



00039

00039



L.B. Holthuis  
1953











Petri Andreae

# MATTHIOLI SENENSIS

Serenissimi Principis Ferdinandi  
Archiducis Austriae &c.  
Medici,

COMMENTARII SECUNDO AVCTI,  
IN LIBROS SEX PEDACII DIOSCORIDIS  
ANAZARBEI DE MEDICA  
MATERIA.

Adiectis quamplurimis plantarum, & animalium imaginibus, quæ in priore  
editione non habentur, eodem auctore.

*HIS ACCESSIT EIVSDEM APOLOGIA ADVERSUS  
Amathum Lusitanum: quin & Censura in eiusdem enarrationes.*

Cum Pont. Max. Cæs. Maiestatis, Christianiss. Galliarum Regis, ac  
Illustriss. Senatus Veneti Gratia, & Priuilegio.



VENETIIS,  
In Officina Valgrisi  
M D L X.

For sale

# MATTIOLI

2 E N E 2 1 2

Second Edition

Amsterdam

Motti

COMMUNICABLE

IN THE

OF THE

At the

the

of the



NEW



# S E R E N I S S I M O A C P O T E N T I S S I M O P R I N C I P I F E R D I N A N D O

ROMANORVM, PANNONIAE,

ET BOHEMIAE, ETC. REGI,

INFANTI HISPANIARVM, ARCHIDVCI  
AVSTRIAE, DVCI BVRGVNDIAE, ETC.

Comiti Tyrolis &c. Domino suo  
clementissimo.



V M vniuersam medicinam non modò vetustissimi quique scriptores, Serenissime Rex FERDINANDE, sed recentiorum quoque plerique Dijs immortalibus acceptam referant, eamque ob id non immerito scientiam antiquissimam, celeberrimam, & diuinam existiment: tum eam præcipuè illius partem, quæ medicamentorum doctrinam pertractat, dignam esse censent, quæ Dijs ipsis accepta referatur, & planè diuina habeatur. Non enim fieri posse putant, vt homo ipse per se abditas stirpium, aut animalium, aut fossilium naturas facultatesque inuestiget, adipiscatur, & perspectas habeat, nisi eas primùm à maximo omnium rerum opifice fuerit edoctus. Quamobrem non desunt probatissimi authores, qui reiectis nugis poetarum, & aliorum, qui fabulosè de medicinæ inuentoribus scripserunt, certò credunt, ac rationibus comprobant, Deum opt. max. plantarum & reliquarum rerum omnium, quas terra procreat, facultates Adæ primo humani generis propagatori indicasse; ei que illarum cognitionem infudisse, simulatque illi è terra conformato, vitæ lumen inspirauit. A quo subsecutam ætatem volunt, rerum omnium notitiam hausisse, ac subinde, industria adaucta, res altius diligentiusque exquirere cœpisse: ita vt hinc primùm rei medicæ plurimum cognitionis ac ornamenti accesserit. Quod cum postea animaduertissent innumeri sapientes viri, nouissentque maximam esse huiusce facultatis præstantiam atque vtilitatem, eius voluptate capti, ipsi etiam rei herbariæ, & cæteris, de quibus illa tractat, inuestigandis ac cognoscendis studium impenderunt. Id quod abunde testantur Pythagoras, Aristoteles, Theophrastus, Democritus, Zoroastres, Xenophon, Amphiloehus, Athenæus, Philisthenes, Apollodorus, Aristander, Hipparchus, Aristomachus, Bion, Agathocles, Diodorus, Diocles, Carystius, Epigenes, Euagoras, Praxagoras, Crateuas, Erasistratus, Metrodorus, Nicesius, Pamphilius, Mantias, Herophilus, Hippocrates, Dioscorides, Galenus, Plinius, & alij antiquorum plurimi, quorum nomina, ne longior



sim, quàm deceat, consultò prætereo. Ii siquidem nobilitate ac iucunditate huius scientiæ ducti, studio item posteritatis iuuandæ, & perpetuæ sibi conciliandæ famæ, non dubitarunt varijs sese vitæ periculis committere, dum permultas ignotas peragrarent regionēs, vt veram legitimamque simplicium medicamentorum cognitionem consequerentur. Porro quòd plantarum peritia, aut inuentio, præter eam quam maximam secum adfert voluptatem & vtilitatem, gloriam quoque & laudem pariat sempiternam, nouerunt non tantum vniuersi orbis sapientes, diligentissimi rerum indagatores, sed summi etiam ac potentissimi reges. Quippe illorum claritatem, quæ hinc potissimum ortum habuerat, admirati, rati in hac antiquissima facultate summum splendorem, singularemque præstantiam esse, tantum otij ac studij ad eam percipiendam, & illustrandam contulerunt, vt eorum plerique de plantarum historia & viribus libros condiderint. Nonnulli generosa antidota composuerunt, vt ita suæ, & aliorum mortalium vitæ vsuique consulerent. Alij etsi ex rebus consilio & armis præclare gestis se illustres reddidissent, cum tamen illustriores effici se posse cernerent, si clarissimam stirpium facultatem ipsi quoque suo essent studio prosecuti, è remotissimis terrarum regionibus raras nobilesque plantas ingenti pecunia conquisitas, ad se transferri curarunt, ut certam ac veram earum historiam describerent. Neque illud certè hos latuit, quòd si hac in re studiosè diutius versati, egregium quicquam inuenissent, aut scriptis tradidissent, suum nomen esset nullis non seculis celebre duraturum. quandoquidem herbæ, quæ singulis annis reuiuiscunt, repullulant, & reuirescunt, eos perpetuò in hominum memoriam reuocant, qui illas inuenerunt, vel de ipsarum historia & viribus aliquid posteritatis memoriæ prodiderunt. Qua in re eos minimè deceptos comperimus. nam satis persuasum est omnibus, Gentianam herbam à Gentio Illyriorum rege inuentam, ab eo quidem appellationem mutuatam esse, illi verò claritatem, & immortalitatem retribuisse. Similiter Lyfimachia (vt Plinius est author) Lyfimachum Macedoniæ regem, qui eam inuenit & nominauit, perpetuis laudibus celebrat. Scordium item, Mithridatem magnum illum Ponti regem, à quo Mithridatiæ herbæ nomen accepit: quin & Eupatorium, eundem Eupatorem cognominatum, à quo herbam hanc inuentam & dictam esse volunt, nominis æternitati commendant. Clymenos præterea herba Clymeno regi inuentori suo, Euphorbium Iubæ Mauritanorum, Telephium Telepho Mysiæ regibus, Echium & Anchusa Alcibiadi Atheniensium duci, famam largiuntur æternam. Hinc etiam clarent, Attalus Pergami, & Euax Arabum reges. siquidem hic de simplicium medicamentorum viribus ad Neronem Imperatorem multa conscripsit: ille verò, dum plura (vt Galenus perhibet) aduersus venena, & animalium virus ei aculantium ictus conficeret antidota, plurimum laboris insumpsit, vt legitimas plantas nancisceretur. His accedunt Archelaus Cappadociæ, Masinissa Numidiæ, Agamemnon Argiuorum reges, quorum nomina nulla vetustate extingui poterunt, ob eam quam in cognoscendis prodendisque stirpibus



stirpibus curam ac diligentiam adhibuerunt. Omittam Philometora, Hieronem, & alios plurimos magni nominis reges, ne verbosius, quàm oporteat, rem hanc prosequi videar, qui vel ipsi ex hoc immortalem gloriam retulerunt, quòd rei plantariæ studiosi extiterint, in eaquæ de posteris præclare sint meriti. Sunt etiánum poetæ quàm plurimi, in quorum poematibus Sole clarius lucet, rem herbariam & antiquam fuisse, & semper laudibus decantatam. qua in re & ipsi nedum insigne, sed etiam perpetuum nomen sibi conciliarunt. Ex Græcis quidem produntur Orpheus, Musæus, Hesiodus, Homerus, Alcæus, Rufus Ephesius, quem testatur Galenus, libros quinque de herbis, versibus scripsisse. ex Latinis autem sunt Virgilius; Ovidius, & Aemilius Macer, qui plura de plantis notatu digna, & nunquam interitura, carminibus cecinerunt. Herbarum gloriam mulieres quoque affectasse, & affectas esse, ut quæ multum curæ ac studij earum viribus inuestigandis impenderint, non modò poetæ, sed etiam historici tradunt. Etenim ob id Circen, à qua Circaea herba dicta est, poetæ Solis filiam fuisse fabulantur. Sed hæc re vera eam demum exquisitam herbarum notitiam adepta est, ut non temerè ob eius admirabilia facta illis seculis diuina potius, quàm humana sit habitata. Talis quoque Medea fuit, quæ tantam herbarum notitiam habuit, ut cum compositis ex ijs medicamentis, pluribus senectutem retardasset, Aesonem poetæ finxerunt ultimo affectum senio, ab hac iuuentuti fuisse restitutum. Helena ad hæc Helenio herbæ, quam primùm, ut quidam volunt, seuit, suum nomen impertita est: atque ideo in ea nunc etiam nominatissima viuit. Artemisia verò Mausoli Cariæ regis vxor, alioquin præclari nominis mulier, vel ex hoc memorabilis & immortalis reddita est, quòd suum nomen herbæ inditum reliquerit. Illud insuper satis esse posset, ut quenque ad plantarum cognitionem capeffendam inuitaret, quòd hæc tantum in se vtilitatis habeat, ut etiam animalia ipsa, natura docta plurimarum herbarum vires cognoscant, easque mortalibus indicarint. Quandoquidem cerui dictamnum herbam, quòd vulnerati, eius pastu telum eiecissent, sagittarum vulneribus mederi ostenderunt. Item ceruæ seseli herbam demonstrarunt: testudines cunilam, mustelæ rutam, accipitres hieracium, columbæ verbenacam, hirundines chelidonium, ciconiæ origanum, & alia denique animalia alias innumeras herbas inuenere ac monstrauere. Quocirca si ad prædicta mentem animumque homines conuerterent, si medicæ materiæ primordia spectarent, utpote cum plantæ suis diuinis præditæ viribus, statim ab elementis conditis, è terra emerferint, nullum mihi dubium est, quin omnes faterentur, hanc facultatem antiquitate, nobilitate, & diuinitate cæteras antecellere. Neque ob id solùm illi tantum laudis, admirationis, ac gloriæ debetur, quòd eius cognitio iucunda & delectabilis sit, sed etiam quia utilis ac necessaria existit. Ea nanque sanitatem (qua nihil homini exoptatius esse potest) tuetur, varia innumeraque morborum genera fugat, ferarum virus euincit, & venenorum vim demolitur. quinetiam homines in vita diutius seruat, & sæpe deploratos, quorum scilicet salutis nulla spes reliqua est, ad vitam reuocat. Quod

cùm



cùm rectè quidem æstimassent Romanorum imperatorum nonnulli ( vt libro primo de antidotis testis est Galenus ) etsi in republica administranda, & prouincijs gubernandis ac tutandis plurimùm essent occupati, eos tamen non mediocriter studium tenuit colendæ atque illustrandæ rei herbariæ. Quippe vt legitimas plantas consequerentur, vtque veris aromatibus potirentur, in multis ac longinquis regionibus herbarios magnis sumptibus alebant, muneribusque donabant: hac præterea animi inductione, vt inde non minus gloriæ quàm vtilitatis referrent, quòd ita quoque studerent mortalitatem beneficio demereri. Sanè memorabili suorum maiorum exemplo ducebantur, qui non solùm exuias regum, quos in bello vicerant, trophæis dactas, in triumphis portare, ipsosque reges victos ante se ducere solebant, sed etiam peregrinas plantas, & generosa aromata, quibus raræ præclaræque doctes inerant, in eisdem magno cum honore ferebant. Nec putabant ij, se minorem laudem ac gloriam adeptos esse ex plantis illis, quas postea diligenter suis in hortis ferebant, itemque ex aromatibus, quæ inter sua alia pretiosa reponebant, in suum & aliorum commodum, quàm ex trophæis, simulacris, & arcubus, quæ omnia erigi curabat senatus populusque Romanus in perpetuam rerum gestarum memoriam, & eorum gratiam, qui se tali laude dignos exhibuerant. Magno etiam apud Romanos honore habiti sunt ij, qui de plantarum historia & viribus scripserunt, inque hac facultate claruerunt. Argumento satis manifesto, quòd expugnata Carthagine, omnes bibliothecas, quas inuenerant, varijs regibus ac principibus donauerint, præter duo & triginta volumina de re herbaria & agricultura tantùm, à Magone Pœno scripta, quæ Romam attulerunt, & vt in Latinam linguam verterentur, mandarunt: tantam nimirum solus cum Romanis iniit gratiam Mago ille rei herbariæ, & agriculturæ peritus. Verùm enimvero etsi medica materia nullis olim non sæculis celebris, nec solùm tractata, sed etiam exculta fuerit, accidit tamen vel regnorum euerfionibus, vel seditionibus, & bellis tum ciuilibus, tum externis, vel grassantis pestilentiae sæuitia, vel medicorum qui nos præcesserunt incuria, vt tam præclara diuinaque facultas superiori nostro sæculo obsoleta, intentata, & inculta iacuerit, adeò vt perpaucae reperirentur medici, qui alias ferè plantas, quàm olera, quorum frequens est in cibis vsus, cognoscerent. Qua quidem re animaduersa, complures ætatis nostræ clarissimi viri, & rei medicæ diligentissimi indagatores, Latini & Græci sermonis peritissimi, Hermolaus Barbarus, Nicolaus Leonicensis, Ioannes Manardus, Ioannes Ruellius, Marcellus Vergilius, Leonhartus Fuchsius apud Germanos claræ eruditionis medicus, Antonius Musa in academia Ferrariensi doctrina celebris, Otho Brunfelsius, Iacobus Syluius Aloysius Mundella, & alij, strenuam nauarunt operam, vt discussa superioris sæculi caligine, medicam materiam è tenebris eriperent, & suæ luci restituerent. Quos equidem eo quo potui maiori studio atque industria secutus, cùm multis iam annis animaduertissem in vniuersis Italiæ pharmacopolijs cùm à seplasiarijs ipsis, tum maximè à medicis huius facultatis ignaris, quàm plurimos



plurimos errores, eosque graues & detestandos, committi in humanæ vitæ discrimen, ac sæpe in eiusdem perniciem, vt illorum errores tollerentur, habita nostrorum pharmacopæorum ratione, quorum pauci satis Latine sciunt, Dioscoridem Anazarbeum & Græcum, & antiquissimum scriptorem, ac in simplicium medicamentorum historia, & viribus reddendis facile principem, in Italicam linguam vertendum, & Italicis item commentarijs, vt possem, illustrandum suscepi. In quos vtique, quantum ingenio, quantum labore ac cura, quantum denique iudicio consequi potui, contuli, vt legitimas quas puto plantas proderem, meamque similiter, de cæteris simplicibus medicamentis proferrem sententiam. Qua in re coacti fuimus non modò seplasiariorum, & medicorum superioris ætatis, qui hanc medicinæ partem neglexisse videntur, errata passim explodere, sed recentiorum quoque, qui tamen materiam hanc diligentissimè tractarunt, opiniones sæpenu-mero refellere. Nec certè mirum, quòd viri alioqui doctissimi, & summa laude digni impegerint, lapsique fuerint, vel in tanto rerum discrimine vacillantes, vel interdum humana caligine cæcutientes: quod quidem & nobis aliquando accidisse hoc opere non dubitamus. Porro plantarum & animalium historiam latè, quantum res postulare visa est, complexus sum. In viribus autem recensendis, eas cuique plantæ ex Galeno in fine reddidi, eoque ferè semper contentus fui, nisi quando quid ipse prætermisit. Præterea cum plura sint plantarum, aromatum, & aliorum simplicium medicamentorum genera, quæ frequentem in medicina vsum obtinent, partim à Mauritanijs, partim ab alijs, qui per singulas ætates claruerunt, inuenta, de quibus nusquam, quod extet, meminerunt Dioscorides, Galenus, alijque veterum Græcorum authores, ea omnia nostris commentarijs inseruimus, ipsorumque historiam & vires, ea qua potuimus diligentia, descripsimus. Hoc opus vbi ad vmbilicum perduxissem, vel amicorum hortatu edidi, eo in primis animo, vt aliqua ex parte industriâ mea hominum vitæ prodessem, deque ea bene meritis existimarer. Affecutus hoc sim necne, nostrum non est, ferre iudicium. Nisi temerè fortasse à nobis dictum videretur, illud certè testari possem, me ex eo coniecisse, non ingratum opus Italis, neque inutile fuisse, quòd paucis post annis tertio, & quarto, & quinto (ni fallor) fuerit excusum & venditum. Adderemque non vulgare de eo doctorum virorum iudicium, ex quo etiam cognoui, me non oleum nec operam planè luisse. Id profectò me mouere debebat, vt si quid de exteris quoque gentibus promereri possem, tentarem, ne viderer in hoc Italis solis natus. Sed illud præterea huc accessit, quòd ex illis etiam aliquos nostris commentarijs, quauis Italicè conscriptis, delectatos esse, ex ijsque fructum aliquem cepisse intellexerim. Cuius rei illud mihi satis manifesto indicio fuit, quòd ex recentioribus tam Germanis, quàm Gallis scriptoribus inuenerim, quibus placuit nostras qualescunque sententias interpretari, suisque scriptis interferere, neque eas tantùm nobis ingenuè acceptas referre, sed de nobis etiam (quæ eorum fuit humanitas) admodum honorificè loqui. Quorum erga nos vo-

luntatem



luntatem vt augerem, & studium omnium externorum, si possem, adiuuarem vtque illis gratiam aliquam rependerem, & cum alijs omnibus inirem, nulla mihi commodior ratio visa est, quàm vt Italicos nostros commentarios in Latinam linguam transferrem. Hos itaque vt primum potui, Latinos feci, in quibus tamen plura mutauì (quod maxima rei difficultas tulit) plura auxi, & omnia quodammodo illustraui. Adiecimus insuper quamplurimas plantarum & animalium imagines, quanto fieri potuit diligentius, ad naturæ imitationem expressas, magnis cum laboribus, tum sumptibus; non alia mehercle ratione, quàm vt ijs, qui terras peragrarè non possunt, nec præceptores habent, quasi hortulum exhiberemus, in quo omni tempore, nullo cultu adhibito, viuas ferè stirpium effigies spectarent. Quinetiam huic secundæ editioni quamplurimas adiecimus imagines, quæ partim plantas, partim verò animalia nonnulla referunt: de quibus præter ea, quæ Dioscoridi tradita sunt, in hisce commentarijs peculiàriter differuimus. Aucta sunt vel ipsa commentaria innumeris ferè locis, vt facilè conijcient ij, qui diligenter priorem editionem perlegerunt. Enimuero, Serenissime Rex FERDINANDE tanto semper cognoscendæ materiæ medicæ, & iuuandæ posteritatis desiderio exarsi, vt facilè impulsus sim per varias ire solitudines, loca tum amæna, tum horrida perlustrare, & abditas terræ fibras scrutari, vt res ipsas oculata fide cognoscerem: quas modò, vel cum vitæ meæ periculo, in præruptis montium locis quæsiui, modò impensis & asperis syluis, modò in conuallibus opacis, modò in collibus apricis; nunc in paludibus & lacubus, nunc in fontium & fluminum ripis, nunc in littoribus maris, aliàs in campestribus aruis, pratis, & vinetis, aliàs in clarissimarum vrbiùm viridarijs, aliàs in ruderibus, & collapsis ædificijs, aliàs in speluncis, & longis terræ meatibus, aliàs in subterraneis metallorum fodinis, & eorum fornacibus: Ex quibus sanè locis plura mecum detuli simplicia medicamenta, quæ ab adulterinis (quorum est in officinis vsus) maximè distant. Nec me certè labores aut pericula deterruissent à magnis longisque itineribus, quòd Galeni exemplo mare traiecissem, & Cyprum, Cretam, Lemnum, Syriam, Aegyptum, aliasque regiones peragrassem, vt multa præclara simplicia, quæ hodie desiderantur, essem consecutus, ad mortalium cognitionem & vsum transferenda, nisi meæ animi propensione obsistissent negotia domestica, agròs curandi pietas, & corporis imbecilla satis constitutio, quæ me quidem maris, & longæ peragationis incommoda ferre non diu permisisset. His tamen nostris secundis conatibus magnam opem tulerunt (nec enim me pudet uerum apertè fatèri) nonnulli huius ætatis medici clarissimi, & rei herbariæ peritissimi, quorum alij plantarum missione, alij consilio, alij rerum inuentarum communicatione, mihi multum profuerunt. Inter quos potissimum non grauarer hoc loco commemorare, si possem illis ex beneficij accepti commemoratione aliquam referre gratiam; Lucam Ghinum Forocorneliensem, Medicum, ingenij & doctrinæ singularis, Pisis magna cum omnium laude rem herbariam profitemem: item Gabrielem Faloppium Mutinensem, medicum eruditio-

ne &



ne & experientia clarum, qui Patauij honoratissimè humani corporis fabricam pariter & materiam medicam profitetur : necnon Andream à Lacuna Secobiensem medicum præstantissimum : præterea Bartholomæum à Maranta Apulum medicum apprime eruditum : Vlysses quoque Aldrouandum Bononiensem honestissimi generis, probatæ doctrinæ, & magnæ expectationis medicum. Quibus omnibus eò magis me deuinctum esse intelligo, quòd ij pro sua tantum humanitate ac liberalitate, me, quem non noverunt nec viderunt vnquam, amore & officio prosequantur : nisi fortè eorum in nos beneuolentia ex eo orta sit, quòd iam aliquam de nobis conceperint opinionem ex nostris Italicis commentarijs. Non defuerunt etiam amicitia & affinitate nobis coniuncti, quorum studio ac diligentia, mihi licuit hoc tempore non aliter peragrandi, ex diuersis locis plures plantas consequi, earumque picturas edere. Sed præsertim in hoc pro nobis assiduam nauauit operam Io. Odoricus Melchiorius Tridentinus medicus spectatæ eruditionis, & magnæ spei iuuenis, qui me in patris loco semper habuit. Et qui ob suam præclaram eruditionem à Serenissima Bohemiæ Regina in sui, & aulæ suæ commodum in medicum honorificè ascitus est. Sanè is tum Patauino, tum Venetijs complures stirpes non vulgares ad nos perferri curauit. Adiuuit nos quoque mirum in modum Georgius Liberalis iuuenis artis pingendi peritissimus, qui dum assiduè plantarum & animalium imagines deliniaret, nulli quidem labori ac diligentia pepercit. Est præterea summa probitate, & vitæ integritate vir Franciscus Parthinus Roboretanus, cuius egregiæ doctrinæ, singularisque in re medica experientia tanta est apud multos huius ætatis Principes opinio, vt eorum nonnulli, præcipuè verò Cardinales Tridentinus, & Augustanus, cuius aliquot annis Phisicum egit, magnæ sibi laudi duxerint, quòd talem hunc virum amplissimis muneribus, variisque ornamentis decorauerint. Quo postea factum est, vt nunc in Serenissimi Regis Bohemiæ Medicum meritò euectus fuerit. Est etiam Hieronimus Donzelinus Brixianus, vtraque lingua, eruditione, & iudicio summo clarissimus medicus : qui quidē modis quàm plurimis labores hosce nostros adiuuantes, maximo nobis fuerunt ornamento. Potuisssem equidem hæc omnia dissimulare, & mihi soli vniuersam laudem vendicare. sed absit omnis inanis gloriæ cupiditas. Etenim benignum est ( vt Plinius in epistola ad Vespasianum scitè inquit ) & plenum ingenui pudoris, fateri per quos proficimus. Cæterum quandoquidem Dioscorides non modò quinque libris tradidit vniuersam medicam materiam, quæ plantis, animalibus, & metallicis comprehenditur, sed his etiam sextum attexuit, in quo ad mortalis generis vsum de antidotis diseruit, quibus venena omnia arcentur, ac omnium venenosorum animalium morfus ictusque curantur, ideo nos ipsum secuti in hunc quoque commentarios scripsimus, in quos plura regeßimus, quæ vitæ hominum profutura speramus. Nam præterquàm quòd improborum veneficorum insidijs pateant cum vniuersum genus humanum, tum maximè reges ac principes, non de-



sunt etiam innumera animalium genera, quæ morfu vel ictu homines ex tempore interimunt. Quippe scorpiones, stelliones, phalangia nostris in domibus viuunt oberrantque, quæ animalia cum nullam habeant personarum aut locorum rationem, vbique sese recipiunt, & latebras nidosque parant. quo fit, vt interdum ab hominibus inscientibus molestata, ictu venenum inferant, & ictos in perniciem agant. Latent præterea modò in hortis & uiridarijs, modò in vinetis, modò in pratis, alijsque in locis inter flores & herbas, aspidæ, viperæ, & alia venenosa reptilia, quæ vel si tantillum quidem pede premantur, aut excitentur, illicò exitiosum vulnus infligunt: ex quo statim, vel paulò post icti commoriuntur, nisi eis quàm primùm antidotis succurratur. Est & canis, qui etsi homini familiarissimus sit, tamen cum in rabiem agitur, quos momorderit, in horrendum mortis genus plerunque deducit. Quod cum diligenter examinassent rectèque expendissent complures veterum sapientum, quorum superius meminimus, plantarum, aromaticum, & aliorum quoruncunque simplicium medicamentorum vires altius perscrutati, varia aduersus venena & virulentorum animalium morsus antidota composuerunt. Quorum vestigia secutus Mithridates magnus ille Ponti & diuersarum gentium rex, cuius etiam antè mentionem fecimus, cum non magnam satis sibi gloriam ex eo comparasse iudicasset, quòd mortalium solus (vt tradit Plinius) duabus & viginti linguis loqueretur, adeò vt de subiectis gentibus nullum hominem per interpretem compellaret, nec quòd plurimis potitus esset victorijs, ad maiorem adhuc immortalémque suam gloriam medicinæ peculiariter curiosus fuit, & rei herbariæ percipiendæ maximum studium impendit. Quorum vtrunque planè affecutus videtur: nam ex herbarum cognitione antidoti genera inuenit, ex quibus vnum composuit, quod nomen etiam eius retinet, & suum authorem famæ immortalitati consecrat. Huius antidoti vsu adeò corpus suum rex ille firmauerat, tutumque à venenis reddiderat, vt cum ipse vitam finire mallet, quàm Romanorum seruitutem pati, id sæpius fertur frustra veneno tentasse. Mithridatem imitatus est Andromachus doctissimus pariter & elegantissimus Neronis imperatoris medicus. Is siquidem theriaces compositionem inuenit, quæ, Galeni testimonio, à venenis seruauit non solum plurimos Romanorum imperatores, ac innumeros principes, sed & alios quosque, qui eam opportunè sumpserunt. quapropter Galeni tempore, ab ipso magnificè ac splendidè, ita iubentibus imperatoribus, hæc parabatur antidotus. Præteribo Attalum Pergami regem, de quo etiam à nobis antè dictum est, quem quoniam idem studium tenuit antidota conficiendi, ideo is ab ipso Galeno maximis laudibus celebratur. Verumtamen nostra hæc ætas ex horum antidotorum vsu non eum fructum neque vtilitatem capientique, quam sensit antiquitas. Nam etsi eorum nomina monumentis tradita habeamus, atque etiam antidota ipsa in seplasiariorum officinis parata reperiantur, non eos tamen effectus virésque hæc præstant, quas suis nominibus



minibus pollicentur, quasque illa præstare veteres memoriæ prodiderunt. Cuius discriminis illud nimirum in causâ est, quòd plura à nobis desiderantur generosa & pretiosa aromata, quæ legitima ac omnium præstantissima suis antidotis immiscebant Mithridates, Attalus, Andromachus, Galenus, & alij complures veterum: quæque ingenti pecunia, summo studio ac labore, ab Arabum, Aethiopum, Troglodytarum, aliarumque diuersarum gentium regionibus, illius florentissimæ ætatis imperatores Romam adferri curabant. Vbi tamen nemini, præterquam medicis imperatorijs (quod fateatur Galenus) licebat veram ac legitimam theriacen conficere: nisi quis fortè potentiorum fauore, ab Imperatoribus esset ijs præclaris donatus aromatibus. Id quod maximè facit, ne miremur, si theriace nostri vsus, itémque antidotus Mithridatica non perinde pollent viribus, atque earum nomina promittunt, & veterum scripta testantur. At certè in hoc fatis infelicitèr actum esse constat cum vita hominis, vtpote quæ iacturam fecerit maximorum remediorum aduersus venena, aliâque grauissima incommoda, quibus obnoxia est, ac sæpe affligitur. Quamobrem hac nostra ætate, in qua quidem reliqua ferè omnia in pristinum candorem reduci, & suæ integritati restitui videntur, gloriosus & verè fortunatissimus dici posset summus ille Pontifex, inuictissimus ille Imperator, serenissimus ille Rex, magnanimus ille Princeps, sapientissimus ille cuiuscunque reipub. Senatus, qui proprijs animi dotibus Romanos illos imperatores, & alios potentissimos reges imitatus, nullis sineret se vel sumptibus, vel laboribus grauari, sed omne studium omnem operam, omnem denique suam facultatem adhiberet, vt iamdudum deperdita aromata, quæ omnino nobis desunt ad antidota conficienda, in lucem reuocarentur. Enimuero si horum aliquis id faceret, vel si omnes idem facere contenderent, non suæ tantùm & aliorum mortalium vitæ consulerent, deque posteris præclarè mererentur, sed præterea hinc famam assequerentur æternam. siquidem beneficium id posterì summa cum laude proprijs authoribus perpetuò acceptum referrent. Equidem si id mihi non licuit, id saltem quod potui, omni studio industriaque mea præstare conatus sum. nam cum viderem huius nostræ ætatis homines in iisdem quæ priscæ, atque etiam in maioribus vitæ periculis uersari, nobis tamen deesse vera illa ac generosa veterum antidota, ob ea quæ hodie in ijsce desiderantur legitima ac præclara simplicia medicamenta, tentare volui, possentne ex legitimis quæ habemus, composita fieri medicamenta, quæ illorum vicem pensarent. Feci id quidem magno meo labore, longoque rerum vsu & experientia: sed affectus sim necne quod contenderam, ignoro. Illud certè fieri possem, ea semper mihi uisa esse longè felicius theriacæ & Mithridaticæ antidoti vires præstare, quàm quæ passim hac tempestate, earundem nomine conficiuntur. Verùm non omisi, quin in hoc, sicut in reliquis aliorum potius esset iudicium, quàm meum. quandoquidem eo promerendi animo, quem semper habui, in nostris commentarijs in sextum Dioscoridis li-



brum, non solum Dioscoridem ipsum, quantum potui, illustraui, sed quædam etiam antidota nobis inuenta descripsi. Cæterum cum veterem & vsitatum scriptorum morem secutus, patronum quærerem, qui hosce nostros commentarios ab inuidis, maleuolis, & vitilitigatoribus protegeret ac tueretur, cuius item amplitudine, autoritate, & splendore maiores illi quodammodo, grauiiores, & illustriores redderentur, prima omnium mihi occurrit Serenissima maiestas tua, Potentissime Rex F E R D I N A N D E, vt quæ pro sua summa virtute atque immensa clementia, neminem vnquam iniquè depressum non extulerit, aut iniuria aliqua affectum non defenderit. Præterea mihi admodum condecens visum est, vt opus, in quo ea tractatur materia, cuius studio olim reges summopere delectati (quod supra retulimus) perpetuum nomen sibi conciliarunt, non alij quàm Regi dicetur, ei quæ præsertim, quem mira naturalis philosophiæ & rei medicæ voluptas tenet. Quarum facultatum dignitatem & excellentiam quia Serenissima maiestas tua summo studio & amore prosequitur, ideo iure aliquo hos nostros commentarios illi dedicandos esse putauit. Illud quoque me adduxit, vt potissimum tuæ Serenissimæ maiestati eos nuncuparem, quod certò sciuerim, eam hilari admodum vultu, summaquæ humanitate cuiusque conditionis hominum munera suscipere; id quod christianæ charitatis, ac religionis maximum præbet indicium. Huc etiam accedit immensa erga studiosos quosque Serenissimæ maiestatis tuæ benignitas, quæ eos perpetuò promouet, fouet, ac tuetur: sed maximè in medicos, quos ea præ cæteris præcipua benignitate complectitur, vtpote qui diuinam potius, quàm humanam profiteantur facultatem. Quod etiam apud Hebræos testatum reliquit Iesus Syrach diuino spiritu afflatus, dum sic inquit. Ab altissimo orta est medicina, & à rege accipiet munera. medicamenta de terra creauit dominus, & vir prudens non contemnit illa. disciplina medici exaltabit caput eius, & in conspectu magnatum collaudabitur. hæc ille. Porro illud omnibus mirum videri posset, quod Serenissima maiestas tua, etsi in grauissimis negotijs, sui imperij functionibus, & curis dies ferè noctesque versetur, præsertim cum ea sola in vniuersa repub. christiana aduersus immanissimas Turcarum gentes iugiter firmissimum sese offerat propugnaculum, nunquam tamen prætermittere soleat, quin succisiuis quibusdam horis, varijs scientiarum studijs vacet. Sed quid plura referam de tanto Rege? cuius nimirum religionem, iustitiam, prudentiam, pietatem, generositatem, liberalitatem, beneficentiam, humanitatem, ac probitatem admirantur non modò vniuersæ reip. christianæ principes ac populi, sed aliæ quoque gentes, quando nullis hominum præconijs præclarissimæ animi illius dotes satis explicari possint. Reliquum igitur est, vt Serenissimam maiestatem tuam humillimè rogem, vt hoc sui mancipij munusculum, qualecunque sit, in seruitutis meæ testimonium læta fronte accipiat, foueat, & tueatur. Id quod eam maximè facturam spero. nam si munus hoc quasi chartaceum perpendet, exiguum quidem, nec tanto rege dignum videbitur:

debitur : at si animum donantis respiciet , maximum dicet , atque hoc nomine me (quæ illius erit immensa benignitas) suo favore complectetur. Quod si ipsa, vt spero, fecerit, præterquàm quòd quàm plurimos studiosos doctos-  
que viros excitabit, me quidem eò inuitabit atque alliciet; quòd maiora for-  
tasse atque exoptatiora, quæ nostra in officina continuè cuduntur , diutius  
latere non sinam. Quæ si in lucem quandoque prodibunt, ea  
vniuersa posteritas Serenissimæ maiestati tuæ accepta feret.

Cui non solum hæc, sed & me ipsum, & seruitutem meam  
dedico, dono, ac voueo. Goritiæ, Calen,  
Ianuarij, M. D. LIIII.

Sereniss. Maiestatis tuæ.

Mancipium

Petrus Andreas Mat-  
thiolus medicus.



# PET. ANDREAE MATTHIOLI

## ad medicæ materiæ studiosos,

### Præfatio.



**I** V E L L E M eorum morem sequi, qui antequàm opus suum aggredi-  
antur, illud in primis profitentur, nihil sibi maiori curæ ac studio esse,  
quàm ut vitæ vsuique mortalium consulant, hoc ipse quoque ingenuè face-  
re possem. Nam ea animi propensione ab ipsa iuuentute, quantum mihi  
otij ab artis medicæ exercitatione, & cura familiari impetrare licuit, id  
totum ad bonorum authorum libros euoluendos, ad simplicium medica-  
mentorum cognitionem assequendam, ac demum ad scribendum con-  
tuli. Qua in re, ut certè apud omnes testatum relinquerem, me hæc  
mente animoq; elaborasse, ut quantum studio, labore, atque industria  
consequi possem, humanæ vitæ prodessem, deq; ea optimè meritis existimarer, Dioscoridi om-  
nem meam operam ac diligentiam adhibui, ut quantum in me esset, illustrior redderetur, atque om-  
nium manibus tereretur. Ad quod ea mihi visa est ratio commodissima, ut ipsum Dioscoridem  
in nostram Italicam linguam transferrem, in eumq; commentarios à nobis Italicè item conscriptos  
adjicerem. quod tunc nos priuatum studium maiorq; cura subiret Italos adiuuandi, quàm cæteros.  
Etenim pauci admodum sunt in Italia pharmacopolæ, ad quos tamen potissimum hæc de medicæ  
materia tractatio spectat, qui Latinam linguam norint. Hoc opus, quod summa animi alacritate  
susceperam, ubi absoluissem emisi vel hortantibus amicis, ut quem fructum antea ex meis labo-  
ribus mihi proposueram, cum postea mortalibus percipiendum, ac omnibus æstimandum exhi-  
berem. Verùm an is talis fuerit, qualis ut esset, contenderam, malim aliorum esse iudicium, quàm  
meum. Illud certè scio ( si tamen id absque vitio nobis testari licet ) à multis in Italia, quorum  
iudicium cæteris omnibus antepono, eo animi candore scripta nostra æstimata ac commendata  
fuisse, quo ipsi illa scripsimus, atque etiam Italis non inutilia, neque iniucunda fuisse. Quorum  
quibus illos legendos tradidimus. Accessit interea mihi non minor inde cupiditas externos quo-  
mentarij Latini fierent. Hac igitur ratione adductus, ut etiam ab externis gratiam aliquam inirem,  
utq; omnibus in vniuersum studio, cura, industriaq; mea prodessem ( quod ego quidem antiquum  
nos reddendos atque illustrandos suscepi. Quo in opere quid præstiterim, planè ignoro. vos, in  
quorum gratiam, tantum in eo laboris insumpsi, quòd iam absolutum quidem ipsum, sed mihi  
nostros commentarios ea animi sinceritate, & æquitate æstiment, qua suos ab alijs æstimari & per-  
pendi vellent: vel qua ipsi aggressi sumus illos conscribere. Nam etsi multorum eruditorum sen-  
tentias refellere ausus sum, atque non pauca fortasse nimis acriter insequi, corrupta scilicet, quæ in-  
doctorum pertinacia nunquam satis explodi possunt; id tamen eo consilio feci, ut quantum inge-  
nio perficere, quantum mente elaborare, quantum denique iudicij in re medica ex studijs, labori-  
bus, ac uigilijs mihi comparare potui, liberè in publicum ad mortalitatis fructum & utilitatem  
proferrem. Sed certæ in hoc longius, quàm statueram, digressa est oratio nostra: eò enim (nescio  
quo modo) irrepsit, ut partem aliquam aperirem nostri scribendi instituti. Quod tamen non pror-  
sus alienum fuisset, nisi eius consilij ratio cum alibi, tum præcipuè superius in epistola nuncupa-  
toria à nobis latius exposita esset, atque à pluribus, opinor, comprobata, quàm ut hoc loco pau-  
cis attingi debuisset. Quare iam ad id nobis accedendum est, quod in primis medicæ materiæ stu-  
diosos admonendos esse putamus, utpote quod nonnihil priuatim ad rem præsentis operis facere  
videatur. Cum enim ab eo tria potissimùm cõprehendantur, Dioscoridis contextus, nostri in  
eum commentarij, & plantarum imagines, de singulis aliqua nobis reddenda ratio est, ut qualem  
me in vnoquoque gesserim, quod confitendum sit, non dissimulem. De contextu itaque Diosco-  
ridis, quem nequaquam prætermittendum censuimus, ob plures causas, quas hic referre nimis lon-  
gum esset, quæret aliquis, cur Ioannis Ruellij Galli medici eruditissimi interpretationem prætule-  
rim, dignamq; existimauerim, quæ præ cæteris in nostris commentarijs legatur; cum tamen duo  
alii viri summi pariter & doctissimi, Hermolaus Barbarus, & Marcellus Virgilius Florentinus in  
idem studium nauiter incubuerint. Fateor ingenuè me Ruellij uersionem secutum esse, sed non  
propterea aliorum præclaros conatus contempsisse unquam; quin potius utriusque studium sem-  
per admiratum, quippe quòd uterque in eo maximam laudem promeruerit. Illud autem me ma-  
gis mouit, ut Ruellium admiserim, quòd eius conuersio omnibus facta sit uulgatior, ac frequen-  
tior



tior in studiosorum manibus versetur. Adde etiam, quòd hæc communi omnium ferè, medicorum præsertim, iudicio præferatur; cui nimirum nobis quoque libuit suscribere. Non tamen illud me certè latuit, Ruellium nimis fortè in ea religiosum fuisse. quippe qui interdum maluerit ipsum Dioscoridem deserere, quàm Plinium, modò Latini sermonis nitore captus, modò etiam rei cognitione incertus. Quare à nobis perspecta, Ruellij quidem interpretationem recepi, ita tamen ut nonnusquam ausus sim ab eo desciscere, vel vetustissimorum probatissimorumq; exemplarium, & vnius Oribasij codicis fidem secutus, vel certa rei experientia fretus. Eorum autem quæ immutavi, nonnulla obelisco adnotata reliqui, nonnullis etiam signum suppressimus. Sanè plura eiusmodi, pluresq; insuper varias lectiones exhibuissem, si maius otium & tempus nobis suppetisset. quæ tamen, Deo concedente, aliquando ad communem vtilitatem, & ampliorem medicæ materiæ disquirendæ campum, dabuntur. Hinc factum est, ut Ruellij nomen contextui præscribendum non duxerim, ne viderer cum eo nomine conuenire, re autem sæpe ab eo dissentire. Satis enim fore putavi, si hic studiosos certiores facerem, me Ruellio Dioscoridis conuersionem acceptam referre: si præterea rationem reddidissem, cur illi non semper addictus esse voluerim. Quod quia abunde, ut arbitror, præstitimus, iam ad alterum nobis propositum, quod de nostris commentarijs erat, progrediamur. De quibus profectò mihi melius esset tacere, quàm pauca dicere, si vellem nasutulis & vitiligatoribus occurrere. Frequens namque hodie est, indiesq; magis pullulat huiusmodi genus hominum in Italia (nescio quid fiat in alijs regionibus) qui nullum in toto vitæ suæ cursu fructum seménue proferunt, alienos tamen auidè carpunt, mox lacerant, & pedibus obterunt. Sed hos hunc missos faciam: alius enim locus, aliud studiorum nostrorum otium postulabit, ut cum ijs sermonem conferamus, vel eos ab hac mala mente deterrendi, vel ad sua quoque proferenda excitandi causa. Verùm ad candidos, & æquos quibus hæc scribimus, nostra sese conuertat oratio. Neminem uelim moueat, lectores optimi, nec id à nobis factum quisquam admiretur, si nobis nostris secundò auctis commentarijs, velut & in prioribus, me inueniat plantas aliquas non incognitas prædidisse, tam quarum meminit Dioscorides, quàm quæ à nobis adiectæ sunt, neque tamen earum imagines pictura expressisse. Hoc (mehercule) factum est, non solùm quòd plantæ nobis cognitæ, dum eas depingi curarem, non omnes nobis in promptu essent, sed quòd etiam deessent sculptores, qui pictas iam in tabulis plantas inciderent. His accessit magna negotiorum moles, quæ studia nostra adeò impedierunt, ut nullus ferè fuerit reliquus lucubrandi locus. Siquidem posteaquàm à Serenissimo Romanorum Rege Ferdinando in eius Serenissimi filij Ferdinandi Archiducis Austriæ Medicum ascitus sum, quum non solùm quotidie præter opinionem multa emergant negotia, ut medicis quibuscunque aulicis plurimùm euenire solet, & longa quandoque itinera sese offerant, & bella quò Medicos suos oporteat sequi Principes; factum sanè est, quum hæc omnia exequi me oportuerit, ut hisce negotijs impeditus, non potuerim per omnia, & vobis, & mihi satisfacere. Atqui non nobis parum fecisse videmur, si inter tot aulica, & bellica incommoda, ingrauescente admodum etiam ætate, commentarios nostros vobis nunc damus, non solùm sexcentis ferè locis auctos, sed quàm plurimis plantarum, & animalium imaginibus insignitos, de quibus nos in ijsdem commentarijs speciatim disseruimus, quinetiam quibusdam, de quibus egit Dioscorides, quæ in priori editione non habentur. Quæ uerò nunc omisimus cogentibus causis præscriptis, ea fortassè aliquandò prodemus, nisi quid nobis humanitus accadat. Nec pigebit vnquam, si forte fortuna successus aliquas horas nactus ero, quin totum id temporis in uestrum, & totius reipublicæ impendam commodum. Cæterùm, ut de imaginibus quoque seorsum aliquid dicam, equidem aliàs abhorui ab hoc dicendi genere, ratus neminem vnquam posse ex iconibus tam veram, & exactam simplicium medicamentorum peritiam assequi, ut eorum varietas possit unica pictura comprehendere. Siquidem non ea est pullulanti herbæ facies, quæ adultæ; neque adultæ, quæ iam senescenti. Quòd si eiusmodi herbarum mutationes omnes singulis picturis deberent repræsentari, quis dubitet id opus futurum infiniti laboris, ac immensi sumptus? Verum enim uerò quum vidissem tales aliorum conatus ab omnibus propemodum commendari, atque in dies crescere studium virorum rerum effigies in publicum edentium, ne solus viderer in diuersam ire sententiam, re ipsa tandem melius perpenſa, & aliter comperta, ac aliud docente ipsa experientia, nolui huic optimo, & minimè infrugifero deesse studio. Huc accedebat, quod non mediocriter ad hoc me incitaret, Typographi cuiusdam Mantuani vanitas, qui nostris operibus Italicè prius editis furtim quasdam inseruerat imagines minimè à nobis adiunctas, quæ quoduis potius, quàm rem ipsam referrent. Gaudebam id adhuc me superſtite contigisse, ut turpem notam falsò mihi iniustam ipse delem. Ideò ut & aliorum conatus, adiuuarem, & malitiosi huiusce calcographi temeritati occurrerem, ipse quoque experiri volui, si quid hac in re præstare possem, non tantùm, ut mea in medium proferrem, sed & ut de vobis studiosis, si possem, benemerer. Sed quàm res hæc nobis difficilis fuerit, non est, quòd pluribus explicem omnes enim sciunt, quàm difficile inueniantur homines, qui res ipsas, ita ut sunt, ad viuum depingant, & qui depictas diligenter insculpant. Quorum maior adhuc inopia est. id quod etiam facile dijudicabitis studiosi, qui in hoc opere nonnullas effigies affabrè fati, nonnullas uerò non satis solerter sculptas offendetis. Sanè quod in rem communem nauare potui, licet illud exiguum esse intelligam, in eo non commisi, ut in eum studium, opera, aut diligentia à vobis desideretur. Quid autem profecerim nescio, uestrum erit iudicium. Sed

longè



longè aliter quàm nos videtur fecisse Cornarius, vir alioqui in vtraque lingua doctissimus, & qui inter omnes alios fortè singularis haberi velit. Is enim suo in Dioscoride, quem nunc primum uertit, & emblematis quibusdam auxit, non solum nullas appinxit imagines, sed eos etiam acriter damnat, qui eas suis inseruerunt commentarijs. Sed an liuore potius, uel ratione ductus, uos iudices esse uelim, si quandoque illius boni uiri legeritis præfationem, & eius animum diligenter explorabitis. Nam etsi Galeno dictum sit (id quod & nos ante Cornarium scripsimus) plantarum imagines parum conferre ad earum indagandam cognitionem, non tamen ob hoc accusandi sunt, qui plantarum, & animalium icones in suos conferunt libros. Quippè quoniam nusquam inuenerim damnasce Galenum plantarum imagines, que in libris appingi solent, sed eos, qui existimant se rei plantarię peritissimos euadere posse, non solum imaginum inspectione, sed & librorum quoruncunque lectione, licet fuerint ij à summis, grauissimisque authoribus conscripti. Quamobrem non parum mirari subit, Cornarium alioqui uirum apprimè doctum Galeni uerba non modò non intellexisse, sed in reprobum quoque distraxisse sensum. Quo fit, ut hinc facillè suspicari quis possit, quòd quum uideret Cornarius omnium ultimus Dioscoridis interpres, nullum sibi reliquum iam esse locum, quòd noui aliquid de plantarum imaginibus afferere potuerit, id sibi consilij ascuiisse, ut eos acriter detestaretur, qui plantarum picturas in suis libris habent, ratus fortassè hoc detestandi genere, non solum plurimum sibi laudis comparare, sed etiam suum obtigere infortunium, suamque (quod eius pace dicam) in plantarum historia imperitiam. Quæ enim sit alia ratio, cur aliorum damnat industriam? quasi posteris non sit id licitum, ut & ipsi aliquid suo ingenio, & studio excogitent, quod ab antiquis arte non sit animaduersum. At non damnasce Galenum plantarum imagines, nec libros de plantarum historia conscriptos, sed eos, qui horum tantum inspectione posse quenquam rei plantarię fieri peritum crediderant, id manifesto fuerit argumento, quòd ipsemet Galenus libro primo de alimentorum facultatibus posteritatis memoriæ prodidit, cum inquit, Comparatos nobis esse hosce libros, ut nobis sint eorum, quæ antè didicimus monumenta, non ut rudes & ignari per illos doctrinam perfectam assequantur. Quòd si qui sint qui præceptoribus careant, uelintque ijs, quæ luculentè ac copiosè sunt scripta diligenter incumbere, magnum indè fructum eos accepturos testatur idem Galenus, præsertim si ea relegere non grauentur. Quibus palàm est longè magis detestandos esse eos, qui clarissimorum hominum laboribus inuidentes, nil aliud, quàm blaterare, ac carpere sciunt, quàm eos, qui reipublicæ commodis semper prodesse cupientes, nil aliud agunt, quàm ut boni semper aliquid, & noui in publicum usum promant. At qua re imagines, & non libros damnauerit Cornarius, cum non minus ex Galeni sententia eorum lectione, quàm imaginum inspectione, quis neutrquam proficere ualeat, non satis animaduerto. Cur tantum laboris, si nihil profuerit, in uertendo Dioscoride adiectis etiam emblematis incassum suscepit? Hòcne ei erat studium, huncne capiebat animum, ut in uanum laboraret? Porro nil aliud uobis dandum, dicendumque superest. Spero tamen ab ijs, qui grati sint (ingratos, malculos, ac inuidos nihil sanè moror) me gratiam initurum, quandoquidem mihi communis utilitatis cupidissimo hoc opus non aggrediendi uoluntas defuerit, sed perficiendi facultas, quam tamen omni studio consequi assidue conamur. Bene ualete, & nostra boni consulite.

## Vincentius Valgrisius

Candido Lectori S.



**D**RAESAGIT mihi animus, candide Lector, multos fore, qui uno ore institutum hoc meum damnent, & iam odiosas eorum voces audire mihi videor, qui coniuratis animis aduersum me nouum querelegenus instituant, Perperam enim & ineptè me facere, qui hosce Matthioli Commentarios toties excussos, toties interpolatos mutatis non solum plantarum imaginibus, uerum etiam additis plerisque rursus in publicum emittam, meque in causa esse, ut studiosi bonarum artium tot inanes, & superuacaneos sumptus faciant. Porro longè satius fuisse, si in aliquot annos editionem distulissem. Quis enim ambigat authorem ipsum hoc temporis spacio plenis (quod aiunt) uiribus ad eam rem fuisse accessurum, & summam manum tanquam Colophonem semel absoluto operi impositurum. Nunc uerò nihil aliud à nobis agi, quàm quòd nouis subindè editionibus eos obruimus, ut eò speciosius ab ipsis pecunias extorqueamus. Hæc & similia de me fortassè aliqui. Quibus quid est quod interim respondeam, nisi quòd conatus hic noster eorum gratia non suscipitur, quos auaritię studium transuersos agit? Ab his enim tantum abest, ut lucellum aliquod expectem, ut sim potius illis vltro etiam magnas gratias habiturus, si tabernam nostram nunquam salutarint. Alijs uerò, quos insignis animi liberalitas, excellentesque virtutes præ cæteris exornatos reddunt, noster omnis labor, & industria dicata est, neque vlla est res tanta, quam horum causa non & libenter, & studiosè sim facturus. Hæc tamen nequaquam eò dixerim, quasi sordidum lucrum communi hominum utilitati præferre uidear uelle, id quod à me tantum



tum abest, ut nihil abesse longius possit. Sed ut intelligas studiose Lector, nullam esse tam modestam felicitatem, quæ malignitatis aculeos effugere possit; quanquam nolim totius defensionis meæ cardinem, ac vim in hoc solo versari, cum longè aliæ & iustissimæ quidem sint causæ, quæ me ad edendos rursus hosce commentarios induxere. Etenim quis est, qui nesciat, si editionem hanc in aliud tempus reiecissem, euenturum omninò fuisse, ut quàm plurimi studiosi huius artis, (me authore) iacturam in studiis facerent, præsertim cum abhinc annum nulla exemplaria Venetijs reliqua fuerint; quo tempore confluebant turmatim ad me vndique studiosi homines, qui quotidianis propè conuicijs à me eosdem Commentarios efflagitabant. Id quod cum multis alijs exploratissimum est, tum uerò vel maximè mihi ipsi satis superq; cognitum: qui singulis horarum momentis adèd ab istis exagitabar, ut penè obscuruerim ad eorum querelas. Itaque operæpretium me facturum existimaui, si rursus hosce commentarios excuderem: alioqui videbam mihi eodem tempore duplex crimen sustinendum. Nam & multorum studiosorum animos hac de causa à me alienassem, & rationem nullam habuisssem eorum, qui Matthioli commentarios vel non viderunt, vel non legerunt. Quorum alterum priuatis meis rationibus plurimùm obfuisse, alterum etiam inhumanum videri poterat, eos scilicet huius lectionis fructu diutius priuari, qui minimè omnium debebant. Quamobrem nullum iam ex studiosis futurum arbitror, qui mihi vitio uertat, quòd hosce commentarios ita auctos, & locupletatos adiectis quàm plurimis plantarum & animalium imaginibus, quæ in alijs editionibus desiderabantur, rursus imprimendos susceperim. Nam cum huius artis cognitio longè, lateq; pateat, neque ullis cancellis sit conclusa; non video, cur ei qui in hoc argumenti genere aliquid scripserit, aut lucubrarit, non liceat suo quasi iure quotidie aliquid addere, immutare, inducere, breuiter scripta sua facere meliora: id quod authorem ipsum in hisce commentarijs fecisse manifestum est. Quinimò ausim hoc planè affirmare, olim permolestum studiosis omnibus futurum, ubi viderint illum alijs studiis impeditum stationem hanc, quam diu tueri cepit, aliquando deferere, neque quicquam amplius in hoc genere meditari, quod in hos commentarios conferat, cum uerisimile sit ipsum & multa & præclara adhuc habere, quæ ad hanc præstantissimam simplicium cognitionem spectent, in qua ille (uti ego ab omnibus doctis passim circumferri audio) non postremum inter alios sibi locū vendicat. Illud satis constat multos acerrimi iudicii homines pleraque ex illius commentarijs mutasse, & scriptis suis inseruisse, nonnullos etiam ex illius laboribus quosdam veluti centones confarcinasse: ut vel hinc coniectari liceat, qua eruditione, qua doctrina vir ille polleat. His igitur de causis hunc librum denuò in manus assumpsi, eumq; (vti antea dixi) tot simplicium & animalium imaginibus auctum, multoq; magis quàm antea locupletatum, typis excudendum censui. Adiecimus præterea tabulam comprehendentem vim & naturam omnium simplicium ad omnes corporis morbos applicatam, ex qua uix dici potest quantum utilitatis & fructus sint studiosi percepturi. An igitur quisquam me reprehendat, quòd hanc prouinciā imprimendi præclari huius operis toties suscipiam? Quòd si iustos iudices sortiri mihi contingat, quicq; ratione potius quàm liuore & odio moueantur, nihil addubito quin omnibus calculis pro me sententiam ferant. Porro quoniam superioribus annis receperam, me in lucem daturū Apologiam Matthioli contra Amathum Lusitanum, vnā & Censuras in illius enarrationes, ne fortè quis fidem meam hac in re desideraret, visum est eam hisce commentarijs adnectere. Quamquam uerò author semper eo animo fuerit, ut libellus non diuulgaretur, quòd existimaret non esse magnoperè gloriosum (ut ipse ait) uincere eum hominē, qui se iam passim omnibus, ut verbis ipsius utar; deridendum propinarit, palamq; omnibus fecerit impudentiam suam; tamen, ne quis me læsæ fidei reum in iudicio sisteret, nihil non feci, ut author precibus meis locum daret. Et iam omni prorsus spe cadere cæperam, nisi acerrimi iudicii homines quotidiano propè conuicio id à Matthiolo efflagitassent. Aiebant illi plurimùm referre, ut ea scripta ederentur; fore enim ut hinc omnis posteritas apertè intelligat, non solùm quàm ille omni culpa in eo uacet, in quo falsò accusatur, uerùm etiam ut Lusitani (uti ipsi addebant) arrogantiam & inuidentiam perspectam & exploratam habeat, cuius exemplo cæteri admoniti ab hac prouincia possint abstinere, neque in probos & doctos viros tam contumeliosè debacchentur. Huc accedit quòd non parum emolumenti, & frugis hinc ad studiosos omnes sit peruenturum, ob uariam & multiplicem doctrinam, quæ in hisce scriptis comprehensa est. Quid multis? Annuit Matthiolus, passusq; est Apologiam vnā cum Censuris in lucem edi. Exilui meherculè præ nimio gaudio, quòd tandem id essem aliorum opera consequutus, quod tantoperè semper optaueram. Sed mirum est quàm difficilem sese hac in re author præstiterit. Reliquum est, studiose lector, ut ad hanc præclarissimam simplicium cognitionem te horter; non enim dubito, quin uberiores & suauiores fructus in dies ex ea percipias. Vale, ac labore nostro fruere.



## EXEMPLVM PRIVILEGII PONTIFICII.



OTV PROPRIO &c. Cum, sicut dilectus filius Vincentius Valgrifus bibliopola, & typographus Venetus nobis nuper exposuit, ad communem omnium studioforum vtilitatem, sua propria impensa, Commentaria dilecti filij Petri Andreae Matthioli medici Senensis in sex Pedacij Dioscoridis Anazarbei libros de medica materia, nunc primum ab ipso in Latinum conuersa & aucta, cum innumeris plantarum, & animalium figuris, quæ ad idem opus spectant: item Almanachum suæ Ephemeridas supputatas per dilectum filium Nicolaum Simoni Bononiensem mathematicum: necnon Dialogos seu Colloquia dilecti filij Iulij Alexandri Piccolomineum Senensem Hetrusco sermone conscriptam: item Carmina dilectorum filiorum Io. Baptistæ Pignæ, & Reueren. Calij calcagnini, & Ludonici Areosti Ferrariensium: præterea Centuriam consiliorum Io. Baptistæ Montani Veronenis: insuper libros Ioannis Schoneri mathematici de iudicijs natiuitatum, in Italicum sermonem per Io. Baptistam Carellum conuersos, hætenus non impressa, imprimi facere intendat, dubitetq; ne huiusmodi opera postmodum ab alijs absque eius licentia imprimantur, quod in maximum suum præiudicium tenderet. Nos propterea eius indemnitati consulere volentes, Motu simili, & ex certa scientia eidem Vincentio, ne supradicta opera per ipsum imprimenda, per decem annos, post dictorum operum impressionem à quocunque sine ipsius licentia imprimi, aut vendi, seu venalia teneri possint, concedimus, & indulgemus, inhibentes omnibus, & singulis tam in Italia, etiam in Fulginatensi, & Raccanateni ciuitatibus, quàm extra Italiam existentibus, bibliopolis, & librorum impressoribus sub excommunicationis lætæ sententiæ. In terris uerò S. R. E. mediâtè vel immediâtè subiectis, sub ducentorum ducatorum auri, pro vna, fisco cameræ Apostolicæ, & pro alia medietatibus, eidem Vincentio eo ipso applicandis poenis: & insuper amissionis omnium librorum, quoties contrauentum fuerit ipso facto, & absque alia declaratione incurrendis, ne intra decennium ab impressione dictorum operum respectiue computandum, dicta opera sine eiusdem Vincentij expressâ licentia imprimere, vendere, seu venalia habere, aut proponere quomodolibet audeant. Mandantes vniuersis venerabilibus fratribus minoris, Archiepiscopis, Episcopis, eorumq; Vicarijs in spiritualibus generalibus, & in statu C. S. R. E. etiam Legatis, & Vicelegatis sedis Apostolicæ, ac ipsius status gubernatoribus, vt quotiens pro ipsius Vincentij parte fuerint requisiti, vel eorum aliquis fuerit requisitus, eidem Vincentio efficacis defensionis præsidio assistentes, præmissa ad omnem ipsius requisitionem contra inobedientes, & rebelles per censuras Ecclesiasticas etiam sæpius aggrauandos, & per alia iuris remedia, auctoritate Apostolica exequantur. Inuocato etiã ad hoc si opus fuerit auxilio brachij secularis, non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, priuilegijs quoque, indultis, & literis Apostolicis quibuscunque, & præsertim dictis Fulginatensi, & Raccanateni ciuitatibus, super libertatibus, & exemptionibus mercatorum quorunlibet, tempore nundinarum, eorundem ciuitati, ac alijs quomodolibet editis, concessis, confirmatis, & innouatis etiam iteratis vicibus. Quibus omnibus illorum veriores tenores pro sufficienter expressis habentes; hac vice duntaxat, specialiter, & expressè pari motu derogamus, cæterisque contrarijs quibuscunque. Et insuper quia difficile admodum esset præsentem motum proprium ad qualibet loca deferri, volumus & Apostolica auctoritate decernimus, ipsius transumptis, uel exemplis plenam, & eandem prorsus fidem ubique tam in iudicio, quàm extra haberi, quæ præfenti originali habeatur: & quod præsentis motus proprii, absque eo quod publicetur, aut in eo data apponatur, sola signatura sufficiat, & ubique fidem faciat in iudicio, & extra, regula contraria non obstante.

## EXEMPLVM PRIVILEGII GAESAREI.



AROLVS Quintus, Diuina fauente clementia, Romanorum Imperator Augustus, ac Rex Germaniæ, Hispaniarum, vtriusque Siciliæ, Hierusalem, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ &c. Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ &c. Comes Habsburgi, Flandriæ, Tyrolis &c. Notum facimus tenore præsentium vniuersis. QVVM sincere nobis dilectus Vincentius Valgrifus bibliopola, & chalcographus Venetus, nobis reuerenter exposuit, se constituisse in communem omnium, & præcipuè rei medicæ studioforum vtilitatem, suis proprijs impensis imprimere, & imprimi facere Commentaria hætenus non impressa in sex libros Dioscoridis Anazarbei, de simplicium historia & viribus latinitati reddita per honorabilem, doctum, nostrum & Imperij sacri fidelem dilectum Petrum Andreæ Matthiolum Senensem, artium & medicinæ Doctorem, cum figuris omnium plantarum, animalium, aliarumq; rerum eidem operi spectantium. Vereri autem ne eiusmodi Commentaria & figuræ, postquàm ab ipso magno labore ac sumptu impressa fuerint, ab alijs chalcographis aut bibliopolis tenere imprimantur & distrahantur, in non modicum ipsius damnum & detrimentum. A nobis proinde humiliter petendo, vt ipsum Priuilegio ac Edicto nostro aduersus eam iniuriam munire vellemus. Nos igitur cupientes in primis illorum indemnitati consultum, qui magnis suis impensis & laboribus vtilitati publicæ prodesse student. Idcirco tenore præsentium, ex certa nostra scientia, & pro ea auctoritate, qua tam ratione Imperialis dignitatis, quàm alijs fungimur, edicimus, statuimus, & districtè inhibemus, ne quis typographus seu impressor, aut cuiusvis alius cuiuscunque status & conditionis existat, per totum Romanum Imperium, & ciuitates, terras, ac loca nobis & eidem Romano Imperio, mediâtè vel immediâtè subiecta, tam in Italia, quàm in Germania, & vniuersa Ditione nostra, prædicta Commentaria in Dioscoridem, per præfatum Vincentium Valgrifum imprimenda, infra decennium ab illarum prima editione, ab illarum prima editione, absque ipsius Vincentij expressâ licentia imitari vel imprimere, seu albi impressa seu excusa, intra fines sacri Romani Imperij, & Ditionis nostræ importare, adducere, ac vendere audeat & præsumat. Quatenus præter nostram, & Imperij sacri grauem indignationem, & amissionem librorum, sic per æmulationem



mulationem impressorum ( quos eidem Vincētio , vbicūque nactos , per se vel agentes suos ad se recipiendi , & in vsum suum uertendi ius esto . ) poenam quoque sex Marcharum auri puri , Fisco nostro Cæsareo , & ipsi Vincētio , ex æquo , quotiescunque contrafactum fuerit , irremissibiliter applicari , cupiant euitare . Harum testimonio literarum , manu nostra subscriptarum , & sigilli nostri impressione munitarum . Datæ in ciuitate nostra Imperiali Augusta Vindelica , die vigesima prima mensis Februarij . Anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo primo , imperij nostri trigesimo primo , & Regnorum nostrorum trigesimo sexto .

## EXEMPLVM PRIVILEGII GALLIARVM REGIS.



**H**ENRY par la grace de Dieu Roy de France : Aux Preuostz de Paris, Bailliez de Rouen, Seneschaulx de Lyon, Tholouse, & Bordeaux; est a tous noz aultres Iusticiers, officiers, ou leurs lieutenants quil appartiendra salut. Nostre cher & bien aime Vincent Vaugrys libraire & Imprimeur demourant à Venize; Nous a faict entendre par lettres que nous a escriptes nostre aime & feal conseillier maistre des requestes de nostre hostel, est nostre ambassadeur deuers la Seigneurie de Venize; Que auecq grandz fraitz peiues soinz & labeurs, Il ha faict traduire le liure de Dioscoride auecq les figures au naturel, est les commentz latins du docteur Philosophie & medecin Maistre Pierre Andre Mathiol Senoys, & pareillemēt les figures de tous les simples qu'il ha faict porctraire & designer au naturel, pour le benefice cōmūg de tout le monde, est pour l'ayde & support des corps humains lesquelz il ha faict Imprimer alla dictē Venize, & pour autant qu'il crainēt que aucuns libraires est Imprimeurs de nostre Royaulme ne s'ingerēt & entremettent de faire Imprimer, est porctraire ledict liure, & par ce moyen le frustrer de ce qu'il pretend du fruit de son labeur. Nous suppliant & requerant a ceste cause luy vouloir surce pourueoir. Pource est il que Nous inclinans à la requeste que nostre dict ambassadeur nous ha faicte pour ledict Vincent Vaugrys. Et voulants luy subuenir en cest endroict auons de Noz certaines sciences, plaine puissance & auctorite Royal; prohibe & defendu, prohibons & defendons, à tous libraires Imprimeurs de nostre Royaulme, est aultres personnes quelz qu'ilz soient. Que durant le temps & terme de dix ans ensuyuans, & consecutifz: Commenceans au iour & date de ces presentes, ilz n'ayent à Imprimer ne faire Imprimer, mettre ne exposer en vente lesdictes œures & traductions dudit liure de Dioscoride, ne aussi les portraictz & figures de tous les simples. Sinon celluy ou ceulx qui auront charge d'en vendre, est exposer en vente de la part du dict Vaugrys sur peine d'amende arbitraire a nous à appliquer, & de confiscation de tous les dictz liures, est œures qui ainsi se trouueront Imprimez sans charge ne commission dudit Vincent Vaugrys. Si uous mandons cōmettons, est a vn chascun de vous endroict, soy & si comme a luy appartiendra. Que selon & ensuyuant ce que dessus uous faictes ou faictes faire expresse Inhibitionz & defences de par Nous, sur les peines que dessus ia dictes, est aultres que uerrez estre à imposer a tous les dictz Imprimeurs, libraires, demourans en voz iurisdicctions & destroictz. Que parcy apres ilz n'ayent aucun d'eulx, ny aultres (que celluy ou ceulx qui auront charge expresse de ce faire dudit Vincent Vaugrys,) ayant à Imprimer ne faire Imprimer, mettre ne exposer en uente ledict liure traduction & figures dessus dictes; Est si apres lesdictz commandements faictz vous trouuez aucuns contreuenants à iceulx vous procedez a lencontre d'eulx par coudemnation desdictes peines, & aultres, ainsi que uerrez estre à faire selon lexigence des cas; Nonobstant oppositions, ou appellations quelcōcques & sans preiudice d'icelles; par lesquelles ne uoulons estre differē. Car tel est nostre plaisir de ce faire, uous auons donnē & donnons plain pouuoir puissance auctorité, & mandement especial; Mandons & comaudons à tous noz Iusticiers officiers & subgetz à uous en ce faict estre obey. Donné a Saint Germain en Leez, le xxix Jour de Mars. Lan de grace, Mil cinq cens cinquante deux auant Pasque, est de nostre Regne le Sixiesme.

Par le Roy

Duthier

## EXEMPLVM PRIVILEGII ILLVSTRISSENATVS VENETI.



**S**ERENISSIMO Principe & Illustris. Signoria. Supplica il fedelissimo Seruitore di V. Sublimità Vincenzo Valgriso libraro & insieme stampator di libri, che hauendo deliberato di far stampar à honore, & vtile di questa inclita città, i commentari Latini dell'Eccellentissimo medico messer P. Andrea Matthioli sopra Dioscoride, libro non men utile, che desiderato da molti. Et hauendo per maggior intelligentia della materia, che in esso libro si tratta, fatto disegnar & intagliar infinite piante. Per il che ha fatto una grandissima spesa, ne quella solamente è stata in far ritrarre, & intagliare le dette piante da valētissim'huomini, ma in farsi trouar, & portar quelle piante (che sono molte) che qui non nascono, da diuersi paesi, tutto con speranza di mandarle insieme co'l libro in luce, mercē però del fauore, che aspetta dalla bontà di V. Sublimità, si per honore & gloria di questa Clarissima città, come per vilità, & beneficio del corpo humano. Et perche dubita il detto supplicante stampando il sopradetto libro con le dette figure senza'l priuilegio di vōstre Sublimità, che altro Libraro, ouer Stampatore non gli toglia la fatica, & le spese insieme, cauando'l disegno dalle sue figure, facendole poi intagliare, & vltimamente stampandole, prēdendo nel resto il suo libro per esemplare, il che gli faria non solamente perdita delle fatiche, & spese fatte intorno à questa opera, ma cagion grande di sua ruina. Per questo egli hora ricorre alli piedi di V. Sublimità, & à quelle con l'Eccellentissimo Consiglio di Pregadi humilmente supplica d'esserli concesso in special gratia, che altri, che egli, ouer chi da lui hauerà auctorità, non possa stampar, o fare stampar, pigliando questo suo Dioscoride per esemplare, & da esso cauando le figure delle piante, ne da altri in alcun modo stampato vendere il detto libro per spatio di anni quindici, sotto pena à chi contrafarà, di ducati seicento, & di perder tutti i libri, & i disegni che fussero stati fatti, & di pagar ducati dui per ciascuna opera, che fusse stata contrafatta. Et se sarà alcun habitante in questa inclita città,

città, che lo facesse stampare, ouero fusse causa, che si stampasse, in terre aliene, che faria danno di V. Sublimità, & di esso supplicante, trouandosi questi tali s'intendano incorrer nelle sopradette pene. delle quali vn terzo vada all'hospital dell'incurabili, l'altro all'acufator, & l'ultimo all'officio, il qual farà l'effecutione, & che ogni officio, ouer magistrato possa far la detta effecutione, doue sarà fatta la conscientia.

Supplica ancora il medesimo per le sottoscritte opere nella forma istessa, che quella di sopra, & questo tutto domanda in gratia à vostre Sublimità, allequali humillissimamente si raccomanda.

Almanach, ouero Ephemeride per xv. anni, calculato per l'Eccellentissimo M. Nicolò Simo Bolognese.

Colloquia, seu Dialogi iuris &c. dell'Eccellentissimo M. Marco Mantoa Patauino.

La Seconda parte della Filosofia naturale di M. Alessandro Piccolomini, volgare.

La Poesia Latina di M. Giouan Battista Pigna, di Monsignor Celio Calcagnino, & di M. Lodouico Ariosto Ferrarese.

1553. Die. 29. Septembris in Rogatis.

Che al soprascritto supplicante sia concesso quanto'l domanda, essendo obligato di offeruar tutto quello, che disposto in materia di stampe.

Raphael Cornelins Ducalis Notar. &c.



# INDEX EORVM, QVAE IN HOC OPERE CONTINENTVR.

Cuius primus numerus paginam, sequens verò  
paginae lineam denotat.

## A



<b>BIETIS</b> historia	80.40	aconiti historia ex Theophrasto	538.51
<i>Abietis lacryma</i>	80.56	aconiti uires ex Galeno	540.59
<i>Abietis lacrymae uires</i>	81.17	aconiti uenenum, & eius remedia Diosc.	730.29
<i>Abrotonum</i> Dioscoridi	369.56	aconiti ueneni noxa, & eius curatio	730.39
abrotoni consideratio	370.9	<i>Aconitae</i> historia	770.40
abrotoni maris genera duo ibid.		aconitae morsus nota, & eius cura	770.48
abrotoni feminae consideratio.	370.11	<i>Acorum</i> Dioscoridi descriptum	129.40
abrotoni uires ex Galeno	370.32	acori consideratio	129.54
<i>Absinthium</i> Dioscoridi	367.9	acorum legitimum	20.50
<i>absinthium marinum</i> Dioscoridi	367.44	acori uires ex Galeno	21.5
<i>absinthium santonicum</i> Dioscoridi	367.56	<i>Acuta spina</i> Dioscoridi	113.30
<i>absinthij</i> consideratio	368.1	acutae spinae consideratio	113.39
<i>absinthium Ponticum</i>	368.2	acutae spinae uires ex Galeno	116.38
<i>absinthij marini</i> consideratio	368.42	acutam spinam non esse berberim vulgi	114.1
<i>absinthij seriphij</i> consideratio	ibidem	<i>Adami</i> Loniceri errata, & sententiae improbatæ 90.	50. & 111.61. & 119.37. & 143.8. & 301.11
<i>absinthij uires</i> ex Galeno.	369.10	<i>Adami</i> poma	153.61
<i>Absque simplicium medicamentorum</i> notitia rectè		<i>Adarces</i> Dioscoridi	694.11
mederi nemo potest	3.4	adarcae consideratio	694.17
<i>Acacalis</i> Dioscoridi	109.42	adarcae uires ex Galeno	694.32
acacalis consideratio	109.46	<i>Adeps</i> omnis Dioscoridi	234.11
<i>Acacia</i> Dioscoridi	129.7	adipis, & pinguedinis uires ex Galeno	235.59
acacia altera Dioscoridi	129.30	adipis in cibis facultas	237.27
acaciae consideratio, & historia	129.38	<i>Adiantum</i> Dioscoridi	581.50
acacia officinarum sacchara	129.55	adianti consideratio	582.40
acaciae alterum genus	130.30	adianti historia ex Theophrasto	582.40
acaciae uires ex Galeno	130.35	adianti uires ex Galeno	583.5
<i>Acanthium</i> Dioscoridi	360.4	adianti uires ex Mesue	583.11
acanthij consideratio	360.8	<i>Aegilops</i> Dioscoridi	584.4
<i>Acanthus sativus</i> Dioscoridi	360.24	egilopis consideratio	584.10
acanthi sativi consideratio	360.40	egilops hordei uitium	584.40
acanthi uires ex Galeno	361.11	egilopis uires ex Galeno	584.49
<i>acanthus sylvestris</i> Dioscoridi	360.34	<i>Aeris flos</i> Dioscoridi	657.54
acanthi sylvestris consideratio	361.10	eris floris historia	658.5
<i>Acarnae</i> historia ex Theophrasto	428.35	eris floris uires ex Galeno	658.13
<i>Acetum</i> Dioscoridi	645.51	<i>Aeris squama</i> Dioscoridi	658.20
acetum è betonica Dioscoridi	651.56	eris squamae consid. & uires ex Galeno	658.41
acetum mulsum Dioscoridi	646.35	eris squamae lethifera uis, & eius remedia	744.34
acetum scillinum Dioscoridi	647.23	<i>Aerugo rasa</i> Dioscoridi	660.28
acetum ex stachade Dioscoridi	651.50	arugo scolecia Dioscoridi	660.40
aceti consideratio	646.7	aruginum consideratio	661.2
acetum contrarijs constat facultatibus	646.8	aruginum uires ex Galeno	661.6
aceti scillini uires mirabiles ex Galeno	647.39	aruginis uenenum, & eius remedia	745.51
<i>Achara lapidis</i> historia, & uires	700.6	<i>Aes ustum</i> Dioscoridi	657.30
<i>Achillea</i> Dioscoridi descripta	506.33	eris usti consideratio	657.43
achilleae consideratio	506.46	eris usti uires ex Galeno	657.45
achilleae uires ex Galeno	507.14	<i>Aethiopis</i> Dioscoridi	563.4
<i>Achras</i> Dioscoridi	154.34	aethiopidis consideratio	563.17
<i>Acida muria</i> Dioscoridi	647.4	aethiopidis uires	563.22
acida muria usus exoleuit	647.10	<i>Aëtites lapis</i> Dioscoridi	705.16
<i>Acinos</i> Dioscoridi	387.4	aëtite lapidis historia, & uires	705.23
acini consideratio	387.8	<i>Agallochum</i> Dioscoridi	48.18
<i>Aconitum</i> Dioscoridi	537.28	agallochi consideratio	48.25
aconitum alterum Dioscoridi	538.12	agallochi fabulosa vulgi opinio	48.36
aconiti genera, & consideratio	538.25	agallochi historia ex Serapione	48.45
		agallochi facultates ex Auicenna	49.20

A Agaricum



<i>Agaricum Dioscoridi</i>	341.26	<i>alyssi consideratio</i>	427.6
<i>agarici consideratio</i>	451.60	<i>alyssi historia uaria</i>	ibidem
<i>agarici uires ex Galeno</i>	342.12	<i>alyssum Aëtij</i>	427.23
<i>agarici facultates ex Mesue</i>	342.24	<i>alyssum Plinii</i>	427.9
<i>agarici nigri noxa, &amp; eius remedia Diosc.</i>	747.57	<i>alyssum Galeni</i>	427.31
<i>agarici nigri noxa, &amp; eius curatio</i>	748.32	<i>alyssi uires ex Galeno</i>	427.41
<i>Ageraton Dioscoridi</i>	522.54	<i>Amaracum Dioscoridi</i>	385.22
<i>agerati consideratio</i>	522.59	<i>amaracum quid</i>	385.35
<i>agerati uires ex Galeno</i>	523.1	<i>amaracini consideratio</i>	63.58
<i>Agnus Dioscoridi</i>	130.59	<i>Amaranti purpurei historia</i>	521.2
<i>Agria arbor</i>	112.51	<i>Amati Lusitani errata</i>	77.13. & 128.54
<i>Agri folij consideratio</i>	112.33	<i>Ambari historia</i>	47.56
<i>Aiuga Dioscoridi</i>	479.50	<i>ambari genera, &amp; uires</i>	48.4
<i>aiugæ consideratio</i>	480.34	<i>Ambrosia Dioscoridi</i>	447.3
<i>aiugæ uires ex Galeno</i>	480.40	<i>ambrosiæ consideratio</i>	447.13
<i>Alabastrites lapis Dioscoridi</i>	702.15	<i>ambrosiæ uires ex Galeno</i>	447.34
<i>alabastrita lapidis consideratio</i>	702.18	<i>Amelli mentio Vergilio</i>	573.13
<i>alabastrita uires ex Galeno</i>	702.25	<i>Amiantus lapis Dioscoridi</i>	703.20
<i>Alberti Magni lapsus</i>	212.36. & 213.60	<i>amianti lapidis consideratio</i>	703.24
<i>Alcea Dioscoridi</i>	473.39	<i>amianto lapide fraus impostorum</i>	703.31
<i>alceæ consideratio</i>	473.39	<i>Ammi Dioscoridi</i>	399.33
<i>alceæ uires ex Paulo</i>	473.51	<i>ammios consideratio</i>	399.45
<i>Alcibiadion Dioscoridi</i>	500.20	<i>ammios uires ex Galeno</i>	400.8
<i>Alcyonium Dioscoridi</i>	693.24	<i>Ammoditæ historia, &amp; uenefica uis</i>	769.57
<i>alcyonii historia, &amp; consideratio</i>	693.39	<i>ammoditæ morsus signa, &amp; eius curatio</i>	770.8
<i>alcyonii uires ex Galeno</i>	693.54	<i>Ammoniacum Dioscoridi</i>	423.11
<i>Alga consideratio</i>	558.15	<i>ammoniaci consideratio</i>	423.24
<i>Albasser quid ex Serapione</i>	245.29	<i>ammoniaci historia ex Plinio</i>	423.29
<i>Alisma Dioscoridi</i>	476.42	<i>ammoniaci lachryma duplex.</i>	423.30
<i>alismatis consideratio</i>	476.55	<i>ammoniaci uires ex Galeno</i>	423.36
<i>alismatis uires ex Galeno</i>	477.11	<i>Amomis Dioscoridi</i>	38.46
<i>Alliarie herbæ consideratio, &amp; uires</i>	443.51	<i>Amomum Dioscoridi</i>	38.34
<i>Allium Dioscoridi</i>	308.6	<i>amomi consideratio</i>	38.51
<i>allium syluestre Dioscoridi</i>	309.11	<i>amomum spurium</i>	39.1
<i>alliij consideratio</i>	309.37	<i>amomi uires ex Galeno</i>	39.51
<i>alliij syluestris consideratio</i>	309.51	<i>Ampelitis terra Dioscoridi</i>	708.48
<i>Alui consideratio, &amp; historia ex Theophr.</i>	102.50	<i>ampelitis terræ consideratio</i>	708.54
<i>alui usus, &amp; uires</i>	103.1	<i>Ampelopraßon Dioscoridi</i>	307.19
<i>Aloë Dioscoridi</i>	365.15	<i>ampelopraßi consideratio</i>	307.24
<i>aloës consideratio</i>	365.54	<i>ampelopraßi usus ex Galeno</i>	307.31
<i>aloës uires ex Galeno</i>	366.11	<i>Amphibæna ictus nota, &amp; curatio Dioscoridi</i>	771.5
<i>aloës uires ex Mesue</i>	366.54	<i>amphibæna consideratio</i>	771.10
<i>Alphasasat Aphris quid</i>	305.31	<i>amphibænam bicipitem esse, falsum</i>	771.26
<i>Alsine Dioscoridi</i>	549.19	<i>amphibæna morsus signa, &amp; curatio</i>	771.38
<i>alsines consideratio</i>	549.29	<i>Amurca Dioscoridi</i>	133.52
<i>alsines uires ex Galeno</i>	549.36	<i>amurcæ usus</i>	134.39
<i>Althæa Dioscoridi</i>	472.47	<i>Amygdalæ amaræ Dioscoridi</i>	162.26
<i>althææ consideratio</i>	473.9	<i>amygdalæ dulces Dioscoridi</i>	162.47
<i>althæa Theophrasto duplex</i>	473.13	<i>amygdalarum consideratio</i>	162.52
<i>althææ uires ex Galeno</i>	473.18	<i>amygdalarum uires ex Galeno</i>	162.59
<i>Alumen Dioscoridi</i>	684.22	<i>Amygdalini parandi ratio</i>	55.50
<i>alumipum omnium consideratio</i>	684.48	<i>amygdalini uires</i>	56.5
<i>aluminis rupei faciendi ratio</i>	685.6	<i>amygdalorum gummi Dioscoridi</i>	162.42
<i>alumina cognita &amp; iam in lucem reddita</i>	685.54	<i>Amylum Dioscoridi</i>	253.14
<i>aluminum uires ex Galeno</i>	686.15	<i>amylj consideratio</i>	258.26
<i>aluminum facultas calida, non frigida, ut quidam con-</i>		<i>amylj uires ex Galeno</i>	258.29
<i>tendunt</i>	686.21	<i>Anacardiorum mentio, &amp; uires</i>	166.23
<i>Alypon Dioscoridi</i>	618.25	<i>anacardiorum ueneni signa, &amp; curatio</i>	729.41
<i>alypi consideratio</i>	618.34	<i>Anagallis Dioscoridi</i>	333.50
<i>alypi uires ex Paulo</i>	618.54	<i>anagallidis consideratio</i>	333.59
<i>Alysson Dioscoridi</i>	426.58		anagallidum



# I N D E X.

<i>anagallidum uires ex Galeno</i>	334.34	<i>apij consideratio</i>	614.47
<i>Anagyris Dioscoridi</i>	474.50	<i>Apium hortense Dioscoridi</i>	403.4
<i>anagyris consideratio, &amp; genera</i>	474.58	<i>apij hortensis consideratio</i>	404.9
<i>anagyris uires ex Galeno</i>	476.3	<i>apij omnis generis uires ex Galeno</i>	406.5
<i>Anchusa Dioscoridi</i>	500.14	<i>apium palustre</i>	404.25
<i>anchusarum consideratio</i>	501.1	<i>apium montanum</i>	404.32
<i>anchusarum uires ex Galeno</i>	501.10	<i>apium risus</i>	331.34
<i>Andacocha Mauritanis quid</i>	441.2	<i>Apocynon Dioscoridi</i>	543.33
<i>Andrea Lacuna literæ</i>	387.54	<i>apocyni consideratio</i>	543.44
<i>Androsaces Dioscoridi</i>	462.36	<i>apocyni uires ex Galeno</i>	544.3
<i>androsacis consideratio</i>	463.1	<i>Apollinaris herba Dioscoridi</i>	529.11
<i>androsacis uires ex Galeno</i>	463.6	<i>apollinaris herbæ consideratio</i>	529.54
<i>Androsemon Dioscoridi</i>	478.32	<i>apollinaris herbæ uires ex Galeno</i>	530.7
<i>androssemi consideratio</i>	478.58	<i>Apri iecur Dioscoridi</i>	207.10
<i>androssemi uires ex Galeno</i>	479.25	<i>apri urina</i>	241.59
<i>Anemone Dioscoridi</i>	331.57	<i>Apum consideratio</i>	246.57
<i>anemones consideratio</i>	332.46	<i>apum rex &amp; regimen</i>	247.2
<i>anemones uires ex Galeno</i>	333.14	<i>apes quibus gaudeant</i>	247.16
<i>Anethum Dioscoridi</i>	397.42	<i>apum mira prudentia</i>	247.24
<i>anethi consideratio, &amp; uires ex Galeno</i>	397.51	<i>apum mira in opere industria</i>	247.26
<i>Angelica historia, &amp; uires</i>	571.7	<i>apum reparatio ex Virgilio</i>	247.47
<i>Anguimum senectæ Dioscoridi</i>	193.22	<i>apum ictus curatio Dioscoridi</i>	763.55
<i>anguimum senectæ consideratio</i>	193.37	<i>apum ictus, &amp; eius remedia</i>	763.60
<i>Animalia ex ouis nascentia</i>	210.44	<i>Aqua Dioscoridi</i>	644.9
<i>animalia alia præter canem rabie tentantur</i>	754.53	<i>aquarum differentia, &amp; facultates</i>	644.14
<i>Anisum Dioscoridi</i>	396.49	<i>aquarum non potabilium facultates</i>	644.50
<i>anisi consideratio, &amp; uires ex Galeno</i>	397.1	<i>aquæ frigida noxa, &amp; curatio Dioscoridi</i>	750.7
<i>Anonis Dioscoridi</i>	361.20	<i>aquæ aurificum noxa, &amp; curatio</i>	745.44
<i>anonidis consideratio</i>	361.35	<i>aqua ex humano stercore</i>	240.35
<i>anonidis uires ex Galeno</i>	362.3	<i>Aquæ pauor quousq; exoriatur in demorsis à cane ra-</i>	
<i>anonidis historia ex Theophrasto</i>	361.48	<i>biofo</i>	759.12
<i>Anthemis Dioscoridi</i>	466.4	<i>aquæ pauor quando, &amp; quibus curetur</i>	759.25
<i>anthemidis consideratio</i>	466.30	<i>Aqua marina Dioscoridi</i>	645.30
<i>anthemidis uires ex Galeno</i>	466.37	<i>aqua mulsa Dioscoridi</i>	643.22
<i>Anthyllis Dioscoridi</i>	465.24	<i>aquæ mulsæ paranda ratio uaria</i>	643.35
<i>anthyllidis consideratio</i>	465.35	<i>aquæ stillatitiæ quæ ceteris præstantiores</i>	
<i>anthyllidis uires ex Galeno</i>	465.52		112.2
<i>Antidota contra uenena, &amp; eorum descriptio</i>	722.	<i>Aquisoglium</i>	112.44
58. & deinde		<i>Aquilina, siue aquileia</i>	337.10
<i>Antidoti è sanguinibus descriptio</i>	724.38	<i>Aquosa quæ ament loca</i>	9.25
<i>antidoti è scinco descriptio</i>	724.46	<i>Arabicum gummi non esse acaciæ</i>	129.61
<i>antidoti è terra Lemnia descriptio</i>	725.23	<i>Arabicus lapis Dioscoridi</i>	701.22
<i>antidotorum actio</i>	715.20	<i>Arabis Dioscoridi</i>	313.52
<i>Antipathes Dioscoridi</i>	695.43	<i>arabidis consideratio</i>	313.59
<i>antipathes ubi uisum</i>	696.10	<i>Arabum lapsus</i>	309.55
<i>Antirrhinon Dioscoridi</i>	580.10	<i>Aranæus piscis</i>	189.36
<i>antirrhini consideratio</i>	580.17	<i>araneus Dioscoridi</i>	222.16
<i>antirrhini uires ex Galeno</i>	580.28	<i>aranei consideratio</i>	222.40
<i>Antispoda Dioscoridi</i>	656.1	<i>aranei muris consideratio</i>	227.1
<i>Aparine Dioscoridi</i>	426.33	<i>Arbores quæ plantæ scandant.</i>	10.4
<i>aparines consideratio</i>	426.43	<i>arboribus quæ inmascantur</i>	10.2
<i>aparines uires ex Galeno</i>	426.49	<i>Arbutus Dioscoridi</i>	614.5
<i>Aphaca Dioscoridi</i>	305.38	<i>arbuti consideratio</i>	161.52
<i>aphaca consideratio</i>	305.42	<i>arbuti descriptio</i>	162.2
<i>aphaca in tybi genus</i>	305.55	<i>arbuti usus &amp; uires</i>	162.18
<i>aphacæ &amp; uiciæ uires ex Galeno</i>	305.48	<i>Arction Dioscoridi</i>	563.37
<i>Apiastrum Dioscoridi</i>	435.49	<i>arctij consideratio</i>	563.42
<i>apiastri consideratio</i>	435.58	<i>arctij uires ex Galeno</i>	563.48
<i>apiastri uires</i>	436.9	<i>Arena Dioscoridi</i>	706.36
<i>Apiastri facultates ex Galeno</i>	436.26	<i>Argemone Dioscoridi</i>	333.26
<i>Apios Dioscoridi</i>	614.35	<i>argemones consideratio</i>	333.33
			argemo-



<i>argemones caput adulterinum</i>	333.36	<i>Asininum iecur Dioscoridi</i>	207.7
<i>argemones uires ex Galeno</i>	333.44	<i>asini ungula Dioscoridi</i>	208.16
<i>Argentina herba</i>	323.43	<i>Asius lapis Dioscoridi</i>	696.48
<i>Argenti recrementum Dioscoridi</i>	666.3	<i>asij lapidis consideratio</i>	696.60
<i>argenti scoria consideratio</i>	666.7	<i>asij lapidis historia, &amp; uires ex Galeno</i>	697.11
<i>Argenti spuma Dioscoridi</i>	666.19	<i>Aspalathus Dioscoridi</i>	45.23
<i>argenti spumæ consideratio</i>	667.1	<i>aspalathi consideratio</i>	43.31
<i>argenti spumæ uires ex Galeno</i>	667.18	<i>aspalathi uires ex Galeno</i>	45.50
<i>argenti spumæ noxa, &amp; curatio Diosc.</i>	743.53	<i>Asparagus Dioscoridi</i>	279.61
<i>argenti spumæ mala</i>	743.60	<i>asparagorum uires</i>	280.11
<i>argenti spumæ sumptæ curatio</i>	744.8	<i>Asphodeli consideratio, &amp; historia</i>	325.47
<i>Argentum uiuum Dioscoridi</i>	673.51	<i>asphodeli uires ex Galeno</i>	325.58
<i>argenti uini consideratio</i>	674.1	<i>Aspidis ictus notæ, &amp; curatio Diosc.</i>	774.54
<i>argenti sublimati parandi ratio</i>	674.42	<i>aspidis perniciosus ictus, &amp; genera</i>	775.1
<i>argenti uini noxa, &amp; auxilia Diosc.</i>	744.45	<i>aspidum historia, ictus signa, &amp; cura</i>	775.10
<i>argenti uini pernicialis natura</i>	744.48	<i>Asplenium Dioscoridi</i>	463.18
<i>argenti uini sumpti curatio</i>	745.14	<i>aspleni consideratio</i>	463.31
<i>Aria arbor</i>	112.52	<i>aspleni uires ex Galeno</i>	463.56
<i>Arida loca qua plantæ ament</i>	9.40	<i>Assa fetida</i>	419.58
<i>Arisarum Dioscoridi</i>	325.4	<i>Aster Atticus Dioscoridi</i>	572.49
<i>arisari historia</i>	325.8	<i>asteris Attici consideratio</i>	573.1
<i>arisari uires ex Galeno</i>	325.14	<i>asteris Attici uires</i>	573.26
<i>Aristolochia clematidis Diosc.</i>	348.1	<i>Astragalus Dioscoridi</i>	524.11
<i>aristolochia longa Dioscoridi</i>	347.57	<i>astragali consideratio</i>	524.21
<i>aristolochia rotunda Dioscoridi</i>	347.55	<i>astragali uires ex Galeno</i>	524.30
<i>aristolochiæ consideratio</i>	348.11	<i>Athera Dioscoridi</i>	253.3
<i>aristolochiæ clematidis examen</i>	348.29	<i>athera consideratio</i>	253.6
<i>aristolochiam longam uulgarem à Plinij pistolochia non differre</i>	349.43	<i>Atrætylis Dioscoridi descripta</i>	428.20
<i>aristolochiæ uires ex Galeno</i>	349.58	<i>atrætylidis consideratio</i>	428.26
<i>Aristotelis lapsus</i>	218.54. & 221.56	<i>Atramentum librarium Dioscoridi</i>	709.16
<i>Aristotelis de lapidum generatione opinio</i>	630.35	<i>Atramentum sutorium Dioscoridi</i>	679.4
<i>Armeniaca mala Dioscoridi</i>	149.32	<i>atramenti sutorij consideratio</i>	679.20
<i>armeniacorum malorum consideratio</i>	152.47	<i>atramenti sutorij historia, &amp; uires ex Galeno</i>	679.52
<i>Armenius lapis</i>	669.46	<i>Atriplex Dioscoridi</i>	273.56
<i>armenij lapidis consideratio</i>	669.8	<i>atriplicis consideratio</i>	274.34
<i>armenij lapidis uires ex Alexandro</i>	669.35	<i>atriplicis uires ex Galeno</i>	275.32
<i>armenij lapidis uires ex Aëtio</i>	669.57	<i>atriplicis alia genera</i>	274.47
<i>armenij lapidis uires ex Galeno</i>	670.5	<i>Auellana nux Dioscoridi</i>	166.56
<i>Armenie terræ uires ex Galeno</i>	678.10	<i>auellandarum nucum consideratio</i>	167.4
<i>Armoracia Dioscoridi</i>	267.55	<i>auellandarum uires ex Galeno</i>	167.16
<i>Aron Dioscoridi</i>	323.54	<i>Auena Dioscoridi</i>	253.27
<i>ari consideratio</i>	324.1	<i>auenæ consideratio</i>	253.34
<i>ari uires ex Galeno</i>	324.11	<i>auenæ facultates</i>	253.39
<i>Arsenici sublimati uenenum, &amp; curatio</i>	745.42	<i>Auerrois uana calumnia contra Galenum</i>	343.
<i>Artemisia Dioscoridi</i>	445.4		
<i>artemisia tenuifolia Dioscoridi</i>	445.23	<i>Auerrois locus restitutus</i>	390.42
<i>artemisiæ consideratio</i>	445.31	<i>Auicenna lapsus</i>	73.2. & 153.56. & 735.9
<i>artemisiæ uires ex Galeno</i>	446.51	<i>Auicenna contra Galenum</i>	401.15
<i>Arundo Dioscoridi</i>	106.3	<i>Auicennæ defensio</i>	160.50. & 390.27. & 539.58
<i>Arundinum consideratio, uide Harundinum</i>		<i>Auicennæ de generatione lapidum opinio comprobata</i>	
<i>Asarum Dioscoridi</i>	29.19		631.4
<i>asari consideratio</i>	29.33	<i>Aurantia poma</i>	153.61
<i>asari uires ex Mesue.</i>	29.56	<i>Auri historia, &amp; præstantia</i>	674.58
<i>asari facultates ex Galeno</i>	30.5	<i>auri uires ex Auicenna</i>	675.30
<i>Asclepias Dioscoridi</i>	427.51	<i>Auricula muris Dioscoridi</i>	338.49
<i>asclepiadis consideratio</i>	427.56	<i>auriculæ muris consideratio</i>	338.56
<i>asclepiadis uires ex Galeno</i>	428.14	<i>auriculæ muris facultates</i>	339.5
<i>Ascyron Dioscoridi</i>	477.53	<i>Auripigmentum Dioscoridi</i>	683.28
<i>ascyri consideratio</i>	478.58	<i>auripigmenti consideratio</i>	683.47
<i>ascyri uires ex Galeno</i>	479.25		



# I N D E X.

<i>auripigmenti uires ex Galeno</i>	684.10	<i>bituminis historia, &amp; uires ex Galeno</i>	90.2
<i>auripigmenti noxa, &amp; remedia Diosc.</i>	745.29	<i>Blatta pistrinaria Dioscoridi</i>	206.9
<i>auripigmenti uenefica uis, &amp; curatio</i>	745.35	<i>blattarum consideratio</i>	206.12
<i>Azadaracht arboris uenenum, &amp; remedia</i>	733.49	<i>blattariæ herba historia, &amp; uires</i>	562.31
<i>Azaroli arboris descriptio</i>	156.1	<i>blattæ bisantis</i>	181.55
<b>B</b>			
<b>BACCAR</b> lauri Dioscoridi	79.9	<i>Bliton Dioscoridi</i>	272.10
<i>Baccharis Dioscoridi</i>	387.28	<i>bliti consideratio</i>	272.13
<i>baccharis consideratio</i>	387.48	<i>bliti uires ex Galeno</i>	272.34
<i>baccharis uires ex Paulo</i>	388.25	<i>Bæotica myrrha</i>	68.25
<i>Balanimum oleum Dioscoridi</i>	56.15	<i>Boli Armenij uires</i>	678.10
<i>balanini olei consideratio</i>	56.19	<i>Bonifacia</i>	579.48
<i>balanini olei uires</i>	56.21	<i>Borraginis consideratio</i>	577.42
<i>Balaustium Dioscoridi</i>	144.43	<i>Botrys Dioscoridi</i>	447.42
<i>balaustij consideratio</i>	144.44	<i>botryos consideratio</i>	447.50
<i>Ballote Dioscoridi</i>	435.15	<i>botryos uires ex Paulo</i>	448.2
<i>ballotes consideratio</i>	435.27	<i>Branca ursina</i>	360.42
<i>Balsamina herba quæ</i>	621.51	<i>Brasauli lapsus, &amp; eiusdem opiniones non acceptæ</i>	20.19. & 25.30. & 28.54. & 42.37. & 67.20. & 73.37. & 84.59. & 88.46. & 102.19. & 102.44. & 265.9. & 283.45. & 293.56. & 300.29. & 309.58. & 317.20. & 332.49. & 341.42. & 357.58. & 362.55. & 374.55. & 382.1. & 388.15. & 401.33. & 404.49. & 411.28. & 419.1. & 445.55. & 449.32. & 479.23. & 564.25. & 581.30. & 606.54. & 656.48. & 663.51. & 680.38. & 681.57. & 684.58
<i>balsamina historia</i>	621.55		
<i>Balsamum Dioscoridi</i>	43.17	<i>Brassica Dioscoridi</i>	276.34
<i>balsamum cur in Syria non reperiatur</i>	44.4	<i>brassica satina consideratio</i>	277.2
<i>balsami consideratio, &amp; historia</i>	43.48	<i>brassicæ uires ex Galeno</i>	277.35
<i>balsami uiridarium in Memphi</i>	44.7	<i>brassicam quæ oderunt</i>	15.34
<i>balsami historia ex Theophrasto</i>	44.13	<i>brassica sylvestris Dioscoridi</i>	276.54
<i>balsami fructum non legitimum officinis</i>	44.33	<i>brassicæ sylvestris consideratio</i>	277.32
<i>balsami uires ex Galeno</i>	44.40	<i>brassica marina Dioscoridi</i>	276.58
<i>balsami loco quid supponendum</i>	44.45	<i>brassica marinæ consideratio</i>	277.58
<i>balsami factitij confectio</i>	45.3	<i>Britannica Dioscoridi</i>	482.42
<i>Barbula hirci Dioscoridi</i>	302.2	<i>britannicæ consideratio</i>	482.46
<i>barbula hirci consideratio, &amp; uires</i>	312.78	<i>britannicæ historia ex Plinio</i>	482.49
<i>Basilisci ictus notæ, &amp; curatio Diosc.</i>	775.41	<i>britannicæ uires ex Galeno</i>	483.47
<i>basilisci uaria historia</i>	775.47. & in ea plura fabu-	<i>Bromus Dioscoridi</i>	584.57
<i>losa 776.12</i>		<i>bromi consideratio</i>	585.1
<i>Bdellium Dioscoridi</i>	69.43	<i>Brunfelsij lapsus</i>	317.60. & 557.4. & 579.32
<i>bdellium plantæ genus</i>	70.23	<i>Bryon Dioscoridi</i>	46.7
<i>bdellij consideratio</i>	69.54	<i>Bryonia Dioscoridi</i>	620.10
<i>bdellij uulgaris genera</i>	70.5	<i>bryoniæ consideratio</i>	620.42
<i>bdellij historia ex Plinio</i>	70.9	<i>bryoniæ noxa, &amp; curatio</i>	748.56
<i>bdellij uires ex Galeno</i>	70.15	<i>Bubuli stercoris uires</i>	240.41
<i>Behen album &amp; rubrum</i>	602.22	<i>Buccina Dioscoridi</i>	177.58
<i>Bellis, &amp; eius historia, &amp; uires</i>	467.27	<i>buccini consideratio</i>	178.29
<i>Belzoinum quid</i>	419.24	<i>Buglossum Dioscoridi</i>	577.37
<i>Beneficium à Dioscoride in posteros collatum</i>	712.31	<i>buglossi consideratio</i>	577.42
<i>Beta Dioscoridi</i>	278.46	<i>buglossi descriptio ex Auicenna</i>	577.59
<i>beta consideratio</i>	278.54	<i>buglossi uires ex Galeno</i>	578.9
<i>beta facultates ex Galeno</i>	278.58	<i>Bulbus esculentus Dioscoridi</i>	326.8
<i>beta sylvestris</i>	279.6	<i>bulbus uomitorius Dioscoridi</i>	326.23
<i>Betonica Dioscoridi</i>	481.24	<i>bulborum consideratio</i>	326.26
<i>betonicæ consideratio</i>	481.56	<i>bulborum uires ex Galeno</i>	326.38
<i>betonicæ uires ex Antonio Musa</i>	481.58	<i>Bunium Dioscoridi</i>	575.50
<i>betonicæ uires ex Galeno</i>	482.31	<i>bunij consideratio</i>	576.1
<i>Betule arboris consideratio</i>	103.7	<i>bunij uires ex Galeno</i>	576.11
<i>betule cortex bituminosus</i>	103.17	<i>Buphtbalmum Dioscoridi</i>	467.42
<i>betule uires</i>	103.29		
<i>Bezabar lapidis historia &amp; uires</i>	678.31		
<i>Bislingua herba</i>	579.48		
<i>Bistorta herba quæ</i>	482.55		
<i>bistortæ uires</i>	483.38		
<i>Bitumen Dioscoridi</i>	87.28		
<i>bituminis consideratio</i>	87.52		



# I N D E X

<i>buphthalmi consideratio</i>	467.51	<i>canis rabiosi morsus curatio</i>	756.27
<i>buphthalmi uires ex Galeno</i>	468.18	<i>canis rabiosi morsus remedia suspecta</i>	757.10
<i>Buprestes Dioscoridi</i>	220.12	<i>canis rabiosi morsus auxilium religiosum</i>	757.26
<i>buprestium consideratio</i>	220.39	<i>caninum stercus, &amp; eius uires</i>	241.4
<i>buprestis sumptæ notæ, &amp; auxilia Diosc.</i>	727.37	<i>Cannabis Dioscoridi descripta</i>	474.3
<i>buprestium uenenum eiusque curatio</i>	727.45	<i>cannabis consideratio</i>	474.16
<i>Bursa pastoris, &amp; eius uires</i>	313.30	<i>cannabis uires ex Galeno</i>	474.35
<i>Butyrum Dioscoridi</i>	229.46	<i>Cannella</i>	34.44
<i>butyri fuligo Dioscoridi</i>	229.55	<i>Cantharides</i>	220.3
<i>butyri consideratio</i>	230.59	<i>cantharidum consideratio</i>	220.36
<i>Buxi arboris consideratio</i>	128.45	<i>cantharidum uires ex Galeno</i>	221.3
<i>buxi usus</i>	128.50	<i>cantharidum noxa, &amp; remedia Dioscoridi</i>	725.35
<b>C</b>			
<i>CACALIA Dioscoridi descripta</i>	575.30	<i>cantharidum malefica uis</i>	725.59
<i>Cacaliæ consideratio</i>	575.35	<i>cantharidum ueneni curatio</i>	726.21
<i>cacaliæ uires ex Galeno</i>	575.42	<i>Caphuræ historia, &amp; genera</i>	82.50
<i>Cachrys Dioscoridi</i>	413.48	<i>caphuræ probatio, &amp; conseruatio</i>	83.26
<i>cachrys quid</i>	414.25	<i>caphuræ temperamentum, &amp; uires</i>	83.13
<i>Cactus cardui genus</i>	359.7	<i>Capnos Dioscoridi</i>	565.22
<i>Cadmia Dioscoridi</i>	653.50	<i>capni consideratio, uide Fumariæ consideratio</i>	
<i>cadmiæ consideratio</i>	654.23	<i>Capparis Dioscoridi</i>	327.57
<i>cadmiæ historia ex Galeno</i>	654.27	<i>capparum consideratio</i>	328.13
<i>cadmiæ historia ex Plinio</i>	654.49	<i>capparum satio</i>	328.27
<i>cadmiæ facultates ex Galeno</i>	654.38	<i>capparis uires ex Galeno</i>	328.33
<i>Cæcilie ictus notæ, &amp; curatio Dioscoridi</i>	771.5	<i>Capra ungula Dioscoridi</i>	208.16
<i>cæcilie morsus signa, &amp; remedia</i>	771.38	<i>caprinum iecur Dioscoridi</i>	207.8
<i>Cæruleus, uide Cæruleus</i>		<i>caprini stercoris uires</i>	240.47
<i>Calamus odoratus Dioscoridi</i>	42.3	<i>Caput lactis</i>	231.8
<i>calami odorati historia ex Theophrasto</i>	42.14	<i>Carciosi</i>	359.12
<i>calami odorati uires ex Galeno</i>	42.59	<i>Cardamomum Dioscoridi</i>	23.13
<i>calamus odoratus officinarum spurius</i>	42.50	<i>cardamomi consideratio</i>	23.22
<i>Calamintha Dioscoridi</i>	381.33	<i>cardamomi officinis genera plura</i>	23.24
<i>calaminthæ consideratio</i>	381.56	<i>cardamomi Mauritanis genera duo</i>	23.30
<i>calaminthæ uires ex Galeno</i>	382.32	<i>cardamomi genera ex Plinio</i>	24.11
<i>Calcifraga Dioscoridi</i>	619.10	<i>cardamomi uires ex Galeno</i>	24.17
<i>Callorum equi uires</i>	209.1	<i>Cardiaca consideratio, &amp; uires</i>	554.45
<i>Calthæ consideratio, &amp; uires</i>	628.46	<i>Carduus Dioscoridi</i>	358.55
<i>Calx uiua Dioscoridi</i>	692.4	<i>carduorum consideratio, &amp; genera</i>	358.59
<i>calcis uiuæ consideratio</i>	692.13	<i>cardui uires ex Galeno</i>	359.51
<i>calcis uires ex Galeno</i>	692.20	<i>carduus pinea</i>	359.25
<i>calcis noxa, &amp; remedia Dioscoridi</i>	745.29	<i>carduus benedictus, &amp; eius uires</i>	429.25
<i>calcis malefica uis, &amp; curatio</i>	745.35	<i>Carlina</i>	354.17
<i>Canabel Aphris quid</i>	368.40	<i>Carnes quo modo diutius asseruentur</i>	15.55
<i>Cancamum Dioscoridi</i>	49.45	<i>carnes noxiæ, &amp; earum remedia</i>	750.18
<i>cancami consideratio</i>	49.52	<i>Carpasi succi noxa, &amp; remedia Dioscoridi</i>	734.4
<i>Cancellorum consideratio</i>	185.43	<i>carpasi consideratio</i>	734.7
<i>Cancri Dioscoridi</i>	184.3	<i>Carpesij consideratio</i>	31.18
<i>cancrorum consideratio</i>	184.27	<i>carpesij uires ex Galeno</i>	31.16
<i>cancrorum uires ex Galeno</i>	184.53	<i>Carpobalsmi consideratio</i>	44.32
<i>cancri fluuiatiles in Hetruria frequentissimi</i>	185.24	<i>carpobalsami loco quid supponendum</i>	44.50
<i>Canis rubus Dioscoridi</i>	116.46	<i>Cartamum</i>	625.38
<i>canis rubi consideratio</i>	116.53	<i>Carum Dioscoridi</i>	397.18
<i>canis rubi uires ex Galeno</i>	117.25	<i>cari consideratio</i>	397.23
<i>Canis rabidi iecur Dioscoridi</i>	207.11	<i>cari officinarum</i>	ibidem
<i>canis rabiosi signa Dioscoridi</i>	754.5	<i>cari uires ex Galeno</i>	397.32
<i>canis rabiosi uenefica natura, &amp; signa</i>	754.23	<i>Caryophyllatæ uires</i>	497.26
<i>canes quibus causis rabie exagitantur</i>	754.41	<i>Caryophyllorum consideratio, &amp; historia</i>	315.52
<i>canis morsus neglecti discrimina</i>	755.13	<i>caryophylli floris mentio</i>	316.11
<i>canis rabidi morsus indicia salutifera</i>	755.40	<i>Caryotæ Dioscoridi</i>	141.22
<i>canis rabiosi morsus curatio Dioscoridi</i>	756.5	<i>caryotarum uires ex Galeno</i>	143.28
		<i>Casus Dioscoridi</i>	229.35
		<i>casei consideratio, &amp; uires</i>	231.11
		<i>Cassia</i>	



# I N D E X.

<i>Cassia Dioscoridi</i>	32.60	<i>cerasorum uires ex Galeno</i>	147.49
<i>castiæ odoratæ consideratio</i>	33.45	<i>Cerastæ ictus notæ, &amp; eius curatio Dioscoridi tradita</i>	
<i>castiam odoratam non esse cassiam coronariâ</i>	33.57	774.32	
<i>castiam in cinnamomum mutari</i>	34.54	<i>cerastæ morsus exitialis auxilia</i>	774.19
<i>castia fistula Græcis quid</i>	34.57	<i>Cerretta herba</i>	484.43
<i>castiæ odoratæ descriptio ex Plinio</i>	35.8	<i>Ceruinum cornu Dioscoridi</i>	217.27
<i>castiæ odoratæ historia ex Theophrasto</i>	35.18	<i>cerui genitale Dioscoridi</i>	208.6
<i>castia lignea</i>	35.23	<i>ceruorum historia</i>	217.51
<i>castiæ uires ex Galeno</i>	37.30	<i>ceruis uita longa</i>	218.20
<i>castiæ solutiæ consideratio</i>	37.50	<i>cerui distamni herbæ inuentores</i>	218.57
<i>castiæ solutiæ uires</i>	38.2	<i>cerui fel non habent</i>	218.59
<i>Cassuthæ siue cuscute historia, &amp; uires</i>	617.52	<i>cerui uenenum atrocissimum in cauda habet</i>	219.3
<i>Castanea Dioscoridi</i>	137.33	<i>eius remedia</i>	742.32
<i>castaneorum consideratio</i>	137.39	<i>Ceruifia</i>	251.25
<i>castaneorum uires</i>	137.54	<i>Cerussa Dioscoridi</i>	667.3
<i>castaneorum uires ex Galeno</i>	138.2	<i>corussa consideratio</i>	667.56
<i>Castorium Dioscoridi</i>	197.46	<i>cerussa uires ex Galeno</i>	667.60
<i>castorij consideratio</i>	198.21	<i>cerussa noxiæ, &amp; curatio Dioscoridi</i>	739.48
<i>castorij uires ex Galeno</i>	198.52	<i>cerussa lethalis natura</i>	739.57
<i>castorei uires ex Plinio</i>	199.19	<i>cerussa ueneni remedia</i>	740.9
<i>castorei uirulenta uis, &amp; curatio</i>	742.45	<i>Cestron Dioscoridi</i>	481.24
<i>Catanance Dioscoridi</i>	580.42	<i>Chalcantbi genera, &amp; historia</i>	679.20
<i>catanances consideratio</i>	580.49	<i>calcanibi uires, &amp; historia ex Galeno</i>	679.52
<i>Cataputia</i>	609.22	<i>Chalcitis Dioscoridi</i>	681.4
<i>Catoblepas</i>	776.3	<i>chalcitis consideratio</i>	681.51
<i>Caucalis Dioscoridi</i>	298.16	<i>chalcitis historia, &amp; uires ex Galeno</i>	682.15
<i>caucalidis consideratio</i>	298.22	<i>Chamæ Dioscoridi</i>	180.16
<i>caucalidis uires ex Galeno</i>	298.30	<i>chamarum consideratio</i>	180.35
<i>Caudæ cerui uenenum, &amp; eius ratio</i>	742.32	<i>Chamaeste Dioscoridi</i>	613.42
<i>caulium in plantis differentia</i>	12.33	<i>Chamaecissos Dioscoridi</i>	576.18
<i>causæ metallorum efficiens</i>	632.33	<i>chamaecissi consideratio</i>	576.24
<i>Cauterij utilitas</i>	757.57	<i>chamaecissi uires ex Galeno</i>	576.37
<i>Cedria Dioscoridi</i>	94.4	<i>Chamedaphne Dioscoridi</i>	589.60
<i>cedrides Dioscoridi</i>	94.19	<i>chamedaphnes consideratio</i>	590.35
<i>cedri historia</i>	94.55	<i>chamedaphnes uires ex Galeno</i>	590.40
<i>cedri &amp; cedriæ uires ex Galeno</i>	96.47	<i>Chamadrys Dioscoridi</i>	431.50
<i>cedromela Dioscoridi</i>	150.1	<i>chamadryos consideratio</i>	432.2
<i>cedrus Dioscoridi</i>	94.4	<i>chamadryos historia, &amp; uires ex Theophr.</i>	432.12
<i>Celticum nardum Dioscoridi</i>	27.14	<i>chamadrios uires ex Galeno</i>	432.25
<i>celtici nardi consideratio</i>	27.40	<i>Chamaleo albus Dioscoridi</i>	353.50
<i>celtici nardi uires ex Galeno</i>	28.25	<i>chamaleo niger Dioscoridi</i>	354.4
<i>Cenchri ictus notæ, &amp; remedia Dioscoridi</i>	774.17	<i>chamaleonis utriusque consideratio</i>	354.17
<i>cenchri consideratio</i>	774.24	<i>chamaleonis utriusque historia, et uires ex Theophr.</i>	355.18
<i>Centaurium magnum Dioscoridi</i>	351.14	<i>chamaleonis nigri uenenum, &amp; remedia</i>	739.35
<i>centaurij magni consideratio</i>	351.38	<i>Chamaleontis historia</i>	225.62
<i>centaurij magni uires ex Galeno</i>	352.2	<i>chamaleontis uires</i>	226.9
<i>Centaurium minus Dioscoridi</i>	352.20	<i>Chamaleuce Dioscoridi</i>	576.42
<i>centaurij minoris consideratio</i>	352.52	<i>chamaleuces consideratio</i>	576.45
<i>centaurij minoris uires ex Galeno</i>	352.58	<i>chamaleuces uires ex Galeno</i>	576.55
<i>Cepa Dioscoridi</i>	307.58	<i>Chamamelou</i>	466.30
<i>ceparum consideratio, &amp; historia</i>	308.18	<i>chamameli consideratio.</i>	ibidem
<i>ceparum uires ex Galeno</i>	308.54	<i>chamameli uires ex Galeno</i>	466.38
<i>Cepæa Dioscoridi</i>	476.15	<i>Chamaptyx Dioscoridi</i>	479.50
<i>cepæa consideratio</i>	476.21	<i>chamaptyxos consideratio</i>	480.34
<i>cepæa uires ex Paulo</i>	476.32	<i>chamaptyxos uires ex Galeno</i>	480.40
<i>Cera Dioscoridi</i>	246.10	<i>Chamasyce Dioscoridi</i>	610.17
<i>cera uires ex Galeno</i>	246.28	<i>chamasyces consideratio</i>	610.26
<i>Cerasia Dioscoridi</i>	246.59	<i>chamasyces uires ex Galeno</i>	610.29
<i>cerasorum consideratio</i>	147.1	<i>Chamelea Dioscoridi representata</i>	611.45
<i>cerasorum latiorum genera</i>	147.10	<i>chamelæa consideratio</i>	612.38
<i>cerasorum acidorum genera plura</i>	147.29	<i>chamelæa</i>	



<i>chamelæ uires ex Galeno</i>	612.59	<i>cinnamoni historia ex Galeno</i>	35.37
<i>chamelæ noxa, &amp; curatio</i>	748.57	<i>cinnamoni penuria unde</i>	36.9
<i>Characias tithymalus Dioscoridi</i>	606.7	<i>cinnamomi optimi nota</i>	35.56
<i>Chelidonia herba ab hirundine inuenta</i>	215.18	<i>cinnamomi vulgaris aqua stillatitia</i>	37.35
<i>chelidonium maius Dioscoridi</i>	336.41	<i>cinnamomi differentia ex Theophrasto</i>	36.49
<i>chelidoni maioris consideratio</i>	336.60	<i>cinnamomi uires ex Galeno</i>	37.27
<i>chelidoni maioris uires</i>	337.17	<i>Cionia Dioscoridi</i>	177.58
<i>Chelidonium minus Dioscoridi</i>	337.33	<i>Circæa Dioscoridi</i>	451.11
<i>chelidoni minoris consideratio</i>	337.46	<i>circæa consideratio</i>	451.18
<i>chelidoni minoris uires</i>	338.20	<i>circæa uires ex Galeno</i>	451.26
<i>Cherfydri natura, morsus, &amp; curatio</i>	774.3	<i>Circunforaneus floris uenenati olfactu interemptus</i>	714.20
<i>Cherue oleum</i>	55.27		
<i>Chia terra Dioscoridi</i>	707.57	<i>Circunforaneorum uenena innoxie sumere profiten-</i>	
<i>China radice consideratio, &amp; uires</i>	125.4	<i>tium fraudes</i>	721.49. & deinde
<i>Chondrilla Dioscoridi</i>	291.4	<i>Circunforaneorum diui Pauli stirpem mentientium</i>	
<i>chondrilla utriusq; consideratio</i>	291.15	<i>fraus 762.53. &amp; deinde</i>	
<i>chondrilla uires ex Galeno</i>	291.20	<i>Cirsium Dioscoridi</i>	572.21
<i>Chrysanthemon Dioscoridi</i>	521.33	<i>cirsij consideratio</i>	572.30
<i>chrysanthemi consideratio</i>	521.42	<i>Cistus Dioscoridi</i>	119.48
<i>chrysanthemi lectio restituta</i>	522.5	<i>cisti consideratio</i>	119.60
<i>Chrysobalanus</i>	602.15	<i>cisti uires ex Galeno</i>	120.57
<i>Chrysocolla Dioscoridi</i>	668.18	<i>Citria mala Dioscoridi</i>	150.1
<i>chrysocolla factitia</i>	242.9	<i>citriorum mira facultas</i>	153.19
<i>chrysocolla consideratio, &amp; historia</i>	668.28	<i>citriorum uires</i>	153.30
<i>chrysocolla uires ex Galeno</i>	668.48	<i>citrij mali uires ex Galeno</i>	153.43
<i>Chrysocome Dioscoridi</i>	519.60	<i>Clematis Dioscoridi</i>	486.53
<i>chrysocomes consideratio</i>	520.4	<i>clematis altera Dioscoridi</i>	487.35
<i>chrysocomes uires ex Galeno</i>	520.8	<i>clematidum consideratio</i>	487.39
<i>Chrysogonon Dioscoridi</i>	520.15	<i>clematidum uires ex Galeno</i>	488.9
<i>chrysogoni consideratio</i>	520.20	<i>Clinopodium Dioscoridi</i>	430.37
<i>Chymistarum de chelidonio uanitas</i>	337.3	<i>clinopodij consideratio</i>	430.43
<i>Cicade Dioscoridi</i>	212.3	<i>clinopodij uires ex Galeno</i>	430.46
<i>cicadarum consideratio</i>	212.22	<i>Clymenon Dioscoridi</i>	493.15
<i>cicadarum uires ex Galeno</i>	212.41	<i>clymeni consideratio</i>	493.21
<i>Cicer satinum Dioscoridi</i>	259.58	<i>Cneori consideratio, &amp; descriptio ex Theophrasto</i>	34.27
<i>ciceris consideratio, &amp; uires ex Galeno</i>	160.10		
<i>ciceris uires ex Aëtio</i>	260.30	<i>Cnicus Dioscoridi</i>	625.19
<i>cicer arietinum Dioscoridi</i>	260.61	<i>cnici consideratio</i>	625.36
<i>cicer sylvestris Dioscoridi</i>	261.7	<i>cnici uires ex Galeno</i>	625.48
<i>Cichorion Dioscoridi</i>	287.20	<i>cnici sylvestris historia ex Theophrasto</i>	428.30
<i>cichorij uires ex Galeno</i>	290.8	<i>Coagulum Dioscoridi</i>	233.36
<i>Cici Dioscoridi</i>	603.51	<i>coaguli consideratio</i>	233.50
<i>Cicini olei consideratio</i>	55.27	<i>coaguli facultates ex Galeno</i>	233.56
<i>cicini olei uires ex Mesue</i>	55.32	<i>Coccum Cnidium Dioscoridi</i>	611.53. & 612.4
<i>Ciconia stercus</i>	241.25	<i>coccum insectarium Dioscoridi</i>	515.28
<i>Cicuta Dioscoridi</i>	542.13	<i>cocci insectorij consideratio</i>	515.38
<i>cicuta consideratio</i>	542.32	<i>cocci insectorij uires ex Galeno</i>	516.5
<i>cicuta uires ex Galeno</i>	542.43	<i>Cochleæ Dioscoridi</i>	182.52
<i>cituta pote noxa, &amp; curatio Dioscoridi</i>	732.19	<i>cochlearum consideratio</i>	183.6
<i>cicuta uenefica uis</i>	732.28	<i>cochlearum uires ex Galeno</i>	183.23
<i>cicuta sumpta remedia</i>	732.47	<i>cochleæ pomatiæ quæ</i>	183.17
<i>Cimices Dioscoridi</i>	205.11	<i>cochleæ marinæ</i>	183.48
<i>cimicum consideratio</i>	205.28	<i>cochleæ sine testa</i>	183.49
<i>cimices sylvestres</i>	205.35	<i>cochlearum lapis, &amp; eius uires</i>	183.52
<i>Cimolia terra Dioscoridi</i>	708.9	<i>Cæruleus lapis Dioscoridi</i>	670.19
<i>Cinis sarmentitius Dioscoridi</i>	692.54	<i>cærulei lapidis consideratio</i>	670.23
<i>cineris omnis uires ex Galeno</i>	693.1	<i>cærulei uires ex Galeno</i>	671.2
<i>Cinnabaris Dioscoridi</i>	671.46	<i>Colchicon Dioscoridi</i>	547.3
<i>cinnabaris consideratio</i>	671.57	<i>colchici &amp; ephemerij consideratio</i>	547.19
<i>Cinnamomum Dioscoridi</i>	33.18	<i>colchici &amp; ephemerij uires ex Galeno</i>	548.28
<i>cinnamomi consideratio</i>	35.30	<i>Colocasia Dioscoridi</i>	261.59
			<i>colocasia</i>



colocasia consideratio	262.24	Cotyledon Dioscoridi	552.43. & 552.52
Colocynthis Dioscoridi	615.10	cotyledonis utriusque consideratio	552.57
colocynthis consideratio	615.29	Crataegonum Dioscoridi	455.33
colocynthis lesiones	615.32	crataegoni consideratio	455.38
colocynthis noxa, & curatio	748.55	Cressini forma & uires	115.23
colocynthis uires ex Mesue	615.39	Crimmon Dioscoridi	252.19
colocynthis uires ex Galeno	615.48	crimni consideratio	252.22
Colophonie resinæ consideratio	85.8	Crithmum, seu crithamon Dioscoridi	284.43
Columelle lapsus	171.52	crithimi consideratio	284.52
Coluteæ colytxæ consideratio	410.54	crithimi uires ex Galeno	285.5
Colymbades oliuæ Dioscoridi	132.61	Crocodili animalis historia	225.39
Communis curatio in omnes ietus uirulentos Diosco- ridi	759.51	crocodili animalis genera, & uires	225.49
Confiligo herba	593.50	Crocodilion Dioscoridi	355.39
Consolida regalis	399.5	crocodilij consideratio	355.44
Conyza Dioscoridi	452.33	crocodilij uires ex Galeno	355.56
conyze consideratio	452.53	Crococoma Dioscoridi	51.58
conyze uires ex Galeno	453.7	Crocum Dioscoridi	51.25
Corallium Dioscoridi	695.35	croci consideratio	52.3
corallij consideratio	695.47	crocum optimum mittit Vienna Austria	52.7
corallij facultates	696.11	croci uires ex Galeno	52.10
Corallina, & eius uires	557.31	crocum Saracenicum	625.36
Cordi errata	39.17. & 317.55. & 510.16	Croton Dioscoridi	603.52
Coriandrum Dioscoridi	400.17	Cruciata consideratio	347.2
coriandri facultas ex Galeno	400.20	cruciata uires	347.8
Coriandri seminis usus	401.6	Crystalli historia	704.23
coriandri uires ex Auicenna	401.15	crystalli uires	704.41
coriandri poti noxa, & curatio Dioscoridi	731.46	Cubeborum consideratio	31.60
coriandri uenefica natura	731.53	cubeborum uires	32.2
coriandri ueneni remedia	731.60	Cucumis satiuus Dioscoridi	292.54
Coria ueteramentaria Dioscoridi	209.10	cucumeris consideratio	293.36
coriorum ueteramentariorum uires	209.13	cucumeris uires ex Galeno	294.34
Coris Dioscoridi	478.47	Cucumis sylvestris Dioscoridi	595.18
coris consideratio	478.58	cucumeris sylvestris consideratio	596.8
Cornarij errata, & eius opiniones damnata	136.44. & 138.40. & 151.22. & 151.58. et 359.51. et 545.56. et 694.37	cucumeris sylvestris uires ex Galeno	596.43
Cornu cerui Dioscoridi	217.27	Cucurbita Dioscoridi	291.30
cornu cerui uires	219.8	cucurbitæ consideratio	291.42
Cornus Dioscoridi	157.48	cucurbitarum uaria genera	291.3
corni co sideratio	157.53	cucurbitæ facultates ex Galeno	292.8
cornorum usus in cibis	158.12	cucurbita sylvestris	620.42
cornorum uires ex Galeno	158.17	Culta quæ plantæ ament	9.47
Coronopus Dioscoridi	285.12	Cuminum satium Dioscoridi	398.42
coronopi consideratio	285.17	cumini satiui consideratio	399.1
coronopi sylvestris uires	286.19	cuminum synestre Dioscoridi	398.51
coronopi hortensis uires ex Galeno	286.25	cuminum sylvestre alterum Dioscoridi	398.57
Corpora icta fulmine non putrescunt	15.56	cumini sylvestris examinatio	399.1
Corrago Apuleio quid	578.7	cumini uires ex Galeno	399.24
Corruda Dioscoridi	279.61	Cunila Dioscoridi	373.15
Cortices quando siccandi, et reponendi	7.47	Cupressus Dioscoridi	90.16
Corydalis herba	566.14	cupressi historia, & consideratio	90.38
Cos Naxia Dioscoridi	706.49	cupressus liquidam resinam fundit	90.59
Costus Dioscoridi	39.57	cupressus pusilla	91.1
costi consideratio	40.8	cupressi uires ex Galeno	91.8
costum quæ suppleant	40.30	Cur pauci, cur multi lapides fiant	633.7
costi uires ex Galeno	40.44	Curatio uirulentorum ictuum secundum quendam ere mitam	763.38
Cot Aphris quid	305.33	Curmi Dioscoridi	251.20
Cotonea mala Dioscoridi	149.1	curmitis consideratio	251.24
cotoneorum malorum consideratio	151.3	Cyami mentio	29.2
cotoneorum malorum genera	151.4	Cyclaminus Dioscoridi	320.12
		cyclaminus altera Dioscoridi	320.47
		cyclamini utriusque consideratio	320.54
		cyclamini	



<i>cyclamini uires ex Mesne</i>	321.1	<i>dioscoridis lectio in moly restituta</i>	391.30
<i>cyclamini uires ex Galeno</i>	321.8	<i>dioscoridis lectio in oreoselino restituta</i>	404.32
<i>cyclamini noxa, &amp; curatio</i>	748.32	<i>dioscoridis locus in asclepiade restitutus</i>	428.5
<i>Cynocrambe Dioscoridi</i>	627.2	<i>dioscoridis codex in leucade dimmutus</i>	432.45
<i>cynocrambes consideratio</i>	627.12	<i>dioscoridis locus in leucoio suspectus</i>	455.6
<i>Cynoglosson Dioscoridi</i>	578.20	<i>dioscoridis locus in aconito suspectus</i>	538.32
<i>cynoglossi consideratio</i>	578.29	<i>dioscoridis locus in squama stomomatis deprauatus</i>	559.51
<i>Cynosorchis Dioscoridi</i>	456.22	<i>dioscoridis locus in alcyonio suspectus</i>	693.51
<i>Cyparissias tithymalus Dioscoridi</i>	606.40	<i>dioscoridis locus in Brassica suspectus</i>	278.1
<i>Cyperus Dioscoridi</i>	22.9	<i>dioscoridis lectio castigata in lacte intus coagulato</i>	743.33
<i>Cyperii consideratio, &amp; genera</i>	22.31	<i>Diphryges Dioscoridi</i>	682.52
<i>Cypirus arbor</i>	22.52	<i>diphrygis consideratio</i>	683.5
<i>cyperii uires ex Galeno</i>	23.4	<i>diphrygis historia, &amp; uires ex Galeno</i>	683.10
<i>Cyphi compositio Dioscoridi</i>	51.8	<i>Dipsacum Dioscoridi</i>	356.2
<i>cyphi caput in Dioscoride adscititium</i>	51.18	<i>dipsaci consideratio</i>	356.18
<i>Cytinus Dioscoridi</i>	144.42	<i>dipsaci uermiculus</i>	356.28
<i>cytini consideratio</i>	144.42	<i>dipsaci uires ex Galeno</i>	356.54
<i>Cytisus Dioscoridi</i>	567.59	<i>Dipladis morsus notæ, &amp; remedia Diosc.</i>	772.24
<i>cytisi consideratio</i>	568.4	<i>dipsadis historia, morsus signa, &amp; curatio</i>	773.12
<i>cytisis frutex est, non herba</i>	568.18	<i>Domestica nobis noxia Dioscoridi</i>	750.7
<i>cytisi historia ex Columella</i>	568.37	<i>domesticarum rerum noxa</i>	750.14
<i>cytisi historia ex Plinio</i>	568.53	<i>domesticarum rerum noxa remedia</i>	750.25
<i>cytisi uires ex Galeno</i>	569.21	<i>Dorella quid</i>	571.47
<b>D</b>			
<b>DAMASCENA</b> pruna Diosc.	159.5	<i>Doronici consideratio</i>	303.19
<i>Damaionium Dioscoridi</i>	476.42	<i>Dorycnion Dioscoridi</i>	534.29
<i>Daphnoides Dioscoridi</i>	589.51	<i>dorycni consideratio</i>	534.38
<i>daphnoidis consideratio</i>	590.35	<i>dorycni uires ex Galeno</i>	534.42
<i>daphnoidis uires ex Galeno</i>	590.49	<i>dorycni sumpti noxa, &amp; remedia Diosc.</i>	730.4
<i>Daucum Dioscoridi</i>	408.51	<i>dorycni ueneni consideratio</i>	730.12
<i>dauci consideratio</i>	409.1	<i>Draba Dioscoridi</i>	313.52
<i>daucum à syluestri pastinaca differre</i>	409.5	<i>drabæ consideratio</i>	313.59
<i>dauci uires ex Galeno</i>	409.31	<i>Draco marinus Dioscoridi</i>	188.48
<i>Delphinium Dioscoridi</i>	409.46	<i>draconis marini consideratio</i>	189.17
<i>delphini consideratio</i>	409.54	<i>draconis marini ictus notæ, &amp; remedia Dioscoridi</i>	767.22
<i>Dendroides tithymalus Dioscoridi</i>	606.43	<i>Dracunculus maior Dioscoridi</i>	321.49
<i>Deuteria Dioscoridi</i>	642.27	<i>dracunculus minor Dioscoridi</i>	322.7
<i>Diapensia</i>	511.55	<i>dracunculorum consideratio</i>	322.36
<i>Dictamnium Dioscoridi</i>	376.35	<i>dracunculi species plures</i>	322.54
<i>Dictamnium Cretense</i>	376.57	<i>dracunculi uires ex Galeno</i>	322.56
<i>dictamni consideratio</i>	377.1	<i>dracunculus hortenſis</i>	323.4
<i>dictamni caulem, florem, &amp; fructum ferre</i>	377.20	<i>dracunculi seminis noxa, &amp; auxilia</i>	731.27
<i>dictamni uires ex Galeno</i>	377.45	<i>Dryini ictus notæ, &amp; remedia Diosc.</i>	771.50
<i>dictamni albi consideratio</i>	394.44. & 377.40	<i>dryini historia, &amp; eius ictus signa</i>	771.55
<i>dictamni albi uires</i>	395.53	<i>dryini morsus curatio</i>	772.13
<i>Difficile unum uni ueneno proprium inuenire signum</i>	712.4	<i>Dryopteris Dioscoridi</i>	624.57
<i>Dioscoridi</i>	712.4	<i>dryopteridis consideratio</i>	625.1
<i>Dioscorides in simplicium medicamentorum materia</i>	5.33	<i>dryopteridis uires ex Galeno</i>	625.9
<i>primas tenet</i>	5.33	<i>Dulcis radix Dioscoridi</i>	350.18
<i>Dioscorides à Galeno maximè commendatus</i>	5.24	<i>dulcis radices consideratio</i>	350.34
<i>dioscorides à calumnia defenditur</i>	8.14	<i>dulcis radices uires ex Gal.</i>	350.60
<i>dioscoridi uaria simplicium nomina adulterina</i>	8.34	<b>E</b>	
<i>dioscoridis lectio in agallocho restituta</i>	48.28	<b>EBENVS</b> Dioscoridi	122.12
<i>dioscoridis lectio in lentiscino oleo deprauata</i>	58.27	<i>Ebeni consideratio</i>	122.28
<i>dioscoridis lectio in thure tribus in locis castigata</i>	75.4. & deinde	<i>ebeni genera duo</i>	122.29
<i>dioscoridis lectio in pice restituta</i>	87.23	<i>ebeni uires ex Galeno</i>	122.49
<i>dioscoridis lectio quibusdam codicibus in mespilo deprauata</i>	156.3	<i>Ebulum Dioscoridi</i>	613.42
<i>dioscoridis locus in thlapsi restitutus</i>	313.13	<i>ebuli, &amp; sambuci genera, &amp; uires</i>	613.55
		<i>ebuli</i>	



# I N D E X.

ebuli uires ex Galeno	614.11	epithymi disputatio	616.22
Ebur Dioscoridi	215.32	epithymum ubi plurimum	617.10
eboris consideratio	215.51	epithymi uires ex Mesue, & Galeno	617.44
eboris uires	216.51	Equisetum maius Dioscoridi	514.51
Echinus marinus Dioscoridi	174.26	equisetum minus Dioscoridi	514.57
echini marini consideratio, & historia	174.44	equiseti utriusque consideratio	515.1
echinometra	174.52	equiseti utriusque uires ex Galeno	515.15
echinorum uires ex Galeno	175.11	Equorum lichenes Dioscoridi	208.43
Echinus terrestris Dioscoridi	175.40	Eretria terra Dioscoridi	707.11
echini terrestris consideratio	175.43	Erica Dioscoridi	109.4
echini terrestris facultas	175.52	erica consideratio	109.7
Echion Dioscoridi	502.3	erica facultas ex Galeno	109.30
echij consideratio	502.16	Erigeron Dioscoridi	556.47
echij uires ex Paulo	502.45	erigerontis consideratio	557.1
Elaphoboscon Dioscoridi	407.18	erigerontis uires ex Galeno	557.6
elaphoboschi consideratio	407.30	Erimus Dioscoridi	503.20
elaphoboschi uires ex Galeno	407.50	erini consideratio	503.28
Elatæon Dioscoridi	385.35	erini uires ex Galeno	503.47
elaterij uires ex Mesue	506.26	Eruca Dioscoridi	288.38
elaterij noxa, & remedia Dioscoridi	747.57	eruca consideratio, & uires	298.47
elaterij noxa & curatio	748.32	Eruca olerum Dioscoridi	219.21
Elatine Dioscoridi	506.53	erucarum olerum historia	219.23
elatines consideratio	508.58	erucarum generatio	219.39
Electarij in cura cantharidum descriptio	727.18	eruca quomodo fugentur	ibidem
Electrum Dioscoridi	100.42	Eruca pinorum Dioscoridi	220.12
Elaomeli Dioscoridi	54.60	erucarum pinorum consideratio	220.40
elaomelitis consideratio	55.6	erucarum pinorum dolores, & remedia Dioscoridi	727.29
Eleliphacos Dioscoridi	378.35	erucarum pinorum uenenum, & curatio	727.45
Eleoselinum Dioscoridi	403.45	Eruum Dioscoridi	294.44
eleoselini consideratio	404.26	erui consideratio	265.5
Elephantorum historia	215.52	erui uires ex Galeno	265.22
Elichryson Dioscoridi	520.27	Eryngium Dioscoridi	364.39
elichrysi consideratio	520.41	eryngium marinum non esse crocodilium	364.57
elichrysi uires ex Galeno	520.59	eryngium marinum	364.54
Elleborine Dioscoridi	565.33	eryngij consideratio	364.58
elleborines consideratio	565.6	eryngij uires ex Galeno	365.8
Elleborum album Dioscoridi	590.58	Erysimon Dioscoridi	314.10
elleborum nigrum Dioscoridi	591.51	erysimi consideratio	314.24
ellebori utriusque consideratio	592.14	Erythrodanum Dioscoridi	471.35
ellebori utriusque uires ex Mesue	594.10	erythrodani consideratio	471.47
ellebori utriusque uires ex Galeno	594.28	erythrodani uires ex Galeno	471.23
ellebori albi noxa, & remedia Dioscoridi	747.57	Eupatorium Dioscoridi	509.17
ellebori albi noxa, & curatio	748.31	eupatorii consideratio	509.30
ellebori nigri noxa, & cura	748.45	eupatorii uires ex Galeno	510.51
Empetron Dioscoridi	619.10	eupatorium Auicennæ quid	509.48
empetri consideratio	619.14	eupatorium Mesui quid	510.1
empetri uires ex Galeno	619.20	Euphorbium Dioscoridi	421.45
Encelij lapsus	200.3. & 242.24	euphorbij consideratio	421.60
Ephemeron Dioscoridi	547.14	euphorbium quis primum inuenerit	422.8
ephemeri, & colchici consideratio.	547.19	euphorbij uires ex Aëtio, & Actuaria	422.10
ephemeri, & colchici uires ex Galeno	548.28	euphorbij uires ex Mesue	422.16
ephemeri colchici noxa, & remedium Dioscoridi	729.15	euphorbij uires ex Galeno	422.31
ephemeri colchici uenenum, & curatio	729.27	euphorbij potio noxia, & eius curatio	748.53
Epimedium Dioscoridi	498.10	Eupragia descriptio, & uires	512.32
epimedij consideratio	498.16		
epimedij uires ex Galeno	498.30		
Epipactis Dioscoridi	565.3		
epipactidis consideratio	565.56		
Epithymum Dioscoridi	615.57		
epithymi consideratio	616.1		

## F

FABA Dioscoridi	260.46
Fabarum consid. & uires ex Gal.	261.8
faba Aegyptia	261.49
faba Aegyptiæ consideratio	262.5



# I N D E X.

<i>Fœx Dioscoridi</i>	691.40	<i>Fluminibus quæ plantæ adnasci gaudeant</i>	9.18
<i>fœcis, &amp; tartari dicti consid. &amp; uires</i>	691.54	<i>Feniculum Dioscoridi</i>	407.57
<i>Fagus Dioscoridi</i>	134.54	<i>feniculum erraticum Dioscoridi</i>	408.13
<i>fagi. consideratio</i>	136.16	<i>feniculi utriusque consideratio</i>	408.25
<i>Farris consideratio</i>	254.55	<i>feniculi uires ex Gal.</i>	408.38
<i>farris, &amp; balicæ differentia</i>	ibidem	<i>Fœnum græcum Dioscoridi</i>	258.52
<i>Fel Dioscoridi</i>	238.11	<i>fœni græci consid. &amp; uires ex Galeno</i>	259.4
<i>fellis uires ex Galeno</i>	238.35	<i>Foliorum in plantis uarietas</i>	4.31
<i>fellis bubuli lapis, &amp; eius uires</i>	238.45	<i>foliorum in plantis comparatio, &amp; similitudo inter</i>	11.13
<i>fellis pardi uenenum, eiusq; remedia</i>	741.49	<i>se</i>	12.5
<i>fellis uiperæ uenefica uis, &amp; auxilia</i>	741.57	<i>foliorum in coloribus discrimen</i>	12.5
<i>fellis canis piscis uenenum, &amp; cura</i>	742.5	<i>Fomes ignis ex tussilagine</i>	444.46
<i>Felis, eiusq; cerebri maleficium, &amp; remedia</i>	742.8	<i>Fontium in riguis quæ plantæ proueniant</i>	9.38
<i>Ferri rubigo Dioscoridi</i>	661.23	<i>Fossilium facultates</i>	636.10
<i>ferri rubiginis consideratio</i>	661.34	<i>Fragariæ, &amp; fragorum consid. &amp; uires</i>	512.19
<i>Ferri stercus Dioscoridi</i>	661.31	<i>Fraxinus Dioscoridi</i>	99.3
<i>ferri stercoris consideratio</i>	661.34	<i>fraxini species</i>	99.38
<i>ferri scobis noxa, &amp; curatio</i>	744.15	<i>fraxini consideratio, &amp; historia</i>	99.19
<i>ferri squamæ noxa, &amp; cura</i>	ibidem	<i>fraxini uires ex Plinio</i>	99.40
<i>ferri recrementi noxa, &amp; cura</i>	ibidem	<i>Fructus quando decerpendi, &amp; quomodo conseruan-</i>	7.36
<i>Ferula Dioscoridi</i>	415.15	<i>di</i>	8.47
<i>ferulæ, in brutorum cibis uariis effectus</i>	415.40	<i>Frutices</i>	20.34
<i>ferulæ consideratio</i>	415.27	<i>Fuchsij errores, eiusq; sententiæ reprobata</i>	20.34
<i>ferulæ &amp; ferulaginis historia ex Theophr.</i>	415.33	<i>2. &amp; 23.55. &amp; 28.29. &amp; 32.42. &amp; 37.7. &amp; 39.</i>	
<i>ferulæ uires ex Galeno</i>	415.55	<i>21. &amp; 41.52. &amp; 42.55. &amp; 44.54. &amp; 48.9. &amp;</i>	
<i>ferulæ ubi maxima</i>	415.53	<i>49.3. et 50.41. et 69.14. et 73.25. &amp; 74.36. &amp;</i>	
<i>ferulæ tacta murena confestim moritur.</i>	415.59	<i>83.3. &amp; 88.33. &amp; 96.18. &amp; 120.43. &amp; 127.</i>	
<i>Fiber Dioscoridi</i>	197.46	<i>24. &amp; 140.19. &amp; 160.11. &amp; 166.19. &amp; 181.</i>	
<i>fibrini testes Dioscoridi</i>	197.47	<i>49. &amp; 216.48. &amp; 255.21. &amp; 242.4. &amp; 244.</i>	
<i>fibri consideratio.</i>	198.21	<i>6. &amp; 245.34. &amp; 257.47. &amp; 265.9. &amp; 267.3.</i>	
<i>fibros sibi testes amputare, uanum.</i>	198.33	<i>268.33. &amp; 294.31. &amp; 317.56. &amp; 320.4.</i>	
<i>fibri testium adulteratio</i>	198.32	<i>332.53. &amp; 338.16. &amp; 342.5. &amp; 349.43.</i>	
<i>fibri testium uires ex Galeno</i>	198.55	<i>357.35. &amp; 368.44. &amp; 390.27. &amp; 404.60.</i>	
<i>Ficus Cypria</i>	169.2	<i>415.4. &amp; 429.1. &amp; 449.17. &amp; 438.10. &amp;</i>	
<i>Fici Dioscoridi</i>	169.20	<i>446.27. &amp; 458.29. &amp; 459.53. &amp; 461.46. &amp;</i>	
<i>ficorum consideratio</i>	170.13	<i>465.37. &amp; 487.52. &amp; 488.52. &amp; 506.8. &amp;</i>	
<i>ficorum facultates ex Galeno</i>	170.19	<i>510.24. &amp; 515.12. &amp; 522.14. &amp; 533.13. &amp;</i>	
<i>ficus agrestis.</i>	171.2	<i>539.18. &amp; 539.33. &amp; 547.61. &amp; 548.10. &amp;</i>	
<i>fici præcoces</i>	171.4	<i>553.4. &amp; 555.41. &amp; 562.13. &amp; 564.22. &amp;</i>	
<i>ficus cinis Dioscoridi</i>	170.1	<i>564.51. &amp; 579.2. &amp; 581.33. &amp; 608.43. &amp;</i>	
<i>Fidicula Theodoro</i>	582.55	<i>621.41. &amp; 684.58. &amp; 689.54. &amp; 697.19. &amp;</i>	
<i>Filicula Dioscoridi</i>	623.53	<i>699.34. &amp; 702.35.</i>	
<i>filicula consideratio</i>	623.69	<i>Fucus marinus Dioscoridi.</i>	558.3
<i>Filipendula, &amp; eius uires</i>	451.54	<i>fuci marini consideratio</i>	558.10
<i>Filix mas Dioscoridi</i>	623.4	<i>fuci marini uires ex Galeno</i>	558.28
<i>filix femina Dioscoridi</i>	623.15	<i>Fuligo è myrrha, resina, styrace Dioscoridi</i>	72.3
<i>filicis utriusque historia</i>	623.23	<i>fuligo liquida picis Dioscoridi.</i>	76.24
<i>filicis utriusque uires ex Galeno</i>	623.40	<i>fuligo pictoria Dioscoridi</i>	709.11
<i>Fimum Dioscoridi</i>	239.35	<i>fuligo thuris Dioscoridi</i>	71.55
<i>fimi uires, uide Stercoris uires</i>		<i>fuliginum omnium uires</i>	87.8
<i>Flammula historia, &amp; uires</i>	487.55	<i>Fumaria Dioscoridi</i>	565.22
<i>flammulæ noxa, &amp; curatio</i>	731.4	<i>fumariæ consideratio.</i>	566.1
<i>Flores quo tempore decerpendi, ac recondendi</i>	7.16	<i>fumariæ alterum genus</i>	549.52
<i>flores sicci quandiu durent</i>	7.24	<i>fumariæ genera ex Plinio</i>	566.4
<i>florum in plantis uarietas</i>	13.33	<i>fumariæ uires ex Mesue</i>	566.20
<i>Flos aris Dioscoridi</i>	657.54	<i>fumariæ facultates ex Galeno</i>	566.35
<i>floris aris historia</i>	658.5	<i>Fungi Dioscoridi</i>	544.56
<i>floris aris uires ex Galeno</i>	658.13	<i>fungorum consideratio, &amp; genera</i>	545.23
<i>Fos salis Dioscoridi</i>	688.48	<i>fungorum alia genera</i>	545.41
<i>Flos punice Dioscoridi</i>	143.58	<i>fungi lucernarum</i>	545.53
<i>flos syluestris punice Dioscoridi</i>	144.6	<i>Fungi corporis affectus</i>	546.11
		<i>fungorum</i>	



# I N D E X.

fungorum uires ex Galeno	546.15	566.58. & 568.31. & 569.7	
fungorum strangulatus, & remedia.	740.18	Gingiber Dioscoridi	316.59
fungorum uenefica natura	740.26	gingiberis consideratio, & historia	317.7
fungorum preparatio	740.34	gingiberis uires ex Galeno	317.24
fungorum ueneni remedia	740.46	Gingidion Dioscoridi	296.52
		gingidij consid. 296.57. & uires ex Galeno	297.3
G		Gith Dioscoridi.	417.42
GAGATES lapis Dioscoridi	699.21	gith consideratio	417.54
Gagatæ lapidis consideratio	699.28	Gladiolus Dioscoridi	498.38
Gagatæ lapidis historia, & uires ex Galeno	699.48	gladioli confi. 498.55. eius uires ex Galeno	499.12
Galaſſites lapis Dioscoridi	701.31	Glandes Dioscoridi	134.54
Galaſſitæ lapidis historia	701.40	glandiferarum arborum consideratio	135.38
Galangæ consideratio, & genera	21.11	glandiferarum arborum uires ex Galeno	137.12
Galangæ uires	21.19	Glans unguentaria Dioscoridi 690.19. eius consid.	
Galaxias lapis Dioscoridi	701.56	600.29	
Galbanum Dioscoridi	422.42	glandis unguentariæ uires ex Mesue	601.4
galbani consid. 422.58. eius uires ex Gal.	423.3	glandis unguentariæ uires ex Galeno	601.18
Galega quid, & eius uires	390.59	Glaſtum ſatiuum Dioscoridi	339.13
Galenî nūigationes	2.45	glaſtum ſylueſtre Dioscoridi	339.20
Galenî lectio in thure reſtituta	72.40	glaſti utriusq; cōſid. 339.27. et uires ex Gal.	340.4
Galenî in prunis deſenſio contra Braſauolū	159.26	Glaucium Dioscoridi	424.15
Galenî de piſtaciōrum uiribus opinio ab Auicenna re		glaucij consid. 424.20. eius uires ex Galeno	424.31
probata	164.1	Glaux Dioscoridi	585.14
Galenî, & Dioscoridis in Seripho, & Santonico abſin		glaucis consid. 585.19. & uires ex Galeno	585.40
thio ſententia uaria	369.18	Glencinum Dioscoridi	63.25
Galenus in coriandro à Dioscoride diſſentit	400.31	glencini consideratio	63.31
Galenî locus ſuſpectus de aſpleno	464.2	Glirium historia, & uires	227.48
Galenus notatur in argento uiuo	674.42	Gluten piſcium Dioscoridi	424.46
Galenî ſn̄a de trifolio aſphaltite damnata	441.16	Glutinium Dioscoridi	424.39
Galenî liber de theriaca ad Piſonē ſuſpectus	441.46	glutinis consideratio, & uires	424.50
Galerita Dioscoridi	214.16	Gnaphalion Dioscoridi	448.54
Galeritæ consideratio	214.35	gnaphalij cōſi. 448.57. & uires ex Galeno	450.37
Galion Dioscoridi	556.22	Gnidium granum Dioscoridi	611.53
galij confi. 556.31. eius uires ex Galeno	556.37	Gnidium oleum	56.60
Galiopſis Dioscoridi	555.22	Gobius Dioscoridi	202.59
Galiopſeos consideratio	138.14	gobiorum consideratio	203.29
Galla Dioscoridi	138.14	gobij facultas ex Galeno	203.32
Gallarum confi. 138.33. & uires ex Gal.	134.12	Gobij flumiatiles	203.36
Galla omphacitis	138.38	Gōſipij consideratio	450.19
Gallarum præſagium	139.5	Gramen Dioscoridi	503.56
Galli, & gallinæ Dioscoridi	209.33	gramen arundinaceum Dioscoridi	504.2
Gallorum, & gallinarum confi. & uires	210.16	gramen Parnafi Dioscoridi	504.3
Gallitricum quid	378.45	graminis consideratio & historia ex Plinio	504.17
Gammarorum lapilli	185.52	graminis uires ex Galeno	504.46
Garum Dioscoridi	204.53	Grandinis impetum quæ arceant	15.51
Gari consideratio	205.1	Gratiolæ hiſtor. & uires	372.14
Gattaria herba	382.3	Groſſi Dioscoridi	169.55
Geniſtæ consideratio	599.45	Guaiaci ligni consideratio	122.53
Geniſtæ hiſtoria, & uires	599.50	guaiaci genera tria	122.58
Genitale cerui Dioscoridi	208.6	guaiaci cortices	123.42
genitalis cerui consideratio	208.8	guaiaci planta 123.50. eius facultates	123.53
Gentes tutæ à ſerpentibus eorumq; iſtibus medentes		Guaiacium lignum præſtantius	123.11
762.36		Gummi amygdalæ Dioscoridi	162.42
Gentiana Dioscoridi	346.37	Gummi ceraſi Dioscoridi	146.59
gentianæ confi. 346.52. eius uires ex Gal.	346.56	Gummi elemi facult. & consideratio	234.35
Gentiana minor	347.3	Gipſum Dioscoridi	692.31
Geodes lapis Dioscoridi	706.55	gyphi confi. 692.34. & uires ex Galeno	692.40
geodæ lapidis consideratio	706.58	gyphi ſtrangulatus remedia Dioscoridi	740.56
Georgij agricolæ lapſus	228.1	gyphi ueneficium, eiusq; curatio	741.2
Geranium Dioscoridi	448.41		
geranij consideratio	448.46	H	
Gefneri lapſus 475.46. & 538.40. & 541.10. &		HÆMATITES lapis Dioscoridi	698.4
		b	bematitæ



# I N D E X

<i>hematite lapidis consideratio</i>	698.20	31.42. 55.7. 65.48. 82.22. 173.	
<i>hematite lapidis uires ex Galeno</i>	698.28	12. 302.16. 314.47. 329.51. 428.	
<i>hematite lapidis uires ex Alexandro</i>	698.41	26. 449.23.	
<i>Hæmorrhoi ictus notæ, &amp; curatio Dioscori.</i>	772.24	<i>Hermolaus à calumnia uindicatur</i>	536.49
<i>hæmorrhoi perniciosus ictus, &amp; historia</i>	772.42	<i>Hieracium magnum Dioscoridi</i>	401.57
<i>hæmorrhoi morsus notæ, &amp; remedia</i>	773.1	<i>hieracium paruum Dioscoridi</i>	401.61
<i>Halica Dioscoridi</i>	254.17	<i>hieracii utriusq; consid. &amp; uires ex Plinio</i>	402.35
<i>halicæ consi. 254.24. &amp; uires ex Galeno</i>	254.46	<i>Hieropili lapsus</i>	592.31
<i>halicæ, &amp; farris differentia</i>	254.55	<i>Hiericuntam non esse Amomum</i>	39.13
<i>Halicacabum solanum Dioscoridi</i>	531.58	<i>hiericuntæ uires</i>	33.19
<i>Halimus Dioscoridi</i>	111.25	<i>Hippocampus Dioscoridi</i>	176.6
<i>halimi consideratio</i>	111.32	<i>hippocampi consideratio</i>	176.45
<i>halimus Mauritanis molochia</i>	111.41	<i>hippocampi uires ex Galeno</i>	177.25
<i>halimi uires ex Galeno</i>	112.2	<i>hippocampi uires ex Aeliano</i>	177.29
<i>Handachocho Arabicis quid</i>	569.48	<i>Hippoglosson Dioscoridi</i>	579.41
<i>Harundo Dioscoridi</i>	106.3	<i>hippoglossi consi. 597.49. eius uires</i>	579.55
<i>harundinum consideratio</i>	106.19	<i>Hippolapathon Dioscoridi</i>	271.9
<i>harundinum genera plura</i>	106.21	<i>hippolathi consideratio</i>	271.23
<i>harundinis, &amp; silicis odium</i>	106.41	<i>hippolathi facultates</i>	271.29
<i>harundinis uires ex Galeno</i>	106.46	<i>Hippomarathon Dioscoridi</i>	408.14
<i>Hastula regia Dioscoridi</i>	325.20	<i>hippomarathri descriptio, &amp; uires</i>	408.34
<i>hastulæ regie consideratio, uide in Aspodelo</i>		<i>Hippophaes Dioscoridi</i>	603.21
<i>Hedera Dioscoridi</i>	335.37	<i>hippophais consideratio</i>	603.39
<i>hedera consideratio, &amp; genera</i>	335.55	<i>Hippophæston Dioscoridi</i>	603.33
<i>hedera facultas</i>	336.24	<i>hippophæsti consideratio</i>	603.39
<i>Hedychroon Dioscoridi</i>	64.13	<i>Hippopotami testes Dioscoridi</i>	197.26
<i>hedychroi compositio ex Galeno</i>	64.16	<i>hippopotami historia 197.28. eius uires</i>	197.38
<i>Hedysaron, uide Securidaca</i>		<i>Hipposelinon Dioscoridi</i>	403.59
<i>Helcysma Dioscoridi</i>	666.3	<i>hipposelini consideratio</i>	404.47
<i>Helenium Dioscoridi</i>	52.21	<i>hipposelini uires ex Galeno</i>	405.7
<i>helenij consideratio</i>	52.45	<i>Hirci barbula Dioscoridi</i>	302.3
<i>helenium alterum Dioscoridi</i>	52.38	<i>hirci barbula consideratio</i>	302.7
<i>helenij Aegyptij consideratio</i>	53.2	<i>Hirculus Dioscoridi</i>	27.23
<i>helenij uires ex Galeno</i>	53.13	<i>Hirudinum deuoratarum remedia Dioscoridi</i>	747.28
<i>Helichryson, uide supra in Elichryso</i>		<i>hirudinum deuoratarum noxa</i>	747.34
<i>Helioscopius tithymalus Dioscoridi</i>	606.35	<i>hirudinum deuoratarum curatio</i>	747.40
<i>Heliotropium magnum Dioscoridi</i>	628.3	<i>Hirundines Dioscoridi</i>	215.4
<i>Heliotropium paruum Dioscoridi</i>	628.18	<i>hirundinū hist 215.13. earū uires ex Gal.</i>	215.13
<i>Heliotropij utriusq; consid. 628.23. &amp; uires</i>	628.25	<i>Historia rustici à serpente hasta transfixo infecti</i>	113.53
<i>Helleborine uide Elleborine</i>		<i>historia rustici suctu morsus fere perempti</i>	714.24
<i>Helleborum uide Elleborum</i>		<i>historia fraudis circumsoranci uenenum innoxie sume</i>	
<i>Helxine cissampelos Dioscoridi</i>	508.18	<i>re proftentis</i>	721.36
<i>helxines consideratio</i>	508.24	<i>historia casus ex cicuta sumpta</i>	732.32
<i>helxines uires ex Galeno</i>	508.44	<i>Holostium Dioscoridi</i>	491.37
<i>Helxines altera Dioscoridi</i>	548.49	<i>holostij consi. 491.42. eius uires ex Gal.</i>	492.29
<i>helxines consi. 549.2 uires ex Galeno</i>	549.7	<i>Hordeum Dioscoridi</i>	249.55
<i>Hemerocallis Dioscoridi</i>	453.50	<i>hordei consideratio</i>	250.15
<i>hemerocallis consideratio</i>	453.36	<i>hordei facultas</i>	250.34
<i>hemerocallis uires ex Galeno</i>	454.38	<i>Horminum Dioscoridi</i>	459.14
<i>Hemionitis Dioscoridi</i>	646.17	<i>hormini consideratio</i>	459.53
<i>hemionitidis consi. 464.23. &amp; uires ex Gal.</i>	465.16	<i>horminum cercalc</i>	460.7
<i>Herba mirabilis ad excitandam uenerem</i>	458.48	<i>Humani Stercoris uires</i>	240.15
<i>Herbarum formæ descriptæ parum conferunt ad co-</i>		<i>Hyacinthus Dioscoridi</i>	524.42
<i>gnoscentia simplicia</i>	3.59	<i>hyacinthi consid. 524.52. eius uires ex Gal.</i>	525.2
<i>herbæ quo pacto legendæ, siccandæq; sint</i>	6.50	<i>Hydri historia, morsus, &amp; curatio</i>	773.53
<i>herbas colligere certis temporibus non est ab re</i>	6.35	<i>Hydromeli Dioscoridi</i>	643.31
<i>herbæ quæ</i>	8.51	<i>hydromelon Dioscoridi</i>	648.59
<i>herbæ quæ in alias profiliunt plantas</i>	10.6	<i>Hydropiper Dioscoridi</i>	318.14
<i>Herba Paris, &amp; eius historia, &amp; uires</i>	539.11	<i>hidropiperis consideratio</i>	318.25
<i>Hermodactyli coniectura</i>	547.49	<i>hydropiperis uires ex Galeno</i>	319.6
<i>Hermolai lapsus, &amp; opiniones improbatæ</i>	25.27		

*Hyoscyaminum*



# I N D E X.

<i>Hyoscyminum Dioscoridi</i>	56.38	<i>Irini unguenti consideratio</i>	93.17
<i>hyoscyamini olei uires</i>	56.50	<i>Irio Dioscoridi</i>	314.10
<i>hyoscyamini parandi ratio</i>	56.58	<i>irionis consideratio</i>	314.24
<i>Hyoscyamus Dioscoridi</i>	529.11	<i>Iris Dioscoridi descripta</i>	17.34
<i>hyoscyami confid. 529.55. eius uires ex Gal.</i>	530.7	<i>iridis confid. &amp; genera 17.54. eius uires</i>	18.51
<i>hyoscyami noxa, &amp; auxilia</i>	734.50	<i>iris cognomine astragalitis</i>	18.57
<i>hyoscyami noxia uis</i>	734.58	<i>iridis mentio à Galeno</i>	19.9
<i>hyoscyami utriusq; noxæ curatio</i>	735.11	<i>Isopyron Dioscoridi</i>	574.4
<i>Hypecoon Dioscoridi</i>	528.54	<i>isopyri consideratio</i>	574.9
<i>hypecoi consideratio</i>	528.57	<i>Iua muscata</i>	442.38
<i>hypecoi uires ex Galeno</i>	529.2	<i>Iudaicus lapis Dioscoridi</i>	703.4
<i>Hypericon Dioscoridi</i>	477.38	<i>iudaici lapidis uires ex Galeno</i>	703.9
<i>hyperici confid. 478.58. eius uires ex Galeno</i>	479.25	<i>Iuglandes nuces</i>	164.23
<i>Hypocistis Dioscoridi</i>	120.31	<i>iuglandium consideratio</i>	164.43
<i>hypocistipis consideratio</i>	119.60	<i>iuglandium uires ex Galeno</i>	164.52
<i>hypocistidis uires ex Galeno</i>	120.57	<i>Iuglandes conditæ</i>	165.8
<i>Hyssopum Dioscoridi</i>	370.59	<i>Iuncus Dioscoridi</i>	517.54
<i>hyssopi confid. 371.16. eius uires ex Galeno</i>	371.59	<i>iunci consideratio, &amp; uires 518.8</i>	& deinde
<i>hyssopi uires ex Mesue</i>	371.69	<i>Iuncus odoratus Dioscoridi</i>	40.57
<i>Hystricis mentio</i>	175.57	<i>iunci odorati consideratio</i>	41.9
<b>I</b>		<i>iunci odorati uires ex Galeno</i>	41.52
<i>I A C E A herba</i>	574.60	<i>Iuniperus Dioscoridi</i>	91.22
<i>Iacobi Sylui in acacia opinio improbata</i>	130.23	<i>iuniperi consideratio</i>	91.39
<i>Iasminum Dioscoridi</i>	95.36	<i>iuniperi caput in Dioscoride deprauatum</i>	ibidem
<i>iasmini unguenti consideratio</i>	65.42	<i>iuniperi domestica</i>	91.52
<i>Iaspis Dioscoridi</i>	704.51	<i>iuniperi gummi 19.57. eius uis</i>	92.8
<i>iaspidum genera plura, &amp; uires</i>	404.57	<i>iuniperi uires ex Galeno</i>	92.20
<i>Iaspidum natura</i>	705.2	<i>Ius galli ueteris Dioscoridi</i>	209.37
<i>Iaspidis uires ex Galeno</i>	705.6	<i>Ius piscium Dioscoridi</i>	204.59
<i>Iberis Dioscoridi 172.4. eius confid.</i>	172.13	<i>Ixia Dioscoridi</i>	353.50
<i>iberis, &amp; lepidium idem</i>	172.32	<i>ixiam nigri chamaeleonis radicibus innasci</i>	354.52
<i>iberis à Damocrate carmine descripta</i>	172.34	<i>ixia uenenum mortiferum</i>	355.29
<i>iberis altera</i>	173.5	<i>ixie uenenum, &amp; remedia Dioscoridi</i>	739.4
<i>Ibiscus, uide Althæa</i>		<i>ixie uenefica natura</i>	739.29
<i>Ichthyocolia Dioscoridi</i>	424.44	<b>K</b>	
<i>Ictum uirulentorum communis curatio Dioscoridi</i>	759.51	<i>K A L I Mauritanorum mentio</i>	274.53
<i>Idæa radix Dioscoridi</i>	513.28	<i>Karabe Mauritanorum</i>	202.19
<i>Idæa radices consideratio</i>	513.33	<i>Kieri quid</i>	455.3
<i>idæa radices uires ex Galeno</i>	513.39	<i>Kerpi quid</i>	100.48
<i>Iecur apri Dioscoridi</i>	207.10	<i>Kerua quid</i>	604.9
<i>iecur asininum Dioscoridi</i>	207.7	<b>L</b>	
<i>iecur canis rabidi Dioscoridi</i>	207.11	<i>L A B R V M Veneris Dioscoridi</i>	356.1
<i>iecur caprinum Dioscoridi</i>	207.70	<i>labri Veneris consideratio</i>	356.18
<i>iecur mergi Dioscoridi</i>	207.14	<i>labri Veneris uires ex Galeno</i>	356.56
<i>iecinorum diuerforum consideratio</i>	207.33	<i>Labrusca Dioscoridi</i>	637.8
<i>Iesemin unde dictum</i>	66.2	<i>Lac Dioscoridi</i>	228.56
<i>iesemini uires ex Scrapione</i>	66.8	<i>lactis consideratio</i>	230.21
<i>Ilex Dioscoridi</i>	134.54	<i>lactis probatio 230.32 eius facult.</i>	230.40
<i>ilicis consideratio</i>	136.26	<i>lactis bibendiratio</i>	230.46
<i>Imperatorie consideratio, historia, &amp; uires</i>	406.50	<i>lactis facultates ex Galeno</i>	232.3
<i>Impia herba Plinij</i>	450.3	<i>lactis coagulati uires</i>	230.51
<i>Impostores quandoque etiam peritos decipiunt</i>	4.12	<i>lac humanum Dioscoridi</i>	229.25
<i>Indica harundo</i>	107.17	<i>lac schiston Dioscoridi</i>	229.13
<i>Indicum Dioscoridi</i>	671.12	<i>lactis serum Dioscoridi</i>	229.10
<i>indici consideratio</i>	671.18	<i>Lactis intus coagulati noxa, &amp; auxilia Dios.</i>	742.58
<i>Intybus Dioscoridi</i>	287.28	<i>lactis coaguli consideratio</i>	743.4
<i>intybi consideratio</i>	288.40	<i>lactis in uentriculo coagulati noxa</i>	743.14
<i>intybi uires ex Galeno</i>	290.8	<i>lactis in uentriculo coagulati curatio</i>	743.30
<i>Ioannis de uigo lapsus</i>	66.18	<i>Lacca, &amp; de ea Arabum opinio uaria</i>	50.1
<i>Iouis glandes Dioscoridi</i>	137.34	<i>lacca infectorum est Arabum lacca</i>	50.2
		<i>lacce factitiæ genera</i>	50.34
		<b>b</b> 2 <i>Lacera</i>	



# I N D E X.

<i>Lacerta</i> Dioscoridi	223.42	<i>laurini olei uires</i>	58.4
<i>lacertarum consideratio</i>	224.22	<i>Laurus lapidea</i>	57.58
<i>lacertarum Chalcidicarum consideratio</i>	224.26	<i>lauri uires ex Galeno</i>	58.2
<i>Lacrymæ, resina, &amp; gummi</i>	8.5	<i>laurus ex se ignem producit</i>	57.53
<i>Lactuca</i> Dioscoridi	295.40	<i>laurus Alexandrina Dioscoridi</i>	588.47
<i>lactuca sylvestris Dioscoridi</i>	295.49	<i>lauri Alexandrinae consideratio</i>	588.55
<i>lactucæ consideratio</i>	295.58	<i>lauri Alexandrinae uires ex Galeno</i>	589.45
<i>lactuca sylvestris consideratio</i>	296.1	<i>Ledon</i> Dioscoridi	121.18
<i>lactucæ uires ex Galeno</i>	296.11	<i>Lemnia terra</i> Dioscoridi	676.21
<i>Ladanum</i> Dioscoridi	121.19	<i>lemniæ terræ consideratio</i>	676.28
<i>ladani consideratio</i>	121.44	<i>lemniæ terræ historia</i>	ibidem
<i>ladani uires ex Galeno</i>	121.53	<i>lemniæ terræ uires</i>	677.18
<i>Lagopus</i> Dioscoridi	497.17	<i>lemnia terra quid censeatur</i>	677.45
<i>lagopi consideratio</i>	497.20	<i>lemniæ terræ adulteranda fraus detecta</i>	677.59
<i>lagopi uires ex Galeno</i>	497.47	<i>Lens</i> Dioscoridi	262.37
<i>Lagrimo uulgò quid</i>	80.58	<i>lentium uires ex Galeno</i>	263.5
<i>Lamium herba</i>	555.60	<i>Lens palustris</i> Dioscoridi	550.5
<i>Lampsana</i> Dioscoridi	271.49	<i>lentis palustris consideratio</i>	550.9
<i>lampsanæ consideratio</i>	271.53	<i>lentis palustris uires ex Galeno</i>	550.11
<i>lampsanæ uires ex Galeno</i>	272.1	<i>Lentiscini olei parandi ratio</i>	58.14
<i>Lana</i> Dioscoridi	232.51	<i>Lentiscus</i> Dioscoridi	81.52
<i>Lanaria herba</i> Dioscoridi	319.41	<i>lentiscina resina</i> Dioscoridi	82.5
<i>lanariæ herbæ consideratio</i>	319.49	<i>lentisci consideratio</i>	82.13
<i>lanariæ herbæ uires ex Galeno</i>	320.1	<i>lentisci uires ex Galeno</i>	82.32
<i>Lapathum</i> Dioscoridi	269.56	<i>Leonici errata, ac eius opiniones dilutæ</i>	285.46.
<i>lapathi consideratio</i>	271.12	& 348.25. & 388.15. & 438.10. & 464.24.	
<i>lapathi uires ex Galeno</i>	271.26	& 773.39	
<i>Lapides cur pauci, cur multi fiant</i>	633.7	<i>Leontopetalon</i> Dioscoridi	430.51
<i>lapidum colores unde varij</i>	633.20	<i>leontopetali consideratio</i>	430.58
<i>lapidum diuersa discrimina</i>	634.18	<i>leontopetali uires ex Galeno</i>	431.1
<i>Lapis plumbarius</i>	662.30	<i>Leontopodion</i> Dioscoridi	579.23
<i>lapidis plumbarij consideratio</i>	662.48	<i>leontopodij consideratio</i>	579.29
<i>Lapis bezabar Arabum</i>	678.31	<i>Lepidium</i> Dioscoridi	339.38
<i>lapidis bezabar historia, &amp; uires</i>	ibidem	<i>lepidij consideratio</i>	339.43
<i>lapis in felle bubulo repertus, &amp; eius uires</i>	238.45	<i>lapidium Plinij</i>	339.46
<i>lapis in oculo ceruorum natus</i>	678.50	<i>Leptocarya</i> Dioscoridi	166.56
<i>Larix arbor, &amp; eius historia</i>	79.38	<i>Lepus marinus</i> Dioscoridi	193.52
<i>larix agaricum profert</i>	80.4	<i>leporis marini consideratio</i>	194.20
<i>larigna resina</i>	80.28	<i>Leporis marini hausti notæ, &amp; curatio</i> Dioscoridi	
<i>Laser</i> Dioscoridi	418.55	746.4	
<i>laseris consideratio</i>	419.23	<i>leporis marini sumpti indicia</i>	746.14
<i>laseris uires ex Galeno</i>	420.46	eius noxæ remedia	746.26
<i>Laserpitium</i> Dioscoridi	418.50	<i>Lepus terrestris</i> Dioscoridi	194.1
<i>laserpitij consideratio</i>	419.23	<i>leporis terrestris consideratio</i>	194.28
<i>laserpitij historia ex Theophrasto</i>	420.11	<i>lepores ubi candidi</i>	194.33
<i>laserpitij uires ex Galeno</i>	420.46	<i>lepores ubi bina habent iecinora</i>	194.50
<i>Lusulata</i>	380.35	<i>leporis facultates</i>	194.56
<i>Lathyrus</i> Dioscoridi	609.3	<i>Leporinum coagulum</i> Dioscoridi	233.36
<i>lathyrus consideratio</i>	609.22	<i>Leucacantha</i> Dioscoridi	362.13
<i>lathyrus uires ex Aëtuario</i>	609.27	<i>leucacanthæ consideratio</i>	362.20
<i>lathyrus uires ex Galeno</i>	609.32	<i>leucacanthæ uires ex Galeno</i>	363.4
<i>lathyrus noxa, &amp; curatio</i>	748.56	<i>Leucas</i> Dioscoridi	432.38
<i>Lauanda uulgò quæ</i>	26.54	<i>leucadis consideratio</i>	432.42
<i>Lauer</i> Dioscoridi	281.58	<i>Leucoion</i> Dioscoridi	454.50
<i>laueris consideratio</i>	282.1	<i>leucoij consideratio</i>	451.1
<i>laueris uires ex Galeno</i>	282.23	<i>leucoij uires ex Galeno</i>	451.14
<i>Laurus</i> Dioscoridi	97.2	<i>Libri explodendi</i>	5.43
<i>lauri bacca</i> Dioscoridi	97.10	<i>Libysiticum Galeno ligusticum</i>	393.46
<i>lauri historia</i>	97.20	<i>Lichenes equonum</i> Dioscoridi	208.43
<i>laurini olei consideratio</i>	58.1	<i>lichenum equorum uires</i>	209.1
		<i>Lichen</i> Dioscoridi	518.30
			<i>licheni</i>



# I N D E X.

<i>Lichenis consideratio</i>	518.37	<i>loræ parandæ ratio ex Galeno</i>	642.37
<i>Lichenis genera ex Plinio</i>	518.4	<i>Lotus arbor Dioscoridi</i>	156.49
<i>Lichenis nires ex Galeno</i>	519.14	<i>loti arboris consideratio</i>	156.53
<i>Lignum aloës</i>	48.25	<i>lotus Italica</i>	157.13
<i>Lignorum marcor Dioscoridi</i>	205.39	<i>loti arboris uires ex Galeno</i>	157.37
<i>Lignorum marcoris uires</i>	205.55	<i>Lotus Aegyptia Dioscoridi</i>	569.27
<i>Ligusticum Dioscoridi</i>	393.19	<i>loti Aegyptiæ historia ex Theophrasto</i>	569.33
<i>ligustici consideratio</i>	393.44	<i>loti Aegyptiæ mentio ex Galeno</i>	569.51
<i>ligustici, seu libystici uires ex Galeno</i>	393.44	<i>Lotus sylvestris Dioscoridi</i>	566.52
<i>Ligustrum Dioscoridi</i>	117.30	<i>lotus urbana Dioscoridi</i>	566.47
<i>ligustri consideratio</i>	117.44	<i>loti sylvestris, &amp; urbanæ consideratio</i>	566.58
<i>ligustri uires ex Galeno</i>	118.15	<i>loti herbæ utriusq; uires ex Galeno</i>	567.49
<i>Lilium Dioscoridi</i>	433.43	<i>Lunaria minor</i>	465.3
<i>lilij consideratio</i>	434.1	<i>lunariæ minoris uires</i>	464.50
<i>lilij historia ex Plinio</i>	434.5	<i>Lupinus Dioscoridi</i>	265.39
<i>Lilia quomodo in totum annum uiridia seruentur</i>	434.24	<i>lupinorum consideratio</i>	266.1
<i>lilia quomodo diuersis temporibus floreat</i>	434.27	<i>lupinorum facultates</i>	266.4
<i>lilia alba quomodo purpurea fiant</i>	434.20	<i>Lupinorum fimum</i>	241.9
<i>liliorum uires ex Galeno</i>	434.40	<i>Lupus salictarius</i>	587.51
<i>Lilium conuallium non est hemerocallis</i>	454.1	<i>lupuli historia, &amp; uires ex Mesue</i>	587.53
<i>lilij conualij historia, &amp; uires</i>	454.12	<i>Lychnis coronaria Dioscoridi</i>	432.57
<i>Limonium Dioscoridi</i>	496.54	<i>lychnis sylvestris Dioscoridi</i>	432.58
<i>limonij consideratio</i>	496.59	<i>lychnidis utriusque consideratio</i>	433.1
<i>limonij uires ex Galeno</i>	497.10	<i>lychnidis facultas ex Galeno</i>	433.34
<i>Limonia poma</i>	153.61	<i>Lycium Dioscoridi</i>	127.47
<i>limoniorum pomorum aqua stilatitia quibus conferat</i>	154.9	<i>lycij consideratio</i>	128.13
<i>Linaria herba</i>	586.9	<i>lycij uires ex Galeno</i>	432.57
<i>Lingua ceruina est phyllitis</i>	437.54	<i>Lycopsis Dioscoridi</i>	501.42
<i>lingua ceruina non est hemionitis</i>	438.11	<i>lycopsis consideratio</i>	501.48
<i>Lingua serpentina</i>	323.42	<i>lycopsis uires ex Galeno</i>	501.32
<i>linguæ serpentinæ descriptio, &amp; uires</i>	ibidem	<i>Lygos Dioscoridi</i>	130.47
<i>Linozostis Dioscoridi</i>	625.60	<i>Lyncurium ex urina lyncis coalescere, uanum putatur</i>	242.14
<i>linozostis consideratio</i>	626.38	<i>Lysimachia Dioscoridi</i>	483.59
<i>Linum Dioscoridi</i>	259.13	<i>lysimachia consideratio</i>	484.37
<i>lini consideratio</i>	259.29	<i>lysimachia uires ex Galeno</i>	484.54
<i>lini uires ex Galeno</i>	259.49		
<i>lini seminis oleum, &amp; eius uires</i>	259.33		
<i>Lithargyros Dioscoridi</i>	666.19		
<i>lithargyri consideratio</i>	667.1		
<i>lithargyri uires ex Galeno</i>	667.18		
<i>Lithocolia Dioscoridi</i>	706.11		
<i>Lithospermon Dioscoridi</i>	469.51		
<i>lithospermi consideratio</i>	470.31		
<i>lithospermi historia ex Plinio</i>	470.48		
<i>Lixiuij saponis noxa, &amp; curatio</i>	745.43		
<i>Locustæ Dioscoridi</i>	213.3		
<i>locustarum consideratio</i>	213.8		
<i>locustarum ingens numerus quando Italiam inuasit</i>	213.20		
<i>locustæ in cibis</i>	213.23		
<i>Lolium Dioscoridi</i>	257.30		
<i>lolij consideratio</i>	257.40		
<i>lolij uires ex Galeno</i>	258.5		
<i>Lonchitis Dioscoridi</i>	472.3		
<i>lonchitis altera Dioscoridi</i>	472.16		
<i>lonchitis consideratio</i>	472.22		
<i>lonchitis uires ex Galeno</i>	472.36		
<i>Loniceri lapsus, uide Adami Loniceri errata</i>			
<i>Lora Dioscoridi</i>	642.27		

## M

<i>MACER Dioscoridi</i>	103.69
<i>Maceris consideratio</i>	104.1
<i>macrem non esse officinarum macim</i>	104.20
<i>maceris facultates ex Galeno</i>	104.14
<i>Macis Arabum consideratio</i>	165.34
<i>Mema Dioscoridi</i>	202.21
<i>manarum, &amp; smaridum consideratio</i>	202.47
<i>Magnes lapis Dioscoridi</i>	700.44
<i>magnetis lapidis historia</i>	700.48
<i>magnetis lapidis uires ex Galeno</i>	701.15
<i>magnetis uenefica uis, &amp; remedia</i>	744.30
<i>Magudaris Dioscoridi</i>	418.60
<i>Mala insana</i>	536.52
<i>malorum insanorum uires</i>	537.5
<i>Mala aurea Italici quæ</i>	537.9
<i>Malabathrum Dioscoridi</i>	32.9
<i>malabathri consideratio</i>	32.22
<i>malabathri uice quid supponendum</i>	32.40
<i>malabathri uires ex Auicenna</i>	32.54
<i>Malicorium Dioscoridi</i>	244.47
<i>Malua Dioscoridi</i>	244.47
<i>malua miræ magnitudinis</i>	273.24
<i>maluæ uires ex Galeno</i>	273.35



# I N D E X.

<i>Malum Dioscoridi</i>	148.43	<i>maſtices conſideratio</i>	82.27
<i>malorum conſideratio</i>	150.50	<i>maſtiche uires ex Galeno</i>	82.40
<i>malorum genera plura</i>	<i>ibidem</i>	<i>maſtichini parandi ratio, &amp; uires</i>	58.39
<i>Mala Armeniaca Dioscoridi</i>	139.32	<i>Matricariam non eſſe artemiſia genus</i>	445.46
<i>malum cotoneum Dioscoridi</i>	149.1	<i>Matrifylua</i>	493.51
<i>malum dulce Dioscoridi</i>	148.59	<i>Matthai Syluatici errata 278.7. &amp; 356.49. &amp;</i>	
<i>malum Medicum Dioscoridi</i>	150.1	<i>492.42. &amp; 497.22. 499.38</i>	
<i>malorum Medicorum conſideratio</i>	152.56	<i>Mauritanorum &amp; ſequacium error</i>	547.21
<i>malum orbiculatum, ſine Epiroticum Dioſc.</i>	148.60	<i>Mauritanorum tutela in Cerulco lapide</i>	670.41
<i>malum Perſicum Dioscoridi</i>	149.32	<i>Meconium Dioscoridi</i>	526.25
<i>malum Punicum Dioscoridi</i>	143.50	<i>meconij mentio</i>	527.12
<i>mali Punici conſideratio</i>	144.12	<i>meconij ſumpti noxa, &amp; remedia Dioscoridi</i>	736.18
<i>mali punici genera tria</i>	144.18	<i>meconij uenefica natura</i>	736.33
<i>mala Punica acria quomodo dulcia fiant</i>	144.27	<i>meconij noxa curatio</i>	736.48
<i>mala Punica quomodo diutius incorrupta ſeruentur</i>	144.35	<i>Medica herba Dioscoridi</i>	305.18
<i>Mali punici uires ex Galeno</i>	144.53	<i>medica herba conſideratio</i>	305.24
<i>Manardi Ferrarienſis errata, ac eius opiniones conſi-</i>		<i>Medica mala Dioscoridi</i>	150.1
<i>tata 25.6. &amp; 69.8. &amp; 244.6. &amp; 245.8. &amp; 264.</i>		<i>medicorum malorum conſideratio</i>	152.56
<i>33. &amp; 304.45. &amp; 329.51. &amp; 387.16. &amp; 438.</i>		<i>Medicamēta adulterabantur &amp; Galeni tempore 2.55</i>	
<i>10. &amp; 511.49. &amp; 600.48. &amp; 656.27. &amp; 675.</i>		<i>medicamenta ſimplicia uenenis aduerſantia</i>	721.10
<i>61. &amp; 737.34</i>		<i>medicamēta compoſita uenenis aduerſantia</i>	721.39
<i>Mandragoras Dioscoridi</i>	534.50	<i>Medicorum error</i>	638.33
<i>mandragora utriuſque conſideratio</i>	535.59	<i>Medium Dioscoridi</i>	497.53
<i>mandragora humanam formam referentes facilius</i>	536.1	<i>medij conſideratio</i>	497.60
<i>mandragora uires ex Galeno</i>	537.12	<i>medij uires ex Galeno</i>	498.2
<i>mandragora ſumpta ſigna, &amp; curatio Dioscoridi</i>	735.21	<i>Medulla Dioscoridi</i>	237.37
<i>mandragora noxia uis</i>	735.28	<i>medulle uires ex Galeno</i>	237.47
<i>mandragora noxa curatio</i>	735.36	<i>medulle in cibis facultas</i>	238.1
<i>Manna thuris Dioscoridi</i>	71.40	<i>Mel Dioscoridi</i>	242.55
<i>manna thuris conſideratio</i>	73.4	<i>mellis conſideratio</i>	243.35
<i>Manna cœleſtis hiſtoria, &amp; genera</i>	73.11	<i>Mel Heracloticum uenenofum</i>	243.49
<i>manna cœleſtis Mauritanis duplex</i>	73.31	<i>mellis Heraclia uenenum, &amp; eius remedia Dioscoridi</i>	
<i>manna hiſtoria ex Theophraſto, Galeno, &amp; Plinio</i>	73.43. & deinde	<i>731.35</i>	
<i>manna in comitatu Goritienſi, &amp; Foro Iulij quo tem-</i>		<i>mellis Heracliotici noxa, &amp; curatio</i>	731.39
<i>pore abundantiffima reperta ſit</i>	74.1	<i>mellis genera non roſcida</i>	243.51
<i>manna ſeſto fraxini cortice manans</i>	74.16	<i>Mel frugum</i>	569.14
<i>manna cœleſtis temperamentum, &amp; eius uires</i>	74.30	<i>Melanteria Dioscoridi</i>	681.31
<i>Marcelli Secretarij Florentini lapſus, &amp; opiniones re-</i>		<i>melanteria conſideratio</i>	581.51
<i>iecta 65.48. &amp; 117.10. &amp; 118.6. &amp; 146.51</i>		<i>Melanthium Dioscoridi</i>	417.42
<i>&amp; 152.39. &amp; 195.37. &amp; 252.36. &amp; 264.24.</i>		<i>melanthij conſideratio</i>	417.54
<i>&amp; 371.28. &amp; 404.50. &amp; 639.36</i>		<i>melanthium ſylueſtre</i>	418.11
<i>Marcor lignorum Dioscoridi</i>	105.39	<i>melanthij uires ex Galeno</i>	418.27
<i>Margaritarum hiſtoria</i>	178.54	<i>melanthinum oleum</i>	57.5
<i>margaritarum uires</i>	179.11	<i>Melchioris guidaldini Boruſſi exploſa temeritas</i>	541.40
<i>Marium, &amp; fluminum litora, quæ planta ament</i>	93.2	<i>Melia terra Dioscoridi</i>	708.32
<i>Marrubium Dioscoridi</i>	446.44	<i>melia conſideratio</i>	608.39
<i>marrubij conſideratio</i>	437.1	<i>Melice conſideratio, &amp; uſus</i>	255.58
<i>marrubij hiſtoria ex Theophraſto</i>	437.2	<i>Melilotus Dioscoridi</i>	385.59
<i>marrubij uires ex Galeno</i>	437.6	<i>meliloti conſideratio</i>	386.7
<i>Marrubium nigrum Dioscoridi</i>	435.14	<i>meliloti uulgaris uſus illegitimus</i>	386.9
<i>marrubij nigri conſideratio</i>	435.26	<i>meliloti uires ex Galeno</i>	486.14
<i>Martagon, liliij genus</i>	434.30	<i>Melimela Dioscoridi</i>	148.59
<i>Marum Dioscoridi</i>	386.27	<i>Melini conſideratio</i>	60.10
<i>mari conſideratio</i>	386.32	<i>Meliſſophyllon Dioscoridi</i>	435.49
<i>mari mentio ex Galeno</i>	386.32	<i>meliſſophylli conſideratio</i>	435.58
<i>marum Italia peregrinum</i>	386.51	<i>meliſſophylli uires ex Arabibus</i>	436.8
<i>Maſtiche Dioscoridi</i>	82.5	<i>meliſſophylli facultates ex Galeno</i>	436.26
		<i>Melites lapis Dioscoridi</i>	701.37
		<i>melitæ lapidis hiſtoria</i>	701.49
		<i>Melomeli Dioscoridi</i>	648.53
			<i>Melopeponum</i>



# I N D E X

Melopeponum consideratio	294.13. eorum uires ex Galeno	294.57	Morochthus lapis Dioscoridi	701.53
Memphites lapis Dioscoridi		704.45	morochthi lapidis consideratio, & uires ex Galeno	701.60
memphitæ lapidis consideratio		704.20	Morsus diaboli descriptio, & uires	334.42
Mentha Dioscoridi		379.45	Morus arbor Dioscoridi	167.20
menthæ consideratio		379.56	mori arboris consideratio	167.42
menthæ uires ex Galeno		380.2	mori arboris, & fructus uires ex Galeno	167.50
mentha sylvestris Galeno calamintha dicitur		380.20	Moschi odorati historia	47.3
Mentha græca		380.33	moschi odorati uires	47.29
menthæ græcæ uires		380.54	Mullus piscis Dioscoridi	196.41
Menthastrum Dioscoridi		379.53	mulli piscis consideratio	197.1
Meon Dioscoridi		21.30	mulli piscis facultas ex Galeno	197.5
mei consideratio		21.45	Mulsum Dioscoridi	643.13
mei uires ex Galeno		22.1	Mumia sepulcrorum	89.17
Mercurialis Dioscoridi		625.60	mumia consideratio	88.51
mercurialis consideratio		626.38	mumia uires	89.45
mercurialis historia, & uires ex Plinio		626.42	Muria Dioscoridi	688.43
mercurialis uires ex Galeno		626.57	Mures Dioscoridi	227.14
Mergi iccur Dioscoridi		207.14	murium consideratio	227.34
Mesuis errata	392.47. & 411.15		murium mirum	227.39
Mespilus Dioscoridi		255.48	murium montanorum consideratio	228.4
mespilorum consideratio		155.55	murium alia genera	228.39
mespilus altera		156.20	Mæus araneus Dioscoridi	226.44
mespilorum uires ex Galeno		156.28	muris aranei consideratio	227.1
Metallorum differentia plures		633.36	muris aranei morsus notæ, & remedia Diosc.	767.59
Metopium unguentum Dioscoridi		64.34	muris aranei morsus signa	768.14
Milium Dioscoridi		255.18	muris aranei morsus curatio	768.19
miliy uires ex Galeno		255.23	Muris auricula Dioscoridi	338.49
milium Indicum Plinio quid		256.10	muris auriculæ consideratio	338.56
milium Solis		470.31	Musæ arboris, & fructus consi. & historia	142.15
Millefolium Dioscoridi		569.57	Muscus Dioscoridi	46.7
millefolij consideratio		570.32	musci arborei consideratio	46.16
millefolij, seu myriophylli uires ex Galeno		570.43	musci arborei uires ex Galeno, & alijs	46.45
Millemorbia herba		555.29	Muscus marinus Dioscoridi	557.25
Millepedæ Dioscoridi		205.41	musci marini consideratio	557.30
millepedarum consideratio		205.60	musci marini uires	557.53
Minium Dioscoridi quid		673.12	Mustela Dioscoridi	199.40
Misy Dioscoridi		681.23	mustela consideratio	199.57
misyos consideratio		681.51	mustele natura, & uis	200.27
misyos historia, & uires ex Galeno		682.15	Myagron Dioscoridi	571.37
Mituli Dioscoridi		179.34	myagri consideratio	571.42
mitulorum consideratio		179.59	myagri uires ex Galeno	571.49
Moly Dioscoridi		391.8	Myles, moly Galeno	391.25
moly consideratio, & historia ex Theophrasto, & Plinio		391.13	Myrica Dioscoridi	107.48
moly, seu myles uires ex Galeno		391.25	myricæ consideratio	108.4
Molybdæna Dioscoridi		665.25	myricæ uires ex Galeno	108.21
molybdæne consideratio		665.33	Myrobalanorum Arabicorum genera	601.34
molybdæna uires ex Galeno		665.53	myrobalanorum omnium uires ex Mesue	601.61
Molybdoides Dioscoridi		662.3	Myrrha Dioscoridi	66.27
molybdoidis consideratio		662.33	myrrhæ Bæotica Dioscoridi	66.54
Momordica	449.38. & 621.53. & 622.24		myrrhæ consideratio	66.57
Monachorum, qui Mesuem commentati sunt, lapsus, atque opiniones explosæ	21.3. & 23.46. & 41.34. & 56.52. & 74.8. & 104.27. & 111.10. & 117.10. & 140.15. & 173.1. & 300.22. & 354.30. & 363.42. & 368.51. & 282.30. & 389.20. & 397.17. & 399.10. & 400.6. & 446.24. & 458.36. & 479.22. & 515.52. & 548.21. & 617.27. & 691.18		myrrhæ officinarum illegitima	66.58
Montes quæ plantæ ament		9.15.58	myrrhæ historia ex Plinio	67.32
			myrrhæ historia ex Theophrasto	67.47
			myrrhæ arboris historia	67.35.50
			myrrhæ uires ex Galeno	68.11
			myrrhæ uice quid supponendum	68.18
			myrrhæ Bæoticæ mentio	68.25
			Myrrhis Dioscoridi	570.51
			myrrhidis consideratio	570.60
			myrrhidis uires ex Galeno	571.28
			Myrteum	



<i>Myrteum oleum, &amp; eius uires</i>	57.11	<i>numularie uires</i>	ibidem
<i>myrtei olei parandi ratio</i>	57.38	<i>Nux auellana Dioscoridi</i>	166.56
<i>Myrtidanum Dioscoridi</i>	146.2	<i>nucis auellanae consideratio</i>	167.4
<i>myrtidani consideratio</i>	146.41	<i>nucis auellanae uires ex Galeno</i>	167.10
<i>Myrtus satina Diosc.</i>	145.3	<i>Nux Indica, &amp; eius historia, &amp; consideratio</i>	165.13
<i>myrti consideratio</i>	145.42	<i>nucis Indicae uires</i>	165.21
<i>myrtus exotica, &amp; Tarentina</i>	146.6	<i>nucis Indicae oleum, &amp; eius uires</i>	165.23
<i>myrti usus</i>	146.37	<i>Nux Iuglans Dioscoridi</i>	164.23
<i>myrti uires ex Galeno</i>	146.47	<i>nucum Iuglandium consideratio</i>	164.43
<i>Myrtus sylvestris Dioscoridi</i>	588.15	<i>nucum Iuglandium uires ex Galeno</i>	164.52
<i>myrti sylvestris consideratio</i>	588.30	<i>Nux metella, &amp; eius historia</i>	166.2. & deinde
<i>Myxa, &amp; myxaria quid</i>	160.2	<i>nucis metellae sumpta noxa, &amp; eius curatio</i>	736.2
<i>myxorum consideratio</i>	ibidem	<i>&amp; deinde</i>	
<b>N</b>			
<i>Naphtha Dioscoridi</i>	87.40	<i>Nux myristica, &amp; eius historia</i>	165.28
<i>Naphtha consideratio</i>	88.41	<i>nucis myristicae uires</i>	165.46
<i>Napelli consideratio, &amp; historia</i>	539.42	<i>Nux pinea Dioscoridi</i>	76.3
<i>napelli uis lethalis</i>	539.46	<i>nucleorum pineorum uires</i>	164.11
<i>napelli uenenum, eiusq; remedia</i>	738.21	<i>Nux uonica, &amp; eius historia</i>	166.2
<i>Napus Dioscoridi</i>	267.23	<i>Nymphæa Dioscoridi</i>	461.10
<i>napi consideratio</i>	267.27	<i>nymphæa altera</i>	461.23
<i>Narcaphthon Dioscoridi</i>	49.27	<i>nymphæae consideratio</i>	461.44
<i>narcaphthi consideratio</i>	49.30	<i>nymphæae uires ex Galeno</i>	462.24
<i>Narcissus Dioscoridi</i>	602.46	<b>O</b>	
<i>narcissi historia ex Theophrasto</i>	603.1	<i>Ochra Dioscoridi</i>	671.29
<i>narcissi uires ex Galeno</i>	603.13	<i>Ochrae consideratio</i>	671.34
<i>Nardum Indicum Dioscoridi</i>	24.25	<i>Ochros legumen</i>	254.30
<i>nardum Syriacum Dioscoridi</i>	ibidem	<i>Ocimastrum Dioscoridi</i>	502.53
<i>nardi Indicae consideratio</i>	24.54	<i>ocimastri consideratio</i>	502.58
<i>nardi Syriacae consideratio</i>	ibidem	<i>ocimastri uires ex Galeno</i>	503.9
<i>nardi Indicae uires ex Galeno</i>	27.3	<i>Ocimum Dioscoridi</i>	300.3
<i>nardum Celticum Dioscoridi</i>	27.14	<i>ocimi consideratio</i>	300.13
<i>nardi Celtici consideratio</i>	27.40	<i>ocimi degeneratio</i>	300.43
<i>nardi Celtici uires ex Galeno</i>	28.25	<i>ocimi uires ex Galeno</i>	300.50
<i>Nardus Italica</i>	26.21	<i>ocimi ab ocymo differentia</i>	300.56
<i>nardi Italicae uires</i>	26.54	<i>Oenanthe herba Dioscoridi</i>	451.38
<i>Nardum montanum Dioscoridi</i>	28.33	<i>œnantibes herbae consideratio</i>	451.43
<i>nardi montani consideratio</i>	28.38	<i>Oenanthe uitis sylvestris Diosc.</i>	339.10
<i>nardi montani lectio in Dioscoride deprauata</i>	28.40	<i>œnanthes uitis sylvestris consideratio</i>	339.21
<i>nardi montani uires ex Galeno</i>	28.59	<i>Oesypum Dioscoridi</i>	233.2
<i>Nardinum unguentum Dioscoridi</i>	65.22	<i>œsypi mentio</i>	233.27
<i>Nasturtium Dioscoridi</i>	312.7	<i>Officinarum lapsus, &amp; abusus</i>	3.15.27. & 7.5.
<i>nasturtij consideratio</i>	312.16	<i>&amp; 58.40. &amp; 553.1</i>	
<i>nasturtij uires ex Galeno</i>	312.20	<i>Olea sylvestris Dioscoridi</i>	132.43
<i>Natrix, &amp; eius ictus curatio Dioscoridi</i>	773.46	<i>oleae sylvestris consideratio</i>	134.1
<i>natrixis historia, morsus signa, &amp; remedia</i>	773.53	<i>oleae, &amp; quercus odium</i>	134.23
<i>Naxius lapis Dioscoridi</i>	706.49	<i>Olea Aethiopica lacryma Dioscoridi</i>	133.43
<i>naxij lapidis consideratio</i>	706.58	<i>oleae Aethiopicae lacrymae consideratio</i>	134.2
<i>Nepeta Dioscoridi</i>	381.37	<i>Olei uires Dioscoridi</i>	53.28
<i>nepete mentio</i>	381.59	<i>olei consideratio</i>	54.9
<i>Nerion Dioscoridi</i>	544.12	<i>olei usus apud ueteres qualis</i>	54.14
<i>nerij consideratio</i>	544.26	<i>olei facultates ex Galeno</i>	54.30
<i>nerij uires ex Galeno</i>	544.41	<i>olei omnis generis parandi ratio</i>	57.31
<i>nerij malefica natura</i>	733.30	<i>Oleum amygdalinum Dioscoridi</i>	554.36
<i>nerij sumpti noxae curatio</i>	733.44	<i>olei amygdalini parandi ratio</i>	55.50
<i>Nitrum Dioscoridi</i>	690.28	<i>olei amygdalini uires</i>	56.5
<i>nitri spuma Dioscoridi</i>	690.30	<i>Oleum balatinum Dioscoridi</i>	56.15
<i>nitri, &amp; eius spumae consideratio</i>	690.44	<i>olei balamini consideratio</i>	56.19
<i>nitri, &amp; aphronitri uires ex Galeno</i>	691.21	<i>olei balamini facultates</i>	56.22
<i>Numularia herba</i>	465.1	<i>Oleum caryinum Dioscoridi</i>	56.18
		<i>olei caryini, siue è nucibus Iuglandibus</i>	56.31
		<i>oleum</i>	



# I N D E X.

<i>oleum cicinum Dioscoridi</i>	55.16	<i>Ononis Dioscoridi</i>	361.29
<i>olei cicini consideratio</i>	55.28	<i>ononidis consideratio</i>	361.35
<i>oleum cnicinum Dioscoridi</i>	56.42	<i>ononidis uires ex Galeno</i>	362.3
<i>olei cnicini consideratio</i>	57.2	<i>Onosma Dioscoridi</i>	460.48
<i>oleum ex humano stercore</i>	240.40	<i>onosmatis consideratio</i>	460.56
<i>oleum Gnidium Dioscoridi</i>	56.42	<i>onosmatis uires ex Galeno</i>	461.3
<i>olei Gnidini consideratio</i>	56.66	<i>Opacis locis quæ plantæ latentur</i>	9.44
<i>Oleum hyoscyaminum Dioscoridi</i>	55.38	<i>Ophioglosson</i>	323.46
<i>olei hyoscyamini uires</i>	56.50	<i>Ophioscorodon Dioscoridi</i>	309.11
<i>olei hyoscyamini parandi ratio</i>	56.58	<i>ophioscorodi consideratio</i>	309.51
<i>Oleum laurinum Dioscoridi</i>	57.53	<i>Ophites lapis Dioscoridi</i>	705.38
<i>olei laurini consideratio, &amp; uires</i>	58.1	<i>ophite lapidis historia</i>	705.43
<i>oleum lentiscinum Dioscoridi</i>	58.9	<i>ophites marmor</i>	705.49
<i>olei lentiscini parandi ratio, &amp; uires</i>	58.14	<i>ophris descriptio, &amp; uires</i>	594.35
<i>Oleum mastichinum Dioscoridi</i>	58.34	<i>Opium Dioscoridi</i>	526.5
<i>olei mastichini parandi ratio</i>	58.49	<i>opi facultas</i>	527.2
<i>oleum melanthinum Diosc.</i>	56.45	<i>opium, quo utimur, adulterium</i>	527.10
<i>olei melanthini consideratio</i>	57.5	<i>opi uenefica natura</i>	736.33
<i>oleum melinum Diosc.</i>	148.54	<i>opi ueneni curatio</i>	736.48
<i>oleum myrteum Dioscoridi</i>	57.11	<i>Opobalsamum Dioscoridi</i>	43.21
<i>olei myrtei consideratio</i>	57.22	<i>opobalsami uis ex Galeno</i>	44.42
<i>olei myrtei parandi ratio</i>	57.38	<i>opobalsamum factitium</i>	45.3
<i>Oleum ex ouorum luteis</i>	211.40	<i>Opocalpasum Galeni quid</i>	734.16
<i>oleum ex lini semine, &amp; eius uires</i>	259.33	<i>opocarpasi consideratio</i>	734.7
<i>Oleum ananthinum Dioscoridi</i>	60.15	<i>Opuntia Plinij</i>	365.58
<i>oleum oliuæ sylvestris Dioscoridi</i>	53.41	<i>Oreoselinum Dioscoridi</i>	403.45
<i>olei oliuæ sylvestris facultas ex Galeno</i>	54.46	<i>oreoselini consideratio</i>	404.33
<i>oleum omphacinum Dioscoridi</i>	53.27	<i>oreoselini uires ex Galeno</i>	405.5
<i>oleum omphacini quomodo arte parari possit</i>	543.7	<i>Origanum Heracleoticum Diosc.</i>	373.51
<i>oleum picinum Dioscoridi</i>	86.16	<i>origanum onitis Diosc.</i>	373.25
<i>Oleum raphaninum Dioscoridi</i>	56.43	<i>origanum sylvestre Diosc.</i>	373.26
<i>olei raphanini consideratio</i>	57.4	<i>origani historia uaria</i>	374.45
<i>Oleum sesaminum Dioscoridi</i>	56.16	<i>origani Heracleotici, &amp; onitidis consideratio</i>	375.4
<i>olei sesamini consideratio, &amp; uires</i>	56.29	<i>origani sylvestris consideratio</i>	375.1
<i>oleum sicyonium Dioscoridi</i>	53.55	<i>origani uires ex Galeno</i>	375.9
<i>oleum sinapinum Dioscoridi</i>	56.46	<i>Ornithogalum Diosc.</i>	302.26
<i>olei sinapini consideratio</i>	57.6	<i>ornithogali consideratio</i>	303.1
<i>oleum styracinum Dioscoridi</i>	68.58	<i>Orobanche Dioscoridi</i>	301.23
<i>oleum susinum Dioscoridi</i>	61.41	<i>orobanches consideratio</i>	301.33
<i>olei susini mentio</i>	62.10	<i>orobanches facultas ex Galeno</i>	301.55
<i>Oleum terebinthinum Dioscoridi</i>	58.11	<i>Oryza Dioscoridi</i>	253.59
<i>olei terebinthini consideratio, &amp; uires</i>	58.23	<i>oryzæ consideratio</i>	254.1
<i>olei nostri de scorpionibus descriptio, &amp; eius uires</i>	723.60	<i>oryzæ facultas ex Galeno</i>	254.5
<i>Oliuarum genera plura</i>	134.11	<i>Ossifragus Dioscoridi</i>	213.37
<i>oliuarum uires ex Galeno</i>	134.43	<i>ossifragi consideratio</i>	213.40
<i>Olera quo pacto ab erucarum iniuria uindicetur</i>	219.46	<i>Ostracites lapis Diosc.</i>	706.16
<i>Oloschænos Dioscoridi</i>	517.59	<i>ostracite lapidis consideratio, &amp; uires</i>	706.21
<i>Olusatrum Dioscoridi</i>	403.59	<i>Osyris Dioscoridi</i>	586.4
<i>Olyra Dioscoridi</i>	252.31	<i>osyridis consideratio</i>	586.9
<i>olyræ consideratio</i>	252.34	<i>osyridis uires ex Galeno</i>	586.35
<i>Omphacium Dioscoridi</i>	639.52	<i>Othonna Dioscoridi</i>	338.30
<i>omphacii consideratio</i>	640.1	<i>othonna consideratio</i>	338.41
<i>omphacii uires ex Galeno</i>	640.8	<i>Ouorum natura Diosc.</i>	210.27
<i>Omphacomeli Dioscoridi</i>	649.4	<i>oui candidum Diosc.</i>	210.30
<i>Onagra Dioscoridi</i>	571.55	<i>ouorum consideratio</i>	210.51
<i>onagræ consideratio</i>	571.60	<i>ouorum partes, &amp; coctura uaria</i>	211.22
<i>onagræ uires ex Galeno</i>	572.13	<i>ouorum uires ex Galeno</i>	211.35
<i>Onobrychis Dioscoridi</i>	477.20	<i>ouorum lutei oleum</i>	211.40
<i>onobrychis consideratio</i>	477.24	<i>oua testudinum</i>	211.53
<i>onobrychis uires ex Galeno</i>	477.29	<i>Oxalis Dioscoridi</i>	269.61
		<i>oxalidis consideratio</i>	271.20
		<i>Oxalma</i>	



# I N D E X

<i>Oxalma</i> Dioscoridi	647.4
<i>Oxycedri</i> consideratio	95.38
<i>Oxylapathum</i> Dioscoridi	269.61
<i>oxylapathi</i> consideratio	271.14
<i>Oxymel</i> Dioscoridi	646.35
<i>oxymelitis</i> confectio triplex Galeno	646.42
<i>oxymelitis</i> confectio ex Mesue.	646.51
<i>Oxys</i> Plinio	440.9

## P

<i>Pæderota</i> , <i>acanthus</i> Dioscoridi	360.24
<i>Pæonia</i> Dioscoridi descripta	468.54
<i>pæonia</i> consideratio	469.18
<i>pæonia</i> uires ex Galeno	469.44
<i>Paliurus</i> Dioscoridi	112.10
<i>paliuri</i> consideratio	112.16
<i>paliurus</i> diuersi generis apud anthores	ibidem
<i>paliuri</i> uires ex Galeno	113.21
<i>Palma</i> Dioscoridi	141.11
<i>palma</i> consideratio	141.53
<i>palmarum</i> uires ex Galeno	143.15
<i>palmarum</i> facultas ex Galeno	143.25
<i>Palma elata</i> Dioscoridi	141.42
<i>palma elate</i> quæ pars in palma	143.1
<i>palma elate</i> Galeno duplex	143.5
<i>palma</i> Indica uinum fundentes	142.39
<i>palma</i> Thebaice	141.22
<i>Palma Christi</i> consideratio	458.5
<i>palma Christi</i> genera duo	458.8
<i>palma Christi</i> uires	458.17
<i>Panaces</i> <i>Asclepij</i> Dioscoridi	392.18
<i>panaces</i> <i>Chironium</i> Dioscoridi	392.32
<i>panaces</i> <i>Heracleum</i> Dioscoridi	391.45
<i>panacis</i> omnis generis consideratio	392.38
<i>panacis</i> cuiusque uires ex Galeno	392.58
<i>panacis</i> lacryma facultas ex Mesue	393.8
<i>Pancration</i> Dioscoridi	327.28
<i>pancrati</i> consideratio	327.35
<i>Panicum</i> Dioscoridi	255.50
<i>panici</i> uires ex Galeno	255.53
<i>Panis optimi</i> conficiendi ratio	149.45
<i>panis hordeaceus</i>	250.57
<i>panis</i> filigineus omnium syncerissimus	252.49
<i>Pannum</i> in larice nascens	80.34
<i>Papauer corniculatum</i> Dioscoridi	527.52
<i>papaueris</i> corniculati consideratio	528.12
<i>papaueris</i> corniculati uires ex Galeno	527.40
<i>papaueris</i> corniculati noxa, & auxilia Dioscoridi	736.30
<i>Papauer erraticum</i> Dioscoridi	525.43
<i>papaueris</i> erratici consideratio	526.31
<i>papauer satium</i> Dioscoridi	525.54
<i>papaueris</i> satiui consideratio	526.41
<i>papaueris</i> lacryma facultas	527.1
<i>papauerum</i> uires ex Galeno	527.12
<i>Papauer spumum</i> Dioscoridi	528.3
<i>papaueris</i> spumei consideratio	528.29
<i>Papyrus</i> Dioscoridi	106.58
<i>papyri</i> consideratio	107.4
<i>papyri</i> conficiendi ratio	107.15
<i>papyri</i> nouum genus	107.20

<i>papyri</i> uires ex Galeno	107.30
<i>Paralios</i> tithymalus Dioscoridi	606.31
<i>Parietaria</i> herba	549.1
<i>Paronychia</i> Diosc.	519.34
<i>paronychia</i> consideratio	519.39
<i>paronychia</i> uires ex Gal.	519.45
<i>Parthenium</i> Diosc.	466.55
<i>parthenij</i> consideratio	467.1
<i>Pastium</i> Dioscoridi	640.28
<i>Pastinaca</i> herba Diosc.	393.59
<i>pastinaca</i> herbae consid.	394.40
<i>pastinaca</i> uires ex Gal.	395.3
<i>Pastinaca marina</i> Diosc.	195.6
<i>pastinaca</i> piscis consid.	195.28
<i>pastinaca</i> piscis, & eius radij uires	195.42
<i>pastinaca marina</i> ictus nota, & eius curatio Diosc.	767.22
<i>pastinaca marina</i> ictus signa	767.31
<i>pastinaca marina</i> ictus remedia	767.40
<i>Pauli Iouii</i> errata, ac eius opiniones refutate	174.55
& 179.60. & 201.39	
<i>Pecten Veneris</i>	298.5
<i>Pedicularis</i> herba Diosc.	596.59
<i>Pelecinon</i> Diosc.	460.19
<i>pelecini</i> consideratio	460.27
<i>Peplus</i> Dioscoridi	609.58
<i>peplos</i> Dioscoridi	709.44
<i>pepli</i> , & <i>peplidis</i> consid.	610.4
<i>pepli</i> , & <i>peplidis</i> uires ex Gal.	610.7
<i>Pepo</i> Dioscoridi	292.57
<i>peponum</i> , & <i>melopeponum</i> consid.	293.13
<i>peponum</i> uires ex Gal.	293.49
<i>Periclymenon</i> Diosc.	493.32
<i>periclymeni</i> consid.	493.50
<i>periclymeni</i> uires ex Gal.	494.14
<i>Peristereon</i> , uerbenaca Diosc.	523.19
<i>Persea</i> arbor Diosc.	171.13
<i>persee</i> arboris consid.	171.20
<i>persee</i> arboris mentio, & uires ex Gal.	171.42
<i>Persica</i> mala Diosc.	149.52
<i>persicorum</i> malorum consid.	151.49
<i>Personata</i> Diosc.	563.57
<i>personata</i> consid.	564.1
<i>personata</i> uires ex Gal.	564.29
<i>personata</i> , Plinio <i>persolata</i>	564.14
<i>Petasites</i> Diosc.	564.44
<i>petasitis</i> consid.	564.49
<i>petasitis</i> uires ex Gal.	564.56
<i>Petri Bellonii</i> errata	76.20. & 78.29. & 81.20
& 89.36. & 93.22. & 95.51. & 116.32	
<i>Petri Criniti</i> errata	74.26. & 140.29
<i>Petroselinum</i> Diosc.	403.53
<i>Petroselini</i> consid.	404.44
<i>petroselini</i> uires ex Gal.	405.5
<i>Pettimborja</i>	347.14
<i>Peucedanum</i> Diosc.	416.4
<i>peucedani</i> consideratio	416.37
<i>peucedanum</i> officinarum supposititium	416.52
<i>peucedani</i> uires ex Gal.	416.57
<i>Phalangium</i> herba Dioscoridi	438.31
<i>phalangii</i> herbae consideratio	438.38
<i>phalangii</i>	



# I N D E X

phalangii herbae vires ex Galeno	438.48
Phalangiorum animalium consideratio, & genera	
222.40.48.223.2	
phalangiorum morsus notæ, & curatio Diosc.	764.16
phalangiorum genera ex Aëtio	223.2. & 764.30
phalangiorum genera, & morsus notæ ex Nicandro	
764.44	
phalangiorum morsus signa, & curatio	765.10
Phalaris Dioscoridi	469.58
phalaridis consideratio	470.35
phalaridis vires ex Galeno	470.57
Pharicon, & eius ueneni notæ, & curatio Dioscoridi	
737.4	
pharici ueneni consideratio	737.10
Phasioli Dioscoridi	263.53
phasiolorum consideratio	263.56
Phellodrys arbor quæ	137.8
Phillyrea Dioscoridi	118.25
phillyræ consideratio	119.1
Phoenix Dioscoridi	513.33
phenicis consideratio	513.12
Phrygius lapis Dioscoridi	696.36
Phrygi lapidis consideratio	696.34
phrygi lapidis vires ex Galeno	696.36
Phu Dioscoridi representatum	30.51
phu confid.	30.60 & vires ex Galeno
Phycus marinus Dioscoridi	558.3
Phyllitis Dioscoridi	437.46
phyllitidis consideratio	437.54
phyllitidis vires ex Galeno	438.22
Phyllon Dioscoridi	455.47
phylli consideratio	455.54
phylli mentio ex Theophrasto	456.8
Phyteuma Dioscoridi	579.10
phyteumatis consideratio	579.14
Picea arbor Dioscoridi	75.50
piceæ consideratio, & historia	80.40
Picinum oleum Dioscoridi	86.14
pice liquidæ fuligo Dioscoridi	86.22
Picis fuliginis consideratio	86.44
Pilosella descriptio, & vires	491.51
Pimpinella genera, & vires	516.43
Pinea nuces Dioscoridi	76.3
pinei nuclei	164.11
Pinorum eruce Dioscoridi	220.12
pinorum erucarum historia	220.40
pinorum erucarum haustarum notæ, & remedia Dioscoridi	727.29
pinorum erucarum uenenum, & curatio	727.45
Pinus Dioscoridi	75.50
pini historia, & genera	76.10
Piper Dioscoridi	314.55
piperis consideratio	315.17
piperis planta in Italia	315.41
piperis plantæ uariæ	315.46
piperis vires ex Galeno	315.47
piper Indicum	23.57
Piscinum ius Diosc.	204.59
Pisaspaltos Dioscoridi	87.36
pissaspalti consideratio	88.27
Pisselaon Dioscoridi	86.16

Pistacia Dioscoridi	163.22
pistaciorum consideratio	163.55
pistaciorum vires ex Galeno	163.59
Pistacia sylvestria quid	164.7
Pistolochia	348.54
Pityusa Dioscoridi	608.12
pityusæ consideratio	608.24
pityusæ vires ex Galeno	608.55
Pix liquida Dioscoridi	86.3
pix sicca Dioscoridi	86.33
pice conficiendæ ratio	86.49
pice facultates ex Galeno	86.60
Plantago Dioscoridi	280.44
plantaginis consideratio, & genera	281.35
plantaginis vires ex Galeno	281.40
Plantæ quæ colligi postulant, dum florent	6.57
plantarum degeneratio	8.55
plantas meliorescere cæli clementia, & loci amicitia	
9.16	
plantarum situs naturales	9.15
plantarum in radicibus uarietas	10.3
plantæ pro locorum ac climatum differentia, facultates uariant	354.54
Platanus Dioscoridi	98.12
platani confid.	98.20. eius vires ex Galeno
Platearij in caphura error	83.9
Plinij lapsus, & sententiæ non probatæ	18.6. & 25.
53. & 63.38. & 63.18. & 78.53. & 79.11. & 79.26. & 79.57. & 99.20. & 100.57. & 105.11. & 119.30. & 120.55. & 121.51. & 143.8. & 152.37. & 179.14. & 191.27. & 191.52. & 213.50. & 216.23. & 218.54. & 282.18. & 315.25. & 348.15. & 350.43. & 351.61. & 374.50. & 378.58. & 437.33. & 442.44. & 444.28. & 445.39. & 451.27. & 460.3. & 460.31. & 479.8. & 502.15. & 528.33. & 578.57. & 581.41. & 582.50. & 586.30. & 617.24. & 619.19. & 631.20. & 658.55. & 672.32. & 673.2. & 696.3. & 699.58. & 704.25	
Plinius à Brasauoli impugnatione uindicatur	29.41
Plinius à Dioscoride in Gladiolo dissentit	499.8
Plinius à Dioscoride in malabathro dissentit	32.32
Plinius in colligendo balsamo à Theophrasto, et Dioscoride discordat	44.27
Plinius in personata defenditur	564.20
Plumbago Dioscoridi	665.25
plumbaginis consideratio	665.33
Plumbum elotum Dioscoridi	661.52
plumbum ustum Dioscoridi	662.7
plumbi recrementum Dioscoridi	662.21
plumbi scorie consideratio	662.33
plumbi facultates ex Galeno	662.55
plumbi scobis noxa, et curatio	744.13
Pnigitis terra Dioscoridi	707.17
Polemonia Dioscoridi	488.37
polemonia consideratio	488.45 eius vires ex Galeno
488.55	
Polentæ consideratio	250.59
Polion Dioscoridi	441.57
polij consideratio	442.34
polij	



# INDEX

Ranz



# I N D E X

<i>Rana</i> Dioscoridi	200.40	<i>ricini uires ex Galeno</i>	604.22
<i>ranarum consideratio</i>	201.1	<i>ricini sumpti noxa, &amp; curatio</i>	748.56
<i>ranarum partus</i>	201.8	<i>Ricini olei consideratio</i>	55.27
<i>ranæ palustris sumptæ noxa, &amp; remedia</i> Dioscoridi		<i>ricini olei uires ex Mesue</i>	55.31
746.36		<i>Risagalli uenenum, &amp; curatio</i>	745.56
<i>ranæ palustris uenenum</i>	746.58	<i>Rosa</i> Dioscoridi	125.22
<i>ranæ maleficæ signa, &amp; curatio</i>	747.10	<i>rosarum consideratio</i>	125.57
<i>Ranunculus</i> Dioscoridi	331.4	<i>rosarum genera plura</i>	ibidem
<i>ranunculi consideratio</i>	331.22	<i>rosarum succus, &amp; dilutum</i>	126.8
<i>ranunculi uires ex Galeno</i>	331.44	<i>rosarum dilutum absq; noxa aluum deijcere</i>	126.11
<i>Raphanus</i> Dioscoridi	167.40	<i>rosæ syluestres</i>	126.26
<i>raphanus syluestris</i> Dioscoridi	167.55	<i>rosæ aureo colore</i>	126.30
<i>raphani Theophrasto plura genera</i>	268.39	<i>rosarum differentia, &amp; genera ex Plinio</i>	126.31
<i>raphani consid.</i> 267.59. & <i>uires ex Galeno</i>	268.44	<i>rosarum partes, &amp; earum uires</i>	126.45
<i>Raphanimum oleum</i>	56.43	<i>rosarum aqua stillatitia quæ præstantior</i>	127.2
<i>Rapum</i> Dioscoridi	266.37	<i>rosarum facultates ex Galeno</i>	127.38
<i>rapi consideratio</i>	266.48	<i>Rosaceum</i> Dioscoridi	58.54
<i>rapi uires ex Galeno</i>	267.5	<i>rosacei consideratio</i>	59.38
<i>Ratio commentariorum in librum sextum</i>	712.50	<i>rosaceum num conueniat in noxa mädragoræ</i>	735.43
<i>Recocta quid, &amp; uires</i>	231.45	<i>Rosaceum omphacinum</i>	59.42
<i>Recrementum argenti</i> Dioscoridi	666.3	<i>rosacei omphacini uires</i>	59.46
<i>Remedia ad uaria medicamentorum noxiorum sympto</i>		<i>Rosei pastilli</i> Dioscoridi	125.45
<i>mata</i>	749.12	<i>Rosmarinum</i> Dioscoridi	412.59
<i>Remedia ad conuulsiones</i>	749.45	<i>rosmarinum coronarium</i> Dioscoridi	413.55
<i>Res quæ uenena produunt, iisque suspensæ aduersantur</i>		<i>rosmarini consideratio</i>	414.1
718.45		<i>rosmarini historia ex Theophrasto</i>	414.9
<i>Resina lentiscina</i> Dioscoridi	82.5	<i>rosmarini uires ex Galeno</i>	414.20
<i>resina liquida è pinu, &amp; picea</i> Dioscoridi	84.6	<i>Rubeta, &amp; eius noxæ remedia</i> Dioscoridi	746.36
<i>resina aliæ</i> Dioscoridi	ibidem	<i>rubeta ueneni signa</i> 746.58. <i>eius curatio</i>	747.10
<i>resina terebinthina</i> Dioscoridi	83.54	<i>Rubia</i> Dioscoridi	471.35
<i>resina terebinthinæ consideratio</i>	84.49	<i>rubia consid.</i> 477.48 & <i>uires ex Galeno</i>	471.53
<i>resinarum omnium consideratio</i>	84.56	<i>Rubigo ferri</i> Dioscoridi	661.23
<i>resinarum omnium uires ex Galeno</i>	85.26	<i>rubiginis ferri consideratio.</i>	661.34
<i>Resta bouis</i>	361.41	<i>Rubrica fabrilis</i> Dioscoridi	676.7
<i>Rha</i> Dioscoridi	342.41	<i>rubrica fabrilis consideratio</i>	676.12
<i>Rhabbarum Italicum</i>	345.60	<i>Rubrica Sinopica</i> Dioscoridi	675.42
<i>Rhamnus</i> Dioscoridi	110.36	<i>rubricæ Sinopicæ consideratio</i>	675.49
<i>rhamni consideratio</i>	110.49	<i>Rubus</i> Dioscoridi	507.23
<i>rhamni uires ex Galeno</i>	111.13	<i>rubi consideratio</i>	507.49
<i>Rhaponticum</i> Dioscoridi	342.41	<i>rubi uires ex Galeno</i>	508.1
<i>rhapontici consideratio</i>	342.55	<i>Rubus canis</i> Dioscoridi	116.46
<i>rhapontici, &amp; rhabarbari discrimen</i>	343.30	<i>rubi canis consideratio</i>	116.53
<i>rhapontici uires ex Galeno</i>	344.10	<i>rubi canis uires ex Galeno</i>	117.25
<i>Rheon</i> Dioscoridi	342.41	<i>Rubus Idæus</i> Dioscoridi	507.40
<i>rhei Barbarici nomenclatura unde</i>	344.46	<i>rubi Idæi consideratio</i>	507.56
<i>rhei Barbarici, seu rhabarbari uires ex Mesue</i>	345.27	<i>Ruellij errata, ac eius opiniones reprobata</i> 23. 55. &	
<i>rhei Indici nominatio</i>	344.31	25. 57. & 31. 42. & 45. 41. & 57. 22. & 79. 26	
<i>rhei Turcici nomenclatio</i>	344.14	et 82. 22. et 101. 5. et 110. 60. et 157. 32. et 173	
<i>Rhodia radix</i> Dioscoridi	513.49	12. et 255. 55. et 278. 4. et 314. 41. et 318. 28.	
<i>rhodiæ radices consideratio</i>	513.53	& 320. 55. et 329. 51. & 333. 9. & 343. 55. &	
<i>rhodiæ radices uires ex Galeno</i>	513.12	358. 32. et 362. 32. et 382. 20. et 394. 46. et 399	
<i>Rhododendron</i> Dioscoridi	544.12	56. et 404. 29. et 406. 30. et 407. 41. et 410. 36.	
<i>rhododendri consid. uide Nerij consideratio</i>		et 427. 42. et 428. 26. & 429. 10. et 438. 10. &	
<i>Rhus</i> Dioscoridi	139.35	446. 12. et 449. 3. & 459. 53. et 484. 40. et 484	
<i>rhois consideratio</i>	139.59	50. et 495. 15. et 506. 11. et 562. 13. & 564. 49	
<i>rhois uires ex Galeno</i>	140.58	& 579. 2. & 580. 53. & 585. 29. & 627. 11	
<i>Ribes Mauritanis quid</i>	116.4	<i>Rumex</i> Dioscoridi	269.56
<i>ribis officinarum consideratio</i>	116.6	<i>rumicis consideratio</i>	271.12
<i>Ricinus</i> Dioscoridi	603.51	<i>rumicis facultas ex Galeno</i>	271.26
<i>ricini consideratio</i>	604.1	<i>Ruscum</i> Dioscoridi	588.15
<i>ricini uires ex Mesue</i>	604.15	<i>rusei consideratio</i>	588.30



# I N D E X.

Ruta Dioscoridi	338.33	Sambuci utriusque facultates ex Galeno	614.11
ruta montana Dioscoridi	389.4	Samia terra Dioscoridi	707.13
ruta sylvestris Dioscoridi	389.11	samie terre consideratio	707.37
rutæ sativæ, & sylvestris consideratio	389.15	Samius lapis Dioscoridi	707.33
rutæ utriusque vires ex Galeno	389.40	sami lapidis consideratio	707.50
Ruta sylvestris altera Dioscoridi	389.53	Sampsuchum Dioscoridi	385.20
rutæ sylvestris alterius consideratio	390.1	sampsuchi cōsid. 385.36. eius vires ex Gal.	385.49
rutæ sylvestris alterius vires ex Galeno	390.52	Sampsuchinum Dioscoridi	60.40
Ruta capraria, & eius vires	390.58	sampsuchini consideratio	60.50
S			
SABINA Dioscoridi descripta	92.29	Sandaracha Dioscoridi	683.39
Sabinæ consideratio	92.40	sandarachæ consideratio	683.47
Sabinæ vires ex Galeno	93.40	sandarachæ vires ex Galeno	684.10
Saccharum Dioscoridi	243.13	Sādarachæ potæ noxa, et eius remedia Diosc.	745.29
sacchari consideratio	243.59	sandarachæ malefica vis, & curatio	745.35
saccharum antiquorū à nostrate non differre	244.17	Sandaracha gummi	91.57. & 682.55
sacchari factitij inuentio	244.39	sandaracha ceraginosi mellis genus	92.15. & 684.4
saccharum candidum	245.61	sandarax Arabum quid	92.1. & 683.57
Sacra herba Dioscoridi	523.19	Sandyx Dioscoridi	657.50
Sagapenon Dioscoridi	421.4	sandycis consideratio	667.55
sagapeni consideratio	421.14	sandycis facultas ex Galeno	668.2
sagapeni vires ex Mesue	421.19	Sanguinaria mas Dioscoridi	485.35
sagapeni facultates ex Galeno	421.33	sanguinaria femina Dioscoridi	485.43
Sal Dioscoridi descriptus	688.9	sanguinaria cōsid. & vires, vide in Polygono	
salis omnis generis consideratio	688.58	Sanguis Dioscoridi	138.53
salis facultates ex Galeno	689.61	sanguinis consideratio	239.9
Sal Ammoniacus Dioscoridi	688.10	sanguinis quorundam animalium vires peculiares à Galeno improbatæ	239.12
salis Ammoniaci consideratio	689.24	Sanguis taurinus, eiusq; epoti notæ, & curatio Dioscoridi	731.14
sal Armeniacus officinis	689.28	sanguinis tauri uenenata potio	731.24
Sal Indus quid Paulo, & Auicenna	245.48	sanguinis menstrui uenenum, et eius remedia	741.41
salis Indi consideratio	689.33	Sanicula, genera, & vires	490.47
Salis flos Dioscoridi	688.48	sanicula, quinquemfolij species	512.7
salis floris consideratio	689.44	Santalorum consideratio, & genera	45.54
Salis spuma Dioscoridi	688.38	santalorum vires	45.56
salis spumæ consideratio	689.41	Sapa Dioscoridi	640.29
Salnitri usus	689.39. & 690.5	Sapphirus lapis Dioscoridi	703.40
Salamandra Dioscoridi descripta	221.21	sapphiri consideratio	703.43
salamandræ consideratio	221.42	sapphirus nostri usus suspectus	703.46
salamandram igni non absumi, falsum	221.56	Sarcocolla Dioscoridi	423.45
salamandra aquatica	222.8	sarcocollæ consideratio	423.48
salamandræ haustæ signa, & remedia Diosc.	727.55	sarcocollæ vires ex Arabibus	423.58
salamandræ uenefica natura	728.1	sarcocollæ facultates ex Galeno	424.7
salamandræ ueneni curatio	728.17	Sardianæ glandes Dioscoridi	137.33
Salina humana, & eius facultates	242.34	Sardonie herbæ noxa, & remedia Dioscoridi	734.26
Salinaris herba, Pyrethrum Dioscoridi	412.20	sardonie herbæ uenenum, eiusq; curatio	734.33
Salimca, & eius consideratio	28.15	Sarmentitius cinis Dioscoridi	692.54
Salix Dioscoridi	172.53	Satureia Dioscoridi	383.58
salicis cōsid. 132.1. eius vires ex Galeno	132.21	satureiæ consideratio	384.1
Salsa parilla quid, & vires	125.14	satureiæ vires ex Paulo	384.21
Salvia Dioscoridi	378.34	Satyrion Dioscoridi	457.44
salviæ consideratio	378.43	Satyrion erithronium Dioscoridi	457.58
salviæ vires ex Galeno	378.59	Satyrj cōsid. 457.57. eius vires ex Galeno	459.2
salviæ sylvestris consideratio	378.44	Saxifraga Dioscoridi	495.42
salviæ Theophrasto duæ species	378.51	saxifragæ consideratio, & vires	495.49
salviæ vires ex Aetio	378.61	saxifragæ nomen pluribus plantis commune	496.6
Salvia Romana	380.34	saxifraga alba	496.10
salviæ Romanæ vires	380.54	Saxosis locis quæ plantæ gaudeant	9.41
Sambucus Dioscoridi	613.38	Scabiosæ consideratio	492.45
sambuci, & ebuli genera	613.55	scabiosæ vires	492.60
sambuci, & ebuli vires	614.1	Scammonia Dioscoridi	610.37
		scammonie	



# I N D E X

scammonia, & eius succi confid.	610.59	scrophularia 555.29. eius uires	556.10
scammonium officinarum uitiatum	611.14	Secale frumenti genus	252.36
scammonij laciones ex Mesue	611.20	Secacul Arabum	364.59
scammonij uires ex eodem	611.39	Securidaca Dioscoridi	460.19
scammonij noxa, & eius curatio	748.55	securidaca confid.	460.27
Scandix Dioscoridi	297.27	securidaca uires ex Galeno	460.37
Scandicis confid. 297.31. eius uires ex Gal.	297.57	Sedum Dioscoridi	550.50
Scariola quæ species intybi	288.53	fedi consideratio, & genera	551.34
Schistum lac Dioscoridi	229.13	fedi uires ex Galeno	551.60
Schistos lapis Dioscoridi	699.3	Selago quid	92.47
Schisti lapidis consideratio	699.19	Selenites lapis Dioscoridi	704.12
Schisti lapidis uires ex Galeno	699.11	selenita lapidis consideratio	704.18
Scilla Dioscoridi	329.57	Selinusia terra Dioscoridi	708.4
scille confid. 327.35. eius uires ex Gal.	327.54	Semperuiuum maius Dioscoridi	550.50
scilla præparatio	327.48	semperuiuum minus Dioscoridi	551.4
scille uenenoſa noxa, & curatio	730.51	semperuiui tertium genus Dioscoridi	551.12
Scillinum acetum Dioscoridi	647.23	semperuiui consideratio, & genera	551.33
scillini aceti uires admirabiles ex Galeno	647.39	Semen sanctum	368.34
Scincus Dioscoridi	224.48	Semina quomodo demetenda	7.26
scinci consideratio	224.54	seminum, & fructuum in plantis discrimina	14.25
scinci Vicentini	224.59	Sena herba, & eius historia	410.19
scinci mentio, & uires ex Plinio	225.32	senæ, & eius diluti uires	411.53
Scolopendra Dioscoridi	189.46	senæ diluti præparatio	411.61
scolopendræ marinæ consideratio	189.49	senæ uinum	411.5
scolopendræ iſtus notæ, & curatio Diosc.	765.45	senæ folliculorum uires	412.13
scolopendræ uenenoſa consideratio	765.52	Senecta anguium Dioscoridi	193.22
scolopendræ morsus remedia	766.1	senecta anguium consideratio	193.37
Scolopendrium Diosc.	463.17	Senecio Dioscoridi	556.49
scolopendrij consideratio	463.31	senecionis 557.1 eius uires ex Gal.	557.5
Scolymos Dioscoridi	358.55	Sepia Dioscoridi	195.52
Scordion Dioscoridi	442.57	ſepiarum consideratio	195.58
ſcordij consideratio	443.10	ſapiarum facultates	196.22
ſcordium ubi optimum	443.33	Seplasiariorum lapsus 27.61. & 50.49. & 55.57. & 58.40. & 280.21. & 390.14	
ſcordij uires ex Galeno	443.41	Seps Dioscoridi	224.3
Scoria ferri Dioscoridi	661.31	ſepis feræ consideratio	224.29. & 770.17
ſcoriæ ferri consideratio 661.34. eius uires ex Galeno	661.40	ſepis morsus signa, & remedia	770.32
Scoria plumbi Dioscoridi	662.21	Serapionis errata 22.56. et 31.57. et 39.7 et 74.28 & 156.25. & 507.8. & 547.35. & 573.5	
ſcoriæ plumbi consideratio	662.33	Serica Galeno quid	160.38. & 161.13
ſcoriæ omnis uires ex Galeno	661.40	ſerici consideratio, & uires	168.2
Scorodoprasum Dioscoridi	310.13	Seris consideratio	287.28
ſcorodopraſi consideratio	320.19	ſeridis consideratio	288.40
Scorpena piſcis consideratio	188.28	Serpens marina Aristoteli quid	189.24
Scorpioides Dioscoridi	636.4	Serpillum Dioscoridi	384.32
ſcorpioidis coſid. 629.8. eius uires ex Gal.	629.20	ſerpylli consideratio	384.52
Scorpiurus herba Dioscoridi	416.47	ſerpylli uires ex Galeno	385.23
Scorpius marinus Dioscoridi	188.9	ſertula Campana Dioscoridi	385.59
Scorpius marinus consideratio	188.28	ſertula Campanæ conſi. uide Meliloti conſid.	
ſcorpionis marini iſtus notæ, et curatio Diosc.	767.26	Seruij Grammatici error	110.12
Scorpius terreſtris Dioscoridi	187.3	Serum lactis Dioscoridi	229.10
ſcorpionis terreſtris consideratio	187.23	ſeri uires ex Galeno	231.50
ſcorpionum genera	187.23	ſeri uires ex Meſue	231.55
ſcorpiones aligeri	187.44	Sesamum Dioscoridi	256.20
ſcorpionum facultates	187.54	ſeſami consideratio	257.1
ſcorpionū oleū miræ facultatis 187.56. et 723.54		ſeſami uires ex Galeno	257.16
ſcorpiones aliquibus admotis ſtupidi reddūtur	15.61	ſeſamoides magnum Dioscoridi	594.55
ſcorpiones quibus admotis reuiuſcant	16.2	ſeſamoides paruum	595.4
ſcorpionis iſtum prohibentia	16.4	ſeſamoidis utriuſque consideratio	595.9
ſcorpionis iſtus notæ, & curatio Diosc.	766.11	ſeſeli Aetiopticum Dioscoridi	395.49
ſcorpionum genera ex Nicandro	766.30	ſeſeli Creticum Dioscoridi	395.58
ſcorpionum iſtum indicia, & remedia	766.50		



# I N D E X

<i>Jeseli Massiliense Dioscoridi</i>	395.43	<i>solani manici noxa, &amp; curatio</i>	730.16
<i>Jeseli Peloponnesense Dioscoridi</i>	395.52	<i>Solbastrella, &amp; eius uires</i>	516.56
<i>Jeselis omnis consideratio</i>	396.1	<i>Soldanella quæ</i>	277.60
<i>Jeselis uires ex Galeno</i>	396.20	<i>Solidaginis minoris, &amp; mediæ uires</i>	490.37
<i>Sicyonium oleum Dioscoridi</i>	553.55	<i>Solidago regalis</i>	490.54
<i>Sideritis prima Dioscoridi</i>	505.36	<i>Sonchus Dioscoridi</i>	287.4
<i>Sideritis secunda Dioscoridi</i>	505.49	<i>sonchi confid. 287.22. eius uires ex Galeno</i>	287.17
<i>Sideritis tertia Dioscoridi</i>	505.58	<i>Sorba Dioscoridi</i>	158.33
<i>Sideritis omnis consideratio</i>	506.1	<i>sorborum confid.</i>	158.30
<i>Sideritis uires ex Galeno</i>	506.25	<i>sorborum uires ex Galeno</i>	158.51
<i>Signa in commune ueneni sumpti</i>	719.50	<i>Sory Dioscoridi</i>	681.38
<i>Siliquæ Dioscoridi</i>	148.3	<i>soreos consideratio</i>	681.51
<i>Siliquarum cõsid. 148.8. &amp; uires ex Gal.</i>	148.30	<i>soreos historia, &amp; uires ex Galeno</i>	682.15
<i>Silurus Dioscoridi</i>	201.20	<i>Sparganion Dioscoridi</i>	499.22
<i>Siluri piscis consideratio</i>	201.39	<i>sparganii confid. 499.28. eius uires ex Gal.</i>	499.46
<i>Silybum Dioscoridi</i>	600.9	<i>Spartion Dioscoridi</i>	598.41
<i>Silybi consideratio</i>	600.13	<i>spartij consideratio</i>	568.43
<i>Simplicium perititia acquiri non potest ex librorum tâ</i>		<i>spartij usus ex Plinio</i>	598.60
<i>tum lectione</i>	3.54	<i>spartij uires ex Galeno</i>	600.2
<i>Simplicium perititia à præceptoribus, non ex libris cõ-</i>		<i>Spatha Dioscoridi</i>	141.42
<i>paratur</i>	4.4	<i>Sphacelus</i>	378.51
<i>Simplicium nomina uaria Dioscoridi adulterina</i>	8.34	<i>Sphondilium Dioscoridi</i>	414.49
<i>Sinapi Dioscoridi</i>	310.39	<i>sphondilij conpd. 414.57. eius uires ex Gal.</i>	415.7
<i>sinapi consideratio</i>	310.55	<i>Sphragis ægos Dioscoridi</i>	676.23
<i>sinapi uires ex Galeno</i>	310.61	<i>Spinacia</i>	274.41
<i>Sion Dioscoridi</i>	281.58	<i>Spina acuta Dioscoridi</i>	113.29
<i>sij consideratio</i>	282.1	<i>spina acuta consideratio</i>	113.38
<i>sij uires ex Galeno</i>	282.23	<i>spina acuta uires ex Galeno</i>	116.39
<i>Sifer Dioscoridi</i>	269.34	<i>spina acuta legitima quæ</i>	114.55
<i>siferis consideratio</i>	269.37	<i>Spina alba Dioscoridi</i>	357.4
<i>siferis uires ex Galeno</i>	269.42	<i>spina albæ consideratio</i>	357.19
<i>siferis forma</i>	269.47	<i>spina albæ uires ex Galeno</i>	358.14
<i>Sison Dioscoridi</i>	396.30	<i>Spina Arabica Dioscoridi</i>	357.22
<i>sisonis consideratio</i>	396.37	<i>spine Arabicæ consideratio</i>	358.26
<i>Sisymbrium Dioscoridi</i>	283.4	<i>spina Arabicæ uires ex Galeno</i>	358.47
<i>sisymbrij consideratio</i>	283.20	<i>Spodium Dioscoridi</i>	655.15
<i>sisymbrij in mentham matatio</i>	283.32	<i>spodij, &amp; pompholygis consideratio</i>	656.12
<i>sisymbrium aquaticum</i>	283.43	<i>spodij, &amp; pompholygis historia</i>	657.3
<i>sisymbrij utriusque uires ex Galeno</i>	283.60	<i>Spongie Dioscoridi</i>	694.43
<i>Smarides pisces Dioscoridi</i>	201.59	<i>spongiarum historia ex Aristotile</i>	694.56
<i>smaridum consideratio</i>	202.43	<i>spongiarum uires ex Galeno</i>	699.17
<i>Smilax hortensis Dioscoridi</i>	304.18	<i>spongiarum lapides Dioscoridi</i>	705.60
<i>smilacis hortensis consideratio</i>	204.28	<i>Spuma nitri, uide Nitri spuma</i>	
<i>Smilax aspera Dioscoridi</i>	586.43	<i>Spuma salis, uide Salis spuma</i>	
<i>smilacis aspera historia ex Teophrasto</i>	586.59	<i>Spuma argenti, uide Argenti spuma</i>	
<i>smilax læuis Dioscoridi</i>	589.52	<i>Squama aris uide Aeris squama</i>	
<i>smilacis læuis historia</i>	587.43	<i>Squama stomomatis Dioscoridi</i>	658.20
<i>smilacis utriusque uires ex Galeno</i>	588.1	<i>squamæ stomomatis consideratio</i>	658.41
<i>Smilacis glandiferæ consideratio</i>	136.35	<i>squama stomomatis quæ legitima</i>	659.13
<i>Smyris lapis Dioscoridi</i>	706.31	<i>Squillarum consideratio</i>	185.31
<i>smyridis confid. &amp; uires ex Galeno</i>	706.39	<i>Squinanthum</i>	41.9
<i>Smyrnion Dioscoridi</i>	405.44	<i>Stachys Dioscoridi</i>	437.18
<i>smyrnij confid. 406.4. eius uires ex Galeno</i>	406.33	<i>stachyos confi. 437.27. eius uires ex Galeno</i>	437.39
<i>Sodomæus lacus</i>	87.57. & 88.22	<i>Stactæ Dioscoridi</i>	64.50
<i>Solanum halicacabum Dioscoridi</i>	531.58	<i>Stactes consideratio</i>	64.55
<i>solanum hortense Dioscoridi</i>	531.14	<i>Staphis agria Dioscoridi</i>	596.58
<i>solanum manicum, seu furiosum Dioscoridi</i>	532.51	<i>staphidis agriæ consideratio</i>	597.14
<i>solanum somniferum Dioscoridi</i>	532.39	<i>staphidis agriæ uires ex Galeno</i>	597.19
<i>solani omnis generis consideratio</i>	533.1	<i>staphidis agriæ noxa, &amp; curatio</i>	729.52
<i>solani historia ex Theophrasto</i>	533.32	<i>Staphylodendron</i>	164.8
<i>solani uires ex Galeno</i>	533.49	<i>Stellariæ historia, &amp; uires</i>	583.32
		<i>Stellionum</i>	



# I N D E X.

Stellionum consideratio	728.29	Tamarix Dioscoridi	107.48
stellionum morsus remedia.	729.3	tamaricis consideratio	108.4. eius uires 108.21
Stercoris uires	240.10. & inde	Tamarindorum consideratio	142.46
Stercus ferri, uide Ferri stercus		tamaridorum uires	142.55
Stibium Dioscoridi	663.33	Tanacetum	467.23
stibij consideratio	663.44	Tarantule consideratio	223.16
stibij uires ex Galeno	664.5	tarantula ictus mirabiles effectus	ibidem
stibij uis deiectionis	660.8	tarantula ictus musica remedium	223.28
Stimmi, lege supra Stibium		tarantula uenenum, & eius auxilia	765.39
Stæbe Dioscoridi	492.25	Tauri sanguis, uide Sanguis taurinus.	
stæbes consid. 492.29. eius uires ex Gal.	493.4	Taxus Dioscoridi	542.55
Stæchas Dioscoridi	372.36	taxi consideratio	543.4
stæchadis consideratio	372.45	taxi historia ex Theophrasto	543.10
stæchadis uires ex Galeno	372.56	taxi historia ex Plinio	543.20
stæchadis uires ex Mesue	373.3	taxi uires ex Galeno	543.20
Stomoma Dioscoridi	658.38	taxi noxa & eius remedia Dioscoridi	732.55
Stramonia herba	533.49	taxi uenefica natura	732.58
Stratiotes Dioscoridi	559.4	taxus utrum calida, uel frigida	733.12
stratiotæ consideratio	559.9	Teda consideratio	78.55
Stratiotes millefolium Dioscoridi	559.16	Telebium Dioscoridi	340.14
stratiotæ millefolij consideratio	559.54	telebii consid. 340.20. eius uires ex Galeno	340.26
stratiotæ millefolij uires ex Galeno	560.4	Tellina Dioscoridi	179.40
Strigmenta balnearum	54.2	tellinarum consideratio	179.59
Struthium Dioscoridi	319.41	Tembulum Arabum	32.36
struthij consi. 319.49. & uires ex Gal.	320.1	Terebinthus Dioscoridi	83.44
Styrax Dioscoridi	68.32	terebinthi consideratio, & historia	84.29
styracis consideratio	69.1	terebinthi uires ex Galeno	85.2
styrax calamita unde dicta	69.3	Terebinthina Dioscoridi	84.5
styracis uires ex Galeno	69.30	terebinthina resina consideratio	84.48
Suberis consideratio, & historia	136.52	Terra omnis Dioscoridi	707.6
suberis uires	137.4	terrarum brevis enarratio	635.33
Succedanea quando admittenda	725.2	terra fornacum Dioscoridi	708.28
Succi quomodo exprimendi seruandiq; sint	75.0	terras alias quære in suis proprijs nominibus	
Succinum Dioscoridi	100.41	Terrantula Italidis quid	224.38
succini historia uaria	101.44	Testæ fornaceæ Dioscoridi	708.23
Sudoris animalium uirus, & remedia	742.38	Testiculus Dioscoridi	456.22
Suffrutices qui dicuntur	8.48	testiculus alter Dioscoridi	457.35
Suillus pulmo Dioscoridi	206.36	testiculorum consideratio	457.58
suillus talus Dioscoridi	216.58	testiculorum uires ex Galeno	458.54
Sulphur Dioscoridi	686.45	Teucrium, Teucrios Dioscoridi	431.11
sulphuris consideratio	686.58	teucrij consideratio	431.20
sulphuris faciendi ratio	687.10	teucrij uires, & historia ex Plinio	431.28
sulphuris uires ex Galeno	687.23	teucrij facultates ex Galeno	431.40
Sycomoros Dioscoridi	168.21	Thalassomeli Dioscoridi	645.44
sycomori historia	168.46	Thaliætron Dioscoridi	557.12
sycomori consideratio, & uires ex Galeno	168.56	thaliætri consideratio	557.15
sycomoros Italiae adulterina	169.8	thaliætri uires ex Galeno	557.18
sycomoros ficus Cypria similis	169.2	Thapsia Dioscoridi	597.33
syluas quæ plantæ adament	10.1	thapsiæ consideratio	598.11
Sympathia, & antipathia rerum	19.25	thapsiæ radices turpeti uicē illegitimè explēt	598.21
Symphyton petraeon Dioscoridi	489.35	thapsiæ uires ex Galeno	598.25
symphyti petræi consideratio	489.51	thapsiæ noxa, & remedia Dioscoridi	747.57
symphytum alterum Dioscoridi	489.41	thapsiæ potius signa, & curatio	748.32
symphyti alterius consideratio	489.57	Theamedes lapis, & eius mira natura	701.12
symphyti utriusque uires ex Galeno	491.1	Theodori lapsus	153.4
Symphoriani Campegi lapsus	152.39	Theophrasti sententiæ non probatæ	105.11. & 201
Syrupus uiolaceus	575.18	54. & 426.3	
		Theophrasti locus in corni historia suspectus	158.6
		Theophrasti de generatione lapidum opinio	636.53
		Theriaca componenda ratio deprauata	64.28
		theriaca laudibus à Galeno celebrata	762.12
			c 3 thlaspi

T

TALVS suis Dioscoridi

Talli suilli consideratio

216.58

216.20



# I N D E X.

<i>Thlaspi</i> Dioscoridi	312.31	<i>Trichomanes</i> Dioscoridi	582.36
<i>thlaspi</i> consideratio	312.45	<i>trichomanis</i> consideratio	582.40
<i>thlaspi</i> uires ex Galeno	312.56	<i>trichomanis</i> historia ex Theophrasto	582.51
<i>Thracius</i> lapis Dioscoridi	766.27	<i>trichomanis</i> uires ex Galeno	583.5
<i>thracii</i> lapidis mentio ex Galeno	700.30	<i>Trifolium</i> Dioscoridi	438.58
<i>Thunnus</i> Dioscoridi	204.7	<i>trifolij</i> omnis generis consideratio	439.49
<i>thunni</i> consideratio	204.14	<i>trifolij</i> acuti historia ex Scribonio	440.2
<i>thunnorum</i> captura, & nomina uaria	204.32	<i>trifolium</i> pratense tempestates prænunciat	440.52
<i>thunnorum</i> in cibis facultas	204.41	<i>trifolium</i> odoratum	440.43
<i>Thus</i> Dioscoridi	71.12	<i>trifolium</i> acetosum	440.8
<i>thuris</i> consideratio, & historia	72.6	<i>trifolij</i> uires ex Galeno	441.8
<i>thuris</i> facultates ex Galeno	72.31	<i>Trinitas</i> herba, & eius historia, & uires	440.55
<i>thuris</i> cortex Dioscoridi	71.40	<i>Tripolion</i> Dioscoridi	581.4
<i>thuris</i> fuligo Dioscoridi	71.54	<i>tripolij</i> consid. 581.10. & uires ex Gal.	581.44
<i>thuris</i> manna Dioscoridi	71.49	<i>Trissago</i> Diosc.	431.50
<i>thus</i> manne consideratio	73.4	<i>trissaginis</i> consideratio,	432.1
<i>Thyites</i> lapis Diosc.	702.31	<i>trissaginis</i> historia, & uires ex Theophrasto	432.12
<i>Thymelæa</i> Diosc.	611.53	<i>trissaginis</i> uires ex Galeno	432.25
<i>thymelæa</i> consideratio	612.38	<i>Triticum</i> Diosc.	248.14
<i>thymelæa</i> , noxa, & eius curatio	748.57	<i>tritici</i> genera ex Theophrasto	248.46
<i>thymoxaline</i> Diosc.	647.15	<i>triticum</i> Italicum optimum	249.8
<i>Thimum</i> Diosc.	383.4	<i>tritici</i> electio 249.18. & uires ex Gal.	249.43
<i>thymi</i> historia	383.20	<i>tritici</i> oleum	249.41
<i>thymi</i> genera duo	383.34	<i>Tubera</i> Dioscoridi	303.28
<i>thymi</i> uires ex Galeno, & Aëtio	383.37	<i>tuberum</i> consideratio	303.47
<i>Thymbra</i> Dioscoridi	383.58	<i>tuberum</i> uires ex Galeno	304.5
<i>thymbra</i> consid. 384.1. eius uires ex Paulo	384.22	<i>Turbit</i> Arabum	481.15
<i>Tigname</i> officinis quid	49.34	<i>Turpetum</i> , & eius consideratio, & historia ibidem,	618.35
<i>Tilia</i> consid. 119.2. eius uires	119.42	<i>turpeti</i> noxa, & curatio	748.55
<i>Tithymali</i> omnes Dioscoridi	606.4	<i>Tussilago</i> Dioscoridi	444.9
<i>tithymalorum</i> omnium consid.	606.49	<i>tussilaginis</i> consid. 444.21. & uires ex Gal.	444.49
<i>tithymali</i> cogniti	607.13	<i>Typha</i> Dioscoridi	450.45
<i>tithymali</i> Theophrasto tria tantum genera	607.31	<i>typha</i> consideratio	450.51
<i>tithymalorum</i> uires ex Mesue	607.42	<i>typha</i> usus, & uires	450.56
<i>tithymalorum</i> uires ex Galeno	607.50		
<i>tithymalorum</i> noxa, & remedia	748.56		
<i>Tordilium</i> Dioscoridi	395.58		
<i>Tormentilla</i> descriptio, & uires	483.34		
<i>Torpedo</i> piscis Dioscoridi	189.57		
<i>torpedinis</i> consideratio	189.60		
<i>torpedinis</i> mira facultas	190.20		
<i>torpedinis</i> uires ex Galeno	190.36		
<i>Toxicum</i> , & eius ueneni curatio Diosc.	737.21		
<i>toxici</i> consideratio	737.30		
<i>toxici</i> sumpti notæ ex Nicandro	737.56		
<i>toxici</i> , & napelli discrimen	738.5		
<i>Tragacantha</i> Diosc.	363.11		
<i>tragacanthæ</i> consid. 363.38. & uires ex Gal.	364.2		
<i>Tragium</i> Dioscoridi	516.15		
<i>tragium</i> alterum Dioscoridi	526.23		
<i>tragij</i> consid. 516.27. & uires ex Gal.	517.9		
<i>Tragoriganum</i> Dioscoridi	374.35		
<i>tragorigani</i> consideratio	375.9		
<i>Tragos</i> Dioscoridi	253.15		
<i>tragis</i> cerealis consideratio	253.18		
<i>Tragum</i> Dioscoridi	517.22		
<i>tragi</i> herba consideratio	517.33		
<i>Trasi</i> , & eorum descriptio, & uires	303.11		
<i>Tribulus</i> Dioscoridi	494.57		
<i>tribuli</i> utriusque consideratio	495.8		
<i>tribuli</i> utriusque uires ex Galeno	495.25		
		<i>Valeriana</i> maior	31.1
		<i>Valeriana</i> minor	31.9
		<i>Varia</i> de generatione lapidum sententia	603.31
		<i>uaria</i> de metallorum ortu sententia	631.58
		<i>Veneficorum</i> doli Dioscoridi	710.33
		<i>Venena</i> præcauendi modi Dioscoridi	710.31
		<i>uenena</i> quot modis mortem adferant	713.40
		<i>uenena</i> petunt diuersa membra	715.40
		<i>uenena</i> calida nō possunt in nutrimentū uerti	717.3
		<i>uenena</i> præcauendi modus	717.51
		<i>Venena</i> curandi ratio generalis Dioscoridi	711.3
		<i>uenena</i> curandi ratio universalis	719.27
		<i>uenena</i> incognita uomita deprehenduntur Dioscoridi	711.24
		<i>Venenata</i> animalia Dioscoridi	750.36
		<i>Veneni</i> operatio qualis	713.13
		<i>ueneni</i> humidi exemplum	714.47
		<i>ueneni</i> sumpti in commune indicia	719.5
		<i>uenenis</i> , quorum nulla cognitio, quæ opitulentur Dioscoridi	711.13
		<i>Venenorum</i> genera unde	713.26
		<i>uenenorum</i> effectus à diuersis causis	714.28
		<i>uenenorum</i> præcautio quædam explosa	727.54
		<i>uenenorum</i> præcautio ex medicamentis	719.12
		<i>uenenorum</i>	



# I N D E X

uenenorum remedia in generali	720.41	uinum è Celtica nardo Dioscoridi	652.32
uenenorum animalium diuersi gradus, & affectus		uinum cestrites Dioscoridi	651.51
760.56		uinum chamædryites Dioscoridi	651.46
Venum quandoque morbis, & alteri ueneno reme-		uinum è camelæa Dioscoridi	653.3
dium est	717.34	uinum chamæpitynum Dioscoridi	653.16
uenenum serpentium frigidum esse, falsum	761.10	uinum è conyza Dioscoridi	652.10
Veneris pecten	298.5	uinum cypressinum Dioscoridi	650.55
Veneris umbilicus Dioscoridi	552.43	uinum cydonites Dioscoridi	648.48
Veneris umbilicus alter Diosc.	552.52	uinum daucites Dioscoridi	652.45
Veneris umbilici utriusque consideratio	552.57	uinum dictamnites Dioscoridi	651.61
Veneris umbilici utriusque uires ex Galeno	553.17	uinum è dulci radice Dioscoridi	652.52
Veratrum album, lege suprâ in Elleboro albo.		Vinum è flore salis Diosc.	692.57
Veratrum utrunque triginta perdurat annos	6.30	Vinum guaiacum, & eius conficiendi, exhibendiq; ra-	
Verbascum Dioscoridi	560.16	tio	124.25
verbasci consideratio, & genera	562.9	uinum gypsatum Dioscoridi	640.36
verbasci uires quadam	562.23	Vinum helleborites Dioscoridi	652.59
verbasci genera, & uires ex Galeno	562.47	uinum hyssopites Dioscoridi	651.37
verbasci sylvestris mentio	572.9	Vinum ex iride Dioscoridi	652.28
Verbenaca Dioscoridi	523.5	uinum iuniperinum Dioscoridi	650.53
uerbenacæ utriusque consideratio	523.36	Vinum è labrusca Dioscoridi	642.54
uerbenacæ uires ex Galeno	523.56	uini è labrusca uires	642.57
Vermes terreni Dioscoridi	226.18	uinum laurinum Dioscoridi	650.55
uermium terrenorum uires	226.22	uinum lentiscinum Dioscoridi	650.5
uermium terrenorum oleum	226.26	Vinum malabathrinum Diosc.	652.32
uermium in lignis enascentium usus	205.46	uinum mangradorites Diosc.	653.7
Veronica herbæ historia, & uires	370.22	uinum marathrites Diosc.	642.56
Vesicaria solani genus	533.3	uinum è marrubio Diosc.	652.1
vesicaria altera	533.43	uinum melites Diosc.	648.48
Vesparum ictus curatio Dioscoridi	763.55	uinum melitites Diosc.	643.4
vesparum ictus, & remedia	773.60	uinum melomeli Diosc.	648.53
Vgonis Solerij de nigro ueratro opin. explosa	593.1	uinum è myrrha Diosc.	652.27
Viburnum quid, & eius descriptio	140.46	uinum myrsinites Diosc.	649.57
Viciæ uires ex Galeno	305.48	uinum myrtites Diosc.	649.49
Victus ratio in morsu rabiosi canis Diosc.	768.24	Vinum è nardo sylvestri Diosc.	652.39
victus ratio demorsorum à cane rabioso	758.56	uinum nectarites Diosc.	652.30
victus ratio eorum, qui uenena sumpserunt	720.24	uinum nouum Diosc.	640.17
Vincetoxicum, & eius descriptio	428.2	Vinum ænantbinum Diosc.	649.17
Vina marina Dioscoridi	648.34	uinum omphacometites Diosc.	649.4
uina picata Dioscoridi	640.37	uinum omphacites Diosc.	642.19
uina resinata Dioscoridi	ibidem	uinum origanites Diosc.	652.7
Vinetis quæ plantæ latè nascantur	9.52	Vinum palmeum Dioscoridi	650.12
Vini natura, & genera Diosc.	640.15	uinum panacites Diosc.	652.59
uini facultates uarie pro modo usus	641.18	uinum passum Diosc.	640.28
uini usus cui ætati conueniat	641.40	uinum è petroselinio Diosc.	652.56
uini usus moderatus quantum profit	641.25	uinum phthorion Diosc.	652.59
uini usus immoderatus quantum obsit	641.30	uinum picatum Diosc.	651.10
uinorum factitiorum consideratio	653.30	uinum pineum Diosc.	650.55
Vinum abiegnum Dioscoridi	650.55	uinum pucinum, & eius uires	641.57
uinum abrotonites Diosc.	652.8	uinum è pulegio Diosc.	652.8
uinum absinthites Diosc.	651.19	uini ex punicis malis uaria confectio	649.28
uinum acorites Dioscoridi	652.52	Vinum resinatum Diosc.	650.38
uinum adynamon Diosc.	642.32	uinum rhodites Diosc.	649.42
uinum anethinum Dioscoridi	652.56	uinum rhoetes Diosc.	649.23
uinum apijtes Dioscoridi	649.11	Vinum saluiatum Diosc.	652.47
uinum aromatites Dioscoridi	652.14	uinum è satureia Diosc.	652.6
uinum asarites Dioscoridi	652.37	uinum scammonites Diosc.	652.59 & 653.26
Vinum bunites Dioscoridi	651.59	uinum scillinum Diosc.	648.7
Vinum calaminthites Dioscoridi	652.8	uini scillini uires ex Galeno	948.20
uinum catorchites Dioscoridi	650.23	uinum stæchadites Diosc.	651.48
uinum cedrinum Dioscoridi	650.55	uinum strobilites Diosc.	650.48
uinum cedrites Dioscoridi	651.2	uinum è sycomoris Diosc.	650.33
		uinum	



# I N D E X.

<i>uinum è syriaca nardo Dioscoridi</i>	652.32	<i>unguentum crocinum Diosc.</i>	62.28
<i>Vinum terebinthinum Dioscoridi</i>	650.5	<i>unguentum cyprinum Diosc.</i>	62.42
<i>uinum thymites Dioscoridi</i>	652.35	<i>Vnguentum elatinum Diosc.</i>	59.52
<i>uinum è thymelea Dioscoridi</i>	653.1	<i>Vnguentum gleucinum, uide Gleucinum.</i>	
<i>uinum tragoriganites Dioscoridi</i>	651.57	<i>Vnguentum hedrychroon, uide Hedychroon</i>	
<i>Vinum uetus Dioscoridi</i>	640.15	<i>unguentum iasminum, uide Iasminum.</i>	
<i>uinum Vipacum, &amp; eius uires</i>	641.58	<i>unguentum irinum Diosc.</i>	62.58
<i>Viola alba Dioscoridi</i>	454.50	<i>Vnguentum lilinum Diosc.</i>	61.42
<i>Viola purpurea Dioscoridi</i>	574.16	<i>unguenti lilini consideratio</i>	62.10
<i>uiola purpurea consideratio</i>	574.52	<i>Vnguentum malabathrinum Diosc.</i>	65.32
<i>uiolarum uires ex Mesue</i>	575.3	<i>unguentum megalinum Diosc.</i>	64.5
<i>uiolarum uires ex Galeno</i>	575.20	<i>unguentum melinum Diosc.</i>	59.59
<i>Vipera ex hominis uentre fugata</i>	209.22	<i>unguenti melini conficiendi ratio</i>	60.10
<i>uipera Aegyptijs cibis</i>	193.12	<i>unguentum mendesium Diosc.</i>	64.44
<i>uipera uino delectantur</i>	192.21	<i>unguentum metopium Diosc.</i>	64.34
<i>uipera ictus nota, &amp; curatio Dioscoridi</i>	768.35	<i>Vnguentum marcesinum Diosc.</i>	62.15
<i>uiperarum consideratio</i>	192.11	<i>unguentum nardinum Diosc.</i>	65.24
<i>uiperarum facies sexusq; discrimen</i>	191.40	<i>unguentum Nicandri</i>	763.2
<i>uiperarum morsus indicia</i>	768.57	<i>Vnguentum ociminum Diosc.</i>	61.18
<i>uiperarum morsus remedia</i>	769.17	<i>unguentum oenanthinum Diosc.</i>	60.15
<i>uiperarum uenatio, &amp; earum pastilli</i>	192.28	<i>unguentum onychinum Diosc.</i>	62.38
<i>Viperinae carnes Dioscoridi</i>	190.60	<i>Vnguentum rosaceum, lege Rosaceum.</i>	
<i>uiperinae carnis uires ex Galeno</i>	191.57	<i>Vnguentum sampsuchinum Diosc.</i>	60.49
<i>Virga aurea, &amp; eius historia, &amp; uires</i>	506.14	<i>unguenti sampsuchini consideratio</i>	60.50
<i>uirga pastoris, &amp; eius consideratio</i>	356.33	<i>unguentum styracinum Diosc.</i>	62.38
<i>Virulentorum ictuum, uel morsuum curatio</i>	761.20	<i>unguentum susinum Diosc.</i>	61.41
<i>Viscum Dioscoridi</i>	425.4	<i>Vnguentum telinum Diosc.</i>	60.14
<i>uisci consideratio</i>	425.31	<i>Vngula asini, &amp; caprae Diosc.</i>	208.16
<i>uisci utilitas in Hetruria</i>	425.39	<i>ungularum animalium uires</i>	208.36
<i>uisci uires ex Galeno</i>	426.17	<i>Vnguis odoratus Diosc.</i>	180.44
<i>Vitex Dioscoridi</i>	130.47	<i>unguium odoratorum consideratio</i>	180.52
<i>uiticis consideratio</i>	131.1	<i>Vniones qui prestantissimi</i>	179.11
<i>uiticis uires ex Galeno</i>	131.11	<i>unionum uires</i>	179.25
<i>Viticella herba historia 622.5 eius uires</i>	622.4	<i>Vrina Diosc.</i>	241.37
<i>Vitis alba Dioscoridi</i>	620.10	<i>urinarum facultates</i>	241.55
<i>uitis alba consideratio</i>	620.42	<i>Vrtica Diosc.</i>	553.59
<i>uitis uires ex Galeno</i>	620.56	<i>urtice consideratio</i>	554.16
<i>Vitis nigra Dioscoridi</i>	621.8	<i>urtice uires ex Galeno</i>	554.24
<i>uitis nigra consideratio</i>	621.20	<i>urtica lactea</i>	555.50
<i>uitis nigra uires ex Galeno</i>	621.48	<i>urtice seminis noxa, &amp; curatio</i>	731.17
<i>Vitis sylvestris Dioscoridi</i>	619.33	<i>Vstio auxilium contra uirulentos ictus Diosc.</i>	757.42
<i>uitis sylvestris consideratio</i>	619.43	<i>ustionis utilitas</i>	757.57
<i>uitis sylvestris uires ex Galeno</i>	620.3	<i>Vtrum uenena in statum diem interimere possint</i>	
<i>Vitis uinifera Dioscoridi</i>	636.51	715.60	
<i>uitis uinifera consideratio</i>	637.25	<i>Vtrum quis assuescere possit, ut uenena innocue sumat</i>	
<i>uitis, &amp; brassica odium</i>	15.31	716.43	
<i>Vitruuij in larice error</i>	79.57	<i>Vtrum animalia, quae cibis uenenosis uictitant, exitio-</i>	
<i>Plmus Dioscoridi</i>	104.44	<i>sam uim retineant</i>	717.10
<i>ulmi consideratio, &amp; historia</i>	104.57	<i>Vua Dioscoridi</i>	637.14
<i>ulmi facultates</i>	105.19	<i>uua consideratio</i>	637.25
<i>ulmi uires ex Galeno</i>	105.30	<i>uuarum uires ex Galeno</i>	637.44
<i>Vlua quæ</i>	558.21	<i>Vua passa Diosc.</i>	638.4
<i>Vmbilicus Veneris, uide supra Veneris umbilicus</i>		<i>uua passa consideratio</i>	638.12
<i>Vnedo, Arbutus, ideo quare in Arbuto.</i>		<i>uua passa uires ex Galeno</i>	638.47
<i>Vnguentorum ratio Diosc.</i>	58.46	<i>Vua spina, &amp; eius usus</i>	115.56
<i>unguentorum consideratio</i>	59.29	<i>uua taminia quæ</i>	621.22
<i>Vnguentum abrototinum Diosc.</i>	61.28	<i>Vulpinus pulmo Diosc.</i>	206.37
<i>unguentum amaracinum Diosc.</i>	63.47		
<i>unguentum anethinum Diosc.</i>	61.34		
<i>Vnguentum butyrinum Diosc.</i>	62.40		
<i>Vnguentum cinnamominum Diosc.</i>	65.9		

X

<i>Xanthion Diosc.</i>	583.30
<i>Xanthij consideratio</i>	583.30
<i>xanthij</i>	



# I N D E X.

<i>xanthij uires ex Galeno</i>	583.51
<i>Xiphion Dioscoridi</i>	498.38
<i>Xiphia piscis</i>	204.48
<i>Xylon, &amp; eius consideratio</i>	259.45. & 450.19
<i>xyli uires</i>	450.31
<i>Xylobalsamum Dioscoridi</i>	43.32
<i>xylobalsamum officinarum spurium</i>	44.38
<i>xylobalсами uicem quid expleat</i>	44.45
<i>Xylocinnamomum Dioscoridi</i>	33.36
<i>Xyris Dioscoridi</i>	499.53
<i>xyridis consideratio</i>	500.4
<i>xyridis uires ex Galeno</i>	500.6

Z	
<i>Zeæ Dioscoridi</i>	251.54
<i>Zeæ consideratio</i>	251.59
<i>zeæ uires ex Galeno</i>	252.12
<i>Zedoariae consideratio, &amp; uires</i>	317.41
<i>Zibetti historia, &amp; facultas</i>	47.35
<i>Zizypha, &amp; eorum consideratio</i>	160.35
<i>Zopissa Dioscoridi</i>	86.40
<i>Zuccharum albusar</i>	245.11
<i>Zurubet arabibus, idē quod Græcis Arnabo</i>	317.49
<i>Zurumbet quid</i>	317.52
<i>Zythum Dioscoridi</i>	351.15
<i>Zythi consideratio</i>	251.24

F I N I S I N D I C I S.

## SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM facultates secundum locos ex Dioscoride.

### AD CAPITIS DOLOREM EX FRIGIDITATE GENITVM.



*Ris Illyrica cum aceto, & rosaceo illita.*

*Oleum sylvestris oliuæ inunctum.*

*Oleum amygdalinum illitum per se.*

*Viticis semen emplastri modo adhibitum.*

*Amygdalæ amaræ cum*

*aceto uel rosaceo fronti uel temporibus illita.*

*Torpedo marina uiuā per se tantum admota.*

*Lana succida cum aceto, & rosaceo imposita.*

*Sisymbrium fronti, & temporibus illitum.*

*Hedera corymborum, uel foliorum succus cum aceto, & rosaceo persusus.*

*Alōe temporibus, & fronti ex aceto, & rosaceo illita.*

*Meniba fronti per se illita.*

*Srepyllum coctum, adiecto rosaceo, acetoq; madefactū & appositum.*

*Melilotus rosaceo, aut aceto madefacta, & imposita.*

*Baccharis folia illita per se.*

*Ruta cum rosaceo, & aceto illita.*

*Anisum potum per se.*

*Sphondylium cum ruta illitum.*

*Peucedanum ex aceto, & rosaceo illitum.*

*Melanthium fronti per sese illitum.*

*Conyza minor per se illita.*

*Anagyris tenera folia drachmæ pōdere ex uino pota.*

*Rhodia radix recens cum rosacei momento imposita.*

*Hippoglossum pro serito capiti impositum.*

*Chamedaphnes folia trita, & imposita.*

*Elatarium ex lacte naribus insusum.*

*Rusci folia, & bacce in uino pota.*

*Scammonia ex aceto, & rosaceo persusa.*  
*Aqua marina uapor aperto capite receptus.*

### AD CAPITIS DOLORES ACALIDA CAUSA EXORTOS.

*Oleum sylvestris oliuæ inunctum.*

*Vnguentum rosaceum linimenti modo impositum.*

*Ligustri flores fronti ex aceto illiti.*

*Rosarum aridarum ex uino maceratarum expressus liquor appositus.*

*Viticis semen appositum.*

*Portulaca per se imposita.*

*Melilotus cum aceto, aut rosaceo aspersa.*

*Nymphaeæ radix pota, & per se naribus indita.*

*Rhodia radix cum rosaceo fronti, temporibusq; adhibita.*

*Papaueris liquor fronti cum rosaceo illitus.*

*Tsyllium ex rosaceo, acetoq; aut aqua impositum.*

*Hippoglossi serium appositum.*

*Sedum maius cum rosaceo illitum.*

*Solani hortulani folia adhibita.*

*Viniferae uitis folia, & capreoli imposita.*

*Ophites lapis adalligatus.*

*Ad expurgandum caput.*

*Brassicae succus*

*Anamonis succus*

*Bete succus*

*Chelidonij ma. succus*

*Cyclamini ma. succus*

*Cepae succus*

*Pyrethrum*

*Staphis agria*

*Colocymhis in catapotijs deuorata.*

*Vua passa cum pipere commanducata.*

*Atramentum sutorium lanis naribus inditum.*

} naribus insusus

} diu mansa

Capitis



Capitis dolores excitant.

*Styracium oleum olfactum.*  
*Oliuæ flauæ*  
*Glandes*  
*Palmulæ Pheniciæ*  
*Iuglandes*  
*Arbuti fructus*  
*Ferulæ caules*  
*Mei radices largius sumptæ.*  
*Absinthij liquamentum haustum.*

Ad ueternosos.

*Vitidis semen cum rosaceo, & aceto persusum.*  
*Castoreum ex aceto, & rosaceo naribus infusum.*  
*Cæpa decocta, & in cibum sumpta.*  
*Sinapi derafo capiti appositum.*  
*Sphondylium suffitum, & ex oleo capiti illitum.*  
*Peucedanum cum aceto, & rosaceo inunctum.*

Ad somnum conciliandum.

*Iris Illyrica pota.*  
*Amomum fronti illitum.*  
*Amygdalæ amare deuorata.*  
*Vitidis semen potum.*  
*Lactuca in cibum sumpta.*  
*Aloë illita per sese, uel ex rosaceo.*  
*Baccharis odorata.*  
*Iunci Aethiopici semen potum.*  
*Papaueris erratici quinque, sexue capita in uini cyathis tribus ad dimidium decocta, & potui data.*  
*Papaueris foliorum, & uasculorum decoctum, tum bibitum tum persusum.*  
*Hyoscyami semen potum, ac appositum.*  
*Solani somnifici radicum cortex drachmæ pondere in uino potus.*  
*Mandragoræ radices ex uino decoctum cyathi unius mensura potum.*  
*Mandragoræ poma olfacta naribus.*  
*Mandragoræ liquor sedi pro balano subditus.*

Somnia terribilia tumultuosaque  
representant.

*Fabæ*  
*Lentes*  
*Dicnocomi semen drachmæ pondere potum.*  
*Smilacis lewis semen cum dorycnio potum ternis singulorum obolis.*

Ad sternutamenta cienda.

*Sinapi semen tritum, & naribus admotum.*  
*Ptarmicæ flores admoti.*  
*Struthij radix trita, & admotæ.*  
*Ranunculi radix sicca, & in puluerem trita, naribus indita.*  
*Daphnoides naribus indita.*  
*Veratri albi radix trita, & imposita.*

Ad uertiginosos.

*Balsami semen per se potum.*  
*Peucedanum ex aceto, & rosaceo illitum.*  
*Galbanum olfactum.*  
*Brionicæ radix pota per continuum annum quotidie drachmæ pondere.*  
*Vitis nigrae uiticulæ primæ recentes decoctæ, & in cibis acceptæ.*

*Vinum*  
*Acetum* } Scillinum potum

Ad apoplexiam.

*Vitis albæ radix continuo anno quotidie drachmæ pondere hausta.*

Ad comitiales.

*Cardamomum ex aqua potum.*  
*Cancanum per se potum.*  
*Balsami semen haustum.*  
*Bitumen naphthæ suffitum comitiales deprehendit.*  
*Populi nigrae semen ex aceto.*  
*Ficus sicca in cibum acceptæ.*  
*Concule Indicæ suffitæ excitant.*  
*Coagulum leporinum potum.*  
*Mustela uentriculus coriandro infarctus, inueteratusq; deuoratus.*  
*Mustela eiusdem sanguis potus.*  
*Asininum iecur tostum in ieiunio sumptum.*  
*Vngula asini combusta epota.*  
*Equorum lichenes triti, & ex aceto hausti.*  
*Lapis in hyrundinum pullorum primæ fætura uentriculo inuentus pro amuleto in cerui aluta suspensus.*  
*Serum lactis potum quousque aluum citat.*  
*Phocæ coagulum bibitum.*  
*Vrsinum fel ad lingendum datum.*  
*Testudinis fel naribus inditum.*  
*Testudinis terrestris sanguis potus.*  
*Ciconiæ finum ex aqua potum.*  
*Plantago cum lenticula decocta, in cibis sumpta.*  
*Sinapi tritum naribus inditum.*

*Piper diu mansum.*  
*Scilla hausta.*  
*Agaricus drachmæ pondere cum oymelite haustus.*  
*Eryngij radix ex dulci aqua ebibita.*  
*Rutæ syluestris semen potum.*  
*Seselis Massiliensis radix, & semen potum.*  
*Peucedanum ex aceto, & rosaceo capiti inunctum.*  
*Sagapenum potum.*  
*Laserpitij liquor cum aceto mulso bibitus.*  
*Ladanum olfactum.*  
*Ammoniacum in eclegmate cum melle datum.*  
*Trifolij semen, & folia pota.*  
*Conyza cum aceto bibita.*  
*Anthyllis altera ex oxymelite pota.*  
*Betonicæ folia hausta.*  
*Quinquefolium triginta diebus haustum.*  
*Papaueris spumei semen cum mulsa aqua potum.*  
*Veratrum nigrum potum.*  
*Hippophæsti succus trium obolorum pondere haustus.*  
*Vitis albæ drachmæ pondere anno toto quotidie hausta.*  
*Vitis nigrae uiticulæ primæ uirentes coctæ, & in cibis sumptæ.*  
*Acetum mulsum potum.*  
*Vinum, & acetum scillinum potum.*  
*Selenites lapis tritus ebibitus.*  
*Ætites lapis cum cyprino unguento, aut gleucino, uel alio ex calfaciente illitus.*  
*Cotes naxia pota.*

Ad phrenesim.

*Vnguentum crocinum persusum, aut naribus admotum uel illitum.*  
*Vitex cum aceto, & oleo instillatus.*

*Asparagus*



## CAPITIS

*Asparagus in uino albo potus.*  
*Serpillum cum aceto, & rosaceo impositum.*  
*Sphondylium suffitum impositum, & capiti ex oleo inunctum.*  
*Peucedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.*  
 Ad cerebri inflammationes, quas syriasi inuocant.

*Cucurbitæ ramenta sincipiti apposita.*  
*Peponis ramenta sincipiti adhibita.*  
*Heliotropii folia fronti adhibita.*  
*Acetum fronti illitum.*

Ad melancholiam.

*Ocimi semen potum.*  
*Veratrum nigrum potum.*  
*Betonica folia pota.*  
*Epithymum potum.*

Ad crapulam & ebrietatem arcendam.

*Crocum ex passo præsumptum.*  
*Punicorum malorum succus } haustus.*  
*Myrti baccarum succus*  
*Brassica summo cibo sumpta.*  
*Absinthium præsumptum.*

Ad capitis defluxiones.

*Unguentum irinum naribus illitum.*  
*Styrax, illita, suffitæque.*  
*Bitumen naphtha suffitum.*  
*Cinnamomum potum.*  
*Mei radices tritæ cum melle in eclegmate deuorata,*  
*ubi fluxio pectus afficiat.*  
*Nuces auellane tostæ, & cum exiguo piperis pota.*  
*Dracunculi maioris radix tosta, uel elixa deuorata.*  
*Tragacantha in eclegmate cum melle sumpta.*  
*Hyssopum cum fico, ruta, melleq; ex aqua decoctum potum.*  
*Helichrysi coma trium obolorum pondere in uino diluto pota.*  
*Hyoscyami semen oboli pondere, addito papaueris semine haustum.*

Ad crebrum roborandum.

*Agallochum potum.*

Ad capitis manantia ulcera.

*Thus cum Nitro confricatum.*  
*Fici & caprisici lacteus succus cum polenta appositus.*  
*Vrina inueterata apposita.*  
*Fœnum græcum appositum.*  
*Cicer adhibitum.*  
*Malua ex urina humana emplastrata.*  
*Allij cinis ex melle inunctus.*  
*Cyclamini decoctum fomenti modo adhibitum.*  
*Bulbi cum cremato Nitro adhibiti.*  
*Melilotus ex aqua cum creta chia, uinoq; aut galla inuncta.*  
*Rubi folia imposita.*  
*Lilij cremata radix ex melle adhibita.*  
*Adiantum in lixiuio decoctum.*  
*Acida muria inspersa.*

## NERVORVM.

Ad conuulsionem.

*Iris illyrica ex aceto pota.*  
*Acori decoctum bibitum.*  
*Cardamomum ex aqua potum.*

## NERVORVM

*Iunci odorati radices drachma una cum pari pondere piperis per dies aliquot data.*  
*Costus ex uino, & absinthio exhibitus.*  
*Balsamum ex aqua haustum.*  
*Helenium ex melle in eclegmate exhibitum.*  
*Unguentum sampsuchinum more cataplasmati appositum.*

*Unguentum metopium illitum.*

*Bdellium illitum.*

*Iuniperi baccæ bibita.*

*Cedrides deuorata.*

*Halimi radix drachmæ pondere in aqua mulsa hausta.*

*Ficulneus cinis ex oleo illitus.*

*Erinacei terrestres caro in cibum sumpta.*

*Castoreum inunctum, & potum.*

*Serpillum potum.*

*Fimum caprinum cum aceto bibitum.*

*Dracunculi radix tosta, et elixa deuorata cum melle.*

*Asphodeli radix drachmæ pondere pota.*

*Capparis semen potum.*

*Capparis cortex pariter haustus.*

*Argemone emplastrata.*

*Agaricus sumptus trium obolorum pondere cum mulso.*

*Rhaponticum potum.*

*Galbanum deglutitum.*

*Gentianæ radix drachmæ pondere pota.*

*Aristolochia rotunda bibita.*

*Centaurij maioris radix ex uino pota.*

*Spina alba semen potum.*

*Acanthij radices pota.*

*Abrotani semen cum aqua potum.*

*Leucacanthæ radices ex uino decoctum exhaustum.*

*Origanum estum cum fico.*

*Eryngij radix pota cum aqua mulsa.*

*Pulegium cum posca potum.*

*Calamintha decoctum haustum.*

*Baccharis radix in aqua decocta, & pota.*

*Panacæ herculeum linitum.*

*Libanotis radices cum loliacea farina emplastrata.*

*Peucedanum ex aceto & rosaceo inunctum.*

*Clinopodium bibitum.*

*Chamadryi decoctum potum.*

*Lasæ oboli pondere datum & deuoratum.*

*Sagapenum potum.*

*Galbanum deuoratum.*

*Betonica folia denarij pondere cum hydromelite data.*

*Xyridis radix ex passo bibita.*

*Symphytum ex aceto mulso bibitum.*

*Psyllium illitum.*

*Serpyllum potum, aut illitum.*

*Verbasci decoctum bibitum.*

*Bryonia eclegma ex melle.*

*Vinum scillinum haustum.*

*Vinum chamadryites bibitum.*

*Vinum tragoriganites bibitum.*

*Satyrii radix ex uino nigro austero bibita.*

*Coris ex uino pota.*

Ad resolutionem neruorum.

*Peucedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.*

*Capparis semen, & cortex potus.*

*Sagapenum potum.*

*Rubia radix hausta.*

*Colocyn-*



## NERVORVM

*Colocynthis clistere perfusa.*

*Vitis nigra viticula prima recentis, cocta, comestaq;.*

*Vinum Scyllinum haustum.*

Ad tremorem.

*Cerebrum leporinum tostum comestum.*

*Castoreum potum, & inunctum.*

*Brassica in cibo sumpta.*

*Althæa decoctum potum.*

Ad fluxiones.

*Farina tritici cū Apollinaris herba succo apposita.*

*Farina hordei ex aceto adhibita.*

Ad ægritudines & dolores.

*Oleum sicyonium inunctum.*

*Oleum laurinum illitum.*

*Eleomeli illitum.*

*Vnguentum cyprinum*

*Vnguentum gleucinum*

*Vnguentum metopium*

*Vnguentum amaracinum*

*Bdellium malagmati insertum.*

*Lixinium ex cinere ficus ex oleo illitum.*

*Castoreum potum, & illitum.*

*Erinacei terrestres caro deuorata in cibis.*

*Viperina carnes decocta, & esui data.*

*Poterij radices decoctum potum.*

*Peucedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.*

*Laser oboli pondere deuoratum.*

*Gentaurium minus ebibitum.*

*Lilij radix inasata, melleq; excepta imposita.*

*Satyrii radix ex uino nigro austero pota.*

*Althæa radix per se, uel decocta in uino, aut aqua mulsa emplastri modo imposita.*

*Coccum insectorium cum aceto illitum preciosos inuat nervos.*

*Senecij folia ad eadem præstant illita.*

*Narcissi radix illita, ad eadem utiliter imponitur.*

*Hippophaëstis succus trium obolorum pondere potus.*

*Aqua marina perfusa.*

*Acetum scyllinum potum.*

*Vinum de stæchade haustum.*

*Vinum de thymo potum.*

*Sesamum illitum crassitiem inuat.*

Ad Nervorum uulnera.

*Cochlæ terrestres tusa, & imposita.*

*Terreni uermes tusi, & illiti.*

*Butyrum illitum.*

*Senecionis folia emplastri modo imposita cum thuris manna.*

*Dracunculi minoris folia illita.*

*Poterij radix tusa, & imposita.*

*Lilij radix ex melle subacta, & illita.*

*Coccum insectorium cum aceto illitum.*

*Narcissi radix illita.*

Ad Nervorum crassitiem.

*Sesamum emplastri modo impositum.*

*Sarmentitius cinis cum axungia, uel oleo illitus.*

## OCVLORVM.

Ad palpebrarum pilorum defluuium.

*Nardi Indica decoctum fotu adhibitur.*

*Cochlæ terrestres acu traiciuntur ut effluat humor, quo postea palpebræ illiniuntur.*

## OCVLORVM

*Oesipus illitus.*

*Condrilla gummi, ac pariter lac impositum.*

*Lapis armenius illitus.*

Ad palpebrarum oculorumq; scabritiem.

*Thuris cortex tostus, & appositus.*

*Picis fuligo illita.*

*Licium appositum.*

*Sepie os leuigatum & illitum.*

F E L	{	Marini scorpionis	}	illitum.
		Marine Testudinis		
		Perdices		
		Aquile		
		Galline albæ		
		Sylvestris Capræ		

*Sinapi tritum ex melle inunctum.*

*Omphacium impositum.*

*Squama æris illita.*

*Rubigo ferri illita.*

*Chalcitis inuncta.*

*Hematites lapis melle exceptus adhibitus.*

Ad palpebrarum inflammationes.

*Amaraci folia cum polenta illita.*

*Alsine cum polenta imposita.*

*Ricini folia cum polenta trita, & emplastri modo adhibita.*

Ad minuendam palpebrarum crassitiem.

*Mitulorum cinis plumbi modo lotus, & illitus.*

*Conchulæ Indicæ cinis inunctus.*

Ad palpebrarum scabiem.

*Capræ succus cum pari spodio impositus.*

*Aloë illita.*

*Fici lac inunctum.*

Ad oculorum albugines.

*Opobalsamum illitum, instillatumq;.*

*Cancamum uino maceratum, & impositum.*

*Myrrha illita.*

*Bitumen naphtha impositum.*

*Mitulorum cinis plumbi modo lotus & illitus.*

*Conchulæ Indicæ cinis oculis inditus.*

*Cochlearum putaminum cinis melle exceptus linitus.*

*Marini scorpionis fel instillatum.*

*Idemq; præstat fel testudinis, perdices, aquila.*

*gallinæ albæ, & sylvestris capræ.*

*Urina humana areo uase decocta illita.*

*Lactuca sylvestris lacteus succus instillatus.*

*Dracunculi succus immixtus.*

*Ceparum succus perfusus.*

*Gingiber illitus.*

*Chamaesyces succus cum melle inunctus.*

*Argemones folia imposita.*

*Ammoniacum impositum.*

*Horminum ex melle impositum.*

*Loti domestici succus ex melle illitus.*

*Sal impositum.*

*Salis flos eodem modo adhibitus.*

*Sapphyrus lapis appositus.*

*Æris squama imposita.*

Ad oculorum cicatrices delendas.

*Cancamum uino maceratum, & infusum.*

*Myrrha illita.*

*Bitumen naphtha instillatum.*

*Cedria illita.*

*Cochlearum*



# OCVLORVM

Cochlearum terrestrium cinis cum melle impositus.  
 Vrina humana areo uase decocta, infusa.  
 Fœni graci oleum cum myrteo impositum.  
 Sagapenum inditum.  
 Chamæsyces succus cum melle illitus.  
 Aerugo immissa.  
 Vini fex adusta imposita.  
 Corallium tritum inditum.  
 Hematites lapis immixtus.  
 Sapphyrus lapis adhibitus.  
 Cochleæ terrestres cum suo putamine ustæ, & ex melle impositæ.

Ad oculorum nebulas.

Acori succus instillatus.  
 Casia alijs medicamentis ocularibus excepta, et iniecta.  
 Cinnamomum impositum.  
 Cerasi gummi inditum.  
 Acacalis dilutum ad collyria additur, quæ oculis claritatem faciunt.  
 Acaciæ succus elotus, & infusus.  
 Pliniorum malorum cytini tres quatuor minimi deo rati integro anno, ab omni lippitudine præseruant.  
 Thus immixtum.  
 Crocomagma illitum.  
 Ebeni tenuissima ramenta uino optimo macerata, & in collyria addita.  
 Lycium inditum.  
 Cedria inuncta.  
 Pruni arboris gummi illitum.  
 Vipere caro decocta, & in cibis desumpta.  
 Hirundines ficedularum modo in cibis deuorata.  
 Cinis hirundinum collyrijs adhibitus.  
 Adeps piscium inunctus.  
 Fœniculi succus infusus.

F E L {  
 Marini Scorpionis  
 Marine Testudinis  
 Perdicis  
 Aquilæ  
 Gallinæ albæ  
 Syluestris Capræ } infusum.

Vrina humana areo uase decocta instillata.  
 Lactucæ syluestris lacteus succus illitus.  
 Dracunculi ma. rad. succus inunctus.  
 Ceparum succus inditus.  
 Loti domestici succus infusus.  
 Hirundinaria ma. succus areo uase cum melle decoctus inunctus.  
 Othomæ succus instillatus.  
 Centaurij minoris succus impositus.  
 Ruta in cibis sumpta.  
 Omphacium instillatum.  
 Panaces Herac. inunctum.  
 Libanotis foliorum, & radices succus infusus cum melle.  
 Laser ex melle inunctus.  
 Apiastris succus cum melle inditus.  
 Marrubij succus ex melle illitus.  
 Pumex indita.  
 Calis flos immixtus.  
 Vini fex cremata imposita.  
 Pyrites lapis inditus.  
 Thyites lapis impositus.  
 Geodes lapis impositus.

# OCVLORVM

Sapphyrus lapis impositus.  
 Ad oculorum ungulas.  
 Sepiæ piscis os tritum & impositum.  
 Glycyrrizæ radices puluis inpersus.  
 Ad oculorum ictus, & recentia uulnera.  
 Lac humanum cum thure iniectum.

Sanguis {  
 Palumbi  
 Columbæ  
 Turturis  
 Perdici } illitus.

Stæbis folia emplastri modo imposita.  
 Hematites lapis cum lacte iniectus.

Ad oculorum ulcera.

Fuligo {  
 Thuris  
 Terebinthinæ  
 Butyri } illita.

Thuris cortex impositus.  
 Myrrha iniecta.  
 Cornu ceruinum ustum impositum lotum.  
 Amylum linitum, & peculiariter canis ulceribus.  
 Stimmi iniectum.

Lapis {  
 Galactites  
 Sapphyrus  
 Samius } cum lacte infusus  
 Ad erosos oculorum angulos.

Oesypum inunctum.  
 Omphacium illitum.

Ad oculorum sinus & ægilopas.

Iuglandium ueterum nuclei triti, & illiti.  
 Myrti decoctum infusum.  
 Malua cruda commaducata cum exiguo sale adhibita.  
 Plantago emplastri modo imposita.  
 Auricula muris altera illita.  
 Baccharis folia emplastri modo in principio indita.  
 Anthemis illita.  
 Solani hortulani concisa folia imposita.  
 Eiusdem succus cum rubenti gallinarum fimo illitus.  
 Aegilops adhibita.  
 Oenanthes. v. labruscæ flos impositus.  
 Cadmia illita.  
 Aeris squama indita.  
 Stimmi inditum.

Ad procidentes oculos, & uuas.

Fabarum farina cum rosas, ouorum albo, & thure emplastri modo imposita.  
 Rubi folia trita, & imposita.  
 Sapphyrus lapis adhibitus.

Ad oculorum inflammationes.

Amomum ex uua passa illitum.

Fuligo {  
 Thuris  
 Picis } illita.

Cupressi pilulæ cum polenta illitæ.  
 Myrti baccae cum polline polente impositæ.  
 Cotoneorum malorum flores emplastri modo.  
 Caseus illitus.  
 Saccharum infusum.  
 Sesamæ herba ex uino decocta, & imposita.  
 Portulaca cum polenta illita.  
 Intybus per se, & cum polenta adhibita.  
 Cucurbitæ ramenta imposita.  
 Anemones radix illita.

Auricula muris cum polenta emplastri modo adhibita.

d Gentianæ

*Gentianæ succus inunctus.*  
*Abrotanum cum cydonio malo decoctum, aut pane,*  
*& emplastri modo adhibitum.*  
*Melilotus cataplasmatibus addita.*  
*Baccharis folia illita.*  
*Sedi maioris folia imposita.*  
*Apium cum pane, aut polenta impositum.*  
*Rubi Idei flos ex melle inunctus.*  
*Elatinæ folia cum polenta imposita.*  
*Papaueris liquor cum tosto oui vitello, & croco im-*  
*positus.*  
*Hyoscyami semen, & folia cum farina, polentaue im-*  
*posita.*  
*Mandragoræ folia recentia cum polenta adhibita.*  
*Verbasci aureum florem ferentis folia imposita.*  
*Aster Atticus illitus.*  
*Viole purpureæ folia illita.*  
*Ricini folia cum polenta imposita.*

## Ad oculorum dolores.

*Oui vitellus tostus addito rosaceo, & croco illitus.*  
*Sesamæ herba in uino decocta illita.*  
*Ocimi succus infusus.*  
*Absinthium ex passio decoctum adhibitum.*  
*Ruta cum polenta emplastri modo imposita.*  
*Aconiti pardalianches radix permiscetur ocularijs*  
*medicamentis, quæ doloribus oculorum auxiliatur*  
*Ad lusciosos.*

*Iecoris* { *Caprini* } *emanans succus dum assatur*  
           { *Hyrcini* } *iniectus.*  
*Caprini iecur tostum in cibis sumptum.*  
*Sylvestrium caprarum fel inunctum.*

*Sanguis* { *Palumbi* } *illitus.*  
           { *Columbæ* }  
           { *Turturis* }  
           { *Perdicis* }

## Ad oculorum suffusiones.

*Fel marini scorpionis inditum.*  
*Viperæ adeps admixto cedrino liquore, Attico melle,*  
*& uetere oleo Gal. uerò non probat.*

**FEL** { *Testudinis marinæ* }  
           { *Perdicis* } *illitum.*  
           { *Aquila* }  
           { *Gallinæ albæ* }  
           { *Capræ sylvestris* }

*Fabarum farina uino macerata, & illita.*  
*Cæparum succus instillatus.*  
*Cyclamini succus infusus.*  
*Sagapenum impositum.*  
*Euphorbium impositum, cum cautela tamen.]*

## Ad oculorum hebetudinem.

*Cancamum ex uino maceratum infusum.*  
*Populi albæ pilula, quæ primo foliorum exortu exili-*  
*unt ex melle illita.*  
*Marini scorpionis fel inunctum.*  
*Brassica in cibo sumpta.*  
*Sinapi cum melle inunctum.*  
*Anagallidis succus naribus exceptus.]*  
*Absinthium cum melle impositum.*  
*Thymus in cibo sumptus.*  
*Thymbra obsonijs addita.*  
*Rutæ succus in malicorio seruefactus, addito feniculi*  
*succo & melle infusus.*

*Rutæ sylvestris succus cum uino, melle, gallinaceorum*  
*felle, & feniculi succo iniectus.*  
*Solani somnifici succus inunctus.*  
*Flos salis inditus.*

## Ad oculorum fluxiones cohibendas.

*Crocum illitum cum humano lacte.*  
*Thus ex oui vitello impositum, uel eiusdem albo.*  
*Turis fuligo imposita.*  
*Picis fuligo illita.*  
*Platani tenerrima folia in uino decocta, & illita.*  
*Ebeniamenta tenuissimè trita indita.*  
*Oleæ sylvestris foliorum succus iniectus.*  
*Corui ceruinum ustum, lotum, & iniectum.*  
*Butyri fuligo illita.*  
*Amylum impositum.*  
*Pompholis elota iniecta.*  
*Fabæ sine cortice commanducate, & fronti impositæ.*  
*Ocimi aquatici semen duarum drachmarum pondere*  
*ex quatuor mellis cyathis temperatum, inunctum.*  
*Elatinæ folia cum polenta imposita.*  
*Squama aris elota iniecta.*  
*Plumbum elotum iniectum.*

*Galactites* }  
*Morochthus* } *Lapis cum lacte iniectus.*  
*Samius* }  
*Hyoscyami sem. cremor expressus infusus.*  
*Sarcocolla infusa.*  
*Alumen impositum.*  
*Corallium iniectum.*  
*Pumex impositus.*  
*Hamatites lapis iniectus.*

## Ad oculorum lippitudines.

*Portulaca, & eius succus impositus.*  
*Plantaginis succus infusus.*  
*Sedi maioris folia illita.*  
*Chalcitis inditus, cum cautela tamen.*  
*Spongiarum crematarum cinis illitus, & præsertim in*  
*arida lippitudine.*  
*Hamatites lapis tritus, cum lacte iniectus.*

## Ad oculorum caligines.

*Chamadrys trita inaspera, aut ex oleo inuncta.*  
*Loti domestici succus cum melle impositus.*  
*Veratrum nigrum in ocularibus collyrijs additum.*  
*Flos aris inditus.*

## A V R I V M.

## Ad aurium dolores.

*Lauri baccarum succus uino uetere, & rosaceo exce-*  
*ptus instillatus.*  
*Populeorum foliorum succus infusus.*  
*Ladanum ex uino illitum.*  
*Rosarum aridarum decoctum ex uino infusum.*  
*Salicis foliorum, & corticis succus cum rosaceo in ma-*  
*licorio seruefactus illitus.*  
*Malorum acidorum puniceorum succus cum melle co-*  
*ctus infusus.*  
*Opium cum amygdalino oleo, croco myrrhaq; iniectum.*  
*Anguium senecta in uino decocta instillata.*  
*Millepedæ siue onisci concisi, & cum rosaceo in mali-*  
*corio calefacti infusi.*  
*Vulpini pulmonis adeps instillatus.]*



*Vermes terreni cum anserino adipe elixi inditi.*

*Anserinus*  
*Gallinaceus*  
*Vulpinus* } *adeps instillatus.*

*Vrina* { *Tauri*  
          *Apri* } *cum myrrha cocta instillata.*

*Mel cum trito fossili sale infusum.*

*Sesami semen ex rosaceo iniectum.*

*Bete succus inditus.*

*Plantaginis succus immixtus in calida materia.*

*Cucurbitæ ramentorum succus cum rosaceo infusus.*

*Dracunculi utriusque succus instillatus.*

*Porri succus cum aceto, thure, & lacte iniectus.*

*Sinapis succus, uel eius decoctum instillatum.*

*Hedere, & eius corymborum succus cum oleo inditus*

*Absinthium suffitum, & cum melle impositum.*

*Origani uirentis succus cum lacte infusus.*

*Menthæ succus inditus.*

*Meliloti succus cum passo iniectus.*

*Rutæ succus in malicorio feruesfactus infusus.*

*Peucedani succus cum rosaceo inditus.*

*Aparinæ succus iniectus.*

*Marrubij succus in rosaceo instillatus.*

*Cannabis domesticæ succus impositus.*

*Polygoni maris succus infusus.*

*Helxinæ succus inditus.*

*Ocimi aquatici succus cum sulphure, & nitro iniectus*

*Hyoscyami seminis cremor instillatus.*

*Solani hortensis succus impositus.*

*Alsinæ succus infusus.*

*Cucumeris asinini foliorum succus inditus.*

*Sal cum aceto iniectum.*

*Ad aurium internas inflammationes.*

*Crocum iniectum.*

*Sesamum cum rosaceo impositum.*

*Ad aurium parotidas.*

*Oesypum impositum.*

*Caprarum motanarum fimus, uino uel aceto decoctus illitus.*

*Lini semen tritum, & emplastri modo impositum.*

*Fabarum farina cum melle, & sæno græco illita.*

*Rumex decoctus adhibitus.*

*Plantago emplastri modo illita.*

*Irionis semen tusum decoctumq; appositum.*

*Hyssopum suffitum incensum, & impositum.*

*Viscum cum pari resina, ac ceræ comistum adhibitum.*

*Althæa decocta illita.*

*Psyllium ex rosaceo, acetoq; aut aqua impositum.*

*Solani hortulani folia cum sale illita.*

*Galiopsis ex aceto adhibita.*

*Cimolia terra imposita.*

*Ad purulentas aures.*

*Myrrha cum meconio, castoreo, & glaucio iniecta.*

*Thus ex uino dulci infusum.*

*Resina* { *Terebinthina*  
          *Larigna*  
          *Abiegna*  
          *Picea* } *ex melle, & oleo indita.*

*Lycium infusum.*

*Rhois decoctum iniectum.*

*Myrti baccarum succus instillatus.*

*Oleæ sylvestris foliorum succus ex uino infusus.*

*Taurinum fel cum caprillo, humanæ lacte instillatæ.*

*Vrina infusa.*

*Umbilicus Veneris cum medulla ceruina iniectus.*

*Asphodeli radicum succus per se, & additis thure, mel le, uino, & myrrha instillatus.*

*Capæ succus impositus.*

*Absinthium cum melle inditum.*

*Anisum cum rosaceo instillatum.*

*Sphondilij florum succus instillatus.*

*Polygoni succus infusus.*

*Stæbis decoctum iniectum.*

*Psyllij succus inditus.*

*Omphacium cum melle impositum.*

*Alumen sanguinalis herbæ succo exceptum infusum.*

*Flos salis iniectus.*

*Ad contusas aures.*

*Bulbi cum polenta impositi.*

*Sulphur cum uino, & melle illitum.*

*Ad exulceratas aures.*

*Oesypum impositum.*

*Suillum fel instillatum.*

*Ad aurium surditatem.*

*Hastulæ regie radicum ex oleo decoctum iniectum.*

*Capæ succus instillatus.*

*Veratrum nigrum immixtum, & relictum usque in diē tertium.*

*Bryoniæ succus cum melle instillatus.*

*Flos aris candidus per fistulam flatu impulsus.*

*Sulphur raptim per fistulam suffitum.*

*Ad aurium tinnitum, & incertos sonos.*

*Cedria infusa.*

*Lauri baccarum succus cum uino uetere, & rosaceo instillatus.*

*Ficus siccæ tritæ cum sinapi, & liquore aliquo excepta iniecta.*

*Taurinum fel infusum.*

*Mel cum trito fossili sale inditum.*

*Porri succus cum thure, aceto, lacte q; instillatus.*

*Capæ succus impositus.*

*Sinapi tritum, & cum fico iniectum.*

*Acetum calidum suffitum per traiectorium instrumentum.*

*Ad uermiculosas aures.*

*Cedria cum aceto instillata.*

*Vrina humana in malicorio decocta instillata.*

*Capparis radices succus iniectus.*

*Calaminthæ succus instillatus.*

*Psyllij succus inditus.*

*Acetum infusum.*

## N A R I V M.

*Ad sanguinis narium fluxiones.*

*Thus in puluerem tritum iniectum.*

*Cochleæ terrestres cum suo putamine tritæ, & impositæ.*

*Porri seminis succus cum thuris polline instillatus.*

*Ruta trita indita.*

*Vrticæ utriusque folia cum succo imposita.*

*Cuminum ex aceto impositum.*

*Ferulæ medulla intronissa.*

*Lysimachia imposita.*

*Clymeni succus inditus.*

*Galiopsis flos impositus.*

*Equiseti succus infusus.*

*Acetum tum potum, tum iniectum.*  
*Stratiotes adhibita.*  
*Chalcitis succo porri instillata.*  
 Ad sanguinem e naribus eliciendum.  
*Crocodilij radice decoctum bibitum.*  
 Ad narium polypum.  
*Cupressi pilula cum fico tusa, & imposita.*  
*Dracunculi maioris radix imposita.*  
*Lasertij liquor cum calcantho, aut rasili ærugine it-*  
*litus, forcipe prius exciso polypo.*  
*Flos æris inditus.*  
*Sandaracha cum rosaceo immissa.*  
 Ad narium ulcera & carcinomata.  
*Dracunculi maioris radix imposita.*  
*Hederæ succus infusus.*  
*Sandaracha cum rosaceo iniecta.*  
 Ad narium tedia.  
*Hederæ succus infusus.*  
 Ad narium distillationes.  
*Melanthij semen tritum, & in linteolo colligatum, sæ-*  
*pè ac sæpius olfactum.*  
 Ad trahendum per nares.  
*Capæ succus infusus.*  
*Origani utriusque succus iniectus cum Irmo unguento*  
*Cyclamini maioris succus instillatus.*  
 Ad cienda sternutamenta.  
*Fibrorum testiculi iniecti.*  
*Ocimi semen, aut succus naribus infusa.*  
*Sinapi tritum inditum.*  
*Ranunculi radix sicca, tritaq; iniecta.*  
*Ptarmicæ flores olfacti.*  
*Struthij radix imposita.*  
*Veratrum album tritum iniectum.*

## O R I S E T L I N G V A E.

Ad erodantia ulcera.

*Cyperij radice farina in os indita, etiam si ulcera depa-*  
*scantur, uorentq;.*  
*Aspalathi ex uino decoctum ore collutum, ad tetra-*  
*oris ulcera.*  
*Acacia indita.*  
*Plantaginis succus in ore detentus.*  
*Capparis in aceto decocta in collutione.*  
*Glycyrrhizæ succus in ore detentus.*  
*Origani succus in ore contentus.*  
*Leucoij flores ex melle impositi.*  
*Testiculus serapias impositus.*  
*Anthemis mansa.*  
*Britanica succus infusus.*  
*Tribuli succus ex melle delinctus.*  
*Rubi decoctum in ore detentum.*  
*Quinquefolij radice decoctum ore collutum.*  
*Verbenaca altera ex uino affusa.*  
*Staphis agria cum melle indita.*  
*Labruscæ flos ori inspersus.*  
*Alumen cum melle impositum.*  
*Sal cum polenta tostum, & iniectum.*  
 Ad oris halitum commendandum.  
*Resina lentiscina manducata.*  
*Myrrha mansa.*  
*Mala medica manducata.*

*Anisum mansum.*  
*Bromus cum siccis rosas decoctas, in ore retenta.*  
 Ad linguæ scabritiem.  
*Mentha confricata.*  
*Rhois semen cum melle fricatum.*

## D E N T I V M.

Ad dentes purgandos

Cinis	{	Purpure	}	dentibus affrica-
		Buccine		
		Mitulorum		
		Conchulæ Indicæ		
		Coclearum terrestrium		
		Sepiæ piscis		
		Cervini cornu		tus.

*Plantaginis radice decoctum in collutionibus.*  
*Aristolochia rotunda confricata.*  
*Alcyonium quintum*  
*Pumex*  
*Arabicus lapis*  
*Samius lapis*  
 } denti affricata.

Ad dentium dolorem.

*Piceæ, & pini folia trita ex aceto decocta frequenti*  
*collutione.*  
*Cedria dentium cauis indita.*  
*Platani corticis ex aceto decoctum ore collutum.*  
*Tamaricis foliorum ex uino decoctum in ore detentum.*  
*Olei amurca in cupreo nase ad mellis crassitem deco-*  
*cta ex aceto, aut uino, aut mulso colluta.*  
*Mori corticis decoctum, aut pariter foliorum in collu-*  
*tionibus adhibitur.*  
*Ficulneum lac lana exceptum, & cauis dentib. inditum.*  
*Anguium senecta ex aceto decocta in collutionibus.*  
*Pastinaca piscis aculeus in eius cauda prominens, den-*  
*tibus adhibetur.*  
*Ranarum ex aqua, et aceto decoctum in collutionibus.*  
*Lacerta iecur cauis dentium impositum.*  
*Vermes terreni oleo elixi, et in contrariâ aurè instillati.*  
*Rumicis decoctum in collutionibus*  
*Asparagi radicum decoctum in ore contentum.*  
*Asphodeli radicum succus in contrariâ aurè infusus.*  
*Allij, tede, thurisq; simul decoctum in ore contentum.*  
*Ononis radice ex posca decoctum in collutionibus.*  
*Capparis seminis decoctum in collutionibus.*  
*Idem præstat Capparis cortex. Quin & radix com-*  
*manducata.*  
*Lepidij (ut aiunt) radix collo suspensa.*  
*Ranunculi radix imposita.*  
*Anagallidis succus in contrariâ nariū partē infusus.*  
*Hederæ corymborum acini quinq; cum rosaceo in ma-*  
*licorio seruesacti in contrariam aurem instillati.*  
*Chamæleonis nigri decoctum in ore contentum.*  
*Spine albæ decoctum in collutionibus.*  
*Leucacanthæ radix commanducata.*  
*Absinthij decoctum suffitum.*  
*Hyssopi ex aceto decoctum in ore retentum.*  
*Panaces heracleum dentium cauis inditum.*  
*Pyrethri decoctum ex aceto in ore acceptum.*  
*Peucedani succus cauis dentium inditus.*  
*Nigellæ decoctum, unâ cū tede ex aceto in ore detentum.*  
*Lasertij liquor cauis dentium impositus.*  
*Galbanum illitum, & eorum cauis inditum.*



# DENTIVM.

*Apiastri decoctum in collutionibus.*  
*Althææ decoctum ex aceto in ore detentum.*  
*Betonicæ decoctum ex uino, uel aceto.*  
*Clematis prima commanducata.*  
*Polemonij radix commanducata.*  
*Quinquesolij radice decoctum in ore retentum.*  
*Hyoscyami radice ex aceto decoctum in collutionibus.*  
*Solani somnifici ex uino decoctum in ore retentum.*  
*Ephemerij radice decoctum in collutionibus.*  
*Verbasci decoctum collutum.*  
*Arctij ex uino decoctum, & in ore detenta.*  
*Cucumeris sylvestris decoctum in os sumptum.*  
*Colocynthidis decoctum in collutionibus.*  
*Staphis agriæ decoctum ex aceto in ore contentum.*  
*Tithymali caraciæ lac dentium cauernis inditum, den-*  
*te prius cera munito, ne lac in fauces incidat.*  
*Acetum calefactum in collutionibus.*  
*Sory dentium canis inditum.*  
*Ad dentes cariosos frangendos.*  
*Cedria eorum cavitatibus indita.*  
*Amurca olei cū omphacio recocta ad mellis crassitu-*  
*dinem, & imposita.*  
*Pastinacæ piscis aculeus impositus.*  
*Ranunculi radix iniecta eorum cavitatibus.*  
*Chamæleonis nigri radix cauernis dentium indita.*  
*Ad firmandos commotos dentes.*  
*Lentisci decoctum in ore retentum.*  
*Colymbadum muria in collutionibus adhibita.*  
*Sylvestris oleæ oleum in ore contentum.*  
*Sory in collutionibus.*  
*Alumen cum aceto, & melle solutum, & adhibitur.*  
*Ad dentium torporem.*  
*Portulaca manducata.*  
*Ad fluidas gingiuas.*  
*Cyperij farina imposita.*  
*Rosarum aridarum ex uino decoctarum expressus li-*  
*quor, in collutionibus impositus.*  
*Colymbadum muria in ore contenta.*  
*Oleum sylvestris oleæ in ore detentum.*  
*Galle quoquo modo adhibita.*  
*Mali punici florentes cytini in decoctis macerati, & in*  
*collutionibus additi.*  
*Prunorum foliorum decoctum in ore retentum.*  
*Lac asininum in collutionibus.*  
*Pulegium siccatum, crematumq; & in puluerem tri-*  
*tum appositum.*  
*Rubi decoctum in ore detentum.*  
*Staphis agriæ decoctum in collutionibus.*  
*Omphacium cum melle impositum.*  
*Acetum in collutionibus adhibitur.*  
*Rubigo ferri illita.*  
*Alumen quocunque modo adhibetur.*  
*Sal tostum cum polenta impositum.*  
*Alabastrites*  
*Smyris*  
*} Lapis tritus impositus.*  
*Ad Erosas putridasq; gingiuas.*  
*Cancanum impositum, nihilq; eo efficacius.*  
*Lycium attritum impositum.*  
*Plantaginis succus in ore detentus.*  
*Aloe ex uino, & melle illita.*  
*Tribuli utriusque fructus ex melle impositus.*  
*Labruscæ florum combustorum cinis cum melle illitus.*

# DENTIVM.

*Acetum in collutionibus.*  
*Chalcitis*  
*Alumen*  
*Pumex*  
*Aerugo*  
*} trita, & imposita.*

## GVTTVRIS ET GVLAÆ.

### Ad Anginam.

*Pix liquida peruncta.*  
*Mori fructus, succus in æreo uase decoctus, insolatusq;*  
*cum mellis exiguo illitus.*  
*Multipedæ siue Oroscij ex melle inuncti.*  
*Cinis crematarum hyrundinum ex melle more empla-*  
*stri adhibitus.*  
*Hyruindines sale inueteratæ drach.i. pondere cum a-*  
*qua pota.*  
*Fel taurinum cum melle inunctum.*  
*Fel testudinis illitum.*  
*Acetum gargarizatum.*  
*Mel gargarizatum.*  
*Cape succus inunctus.*  
*Piper cum melle inunctum.*  
*Absinthium cum melle, & nitro illitum.*  
*Raphani semen ex aceto mulso gargarizatum.*  
*Hyssopi cum fico decoctum gargarizatum.*  
*Lasertij liquor cum mulsâ aqua gargarizatus.*  
*Viola purpureæ ex aqua cocta, & pota.*  
*Elaterium efficacissimè illinitur cū melle, uetere oleo,*  
*aut felle taurino.*  
*Sal ex melle, oleo, & aceto illitum.*  
*Spartij succus è ramis in aqua maceratis, et mox tufis,*  
*extractus, & illitus.*

### Ad Gutturis inflammationes.

*Cinis crematarum hyrundinum ex melle more empla-*  
*stri applicitus.*  
*Lac gargarizatum.*  
*Ranæ oleo elixæ ceruicis & colli abscessibus illita.*  
*Mel illitum.*  
*Origani uirentis succus gargarizatus.*  
*Helxine succus gargarizatus, forisq; inunctus.*  
*Vrticæ utriusque succus gargarizatus.*  
*Chalcitis imposita.*  
*Alumen illitum.*  
*Sal tostum cum melle inunctum.*  
*Acetum gargarizatum.*  
*Aloe cum uino aut melle apposita.*  
*Britannicæ succus.*  
*Tribuli fructus ex melle impositus.*  
*Rubi mororum succus gargarizatus.*  
*Ficum siccatum decoctum gargarizatum.*  
*Ad columellam reprimendam.*  
*Lasertij liquor cum melle inunctus.*  
*Pruni foliorum ex uino decoctum gargarizatum.*  
*Omphacium impositum.*  
*Acetum gargarizatum.*  
*Flos aris in puluerem subtilissimum impositus.*

### Ad Gulæ destillationes.

*Papaueris uasculorū decoctum ex melle in eclegmatis*  
*forma redactum, sepiusq; linctum.*  
*Acetum gargarizatum.*  
*Bdellium cum ieiuna salina dilutum, & illitum.*



## GUTTURIS ET GVLAE.

*Verbenaca altera ex uino gargarizata.*  
*Omphacium impositum.*  
*Flos æris puluerizatus, & impositus.*  
*Alumen impositum.*  
*Acetum gargarizatum.*  
 Ad Faucium & Tracheæ arteriæ asperitates.  
*Myrrha linguae subdita, ibique liquata.*  
*Ptisana hordeacea gargarizata.*  
*Amylum delinctum.*  
*Sinapis succus gargarizatus.*  
*Glycyrrhizæ succus linguae subditus*  
*Tragacantha in eclegmate cum melle sumpta.*  
*Lasertij liquor aqua dilutus in delinctu.*  
*Symphytum petraeum commanducatum.*  
*Quinquefolij radice decoctum gargarizatum.*  
*Aethiopis cum melle in eclegmate.*  
*Lac gargarizatum.*  
*Licium attritum, & delinctum.*

## PECTORIS ET PVLMONIS.

Ad cruenta sputa & sanguinis reiectiones.  
*Ouum tepidum bibitum.*  
*Cornu ceruini cinis lotus, & ebibitus cū tragacantha.*  
*Climenum potum.*  
*Serpilli succus drachmarum duarum pondere cū acetoto potus.*  
*Fimum caprinum tritum, in uino, aquaue potum.*  
*Triticea farina glutinis modo elixa, in delinctu data.*  
*Amylum potum.*  
*Ferulae uiridis medulla pota.*  
*Portulaca ad summum costa deuorata.*  
*Plantago quoquo modo exhibita, praesertim succus.*  
*Eiusdem semen potum.*  
*Porri semen drachmarum duarum pondere cum paribus myrti baccis.*  
*Agaricus triū obolorū pōdere cū aqua mulsa potus.*  
*Rhaponticum haustum.*  
*Lysimachiae succus haustus, & perfusus.*  
*Centaurij maioris radix pota.*  
*Spinae albae radix hausta.*  
*Arabicae spinae radix pota.*  
*Aloe cochlearium duorum pondere cum frigida aqua uel sero pota.*  
*Polygoni maris succus potus.*  
*Salviae succus in orbiculos cōcretus cū melle sumptus.*  
*Symphytum petraeum cum aqua potum.*  
*Menthae succus cum aceto potus.*  
*Althaeae decoctum potum.*  
*Betonicae folia triū obolorum pōdere in diluta uini portione hausta.*  
*Symphyti alterius radix pota.*  
*Achillea hausta.*  
*Tragacacumina decem in uino bibita.*  
*Personata radix cum pineis nucibus pota.*  
*Isopyri semen potum.*  
*Adiantum potum.*  
*Trichomanes pota.*  
*Vitis uiniferae foliorum, & capreolorū succus haustus.*  
*Labruscae flores poti.*  
*Omphacium parce potum.*  
*Corallium haustum.*

## PETORIS ET PVLMONIS.

*Hematites lapis*  
*Morochthus lapis* } cum mali punici succo pota.  
*Sannia terra*  
 Ad Phthisim, seu Tabem.  
*Pistacia*  
*Pinea uices* } per se, aut ex melle sumpta  
*Terebinthina resina* per se, uel ex melle more eclegmatis deuorata.  
*Pix liquida in eclegmate ex melle cyathi mensura deuorata.*  
*Iuniperi baccæ haustæ.*  
*Lauri baccæ trita cum melle uel passo, deuorata.*  
*Ficus sicca cum hyssopo seruata, & pota.*  
*Cancris fluuiatiles elixi cum suo iure sumpti.*  
*Lac humanum ex ubere suctum.*  
*Ius esculentum omnium adipum datum.*  
*Plantago in potu exhibita.*  
*Porrum cum melle decoctum.*  
*Agaricus drachma pondere sumptus cum passo.*  
*Acanthi radices pota.*  
*Marrubij folia, sine expressus succus potus.*  
*Betonicae folia cum melle data.*  
*Myrrhis in sorbitione pota.*  
*Asi lapidis flos ex melle delinctus.*  
 Ad pulmonis abscessus.  
*Semen cyclaminis secundæ speciei quadraginta diebus potum.*  
*Tragoriganum cum melle in eclegmate exhibitum.*  
*Tussilaginis sicca incensa; fumus ore haustus, apostemata interna pectoris rumpit.*  
 Ad suspiriosos.  
*Lauri baccæ trita cum melle, uel passo, & exhibita.*  
*Ficus sicca cum hyssopo decocta, & pota.*  
*Vulpinus pulmo exiccatus bibitus.*  
*Ius senum gallorum potum.*  
*Vinum hyssopites bibitum.*  
*Plantago cum lenticula decocta comesta.*  
*Rhaponticum bibitum.*  
*Aqua mulsa pota.*  
*Aristolochia rotunda bibita.*  
*Centaurij maioris radix pota.*  
*Hyssopum decoctum cum fico, aqua, melle, rutaq; potum.*  
*Stachas ex aqua decocta pota.*  
*Pulegium cum melle, & aloe potum.*  
*Scylla ex melle triū obolorum pondere delincta.*  
*Thymi cum melle decoctum potum.*  
*Satureia eodem modo pota.*  
*Baccharis radice decoctum potum.*  
*Ruta pota.*  
*Peucedani succus in ouo sumptus.*  
*Nigella in uino pota.*  
*Galbanum deglutitum.*  
*Marrubij decoctum, siue expressus succus potus.*  
*Parthenium ex oxymelite sumptum.*  
*Anagyris folia cum passo bibita.*  
*Periclymeni semen potum cum uino.*  
*Adianti decoctum potum.*  
*Fidicula siue Trichomanes hausta.*  
*Elaterium optima suspiriosis est purgatio.*  
*Thapsiae succus exhibitus.*  
*Bryonia cum melle in eclegmate sumpta.*  
*Sandaracha cum resina in catapotijs data.*



## PECTORIS ET PVLMONIS.

*Sulphur in ouo sumptum, uel suffitum.*

*Agaricum drachmæ unius pondere datum.*

*Cancanum haustum ex aqua uel mulso.*

*Ad Tussim.*

*Iris Illyrica assumpta.*

*Cardamomum ex aqua potum.*

*Cinnamomum deuoratum, uel potum.*

*Calamus odoratus suffitus per se, uel ex resina terebinthina.*

*Helenij eclegma ex melle deglutitum.*

*Myrrha ad quantitatem fabæ deuorata.*

*Styrax*

*Bdellium } data in eclegmate.*

*Terebinthina resina ex se, uel ex melle eclegma delinctum.*

*Mastix pota.*

*Iuniperi baccae bibite.*

*Cedri fructus deuorati.*

*Paliuri semen potum.*

*Ladanum in medicamentis, & malagmatibus insertum.*

*Cerasi gummi cum uino diluto exhaustum.*

*Amygdala amara cum melle, & lacte in illinctu data.*

*Gummi amygdalarum amararum cum uino diluto potum.*

*Nuces auellanae cum aqua mulsa pota.*

*Ficus siccae deuorata.*

*Camedryi decoctum potum.*

*Scordium potum.*

*Tussilago sicca sumpta, siue incensa, accepto fumo per os.*

*Propolis suffita.*

*Mel deglutitum.*

*Farina tritici glutinis modo elixa, & ad lingendum cum mentha, & butyro data.*

*Farinae auenae cremor in sorbitione receptus.*

*Semen lini cum melle, & pipere sumptum.*

*Faba in cibis accepta.*

*Raphanus elixus manducatus, praesertim in uetere tussi.*

*Dracunculi maioris radix tosta, & elixa deuorata.*

*Asphodeli radix trium drachmarum pondere pota.*

*Allium crudum, & coctum assumptum in uetere tussi.*

*Irionis semen cum melle linctum.*

*Piper delinctu acceptum.*

*Scilla cum melle in eclegmate in diutinis tussibus.*

*Centaurij maioris radix hausta, in antiqua.*

*Tragacantha in eclegmate cum melle.*

*Hyssopum cum melle, fico, rutaq; ex aqua decoctum.*

*Stachas eodem modo parata.*

*Origanum in eclegmate cum melle linctum.*

*Tragoriganum eodem modo paratum.*

*Baccharis radicum decoctum potum, in diutina.*

*Panaces cum uino dulci potum.*

*Seselis massiliensis radix, & semen haustum.*

*Smyrni radix comesta.*

*Dauci semen potum, in diutina.*

*Pencedani succus in ouo sumptus.*

*Lasertij liquor in sorbili ouo datus.*

*Marrubij decoctum, sine expressus succus bibitus.*

*Galbanum deglutitum, in uetere.*

*Sagapenum deuoratum, in diutina.*

*Helsinae succus cyathi pondere bibitus, in diutina.*

*Equiseti radix, & herba pota.*

## PECTORIS ET PVLMONIS.

*Iunci decoctum bibitum.*

*Papaueris uascula in aqua ad dimidium decocta, decoctaq; addito melle, ut eclegma fiat ad lingendum.*

*Hyosciami semen potum.*

*Verbasci decoctum potum, in antiqua.*

*Cacalia radix uino madefacta comesta.*

*Bryonia cum melle in eclegmate delincta.*

*Vua passæ albæ caro exiccata deuorata.*

*Aqua mulsa pota.*

*Thapsia illita.*

*Vinum hyssopites bibitum*

*Sandaracha suffita cum resina, accepto uapore per fistulam uel traiectorium.*

*Sulphur in ouo sumptum, uel suffitum.*

*Ad pectoris asperitates.*

*Glycyrrhizæ succus in ore retentus quousque collique scat.*

*Radix cacalidæ in uino madefacta, & delincta.*

*Ad vocem expediendam.*

*Myrrha linguae subdita, quousque tota lique scat.*

*Tragacantha ex melle in delinctu adhibita.*

*Lasæ aqua dilutum, & in sorbitione sumptum.*

*Styrax delinctus.*

*Brassica commanducata.*

*Vinum hyssopites.*

*Ad Pleuretim.*

*Suillus adaps ex uino lotus, & cum cinere, & calce coactus impositus.*

*Pastinacæ erratica semen potum.*

*Sagapenum emplastri modo illitum.*

*Ad Lateris dolores ubi febris absit.*

*Fimum caprillum cum cera, et oleo subactum, impositum.*

*Hordeacea farina una cum meliloto, & papauerum uasculis ex mulso elixa, illita.*

*Brassica caules uirides cremati, et suillo adipe excepti, & impositi.*

*Leucacanthæ radicis ex uino decoctum haustum.*

*Asphodeli radix drachmæ pondere ex uino pota.*

*Gentianæ radicum succus drachmæ pondere sumptus.*

*Aristolochia rotunda ex aqua bibita.*

*Centaurij maioris radix pota.*

*Lasæ in sorbitionibus datum.*

*Galbanum illitum.*

*Marrubij folia ex melle adhibita.*

*Trifolij bituminosi folia, semenue potum.*

*Aethiopis pota.*

*Acori decoctum potum.*

*Costus cum absinthio, & uino potus.*

*Agallochum ex aqua potum.*

*Myrrha fabæ pondere deuorata.*

*Bdellium haustum.*

*Resina terebinthina illita, appositae.*

*Bryonia ex melleo eclegmate delincta.*

*Ad Pulmonis inflammationes.*

*Ocimum cum polenta illitum.*

*Vrtica utriusque semen cum melle delinctum.*

*Tragoriganum ex melle in eclegmate sumptum.*

*Chrysocome pota.*

*Aqua mulsa hausta.*

*Ad purulentas excreationes.*

*Irionis semen cum melle delinctum.*

*Betonicae folia drachmarum duarum pondere in aqua mulsa*



## PECTORIS ET PVLMONIS.

*mulsa cyathis quatuor pota.*  
*Personata radix cum pineis nucibus sumpta.*  
*Aethiopis hausta.*  
*Vinum hyssopites.*  
*Sandaracha ex mulso data. (Hoc medicamentum ego nunquam probauerim.)*  
*Sulfur in ouo potum, uel suffitum.*  
*Vinum hyssopites bibitum.*

### Ad astmaticos.

*Lauri baccae ex melle, uel passo acceptae.*  
*Ficus siccae cum hyssopo seruesactae, & potae.*  
*Vrina impubis pota.*  
*Ruta epota.*  
*Cyclamini alterius semen potum.*  
*Dracunculi maioris radix tosta, & elixa cū melle in eclegmate sumpta.*  
*Aqua mulsa pota.*  
*Sphondilij semen, & herba ipsa in sorbitione.*  
*Equiseti radix, & folia hausta.*  
*Abrotoni utriusque semen tritum, & cum aqua potū.*  
*Hyssopum cum fico, melle, rutaq; ex aqua decoctum, potum.*

*Calamyntha decoctum potum.*  
*Vinum hyssopites haustum.*  
*Thymi cum melle decoctum potum.*  
*Satureia cum melle hausta.*  
*Seseli Masiliense potum.*  
*Fidicule siue Trichomanis decoctum bibitum.*  
*Cuminum cum posca sumptum.*  
*Smyrniij radix comesta.*  
*Tapfia illita.*  
*Ammoniacum bibitum.*  
*Melissophylli folia in eclegmate delincta.*  
*Tussilago sicca & suffita, adeo ut fumus in os ingrediatur.*  
*Hippophaesti succus trium obolorum pōdere haustus.*  
*Botrys pota, uel in eclegmate data.*  
*Periclymeni semen potum.*  
*Adianti decoctum bibitum.*

### Ad renitentes excreationes.

*Iris illyrica pota.*  
*Coagulum ferè omne potum.*  
*Raphanus elixus deuoratus.*  
*Porrum cum ptisana coctum, esui datum.*  
*Nasturtium coctum, in sorbitione datum.*  
*Bulbi breui coctura elixi, & in cibum sumpti.*  
*Ammoniacum in eclegmate datum.*  
*Scordium potum.*  
*Thapsia linita.*  
*Lini semen in eclegmate delinctum.*  
*Scilla sicca oboli tres ex melle in eclegmate exhibiti.*  
*Marrubium siccum potum cum iridis farina.*  
*Vinum hyssopites haustum.*

### Ad pectoris destillationes.

*Irionis semen cum melle delinctum.*  
*Ad omnia pectoris incommoda.*  
*Porrum cum melle decoctum comestum.*  
*Glycyrrhizae succus bibitus.*  
*Thymus melli mistus in delinctu sumptus.*  
*Thymbra eodem modo parata.*  
*Tordilij radix in eclegmate cum melle sumpta.*  
*Libanotis radices pota.*

## CORDIS.

*Symphytum petraeum in mulso decoctum bibitum.*  
*Quinquefoij radices succus potus.*

## CORDIS.

### Ad Defectum animi.

*Cucumis olfactus.*  
*Pulegium ex aceto naribus admotum.*  
*Buglossum potum.*

### Ad Cardiacam.

*Intybus per se & cum polenta illita.*  
*Absinthium in passo decoctum, & appositum.*  
*Rubi folia illita.*

### Ad praecordiorum duritiem.

*Rhaponticum potum.*  
*Vinum absinthites potum.*

### Ad Vetusas praecordiorum Inflammationes.

*Scordium cum cera coactum impositum.*

## MAMMARVM.

### Ad Mammarum inflammationes.

*Thus cum cimolia, & rosaceo inunctum.*  
*Cydonia mala cataplasmatibus adiecta, & illita.*  
*Nuces iuglandes cum ruta, & exiguo melle imposita.*  
*Fabarum lomentum per se, & cum polenta illitum.*  
*Asphodeli radices, & folia ex uino adhibita.*  
*Irionis semen illitum.*  
*Hemerocallis radix emplastri modo imposita.*  
*Althaea decocta, & superposita.*  
*Vuarum uinacei cum sale illiti.*  
*Ostracites lapis cum melle impositus.*  
*Geodes lapis cum aqua illitus.*  
*Terra Samia ex rosaceo, & aqua imposita.*

### Ad Rigentes à partu mammas.

*Triticeij furfures ex ruta decocto elixi, & appositi.*  
*Baccharis folia emplastri modo adhibita.*  
*Epimedij folia concisa ex oleo cataplasmatibus addita.*  
*Hyoscyami semen tritum ex uino illitum.*  
*Ricini folia imposita.*  
*Vuarum uinacei cum sale illiti.*

### Ad Mammarum duritiem.

*Erui farina emplastri modo imposita.*  
*Chamaepitys prima ex melle illita.*  
*Vuarum uinacei cum sale triti & impositi.*

### Ad Mammas exulceratas.

*Conchulae Indicae cinis illitus.*  
*Asclepiades herbae radices impositae.*

### Ad Lac in mammis concretum.

*Cerae grumi decē granorū milij magnitudine sumpti.*  
*Fabarum lomentum per se, & cum polenta impositū.*  
*Lentium farina illita.*  
*Apium, & eius succus illitus.*

### Ad extinguendum Lac.

*Cicuta imposita mammis.*

### Ad Lactis ubertatem praestandam.

*Halimi folia in cibis sumpta.*  
*Viticis semen potum.*  
*Ptisana hordeacea cum fœniculi semine cocta, & in cibum sumpta.*  
*Malus decoctum potum.*



## MAMMARVM.

Sonchi succus haustus.  
 Lactuca in cibis recepta.  
 Ocimum deuoratum.  
 Eruca comesta.  
 Anemone & eius caules cum ptisana hordeacea deuorati.  
 Anisum potum.  
 Anei aridi seminis, & coma decoctum haustum.  
 Feniculum in cibo sumptum.  
 Nigella pluribus diebus pota.  
 Circae semen in sorbitione potum.  
 Clematis prima in cibis accepta.  
 Echij radix in sorbitione, uel cum uino hausta.  
 Glaux cum hordeacea farina, sale, & oleo cocta, & deuorata in sorbitione.  
 Polygala pota.  
 Bryonia succus cum tritico coctus, & in cibum sumptus (sed hic prudentia opus est.)  
 Ne Lac in mammis concreascit.  
 Mentha cum polenta imposita.  
 Fax uini cum aceto peruncta.  
 Ad Mammās cohibendas, ne nimis augeantur.  
 Cicuta contrita, & imposita.  
 Cotes naxia illita.

## VENTRICVLI.

Ad Vomitiones & nauseam.

Cotoneorum malorum maceratorum liquor haustus.  
 Nardus Indica } ex aqua pota.  
 Nardus Celtica }  
 Palmula in cibo sumpta.  
 Palmularum inuolucrum cataplasmatibus conferentibus adiectum.  
 Gallinaceorum uentriculi interior folliculus siccus, tritusq; cum uino potus.  
 Succinum haustum.  
 Fabā in posca decocta, & in cibum sumpta.  
 Lentis xx grana sine cortice deuorata.  
 Phaselus in cibo acceptus.  
 Sisybrium haustum.  
 Rubifolia exterius illita.  
 Lactuca illota deuorata.  
 Lens syluestris esui data.  
 Scilla sicca epota.  
 Agaricus trium drachmarum pondere per se absque liquore sumptus.  
 Gentianae radices succus cum aqua potus.  
 Albæ spinæ radix hausta.  
 Menthae duo, tresue rami cū acidæ punice succo poti.  
 Peoniae semen ex uino nigro potum.  
 Betonica commanducata, mosq; uino aqua misto superbibito.  
 Vitis uinifera foliorum, capreolorumq; succus potus.  
 Myrtites uinum potum.  
 Vini fax illita.  
 Scillinum uinum potum.  
 Ad coeliacos.  
 Lycium potum, & inditum.  
 Cotonea mala cruda comesta.  
 Mora immatura siccata, tusaq; obsonijs immista.

## VENTRICVLI.

Ficulnei cineris lixiuium pondere cyathi exhibitum.  
 Myrica in potu data.  
 Gallæ cum aqua aut uino trita, & illita.  
 Rhois semen obsonijs inspersum.  
 Myrti folia trita, & ex aqua illita.  
 Oleæ syluestris folia cum polenta illita.  
 Coagulum leporinum, & equinum trium obolorum pondere ex uino potum.  
 Faba in posca decocta, & deuorata.  
 Aegyptiae fabæ farina, & corticis ipsius decoctum, ex mulso datum.  
 Oxylapathi, aut oxalidis semen in aqua, aut uino potum.  
 Plantago elixa in aceto, & cum sale sumpta.  
 Hyacinthi semen potum.  
 Coronopus decoctus in cibo sumptus.  
 Rha ponticum potum.  
 Spinae albæ radix pota.  
 Ferula uiridis medulla bibita.  
 Laferpitij liquor in uua acino sumptus.  
 Nymphaeæ radix siccata, & in uino bibita.  
 Clymeni succus potus.  
 Limonij herbae semē acetabuli pondere ex uino sumptum.  
 Tragi herbae acini decem ex uino bibiti. (ptum.  
 Papaueris uasculorum decoctum ex melle in eclegmate redactum in delinctu. Si uerò efficacius reddere uelis, adiungito hypocistidis, & acaciae succum.  
 Vuarum uinaceorum decoctum potum.  
 Vinaceorum nuclei in farina polentæ modo inspersi.  
 Aqua uel uinum, in quibus ferrum extinctum fuerit  
 Morochthus lapis potus. (pota.  
 Vinum myrtites potum.  
 Adiantum ex uino bibitum.  
 Thrichomanes ex uino pota.  
 Ad uomitiones ciendas.  
 Lauri folia pota.  
 Cochleæ uepribus inherentes deuorata.  
 Peponis radix sicca drachmæ pondere ex hydromelite pota.  
 Bulbus uomitorius deuoratus.  
 Origanum cum Rhois semine, & capis in cupreo uase diebus quadraginta, dū caniculæ sydyus flagrat insolatum potum.  
 Lemnia terra pota.

Ad uentriculi dolores.

Iuncus odoratus potus.  
 Bulbi comesti.  
 Rha ponticum bibitum.  
 Absinthium in passo decoctum potum.  
 Melilotum ex uino decoctum haustum.  
 Artemisia tenuia folia ex oleo cotusa emplastri modo imposita.  
 Nymphaeæ radix illita.  
 Senecionis caulis in passo decoctus, deuoratus uel potus.  
 Alabastrites lapis cum cerato impositus.

Ad uentriculi erosiones.

Nardus Indica } ex aqua pota.  
 Nardus Celtica }  
 Iuncus odoratus potus.  
 Sycomori succus potus.  
 Pineæ nuces deuoratae.  
 Lac humanum potum.

## VENTRICVLI.

*Sonchi succus bibitus.*  
*Pulegium cum posca sumptum.*  
*Hieracij utriusque succus haustus.*  
*Scordium duarum drachmarum pondere cum mulsâ potum.*  
*Pæonia semen ex uino nigro potum.*

Ad uentriculi ardores.

*Portulaca cum polenta illita.*  
*Sonchus emplastri modo impositus.*  
*Umbilici Veneris succus illitus.*  
*Intybus utraque ex aceto deuorata.*  
*Glycyrrhizæ succus potus.*  
*Apium ebibitum.*  
*Feniculum cum frigida aqua potum.*  
*Polygonum illitum.*  
*Solani hortulani folia apposita.*  
*Chamædaphnes folia hausta.*  
*Vitis uinifera folia, & capreoli emplastri modo adhibita.*  
*Labruscæ flos illitus.*

Ad uentriculi flatus.

*Mei radices ex aqua feruesactæ, uel citra coctionem tritæ potæ.*

*Nardi Indicæ, & Celticæ ex aqua potæ.*

*Castoreum bibitum.*

*Gallinaceorum senescentium ius potum.*

*Absinthium cum seseli aut gallicæ nardo potum.*

*Ligustici semen, & radix potæ.*

*Smyrnijs semen haustum.*

Ad singultum.

*Sisimbrii semen in uino potum.*

*Rha ponticum haustum.*

*Aristolochia rotunda bibita.*

*Menthæ duo, tresue rami cū acidæ punicæ succo poti.*

*Anethi come, & seminis decoctum potum.*

*Cuminum erraticum cum aceto potum.*

*Alysson potum, siue manibus gestatum, uel naribus infusum.*

*Aspleni decoctum potum.*

*Periclimeni semen potum.*

*Saxifraga bibita.*

Ad acidis ructus.

*Agaricus drachmæ pondere sumptus.*

*Tragoriganum potum.*

*Betonicæ folia fabæ pondere ex despumato melle sumpta.*

Ad sanguinem & lac in uentriculo concreta.

*Ficulnei cineris lixiuum potum.*

Coagulum	{	Equinum	} trium obolorum pondere ex uino potum.
		Leporinum	
		Agninum	
		Hædinum	
		Himulinum	
		Bubalinum	

Ad inflammationes uentriculi.

*Helichrysi coma cum mulso potæ.*

*Laser potum.*

*Hieracium maius & minus emplastri modo impositum.*

*Vitis uinifera folia & capreoli cum polenta impositi.*

*Viola purpurea ex polenta illita.*

## VENTRICVLI.

Ad cibi appetentiam ciendam.

*Piper comestum.*

*Acetum in obsonijs additum.*

*Absinthium potum.*

Ad concoctionem adiuuandam.

*Eruca in cibo comestæ.*

*Piper omne comestum.*

*Gingiberis usus.*

*Scylla cum melle costæ, & deuorata.*

*Absinthium haustum, uel uentriculo adbibitum.*

*Tragoriganum potum.*

*Pulegium potum.*

*Ligustici semen & radix potæ.*

*Seselis masiliensis semen cum uino potum.*

*Carum potum.*

*Betonicæ folia post cœnam sumpta addito melle despumato fabæ magnitudine.*

*Vinum absinthites.*

Ad stomachi fluxiones.

*Adiantum potum cum uino.*

*Persici mali sicci decoctum, & bibitum.*

*Cotonei mali macerati liquor potus.*

## IECINORIS.

Ad iecinoris obstructions.

*Nardus Indica* } ex aqua frigida hausta.  
*Nardus Celtica*

*Lauri cortex tribus obolis in uino odorato potus.*

*Piceæ folia drachmæ pondere in aqua, aut mulsâ potæ.*

*Amygdalæ amaræ cum melle, & lacte in illinctu datæ nucis auellane magnitudine.*

*Gentianæ radices succus cum aqua potus.*

*Agaricum potum.*

*Rha ponticum exhaustum.*

*Eryngium ex uino assumptum.*

*Anthemidis decoctum potum.*

*Chamaepityos folia septem diebus in uino potæ.*

*Betonica in aceto mulso drachmæ pondere bibita.*

*Eupatorii herba aut semen in uino potum.*

*Papaueris corniculati radix potæ.*

*Rubrica Sinopica hausta.*

*Glycyrrhizæ succus delinctus.*

Ad regium morbum.

*Nardus* { Indicæ } hausta.  
*Celticæ*

*Ceruinum cornu ustum, ac lotum, potumq;.*

*Millepedæ siue ouisci ex uino poti.*

*Cicer cum roremarino decoctum comestum.*

*Rumicis radices in uino decoctæ & bibitæ.*

*Atriplicis semen bibitum cum mulsâ aqua.*

*Asparagi radicem decoctum potum, cum ficis, & ciceribus.*

*Critibmi, & eius radicem seminū decoctum potum.*

*Irio cum melle linctæ.*

*Scilla cum melle in eclegmate pondere trium obolorum potæ.*

*Hirundinariæ radix cum aniso, & uino potæ.*

*Sphondylii semen potum.*

*Agaricus drachmæ pondere sumptus.*

*Rhaponticnm haustum.*

*Absinthij*



## IECINORIS.

*Absinthij decoctum, dilutum uel trium cyathorum pondere quotidie haustum.*  
*Aloë drachmæ pondere pota.*  
*Origani decoctum corporis perfusum.*  
*Calamintha cum uino pota.*  
*Feniculum erraticum potum.*  
*Libanotis radices potæ cum uino, & pipere.*  
*Rorismarini decoctum potum.*  
*Nigella trita cum Irino unguento, naribus apposita.*  
*Chelidoij radix cum aniso, & uino albo pota.*  
*Lasër cum caricis datum.*  
*Marrubij succus naribus infusus.*  
*Polij utriusque decoctum bibitum.*  
*Conyze folia, & flores poti.*  
*Aspleni decoctum potum.*  
*Lichen ex melle inunctus.*  
*Adianti decoctum potum.*  
*Trichomanes decoctum haustum.*  
*Anthemides decoctum potum.*  
*Bupbthalmum potum statim à balneo.*  
*Peoniæ radix bibita.*  
*Hyacinthi semen cum uino potum.*  
*Rubiæ radix cum mulsâ aqua bibita.*  
*Chamepitjos folia septem diebus in uino pota.*  
*Betonicæ folia cum dulci aqua pota.*  
*Elaterium potum.*  
*Anchusæ radicis decoctum potum.*  
*Quinquefolij succus trium cyathorum pondere aliquot diebus potus.*  
*Osyris decoctum potum.*  
*Chrysanthemi decoctum balnei more adhibitum.*  
*Vinum scillinum potum.*  
*Verbenacæ supinæ folia drachmæ pondere cum thuris obolis tribus, et uini ueteris hemina una ieiunis 40 diebus pota.*  
*Lycij herba in aceto decocta, & bibita.*  
*Myricæ decoctum potum.*  
*Halycacabi fructus poti.*  
*Chamæcissi folia trium obolorum pondere senis diebus in aqua pota.*  
*Rusci folia, & bacce in uino pota.*  
*Vinum scillinum haustum.*  
*Ceruini cornu cinis potus binis ligulis.*  
*Sulfur sorbili ouo sumptum.*

Ad hydropem.

*Asarum potum.*  
*Cinnamomum ebibitum.*  
*Calami odorati decoctum cum semine apij potum.*  
*Erinacei terrestris caro.*  
*Cochlearum terrestrium operimentum, & caro simul contrita tumoribus hydropicorum imposita.*  
*Amurca in uillosa pelle peruncta, & imposita.*  
*Urina humana sui ipsius bibita.*  
*Urina capræ quotidie cum spica pota.*  
*Cicer cum rore marino decoctum.*  
*Raphanus emplastri modo impositus.*  
*Plantago cum lenticula decocta.*  
*Ebuli radix in uino decocta, & pota.*  
*Allium decoctum manducatum.*  
*Bulbi cum melle, & trito pipere emplastri modo impositi.*  
*Scilla preparata sumpta.*

## IECINORIS.

*Anagallidis succus uino potus.*  
*Chamaeleonis albæ radix cum uino pota.*  
*Absinthium bibitum cum ficubus, nitro, & loliacea farina.*  
*Adianti decoctum potum.*  
*Trichomanes decoctum potum.*  
*Hyssopum cum fico, nitroq; emplastri modo impositum.*  
*Fidiculæ decoctum potum.*  
*Origanum cum fico decoctum.*  
*Sampsuchi decoctum potum.*  
*Ruta cum fico emplastrata, & eius decoctum ex uino tum potum, tum corpori perfusum.*  
*Pastinacæ erraticæ semen potum.*  
*Anisum potum.*  
*Smyrniij semen potum.*  
*Lasèrpiij liquor cum caricis datus.*  
*Chamedrij decoctum potum.*  
*Polij utriusque decoctum bibitum.*  
*Androsaces in uino pota duarum drachmarum pondere.*  
*Betonicæ folia cum aqua dulci pota.*  
*Cucumeris asinini radicis succus sesquiboli pondere, & cortex eius acetabuli quartaparte.*  
*Aquæ marinæ balneum.*  
*Vitis sylvestris radix in aqua seruata, et in uini cyathis duobus marina aqua diluti pota.*  
*Vinum Scillinum potum.*  
*Viticis semen potum.*  
*Ficus sicca in uino cum polenta, & absinthio decocta & illita.*  
*Sal.*  
*Alcyonium tertium.*  
*Arena è littoribus sole seruata, capite tenuis hydro picis obruta.*

Ad refrigerantum iecur.

*Nardus Indica } ebibita.*  
*Nardus Celtica } ebibita.*  
*Amomi decoctum potum.*  
*Pinorum, & piceæ folia ex aqua, uel mulso pota.*  

Ad iecinoris dolores.

*Acori decoctum potum.*  
*Absinthij decoctum ex passo appositum.*  
*Periclymeni semen potum cum uino.*  

Ad iecinoris duritiem.

*Ammonia cum illitum, & ebibitum.*

## L I E N I S.

Ad induratos lienes.

*Cotonea mala cruda cataplasmatibus addita, & imposita.*  
*Sycomori liquor haustus, & illitus.*  
*Raphanus emplastri modo impositus.*  
*Brassicæ foglia cum aceto deuorata.*  
*Chamedrij decoctum potum.*  
*Lupinorum farina illita.*

Ad lienis obstructions.

*Nardus celtica ex uino pota.*  
*Adiantum bibitum.*  
*Trichomanes hausta.*

Ad lienis inflammationes.

*Iris illyrica ex aceto pota.*  
*Acorum potum.*  
*Nardus celtica ex uino pota.*

Nardus

## LIENIS.

*Nardus montana* ex uino hausta.  
*Sarmenticius cinis* ex aceto, rosaceo, & ruta illitus.  
*Myrica* ex uino decoctum potum.  
*Vitidis semen* potum.

Ad lienis dolores.

*Distamnum* potum, & illitum.

Ad minuendos lienes.

*Iris Illyrica* ex aceto pota.

*Acorum* potum.

*Nardus* { *Celtica*  
*Montana* } ex uino bibita.

*Myrica* ex uino decoctum haustum.

*Vitidis semen* potum.

*Cyclamini* secundæ semē quadraginta diebus haustum.

*Sagapenum* ebibitum.

*Ammoniacum* drachmæ pondere ex aceto sumptum.

*Chamaedrys* ex aceto pota.

*Nasturtium* haustum.

*Piperis radix* illita.

*Polij* utriusque decoctum cum aceto potum.

*Cyclamini succus* inunctus.

*Capparidis* semen drachmarum duarum pondere quadraginta diebus ex uino bibitum.

*Eiusdem radix* ex uino bibita eodem pondere.

*Lepidium* cum *helenij* radice impositum.

*Hedera tenella* folia ex uino decocta, uel arida ex pane coacta imposita.

*Isatis Syluestris* tum pota, tum illita.

*Agaricū* drachmæ pondere cum aceto mulso datum.

*Rhaponticum* potum.

*Smyrnijs* radix comesta.

*Gentianæ* radix duarum drachmarum pondere pota.

*Aristolochia* rotunda pota.

*Crocodilij* radicis decoctum potū præsentaneo remedio prodest.

*Hyssopum* cum *ficis*, nitroq; illitum.

*Tragoriganum* cum aceto potum.

*Pulegium* cum sale illitum.

*Sison* potum.

*Peucedani succus* haustus.

*Viscum* cū calce, gagate, lapide decoctum illitum.

*Teucrium* cum posca potum, uel cum *ficis* appositum.

*Leucoij* radices cum aceto illite.

*Nymphaeæ* radix ex uino bibita.

*Aspleni* folia pota, uel eius decoctum cū aceto quadraginta diebus haustum, uel folia ipsa ex aceto illita.

*Bunij* semen potum.

*Hæmionitis* cum aceto pota.

*Rubiæ* semen ex aceto mulso potum.

*Lonchitis* alterius folia cum aceto hausta.

*Betonicæ* folia ex oxymelite ebibita.

*Polemonij* radix ex aqua sumpta.

*Peridymeni* semen quadraginta diebus in uino potū.

*Xyridis* semen ex aceto sumptum.

*Anchusæ* radix cum multa aqua pota.

*Urtica* utraque cum cerato imposita.

*Trichomanes* pota.

*Vini scillini* usus.

*Glans unguetaria* cū erui farina pota ex multa aqua.

*Bryonia* trium obolorum pondere triginta diebus ex aceto hausta, aut cum *ficis* illita.

*Vitis* nigrae uiticule primæ recētes coctæ, ac comestæ.

## LIENIS.

*Filicis maris* radix hausta.

*Aqua* uel uinum, in quibus chalybs, aut ferrum restitutum fuerit in potu.

*Alcyonium* tertium bibitum.

*Corallium* ex aqua bibitum.

*Asius lapis* ex aceto, & uina calce illitus.

*Cotis naxia* delimitata à ferro scobes ex aceto bibita.

## INTESTINORVM.

Ad colicos affectus.

*Amygdalæ* amarae illinctu adhibite.

*Cochleæ* terrestres cū suo putamine tusa, addita pauca myrrha, ex uino bibita.

*Alauda* auis tosta in cibo sumpta.

*Suillus* talus crematus ad albedinem usque potus, ubi flatu excruciet.

*Butyrum* infusum, ubi colon exulceratum fuerit.

*Gallinæ* finum cum aceto uel uino haustum.

*Rutæ* decoctum ex oleo infusum.

*Petroselinum* potum.

*Colocynthidis* infusa clisimatibus.

*Cnici* decoctum infusum.

Ad intestinorum dolores.

*Iris illyrica* pota.

*Acori* decoctum bibitum.

*Mei* radices tritæ cum melle in eclegmate sumptæ.

*Cardamomum* ex aqua potum.

*Agallochum* ex aqua haustum.

*Nuces* inglandes cum suo putamine perustæ, & umbilico admotæ.

*Ficuum* cum rutæ decoctum clysmate infusum.

*Halimi* folia drachmæ pondere in aqua mulsa pota.

*Crocum* in potionibus bibitum.

*Dauci* semen potum.

*Libanotidis* radices haustæ.

*Ferulæ* semen in potu sumptum.

*Peucedani* succus in ouo haustus.

*Melissophylli* decoctum clystere infusum.

*Castoreum* potum.

*Butyrum* clysmatibus infusum.

*Serpyllum* ebibitum.

*Calaminthæ* decoctum haustum.

*Eryngium* potandum datum.

*Cera* in sorbitionibus data.

*Ammi* ex uino sumptum.

*Triticeij* surfures ex decocto rutæ elixi, & illiti.

*Milium* calefactum, in sacculis adhibitum.

*Orobi* farina aceto macerata imposita.

*Sisymbrij* semen in uino potum.

*Piper* cum lauri tenellis folijs haustum.

*Scilla* in eclegmate cum melle.

*Rhaponticum* potum.

*Sampsuchi* decoctum ebibitum.

*Centaurij* maioris radix pota.

*Ruta* una cum siccato anetho elixa in potu sumpta.

*Panaces* cum uino haustum.

*Anethi* coma, & seminis decoctum potum.

*Ligustici* semen & radix pota.

*Cumini* decoctum cum oleo clystere infusum.

*Phalangij* folia, flores, ac semen haustum.

*Centumculum* auslero uino potum.



# INTESTINORVM.

*Conyza folia, & flores poti.*  
*Peonia radix in uino pota.*  
*Pseudobunium ebibitum.*  
*Aqua marina foti adhibita.*  
*Chamaepitys hausta.*  
*Graminis decoctum ebibitum.*  
*Chamaedaphnes folia in potu data.*  
*Sal calefactum in sacculis adhibitum.*  
*Nitrum cum cumino ex hydromelite haustum.*  
*Seselis Masiliensis semen ex uino potum.*  
*Asclepiadis radices ex uino potæ.*  
*Alisma per se, aut cum pari pondere seminis dauci haustum.*  
*Suillus talus combustus ad albedinem usque ebitus.*  
*Lini seminis decoctum per sedem infusum.*  
*Agaricum duorum obolorum pondere sumptum.*  
 Ad dysentericos.  
*Aspalathi decoctum clystere infusum.*  
*Myrrha fabæ magnitudine deuorata.*  
*Lentiscus ebibita.*  
*Piceæ cortex potus.*  
*Maceris cortex in potu sumptus.*  
*Paliuri folia, & radix hausta.*  
*Acute spinæ fructus deuorati, uel epoti.*  
*Rubi canini fructus deuoratus.*  
*Cisti folia, & cythri in potu data.*  
*Hypocistis hausta.*  
*Ladanum cum uino uetere potum.*  
*Rosarum fructus in potu sumptus.*  
*Lycium potui datum.*  
*Acaciæ succus haustus.*  
*Glandium interior tenuiorq; tunica decocta pota.*  
*Castanearum interior pariter tunica ebibita.*  
*Galla omphacitis ex uino, aut aqua trita illita, aut hausta.*  
*Rhois foliorum decoctum clystere infusum, uel in potu acceptum.*  
*Eiusdem semina pro sale cibus, obsonijsq; aspersa.*  
*Palme inuolucris decoctum, tum infusum, tum bibitum.*  
*Tunicorum acidorum nuclei siccati, & ebibiti, uel in defensionibus additi.*  
*Myrti semen, & folia pota.*  
*Cotonea mala comesta cruda, uel cocta, uel eorum succus potus.*  
*Pyræ tam domestica, quam syluestria deuorata.*  
*Mespila in cibum accepta.*  
*Loti arboris bacca comesta, uel hausta.*  
*Corni arboris bacca siue in edulijis, siue in defuto asumpta.*  
*Sorba sicca quoquo modo sumpta.*  
*Prunorum syluestrium bacca deuorata.*  
*Siliquæ siccata deuorata.*  
*Cochleæ terrestres suis cum putaminibus usæ (ut Gal. inquit) esui data.*  
*Siluri piscis salsamentum fomento adhibitum.*  
*Leporinus sanguis frixus deuoratus.*  
*Garum piscium clysmate infusum.*  
*Cernui cornu potum duorum cochlearium mensura.*  
*Cera in sorbitionibus data.*  
*Lac ignitis iniectis calculis decoctum clystere infusum.*  
*Leporinum } eoagulum trium obolorum pondere ex*  
*Equinum } uino potum.*

# INTESTINORVM.

*Asparagus altis elixus, uel assus in cibo sumptus mitigat.*  
*Idea radix bibita.*  
*Althææ decocta succus ex uino haustus.*  
*Alceæ radices cum uino, aut aqua potæ.*  
*Phyllitis pota.*  
*Portulaca ad summum cocta in cibus sumpta.*  
*Plantago per sedem infusa.*  
*Equiseti succus potus.*  
*Caprillus adeps cum polenta, & Rhoe datus, uel clystere infusus.*  
*Melissophyllum bibitum.*  
*Tragium scolopendræ similis elixum, & sumptum in cibo*  
*Faba in posca decocta, & comesta.*  
*Alismatis radix cum pari pondere seminis syluestris pastinacæ bibita.*  
*Oxylapathi aut oxalidis semē, in aqua aut uino bibitum.*  
*Lysimachia potui data.*  
*Tragi cacumina x. in uino pota.*  
*Clematis folia cum uino hausta.*  
*Stæbis decoctum clystere infusum.*  
*Limonij semen in uino potum.*  
*Elatine elixa pota.*  
*Polemonij radix ex uino sumpta.*  
*Eupatorij semen, & folia in uino hausta.*  
*Nymphæ siccata radix ex uino ebibita.*  
*Sedum maius cum uino potum.*  
*Sanguis hyrci, capræ, leporis, ceruiq; in sartagine frixus, in cibo sumptus.*  
*Vitis uiniferæ foliorum & capreolorum succus potus.*  
*Vinaceorum decoctum ebibitum.*  
*Vinaceorum nuclei in farinam polentæ modo illiti.*  
*Vua passa alba comesta per se cum suis nucleis.*  
*Omphacium clystere infusum.*  
*Vinum ænantinum } potum.*  
*Vinum Cydonites }*  
*Vinum rhoites }*  
*Terra lemnia ebibita.*  
*Muria clysmatibus infusa, ubi diutina dysenteria testina exulcerata extiterint.*  
*Scordij duarum drachmarum pondere cum aqua dulci potum.*  
*Hederæ flores trium digitorum carptæ bis in die ex uino hausti.*  
 Ad cohibendum aluum.  
*Coagulum leporinum potum*  
*Lac ovi, in quo igniti calculi marini extincti fuerint.*  
*Casus elixus, & ab elixatione statim sepositus, moxq; inassatus in cibo sumptus.*  
*Fimus caninus ardente Syrio acceptus, et in aqua bibitus.*  
*Panis triticens siccus inueteratus comestus.*  
*Ordeacea farina cum myrti baccis, aut syluestribus pyris, aut malicorio ex uino illita.*  
*Puls ex Zea } in cibum sumpta.*  
*Puls ex Aucna }*  
*Puls ex milio }*  
*Oryza in cibum accepta.*  
*Lentes cum suo cortice decocta deuorata, præsertim si decoquantur ex aceto cum adstringentibus alijs.*  
*Oxylapathi, aut oxalidis semen in uino, aut aqua potum.*  
*Braßicæ percocta cibus.*  
*Beta nigra cum sua radice, & lente decocta esui data.*  
*Plantago ex aceto elixa, cum sale comesta, quin & eius*  
semen



# INTESTINORVM.

*Semen ex uino potum. Præterea clysteribus infusa.*  
*Intybus tam hortenſis, quàm erratica in cibū accepta.*  
*Condryllæ ſuccus coctus potus.*  
*Lens ſylueſtris quoquo modo ſumpta.*  
*Acinos pota.*  
*Aniſum ebibitum.*  
*Anethum, quin etiam eius coma, & ſemen haſtum.*  
*Apium in cibo ſumptum.*  
*Phyllitis potui data.*  
*Acanthi radices bibita.*  
*Feniculum erraticum potum.*  
*Ruta in cibo uel potu ſumpta.*  
*Orchis Serapias ex uino potus.*  
*Pæoniæ radix ex uino decocta haſta.*  
*Althææ decoctum bibitum.*  
*Alifmatis radix pota.*  
*Polygoni ſuccus potus.*  
*Clematis prima in uino bibita.*  
*Lagopus ex uino, uel ex aqua ſumpta ubi febris ſit.*  
*Xyridis radix in mulſo pota.*  
*Anchuſæ folia ex uino ſumpta.*  
*Rubi ramorum decoctum potui datum.*  
*Quinqueſolij radice decoctum bibitum.*  
*Phœnix in uino aſtero haſta.*  
*Ideæ radix bibita.*  
*Iunci, præſertim marini ſemen frixum, & in diluto ui-*  
*no potum.*  
*Aſtragali radix ex uino haſta.*  
*Hyacinthi radix ebibita.*  
*Papaueris nigri ſemen ex uino haſtum.*  
*Verbaſci radix, & flores potui dati*  
*Labruſcæ flores poti.*  
*Punicorum acidorum uinum potui datum.*  
*Rubrica Sinopica in ouo haſta, aut clyſtere infuſa.*  
*Vini ſex illita.*  
*Sedum maius ex uino haſtum.*  
*Adianti decoctum potum.*  
*Trichomanes decoctum bibitum.*  
*Acetum cibus incoctum.*

Ad diuturnas alui fluxiones.

SAN- 

{	Hyrcinus	}	in ſartagine frixus & comefus.
	Caprillus		
	Leporinus		
	Cerninus		

Ad ciendam, & emolliendam aluum.

*Ceraſia comeſa.*  
*Melimela eſui data.*  
*Perſica in cibum ſumpta.*  
*Mora matura comeſta.*  
*Ficus mature deuorata.*  
*Marinus echinus in cibus.*  
*Tellinarum, chamarumq; ius cum ſale haſtum.*  
*Sepia in cibo ſumpta.*  
*Silurus piſcis in cibus.*  
*Gobi ius bibitum.*  
*Piſcium in uniuerſum ius per ſe, aut ex uino bibitum.*  
*Gallinaceorum ueterum ius epotum.*  
*Lac haſtum.*  
*Serum lactis potum.*  
*Cafeus recens in cibo ſumptus.*  
*Butyrum comeſtum uel bibitum.*  
*Medulla oſium deuorata.*

# INTESTINORVM.

*Cicer in cibo ſumptum.*

*Rumex*  
*Blitum*  
*Malua*  
*Atriplex*  
*Beta candida*  
*Aſparagus*  
*Lactuca* } *decocta & in cibus ſumpta.*  
*Bræſſica leuiter ſerueſacta, eſui data.*  
*Tragoriganum potum.*

Ad inteſtinorum inflationes.

*Farina tritici cum hyoſcyami ſucco illita.*  
*Farina hordei cum lini, et fœni græci ſemine impoſita.*  
*Ocimi ſemen potum.*  
*Rhaponticum bibitum.*  
*Anethi coma, & ſeminis decoctum potum.*  
*Cumini decoctum cū oleo clyſtere infuſum, uel eius ſe-*  
*men cum polenta & hydreleo maceratum & illitū*  
*Pencedani liquor in ouo ebibitus.*  
*Anthemidis decoctum potum.*

Ad latas inteſtinorum tineas

*Cardamomum potum.*  
*Mali paniceæ radicem decoctum bibitum.*  
*Nuces iuglandes largius eſitate.*  
*Mori radice corticum decoctum haſtum.*  
*Allium potui datum, uel comeſtum.*  
*Chamaeleonis albi radix acetabuli pondere, ex caſtorei*  
*& origani decocto pota.*  
*Filicis ſemina radix trium drachmarum pondere ex*  
*melle haſta.*  
*Melanthij ſemen potum, uel ex aqua umbilico illitum.*  
*Atramentum ſutorium drachmæ pondere ſumptū, uel*  
*cum melle delinctum.*  
*Heliotropij ma. tum folia, tum ſemina cū hyſſopo, ni-*  
*tro, & naſturtio pota.*

Ad teretes inteſtinorum tineas.

*Lupinorum farina cum melle linctæ, uel cum aceto, pi-*  
*pere, & ruta pota.*  
*Bræſſicæ ſemen potum.*  
*Purtulacæ ſuccus potui datus. Præſtat idem & ſemen.*  
*Naſturtium bibitum.*  
*Absinthium marinum per ſe, uel cum oriza decoctum*  
*cum melle ſumptum.*  
*Absinthium ſantonicum, ut marinum, haſtum.*  
*Hyſſopum cum melle linctum.*  
*Mentha bibita.*  
*Calaminthæ decoctum cum ſale, & melle ſumptum.*  
*Thymum haſtum.*  
*Thymbra potui data.*  
*Rutæ decoctum ex oleo bibitum.*  
*Coriandrum cum paſſo ſumptum.*  
*Anchuſa tertia cum hyſſopo, & naſturtio pota.*  
*Vinum abſinthites potui datum.*  
*Sedum maius ex uino haſtum.*  
*Filicis ſemina radix drachmarum triū pondere cum*  
*uino pota. Sed qui ſumunt præguſtare allia debent.*

Ad aluum fluentem ab expurgante me-

dicamneto.

*Gallorum gallinaceorum ſenum uentriculus ſale inne-*  
*teratus, & in umbra ſiccatus potus.*

Ad inteſtinorum uulnera.

*Equiſeti radix, & folia cum aqua, pota.*



## S E D I S.

Ad intestinorum ulcera.  
Lac omne ignitis calculis calefactum, infusum.  
Sapphyrus lapis bibitus.

## S E D I S.

Ad sedis rimas.  
Pix liquida illita.  
Amurca in cupreo uase ad mellis spissitudinem decocta illita.  
Vitici semen cum aqua illitum.  
Cancris fluuiatiles combusti cum melle cocto illiti.  
Labri ueneris radix in uino decocta, & subinde tusa imposita.  
Leucoj flores cera excepti, & emplastri modo adhibiti. Labruscæ flores illiti.  
Plumbum elotum impositum.  
Ad sedis ulcera.  
Thus tritū cū lacte, et linamento exceptum impositū.  
Punicorū acidorum succus cum melle decoctus illitus.  
Oesypus impositus explet, & emollit.  
Plumbum elotum illitum.  
Ad condylomata.  
Cotonea mala cruda cataplasmatibus adiecta.  
Qui uitellus asatus, & ex rosaceo, & croco illitus.  
Aloe cum passo adhibita.  
Anethi cremati seminis cinis illitus.  
Libanotis emplastri modo imposita.  
Ballotes folia in feruenti cinere cocta imposita.  
Rubi folia adhibita.  
Helsine imposita.  
Quinquesolij radix illita.  
Sarmētitijs cinis, quin et uinaceorum ex aceto illitus.  
Rubigo ferri illita.  
Plumbum elotum impositum.  
Sandaracha cum rosacco inuncta.  
Suillus adeps illitus.  
Crocum cataplasmatibus inditum.  
Ad sedis inflammationes.  
Lens cum sertula campanæ, siccis rosis, cydonio malo, malicorio & rosaceo illita.  
Sonchi succus illitus.  
Melilotus cum fœni græci farina, & lini semine ex passo impositus.  
Libanotis adhibita.  
Althææ radix decocta illita.  
Symphyti maioris radix cū folijs Senecionis cataplasmatibus modo.  
Senecionis flores, & folia, ex modico uino illita.  
Ad induratos sedis tumores.  
Pix liquida illita.  
Ad procidentem sedem.  
Lentisci succus, & folia illita.  
Malorum cydoniorum decoctum in defensionibus.  
Torpedo marina apposita.  
Cyclamini succus ad mellis spissitudinem decoctus, illitus. Cærulei anagallidis flores appositi.  
Aster Atticus illitus.  
Acetum illitum, & sotu adhibitum.  
Acida muria in defensionibus.  
Ad tenafmos.  
Lac ouillū, caprillum, bubulumq; ignitis calculis calefactum, & clystere infusum.

## S E D I S.

Fœni græci seminis decoctum infusum.  
Lini semen quoquo modo appositum.  
Erui farina uino macerata illita.  
Ad peniles sedis thymos.  
Capræ syluestris fel illitum.  
Finum ouillum ex aceto inunctum.  
Laser in malicorio cum aceto feruesfactum.  
Acetum illitum.  
Ad hæmorrhoidas ciendas.  
Capra confricata.  
Ad hæmorrhoidum defluxiones.  
Aloe cum passo illita.  
Libanotis emplastri modo imposita.  
Rubi folia adhibita.  
Palmula illita.  
Ad hæmorrhoidas sanandas.  
Rhois semen illitum.  
Palmula illita.  
Ononis decoctum ( ut quidam aiunt ) potum.  
Plumbum elotum impositum.  
Arabicus lapis illitus.  
Portulaca ad summum cocta imposita.

## R E N U M.

Ad renum dolorem.  
Cardamomum ex uino potum.  
Nardum Celticum potum ac linitum.  
Amomi decoctum bibitum.  
Harundinis radix lumborum doloribus proficit cū acetato illita.  
Tragacantha drachmæ pondere in passo dissoluta cū adusto, elatoq; cerui cornu, & scissilis aluminis tantillo potum.  
Peucedani succus potus.  
Vua passa alba in cibum sumpta.  
Alcyonium tertium potum.  
Feniculi comæ decoctum subditum.  
Anagallis pota.  
Agarici drachma pota.  
Glycyrrhizæ succus cum passo potus.  
Tordilium bibitum.  
Anthyllis pota.  
Præniæ radix ex uino pota.  
Symphytum petræum ex aqua potum.  
Anchusæ decoctum ex aqua haustum.  
Vinum melitites ebibitum.  
Ad renum calculos & arenulas.  
Nardus 

{	Indica
{	Celtica
{	Montana

 potui data. Verū celtica cæteris præstat.  
Lauri folia pota, quin & radicis cortex qui longe potentior est, potus.  
Cerasi gummi ex uino haustum.  
Amygdalæ amaræ gummi ex passo sumptum.  
Ononis radicis cortex cum uino potui datus.  
Anisum potum.  
Cumini alterius syluestris semen potum.  
Artemisia decoctum in defensionibus adhibitum.  
Chamemeli decoctum potum, uel sotu adhibitum.  
Parthenij folia hausta.  
Althææ decoctum bibitum.  
Alismatis decoctum potui datum.



Tribuli utriusque fructuum succus haustus.  
 Rubi radix pota.  
 Papaueris corniculati radice decoctum haustum.  
 Umbilici ueneris folia cum radice pota.  
 Vinum absinthites bibitum.  
 Adiantum potui datum.  
 Trichomanes potui data.  
 Vua passa alba comesa.  
 Melitites uinum assidue potum.  
 Alcyonium tertium potum.

Ad renum ulcera.

Lac omne potum.  
 Plantaginis radices, & folia ex passo sumpta.  
 Vua passa alba comesa.  
 Melitites uinum assidue potum.

Ad renum obstructions.

Rhaponticum haustum.  
 Vinum absinthites } potum.  
 Vinum Melitites. }

## VESICAE.

Ad ciendam remorantem urinam.

Acori decoctum potum.  
 Mei radices ex aqua decoctae, uel tritae citra coctionem, & pota.

Nardus { Indica  
 Celtica } potui data.  
 Montana }

Cardamomum ex uino haustum.  
 Asarum bibitum.  
 Phu sicca pota.  
 Malabathrum potum.  
 Casia in potu hausta.  
 Cinnamomum potum.  
 Costus ebibitus.  
 Iuncus odoratus in potu sumptus.  
 Calamus odoratus cum graminis, aut apij semine sumptus.  
 Aspalathi decoctum haustum.  
 Crocum ebibitum.  
 Helenij radicum decoctum potui datum.  
 Crocomagma potum.  
 Pineae nuces repurgatae comesa, aut cum passo, uel cucumeris semine pota.  
 Lentisci decoctum haustum.  
 Terebinthi fructus comestus.  
 Resina omnis, praesertimq; terebinthina hausta.  
 Cupressi folia ex passo, & exiguu myrrhae pota.  
 Cedrides deuoratae, uel pota.  
 Lauri foliorum decoctum in defensionibus.  
 Albae populi cortex unciae pondere haustus.  
 Palinuri foliorum, et radicū decoctum in potu sumptum.  
 Phillyreae folia pota.  
 Ladanium ex uetere uino haustum.  
 Oleae Aethiopicae, ac nostratis lachryma potui data.  
 Glandes in potu sumpta.  
 Palmae inuolucris decoctum bibitum.  
 Punice acidae succus potus.  
 Cerasi gummi haustum.  
 Amygdalae amarae lachryma bibita.  
 Erinaceus marinus in cibum sumptus.

Erinacei terrestres caro inueterata ex ace. mulso pota.  
 Vermes terreni triti, & cum passo poti.  
 Mel haustum.  
 Ptisana hordeacea deuorata.  
 Zythum ex hordeo paratum potum.  
 Cicerum decoctum potui datum.  
 Erui decoctum haustum.  
 Lupinorum radicum decoctum bibitum.  
 Raporum cauliculus elixus, & in cibum sumptus.  
 Raphanus comestus, quin & eiusdem semen potum.  
 Siferis radix in cibum accepta.  
 Asparagi breui coctura elixi, & in cibum propinati.  
 Sion quoquo modo sumptum.  
 Cucumeris semen potum.  
 Erucae utriusque semen bibitum.  
 Dracunculus minor haustus.  
 Hortensis smilacis siliqua cum semine elixa, & in cibum data.  
 Asphodeli radix pota.  
 Bulbus uomitorius in cibum sumptus, uel eius decoctum potum.  
 Porrum domesticum, & syluestre comestum.  
 Cepa decocta in cibum sumpta.  
 Allium in cibum sumptum.  
 Capparis fructus quadraginta diebus potus.  
 Anagallidis succus bibitus.  
 Calamintha decoctum potum.  
 Salvia decoctum haustum.  
 Crocodilij semen bibitum.  
 Thymi decoctum potui datum.  
 Thymbræ decoctum bibitum.  
 Serpyllum in potu sumptum.  
 Ruta quoquo modo sumpta.  
 Spinae albae radix pota.  
 Acanthi radices pota.  
 Ononis radice cortex ex uino haustus.  
 Eryngij radix pota.  
 Absinthii potui datum, uel eiusdem decoctum bibitum.  
 Hyssopi decoctum in potu assumptum.  
 Origanum haustum.  
 Tragorigani decoctum ebibitum.  
 Ruta syluestris pubi illita.  
 Ligustici semen, & radix pota.  
 Pastinacae erraticae semen haustum.  
 Cari semen potum.  
 Anethi coma, & seminis decoctum bibitum.  
 Apium crudum, coctumque in cibum sumptum.  
 Petroselinum in potu haustum.  
 Feniculi decoctum potum.  
 Nigella pluribus diebus bibita.  
 Polij montani decoctum potui datum.  
 Artemisiae decoctum in defensionibus adhibitum.  
 Anthemidis decoctum haustum, uel in defensionibus additum.  
 Lithospermi semen ex uino albo sumptum.  
 Rubiae radix pota.  
 Lonchitis radix ex uino sumpta.  
 Hypericum bibitum.  
 Betonicae folia pota.  
 Periclymeni semen haustum, Est enim ualentissimum medicamentum.  
 Saxifraga potui data.  
 Xyridis radix trium obolorum pondere bibita. Sed seminis



mini uis longè maior.  
 Iunci marini semen frixum, & ex diluto uino haustū.  
 Ageratum suffitum.  
 Vesicaria siue halicacabi rubentes acini folliculis inclusi deuorati.  
 Solani somnifici semen potum.  
 Rusci folia, bacca asparagi, radices uē in uino potæ.  
 Spartij semen deuoratum.  
 Vitis albæ cauliculi teneri decocti, & deuorati.  
 Cytisi decoctum potum.  
 Dauci semen haustum.  
 Coris semen in potu sumptum.  
 Equiseti succus potus.  
 Umbilici ueneris folia cum radicibus manducata.  
 Bunij, & pseudobunij semen potui datum.  
 Astragali radix ex uino sumpta.  
 Hyacinthi radix bibita.  
 Vitis nigræ uiticule primæ coctæ, comestæq;  
 Chamædaphnes foliorum succus ex uino sumptus.  
 Vinum { Cydonites  
 Hyssopites  
 Scillinum  
 Absinthites } potum  
 Aqua mulsa in potum accepta.  
 Ad urinæ angustias.  
 Cimices leetularij tritæ, & urinariæ fistule impositi.  
 Millepedæ ex uino potæ.  
 Cicadæ inassate mansæ.  
 Locustæ suffitæ, præsertim in fœminis.  
 Ceruini cornu cinis elotus binis ligulis epotus.  
 Maluæ decoctum in sessione adhibitum.  
 Portulaca in cibum sumpta.  
 Asparagi radicum decoctum haustum.  
 Crithami radix, semen, & folia ex uino decoctæ pota.  
 Sandycis decoctum potui datum.  
 Caulicis olerum modo in cibum sumpta.  
 Amaraci decoctum potum.  
 Baccharis radicum decoctum haustum.  
 Ocimi semen bibitum.  
 Smyrniæ radix pota.  
 Agaricum drachmæ pondere datum.  
 Peucedani succus potus.  
 Rhaponticum potum.  
 Phalaridis succus ex aqua, aut uino haustus.  
 Lotus syluestris trita per se, aut cum maluæ semine ex uino, aut ex passo pota.  
 Chamæpitys potui data.  
 Chamæleonis albi radices decoctum bibitum.  
 Abrotani semen tritum, & ex aqua calefactum potū.  
 Pastinacæ syluestris semen potum, nel pubi illitum.  
 Tordilij semen in potu sumptum.  
 Ptelemonij radix ex aqua pota.  
 Sisonis semen haustum.  
 Ammi cum uino sumptum.  
 Petroselini semen potum.  
 Galbanum bibitum.  
 Chamædryos decoctum potui datum.  
 Trifolij bituminosi semen, & folia in aqua hausta.  
 Scordij decoctum ex uino, uel ex aqua paratū potum.  
 Anthyllis altera drachmarum duarū pondere bibita.  
 Peonia potui data.  
 Althææ decoctæ succus ex uino potus.

Graminis radicum decoctum potui datum.  
 Arctij radix cum semine decocta, in potu sumpta.  
 Adiantum potum.  
 Trichomanes hausta.  
 Alcyonium tertium potum.  
 Lapis { Hematites ex uino  
 Morochthus ex aqua } bibitus.  
 Iudaicus ciceris magnitudine ex aqua calida potus.  
 Spongiæ ex uino haustus.  
 Ad urinæ stillicidium.  
 Acori decoctum potum.  
 Sisymbrij semen in uino bibitum.  
 Panaces heraclium ex uino haustum.  
 Sefeli masiliense potui datum.  
 Cumini syluestris alterius semen in potu sumptum.  
 Olusatris radix cum semine ex mulso pota.  
 Polycnemum ex uino bibitum.  
 Clinopodium haustum.  
 Oenanthes radix cum uino epota.  
 Conyza folia, & flores in potu.  
 Aspleni decoctum potui datum.  
 Capæ cū asparagi radicibus decoctū, in potu sumptū.  
 Onobrychis bibita.  
 Polygoni succus haustus.  
 Saxifraga in uino decocta potui data.  
 Xyridis radix ex mulso pota.  
 Tragij liquor, semen, & folia in potu sumpta.  
 Rusci folia, radices, bacca, bibita.  
 Lauri Alexandrinæ radix sex drachmarum pondere potui data.  
 Elichrysi coma ex uino hausta.  
 Ad uesticæ ulcera.  
 Myrti folia, & semen pota.  
 Lac omne bibitum.  
 Cucumeris semen ex lacte, & passo haustum.  
 Glycyrrhizæ succus ex passo sumptus.  
 Vna passa alba comesta.  
 Ad uesticæ vulnera.  
 Butyrum insusum.  
 Equiseti folia ex aqua pota.  
 Ad eijciendos uesticæ calculos.  
 Ossifragi auis uentriculus paulatim in potu haustus.  
 Muris qui muserta dicitur, simus cum mulso, & thure potus.  
 Vrina apri potui data.  
 Rumicis radicum ex uino decoctum bibitum.  
 Sion crudum, coctumq; haustum, uel comestum.  
 Sisymbrij semen potum.  
 Baccharis decoctum haustum.  
 Apij semen, uel radix ex uino bibita.  
 Feniculum erraticum potum.  
 Sagapenum potui datum.  
 Adianti decoctum bibitum.  
 Trichomanes decoctum in potu sumptum.  
 Vitis uinifera lachryma in caudice concreta ex uino pota.  
 Ad uesticæ calculos frangendos.  
 Cardamomū, cū corticis radices lauri drachma, potū.  
 Bdellium potum.  
 Cerasi arboris gummi bibitum.  
 Aspleni decoctum haustum.



## VIRILIVM ET PVDENDORVM.

*Lithospermum ex uino albo potui datum.*  
*Saxifraga ebibita.*  
*Graminis decoctum haustum.*  
*Tragij semina pota.*  
*Rusci radices, ac bacca in potu sumptæ.*  
*Iudaicus lapis coti delimatus, ex aqua calida potus.*  
*Lapis spongiæ potui datus.*

Ad urinæ incontinentiam.

*Rutæ sylvestris semen frixum, & in cibis sumptum.*  
*Phœnix in uino austero bibita.*

Ad uescicæ scabiem.

*Panaces herculeum cum mulsa aqua aut uino potum.*  
*Cepæa herba bibita.*

Ad mictum grumorum sanguinis.

*Cumini sylvestris alterius semen potum.*  
*Elichrysi coma in mulso pota.*

Ad cruentos mictus, ex fractis calculis  
prouenientes.

*Acida muria illico chysmate infusa per urinæ fistulā.*

## VIRILIVM ET PVDENDORVM.

Ad Venerem ciendam, stimulantamq;

*Costus ex mulso bibitus.*  
*Crocum potum.*  
*Semen lini cum melle, & pipere deuoratum.*  
*Rapum decoctum in cibum sumptum.*  
*Eruca largius in cibis comesta.*  
*Eruce semen haustum.*  
*Dracunculi maioris radix tosta, uel elixa ex uino bi-*  
*bita.*

*Asphodeli radix assumpta.*  
*Nasturtium potum, uel comestum.*  
*Porri semen potui datum.*  
*Bulbus decoctus manducatus.*  
*Allium cum coriandro tritum in cibis.*  
*Vrticæ semen ex passo potum.*  
*Galij radix assumpta.*  
*Menthæ succus potus.*  
*Pastinacæ erraticæ radix comesta.*  
*Anisum potum.*

*Testiculi canis radix quæ uegetior est bibita, uel co-*  
*mesa.*

*Satyrii radix esitata.*  
*Horminum in uino potum.*  
*Gladioli superior radix ex uino sumpta.*  
*Scincorum reues drachmæ pondere ex uino hausti.*  
*Lac omne haustum.*

Ad augendam genituram.

*Coriandrum bibitum.*  
*Omnia medicamēta quæ uenerem excitant, præter ea,*  
*quæ in calore & siccitate excellunt.*

Ad Venerem inhibendam.

*Viticis semen potum, & folia testibus illita.*  
*Portulaca manducata, pudendisq; inuncta.*  
*Lactucæ semen potum nocturnas ueneris imaginatio-*  
*nes arcet.*

*Anethi seminis, & comæ decoctum assidue potum.*

*Ruta in cibo, potuq; sumpta.*

*Canini testiculi herbæ languida, flaccidaq; radix po-*  
*tui data.*

*Cannabis satiuæ semen in cibum largius sumptum.*

*Gladioli inferior radix pota.*

*Cicuta cum sua coma trita, & genitalibus illita, & est*  
*potentissimum medicamentum.*

Ad feminis profluuium.

*Nymphææ radix bibita.*

*Iridis Illyricæ radix ex aceto pota.*

Ad pundendorum ulcera.

*Oesypus illitus.*

*Aloe illita, & in puluerem imposita.*

*Polygoni succus in uino decoctus cū melle adhibitus.*

*Alumen quocunque modo adhibitur.*

*Flos salis inspersus.*

Ad testium inflammationes.

*Cicer cum eruo decoctum appositum.*

*Faba in uino decocta cataplasmatibus adhibita.*

*Senecionis folia cū floribus emplastri modo imposita.*

*Asphodeli radix, & folia illita.*

*Cimolia illita.*

*Melilotum emplastri modo adhibitur.*

*Geodes lapis illitus.*

*Ruta illita cum lauri folijs.*

*Sal cum origano & fermento illitum.*

*Cuminum cum passa uua, fabaq; lomento, aut cera*  
*impositum.*

*Coriandrum cum passa uua, & melle illitum.*

*Lilij concisa radix cum apollinari herba, & triticea fa-*  
*rina cataplasmatibus modo.*

*Samia terra ex rosaceo & aqua illita.*

*Hyoscyami semen tritum ex uino impositum.*

Ad genitalium pruritus.

*Saluæ decoctum ex uino illitum.*

*Resinæ omnes, præsertimq; terebinthina illita.*

Ad induratos testes.

*Irionis semen impositum.*

Ad eos qui natura preputio carent.

*Thapsiæ succus circumlinitus. Tumorem enim exci-*  
*tat, qui deinde pinguium fotu emollitus, preputij ia-*  
*cturam resarcit.*

*Mel triginta diebus à balneo illitum.*

Ad genitalium phagedenas exulcerationes.

*Taurinum fel ex melle illitum.*

*Labruscæ flos tritus cum melle, croco, myrrha, & ro-*  
*saceo impositus.*

Ad genitalium thymos.

*Smaridis falsæ crematum caput illitum.*

*Fel sylvestris capræ inunctum.*

*Fimum ouillum ex aceto impositum.*

*Thymus emplastri modo adhibitus.*

*Thymbra apposita.*

*Ruta cum pipere, nitroq; confricata.*

*Tithymali characiæ lac inunctum.*

*Chamaesices rami triti, & impositi.*

*Mercurialis succus illitus.*

*Heliotropij semen illitum.*

## V T E R I.

Ad uteri strangulatus.

*Mei radices tritæ, & cū melle in eclegmate deuoratæ.*

*Imiperi baccæ potæ.*

*Vngues odorati suffiti.*

*Cimices lectularij naribus illiti.*

*Bitumen*



Bitumen olfactum, suffitum, & admotum.  
 Phoca coagulum potum.  
 Urina cum ligustrino oleo feruescens infusa.  
 Plantaginis succus potus.  
 Sinapi tritum naribus illitum.  
 Agaricum drachma pondere sumptum.  
 Ruta trita excepta melle, pudendis & sedi illita.  
 Panacis herculei semen cum uino bibitum.  
 Sefelis Massiliensis radix, & semen potum.  
 Peucedanum olfactum.  
 Sagapenum naribus ad olfaciendum illitum.  
 Trifolij bituminosi semen, & folia pota.  
 Peonia nigri seminis grana xv. bibita.  
 Alismatis radix pota.  
 Betonica folia drachma pondere in aqua dulci hausta.  
 Gagates lapis suffitus.  
 Ad menses ducendos.  
 Iris Illyrica ex uino sumpta, & fotu adbibita.  
 Mei radicum decoctum defensionibus adhibitum.  
 Acori decoctum in defensionibus.  
 Cyperi radicum decoctum fotu adhibitum.  
 Asari radices senis drachmis ex aqua bibita.  
 Fhu decoctum potui datum.  
 Casia odorata in potu sumpta.  
 Cinnamomum haustum, uel ex myrrha suppositum.  
 Amomum pepsis, aut defensionibus additum.  
 Costus ebibitus.  
 Odoratus iuncus potui datus.  
 Calamus odoratus haustus, & suppositus fotu.  
 Cancanum ex aqua malsa potum.  
 Helenij radicum decoctum potum.  
 Myrrha cum absinthio, lupinorum cremore, uel ruta succo admoti.  
 Styrax pota, & apposita.  
 Bitumen ex uino, & castoreo bibitum.  
 Cedrides ex polline piperis hausta.  
 Lauri foliorum decoctum fotu admotum.  
 Phillyrea folia potui data.  
 Viticis semen drachma pondere ex uino haustum.  
 Olea ethiopica, ac nostratis lacryma pota.  
 Amygdala amara admoti.  
 Ficulneum lac cum detrita nuce Græca ebibitum.  
 Cochlea terrestres cum suo operimento tuse, & femineis locis admoti.  
 Castoreum drachmarum duarum pondere haustum.  
 Capæ succus pudendis illitus.  
 Oesypum in lana suppositum.  
 Anserinus, & gallinaceus adeps illitus.  
 Caprarum montanarum simum ex odoramento aliquo potum.  
 Scandulaceum bibitum.  
 Seminis lini decoctum fotu admotum.  
 Lupinorum decoctum cum myrrha, & melle suppositum.  
 Raphanus in cibum sumptus, uel eius succus haustus.  
 Asphodeli radix potui data.  
 Eryngij decoctum haustum.  
 Brassica succus ex loliacea farina suppositus, uel eiusdem decoctum bibitum.  
 Sium pro oleris sumptum.  
 Crithmum, uel eius decoctum in potu sumptum.  
 Centaurij maioris radix bibita, uel eiusdem succus sup-

positus.  
 Condrylla gummi ex myrrha subditus.  
 Lactuca syluestris lacteus succus bibitus.  
 Porrum domesticum, & syluestre comestum.  
 Allij comarum decoctum in defensionibus additum.  
 Cyclaminus tum pota, tum supposita.  
 Abrotani semen ex aqua haustum.  
 Capparis cortex, & semen potui datum.  
 Anemones radix ex uellere apposita.  
 Hederae Corymbi triti subditi.  
 Pulegium bibitum.  
 Agaricum cum oxymelite drachma potere haustum.  
 Origanum potum.  
 Absinthium haustum, uel ex melle subditum.  
 Tragoriganum potui datum.  
 Saluie decoctum potum.  
 Ammi ex uino haustum.  
 Thymi, thymbraeq; decoctum in potu sumptum.  
 Serpyllum potui datum.  
 Smyrni semen ebibitum.  
 Amaraci decoctum haustum, uel pudendis illitum.  
 Baccharis radices decoctum potum.  
 Ruta utraque tum pota, tum subdita.  
 Panaces Herculeum ex uino haustum.  
 Ligustici radix, & semen potum, & illitum.  
 Pastinaca erratica semen potum.  
 Sefelis Massiliensis radix, & semen haustum.  
 Tordilium potui datum.  
 Feniculum ex uino sumptum.  
 Sison bibitum.  
 Libanotis radices pota.  
 Peucedani succus potus.  
 Petroselinum potui datum.  
 Daucum haustum.  
 Hammoniacum in potu sumptum.  
 Nigella pluribus diebus hausta.  
 Sagapenum potum.  
 Laserpitij liquor cum pipere, & myrrha bibitus.  
 Galbanum suppositum, & suffitum.  
 Clinopodium haustum.  
 Chamadryos decoctum potui datum.  
 Lilij cremata radix ex rosaceo subdita.  
 Melissophylli decoctum in defensionibus.  
 Trifolij semen, & folia pota.  
 Poly utriusque decoctum haustum.  
 Scordij succus bibitus, uel herba ipsa subdita.  
 Artemisia decoctum defensionibus additum.  
 Myrrhis bibita.  
 Conyza folia, & flores poti.  
 Hemerocallis radix cum uellere subdita.  
 Rusci folia, & bacca ex uino sumpta.  
 Leucoij decoctum fotum, & defensionibus admotum.  
 Eiusdem seminis duarum drachmarum potere ex uino sumptum.  
 Anthemidis decoctum tum potu, tum fotu adbibitum.  
 Peonia radix amygdala quantitate hausta.  
 Rubie radix supposita.  
 Adianti decoctum bibitum.  
 Trichomanes potui data.  
 Anagyris tria folia ex passo sumpta.  
 Hypericum tam bibitum, quam suppositum.  
 Coris semen potui datum.



*Vrtice utriusque folia trita, & cum myrrha subdita.*  
*Betonice folia drachmæ pondere cum uino sumpta.*  
*Medij semen haustum.*  
*Chamaedaphnes foliorum succus ex uino bibitus.*  
*Gladioli superior radix supposita.*  
*Tragij liquor bibitus, quin etiam semen, & folia pota*  
*drachmæ pondere.*

*Chrysocome ex mellicrato sumpta.*  
*Elaterium in pefso subditum,*  
*Helichrysi coma ex mulso potui data.*  
*Mandragoræ liquor semioboli pondere subditus.*  
*Eiusdem semen bibitum.*  
*Daphnoides hausta.*

*Veratrum { Nigrum } suppositum.*  
*{ Album }*

*Vitis nigra tenella uiticula in cibum sumpta, decocta*  
*olerum, uel asparagorum more.*

*Heliotropij folia supposita.*  
*Vinum scillinum bibitum.*  
*Vinum absinthites haustum.*  
*Vinum hyssopites potum.*

Ad menses cohibendos.

*Nardus Indica.*  
*Muscus arboribus innascens in seſſionibus additum.*  
*Tburis cortex in pefso subditus.*  
*Oxyacanthæ bacca in potu, uel in cibo sumpta.*  
*Hypocistis tum pota, tum indita.*  
*Oleæ sylueſtris succus pudendis admotus.*  
*Rhois semen potum. alba profluvia sistit.*  
*Palmule immature manducata.*  
*Palmularum inuolucrum potui datum.*  
*Punicorum acinorum nuclei siccati in sole, et obsonijs*  
*inſperſi, concoctiue sumpti.*  
*Gallæ in decoctis addita ad inſeſſiones paratis.*  
*Glandium tenuior cortex tum bibitus, tum in passo sup-*  
*positus.*  
*Myrti semen fotu subditum, uel deſeſſionibus additum.*  
*Cotoneorum malorum decoctum fotu adhibitum.*  
*Acacia tum pota, tum indita.*  
*Lycium subditum.*  
*Loti ligni decoctum haustum, aut fotu admotum.*  
*Lentisci folia tam pota, quàm subdita.*

*Coagulum { Leporinum } potum, ac etiã subditum.*  
*{ Hædinum }*  
*{ Agninum }*  
*{ Ceruinum }*  
*{ Hinnulinum }*  
*{ Vitulinum }*

*Ceruinum cornu uſtum, lotum ex adſtringenti liquore*  
*aliquo haustum.*  
*Caprarum môtanarum ſimum ſiccatum tritumue cū*  
*thure in lana suppositum.*  
*Rumicis radices subdite.*  
*Plantago tum bibita, tum fotu adhibita.*  
*Barbæ hyrcinæ succus ex uino sumptus, uel suppositus*  
*Porri comæ decoctum ex aqua marina, et aceto in de*  
*ſeſſionibus.*  
*Rubi ramorum decoctum potum.*  
*Arabice ſpinæ radix manducata.*  
*Phœnix ex uino aſtero bibita.*  
*Papaueris nigri semen potum.*  
*Achillea subdita.*

*Idæa radix hausta.*  
*Rubi decoctum potui datum.*  
*Equiſeti folia bibita.*  
*Mentha fotu subdita.*  
*Iunci marini semen frixum, & ex uino diluto potum.*  
*Ocimaſtrum potum ex uino.*  
*Aniſum haustum, præſertim ad alba profluvia.*  
*Cuminum ex aceto impositum.*  
*Nymphææ, flore luteo, radix, & semen ex uino nigro*  
*pota.*  
*Pæonia ſeminis grana xij. ex uino aſtero sumpta.*  
*Lyſimachie succus subditus.*  
*Moly herba cum loliacea farina indita.*  
*Poligoni succus suppositus.*  
*Symphyti petræi ex uino decoctum haustum.*  
*Clymeni succus bibitus.*  
*Limoniſi semen acetabuli pondere ex uino bibitum.*  
*Medij radix elixa, & ex melle in eclegmate sumpta.*  
*Tragi acini numero x. ex uino hausti.*  
*Hyoscyami semen oboli pōdere in mulſa aqua potum.*  
*Solani hortensis succus in lana inditus.*  
*Mādragoræ ſemē cum ſulphure, & uino suppositum.*  
*Semperuium maius in uellere subditum.*  
*Vuarum uinaceorum decoctum haustum, & fotu ap-*  
*positum.*

*Labruſcæ flos peſſulo inditus.*  
*Omphacium inditum.*  
*Rubigo ferri subdita.*  
*Chalcitis cum ſucco porri indita.*  
*Vini ſex imo uentris, ac pudendis illita.*  
*Hæmatites lapis cū uino haustum.*  
*Morochthus lapis in uellere inditus.*  
*Oſtracites lapis drachmæ pondere ex uino sumptus.*  
*Samia terra cum ſylueſtris punice floribus hausta.*  
 Ad ſecundas pellendas.

*Caſtoreum drachmarum duarum pondere cum pule-*  
*gio bibitum.*  
*Cyclaminis alterius semen haustum.*  
*Allij comæ decoctum fotu impositum.*  
*Ariſtolochia longa cū myrrha, & pipere sumpta, uel*  
*peſſulo indita.*  
*Pulegium bibitum.*  
*Thymi decoctum potui datum.*  
*Thymbræ decoctum haustum.*  
*Apij semen in potu sumptum.*  
*Marrubij decoctum bibitum.*  
*Stachyos decoctum potui datum.*  
*Artemiſiæ decoctum in deſeſſionibus adhibitum.*  
*Circeæ radix quatuor librarum pondere cōtuſa, & in*  
*ſeptē dulcis uini heminis macerata per noctem, di-*  
*emq; tribus diebus pota.*  
*Oenanthes semen, caulis, & folia ex mulſo bibita.*  
*Leucoj ſemen drachmarum duarum pondere ex uino*  
*haustum.*  
*Rubiæ radix supposita.*  
*Anagyris trita folia ex passo bibita.*  
*Chamæpityos ex melle subdita.*  
*Chrysocome ex aqua mulſa pota.*  
*Thrychomanes hausta.*  
*Bryonia supposita.*  
*Myrrha pota.*  
*Peucedani succus potus.*



V T E R I.

Bunij semen potum.  
 Smyrniij semen potui datum.  
 Adianti decoctum bibitum.  
 Ad expellendum foetum.  
 Castorei duarum drachmarum pondere cum pulegio sumptum.  
 Caniculae lac primae foeturae haustum mortuum pellit.  
 Oesypus, in lana suppositus.  
 Caprarum montanarum finum cum aliquo odoramento potum.  
 Vulturis finum suffitum.  
 Ciceris decoctum bibitum.  
 Lupinorum decoctum cum myrrha, & melle fotu adhibitum.  
 Sium pro olere in cibo sumptum.  
 Dracunculi maioris decoctum infusum.  
 Piper haustum.  
 Cyclaminis radix foetori adalligata.  
 Hederae foliorum pediculi melle illiti subditi.  
 Gentianae radix subdita.  
 Centaurij maioris radix indita.  
 Centaurij minoris succus infusus.  
 Pulegium potum.  
 Distamnium bibitum, inditum, incensumq;  
 Thymi decoctum haustum.  
 Thymbræ decoctum potui datum.  
 Baccharis recentissima radix supposita.  
 Panacis Herculei a cuminata radix indita.  
 Pastinacæ erraticæ radix subdita.  
 Seselis Masiliensis radix pota, quin etiam & semen.  
 Galbanum cum myrrha, & uino potum, suffitumq;  
 Clinopodium potum.  
 Chamædryos decoctum haustum.  
 Scordij succus drachmæ pondere sumptus.  
 Artemisiæ decoctum in sessionibus adhibitum.  
 Conyzæ folia, & flores bibita.  
 Leucoij semen duarum drachmarum pondere ex uino potum.  
 Onosmatidis folia ex uino hausta.  
 Rubie radix supposita.  
 Anagyris trita folia cum passo pota, quin et adalligata, sed statim post partum auferantur.  
 Anchusæ radix apposita.  
 Mandragoræ liquor infusus.  
 Myrrhis pota.  
 Heliotropij folia indita.  
 Sulphuris fumus in uterum permeans.  
 Dauci semen bibitum.  
 Ammoniacum haustum.  
 Periclymeni semen drachmæ pondere in uino potum.  
 Lauri Alexandrinæ radix sex drachmarum pondere ex dulci uino sumpta.  
 Alumen subditum.  
 Iaspis lapis foetori adalligatus.  
 Aetites lapis pro amuleto foetori suspensus.  
 Samius lapis adalligatus.  
 Ad conceptionem inhibendam.  
 Salicis folia per se, & cum aqua sumpta.  
 Leporinum coagulum post triduum à purgatione menstrua sumptum.  
 Sanguis menstruus illitus.  
 Brassicæ flores à puerperio in pessulo subditi.

V T E R I.

Asparagi radix suspensa.  
 Piper à coitu illico subditum.  
 Hederae corymbi drachmæ pondere à purgatione hausti.  
 Hedysarum ante coitum foeminae subditum.  
 Cedria virili membro illita.  
 Ostracites lapis sicilici pondere quatuor diebus à purgatione potus.  
 Asplenium (ut quidam credunt) silente luna nocturno tempore decerptum cum muli liene uentri adalligatum.  
 Periclymeni semen, & folia diebus 3 & 6. pota.  
 Epimediij folia trita illico à purgatione quique diebus continuis bibita.  
 Gladioli inferior radix hausta.  
 Filicis foeminae radix potui data.  
 Heliotropium adalligatum.  
 Rubigo ferri pota.  
 Mentha ante coitum uulvae admota.  
 Ad conceptionem iuuandam.  
 Leporinum coagulum cum butyro subditum statim à mensium purgatione.  
 Loliacea farina cum myrrha, thure, bitumine, et croco suffita.  
 Pastinacæ erraticæ semen potum.  
 Ad foetum mortuum educendum.  
 Distamnium tum potum, tum subditum.  
 Salvia decoctum bibitum.  
 Galbanum cum myrrha ex uino potum.  
 Marrubij decoctum haustum.  
 Tusilaginis decoctum potui datum.  
 Ad prohibendum abortum.  
 Aetites lapis sinistro brachio adalligatus.  
 Samius lapis pro amuleto suspensus.  
 Ad puerperia iuuanda.  
 Distamni radix bibita.  
 Baccharis radice decoctum fotu adhibitum.  
 Feniculum erraticum potum.  
 Peucedani succus haustus.  
 Peoniae siccata radix potui data.  
 Althææ decoctum infusum.  
 Ad prægnantium malacias.  
 Vitis uinifera foliorum capreolorumq; succus potus.  
 Ad vteri inflammationes.  
 Nardi Indicæ decoctum fotu adhibitum.  
 Iunci odorati decoctum in defessionibus adhibitum.  
 Viticis foliorum et seminis decoctum fotu appositum.  
 Butyrum recens illitum.  
 Sonchi succus inunctus.  
 Agaricum drachmæ pondere cum oxymelite potum.  
 Pulegij decoctum fotu subditum.  
 Melilotus cum passo emplastri modo impositus.  
 Panacis Herculei lacryma ex melle indita.  
 Artemisiæ decoctum in defessionibus adhibitum.  
 Leucoij decoctum fotu appositum.  
 Anthyllidis radix ex rosaceo, lacteq; indita.  
 Parthenij decoctum in defessionibus additum.  
 Althæa decocta, ac subide anserino, suillive adipe, aut resina terebinthina subacta, subdita.  
 Ac exulceratos locos.  
 Aspalathi ex uino decoctum infusum.  
 Lac in quo igniti calculi extincti fuerit infusum.  
 Oesypum inditum. Explet enim & emollit.



## EXTREMORVM MEMBRORVM.

*Fœni græci folia ex aceto illita.*

*Asclepiadis folia adhibita.*

Ad induratos locos.

*Myrrha cum absinthio, lupinorum cremore, uel ruta admota.*

*Styrax illita.*

*Anserinus & Gallinaceus adeps illitus.*

*Bdellium inunctum.*

*Maluæ decoctum inditum.*

*Ladanum pēsis immissum.*

*Panaces Herculeum ex melle inditum.*

*Ebuli, sambuci; decoctum fotu admotum.*

*Parthenij decoctum in defecationibus.*

*Fœni græci ex aqua expressus succus cum anserino adipe in pessulo subditus.*

*Lilij radix admota.*

*Ageratum suffitum.*

Ad vteri inflammationes.

*Rutæ ex oleo decoctum clystere perfusum.*

*Geranium, & eius radix drachmæ pondere pota.*

Ad procidentem vterum.

*Casia fotu uel suffitu adhibita.*

*Myrti baccarum succus in defecationibus.*

*Cotoneorum malorum decoctum fotu adhibendum.*

*Gallarum decoctum in defecationibus additum.*

*Acacia subdita.*

*Hypocistis subdita.*

*Vrticæ utriusque folia imposita.*

*Acetum fotu adhibendum.*

Ad vteri dolores & erosiones.

*Adeps { Anserinus } illitus.*

*Vrina cum ligustrino oleo feruēfacta imposita.*

*Lini seminis decoctum infusum.*

*Maluæ decoctum fotu adhibendum, uel infusum.*

*Portulacæ decoctum clysmate inditum, propriè facit ad erosiones.*

*Rhaponticum potum.*

*Centaurij maioris radix bibita.*

*Anethi decoctum in defecationibus.*

*Verbenacæ rectæ folia ex recetī suillo adipe, uel ex rosaceo subdita.*

*Hyoscyami seminis cremor inditus.*

*Mandragoræ liquor pessulis impositus.*

## EXTREMORVM MEMBRORVM.

Ad podagram.

*Amomum illitum.*

*Mei radices impositæ.*

*Populi nigre folia ex aceto illita.*

*Amurca cruda, ac recens fotu adhibita.*

*Salicis foliorum, & corticis decoctum fotu impositū.*

*Ficulneum lac cum farina fœnigræci, & aceto cataplasmatibus additum.*

*Cochleæ terrestres, suo cum operimento tuæ, impositæ.*

*Mustelæ crematæ cinis ex aceto inunctus.*

*Marinus recens pulmo concisus impositus.*

*Lac humanum cum opio, & cera illitum.*

*Adeps ouillus, caprillus, hircinusue ex eiusdē animalis fimo coactus inunctus.*

*Sanguis menstruus inunctus.*

*Caprarum mōtanarum fimum ex earum adipe illitū.*

*Hordei farina cum cotoneis malis imposita.*

*Lēs cum polēta decocta, & emplastri modo adhibita.*

*Raporum decoctum fomentis additum.*

*Brassica cum fœno greco, & aceto in cataplasmate.*

*Intybus per se, & cum polenta illitus.*

*Cucurbitæ ramenta imposita.*

*Ari radix fimo bubulo emplastri modo excepta.*

*Asphodeli radix drachmæ pondere ex uino pota.*

*Cyclaminis decoctum fotu adhibendum.*

*Bulbi per se, & cum melle impositi.*

*Panaces Herculeum cum passa una illitum.*

*Libanotis cum loliacea farina, et aceto cataplasmatibus addita.*

*Scordium ex aceto, aut aqua impositum.*

*Leucoium ex aceto illitum.*

*Androsaces imposita.*

*Helxines succus cera, et hircino adipe exceptus illitus*

*Hyoscyami semen, et folia cum polenta cataplasmatibus adhibita.*

*Semperuiuum inunctum, ubi calor exasperat.*

*Vrtica emplastri modo illita.*

*Musculus marinus impositus.*

*Cucumeris asinini radix ex aceto inuncta.*

*Thapsiæ succus illitus.*

*Glans unguentaria illita.*

*Sambuci & Ebuli folia cum seuo taurino, aut hircino imposita.*

*Bryonia cum caprino stercore cataplasmatibus addita.*

*Heliotropij folia illita.*

*Vua passa à nucleis repurgata, & cum panacis succo inuncta.*

*Acetum calido fotu cum sulphure adhibendum.*

*Rubigo ferri illita.*

*Sulphur cum aqua, & nitro inunctum.*

*Sal cum aceto impositum.*

*Asius lapis cum fabarum lomento illitus.*

*Gagates lapis inunctus.*

*Fornacæ testæ exusta impositæ.*

Ad coxendicos affectus.

*Mei radices impositæ.*

*Helenij folia ex uino cocta imposita.*

*Iridis Illyricæ decoctum clysmate infusum.*

*Cardamomum ex aqua potum.*

*Asarum potum, uel clystere infusum.*

*Populi albæ cortex uncie pondere haustus.*

*Iberis contusa, & emplastri modo imposita.*

*Siluri piscis salsamentum clysteribus infusum.*

*Piscium Garum clysteribus iniectum.*

*Smyrnijs semen potum.*

*Bubulum fimum ex bubus in pascuis degentibus illitū.*

*Lolij farina ex aqua mulsa decocta imposita.*

*Lupinorum farina ex aceto illita.*

*Ammoniacum bibitum.*

*Ascyri semen ex aqua potum.*

*Asparagi radicum decoctum bibitum.*

*Althææ decoctum potui datum.*

*Sinapi tritum cum fico impositum donec ruborem excitet.*

Nasturtium



# EXTREMORVM MEMBRORVM.

*Nasturcium clysmate infusum.*  
*Irionis semen clystere iniectum.*  
*Bulbi per se, & cum melle impositi.*  
*Capparis semen potum.*  
*Lepidij folia, & radices, cum helenij radice trita, & imposita.*  
*Agaricū trium obolorū pondere in aceto mulso potū.*  
*Rhaponticum potum.*  
*Androsēmi semen bibitum. Sed à purgatione aquam exorberē oportet.*  
*Centaurij maioris decoctum clystere infusum.*  
*Leucacanthæ radices ex uino decoctum bibitum.*  
*Abrotani semen cum aqua potum.*  
*Rubiæ radix pota.*  
*Pulegium illitum, quousque rubescat cutis.*  
*Calamintha imposita recens tritaq; donec exuratur locus.*  
*Thymus ex fimo cum polēta impositus. Idem præstat & Thymbra.*  
*Rute sylvestris semen quadraginta diebus potum.*  
*Panaces Herculeum ex melle inunctum.*  
*Laser cera, ligustino, & Irino oleo subactum, illitum.*  
*Euphorbium in odorata potione sumptum.*  
*Leontopetalum clysteribus infusum.*  
*Hyperici semen quadraginta diebus potum.*  
*Chamæpityos folia quadraginta diebus ex dulci aqua bibita.*  
*Betonicæ folia ex aqua bibita.*  
*Polemonie radix ex aqua sumpta.*  
*Xyridis radix ex mulso pota.*  
*Ocimastrisemen cum uino, myrrha, et pipere sumptū.*  
*Quinquefolij radices decoctum potum.*  
*Helichrysi coma ex uino hausta.*  
*Papaueris corniculati radices decoctum potum.*  
*Aethiopis decoctum bibitum.*  
*Arction ex uino haustum, & illitum.*  
*Chamæcisi folia trium obolorum pondere in aqua cyathis tribus tricenis quadragenisue diebus pota.*  
*Colocynthis clystere infusa, & recens loco confricata.*  
*Cucumeris sylvestris radix clysmate infusa.*  
*Spartij ramorum ex aqua marina dilutum infusum.*  
*Scammonia ex aceto decocta, & cum hordeacea farina imposita.*  
*Acetum mulsum haustum.*  
*Sory ex uino clystere infusum.*  
*Muria clystere indita.*  
*Adarces illitus.*

## Ad articularum dolores.

*Gallorum senescentium ius potum.*  
*Brassica cum sæno græco, & aceto illita.*  
*Ruta tum hausta, tum cataplasmatis adhibita.*  
*Agaricum drachmæ pondere ex aceto mulso sumptū.*  
*Melissophyllum ex sale impositum.*  
*Quinquefolij radices decoctum bibitum.*  
*Psyllium ex rosaceo, & aceto, aut aqua illitum.*  
*Mandragoræ radix cum polenta imposita.*  
*Vrtica cataplasmatis modo adhibita.*  
*Veratrum nigrum potum.*  
*Fucus marinus recens impositus.*  
*Thapsiæ succus inunctus.*  
*Narcissi radix trita, & ex melle imposita.*  
*Acetum mulsum potum.*

*Vinum melitites frequentius potum.*

*Ad articularum collisiones.*

*Sarmentitius cinis cum axungia uel oleo illitus.*

*Ad articularum tophos.*

*Cannabis sylvestris radix decocta, & illita.*

*Ochra inuncta.*

*Ad perniones.*

*Thus cum suillo adipe aut anserino impositum.*

*Pix liquida inuncta.*

*Acacia illita.*

*Myrti seminis decoctum fotu adhibitum.*

*Ficus cremata cum cerato imposita.*

*Cancrorum fluuiatilium cinis cū decocto melle illitus.*

*Pulmo marinus recens concisus, & impositus.*

*Asinina ungula cinis oleo maceratus illitus.*

*Vrsinus adeps inunctus.*

*Vmbilici ueneris succus impositus.*

*Lentes cum meliloto, siccis rosas, malicorio, cydonio malo, & rosaceo adhibita.*

*Orobi decoctum fotu impositum.*

*Raporum decoctum fomenti modo.*

*Betæ decoctum impositum.*

*Draconculi maioris folia ex uino decocta, & imposita.*

*Oleum in excavata asphodeli radice decoctum illitū.*

*Cyclamini decoctum fotu adhibitum, quinetiam oleū cū pauca cera in eius excavata radice feruefactū, illitum.*

*Scilla cremata imposita.*

*Ranunculi decoctum inunctum.*

*Arction ex uino illitum.*

*Alumen aqua aspersum.*

*Ad pedum inflammationes ex calceorum atritu.*

*Pulmo*  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Agnimus} \\ \text{Vrsinus} \\ \text{Suillus} \end{array} \right\}$  *impositus.*

*Calceamentorum ueterum solea combusta, & illita.*

*Capæ succus cum adipe gallinaceo impositus.*

*Ad pedum rimas.*

*Cancrorum fluuiatilium cinis cū decocto melle illitus.*

*Scilla oleo feruefacta, & cum resina imposita.*

*Ad digitorum reduuias.*

*Punicorum malorum succus illitus.*

*Myrti folia trita, & inspersa.*

*Oleæ sylvestris folia trita, & imposita.*

*Eboris ramenta in puluercm adhibita.*

*Aloe cum passo imposita.*

*Paronychia concisa & illita.*

*Bryonia oleo decocta, quousque liquecat, inuncta.*

*Labruscæ cremati flores ex melle impositi.*

*Rubigo ferri illita.*

*Acacia illita.*

*Rhois folia ex aceto, aut melle illita.*

*Marrubij folia ex melle imposita.*

*Quinquefolij radix illita.*

*Tithymali characiæ lac illitum.*

*Acetum illitum.*

*Alumen aqua inspersum.*

*Sal impositum.*

*Ad Paronychia.*

*Thus cum melle illitum.*

*Eboris scobes inspersus.*

*Paronychie*

## EXTREMORVM MEMBRORVM.

*Paronychia folia illita.*

Ad scabros vngues auferendos.

*Pix liquida illita.*

*Lin isemen cum pari nasturtio & melle.*

*Cupressi pilula imposita.*

*Lapathi cuiusque radix in aceto decocta illita.*

*Ranunculi folia, & radices admota.*

*Chelidonium minus illitum.*

*Viscum cum trito auripigmento appositum.*

*Aumen cum aqua aspersum.*

*Sulphur cum resina terebinthina inunctum.*

*Saludaracha cum pice imposita.*

*Fex uini cremata ex resina.*

Ad mobiles vngues extrahendos.

*Vua passa illita.*

Ad contusos vngues.

*Bulbi cum polenta impositi.*

Ad clauos & callos.

*Fermentum triticeum illitum.*

Ad varices.

*Cirsij radix dolenti loco adalligata.*

Ad lumborum dolores.

*Echij radix pota.*

*Chamaeleuce illita.*

Ad inguinum inflammationes.

*Leporinus pes herba imposita.*

*Aster atticus recens illitus.*

Ad enterocelas.

*Cupressi pilula illita.*

*Punicorum cytini cataplasmatibus additi.*

*Symphytum petraeum emplastri modo impositum.*

*Quinquefolium haustum.*

*Equiseti radix & folia pota.*

*Aloe emplastri modo illita.*

Ad farcocelas.

*Cinis sarmentitius illitus.*

# SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM facultates secundum genera ex Dioscoside.

## FEBRIVM.

Ad tertianas.



*RANEVS* plagella con-  
fricatus, linteoloue illi-  
tus, mox fronti, aut tem-  
poribus impositus.

*Vermes terreni cum an-  
serino adipe decocti, &  
illiti.*

*Plantaginis radices inte-  
græ tres cū uini cyathis*

*tribus, & pari aqua pota.*

*Trifolij bituminosi tria folia trita, totidemq; semina  
epota.*

*Hypericum ex uino bibitum.*

*Verbenace supinae tertius à terra geniculus cum adia-  
centibus folijs bibitus.*

*Heliotropij seminis grana quatuor pota ante febris ac-  
cessionem.*

*Portulacæ succus haustus.*

Ad quartanas,

*Cimices lectularij septem canis fabarum inclusi, &  
poti.*

*Plantaginis radices integræ quatuor, cum uini cyathis  
quatuor, & pari aqua bibita.*

*Vermiculi, qui in Dipsaci echino internis partibus con-  
clusi reperiuntur, in aluta collo, brachioe adalliga*

*Ruta syluestris cum uino pota.*

*Hypericum ex uino haustum.*

*Quinquefolij rami quatuor sumpti.*

*Verbenace supinae quartus à terra geniculus una cū  
adiacentibus folijs haustus,*

## FEBRIVM.

*Heliotropij seminis grana quatuor hora una ante ac-  
cessionem.*

Ad diurnas febres.

*Galli senis ius Dioscoridis modo paratum potum.*

*Agaricum haustum.*

*Vinum melitites haustum, ubi uenterculus magna im-  
becillitate laboret.*

Ad hepielas.

*Hyosciami tria, uel quatuor folia pota.*

Ad febrium circuitus.

*Sinapi cibus inspersum.*

*Smyrni semen potum.*

*Piper bibitum.*

*Ruta pota.*

*Sagapenum haustum.*

*Anthemis chysmate infusa.*

*Polygoni succus hora ante accessionem sumptus.*

*Quinquefolij folia ex dulci aqua, aut diluto uino cum  
exiguo pipere bibita.*

Ad ethicam.

*Portulaca tū uentriculi osculo, tū hypochondrijs illita.*

Ad febrium algores.

*Piper haustum.*

*Agaricum drachmæ pondere sumptum.*

*Aristolochia rotunda ante accessionem bibita.*

*Abrotanum ex oleo inunctum,*

*Calaminthæ decoctum potum.*

*Panaces Herculeum illitum.*

*Smyrni semen, & radix ex mulso pota.*

*Pyrethrum inunctum.*

*Lasar cum pipere, & thure ex uino haustum.*



Conyza ex oleo inuncta.  
 Coris semen cum pipere haustum.  
 Buglosi radix cum semine bibita.  
 Periclymeni semen ex oleo inunctum.  
 Ad pestilentes febres.  
 Myrrhis bis, uel ter qualibet die ex uino pota.

T V M O R V M P R A E T E R  
 N A T V R A M

Ad inflammationes.

Harundinum virentia folia tusa illita.  
 Glandes intrita, & illitu apposita.  
 Rhois semen ex aqua illitum.  
 Lupinorum farina cum polenta, & aqua imposita.  
 Umbilici Veneris succus circumlitus.  
 Plantago emplastri modo imposita.  
 Asphodeli radix cum polenta adhibita.  
 Acetum in succidis lanis, aut spongijs impositum.  
 Rhaponticum cum aceto illitum, ubi diutius perseuera-  
 uerit inflammatio.  
 Pulegium cum polenta illitum.  
 Tusilaginis folia contrita, & ex melle imposita.  
 Parthenium emplastri modo impositum.  
 Lonchitis altera imposita.  
 Cannabis sylvestris radix emplastri modo adhibita.  
 Polygonon illitum.  
 Tribuli fructus cataplasomatis additus.  
 Xyridis radix ex aceto imposita.  
 Achillea illita.  
 Helxine cataplasomatis addita.  
 Lichen herba adhibita.  
 Verbenacæ supina folia illita, ubi inflammatio diu-  
 tius perseuerat.  
 Papaueris folia, una cum calycibus illita, uel calyces  
 tantum cum polenta adhibiti.  
 Hyoscyami semen, & folia imposita.  
 Mandragoræ recentia folia cum polenta illita.  
 Bryonia radix ex uino decocta adhibita.  
 Sambuci, ebuliq; prætenera folia cum polenta illita.  
 Indicum illitum rumpit.  
 Triticeæ furfures acerrimo aceto elixi impositi.  
 Tritici pollen ex hydrelæo, uel aqua mulsâ illitus.  
 Triticeus panis ex aqua mulsâ decoctus, & herbis ad-  
 idem conferentibus additus, & impositus.  
 Sesamum illitum.

Ad carbunculos.

Ligustri folia imposita.  
 Pix liquida ex melle, & uua passa illita emarginat,  
 disrumpitq;  
 Cupressi folia trita, & imposita.  
 Sabine folia ex uino illita carbunculos circūscribunt.  
 Oliuæ maturæ arefactæ illite emarginant.  
 Nucum iuglandium ueterum nuclei peruncti.  
 Columbinum finum cū melle, & lini semine subactū.  
 Erui farina emplastri modo imposita.  
 Lupinorum farina ex aceto adhibita.  
 Brassica cum sale illita rumpit.  
 Nasturtium impositum.  
 Porrum cum sale appositum.  
 Panaces Herculeum illitum.  
 Coriandrum cum passa uua ex melle impositum.

Laserpitij liquor inunctus.  
 Tithymali caraciæ lac illitum.  
 Uua passa à nucleis repurgata, & cum ruta imposita.  
 Ad furunculos & tubercula.

Fermentum triticeum impositum.  
 Helxine illita.  
 Sal cum uua passa, aut suillo adipe, aut melle impositū.  
 Hastulæ regiæ radix in fece uini decocta, illita.  
 Ephemeris folia ex uino cocta, & imposita.  
 Vtriusque urticæ folia illita.  
 Leontopodij radix suspensa.  
 Cucumeris sylvestris radix cum resina terebinthina  
 imposita.  
 Scammonia succus cum melle, aut oleo illitus.  
 Mori radices liquor illitus.  
 Thapsia succus ex melle illitus.  
 Pycnocomi folia inuncta.  
 Sandarachæ cum adipe imposita.  
 Asius lapis liquida pice, aut resina terebinthina exce-  
 ptus, illitus.  
 Cimolia terra ex aceto illita.

Ad gangrænas.

Rhois folia ex aceto, & melle illita.  
 Punicorum succus inunctus.  
 Nucum iuglandium ueterum nuclei peruncti.  
 Ficulnei cineris lixiuium spongijs exceptū et impositū.  
 Loliacea farina cum sale, & raphano cataplasomatis  
 addita.  
 Cicerum farina cum hordeo, & melle adhibita.  
 Lentes cum sertula campana, rosaceo, siccis rosis, ma-  
 licorio, & salsa aqua illite.  
 Erui farina illita.  
 Brassica elixa cum melle, cataplasomatis addita.  
 Bulbi per se, & cum melle impositi.  
 Laserpitij liquor illitus, loco prius scalpello exciso.  
 Galiopsis folia, semen, succus, & caulis, ex aceto  
 imposita.  
 Verbaschi florem aureum ferentis folia adhibita.  
 Tithymali caraciæ lac impositum.  
 Bryonia radix; fructus, & folia cum sale illita.  
 Uua passa à nucleis repurgata, et cum sale imposita.  
 Ad erysipelas, & sacros ignes.

Crocum illitum cum refrigerantibus.  
 Cupressi folia per se, & cum polenta imposita.  
 Rhamni folia illita.  
 Ligustri folia adhibita.  
 Rosæ illita.  
 Acaciæ succus inunctus.  
 Oleæ sylvestris folia contrita, & imposita.  
 Myrti folia cum omphacino oleo, aut exiguo rosaceo,  
 & uino illita.  
 Menstruus mulierum sanguis circumlitus.  
 Caprarum mōtanarum finum ex uino, uel aceto deco-  
 ctum impositum.  
 Urine humana sedimen inunctum.  
 Lentes cum meliloto, siccis rosis, rosaceo, & mali-  
 corio adhibita.  
 Malua ex oleo decocta, & illita.  
 Brassica utraque incisa, et cum polenta emplastri mo-  
 do imposita.  
 Portulaca cum polenta cataplasomatis addita.  
 Plantago illita cum cimolia, & cerussa.



*Intybi radix, & folia cum polenta imposita.*  
*Isatidis folia illita.*  
*Acinos cataplasmatibus addita.*  
*Ruta succus cum aceto, cerussa, & rosaceo inunctus.*  
*Coriandrum cum pane, polentaue illitum.*  
*Lilij folia ex aceto illita.*  
*Tussilaginis folia trita, ex melle imposita.*  
*Parthenium cum floribus emplastri modo impositum.*  
*Polygonum illitum.*  
*Anchuse radix cum polenta adhibita.*  
*Lycopsis radix cum polenta imposita.*  
*Rubi Idae flos illitus.*  
*Helxine imposita.*  
*Quinquefolij radix decocta cataplasmatibus indita.*  
*Verbenaca recta ex aceto inuncta.*  
*Papaueris nascula concisa cum polenta imposita.*  
*Solani hortensis folia cum polline polenta illita. Quin et eiusdem succus inunctus.*  
*Mandagora radix ex aceto illita.*  
*Cicutæ succus inunctus.*  
*Umbilici Veneris succus circumlitus.*  
*Phyllium, & eius spissamentum inunctum.*  
*Lens palustris illita.*  
*Ricini folia ex aceto illita.*  
*Semperuium maius inunctum.*  
*Stratiotes imposita.*  
*Acetum circumlitum.*  
*Rubigo ferri illita.*  
*Chalcitis inuncta.*  
*Sal cum aceto, aut hyssopo illitum.*  

Ad herpetas.

*Acacia succus inunctus.*  
*Myrti folia cum omphacino oleo, aut exiguo rosaceo ex vino imposita.*  
*Olea sylvestris folia contrita, & imposita.*  
*Caprarum montanarum fimum ex vino, vel aceto decoctum illitum.*  
*Lentes cum fertula campana, rosaceo, siccis rosis, & malicorio cataplasmatibus indita.*  
*Helxines succus cum cerussa inunctus.*  
*Plantago imposita.*  
*Chelidonium maius ex vino illitum.*  
*Rubi folia illita.*  
*Solani hortulani succus cum cerussa, rosaceo, & argenti spuma illitus.*  

Ad epinectidas.

*Onillum, caprillumque fimum ex aceto illitum.*  
*Brassica concisa cum polenta imposita.*  
*Plantago quoquo modo adhibita.*  
*Cucumeris folia cum melle inuncta.*  
*Porri folia cum Rhoe obsoniorum cataplasmatibus indita.*  
*Absinthium cum aqua illitum.*  
*Coriandrum cum passa rura, & melle impositum.*  
*Viscum in splenio adhibita.*  
*Heliotropij semen illitum.*  
*Vua passa à nucleis repurgata, cum ruta imposita.*  

Ad strumas.

*Iridis Illyrica radix cocta, & illita.*  
*Pix liquida cum farina hordeacea, & pueri impubis vrina decocta, illita.*  
*Ficus sicca cocta, & imposita.*

*Grossi cocta & illita.*  
*Viperina carnes cocta, & in cibum sumpta.*  
*Mustela sanguis inunctus.*  
*Asinini unguis cinis ex oleo maceratus illitus.*  
*Bubulum fimum è bubus herbas pascentibus sumptum illitum.*  
*Hordei farina cum pice, & impubis pueri urina excocta imposita.*  
*Loliacea farina cum fimo columbino ex uino decocta, adhibita.*  
*Fabarum farina cum melle, & sœno græco illita.*  
*Lens in aceto cum meliloto decocta, illita.*  
*Lupinorum farina ex aceto inuncta.*  
*Rumex decoctus circumlitus.*  
*Plantago cum sale imposita, uel radix collo suspensa.*  
*Sinapi cum sulphure illitum.*  
*Nasturtium ex muria inunctum.*  
*Piper cum pice impositum.*  
*Coriandrum cum faba lomento adhibita.*  
*Galbanum illitum.*  
*Aparine cum axungia inuncta.*  
*Melissophylli folia cum sale cataplasmatibus addita.*  
*Alathæa ex vino, uel aqua mulsâ decocta, imposita.*  
*Quinquefolij radix decocta, ac concisa adhibita.*  
*Laserpitij liquor ex cera illitus.*  
*Umbilici uenenis succus circumlitus.*  
*Mandagora recentia folia cum polenta imposita.*  
*Semperuium tertium impositum.*  
*Galiopsis folia, caulis, semen, & succus cataplasmatibus indita.*  
*Pseudobunij rami quaterni ex aqua poti illitiq;.*  
*Adiantum impositum.*  
*Fornacea testæ ex cerato illita.*  
*Capparis radix, & folia trita & imposita.*  

Ad panos.

*Olea sylvestris folia cum melle inuncta.*  
*Ficus sicca cocta, & illita.*  
*Bubulum fimum ex pascuis sumptum impositum.*  
*Lupinorum farina ex aceto adhibita.*  
*Atriplex tam crudum, quàm coctum illitum.*  
*Plantago cum sale imposita.*  
*Bulbi clixi cum polenta, & suillo adipe illiti.*  
*Isatidis folia imposita.*  
*Eryngium adalligatum.*  
*Abrotanum cum farina hordeacea, & hydreleo subacta illitum.*  
*Acinos herba imposita.*  
*Panacis Asclepij flores, & semē cataplasmatibus indita.*  
*Coriandrum cum faba lomento appositum.*  
*Ammoniacum inunctum.*  
*Onobrychis concisa, & emplastri modo imposita.*  
*Gladioli superior radix, cum loliacea farina, & dulci aqua illita.*  
*Phyllium ex rosaceo, acetoque, aut aqua impositum.*  
*Mandagora folia recentia adhibita.*  
*Galiopsis folia, caulis, succus, & semen illita.*  
*Personata radix cum axungia suo super folio imposita.*  
*Pycnocomum adhibita.*  
*Conyza emplastri modo imposita.*  
*Vini sœx illita.*  

Ad tumores discutiendos.

*Cancris fluuiatiles impositi.*



*Lini semen illitum.*  
*Fœni græci farina cataplasmatibus addita.*  
*Capparis radix, & contusa folia imposita.*  
*Smyrniæ radix illita.*  
*Ammoniacum inunctum.*  
*Buphthalmi folia, & flores cera excepta, & imposita.*  
*Mandragoræ recentia folia cum polenta illita.*  
*Galiopsis folia, caulis, succus, & semen adhibita.*  
*Aegilops imposita.*  
*Diphryges cum resina terebinthina, aut cerato.*  
*Pyrites lapis illitus.*  
*Alabastris lapis crematus, resina, aut pice exceptus.*  
*Cimolia terra illita.*

Ad scirrhum.

*Taurinus sanguis cum polenta illitus.*  
*Bubulum finum ex pascuis assumptum ex aceto illitum.*  
*Loliacea farina cum fimo columbino in uino decocta.*  
*Lini semen cum nitro, & lixiuo ficulnei cineris decoctum.*

*Hydropiper illitum.*  
*Cannabis sylvestris radix imposita.*

Ad carcinomata.

*Cancrorum fluuiatiliu cinis cum melle decoctus, & illitus.*  
*Irionis semen tritum, & impositum.*  
*Vitæ urtica adhibita.*  
*Galiopsis folia, caulis, succus, & semen imposita.*

Ad tumores in uniuersum.

*Suillus adeps illitus.*  
*Brassica utraque concisa, cum polenta imposita.*  
*Cucurbita imposita.*  
*Xanthii semen illitum.*  
*Bulbi elixi cum polenta, & adipe suillo illiti.*  
*Lini semen cataplasmatibus inditum.*  
*Fœni græci semen illitum.*  
*Cepa decocta, & cum passa vna, & ficu adhibita.*  
*Narcissi radix illita.*  
*Bryonia radix ex uino decocta, & imposita.*  
*Isatidis folia applicata.*  
*Smyrniæ radix illita.*  
*Tragoriganum cum polenta impositum.*  
*Mentha cum polenta cataplasmatibus addita.*  
*Amaraci folia cum cera coacta, & illita.*  
*Daucum illitum.*  
*Libanotis radices emplastri modo imposita.*  
*Nigella ex aceto inuncta.*  
*Horminum ex aqua illitum.*  
*Buphthalmi flores cera subacti.*  
*Althea decocta imposita.*  
*Cannabis sylvestris radix emplastri modo adhibita.*  
*Anagyris folia illita.*  
*Polygonon cataplasmatibus inditum.*  
*Xyridis radix ex aceto inuncta.*  
*Helxine imposita.*  
*Quinquefolij radix decocta emplastri modo.*  
*Verbenacæ supina folia imposita.*  
*Phyllium ex rosaceo, acetone, aut aqua illitum.*  
*Ephemeris folia ex uino decocta, illita.*  
*Cytisi folia cum pane inter initia imposita.*  
*Cucumeris agrestis radix cum polenta imposita.*  
*Chamaesyces rami triti, & impositi.*  
*Pycnocomi semen cum polenta illitum.*

*Indicum inunctum.*

*Vini fœx cruda per se, uel cum myrto illita.*

Ad steatomata.

*Chrysanthemi flores cum cerato triti, & impositi.*

Ad meliceridas.

*Rumex cum rosaceo, & croco illitus.*

*Melilotus ex aqua inuncta.*

*Vua passa à nucleis expurgata trita, cum ruta imposita.*

Ad tumores ex ictu.

*Brassica concisa cum polenta imposita.*

*Cucurbita emplastri modo illita.*

*Hydropiper impositum.*

*Thymus, Thymbraque illita.*

Ad sugillata.

*Caseus recens illitus.*

*Succida lana oleo, acetone perfusa.*

*Fabarum farina ex melle, & fœno græco.*

*Lupinorum farina imposita.*

*Raphanus ex melle.*

*Allij cinis ex melle.*

*Sinapi illitum.*

*Hydropiper impositum.*

*Ptarmica cum floribus illita.*

*Bulbi per se, aut ex oui nitello.*

*Rhaponticum ex aceto.*

*Aloë ex melle.*

*Lusperitij liquor illitus.*

*Absinthium ex melle.*

*Aqua maris calida fotu adhibita.*

*Hyssopum ex feruenti aqua.*

*Calamintha ex uino.*

*Amaraci siccata folia ex melle.*

*Cuminum erraticum commansum ex melle, & passa vna illitum.*

*Ammi ex melle.*

*Acetum ex melle.*

*Thapsiæ succus, & radix cum thuris, & cera equali portione duabus tantum horis imposita, & subinde marina aqua fotu adhibita.*

*Bryonia ex oleo decocta quousque liquecat.*

*Sal ex melle inunctum.*

VVLNERVM.

Ad vulnera conglutinanda.

*Cupressi folia trita.*

*Vlmi folia, sed multò magis corticis, tilia, si fasciæ loco intorqueatur.*

*Sycomori liquor illitus.*

*Amurca in cupreo uase decocta illita.*

*Palmula immatura illita.*

*Viticis folia, & semen imposita.*

*Punicorum cytini impositi.*

*Thus inspersum.*

*Lana cinis impositus.*

*Sylvestris brassicæ folia imposita.*

*Argemone illita.*

*Glycyrrhizæ succus illitus.*

*Centaurij maioris recens radix imposita.*

*Centaurij minoris folia tusa, & illita.*

*Achillea imposita.*



Poterij radix concisa illita.  
 Smyrni radix imposita.  
 Aloe in puluerem inspersa.  
 Sarcocolla imposita.  
 Polycnemon ex aqua impositum.  
 Polium emplastri modo impositum.  
 Scordium impositum.  
 Equiseti folia inspersa.  
 Lonchitis folia imposita.  
 Althea in vino, aut mulsa aqua decocta imposita.  
 Sideritis folia imposita.  
 Chamapitys, ex melle adhibita.  
 Sideritis altera imposita.  
 Polygonum emplastri modo adhibitum.  
 Polygonatum emplastri modo admotum.  
 Symphytum petreum inditum.  
 Symphytum emplastri modo impositum.  
 Clymeni succus impositus.  
 Sideritis qualibet illita.  
 Lycopsis radix cataplasmatibus indita.  
 Ocimi semen illitum.  
 Graminis radix concisa, & adhibita.  
 Conyza illita.  
 Quinquefolium adhibitum.  
 Coccum insectorium tritum, & inspersum.  
 Verbenaca illita.  
 Erigeri folia, & flores cum thuris mamma adhibita.  
 Verbasci folia ex aceto.  
 Spongiae recentes sine pinguedine ex aqua uel posca.  
 Succida lana vino, aceto, oleo infusa.  
 Dracunculi folia ex vino decocta.  
 Isatidis folia illita.  
 Stratiotes millefolium impositum.  
 Morochthus lapis inspersus.  
 Ad fluxum sanguinis vulnerum.  
 Sylvestris olea foliorum succus admotus.  
 Galle crematae vino, aceto, aut muria extinctae, inspersae.  
 Puniceorum cytini impositi.  
 Persea arida folia illita.  
 Cupressus pilula cum arboris coma trita & admota.  
 Thus inspersum.  
 Ranarum crematarum cinis illitus.  
 Araneorum tela adhibita.  
 Caprarum montanarum finum ex aceto.  
 Asininum finum tum crudum, tum crematum ex aceto.  
 Stæbis folia imposita.  
 Portulaca illita.  
 Plantago admota.  
 Idea radix admota.  
 Isatidis folia inuncta.  
 Salvia adhibita.  
 Galij flos inditus.  
 Androsæmi folia illita.  
 Quinquefolium admotum.  
 Phoenix herba cum punicea lana corpori alligata.  
 Lichen herba adhibita.  
 Astragali radix indita.  
 Hyoscyami semen oboli pondere in mulsa aqua potum.  
 Stratiotes millefolium admotum.

Cinnabaris, & Sanguis draconis inditus.  
 Alumen admotum.  
 Sulphur impositum.  
 Gypsum inspersum.  
 Spongiae siccae recentes, & uacuae impositae.  
 Spongiarum crematarum cinis ex pice.  
 Ereteria terra inspersa.  
 Stibium inspersum.

Ad sanguinem ex cerebro erumpentem.  
 Callinaceorum cerebrum ex uino potum.  
 Stibium tritum inspersum.

Ad sanguinis grumos.  
 Thymus impositus.  
 Thymbra illita.

Ad vulnera telis venenatis illata.  
 Distamni succus tum potus, tum instillatus.

Ad ossa carne uestienda.  
 Iris Illyrica illita.  
 Panacis Herculei radix imposita.  
 Myrrha cum cochleae carnibus peruncta.

Ad vulnera membranarum cerebri.  
 Butyrum admotum.

Ad vulnerum inflammationes.  
 Bubulum recens finum ex pascuis sumptum, ac subinde folijs inuolutum, & in feruenti cinere calefactum impositum.

Pinorum, & picearum folia trita, & illita.  
 Fabarum farina cataplasmatibus indita.  
 Lupinorum farina admota.  
 Stratiotes imposita.  
 Millefolium ex aceto illitum.  
 Labruscae flores cataplasmatibus inditi.  
 Aerugo illita.

Ad infixam vulneribus extrahenda.  
 Cochleae terrestres cum suo operimento tuse, & appositae.

Siluri salsi caro admota.  
 Lacertae concisum caput impositum.  
 Bulbi cataplasmatibus inditi.  
 Horminum ex aqua illitum.  
 Anagallis adhibita.  
 Narcissi radix cum lolij farina imposita.  
 Aristolochia rotunda imposita.  
 Distamnum admotum.  
 Gladioli radix superior ex uino, & thure illita.  
 Xyridis radix admota.  
 Tragij folia, semen, & liquor illita.  
 Pycnocomi semen cum polenta impositum.  
 Acuta spinæ radix illita.  
 Harundinis radix admota.  
 Sinapi impositum.

Ad carnis excrescentias.  
 Callae tritae, & inspersae.  
 Palmarum nuclei exusti, lotiq; illiti.  
 Erinacei marini operimenti cinis admotus.  
 Crematae purpureae cinis inditus.  
 Conchulae Indicae cinis illitus.  
 Smaridis piscis exustum caput impositum.  
 Lanae crematae cinis inunctus.  
 Scordium siccatum inspersum.  
 Aes istum impositum. Quin etiam aris flos admotus.



Plumbum elotum  
Stibium  
Argenti spuma  
Cerussa  
Gbyriocolla  
Oebra  
Diphryges  
Auripigmentum  
Pumex  
Corallium

Trita, inspersa, illita, uel  
quoquo modo admota.

Asij lapidis flos siccatus

Pyrites lapis cum resina impositus.

Ad vulnera cicatrice obducenda.

Cadmia elota inspersa, uel illita.

Plumbum elotum impositum.

## V L C E R V M.

Ad depascentia vlcera, quæ Græcis

φαιδ' αρα vocantur.

Pini, piceæq; cortex cum chalcantio tritus illitus.

Lentisci decoctum fotu adhibitum.

Cupressi folia trita inuncta.

Sabine utriusque folia trita, & admota.

Rhamni cuiusque folia imposita.

Cisti flores per se illiti.

Oleæ sylvestris folia trita, & adhibita.

Lignorum marcor illitus.

Oliuæ maturæ exuste, trita, & inspersa.

Palme cortex siue inuolucrum admotum.

Myrti folia trita, cum omphacino oleo, aut exiguo ro-

saceo ex vino imposita.

Amygdalæ amara ex vino inuncta.

Smaridis piscis crematum caput, tritum, & illitum.

Garum piscium admotum.

Testudinis fel inunctum.

Loliaceæ farina cum sale, & raphano illita.

Lini semen ex vino decoctum.

Erui farina admota.

Raphanus tritus inunctus.

Betæ folia imposita.

Plantago quoquo modo indita.

Dracunculi maioris radix concisa, ex melle, bryonia

addita.

Asphodeli radix, & folia ex vino.

Anagallis trita adhibita.

Hederæ decocta folia ex vino.

Chelidonij maioris radix ex vino.

Isatidis folia superposita.

Aristolochia rotunda adhibita.

Chamaeleonis nigri radix cataplasmatibus addita.

Pulegium virens appositum.

Marum admotum.

Panacis Asclepij flores, & semen illitum.

Pastinacæ erraticæ folia contusa ex melle.

Coriandrum cum pane polentaue illitum.

Marrubij folia ex melle.

Tithymali characiæ lac illitum.

Omphacium ex aceto inunctum.

Cicutæ succus illitus.

Sedum maius impositum.

Sphondylium cum ruta admotum.

Polygonum superpositum.

Verbenacæ ex aceto.

Solani hortulani folia cum polenta polline illita.

Acetum fotu adhibitum.

Acida muria fotu imposita.

Petasites admota.

Aeris squamma inspersa.

Aerugo illita.

Sal tostum cum polenta adhibitum.

Salis flos inspersus.

Chalcitis illita.

Diphryges inunctum.

Asius lapis tritus ex aceto.

Alumē cū gallæ crematæ pari pondere ex aceti face.

Ad vlcera diuturna.

Cisti flores per se illiti.

Centaurium minus admotum.

Panacis Herculei acuminata radix imposita.

Viscum cum thure inunctum.

Chamaedrys ex melle.

Lilij soliorum succus in æreo uase decoctus ex aceto,

& melle.

Scordium tritum ex melle.

Anchusæ radix oleo incocta ex cera.

Verbenacæ trita ex melle.

Astragali radix illita.

Thalitri radix inuncta.

Personatæ folia imposita.

Omphacium ex aceto.

Sopngiæ recentes siccæ, & uacuæ impositæ.

Asij lapidis flos siccatus illitus.

Ad malefica dolosaq; vlcera.

Plantago quoquo modo imposita.

Dracunculi concisa radix cum bryonia ex melle.

Petasites illita.

Psyllium tritum ex melle.

Bryoniæ folia, fructus, radix cum sale imposita.

Filicis femineæ radix trita, & illita.

Cadmie pulvis inspersus.

Salis flos illitus.

Asij lapidis flos ex melle.

Ostracites lapis ex melle.

Ad sinus & fistulas.

Iridis Illyricæ radicem decoctum infusum.

Suillus adeps infusus.

Mel infusum.

Plantaginis succus inditus.

Dracunculi maioris radice succus ex melle.

Aristolochia rotunda cum iride ex melle.

Sphondilij ramēta circūligata sinuum callos erodunt.

Quinquefolium cum sale ex melle.

Stratiotes millefolium infusum.

Tithymali characiæ lacteus succus inditus.

Omphacium cum aceto.

Chalcitis collyrij modo infusa.

Cadmia illita.

Spongia recens sine pinguitudine ex decocto melle im-

posita.

Gentiana quoquo modo adhibita.

Ad vlcera in callum indurata.

Capparis radix exiccata imposita.

Aerugo cum ammoniaco collyrij modo imposita.

*Spongiæ aridæ lino ligatæ, & in pænicilli modo impositæ.*

Ad vlcera ab erodentibus  
prouenientia.

*Lac omne, & præsertim bubulum illitum.*

Ad phthiriasim.

*Staphis agria trita, & ex oleo illita.*

Ad fordida vlcera.

*Oleæ syluestris folia tusa ex melle.*

*Iris Mlyrica ex melle.*

*Colymbades trita & imposita.*

*Resina terebinthina illita.*

*Pix liquida cum melle indita.*

*Erinacei marini operimentum exustum impositum.*

*Purpure crematæ cinis illitus.*

*Conchulæ Indicæ cinis inspersus.*

*Orobi farina admota.*

*Brassica cum feno græco, & aceto illita.*

*Asphodeli folia, & radices imposita.*

*Capparidis cortex siccatus, & adhibitus.*

*Anemones radix illita.*

*Hederæ decocta folia ex vino.*

*Chelidonium maius cum axungia admotum.*

*Aristolochia rotunda imposita.*

*Libanotidis radices siccata ex melle.*

*Ballote ex melle.*

*Marrubij folia ex melle.*

*Verbenacæ supinæ folia illita.*

*Narcissi radix cum erui farina ex melle.*

*Bryoniæ radix, fructusq; cum sale admota.*

*Aerugo ex melle cocta, & imposita.*

*Aes ustum inspersum.*

*Vrtica utraque trita, & illita.*

*Peucedani radix trita inspersa.*

*Cadmia indita.*

*Mel illitum.*

*Pompholyx admota.*

*Muria indita.*

*Alumen quoquo modo adhibitur.*

*Asij lapidis flos exiccatus & illitus.*

Ad ambusta.

*Platani pilule adipe exceptæ illitæ.*

*Ligustri foliorum decoctum fotu adhibitur.*

*Cisti flores cum cerato impositi.*

*Acaciæ gummi ex ovo illitum pustulas prohibet.*

*Myrti folia cruda seu cremata cerato excepta.*

*Mori folia trita ex aceto illita.*

*Thus ex suillo uel anserino adipe exceptum.*

*Buccinæ cinis illitus.*

*Mitulorum combustorum cinis admotus.*

*Conchulæ Indicæ cinis inunctus.*

*Calciamentorum ueterum cinis impositus.*

*Suillus adeps inunctus.*

*Fimum* { *Ouillum cera & rosaceo subactum.*  
*Columbinum*  
*Gallinaceum* } *cum lini semine ex oleo.*

*Sesamum ex rosaceo.*

*Malua decocta ex oleo.*

*Betæ uirentia folia illita.*

*Brassicæ cinis ex oui albo.*

*Lactucæ syluestris lacteus succus ex humano lacte.*

*Hederæ flores ex cera. Quin & decocta folia ex vino.*

*Acanthi radix illita.*

*Rutæ syluestris semen, & folia admota.*

*Glutinum calida aqua maceratū illitum pustulas prohibet.*

*Typhæ flos uetere suillo adipe eloto exceptus.*

*Hemerocallis radix illita.*

*Althææ folia ex exiguo oleo admota.*

*Hyperici semen, & folia imposita.*

*Ascyri semen, & folia adhibita.*

*Androsæmi folia imposita.*

*Anchusæ radix in oleo decocta ex cera.*

*Helxine admota.*

*Papaueris corniculati folia ex oleo.*

*Verbasci syluestris folia cataplasmatibus addita.*

*Stimmi ex recenti adipe illitum postulas prohibet.*

*Alumen ex aqua.*

*Sal ex oleo*

*Cimolia terra illita* } *pustulas prohibet.*

*Phrygius lapis cerato exceptus.*

*Atramentum scriptorium ex aqua.*

*Cinnabaris, & sanguis draconis illitus.*

*Galij flos inunctus.*

*Lilij radix cremata ex rosaceo. Quin & folia illita.*

*Cynoglossæ folia ex ueteri suillo adipe.*

*Sambuci prætenera folia inuncta.*

*Narcissi radix ex exiguo melle.*

*Oleum ex cauatis asphodeli radicibus decoctum illitum.*

Ad fauos.

*Peponis radix ex melle.*

*Nasturtium illitum.*

Ad ficos.

*Bulbi in cinere tostii, & cum capitum manarum cinere impositi.*

Ad intertrigines.

*Calciamentorum crematorum soleæ illitæ.*

Ad vlcerum inflammationem.

*Aranei tela imposita.*

Ad vlcera caua explenda.

*Thus inditum.*

*Pix liquida cum melle.*

*Pix arida imposita.*

*Medulla ossium quadrupedum quolibet inuncta.*

*Mel infusum.*

*Cadmia inspersa.*

*Corallium inditum.*

*Asij lapis flos ex melle.*

*Eretria terra illita.*

*Pumex inspersus.*

Ad vlcera cicatrice obducenda.

*Purpurarum crematarum cinis illitus.*

*Mitulorum*

*Conchulæ Indicæ* } *cinis illitus.*

*Aloe inuncta.*

*Eupatorii folia concisa ex suillo adipe.*

*Filicis semina radix sicca in puluerem aspersa.*

*Cadmia admota.*

*Aes ustum impositum.*

*Squama aris inspersa.*

*Aerugo ex oleo & cera.*



# LUXATIONVM ET FRACTVRARVM.

Stimmi  
Molybdæna  
Argenti spuma  
Cerussa  
Chalcitis  
Pumex  
Fex uini cremata  
Calx lota  
Corallium  
Asij lapidis flos  
Fornacea testæ tosta }  
quoquo modo adhibita.

## LUXATIONVM ET FRACTVRARVM.

Ad artuum luxationes.

Harundinis radix cum aceto adhibita.  
Personatæ radix trita illita dolores artuum à contor-  
sionibus sedat.  
Acaciæ decoctum fotu adhibitum.  
Vitici semen cum folijs cataplasmatitis additum.  
Stercus caprillum cum cera, & rosaceo inunctum.  
Asparagi radix ex aceto, uel uino adhibita.  
Cyclamini decoctum fomenti modo.  
Bulbi cataplasmatitis more adhibiti.  
Acanthi radices impositæ.  
Sampsuchi folia cum cera coacta imposita.  
Anchusæ folia cum melle, & farina adhibita.  
Vrtica utraque imposita.  
Narcissi radix cum melle trita.  
Vitis nigræ folia cum uino imposita.  
Filicula imposita.  
Heliotropij folia linita.  
Sarmentorum uitis, & uinaceorum cinis ex aceto li-  
nitus.  
Sal cum farina, & melle.

Ad ossa fracta.

Myrthi foliorum decoctum fotu adhibitum.  
Succida lana oleo, uino, acetoq; perfusa.  
Verbasci decoctum potum.  
Fuligo pictoria cum rosaceo cerato imposita.  
Vlmi foliorum, aut corticis radicum decoctum per-  
fusus.

Ad ossa fracta euellenda.

Aristolochia rotunda cataplasmatitis more imposita.  
Peucedani radix in puluerem imposita.  
Euphorbium impositum.  
Xyridis radix addito flore æris.  
Bryonia trita, & imposita.  
Vitis nigræ radix.

Ad eos qui ab alto deuoluuntur.

Gentianæ radices succus drachmæ pondere haustus.  
Baccharis radices decoctum potum.  
Millefolium cum aqua, & sale potum.  
Lixiuum ex cinere sarmentitio factum cum aceto, sa-  
le, & melle.

Ad ruptos.

Acori decoctum potum.  
Cardamomum ex aqua potum.  
Calami odorati decoctum cum graminis, aut apij se-  
mine potum.  
Helenij radices in eclegmate cum melle deuorata.

Bdellium haustum.  
Iuniperi bacca bibita.  
Cedrides deuorata.  
Halimi radix drachmæ pondere in aqua mulsa pota.  
Dracunculi maioris radin tosta, & elixa cum melle  
sumpta.  
Asphodeli radix drachmæ pondere in uino pota.  
Bulbi elixi in aceto, & in cibo sumpti.  
Agaricum trium obolorum pondere deuoratum cum mulso.  
Gentianæ radices succus drachmæ pondere haustus.  
Aristolochia rotunda bibita.  
Serpillum potum.  
Centaurij maioris radix hausta cum uino.  
Acanthi radices pota.  
Smyrniæ radix comesta, uel pota.  
Leucacanthæ radices ex uino decoctum potum.  
Abrotani semen ex aqua potum.  
Origanum cum ficu deuoratum.  
Equiseti radix & folia pota.  
Calaminthæ decoctum haustum.  
Baccharis radices decoctum bibitum.  
Libanotis radices pota.  
Sagapenum bibitum.  
Laserpitij liquor cum lixiuio potus.  
Galbanum deglutitum.  
Polycnemum bibitum cum uino.  
Scordium additis nasturtio, melle, resinaq; deuoratum.  
Althææ decoctum potum.  
Alceæ radix in uino uel aqua pota.  
Betonice folia drachmæ pondere in dulci aqua bibita.  
Symphytum petraum cum aceto mulso potum.  
Symphyti radix pota.  
Xyridis radix ex mulso pota.  
Helichrysi coma in uino pota.  
Verbasci decoctum potum.  
Bryonia cum melle in eclegmate deuorata.  
Schiſtus lapis potus.

## VENENORVM.

Ad omnium venenosorum morsum,  
ictumque.

Iridis illrice radix ex aceto pota.  
Cardamomum ex uino potum.  
Nardus Celtica cum absinthij decocto hausta.  
Pbu antidotis inseritur, quæ uenenatis resistunt mor-  
sibus.  
Cinnamomum bibitum.  
Cassia potui data.  
Helenij radices decoctum potum.  
Bdellium potui datum.  
Platani pilula ex uino hausta.  
Ericæ flores poti, Quin etiam coma.  
Vitici semen in potu sumptum.  
Glandes esitate.  
Nuces comesta.  
Sycomori lachryma illita.  
Ficulneum lac plagis inditum.  
Pix liquida cum trito sale illita.  
Paliuri foliorum, & radices decoctum potum.  
Gallinaceorum cerebrum cum uino potui datum.  
Eruca, quæ in oleribus reperiuntur ex oleo illita.  
Leporinum

Coagulum	Leporinum	} potum ex uino trium obolorum pondere.
	Agnum	
	Hinnulinum	
	Aprinum	
	Cerninum	
	Vitulinum	
	Bubalinum	
	Hedinum	
	Caprea	
	Laticornis	

Marinae testudinis sanguis cum leporino coagulo, & cumino potus.  
 Mel ex calido rosaceo bibitum.  
 Triticea farina ex aceto & uino imposita.  
 Porri succus ex melle sumptus. Quin & coma illita.  
 Porrum syluestre esitatum.  
 Piper quoquo modo sumptum.  
 Eryngium ex uino haustum.  
 Teucrium ex aceto inunctum.  
 Argemone ex uino epota.  
 Agarici trium obolorum pondere ex uino haustum.  
 Rhaponticum potui datum.  
 Chamadrys ex uino bibita.  
 Gentiana radix drachma pondere cum pipere, & ruta ex uino pota.  
 Aristolochia longa drachma pondere potui data, ac etiam plage admota.  
 Origani decoctum haustum.  
 Leucas ex uino sumpta, uel cataplasmatibus addita.  
 Pulegium ex uino potui datum.  
 Distamni succus ex uino potus.  
 Baccharis radix ex uino bibita.  
 Panacis Herculei semen cum aristolochia sumptum.  
 Ligustici tum radix, tum semen haustum.  
 Pastinaca erratica semen potui datum.  
 Anisum potum.  
 Asclepiadis radices ex uino sumptae.  
 Cuminum ex uino haustum.  
 Ammi cum uino potui datum.  
 Delphinium morsui admotum.  
 Lasepii liquor tum inunctus, tum bibitus.  
 Galbanum inunctum homines tutos reddit.  
 Clinopodium haustum.  
 Trifolij bituminosi folia ex oxymelite sumpta.  
 Polij decoctum potum.  
 Betonicae folia trium drachmarum pondere ex uini sextarij duobus hausta, uel admoti.  
 Polygoni succus bibitus.  
 Clematis prima illita.  
 Sparganii radix ex uino pota.  
 Acida muria plage indita.  
 Terra Lemnia hausta.  
 Sal cum origano, melle, & hyssopo illitum.  
 Ad viperarum morsum.  
 Costus, semiunciae pondere potus.  
 Cassia potui data.  
 Pix liquida illita.  
 Iuniperi folia, & foliorum succus potui datus.  
 Fraxini folia, uel eorum succus haustus.  
 Lauri folia admoti.  
 Abrotanum illitum.  
 Galbanum Splenij loco superiectum.

Origanum uirens inditum.  
 Pulli gallinarum discerpti, & confestim admoti.  
 Anthemidis detrita cum hordeacea farina, & mulso aceto cataplasmatibus modo admoti. Sed locus atrox aceto mulso calido foueatur.  
 Rubi folia ex uino illita.  
 Porri succus ex meri hemina haustus.  
 Apiastris succus ex uino potus.  
 Leporis coagulum potui datum.  
 Omotarichi piscis salita carnes in cibum sumptae, hausto deinde copiosiore uino. Quin etiam admoti.  
 Cerui genitale tritum, & ex uino sumptum.  
 Urina ipsiusmet demorsi bibita.  
 Furfures tritici in decocto ruta elixi, admoti.  
 Erui farina ex uino macerata illita.  
 Raphanus inunctus.  
 Brassica succus cum nitro & iride potus.  
 Chondrylla manducata.  
 Allium ex uino sumptum, & illitum.  
 Scilla decocta in aceto, & imposita.  
 Anagallidis succus ex uino sumptus.  
 Ferula medulla in uini potione.  
 Aparinae succus ex uino potui datus.  
 Rubiae radices succus cum folijs potus.  
 Tribuli terrestres succus drachma pondere potus, plagaq; admotus.  
 Anchusa Alcibiadis nomine folia, radicesq; tum comesta, tum bibita, tum adalligata.  
 Ocimastris semen ex uino haustum.  
 Sambuci, ebulij; radix ex uino cocta, potui data.  
 Bryoniae radix duarum drachmarum pondere hausta.  
 Vitium sarmentorum cinis ex aceto illitus.  
 Ad serpentum & aspidum morsum.  
 Cancris fluuiatiles crudi, tritique cum asinino lacte potui dati.  
 Equi fluuiatilis testiculus potus.  
 Castorium bibitum.  
 Mustela salita, et in umbra exicata puluis drachmarum duarum pondere ex uino sumptus.  
 Rana cum sale in oleo decocta comesta.  
 Gobius piscis deuoratus.  
 Cimices lectularij septem quoquo modo hausti.  
 Aprinum iecur, et recens, & siccum ex uino sumptum.  
 Gallinae carnes dissectae, ita ut tepebunt appositae, crebroq; mutatae.  
 Butyrum illitum.  
 Caprarum montanarum finum in uino, uel aceto decoctum illitum.  
 Mel ex calido rosaceo bibitum.  
 Asphodeli radix trium drachmarum pondere sumpta.  
 Quin & folia, flores, & radices in cataplasmatibus.  
 Nasturtium haustum.  
 Spinae albae semen potum.  
 Abrotanum ex uino sumptum.  
 Hyssopum tritum cum melle, sale, & cumino impositum.  
 Nepeta pota, uel cataplasmatibus indita.  
 Panacis Asclepij semen cum floribus haustum, & inunctum.  
 Panaces chyronium bibitum, & illitum.  
 Hieracii succus ex uino potus.  
 Elaphobosci semen in uini potione sumptum.  
 Euphorbium incisa capitis cute ad os usque, in uulnus impositum.



## VENENORVM.

impositum, statimq; consutum.  
 Leontopetalum bibitum illico dolorem aufert.  
 Lili folia illita.  
 Melissophyllum ex uino haustum, et plagæ admotum.  
 Marrubij folia hausta.  
 Serpyllum tum potum, tum impositum.  
 Ruta cum nucibus inglandibus, & caricis sumpta.  
 Phyllitis ex uino hausta.  
 Smyrni radx illita.  
 Feniculum ei uino sumptum.  
 Sagapenum ex uino potui datum.  
 Libanotis radices cum uino bibite.  
 Scordium siccatum ex uino sumptum.  
 Conyza illita.  
 Clematis in aceto bibita.  
 Echij radix ex uino pota. Præpota uerò demordei pro  
 hibet, id quod præstant semen, & folia.  
 Ocimastri semen potum.  
 Eupatorii semen, & folia in uino sumpta.  
 Helicrysi coma ex uino bibita.  
 Verbenacæ supine radix, & folia ex uino hausta, tum  
 etiam admotæ.  
 Mandragoræ radix ex melle, aut oleo illita.  
 Nerij radix ex uino sumpta.  
 Acetum calidum fotu adhibitum, ubi illatum uenenis  
 frigidum sit: frigidum uero ubi calidum.  
 Adianti decoctum bibitum.  
 Aqua maris fotu adhibita.  
 Sal cum origano, melle, & hyssopo inunctum.  
 Sarmenitius cinis ex aceto illitus.  
 Samia terra ex aqua pota.  
 Ophites lapis pro amuleto gestatus.  
 Ad hæmorrhoi morsum.  
 Allium bibitum, & illitum.  
 Merum copiosius haustum.  
 Vitium uiniferarum folia decocta, et ex melle subacta  
 imposita.  
 Ad cerasæ morsum.  
 Sesamum cum rosaceo inunctum.  
 Raphani semen ex uino bibitum.  
 Sal cum cedria, aut pice, aut melle illitum.  
 Ad scolopendræ morsum.  
 Asphodeli radix, & semen ex uino pota.  
 Sal ex melle, & aceto.  
 Ruta syluestris admota. Quin, & bibita ex uino.  
 Muria acida fotu adhibita.  
 Aristolochia ex uino pota.  
 Serpyllum potui datum ex uino.  
 Calamintha ex mero sumpta.  
 Ad dryini morsum.  
 Aristolochia cum uino hausta.  
 Trifolij bituminosi folia in potu sumpta.  
 Asphodeli radix potui data.  
 Glandes quæcunque bibite.  
 Illicis radices tise, & isto loco illite.  
 Ad natricis morsum.  
 Origanum tritum, et aqua subactum ex lixiuio, et oleo  
 inditum.  
 Aristolochiæ cortex minutim contritus cū querna ra  
 dice, & hordei farina ex melle illitus.  
 Aristolochiæ binæ drachmæ in portione poscæ potæ.  
 Marrubij succus ex uino haustus.

## VENENORVM.

Fauus recens ex aceto sumptus.

Ad cenchri morsum.

Lactuca semen cum lini semine illitum.

Satureia cū syluestri ruta, et serpyllo, et asphodeli ra  
 dice ex uino sumpta.

Gentiana potui data.

Cardamomum deuoratum.

Ad muris aranei morsum.

Mus araneus ipse discerptus, & impositus.

Allium cum ficulneis folijs, & cumino illitum.

Absinthium uino bibitum.

Chrysogoni radix concisa, & ex aceto imposita.

Galbanum in Splenio admotum.

Hordeacea farina ex aceto mulso illita.

Punica dulcis acini decocti, & inuncti.

Porrum contritum impositum.

Abrotani decoctum ex uino haustum.

Serpyllum ex uino potum.

Eruca ex uino sumpta.

Cupressi recentes pilule ex aceto potui datæ.

Cyclaminus ex aceto mulso sumpta.

Pyrethrum ex uino potum.

Chamæleonis radix bibita.

Ad pastinacæ marinæ, scorpionis & draco  
 nis marini morsum.

Saluia decoctum potum.

Simplicia omnia, quæ viperinis morsibus conueniunt.

Absinthij, aut Sulphuris ex aceto decocti potio.

Animalia ipsa dissecta suo cuiusque ictui admota.

Mullus piscis dissectus, & impositus.

Ocimum cum polenta, & aceto impositum.

Plumbum confricatum.

Sulphur admotum.

Ad morsum mustelæ.

Eruca comesta, et post eam bibitum uinum odoriferū:

Ad morsum basilisci.

Castoreum drachmæ pondere ex uino potum.

Papaueris succus haustus.

Ad caldicæ lacertæ morsum.

Portulaca percocta.

Ad rabidi canis morsum.

Lycium in catapotio datum, aut ex aqua bibitum.

Cancrorū fluuiatilium cinis cochlearum duorum pon  
 dere ex gentianæ radice uino, per triduum in uino  
 potus.

Smaridis piscis salsa caro.

Omotarichi piscis salitæ carnes illitæ.

Garum omnium piscium fomento adhibitum.

Canis rabidi epar tostum, & in cibo sumptum à metu  
 aquæ præseruat.

Caninus sanguis bibitus.

Canina urina bibita.

Mel bibitum cum rosaceo calido.

Triticum commanducatum, & appositum.

Cepæ cum ruta, sale, & melle mixta.

Allium cum uino potum, & cataplasmatidis inditum.

Panaces Herculeum pici mistum, et cataplasmatidis ad  
 ditum.

Feniculi radices concisæ, & ex melle impositæ.

Lasar impositum.

Ballote cataplasmatidis modo cum sale illita.

Melissophyllum



# VENENORVM.

Melissophyllum cum uino bibitum, & cataplasmatibus inditum.

Alyssum in edulio contusum.

Allium syluestre in cibo sumptum & illitum.

Salsamentum inditum.

Succus Cyrenaicus.

Ad canis non rabidi morsum.

Amygdala amara ex melle excepta.

Mitulorum caro imposita.

Gobius piscis impositus.

Orobi farina uino macerata indita.

Plantago cataplasmatibus modo adhibita.

Cucumeris folia imposita.

Bulbi cum melle, & trito pipere cataplasmatibus more impositi.

Mentha imposita.

Urtica nitraque cum sale adhibita.

Cynoglossi radix, & folia cum suillo adipe ueteri imposita.

Sambuci, & ebuli folia illita.

Sarmentitius cinis ex aceto illitus.

Ad phalangiorum morsum.

Myrica fructus poti.

Myrtus ex mero hausta.

Mori foliorum succus cyathi mensura potus.

Lixiuum ficulnei cineris potum, adiecto sale trito, & uino.

Canceri fluuiatiles crudi, tritiq; cum asinino lacte poti.

Mullus piscis dissectus, & impositus.

Malue decoctum impositum.

Myrrhis ex uino pota.

Asparagi radicum decoctum haustum ex uino.

Lactuca syluestris bibita.

Coris semen potum in uino.

Hederae succus cum aceto potus.

Abrotanum cum uino bibitum.

Dauci semen ex uino assumptum.

Nigella drachma pondere cum aqua pota.

Aparine ex uino pota.

Melissophyllum cum uino bibitum, & cataplasmatibus more additum.

Phalangij folia, flores, semenq; potum.

Iunci marini tenella folia propè radicem erumpentia imposita.

Hyacinthi radix pota.

Semperuiuum maius in potu datum.

Aqua maris fotu applicata.

Punica syluestris radix, quàm tenuissimè trita, aut aristolochia cum hordei farina, & aceto subacta.

Apiastri decoctum fotu adhibitum, aut eius folia.

Abrotani

Anisi

Cumini ethiopici } Semè propinatu } binarū drachmarū pondere cum hemina uini.

Ciceris syluestris }

Cedrides trita admotæ, uel bibita }

Platani cortex potus.

Cupressi uiridium pilularum admisto uino decoctum.

Chamaepityos decoctum bibitum.

Trifolij semen propinatum.

Ad tellionis morsum.

Sesamum cum rosaceo.

# VENENORVM.

Ad crocodilorum morsum.

Sal impositum.

Ad quadrupedum morsum.

Aprinum epar tum recens, tum siccum bibitum.

Ad scorpionum ictus.

Cyperus impositus.

Cardamomum ex uino potum.

Amomum ex ocimo illitum.

Lauri bacca ex uino bibita.

Myrti succus ex mero haustus.

Ficus satine lacteus succus plagæ instillatus.

Canceri fluuiatiles crudi, tritiq; cū asinino lacte poti.

Scorpius ipse tritus, & ipositus, uel tostus deuoratus.

Delphinium appositum.

Mullus piscis dissectus, & impositus.

Smaridis piscis salita caro apposita.

Lacerta dissecta, & apposita dolorem sedat.

Mures domestici dissecti, & impositi.

Fimum { Asini } herbas pascentis uino dilutum  
{ Equi } haustum.

Urina humana pota.

Farina triticea ex aceto, & uino pota posita.

Lychnidis semen cum uino potum.

Oxylapathi, & oxalidis semen uino, aut aqua potum.

Sonchi succus comestus, & cataplasmatibus more impositus.

Intybus more cataplasmatibus.

Phalangium herba pota.

Lactuca syluestris bibita.

Ocimum cum polenta impositum.

Asphodeli semen, & flores in uino poti.

Abrotanum in uino potum.

Sampsuchum ex aceto, & sale impositum.

Hieracium maius, & minus cataplasmatibus more appositum.

Laser oleo dilutum impositum.

Colus rustica cum uino pipereq; bibita, et manibus gestata dolorem puncturæ omnino fugat.

Melissophylli folia adhibita.

Polemonij radix alligata.

Rubi flos, & mora.

Verbasci aureum florem ferentis folia imposita.

Chamaesyces succus illitus.

Scorpioides illita.

Heliotropium potum cum uino, & illitum.

Aqua maris fotu imposita.

Sulphur ignem non expertum cū resina terebintina exceptum admotum.

Calamintha trita illita, uel cum posca, fota.

Galbanum Splenij more ductum impositum.

Hordei farina cum uino parata.

Rutæ decoctum fotu adhibitum.

Trifolium tritum iniectum.

Cupressus cum uino, & ruta.

Peucedani succus haustus.

Pulegij

Gentiane } decoctum potum.

Aristolochia præsertim cortex drachmarū duarum pondere.

Sal cum lini semine.

Sapphirus lapis illitus.



## VENENORVM.

Ad uesparum & apum ictum.

Lauri folia trita, & illita.

Malua concisa ex oleo imposita.

Sisymbrij folia imposita.

Althæa decoctum ex posca bibitum.

Sal cum sepo uitulino.

Ad fugandum animalia venenosa.

Iuniperi accensa fumus.

Cedrides peruncto corpore adipe uel medulla ceruina excepta.

Vitici folia suffita, uel substrata.

Cancris fluuiatiles crudi cum ocimo triti scorpionibus admoti.

Ceruinum cornu crudum incensum, suffitumq;.

Cerui, & Elephantis adeps inunctus.

Ceruina medulla.

Nasturtium suffumigatum.

Abrotanum stratum, suffitumq; incensum.

Origani folia stratis subiecta.

Distamnium olsactū omnia, quæ ictu, aut morsu uenenum relinquunt, enecat.

Calaminthæ suffitus.

Pencedani suffitus.

Lysimachia incensa fugat serpentes, & muscas.

Nigella suffitus.

Galbani suffitus.

Polium utrumq; incensum, stratumq;.

Conyze suffitus.

Gagates lapis suffitus.

Ad venena omnia.

Phu antidotis insertum.

Cinnamomum potum.

Pix liquida cyathi mēsurā i eclegmate ex melle data.

Cedrides antidotis imposita.

Nuces iuglandes cum ruta, & ficis præsumpta.

Quinquesfolij radices succus bibitus.

Coagulum leporinum potum.

Epipactis hausta.

Castoreum bibitum.

Calamintha præpota.

Mustela salita et in umbra exiccata puluis cū uino.

Mustela uentriculus coriandro farsctus, et inueteratus.

Canicula lac primi partus potum.

Eryngium cum uino potum.

Butyrum deficiente oleo, haustum.

Sanguis { Anseris } antidotis commistus.  
                  { Anatis }  
                  { Hædi }

Urina ipsiusmet infirmi pota.

Semen raparum haustum.

Rutæ semen acetabuli pondere cum uino potum.

Napi semen potum.

Maluæ decoctū cum suis radicibus frequenter potum, crebroq; euomitum.

Brassicæ semen antidotis impositum.

Irionis semen haustum.

Laserpitium potum.

Agaricū drachmæ pondere cum diluto uino sumptū.

Chamaeleonis albæ radix cum uino pota.

Spina alba in amuletum congesta, colloq; suspensa.

Abrotani semen cum uino potum.

Ruta cum iuglandibus nucibus, & caricis sumpta.

## VENENORVM.

Apij decoctum potum.

Marrubij folia bibita.

Betonice folia drachmæ pondere in uino bibita.

Polemonie radix in uino bibita.

Tribuli terrestris succus haustus cum uino.

Smilacis asperi acini prius, postuē sumpti.

Acetum tepidum bibitum.

Terra { Lemnia } ex aqua hausta.  
                  { Samia }

Ad leporem marinum ebibitum.

Cedria contrita cum uino hausta.

Cancris fluuiatiles cum suo iure elixi, & comesti.

Lac asininum } continuè datum,

Passum }

Maluæ radicum decoctum haustum.

Cyclamini radix cum uino bibita.

Veratrum nigrū } drachmæ pōdere data cū mulsā,

Scamoniij succus } & mali punici acinis.

Anserinus sanguis tepidus haustus.

Alismatis drachma una, uel altera bibita.

Ad rubetam ranam ebibitam

Testudinis marinæ sanguis cum leporis coagulo, et cymino bibitus.

Alismatis radix unius, uel duarum drachmarū pondere in uino pota.

Merum largius potum, & euomitum.

Arundinis } radices binæ drachmæ potæ.

Cyperij }

Ad buprestes & pinorum erucas ebibitas.

Oleum { Irinum } potum.  
                  { Melinum }

Caricæ comese, & earum decoctum ex uino.

Palmulæ thebaicæ in cibo sumptæ, uel tritæ ex mulsō, aut lacte potæ.

Pyra omne genus in cibum sumpta.

Humanum lac bibitum copiose.

Simplicia omnia, quæ epotis cantharidibus prosunt.

Ad epotas hirudines.

Muria in forbitionibus data.

Cyrenaicus succus potus.

Laserpitij folia ex aceto hausta. Quin et succus ex aceto gargarizatus.

Betæ folia cum aceto bibita.

Niuis glebula cum posca sumpta.

Cimices uino acetone poti.

Acetum cum sale potum.

Nitrum ex aqua gargarizatum.

Atramentum sutorium aceto dilutū et gargarizatū.

Ad epotas cantharidas.

Halice

Oryze

Tragij

Maluæ

Sem. lini

Semē feni graci

Althæa

Nitrum ex hydromelite potum.

Nuclei pinei ex uino sumpti.

Cucumeris semē contritū, ex mulsō aut lacte haustum.

Anserinus adeps ex passo potus.

Lac potum.



Vinum dulce liberalius bibitum.  
 Thuris cortex ex passo sumptus.  
 Samia terra, quæ Aster appellatur ex defuto hausta.  
 Pulegium tritum ex aqua potui datum.  
 Rosaceum cum Irino ex ruta decocto sumptum.  
 Vitis recentes ramuli detriti, & ex passo hausti.  
 Ius esculentum omnium adipum.

Ad haustam salamandram.

Resina piuea in delinctu.  
 Galbanum ex melle deglutitum.  
 Nuclei pinei contriti, ex aiuga decocto poti.  
 Vrtica cum lilij ex oleo decocta, & pota.  
 Testudinis marine, & terrestres oua cocta deuorata.  
 Ranarum ius, in quo eryngij radix fuerit cocta, potui.

Ad sanguinem & lac in ventriculo  
 concretum.

Coagulum leporinum epotum.  
 Acetum tepidum potum, & uomitu redditum.  
 Grossi lacteo succo turgentes ex posca sumpti.  
 Nitrum per sese potum.  
 Coagulum omne ex aceto, & laserpitij radice, aut la-  
 sere haustum.  
 Brassicæ semen ex lixiuio ficulnei cineris potum.  
 Conyze semen cum pipere ex aceto haustum.  
 Rubi succus ex aceto potui datus.  
 Hordeacea farina ventriculo, & aluo ex aqua mulsa  
 inuncta.

Thymum ex vino haustum.  
 Calaminthe folia arida pota.

Ad colchicum.

Origanum cum passo, aut oxymelite potum.  
 Bubulum lac haustum, quin et asininum largius potui.  
 Quercus foliorum, aut glandium decoctum potum.  
 Malicorium haustum.  
 Serpyllum ex lacte decoctum bibitum.  
 Sanguinalis herbe succus potui datus.  
 Vitis recentium viticularum succus bibitus.  
 Rubi succus in potu sumptus.  
 Ferule recentis medulla ex uino sumpta.  
 Myrti baccae tuse, & aqua macerata, & in liquorem  
 solute, potæ.

Castanearum media tunica trita, & cum sanguinarie  
 succo epota.

Origanum cum lixiuio bibitum.  
 Simplicia omnia, quæ fungis aduersantur.

Ad folanum somniferum.

Aqua mulsa copiose sumpta.  
 Lac caprillum } potum.  
 Lac asininum. }  
 Vinum dulce tepidum cum aniso bibitum.  
 Amygdalæ amaræ deuorata.  
 Conchyliæ omnia tam cruda quam tosta deuorata.  
 Locuste marinæ, quin & Gammarum in cibis sumpti, &  
 eorum iuscula pota.

Ad hyoscyamum.

Mori cortex potus.  
 Aqua mulsa largius ebibita.  
 Lac omne præsertim asininum potum.  
 Ficuum aridarum decoctum bibitum.  
 Nuclei pinei deuorati.  
 Cucumis semen ex passo potui datum.  
 Vinum salsum cū suillo recenti adipe, & passo potum.

Vrticæ semen ex aqua sumptum.  
 Nitrum ex aqua haustum.  
 Cichorium deuoratum.  
 Sinapis quoquo modo sumpta.

Nasturtium }  
 Raphanus } ex uino sumpta.  
 Cæpa }  
 Allium }

Ad aconitum.

Leporinum }  
 Hædium } coagulum ex uino potum.  
 Vitulinum }

Chamaepityos decoctum haustum.  
 Scoria ferri ex aceto mulso sumpta.

Origani }  
 Rute } decoctum cum uino absinthie potum.  
 Marrubij }  
 Absinthij }  
 Sedum maius }  
 Abrotanum } ex uino absinthie pota.  
 Chamelæa }  
 Aiuga, }

Opobalsamum drachmæ pōdere ex melle, uel lacte cū  
 castoreo, pipere, & ruta æquis ponderibus ex ui-  
 no potum.

Vinum, in quo aurū, argentum, ferrum hæc candens re-  
 stinctum fuerit, potum.

Gallinæ ius ex lixiuio & uino paratum potum.

Bubularum carniū præpinguia iura cū uino sumpta.

Ad taxum.

Acetum calidum potum, & uomitu redditum.  
 Simplicia omnia, quæ cicuta resistunt.

Ad toxicum.

Sanguis }  
 Hircinus }  
 Caprillus } frigus, & in cibis sumptus.  
 Leporinus }  
 Ceruinus }  
 Caninus }

Galbanum cum myrrha ex uino haustum.

Quinquefolij radix pota.

Roboris }  
 Fagi } cortex tritus ex lacte haustus.  
 Illicis }

Cotonea mala deuorata, aut cum pulegio, & aqua  
 bibita.

Amomum }  
 Carpobalsamum } ex uino haustum.

Ad opium & corniculatum papauer.

Mel ex rosaceo calido bibitum.

Origanum cum passo aut oxymelite haustum.

Alismatis radix duarū drachmarum pondere ex uino  
 pota.

Acetum bibitum, & uomitu redditum.

Sal cum oxymelite sumptum.

Meracum uinum cū absinthio, et cinnamomo haustum.

Nitrum ex aqua potui datum.

Origanum cum lixiuio, aut passo potum.

Rutæ syluestris semen cum pipere, & panace ex uino  
 sumptum.

Piper cum castoreo ex aceto mulso, uel cum saturciæ  
 aut origani decocto ex uino bibitum.

Pinguia iura in potum sumpta cum uino aut passo.

Ossium



# VENENORVV.

*Oſium medulla ex oleo pota.*  
*Ad cicutam.*  
*Absinthium ex vino bibitum.*  
*Origanum cum paſſo, aut oxymelite potum.*  
*Acetum bibitum, & vomitu redditum.*  
*Meracum vinum largius epotum, & per interualla re-*  
*petitum.*  
*Lac tum bubulum, tum aſininum potum.*  
*Caſtorium cum ruta, & mentha ex vino ſumptum.*  
*Amomi*  
*Cardamomi* } *uncia epota.*  
*Syracis.*  
*Piper cum vrtice ſemine ex vino hauſtum.*  
*Lauri folia potui data.*  
*Laſer ex oleo uel paſſo potum.*  
*Paſſum per ſe largius ebibitum.*  
*Ad ixiā.*  
*Absinthium cum ex vino bibitum.*  
*Origanum ex vino ſumptum.*  
*Acetum potum, vomituq; reiectum.*  
*Ruta ſylueſtris ſemen* } *pota.*  
*Laſerpitiꝝ radix*  
*Tragorigani decoctum hauſtum.*  
*Reſina terebinthina deuorata.*  
*Nardus Indica potui data.*  
*Caſtorium* } *oboli pondere ſumpta.*  
*Laſerpitium*  
*Nuces iuglandes cum reſina, caſtorio, & ruta trita,*  
*ita ut ſingula drachmæ pondus æquent ex vino*  
*hauſta.*  
*Chamelææ* } *succus ſcillici pondere ex aqua mulſa*  
*Thapſiæ* } *hauſtus.*  
*Absinthij*  
*Ad coriandrum.*  
*Merum per ſeſe, uel ex abſinthio potum.*  
*Oleum potum.*  
*Oua in oleo exinanita, & ex muria liquefacta deuo-*  
*rata.*  
*Muria epota.*  
*Gallarum, & anſerum ius copioſe ſalſum hauſtum.*  
*Paſſum ex lixiuio aſſumptum.*  
*Ad pſyllium.*  
*Simplicia omnia quæ coriandro aduerſantur.*  
*Ad herbam ſardoniam.*  
*Aqua mulſa liberalius pota.*  
*Lac aſſatim bibitum.*  
*Aqua calida ſotu adhibita. Quin etiam & oleum.*  
*Ad mandragoram.*  
*Aqua mulſa copioſe pota, & uomitu reiecta.*  
*Nitrum cū abſinthio ex dulci vino, aut paſſo ſumptū.*  
*Rosaceum cum aceto capiti perfuſum.*  
*Eupatorium* } *ex aceto trita, & ad olfaciendū data.*  
*Piper*  
*ſinapi*  
*Caſtorium*  
*Ruta*  
*Licernarum extinctarum ſumus olfactus.*  
*Ad fungos malos.*  
*Fimus gallinæ cum aceto bibitus.*  
*Mel ex roſaceo calido potum.*

# VENENORVM.

*Raphanus deuoratus, uel potui datus.*  
*Absinthium cum aceto ſumptum.*  
*Meliſſophylli folia cum nitro bibita.*  
*Lixiuum ſarmentitiꝝ cineris ex acida muria potum.*  
*Satureia ſeruefacta, hauſtaq;.*  
*Origani iuſculum potui datum.*  
*Acetum calidum potum, & vomitu reiectum.*  
*Atramentum ſutorium ex aqua potum.*  
*Sal cum oxymelite bibitum.*  
*Pyraſtri folia pota, deuorataq;.*  
*Oua gallinacea cum ariſtolochiæ drachma ex poſca*  
*deuorata.*  
*Panacis radix, & ſemen ex uino pota.*  
*Fex uini cremata ex aqua pota.*  
*Sinapis bibita.*  
*Naſurtium comeſtum.*  
*Ad gypſum.*  
*Origanum cum paſſo aut oxymelite potum.*  
*Maluæ decoctum potum. Quin & toto corpori inſper-*  
*ſum.*  
*Oleum ebibitum.*  
*Aqua mulſa bibita.*  
*Caricarum decoctum potum.*  
*Lixiuum d ſiculneo, aut ſarmentitio cinere paratū, cū*  
*uino copioſiore hauſtum.*  
*Origanum cum lixiuio, aut aceto, aut paſſo ſumptum.*  
*Quin etiam & thymum.*  
*Simplicia omnia quæ fungis reſiſtunt.*  
*Ad ceruſſiam.*  
*Amaracinum* } *oleum potum.*  
*Irinum*  
*Vlmi liquor potus.*  
*Perſicorum nuclei ex ptifana poti.*  
*Caricarum* } *decoctum hauſtum.*  
*Maluarum*  
*Lac calidum bibitum.*  
*Sesamum tritum ex vino ſumptum.*  
*Lixiuum ex ſarmentitio cinere hauſtum.*  
*Columbina oua cum thure pota.*  
*Ad argenti ſpumam.*  
*Hormini ſylueſtris ſemen potum.*  
*Myrrha bibita*  
*Absinthium* } *ex uino pota.*  
*Hyſſopum*  
*Apiꝝ ſemen*  
*Piper*  
*Ligūſtri flores*  
*Palumborum aridū ſinum cum Nardo ex vino potū.*  
*Ad argentum viuum.*  
*Lac copioſe potum, & uomitu reiectum.*  
*Simplicia omnia, quæ faciunt ad argenti ſpumam.*  
*Ad calcem, ſandaracham, & auri-*  
*pigmentum.*  
*Lac ex aqua mulſa potum, & uomitum.*  
*Carnium iura pingua hauſta.*  
*Althææ* } *decoctum ad ſpiſſitudinem redactum potū.*  
*Maluæ*  
*Tragi herbæ ſemen bibitum.*  
*Seminis lini decoctum potui datum.*  
*Oryzæ decoctum potum.*

# SIMPLICIVM MEDICAMENTORUM facultates, quæ corpori decorem præstant, ex Dioscoride.

## DECORIS.

Ad alopeciam.



YRRHA, cum ladanu, & vino myrteo illita firmat.

Harundinū corticum cinis ex aceto inunctus.

Ladanū cum vino, myrrha, & myrteo oleo admotum.

Myrti baccarum succus

illitus.

Nucum iuglandium putamē combustum, tritumq; et impositum.

Nucum auellandarum crematarum cinis ex ursino adipe perunctus.

Erinacei terrestres corij cinis ex liquida pice illitus.

Leporinum caput crematum ex ursino adipe.

Ranarum crematarum cinis ex liquida pice.

Murium stercus combustum ex aceto.

Ursinus adeps illitus.

Caprarum simus ex aceto.

Raphanus tritus ex loliacea farina admotus.

Brassica cum sale confricata.

Betæ recentia folia cruda illita.

Asphodeli radicum cinis impositus.

Capa confricata.

Allij cinis ex melle.

Sinapi illitum.

Nasturtium confricatum.

Cyclamini succus inunctus.

Ranunculī folia, & radices illita paruo tēporis spatio.

Aloe ex vino.

Abrotoni cinis ex raphani succo, aut cicino oleo.

Laserpitij liquor cum pipere ex aceto.

Nymphææ radix ex pice.

Cynoglossæ folia ex uetere suillo adipe.

Adiatum illitum cum susino, aut myrtino oleo, aut hysoposopo, aut uino.

Thapsiæ succus inunctus.

Rubigo ferri illita.

Sandaracha ex resina.

Alcyonium tertium exustum inunctum.

Cortex nazia illita.

Hippocampi cremati cinis ex liquida pice, aut axungia, aut amaracino unguento.

Caprillarum ungularum cinis ex aceto inunctus.

Ad pilos auellendos.

Oleum in quo decocta fuerit scolopendra inunctum.

Lepus marinus per se, & cum marina urtica tritus, & appositus.

Salamandræ cinis ex oleo.

Hederæ lacrima illita.

## DECORIS.

Dryopteris radix trita, & post sudorem inuncta.

Aqua è uiridibus uitium sarmentis igne incensis emanans admota.

Auripigmentum illitum.

Cyperus babilonicus illitus.

Ad capitis furfures.

Salicis foliorum, & corticis decoctum in lotionibus.

Myrti baccarum succus illitus.

Fel taurinum cum nitro, & cimolia inunctum.

Humana vrina inueterata admota.

Adiantum in lixiuio decoctum.

Fenum græcum in lotionibus.

Malua ex vrina humana.

Betæ decoctum admotum.

Allij cinis ex melle.

Bulbi cum cremato nitro illiti.

Lilij cremati radix ex melle.

Alumen cum eruo ex pice.

Ad ruffandum capillum.

Ligustri folia trita, & in radiculæ succo macerata illita.

Lycium illitum.

Loti ligni decoctum in lotionibus admotum.

Vini sex cremata ex lentiscino oleo tota nocte illita.

Ad denigrandos capillos.

Cupressi folia trita ex aceto.

Rhois decoctum admotum.

Mori folia trita ex aceto.

Gallæ aceto, aut aqua macerata illita.

Palme corticis decoctum admotum, & subinde detersum.

Myrti foliorum decoctum in lotionibus.

Acaciæ succus illitus.

Iligne radicis cortex ex aqua coctus, donec mollitus intabescat, tota nocte illitus.

Hederæ corymbi illiti.

Saluicæ decoctum sapius inspersum.

Rubi folia admota.

Sory illitum.

Ad pediculos & lendes necandos.

Cedria illita.

Myricæ decoctum persusum.

Mel inunctum capiti.

Betæ decoctum persusum.

Allium cum origani decocto potum.

Hederæ lachryma illita.

Staphis agria admota.

Sandaracha ex oleo.

Alumen ex aqua.

Ad prohibendum solis adustionem.

Albumen oui inunctum.

Cyclamini succus inunctus.



## DECORIS.

Ad faciei nitorem.

*Ulni liquor in folliculis contentus illitus.*  
*Mastiche illita.*  
*Lupinorum farina illita.*  
*Raparum sylvestrium semen admotum.*  
*Peponis succus cum eius semine, & farina in sole sic-*  
*catus, & inunctus.*  
*Polygonatum illitum.*  
*Glans unguentaria ex urina.*  
*Ricini semen impositum.*  
*Vitis sylvestris acini illiti.*  
*Argenti spuma elota inuncta.*  
*Alcyonium primum, & secundum admotum.*  
*Chia terra imposita.*  
*Crocodili terrestris finum illitum.*

Ad colorem conciliandum.

*Cicer in cibis sumptum.*  
*Agaricum drachmæ pondere potum.*  
*Hyssopum manducatum, bibitumque.*  
*Chia terra illita.*  
*Cerasi gummi illitum.*  
*Caricæ in cibis sumptæ.*

Ad faciem derugandam.

*Cacaliæ grana post excusum florem prodeuntia tri-*  
*ta, & cum cerato illita.*  
*Bryoniæ radix cum eruo, creta chia, & feno græ-*  
*co illita.*  
*Chia terra admota.*

Ad cutis vitia in facie.

*Sabinæ decoctum persusum.*  
*Conchulæ Indicæ cinis admotus.*  
*Glans unguentaria trita ex urina.*  
*Cancrorum fluuiatiliū cinis illitus.*  
*Narcissi radix cum semine urtica ex aceto.*  
*Ricini semen admotum.*  
*Vitis sylvestris acini illiti.*  
*Cinnamomum ex melle.*  
*Costi radix cum aqua vel melle illita.*  
*Bryoniæ radix per se, & cum eruo, creta chia, & feno*  
*græco admota.*  
*Alcyonium primum, & secundum impositum.*

Ad ionthos & varos.

*Myrrha illita cum melle, & casia.*  
*Porri folia cum Rhoe obsoniorum loco admota.*  
*Cepæ succus cum sale appositus.*  
*Bulbi per se, & ex oni uitello.*  
*Pulegium ex cera.*  
*Sori ex aqua.*

*Alcyonium primum, & secundum admotum.*

Ad cutis faciei vitia à sole contracta.

*Iridis Illyricæ radix cum helleboro admota.*  
*Cinnamomum ex melle.*  
*Costi radix cum aqua vel melle illita.*  
*Amygdalæ amaræ radicū tritarum decoctū admotū.*  
*Fici lac inunctum.*  
*Cochlearum tum caro, tum testā simul crematæ ex*  
*melle.*  
*Leporinus sanguis inunctus.*  
*Sepiæ crematæ cinis admotus.*  
*Lini semen illitum.*  
*Orobi farina imposita.*  
*Sisymbrium inunctum.*

## DECORIS.

*Bulbi cremati cum Alcyonio impositi.*

*Hederæ decocta folia ex vino.*

*Chamaeleonis nigri radix.*

*Alyssum concisum ex melle.*

*Melia terra inuncta.*

*Cyclamini succus illitus.*

Ad lentigines delendas.

*Iridis Illyricæ radix cum albo veratro admota.*

*Casia ex melle illita.*

*Costus ex aqua, & melle.*

*Sanguis leporinus calens inunctus.*

*Tritici farina ex aceto mulso.*

*Raphanus cum loliacea farina admotus.*

*Brassicæ semen inspersum.*

*Sisymbrium tritum, & impositum.*

*Allij cinis ex melle.*

*Dracunculi maioris radix ex melle.*

*Bulbi ex melle, & aceto.*

*Nigella confricata.*

*Galbanum cum nitro ex aceto.*

*Alyssum concisum ex melle.*

*Narcissi radix cum urticæ semine ex aceto.*

*Ricini semen illitum.*

*Vitis sylvestris acini liniti.*

*Bryoniæ radix cum eruo, feno græco, & creta chia.*

*Adarces imposita.*

Ad nauios.

*Alcyonium illitum.*

Ad totius corporis nitorem.

*Mastiche inspersa.*

*Ulni liquor in folliculis conclusus illitus.*

*Butyrum inunctum.*

*Crocodili terrestris finum illitum.*

*Peponis succus cum eius semine, & farina in sole sic-*  
*catus ex aqua.*

*Bryoniæ radix inuncta.*

*Cyclamini succus inunctus.*

Ad cicatrices delendas.

*Asininus adeps inunctus.*

*Fabarum farina cataplasmatibus indita.*

*Ranunculi folia, & radices illita.*

*Calamintha ex vino decocta admota.*

*Cucumeris sylvestris radix trita, & inspersa.*

*Glans unguentaria cocta in aceto cum nitro adhibita.*

*Bryoniæ radix cum Eruo, creta chia, & feno græco*  
*admota.*

*Chrysocolla illita.*

*Alcyonium primum, & secundum inunctum.*

Ad vitiliginis.

*Cochlearum terrestrium testæ crematæ, & illitæ.*

*Leporinus sanguis inunctus.*

*Sepiæ crematæ cinis admotus.*

*Fabarum farina inspersa.*

*Lupinorum farina imposita.*

*Betæ cruda folia illita.*

*Chondrillæ radix, & folia ex melle, & nitro trita ex*  
*aqua.*

*Dracunculi maioris radix ex melle.*

*Asphodeli radicis succus inunctus, confricata prius*  
*sub sole ente.*

*Cepæ succus in sole inunctus.*

*Allij cinis ex melle.*



Piper cum nitro impositum.  
 Capparis radix trita ex aceto.  
 Argemone siccata, tusaq; cum nitro, & vino sulphu-  
 re admota.  
 Telephij folia cum hordeacea farina ex hydrelao sex  
 horis admota.  
 Gentiana radice succus inunctus.  
 Chamaleonis nigri radix cum sulphure illita.  
 Ruta cum vino, pipere, nitroq; confricata.  
 Libanotis semen ex acerrimo aceto.  
 Lilij cremata radix ex melle.  
 Nymphææ radix ex aqua.  
 Rubiæ radix ex aceto.  
 Rithææ semen tum recens, tum siccum tritum ex ace-  
 to, in sole inunctum.  
 Anchusæ radix ex aceto.  
 Narcissi radix cum urticæ semine ex aceto.  
 Bryonia cum Eruo, creta chia, & feno græco illita.  
 Glans unguentaria in aceto decocta cū nitro imposita.  
 Cucumeris sylvestris radix trita, & inspersa.  
 Ricini semen illitum.  
 Veratrum nigrum ex aceto.  
 Sulphur quoquo modo admotum.  
 Alcyonium primum, & secundum inunctum.  
 Ad lychenas, & impetigines.  
 Pini, & piceæ cortex illitus.  
 Lentisci foliorum decoctum fotu adhibitum.  
 Cupressi folia cum polenta illita.  
 Rhamni folia admota.  
 Lignorum marcor inspersus.  
 Nasturtij semen admotum.  
 Rhaponticum ex aceto illitum.  
 Veratrum nigrum ex aceto illitum.  
 Glans unguentaria cum lotio imposita.  
 Vitis uinifera gummi cum nitro illitum, loco tamen  
 prius perfricato.  
 Sulphur ex terebinthina resina.  
 Sal ex oleo, & aceto perfrictum.  
 Alcyonium primum, & secundum impositum.  
 Adarces illita.  
 Pix liquida inuncta.  
 Thus inspersum.  
 Aethyopitæ oleæ lachryma inuncta.  
 Pruni arboris gummi illitum.  
 Ficulneum lac cum polenta illitum.  
 Mel cum alumine decoctum illitum.  
 Propolis inuncta.  
 Triticæ recens panis ex muria.  
 Loliacea farina cum sulphure ex vino.  
 Cicer cum hordeo ex melle.  
 Lapathi cuiusque radices in aceto decoctæ, loco prius  
 scarificato, & nitro confricato appositæ.  
 Nasturtium ex melle appositum.  
 Allij cinis ex melle illitus.  
 Sinapi ex aceto linitum.  
 Chamaleonis nigri radix ex aceto cocta, & inuncta.  
 Ruta cum alumine ex melle.  
 Lasepiti liquor ex aceto.  
 Glutinum in aceto solutum inunctum.  
 Cucumeris sylvestris radix trita, & inspersa.  
 Tithymali characie lac illitum.  
 Bryoniæ radix cum Eruo, creta chia, & feno græ-

co illita.  
 Aqua maris fotu adhibita.  
 Ad papulas.  
 Lac omne potum cum crudo melle, admixta aqua, &  
 exiguo sale.  
 Serum lactis potum.  
 Acetum applicatum.  
 Butyrum illitum.  
 Urina humana inueterata.  
 Lupinorum farina admota.  
 Cyclamini succus adhibitus.  
 Pulegij decoctum corpori persusum.  
 Ruta cum cera, & myrteo oleo cataplasmati indita.  
 Staphis agria illita.  
 Glans unguentaria cum lotio linita.  
 Rubigo ferri illita.  
 Alumen cum melle.  
 Cinnabaris, idest sanguis draconis adhibitus.  
 Fornacæ testæ tostæ admotæ.  
 Ad alphos, & cutis maculas.  
 Thapsiæ succus cum melle illitus.  
 Glans unguentaria cum lotio linita.  
 Narcissi radix cum semine urticæ ex aceto.  
 Lotus sylvestris cum melle perunctus.  
 Cucumeris sylvestris puluerizata radix imposita.  
 Ricini semen illitum.  
 Vitis sylvestris acini liniti.  
 Bryonia cum eruo, creta chia, & feno græco illita.  
 Ad pforam.  
 Staphis agria trita ex oleo illita.  
 Bryoniæ semen inunctum.  
 Aqua marina fotu adhibita.  
 Glans unguentaria in aceto cocta.  
 Sal illitum.  
 Ad scabiem.  
 Cardamomum ex aceto illitum.  
 Olea uirentis, & accensa sudor manans illitus.  
 Ficulneum lac inunctum.  
 Erinacei marini testæ cruda, testæ cum alijs mista,  
 & illita.  
 Hippocampi marini cremati cinis liquida pice, axun-  
 giæ, aut amaracino unguento coactus, & capi-  
 ti inunctus.  
 Urina humana inueterata.  
 Serum lactis potum.  
 Cicer cum hordeo, & melle.  
 Lupinorum farina.  
 Argemone siccata, tusaq; cum nitro in balneo con-  
 fricata.  
 Hirundinaria minor confricata.  
 Chamaleonis nigri radix addito exiguo atramento su-  
 torio, cedrinoq; liquore, & axungie pauco linita.  
 Quin etiam sulphure, & alumine mistis.  
 Glans unguentaria cum lotio linita.  
 Origani decoctum corpori persusum.  
 Quinquesolij radix decocta, linitaq;  
 Potamogeton ualet pruritus imposita.  
 Lotus sylvestris cum melle peruncta.  
 Veratrum nigrum linitum cum cera, pice, & cedri-  
 no oleo.  
 Stimmi cum cera, & exigua cerussa.  
 Alumen cum aqua aspersum aduersus pruritum. Ad



Adlepram græcorum.

Fel taurinum cum nitro, &amp; cimolia.

Urina humana addito nitro fota.

Iuniperi cortex crematus ex aqua.

Fraxini cortex crematus ex aqua.

Ulmī folia concisa ex aceto.

Aethiopica olea lachryma illita.

Resina { Terebinthina  
Larigna  
Abiegna } cum ærugine, chalcantio, & nitro illita.

Ficulneum lac cum polenta.

Triticeī fures ex acerrimo aceto elixi.

Hordei farina ex aceto acerrimo, &amp; hydrelæo.

Lolij farina cum sulphure ex uino, &amp; aceto.

Lapathi cuiusque radices, loco prius sacrificato, &amp; nitro confricato admota.

Brassica concisa cum polenta adhibita.

Veratrum nitrum ex aceto.

Allij cinis ex melle.

Sinapi ex aceto.

Bryonia semen illitum.

Nasturtium ex melle.

Anchuse radix ex aceto.

Ranunculi folia, &amp; radices apposita.

Melanthij semen admotum.

Cucumeris agrestis radix in puluerem aspersa.

Glans unguentaria cocta in aceto cum nitro.

Thapsiæ succus inunctus.

Scammonia in aceto decocta illita.

Vitis uiniferae gummi admotum, loco tamē prius nitro perfricto.

Aerugo cum nitro ex terebinthina resina.

Alumen cum brassica, &amp; melle coctum.

Sulphur ex resina terebinthina, &amp; aceto.

Sal ex oleo, &amp; aceto feruesactum.

Alcyonium primum &amp; secundum illitum.

Adarces imposita.

Melia terra illita.

Ad pruritem.

Ficulneum lac admotum cum polenta.

Sulphur ex nitro.

Sal ex oleo, et aceto perfrictum.

Alumen cum aqua aspersum.

Ad elephantiasim.

Erinacei terrestris exiccatum corpus in cibis sumptum.

Cedria inuncta.

Cochlearum terrestrium cinis illitus.

Salamandra alijs conferetibus medicamentis admista.

Serum lactis potum.

Fel { Capra sylvestris  
Hircinum } inunctum.

Calamintha in cibis sero lactis superposito.

Ad clauos, callos &amp; verrucas.

Salicis corticis cinis admisto aceto maceratus illitus.

Smaridis piscis saliti crematum caput.

Lacerta concisum caput.

Ouillum finum ex aceto.

Mel cum alumine decoctum.

Cicerum grana tot accipe, quot sunt porri, et singulis granis singulas tange verrucas, deinde liga grana cicerum in linteolo, &amp; post tergum projice, &amp; hoc non fiat nisi noua luna.

Heliotropij semen linitum.

Scilla cremata peruncta.

Ranunculi folia, &amp; radices.

Dipsaci radix in uino decocta, tusa, &amp; imposita.

Nigella ex uetere urina imposita, loco prius scarificato.

Laserpitij liquor cera præmollitus impositus, scarificatione prius facta.

Clinopodium diebus aliquot potum.

Chamaefices rami triti, &amp; impositi.

Vitis sarmentorum uiridum incensorum emanans aqua.

Aerugo imposita.

Ad acrochordonas, &amp; thymos &amp; myrmecias.

Mali punici uinum adhibitum.

Lac ficulneum cum adipe circa adiacentem carnem illitum.

Thus ex aceto, &amp; pice illitum.

Ruta cum pipere, uino, &amp; nitro affricata.

Cicer cum hordeo, &amp; melle.

Ranunculi folia, &amp; radices.

Dipsaci radix trita in uino decocta.

Tithymali characiæ succus, &amp; lac illitum.

Chamaefices rami triti, &amp; impositi.

Heliotropij semen linitum, Quin &amp; heliotropij minus.

Fritium uinifarum sarmentorum uiridum incensorum emanans aqua illita.

Sal cum seuo nitulino illitum.

Ad alarum tædia.

Myrrha cum liquido alumine illita.

Myrti foliorum arentium farina inspersa.

Cardui radix cataplasmatis more adhibita.

Alumen linitum.

Ad labiorum rimas.

Adeps { Anserinus  
Gallinaceus } illitus.

Lycium admotum.

Ad sudorem ciendum.

Ferula semen ex oleo inunctum.

Onobrychis ex oleo inuncta.

Mel Heraclium quodam anni tempore deuoratum.

Fici maturæ comestæ.

Sinapi in cibum sumptum.

Ad sudorem compefcendum.

Bulbi comesti.

Sulphur confricatum.

Gypsum

Morochthus lapis } admota.

Samia terra.

Ad extercendam cutim.

Cyclamini radix inuncta.

Ad extrahendum ex alto.

Mel  
Sinapi } appositum.



# SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM VIRES, Quibus exuberantes in corpore humores vomitu & alui deie- ctione excernuntur, ex Dioscoride.

## EXPELLENTIVM MEDICAMEN.

Ad bilem educendam.



**I** R I S. Illyrica drachma-  
rum septem pondere ex  
hydromelite pota.  
Thlaspi semen potum.  
Aloe hausta.  
Absinthii potui datū.  
Tragorigani decoctū bi-  
bitum.

Lychnidis sylvestris se-  
men drachmarum duarum pondere potum.  
Androssemi semē duarum drachmarum pondere hau-  
stum.

Veratrum nigrum per se datum, aut ex Scāmonia cū  
salis drachma.

Pycnocomi radix duarum drachmarū pondere ex a-  
qua mulsa.

Centaurium minus decoctum deuoratum.

Parthenium siccatum cum aceto mulso, aut sale.

Thapsiæ lacteus succus in aqua mulsa potus.

Clematidis alterius semen tritum potum.

Sesamoides tritum datum.

Cucumeris sylvestris radices succus, et cortex sexqui-  
oboli pondere bibitus.

Hippophae succus oboli pondere potus.

Ricini triginta grana purgata trita hausta.

Tithymalorū omniū succus binis obolis ī posca potus.

Mercurialis ius potum.

Lathyrus grana sex aut septem cum ficis aut palmulis  
in catapotio deuorata.

Peplus in hydromelite cyatho potus.

Scāmonij succus drachmæ unius, aut quaternū obolo-  
rum pondere haustus ex aqua mulsa, uel pura.

Chameleæ folia in catapotijs deuorata cū duabus ab-  
sintij partibus adiecta chameleæ una cum hydro-  
melite.

Thymelæe uiginti granorum pars interna bibita.

Folia { Sambuci }  
{ Ebuli } olerum more cocta.

Apios, scilicet inferior pars deuorata.

Empetrum in iure aliquo aut hydromelite potum.

Filiculæ aride farina aqua mulsa inspersa bibita.

Cynocrambæ decoctum haustum.

Heliotropij decoctum ex aqua potum.

Agarici drachma una uel altera cum mulsa bibita.

Pityusæ radix drachmarū duarum pōdere cum mul-  
sa hausta, seminis uerò drachma, et succi cum fari-  
na subacti cochlearium in catapotio.

Ad pituitam eijciendam.

Iris Illyrica drachmarum septem pondere ex hydro-  
melite.

Mandragoræ succus duorū obolorum pondere potus.

Veratrum nigrum per se datum, uel cum scammonia  
cum salis drachma.

Lycij Indici semen cyathi dimidij mensura potum.

Vlmi crassior cortex ī uino, aut aqua frigida ūciatim  
potus.

Gallinaceorum senescentiū ius Dioscoridis modo p̄-  
ratum, haustum.

Cyclamini radix ex hydromelite pota.

Scilla cum melle cocta pota.

Hyssopi decoctum ex aqua, melle, & ruta potum.

Thymum cum sale, & aceto haustum.

Spondilij semen potum.

Ammoniacum drachmæ poudere bibitum.

Daphnoides folium recens, uel aridum potum.

Hippophaesti succus trium obolorū pondere ebibitus.

Epithymum potum cum melle.

Bryoniæ succus cum aqua mulsa.

Cnici seminis succus cum mulso, uel iure gallinaceo.

Magnes trium obolorum pondere cum mulsa.

Centaurij minoris decoctum deuoratum.

Partbeniū siccatum cum aceto mulso, aut sale potum.

Clematidis alterius semen tritum, potum.

Sesamoides tritum datum.

Cucumeris sylvestris radices succus, et cortex sesquio-  
boli pondere bibitus.

Hippophae succus oboli pondere potus.

Ricini grana triginta trita epota.

Tithymalorum omnium succus binis obolis in posca  
potus.

Lathyrus grana sex, aut septem in catapotio cum ficis,  
aut palmulis deuorata.

Peplus in hydromelitis cyatho potus.

Scammonij succus drachmæ unius, aut quaternū obo-  
lorum pondere haustus ex aqua pura uel mulsa.

Chameleæ folia ī catapotijs deuorata cū duabus ab-  
sintij partibus, adiecta chameleæ una cum hydro-  
melite.

Thymelæe uiginti granorum pars interior bibita.

Folia { Sambuci }  
{ Ebuli } olerum more cocta.

Apij inferior pars deuorata.

Empetrum in iure, aliquo, aut hydromelite.

Filiculæ aride farina aqua mulsa inspersa hausta.

Cynocrambæ decoctum bibitum.

Heliotropij decoctum ex aqua potum.

Agarici drachma una, aut altera cum mulsa bibita.

Pityusæ radix drachmarum duarū pondere cum mul-  
sa, et seminis drachma, succi uero cum farina suba-  
cti cochlearium in catapotio exhibita.

Ad atram bilem pellendam.

Mandragoræ succus potus duorum obolorum ponde-  
re ex mulso.

Gallinaceorum senescentium ius Dioscoridis modo p̄-  
ratum haustum.

Epithymum ex melle haustum.

Serum lactis potum.

Origanum siccum acetabuli mensura potum ex mulsa.

Pulegium bibitum.

Helleborum



*Helieborum nigrum haustum.*  
*Spartium epotum.*  
*Alypum mensura epithymo pari cum sale, & aceto sumptum.*

Ad vomitum ciendum.

*Thlaspi potum bilem rubeam educit.*  
*Mandragora pota atram bilem.*  
*Thapsiæ lacteus succus in mulsa bibitus.*  
*Tithymalorū succus cū aqua mulsa binis obolis potus.*  
*Api superior pars deuorata.*  
*Sparti flores, & semina in mulsa pota.*  
*Anagyris semen commanducatum.*  
*Betonica radices ex hydromelite potæ, pituitam eijciunt.*  
*Papaueris spumei semen in mulsa acetabuli mensura potum.*  
*Staphidis agrie grana quindecim in mulsa data.*  
*Silybi radices drachma pota.*  
*Glans unguentaria cum hydromelite.*  
*Narcissi radix cocta, esta, seu bibita.*  
*Ricini grana triginta hausta.*  
*Raphani cortex ex aceto mulso potus.*  
*Tithymalorum omnium succus potus.*  
*Aes ustum cum hydromelite bibitum.*

Ad aquam intercutem pellendam.

*Cyclamini radix ex hydromelite hausta.*  
*Polij decoctum bibitum.*  
*Hippophæsti succus trium obolorum pondere potus.*  
*Hippophæis succus oboli pondere potus.*  
*Ricini grana triginta pota.*  
*Lathyrus cuiusq; grana sex, aut septem in catapotio cum ficis, aut palmulis deuorata.*  
*Sambuci } folia olerum more cocta.*  
*Ebuli }*  
*Empetrum in iure aliquo, aut hydromelite haustum.*  
*Cynocrambe decoctum potum.*  
*Asarum bibitum.*  
*Lactuca syluestris succus in aceto mulso potus.*

*Trifolij radix drachmarum duarum pondere in uino bibita.*

*Tithimalorum succus bibitus.*

*Thymelæa uiginti granorum pondere pars interna bibita.*

*Vitis syluestris radix feruesacta i aqua in cyathis duobus uini aqua marina diluti, pota.*

*Squamma æris ex aqua mulsa hausta.*

*Mercurialis decoctæ ius potum.*

Ad aluum emolliendam.

*Cerasia recentia manducata.*

*Pruna in cibis sumpta.*

*Siliquæ deuorata.*

*Fici maturæ deglutitæ.*

*Lac ficulneum potum.*

*Chamarum piscium ius potum.*

*Vnguis odoratus exhibitus.*

*Raphanus comestus.*

*Beta alba deuorata.*

*Blitum comestum.*

*Rumicis cuiusq; decoctum potum. Quin et ipsa herba decocta deuorata.*

*Malua in cibo sumpta.*

*Atriplex manducatum.*

*Brassica leuiter feruesacta comesta.*

*Lentis decorticatæ decoctum primum haustum.*

*Asparagorum cauliculi in cibum accepti.*

*Cucurbitæ integræ feruesactæ expressus succus potus.*

*Gingiber quoquo modo sumptum.*

*Peucedanum potum.*

*Scilla sicca cochlear unum, aut alterū ieiunis datā.*

*Androsæmi semen tritum potum.*

*Helxines foliorum succus haustus.*

*Papaueris erratici semina acetabuli pōdere ex mulsa aqua pota.*

*Cynoglossi decoctum haustum.*

*Chamaesices rami decocti, & in cibum sumpti.*

*Bryonia cauliculi recētes cocti, & in cibum deuorati.*

F I N I S.

## Mensurarum & Ponderum Typi ad Dioscoridis mentem. Ex Galeno.

In Ponderum ratione.

Siliqua	}	
Aegyptia faba		
Orobis		
Obolus		
Scrupulus		
Drachma		
Vncia		
Acetabulum		
Nux		{ Regia
Libra		{ Pontica
Mina	{ Medicorum	
	{ Italica	
	{ Alexandrina	

Pendet

Chalcum unum	}
Chalcum unum & semis,	
Chalcos duos	
Chalcos tres	
Obolos duos	
Scrupulos tres	
Drachmas octo	
Drachmas quindecim	
Vncias septem	
Vnciam unam	
Vncias duodecim	
Vncias sexdecim	
Vncias decem & octo	
Vncias uiginti	

# DE ARIDORVM MENSVRIS.

In aridorum mensuris.	{	Artaba Aegyptia	continet	{	Modios quinque
		Modius Aegyptius & Italicus			Chenices octo
		Medimnus			Hemiecta duodecim
		Hemiectum.i. semifextum			Congios duos
		Congius			Chenices quatuor, id est drachmas 720
		Chenix			Heminas 3. Atticas.i. drach. 180
		Sextarius			Heminas duas.i. drachmas 120
		Hemina			Cyathos sex, id est drachm. 60
		Cheme			Cyathi quartam partē, id est drachmas 2. & 5.
		Cochlear			Scrupulos tres

## Ponderum & Mensurarum Liquidorum ratio.

In liquidorum mensuris. Pendet.	{	Vini Aceti Aqua	{	Ceramium lib. 80
				Amphora lib. 80
				Vrna lib. 40
				Congius lib. 10
				Sextarius lib. 1 & uncias 8
				Hemina uncias 10
		Olei	{	Cotyla unc. 10
				Oxybaphus drach. 18
				Acetabulum drach. 18
				Cyathus drach. 12 & scrupulos 4
				Cheme drach. 3. & scrup. 1
		Mellis	{	Ceramium lib. 72
				Amphora lib. 72
				Vrna lib. 36
				Congius lib. 9
				Sextarius lib. 1.
				Hemina uncias 9
			{	Cotyla uncias 9
				Acetabulum drachmas 18
				Oxybaphus drach. 18
				Cyathus drach. 18
				Cheme drach. 3
			{	Ceramium lib. 120
				Amphora lib. 120
				Vrna lib. 60
				Congius lib. 15
				Sextarius lib. 2
				Hemina lib. 1
			{	Cotyla lib. 1
				Acetabulum drach. 27
				Oxybaphus drach. 27
				Cyathus drach. 20
				Cheme drach. 5



# PETRI ANDRAE MATTHIOLI MEDICI

## Senensis Commentarii,

IN LIB. PRIMVM PEDACII DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE MEDICA MATERIA.

### Præfatio Dioscoridis.



VANQVAM, amicissime Aree, complures non ueterum modò, sed recentiorum quoque, de medicamentorum compositione, uiribus, atq; probatione scripserunt; nobis tamen nec uanum, nec à ratione abhorrentem impetum animi ad hoc opus incessisse, tibi ostendere tentabimus. propterea quòd eorum nonnulli absolutum nihil ediderunt, alij plurima, ut ex narratione acceperant, scriptis tradiderunt. Siquidem Bithynus Iolas, & Heraclides Tarentinus, omiſſa prorsus herbarum tractatione, rem ipsam paucis perstrinxerunt. neque uerò omnes illi de metallicis quicquam rebus, aut odoramentis memoriæ prodiderunt. Crateuas autem herbarius, &

Andreas medicus, qui cæteris diligentius hac in parte uersati uidentur, radices multas apprimè utiles, herbasque aliquas haud quaquam adnotatas reliquerunt. Veruntamen priscorum subscribere oportet sententijs: quos, etsi pauca ipsis referantur accepta, magnam tamen impendisse diligentiam constat. Iunioribus minus assentiendum: è quibus est Iulius Bassus, & Niceratus, & Petronius Niger, & Diodotus, Aselepiadæ omnes, qui medicinalem materiam uernaculam, cognitamque uulgo, dignam censuerunt, quæ ab ipsis literis exactè mandaretur: & ut medicamentorum uires, probationesque cursim complexi, sic nullo experimento eorum effectus colligentes, inani uerò reddendarum causarum studio uerba fundentes, alia interdum pro alijs scriptitando, † rem in aceruum, congeriemque controuersiarum extulerunt. Siquidem qui inter eos egregius habetur Niger, euphorbium nascentis in Italia chamelææ succum esse contendit: androsæmonque eandem herbam cum hyperico esse: quinetiam aloen in Iudæa fossilem nasci: & pleraque his similia falsò exponit, quæ prorsus ueritati refragantur. Quibus coniectura colligi potest, ea non oculata fide, sed narratione potius ab alijs accepisse. In ordine præterea iidem ipsi aberrarunt, partim eorum discrepantes, nullaque cognatione coniunctas uires collidentes: partim per elementa literarum scripta in ordinem digerentes, quòd facilius memoriæ mandarentur, genera & eorum effectus à sua cognatione disiungentes. Nos uerò ab ineunte, ut ita dicam, iuuenta, iugi desiderio cognoscendæ materiæ alleccti, multis regionibus peragratis (nec enim nescis nos militarem uitam exegisse) tuo hortatu commemorationem in sex libros contulimus. Quod opus tibi dicamus, Aree, animi gratitudine obsequentes, ob eum quo nos prosequeris affectum. Etenim natura cum in omnes eruditione excultos, tum uero in eos, quibus cum tibi eiusdem artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitiam esse soles, in nos etiam aliquando peculiararius. Enim uero non parum præbet tuæ probitatis argumentum, optimi uiri Licinij Bassi singularis erga te amicitia: quam unà nobiscum degentes nouimus, cum mutuam inter uos beneuolentiam emulatione dignam intueremur. Admonitum autem te uelim, eosque qui in hosce commentarios incident, ne in uerbis facultatem nostram æstimetis, sed potius adhibitam rebus cum peritia curam. Etenim plurima uisu ipsi exactissimè cognouimus: quædam etiam ex ea, de qua inter omnes conuenit, historia, percunctationeque rerum apud singulos uernacularum, diligenter accipimus. Dabimus igitur operam, ut differenti ab alijs ordine tradito, genera singularum medicinarum, uiresque describantur. Quòd autem necessaria sit medicamentorum doctrina, nemo est fermè qui ignoret: quòd ea & toti arti coniuncta sit, uniuersisque eius partibus efficax administret auxilium. Quare per medicamentorum compositiones, atque misturas, & facta in morbis pericula extendi, & incrementum capeſſere potest, plurimum conferente singulorum medicaminum cognitione. Quinetiam uernaculam, familiaremque materiam complectemur, ut perfecta sit, quæ à nobis relinquatur, doctrina. Verum in primis curam impendere oportet, ut suis temporibus singula & de-



metantur, & recordantur. certè pro horum ratione, medicamenta aut ualent uiribus, aut euano nulloque munere funguntur. Serena igitur cali constitutione demetenda sunt. magni siquidem refert inter colligendum, si uel squalores, uel imbres infesti sint: quemadmodum si loca, in quibus prodeunt, cliuosa, & uentis exposita sint, & perflata, frigidaque, & aquis carentia: in his enim locis uires eorum longè ualidiores intelliguntur. Contra, quæ in campestribus, riguis, & opacis, cæterisque locis à uento silentibus enascuntur, plerunque degenerant, & minus uiribus ualent: multoque magis, si non suo tempore, nec opportunè colligantur, aut si per imbecillitatem intabuerint. Neque ignorandum, hæc sæpe pro peculiari loci natura, aut anni clementia, maturius, aut serius adulescere. nonnulla propria uel hyeme florent, & folia pariunt: quædam bis anno florifera. Quare cui in animo est horum peritiam assequi, necesse est eum prima germinatione solo emergentibus, adultis, & senescentibus adesse. Nam qui pullulanti herbæ duntaxat adstiterit, adultam cognoscere non potest: neque qui adultam tantum inspexerit, nuper erumpentem noscet. Quo fit, ut propter mutatam foliorum faciem, caulium proceritates, florum seminisque magnitudinem, & id genus alias peculiare notas, nonnulli, qui olim has rerum uarietates non perspexerunt, magno in errore uersentur. Quæ causa etiam nonnullis scriptoribus imposuit, qui herbas quasdam, uerbi gratia, gramen, quinquefolium, & tussilaginem emittere florem, fructum, & caulem negant. Ergo qui sæpius ad uisendas herbas, & earum natales se contulerit, earum cognitionem maximè consequetur. Scire etiamnum conuenit, sola ex herbaceis medicaminibus ueratri genera, nigrum, inquam, & candidum, multis edurare annis: reliqua à trimatu inutilia. Quæ uerò fruticosa sunt, sicut stæchas, trifago, polium, abrotonum, seriphum, absinthium, hyssopum, & alia id genus semine prægnantia demetantur. Flores quoque antea, quam sponte sua decidunt, fructus autem, ut maturi decerpantur, necesse est: & semina, ubi siccari cœperint, priusquam defluant. Herbarum succus, & foliorum elici debet, germinantibus tum primum cauliculis. Lac, & lachrimæ excipiantur, inciso per summum adolescentiæ uigorem caule. Radices, & liquamenta, cortices uelut recondantur, eximere conuenit, cum herbæ suis folijs exuuntur. siccantur etiam expurgatæ inibi, locis asperginem non redolentibus: sed quæ luto, aut puluere sunt oblitæ, aqua elui debent. Flores, & omnia, quæ iucundum odorem efflant, arculis tiliaceis, nullo situ obductis, reponantur. Nonnunquam charta, aut folijs semina, ut perennent, aptè inuoluuntur. Liquidis medicaminibus densior materia, argentea, uirena, aut cornea conuenit. Fictilis etiam, si modò rara non sit, accommodatur: & lignea, præsertim è buxo: sed ænea uasa ocularijs medicamentis, liquidisque, & omnibus ijs, quæ aceto, pice liquida, aut cedria componuntur. Adipem autem, & medullas stagneis uasis recondi conuenit.

## COMMENTARIVS MATTHIOLI.



Galenus nauigationes, ut legitima cognosceret simplicia.

Medicamenta adulterantur etiam Galeni tempore

**Q**UANTVM oporteat Medicos omnes, qui legitimum in arte nomen sibi comparare student, simplicium quoruncumque medicamentorum, quæ medicinæ usui competunt, cognitionem, ac facultatem sensibus exactè consequi, non modò hac præfatione declarat Dioscorides. Anazarbus in hac materia cæteris facillè princeps; sed id quoque post Dioscoridem admirabili doctrina pluribus in locis memoria prodidit grauissimus auctor Galenus: qui hac in re præ cæteris Dioscoridè secutus (ut eius luculentissima monumenta passim attestantur) in simplicium medicamentorum uiribus, ac facultatibus, indagandis, relictæ (hoc etiam ipse fatetur) Dioscoridi historiæ palmam, omnes, qui in hac materia scripserunt, longè admodum superant. Quippe tanta animi propensione oblectationeque cognoscendorum simplicium captus fuit (sciebat enim non posse ritè se dici medicum sine eorum scientia) ut nullo magis laboris metu, nullis periculis deterritus, in Lemnũ, Cyprum, Syriam nauigauerit, atque alias plurimas peragrauerit regiones, ea demum causa, ut quæ legitima & sincera, quæque spuria & adulterata essent medicamenta, certò dignoscere posset. Quapropter lib. I I I, de medic. comp. per genera ita scriptum reliquit. Hinc enim puto bonæ indolis iuuenes incitatum tri, ut medicamentorum materiã cognoscant, ipsi met inspicientes, non sentel aut bis, sed frequenter: quoniam omnia similes esse nobis uideantur, differentes autem ijs, qui ipsos inspicere consueuerunt. Itaque herbarum, fructuum, & arborum materiam, priusquam è terra exinuantur, contemplari pulcherrimũ est, dum fructus uidelicet futuri sunt, dum eduntur, dum augescunt, & dum uigent. Hæc siquidem continua eorum speculatio docebit te, quando potissimum ipsos commode decerpas, ac in siccis domunculis repositos custodias. Vos ergo admoneo, amici, ut in hoc quoque me secum amini, si artis opera pulchrè obire uolueritis. Nouistis enim, quomodo ex omni natione præstantissima quotannis mihi afferantur medicamenta, eo quòd perdit illi omniuegarum rerum coemptores (Græci *φάρμακας* uocant) uarijs modis ea contaminant. Præstiterat forsau uon hos solùm, sed multò magis etiã mercatores, qui illa aduehant, incusare, atque his multò magis ipsos herbarios, item nihil minus eos, qui radicũ liquores, succos, fructus, flores, & germina ex montibus in urbes conferunt: hi siquidem omnium primi in eis dolum exercent. Quisquis igitur auxiliorum undique copiam habere uolet, omnis materiæ stirpium, animalium, & metallorum, tum aliorum terrestrium corporum, quæ ad medicinæ usum ducimus, expertus esto, ut ex eis et exacta, et notha cognoscat. Nisi enim hoc modo instructus ad præsentis operis præsidia ueniat, uerbò tenus quidem medendi methodum sciet, opus uerò nullũ ipsa dignum perficiet. Et primo de



de antidotis: Medicus autem (inquit) omnium stirpium, si fieri potest, peritiam habeat, consulo: si minus plurimum saltem, quibus frequenter utimur. Earum genera quisquis toto ætatis illarum decursu nonerit, multis in partibus orbis terrarum reperiet. ut ego in Italia multis in locis inueni: quæ nec quando pullulant, nec quando crescunt, nouerunt isti, qui siccas stirpes tantummodo cognoscunt. Hæc Galenus. Ex quibus satis medicis omnibus perspicuum est, non posse quenuquam sine certa simplicium medicamentorum cognitione, nec morbis ratione mederi, neque artem recta methodo exercere, nec nisi fortuna quadam, uel naturæ ipsius robore ægros sanare. Neque enim ullo pacto eis ad stipulandum censeo (ut medicorum plerique faciunt, et ii sepe, qui primas sibi deferri existimant) qui compositis tantum officinarum medicamentis, ipsi quoque admodum uulgaribus contenti sunt. Nam cum satis sibi fore persusadeant, scire Diacatholicum omnes in uniuersum humores deicere, Deiectorium è succo rosarum flauam bilem, Diacnicum pituitam, Diascum, et Catapotia ex cæruleo atram bilem, Coccia caput et cerebrum expurgare; si cuti, quæ Lucida nuncupant, oculis, et quæ ex hermodactylis dicuntur, ac quæ foetida uocantur, arthriticis esse peridonea, nihil ultra requirunt: quin potius scire negligunt, è quibus ea simplicibus componantur medicamenta, et an iis ea insint uires, quæ suis nominibus pollicentur. an simplicia, quibus constanter legitima sint an spuria, syncera an adulterata, recentia an exoleta, sicca an humore, uel situ corrupta, an suo tempore, et opportune decerpta, sole siccata an umbra, an igne, ut sæpius in temporis angustia officinis fieri solet. Neque unquam animaduertunt, quod deiectoris medicamentis, quæ nostro auro parantur ad bilem deiciendam, semper Scannominum lacte tithymalorum, ac pityusæ adulteratum, magno agrorum detrimento immiscunt. Iis uero, quæ pituitam ducunt, sepe legitimi Turpeti loco, modo pityusæ, modo thapsiæ, modo pæoniæ radicum cortices imponunt, quæ impostorum mangonio ita Turpetum referunt, ut non seplastiariorum modo, sed etiam medicorum quoruncunque oculos sæpenumero fallant, uisi fraus gustu, et legitimi Turpeti scrutinio, et collatione deprehendatur. In Catapotis deinde, quæ ex hermodactylis uocant, ephemerum Colchicum legitimi hermodactyli uice, in Foetidis uero cicutæ semen pro agrestis rutæ semine, quorum utrumque mortiferum est medicamentum, omnes iniiciunt. Adde præter hæc, quod sæpenumero medicamenta ex iis simplicibus componunt, quæ ætate exoleta, nihil uiribus præstant. quo fit, ut penitus enanida, ac inualida reperiantur. Quod etsi quandoque malitia, ac propria artificum inopostura fiat; id tamen plerumque accidit, ex ipsorum tum incuria, tum etiam imperitia. nam pauci, uel potius nulli habentur pharmacopole (eos semper excipio, qui simplicium historias amplexantur) qui supposititiis, ipsi quoque innumeris non utantur simplicibus. Nanque a saro utuntur pro bacchare, cytiso pro trifolio, syluestri loto pro serapula Campana, colutea pro sent, acoro odorati calani nice, cypero pro galanga, hieracio pro soncho, sphondylia pro acantho, chondrilla pro cichorio, agresti lactuca pro intubo, ophioscorodo pro scordio, quibusdam arborum lacrymis pro succino. thapsia pro turpeto, pice pro pissasphalto, resina larigna pro abiegna, et legitima terebinthina, phyllitide pro asplenio, obscuris quibusdam radicibus pro meo, peucedano, et costo. Ad hæc cassia pro cinnamomo usurpant, santala pro aspalatho, laccani ex brasilio et cocco insectorio confectam pro cancamo, Rhodium oleastrum pro agallocho, ossa et carnen humanam pro numia, macini pro macere, chartam pro papyro, crespinum (sic enim uulgò uocant aculeatam quandam plantam) pro oxyacantha, conuoluulum, siue leucom simlacem pro ligustro, agræstium prunorum succum pro acacia, succum uero baccarum ligustri, et periclymeni pro lycio, nuces, quas Arabes uomicas appellant, pro metellis ita uocatis, caneros pro gammariis, ranunculum pro coronopo, saponariam uulgò diatam pro struthio, carduum, quem benedictum nominant, pariterque chamæleonem album pro leucacantha, parthenium pro artemisia, cotulam foetidam appellatam pro parthenio, canis testiculus (sic enim radices quædam nominantur) pro satyrio, posium pro chamæpity, paronychia, et trichomanem pro adianto. Cadmia præterea officinis ferè omnibus pompholygem refert, ærugo æris florem, æris squama stomonatis (quod chalybem dictum putamus) squamam, sandix minium, terra quædam mangonizata sbragidem lenuiam, salnitrum nitrum, et aphronitrum. Alia denique plura, ac diuersa simplicia medicamenta sunt, quæ ubique locorum apud uarias nationes, huius, uel illius uicem nulla penitus ratione indifferenter subiiciuntur, ubi tum prauum, tum spurium sibi iandiu uendicant usum. quæ ne uerbosius rem hanc prosequi uideamur, silentio prætermittenda censemus. Hæc autem pluribus in locis non euenirèt, si medici omnes ueram, et exquisitam simplicium rerum doctrinam consequerentur, quam maxime, et iure consequi deberent. Quippe materiæ huius peritiam assecuti, et errorum cognitionem nacti, ne seplastarii in eiusmodi uersarentur scandalis, obstarent: neque eis ulla unquam medicamenta confici permitterent, nisi sibi prius perspectis cognitis, ac probatis simplicibus, quæ in ipsis componendis expetuntur. Dent itaque iam operam imperiti, ut huiusce materiæ cognitionem exactè consequantur. quandoquidem artificii nihil quidem execrabilius, ac turpius esse potest, quàm suæ artis subiectum, et instrumenta ignorare. Quod sanè unicuique medico usu euenire comperimus, qui non modo alienis utitur misturis, sed nec simplicia quidem, nec eorum facultates nouit. Proinde scit è à Galeno dictum est lib. VII. et VIII. de composit. medic. secundum locos, quod non poterit is, ex quo ordine eiusdem generis medicamentorum compositum sit, cognoscere, num ex mollissimo, an uehemētissimo, aut medio, aut alio aliquo inter hunc, et alios intermedio, qui singulorum simplicium potestatem exactè antea non perceperit. Verūtamen nemo in hac materia se peritum euadere confidat asidua tantum librorum lectione, etsi eos quidem grauissimi conscripserint auctores, nisi sæpius ad uisendas stirpes se contulerit, et quod à præceptore in herbarum agnitione diu exercitatus, digiti demonstratione prius fuerit doctus, ac oculorum sensu, gustatuque, uariis anni temporibus omnia hæc diligenter omni ex parte perpendat. Id enim, cum maxime perpendisset Galenus (ut sexti libri de simpl. med. facul. præfatione legitur) inquit. Equidem non possem non accusare et illos quoque, qui primi herbarum formas scriptis docere sunt conati, sciam melius existimem ab ipso præceptore oculis discere, ac non ad similitudinem ipsius, qui ex libris prodeunt gubernatores. nam sic et uerior, et manifestior esset doctrina, non herbarum modo, et fruticum, arborumque, sed et aliorum omnium.

Sine simplicium cognitione manca est medendi ratio.

Officinarum lapsus.

Officinarum abusus & ignorantia.

Simplicium peritiam nemo potest adipisci ex librorum lectione.

Herbarum formarum descriptione parum conferunt



Scripta quorum commendet Galenus.

Simplicium peritia à præceptoribus, non ex libris comparatur.

Impostores quandoque etiam peritos decipiunt.

Stirpes folia immutantes.

Stirpium imagines parum, uel nihil profunt ad simplicia dignoscenda.

num medicaminum. Verum enimvero si omnino libris est opus, quis adeo miser est, ut præteritis scriptis Dioscoridis, Nigri, Heraclidis, Crateæ, & aliorum innumerorum, qui in arte ipsa consenuerunt, libros grammaticos scribētis immutationes, transformationes, & decanorum, demoniorūq; herbas sacras perferat? Et libro primo de alimentorum facultatibus: Optima (inquit) illa doctrina est, quæ uiua uoce traditur. neq; enim quisquam ex libro nauclerus, aut aliterius artis artifex euadit. In hoc uanq; comparati sunt libri, ut nobis sint eorum, quæ antè didicimus, monumenta, non ut rudes & ignari per illos doctrinam perfectam assequamur. Quod si qui sunt, qui præceptoribus careant, uelintq; ijs, quæ luculentè, ac copiosè sunt scripta (qui nobis scribendi mos est) diligenter incumbere, magnum ij fructum capient, præsertim si eadem relegere eisdem non grauentur. Et primo de antidotis: Quod si nullo (ait) monstrante ex libri alicuius lectione, quales sunt commentarij Heraclidis, Crateæ, Dioscoridis, aliorumq; quorundam in simplicium medicaminum cognitionem peruenire aliquis uelit, longè maiore ipsi opus est inspectione, ut exactè singularum medicinarum uirtutes, ac uirtus diiudicare sciat. Nam qui simplices medicinas diuendunt, tam callidè illarum quasdam concinnant adulterantq; ut etiam exercitatissimos in eis decipiant. Quare idem Galenus lib. i. x. de simpl. medic. facultatibus in diphrygis mentione ita scriptum reliquit. Adjiciam huic, qui de illo habetur, sermoni, rem non modo de diphryge scitu utilem, sed & de Lemnia sphafragide, & pompholyge, & opobalsamo, & lycio Indico. Nam etiamnum adolescens didici hæc ita præparare, ut à ueris natuijsq; nihil differre uiderentur. Erat autem qui me docebat ingenti mercede, homo curiosissimus, non in his tantum, sed & alijs similibus. Itaq; in Lemnum, in Ciprum, in Palestinam Syriam eo studio nauigauit, ut medicamentorum istorum cuiusq; multam copiam, quæ in omnem uitam meam satis foret, reponerem. Sed & Lycium Indicum cum aloë Indica id temporis commodum accipere contigit, cum à Palestina iter reflecterem: cum persuasum haberem, eo quod à camelis cum tota sarcina aduectum esset, proculdubio id esse Indicum: quodq; adulteratum haud nosci ab ijs, qui portassent, posset, propterea quod materia, ex qua id præparatur, illis in locis haud nasceretur. Porro satius uisum est mihi illegitimarum compositiones haud quaquam adscribere, utpote cum homines scelerati in lucro ponant talia posse discere. Nec enim necessarium est cum uerorum ac germanorum notis ac indicijs, adulterandorum nosse compositiones, cum nihil ad ea discernenda conferant: imò optem, si queant, quæ à maioribus me perperam conficiendorum atque adulterandorum medicaminum prodite sunt compositiones, omnes prorsum delere atque extirpare. hæcenus Galenus. Ex cuius uerbis manifeste percipi potest, ex libris duntaxat non posse in simplicium agnitione peritum fieri quenquam, etiam si in ipsis stirpium imagines uirentibus persimiles omni exquisito artificio fuerint adiectæ. Siquidem (ut hac in præfatione scribit Dioscorides, & locis iam citatis asserit Galenus) qui in stirpium historia peritissimus euadere cupit, illum quidem uiuas omnium plantarum non solum prima tantum, sed diuersis anni temporibus inspicere oportet. Quandoquidem plantæ ipse folia aliàs exhibent, cum prima germinatione emergunt, aliàs cum adolescunt, & caulè edunt, aliàs ubi flores erumpunt, & aliàs ubi siccescentes maturum gestant semen. Videmus enim apertè populum nigrum, sicuti ricinum, per initia folia explicare euenit. quippe huic prima statim inuenta triquetra folia insunt, quæ utiq; iora iam facta quadantenus rotundantur. Symbrij aquatici folium cum primum erumpit, rotundum est, cum uero adoleuit, in crucem modum laciniatur. Lepidii, & nasturtio folia primo exortu circinata, ac circumquaque apij ferè modo laciniata emergunt: at cum pubescunt, prælonga oleaceis similia euadunt. Quo etiam modo hortense nostrum uulgò petroselinum uocatum cum suis ludere certaminus. Lathyrus amygdalinus folijs caulē uestit, quæ in cacumine ita prioris formæ obliuiscuntur, ut in aristolochiæ, aut hedera folia degenerent. Nouellus acanthus folio lactucæ longiore uirescit erucæ incisuris diuiso: at senior effectus quedam circa totum caulē folia promit tam crebra, acuta, implicita, densa, ac minuta, ut nucameti speciem quædam referant. Sunt & aliæ nonnullæ, quæ has foliorum mutationes per tempora ostendunt, quarum nomina breuitati consulescentes uinc prætereunda censemus. At fieri quidem nequit, ut huiusmodi stirpium uariationes ex libris, in quibus figuræ expressæ, atque etiam coloribus exornatæ habentur, omnes obseruari possint. quandoquidem plantæ ipse appictæ ex tot uarijsq; unam nobis duntaxat imaginem representant. Huc etiam illud accedit, quod ea, quæ picturæ artificio fiunt, etsi ex optimi artificis penicillo emergant, nunquam tamen naturalium rerum lineamenta ad unguè referre, ac exprimere queunt, quanuis etiam naturam exactissime imitentur. Eadem ratione putauerim ex cuiuslibet grauissimi auctoris commentarijs, qui stirpium historiam continent, neminem absolutam earum notionem unquam adepturum esse, quæ maxime medicis requiritur. quippe quod ij suis simplicium monumentis, ac foliorum, caulium, & reliquarum partium historiis, non nisi unam lineamentorum, ac similitudinum enarrationem tradiderint. Quæ tametsi uera sint, nullum tamen præbeant mutationis exemplum, ut sepe ac sepeius plantis compluribus uariis totius anni curariculis tum in foliis, tum in caulibus, reliquisq; particulis euenire comperimus. Quo fit, ut hæc uariandi series nullo alio pacto addisci possit, quam longa oculorum exercitatione, dum ætate tota plate ipsæ solo educate uirescunt. Ceterum ubi scriptores in suis historiis stirpium notas explicant, illi quidem ferè semper similitudinibus utuntur, ac omni exempli gratia, xyridem, gladiolumq; iridi similem reddentes: Meon præterea anetho, cyperum porro, asarum hedera, & ph. smyrnio, & hoc illi, & illud huic sæpissime comparantes. Vnde fieri non potest, quin aliquis, non prius perspetis una cum doctissimis ac exercitatissimis præceptoribus plantis quibuslibet, cum quibus aliæ iniisse tum similitudinem, tum etiam cognationem narrant auctores; & non habita hoc modo earum ratione, possit unquam ex solis libris cum stirpium imaginibus, uel sine eis editis, in summum & perfectum barbarum euadere. Quamobrem etsi stirpium imagines, quæ magno tum pictorum, tum typographorum studio libris excuduntur, insipientium oculos blandè admodum detineant, atq; illas prius à nobis cognitās in memoriam reuocent; magni tamen eas esse emolumentum iis non crediderim, qui uisu & præceptoris auxilio numerosam earundem partem non acceperint prius: quauquam fortasse scens uulgus existimet. Adhibeant igitur curam iis, quibus in animo est rei barbariæ peritiā adipisci, ut in primis uiros huius



huius rei non imperitos sibi præceptores asciscant: deinde ut assuescant per diuersa temporis interstitia, montes adreualles, siluas, ac cetera terræ loca, ubi oculis, reliquisq; sensibus simplicia medicamenta inspicere, & cognoscere ualeant. Quos nec pigeat se conferre ad fondinas, ubi metallica, & fossilia medicamenta tam diligenter contemplantur, ut legitima quæque deinde ab adulterinis discernere sciant. Neque solū in fondinis ipsis uersari debent, sed etiam in fornacibus, ubi metalla funduntur. nam ibi & diphrygem, & pompholygem, & spodium, & caduiam, & argenti spumam, & alia nonnulla dignoscere poterunt: quæ hac nostra ætate factitia, spuria, & adulterata in myropolijs ferè omnibus habentur. Quin & ad magna emporia, luculentissimasq; ciuitates se conferant, ubi peregrina undiq; importata ueneunt. At certè ridiculi sunt, qui inter legendum tum herbas, tum etiam radices uana ducti religione, quibusdam uerborum, carminum, & suffimentorum superstitionibus uti præcipiunt, quasi uires, & facultates medicamentorum uerba, & carminum incantationes infundere, augere, et diminuere ualeant, ut stulti, et superstitiosi falsò credere, & affirmare non erubescunt. Quos tamen lib. v. 1. de simp. med. facul. superius citato acerrimè damnauit Galenus, sic inquit. Et Pamphilus eum in modum tractatum de herbis coposuit, uerum is ad fabulas uersus aniles est, simulq; præstigiaturas quasdam, iunctis nonnullis incantationibus, quas, cum herbas colligunt, admurmurant. Et sanè utitur ijs *ἡ πόσις περὶ ἁπάντων*, id est, ad quæ suspenduntur, & ad alias manganas non solum curiosas, & à medicina alienas, sed etiam falsas uniuersas. Ex hac Galeni sententia omnibus palàm fit, quòd si modò commentarios aliquos admittamus, omisissis omni ex parte superstitiosis, eos tantum legere debeamus, atq; in ijs nauare operam, in quibus uera, & exculata simplicium doctrina nitet. Quos præsertim posteritati donarunt ijs, qui exactam eorum peritiam indefessis laboribus sunt cõsecuti: inter quos omnium primus est Dioscorides. Ideoq; iure quidem eodem loco ceteris à Galeno præfertur, cum inquit. At Pamphilus, is scilicet, qui libros de herbis composuit, planè ex ijs, quæ uel ipse scribit, præ se fert grammaticum, indicatq; se nec conspexisse herbas, quas exponit, nec uires earum expertum, sed ijs, qui ante ipsum scripsere, fidem habuisse citra ullam explorationem. Hic sanè libros exscripsit frustra annexo ad unamquamque herbam nominum aceruo: deinde etiam exponens, si qua ex homine ferebatur transformatio: tum incantamenta, & libationes, atque thymiamata, quæ in colligendis illis adhibeantur, adscribens: necnon & alias eiusmodi præstigiaturas nugaces. At Dioscorides Anazarbensis quinque libris materiam omnem utilem absoluit, non herbarum tantum, sed et arborum, & fruticum, & succorum, & liquorum: memorans insuper & metallica omnia, & partes animalium. Et mihi utiq; uidetur omnium perfectissimè tractatum de materia medicamentorum conficisse. Nā licet à maioribus multa de illis benè scripta extent, tamen à nemine omnium æquè de omnibus. Ceterum quæ scripta reliquit Heraclides Terentiinus, & Crateuas, & Mantias, non in ordinem digestas, nec in unum omnia collecta nisuntur, quemadmodum illa, quæ scripsit Dioscorides. Et primo de antidotis uolumine: Ac de omni quidem (inquit) medica materia sufficienter à Dioscoride quinque libris traditum est, à quo tibi discere licet cum alias omnes notas, tum gustu, olfactuq; perceptas, quibus maximè probatiora medicamenta à deterioribus cognoscuntur & discernuntur. Hinc ergo auctoritate Galeni satis perspicuum esse potest omnibus medicis, itemq; seplasiarijs, ad quos potissimum spectat rei medicæ cognitio, in ea simp. medicamentorum facultate Dioscoridem ceteros excellere, & facile primas tenere. Quapropter ab ijs præclarissimè ageretur, si eius scripta tantisper legerent ac perlegerent, perpetuoq; in sinu gestarent, donec eū plane sibi familiarem redderent. & hoc quidem eo præsertim tempore facerent, quo à peritissimis præceptoribus uera, ac legitima simplicia tum oculorum, tum gustus, tum olfactus sensibus offeruntur. Quod eò citius ducet illos ad optatum finem, quò magis Dioscoridis præclara scripta castigatissima, et à mendis quàm plurimis expurgata reperiret. Quinetiam nostris commentarijs, qui præterea Galeno referunt acceptum ferè quicquid ipse scripsit de simplicium medicamentorum materia, ita dilucidata & illustrata, ut maximam (ni fallor) secum adferant claritatem. Huic igitur soli se dedant, hunc solu in sequantur ob iam dictas rationes omnes ijs, qui non modò stirpiū, sed & reliquorum simplicium medicamentorum doctrinam & facultatem consequi uolunt. Ac contra tum uulgo semper ignaro, tum ijs etiam, qui coxantium rauarum instar, è sordido palustrium aquarum limo caput exerere nequeunt, nugaces, ac penitus deprauatas Pandectas relinquant, unà cum tenebrosis officinarum Luminaribus, & reliquis mendacibus uoluminibus, ubi simplicium, & compositorum materia ab ijs tractatur, qui uix lactucam nouissent, nisi eorum cœnis frequentissima extitisset: pariterq; urticant, nisi acerrimè tangentes pupugisset. Quorum inscitiam animaduersus Galenus, contra eos locutus esse uidetur lib. v. 1. de simpl. med. facul. præfatione breuiter & scitè, sic inquit. Verum abstinendum est à multis mendacibus, multoq; etiam magis fugiendus est Pamphilus, qui ne per somnium quidè herbas uident, quarum aggreditur figuras perscribere. nā id genus hominū (quomodo assimilauit eos Heraclides Tarētinus) simile limum est præconibus, qui formam ac notas fugitiui mancipij, licet ipsi non uiderint unquam, præconio tamen publico cant. notas enim ab alijs, qui norunt, accipiunt, & ceu cantilenam eas proferunt, ut si forte is, quem præconio indicant, adlisteret, agnoscere tamen non possent. Hucusq; Galeni uerba. Quæ longè satis sufficere possunt ad eorum monitionem, qui ad simplicium materiam noscendam per rectum ostium introire cupiunt, & securo totius itineris gressu progredi. Verum in primis, ut opportune singula demetantur, nosse oportet tempora, quibus maximè plantæ uiribus ualeant. Quapropter à radicibus initium sumentes, dicimus harum uires, sicut etiam aliarum stirpiū partium, non eodem anni tempore æquè in omnibus reperiri. quandoquidem aliæ hoc tempore, aliæ uerò illo humore prægnantes deprehenduntur. Tametsi non desint, qui haud quaquam infirmis rationibus innixi, radices è terra eruendas asserant semper autumno, cum scilicet folia decidunt, & caules contabescunt. alij uerò incunte uere, priusquàm folia concreseant: siquidem hisce temporibus radicibus maior uis inest, quàm ceteris partibus. Sed ut ingenue in hac re fatear, quid sentiam, crediderim ego omnino maiorem succi ubertatè inueniri in his, quæ uere effodiuntur. quippe quòd plantæ nondum caules, folia, neque flores emisierint, à quibus omnis radicum succus exhauritur. Sed & rationi consonum mihi uidetur, autumnales radices omnes tum paucioris, tum imbecillioris esse succi, quàm uernales, quòd sci-

Vanū & superstitiosum incantationibus uti, dum plantas effodiuntur.

Dioscorides à Galeno maximè commendatur.

Dioscorides in simplicium medica. materia primas tenet.

Libri explodendi.

Tempus, quo stirpiū partes legendæ sunt.

Radices quæ do effodiendæ.



licet pauco antè tempore & caules, & folia, & fructus ediderint. Non tamen iusciari uelim, quòd quæ uere leguntur, copiosiore, quàm par sit, humore redundantes, illoq; longè minus concocto eo, qui in autumnalibus habetur, putredini & corruptioni non sint magis obnoxie, præsertimq; si longo asseruentur tempore. Quare à Dioscoride animaduersa, is sanè iussit stirpium radices effodiendas esse, cum stirpes ipsæ folijs exuuntur. Quod cum uariis anni temporibus eueniat pro natura diuersarum plantarum, curam impendere oportet, ut suo tempore unaquæq; radix integrè si fieri potest, cum omnibus suis adnatis euellatur, & iis in locis, atq; sub ea cœli constitutione, quam maxime familiare habent. Porro radices abundè nutritæ sint oportet, ac omni putredine, & imbecillitate uacantes: non ita tamen, ut præ nūcio alimento ex pingui solo, ubi nascuntur, accepto, debitam & humoris copiam, & corpulentie metam excedant, neq; ut eiusdem alimenti inopia inanes, & rugosæ reddantur. Quod cum maxime perspexisset Galenus de iridis radicibus differens libro primo de antidotis: in uniuersum (inquit) ex omni medicinarum genere illæ radices inutiles habentur, quæ inanes sunt, & rugosæ. Atq; illæ quidem deteriores sunt mediocriter nutritis, & mediocrem magnitudinem nactis quæ crassitudinis modum excedunt, & plus humoris in se continent, quàm illis usu ueniat.

Radiciū optimarū notæ,

Radices quo modo mundandæ, siccandæ, ac conseruandæ sint.

Radices quibus in locis exiccatae sint ponendæ.

Veratrū utrū que triginta educat annis.

Non est ab re certis temporibus herbas colligere.

Herbæ quo pacto legendæ, siccandæq; sint.

Plantæ, quæ colligi possunt floribus ornatæ.

Hæc Galenus. Ceterum ubi radices è terra fuerint exptæ, primum quidem tandiu aqua clara elui debent, donec omni undiq; terra, uel limo penitus abstergantur: mox deradi tū à fibris, tum capillamentis omnibus, quibus uniuersim ferè omnes conantur: postremò siccari eas conuenit omni adhibita cura. Quòd si fuerint quales fœniculi, apij, asparagi, ruscij, polipodij, rubiæ, intubi, & consimilium, in umbra, ubi orientales uenti respirent, diligenter siccentur. At omnino cauendum est, ne sole feriantur: quippe quoniam potior earum pars ab eis prorsus euanesceret, utpote raris & tenuibus. Verum enimuero si ex eis fuerint, quæ natura crassæ sunt, ueluti gentianæ, helenij, mandragoræ, bryoniæ, & id genus aliæ, & aer sit nubilus, & hyems, ne in umbra situ tabescant, ac proinde marcescant, in sole ac uento tuto siccari possunt. Quod commodius fieri pōt, si frustatim dissectæ ita tenui funiculo traiciantur, ut partes non se contangant, aut cratibus impositæ quotidie sæpius manibus reuoluantur. Atqui curandum est, ante quàm siccentur, ut liguea matrix, quæ omnibus ferè radicibus includitur, ipsis in longum scissis, integra eximatur: quippe omnino inutilis est, nullamq; uim obtinet, etsi gentiana, cyclaminus, aristolochia rotunda, iris, bryonia, centaurium maius, nymphaea, aliæq; complures absq; matrice suas præ se ferant radices. Siccatis radicibus, quòd planè constat eas sine tabe, & terredine per tempora adseruari posse, ijs reponantur in locis, ad quæ solares radij non penetrent, neq; summo pateat aditus, & quæ neq; uliginosa sint, neq; puluerulenta. Sit igitur locus eminens, & siccus, ad septentrionem uergens, uel etiam ad meridionalem plagam, quando scilicet radices ipse non prorsus exiccatae reconderentur: adhibita tamen cura, ne eo tempore austri humidissimi status admittantur. Ita deniq; recondi, ac seruari possunt tot annis, quot ab inani tate, terredine, & tabe uindictari ualeant. Nam etsi quæ tenues sunt, ut asari, phlegmarij, ruscij, & id genus aliæ, annoduntaxat pereunt: ueratrū tamen utrunq; quauis radicibus constat tenuibus, ad trigessimū annum usq; perdurat. Ceterum demetendi tempus, recondendi locus, perdurandi terminus non modò in radicibus obseruandus, sed & in cæteris tum stirpium, tum etiā animalium partibus, ut in birca sanguine, lupi iocinore, intestino, ac etiam stercore, uulpis pulmone, apri uestica, anguim senecla, alijsq; cōsimilibus. Assumatur igitur hæc omnia eo denum anni tempore, quo magis suis uiribus sunt præditæ, nullo plane modo neglecta temporum ratione, quibus singula decerpi postulāt. Neq; enim damnandi sunt, qui in quibusdam plantis colligendis quædā decreta tempora, nonnullosq; errantium siderum aspectus obseruant: quippe quòd apud graues auctores scriptum inuenerint, peoniæ radices contra comitiales non esse euellendas, nisi decrecente luna. Quæ quidem opinio non prorsus reprobanda uidetur, nec ad ineptias incantationum, aliarumq; uanitatū, quas stultè (ut Galenus inquit) prodidit Pamphilus, comparanda. Nam cum inferiora terrestria à superioribus cœlestibus gubernentur, & regantur, fieri maxime potest, ut luna, ut quæ cæteris errantibus sideribus est nobis magis proxima, motuq; uelocissima, maximam cum plantis omnibus, ac rebus quibusuis alijs habeat rationem, tum cum augetur, tum etiam cum minuitur singulis mensibus. Quamobrem non temerè à Galeno proditum est, abyssum herbarum tantum sirio ardente ad canunt, rabiosorum morsus esse euellendam, sicuti etiam fluuiatiles canculos ad idem peridoneos. Quæ etiam tempore captamus scorpiones, atque anchusa radice constat sanguineo succo madente. Quemadmodum & stirpes, quibus facultas excofaciens insit, perpetuò in locis calidis, ac siccis demetere conuenit. Quocirca Hippocrates ad Crateum scribens: Adiuuere (inquit) quantum potes, ut nobis montanas maxime, & in altis collibus nascentes herbas à radicibus refeces: quandoquidem hæc firmiores, atque acriores sunt ijs, quæ aquosioribus nascuntur locis: idq; quòd in montibus terra sit densior, & aer tenuior, nam quòd attrahunt, frigidius est. Quinetiam dabis operam, ut flores ex his herbis etiamnum decerpas, quæ circa stagnantes aquas, paludes, fluuios, & fontes prodeunt, quas sanè debiles, & exolutas, ac dulcis succi esse scio. Hæc Hippocrates.

Herbæ similiter, atque radices, legendæ sunt, siccandæ, ac asseruandæ his tamen demptis, quæ tum in medicina usu, tum in cibis, tum etiam in obsoniorū condimentis quotidie uiuentes usurpantur, ueluti lactuca, intubus tam domestica, quàm agrestis (cichorium appellant) portulaca, buglossum, beta, atriplex, blitum, bassica, uiola nigra, malua, helxine, lincozotis, ocimum, apium, hyoscyamus, sedum, plantago, asparagus, acanthus, & aliæ complures. Atq; non solum refrigerantibus herbis, uerum etiam excofacientibus recentibus utimur: plerumq; enim ex calida potestate præditi uirides siccis præponimus, præsertim ubi minus calefacere sit opus: siquidem humor in uiuentibus exuberans earum caloricam facultatem haud parum demulcet. Cuius quidem classis habentur amaracus, eruca, nasturtium, mentha, abinthium, thymus, satureia, ruta, calamintha, sisymbrium, pulegium, abrotonum, & id genus permulta. Sunt præterea & aliæ, quæ demetiri expetunt, cum primum floribus ornantur, ut centaurium minus, uiola purpurea, origanum, symphytum petraeum, pulegium, serpyllum, amaracus, polium, thymus, chamædrys, chaenopitys, anthemis, chrysanthæum, scythas, hyssopum, fumaria, aliæq; cōsimiles plantæ, quas ne longior, quàm par sit, esse uidear, ex industria prætereop. Hæc igitur omnia serena cœli constitutione, non nubibus, non imbribus infestis in primis colligantur oportet.

Deinde



Deinde terra expurgata, atq; alijs aduentitijs excrementis amotis diligenter in umbra siccentur. Nisi ex eo genere habeantur, quæ caulis crassitudine, ut in acantho, uel foliorum lentore, crassitie, & humoris exuberantia, ut in portulaca, & crithamo, omnino in solari expetant. quandoquidem si eiusmodi herbæ in umbra siccandæ reponantur, dubio procul situ obducentur, & putrescent. Cæterum cum rectè siccatæ fuerint, decusso puluere, in sacculis ex corio, uel ligneis capsulis recondantur, ac diligenter claudantur, ne earum uires enanescant. Quæ in re errant seplasia= riorum plerique, qui herbas iam siccatas in fasciculos digerentes ad officinarum laquearia suspendunt, ubi non so= lium breui uiribus destituntur, aeris ambientis exustione, ac uentorum perflatu, sed etiam in mille sordium senti= nam deiscunt: quandoquidem & puluere, & aranearum telis obsiduntur, ac inde muscarum stercore, quæ illis die, noctuq; insident, labefactatæ nigricant. Neque uerò planè laudibus offerendi sunt ij, qui in linteis sacculis, 10 ipsiq; textura admodum raris eas trabibus appendere consueuerunt: quippe æstiuus aer in ipsos penetrans, quicquid boni inest, absunt, & abolet. quinetiam puluere oblitæ corrumpuntur, & contabescunt. Idcirco ut tam herbæ, quam radices suas integras asseruent facultates, uibil quidem præstantius, quàm eas capsulis tiliaceis, uel piceis, uel fictilibus diligenter clausis reponere, ut docet Hippocrates ad Cratenam his uerbis scribens. Omnia medicamenta, quæ succi, & liquores fluidi sunt, in uitreis uasis ferantur. quæ uerò folia, aut flores, aut radices sunt in fictilibus no= uis probè obturatis, ut ne uentis perflata, medicamenti rigorem, uelut in animi deliquium collapsa, amittant. Quod si Hippocrates in recentibus obseruandum præcipit, id maxime in siccis fieri operæ pretium erit. Flores insuper non secus, atque reliquæ plantarum partes, eo tempore colligendi sunt, quo magis suo in uigore consistunt, non au= tem cum iam flaccescentes decidui euanescent. At capparum flores muria asseruandi, antea quàm se explicent, de= cerpantur: rosarum uerò cum non planè explicati uisuntur: cæteri deinde cum omnino expansis folijs patent. Ve= 20 rum cum maiori ex parte omnes ferè flores sint herbis fragiliores, molliores, & tenuiores; idcirco tantum abest, ut in sole siccandi sint, ut ne quidem in umbra, si calida, uel eminentia fuerint loca: quippe, ut solis fernore, sic & æ= ris calore nimio exoluuntur. Siccentur igitur in locis temperatis, quo tempore sepius reuoluantur, ne situm contra= bant, adhibita etiam cura, ne sicci natium colorem deperdant. quandoquidem certum est flores, qui inter siccandum à proprio colore degenerant, nullius esse in medicina usus. Flores itaq; in uniuersum sicci ad annum duntaxat, edu= rant, et si anthenidis, centaurij, chrysanthemi, millefolij, spartij, & rosarum flores etiam longiori asseruentur tempore, si ligneis arculis optimè inclusi diligenter recondantur. Non minori etiam studio sunt colligenda semina tam ea, quæ suis in stirpibus nuda innascuntur, ut lithospermi, phalaridis, fœniculi, anethi, & cari: uel uasculis, aut capitulis inclusa, ut papaueris, nimpheæ, melanthij, hyoscyami, & ocimoidis: aut siliquis tecta, ut fabæ, ciceris, phasoli, doli= chi, & lupini: aut corniculis recondita, ut fœni græci, sertule Campanæ, sinapis, & erucæ: aut uarijs inuolucris 30 contenta; quàm ea, quæ circa medullam quorundam fructuum intus conduntur, quale est mali medicij semen, auran= tij, limonis, pyrorum, cydoniorum malorum, peponum, & melopeponum, cucurbitæ, & cucumeris. Veruntamen hæc assumere opertet, cum fructus, à quibus exinuntur, suam maturitatem planè senserint: illa uerò, ubi herbæ iam siccæ, non amplius uirent. Et quamuis multa reperiantur semina, quæ ad annum ultra suas asseruent uires, ea tamen quo= tamis renouare satius, ac tutius erit: siquidem pauca sunt, quæ inueterata rancorem non redoleant. quo fit, ut calorè nanciscantur extraneum, & sibi non congenitum. Vbi igitur sicca fuerint semina, arculis ligneis reponantur in locis siccis: facili enim contrahunt locorum humores. Cæterum fructus, quemadmodum pruna, serica, myrti baccæ, cy= donia mala, cerasa (quæ uulgo uarasas uocant) corna, sorba, ficus, punica mala, & alia id genus, quæ in medicina usum reponuntur, operæ pretium est, ut maturi ex arboribus decerpantur: quanquam sorba, ut siccentur, immatu= ra decerpere conueniat. At animaduertendum est, quòd ubi adstrictione, & repressione sit opus, fructus adstrin= 40 gentes ut paululum potius immaturi, quàm secus, demetantur oportet. Porro iuglandes, amygdale, pistacia, nu= clei pinei, & auellane non prius ex arboribus excutiantur, quàm planè ultimum maturitatis gradum senserint. Id autem rectè cognoscitur, cum extima inuolucra sponte sua debiscunt, & arbore concussa una cum fructibus deci= dunt, alioquin in solatu contrahuntur, & siderantur. Ex his igitur, qui siccati asseruantur, capsulis ligneis po= tius, quàm saccis recondantur, ne extraneos humores concipiant. Qui uerò per annum recentes reponuntur, aut maiori ex anni parte perdurant, in locis siccis minime asperginem redolentibus appendantur, ut assolet de uuis, prunis, malis cydonijs, & punicis: aut super paleas expandantur, ut fit cum malis, sorbis, ac mespilis: aut hordeo, uel milio sepeliantur, quemadmodum medica, & aurantia mala. Cortices præterea, qui fructibus auferuntur, ut citrijs, punicis, & cucurbitis: quiq; arboribus decerpuntur, ueluti thuri, ligno guaiaco, sambuco, ac fraxino: qui item herbarum radicibus detrahuntur, ut capparum, mandragoræ, thapsiæ, alypiæ, pitynsæ, ac aliarum, non 50 secus sunt siccandi, atque radices: quinetiam similiter reponendi. Succique, utpote in medicina admodum ne= cessarij, omni prorsus diligentia, ac ratione sunt conficiendi, atque ita asseruandi, ut toto anni curriculo putredinem non sentiant. Ii igitur non solum ab herbis eliciantur oportet, sed etiam à radicibus, ac fructibus. Qui è radicibus exprimuntur, ut Cyrenæicus, & glycyrrhizæ, uere quidem parandi sunt, cum primum folia emergunt. Ex folijs uerò, ante quàm stirpes flores edant, & earum caules lignosi fiant. Ex fructibus denique, quidam cum ipsi ulti= mam maturitatem senserint, cuiusmodi esse debet malorum punicorum, citriorum, limonum, & ex myrti baccis: quidam uerò antequàm ad plenum maturuerint, ut ex iuglandibus, moris, pyxacanthæ, ligustri baccis, & acacia: qui= dam ex immaturis adhuc uuis, ut omphacium. Horum omnium nonnulli diu in solati, aut lento igne siccati reponun= tur, ut aloes, syluestris cucumeris, absinthij, eupatorii, hypocistidis, glycyrrhizæ, & huiusmodi generis: aliqui uerò 60 humidi, fluxibilesq; reconduntur. At qui non omnibus eadem est conseruandi ratio: quippe alij paululum primum ad ignem feruesciti, moxq; diligenter desecati, ut fieri solet de succo rosarum, intubi, buglosi, oxalidis, lupulorij, apij, & fœniculi. Alij uerò ignem non experti tantum subsidere permittuntur, ac deinde uasis tandiu transferuntur, do= nec

Officinarum lapsus in herbis siccis reponendis.

Flores quo tempore sint decerpèdi, sic candi, ac recondendi.

Flores quan= diu durent.

Semina quo= modo deme= tenda.

Fructus quan= do decerpèdi & quomodo conseruandi.

Cortices quo siccandi, & reponendi.

Succi quo ex primendi, & conseruandiq; sint



Gumi, lacry-  
mæ, & resinæ

Dioscorides  
defenditur à  
calumnia.

Simplicium  
nomina ua-  
ria Dioscori-  
di adulterina

Arbores.

Frutices.

Suffrutices.

Herbæ.

Plantarum de-  
generatio.

nec defecati pelluceant. Quod fit de succo malorum punicorum, citriorum, limonum, cydoniorum, & mororum. Veruntamen diligenti admodum animaduersione opus est (ut Galenus inquit lib. vi. de medicamentorum compositione secundum locos) in succis liquidis conseruandis: quandoquidem faciliè corrumpuntur, nisi seruefactis prius, & mox à fecibus omnibus percolatis, olei parum superponatur, ut optimè norunt solertissimi pharmacopole. Adhuc habentur uaria liquorum genera, quæ quàm plurimis ex plantis distillant, ac defluunt, quorum alij gummi, alij resine, alij lacrymæ uocantur. In gummi genere sunt opopanax, laser, ammoniacum, sagapenum, euphorbium, galbanum, bdellium, myrrha, thus, opocalpasum, sarcocolla, styrax, & id genus alia. In resinarum uero censu sunt terebinthina, lentiscina, strobilina, pinea, picea, larigna, & abiegna. In lacrymarum denique numero sunt lac, quod ex papauerum uasculis excipitur, propriè opium appellatum, scammonium, quodq; ex thapsia fluit, tithymalorum omnium lac, cancanum, tragacanthæ lacryma, quicq; defluit è uitibus liquor, ex pruno, amygdalo, & ceraso. Quin & illud, quod uulgus Arabicum uocat gummum, quanquam non defuit, qui tam hoc, quàm prunorum, cerasorum, & amygdalarum lacrymæ malint in gummi potius referre, quàm in lacrymas. Sed quoquo modo res habeat, eò tantum summa harum rerum spectat, ut exacta scilicet earum notitia habeatur. quippe non de sunt mangones, & impostores, qui eas adulterent, quemadmodum & medicamenta metallica. Postremo si forsitan cuiuspiam nasuto uideretur Dioscorides non parua erroris culpa suspectus esse, quod in hac præfatione absolutè pronunciauerit, ex omni herbarum genere solum uera truni multis edurare annis, reliqua uero à trimatu inutilia esse, cum tamen in pluribus locis eius sententiæ reclamet Theophrastus antiquissimus plantarum scriptor, dicimus, ut hos ab huiusmodi opinione distrahamus, quod cum Dioscorides extiterit in hac facultate peritissimus, & consummatissimus, & omnium faciliè princeps, grauissimo quoque Galeni testimonio, non modo non credendum uidetur, sed ne cogitandum quidem, quod non calluerit is omnes stirpium proprietates, quodq; haud studiosè legerit ea, quæ ante ipsum trecentis, aut pluribus annis posteritatis memorie mandauerat Theophrastus, & aliorum ueterum plerique: præsertim cum nobis perspicuum sit, quantum in his rebus describendis fuerit ipse apprime fidelis, & diligens. Verum omnibus persuasum esse debet, quod sicuti in quibusdam locis huius uoluminis scriptura deficit, in alijs spurij additionibus redundat, in alijsq; quandoque scaturit mendis, scriptorum culpa, atque etiam eorum, qui inscribendis, uel excudendis auctorum uoluntatibus plus, minusue curæ impenderunt, quàm sua interesset; ita etiam in hac præfatione euenisse faciliè potuit. Quare pro certo crediderim, longe plura hic desiderari, quàm ea, quæ hac in re tradiderit Theophrastus, qui ueteratratum ait triginta perdurare annis, aristolochiam quinque, uel sex, chamaeleonta nigrum quadraginta, centaurium annis, ita ut repertum esse attestetur elaterium ducentorum annorum, quod optimum erat, & pretiosum. Harum itaque rerum historias omnes tantum absit, ut credamus non legisse, notasse ac monumentis tradidisse Dioscoridem, ut ne uim agnoscatur quidem, etsi scriptis suis non extant: quin potius locus iste nobis suspectus & deprauatus habeatur. Idcirco non Dioscoridi, sed scriptorum, & librariorum incuriæ id uitij adscribendum est: quemadmodum additionum redundantiæ accusantur ij, qui ut earum auctores essent, ab re hoc opus augere, atq; illustrare existimarunt, quales sunt spurie additiones illæ, quæ plura & Græcorum, & Hebræorum, & Arabum, & Chaldæorum, & Aegyptiorum, & Magorum, & Latinorum, aliarumq; linguarum nomina coaceruant, atq; in omni fere plantarum historia in pluribus uoluminibus Græcis statim occurrunt singulis capitibus. Quæ faciliè ex Pamphilo deprompta fuerunt: arguameto quod (ut superius dictum est) ei rem hanc uitio uertat Galenus, atq; sine ulla ratione sint in hoc Dioscoridis uolumen importata. Cuius rei nobis postea præbuit testimonium, quod in quibusdam antiquis bibliothecis legitima Dioscoridis uolumina reperta sint Græcè pluribus centenis annis scripta, in quibus nullum prorsus ex his spurij nominibus legebatur. Quorum uetustam auctoritatem simul cum doctissimo Ruellio secutus, in meis uersionibus Italica lingua conscriptis omnia illa nomina adulterina ab opere abdicari, quemadmodum facturus sum in hoc Latino Dioscoride: etsi Hermolaus, & Marcellus uulgatis exemplaribus decepti, nomina illa suis interpretationibus reliquerint, tantumquam Dioscoridi legitima. Sed quoniam non minus utile, quàm necessarium duximus, ut omnes ij, quibus in animo est plantarum peritiam assequi, sciant ad unguem, quo arbores à fruticibus dissideant, frutices ipsi à suffruticibus, & suffrutices ab herbis, dixerim ego Theophrasti auctoritate, omnes illas stirpes arbores appellari debere, quæ ab radice statim simplici caudice surculo, dissolutiq; contumaci assurgunt, à quo per interualla tanquam brachia, exortantur, mi latius diffunduntur, uti olea, ficus, malus, pyrus, quercus, ilex, & id genus alie. Frutices uero, quæ ab radice caudice multiplici, ramosq; sese attollunt, in quorum classe sunt rubus, rosa, paliurus. Suffrutices, qui inter herbarum genera annuerantur ab radice caulem emittunt, lignosis adnascantibus ramulis, folijsq; minutis, quæ non uelut aliarum herbarum folia quotannis arefcunt, & decidunt, sed perpetuis folijs toto anno uirescunt, ut stæchas, ladanum, ruta, hyssopus, salvia, & eiusdem generis alia. Herbarum denique generi subscribunt reliquæ plantæ, quæ inter initia folia tantum sine caule pandunt, ac deinde in caulem erectæ, flores, & semina ferunt, ut cerealium omnia genera, olera, quæ in hortis ad cibos feruntur, & syluestrium fere innumera, quæ sponte sua in pratis, campis, ac alijs compluribus locis proueniunt: tametsi ex eis nonnullæ habeantur, quæ neq; caule, neq; flores, neq; semina gignunt, ut pyllitis, asplenitis, cynoglossum, hemionitis, onosma. His ita determinatis, sciendum præterea est, herbas assiduo quodam cultu, ac diligentia nonnunquam arborescere, quod maxime malus accidit. Hanc enim pluries uidi senis, septenis uel mensibus cultu tantam caudicis longitudinem, crassitudinem, & duritiem proficere, ut hasta instar grandesceret. Frutices quoque aut tenuioris diuturnitate, aut cultorum magonio in arbores non pumilas exeunt, ut uitex, hedera, myrica, paliurus. Contra ita recedant, ut in frutices degenerent. Quandoquidem hi tum per adultam ætatem, tum per cultus rationem, uendicant sibi robore, crassos prædurosq; fundunt caudices, ac ramos. Illæ uero, tanquam indomitæ surculis, stolonibus ac germinibus.



minibus, qui circa caudicem & radices adnascuntur, luxuriantes, solidos ita ramos debilitant, & infirmant, subrepto illis humore, ut in frutices sensim elanguescant, ut myrto, lentisco, & corylo quandoq; enuisse cõperimus. Tantum enim in plantis naturæ germanitas potest, ut non solum sæpe prædictos præstet effectus; sed etiam ut alteram in alteram stirpem facile uertat, ut castia in cinnamomum, si symbrium in mentham, triticum in lolium, hordeum in auenā, et ocimum in serpyllum. Porro ex his omnibus herbarum generibus quædam sativæ sunt, quædam agrestes. Has uolunt nonnulli priores fuisse sativis, cum earum permultas domita cultu feritate mansuescere in hortis liquidò constet: etsi in permultis quoq; & sylvestre, & sativum genus inveniatur. quarum aliæ fecundæ sunt, aliæ steriles: aliæ florent, aliæ floribus orbantur: aliæ perpetua fronde uirent, aliæ folia amittunt. Quod non aliunde pronuncare scribit Theophrastus, quàm à loco ipso, ubi nascuntur, sicuti ab aere eas ambiente: tametsi id accadat interdum particulari radicis uicio. Magni quippe refert, ut fecundæ, floridæ, & perpetuò uirentes plantæ conferuentur, si clemens cœli constitutio, situsq; germanitas adsit. Quare nil mirum, si circa Memphim, & in Elephantio agro ficibus, ac etiam uitibus folia nunquam decidant, quòdq; in insulis, alijsq; regionibus nuper in Iudijs occidentalibus à Lusitanis, & Hispanis relictis, nulla spectetur arbor, quæ sempiterna coma non uireat. Neq; item admirandum, quòd reperiantur arbores proceriores, uirentiores, aspectu pulchriores, & magis frondibus, & fructibus exornate in hoc loco, quàm in illo: namq; aliæ hoc situ lætantur, aliæ illo pro suæ quæq; naturæ ratione. Proinde uidemus, quòd quæ montes amant, ut cedrus, latrix, abies, pinus, picea, terebinthus, buxus, iuniperus, fagus, carpinus, ibi proceræ admodum, formaq; insigni profiliunt. Quæ admodum in planitierum & collium nemoribus quercus, cernus, suber, ilex, lotus, ulmus, acer, fraxinus, corylus maxime proficiunt. Iuxta flumina, & in aquosis lætiores proueniunt platanus, alnus, populus utraq; myrica, salix, harundo: etsi harum permultæ non æquè lætæ in montibus, uallibus, planis, & sylvis exultent. Id quoq; discriminis in herbis, & fruticibus uisitur. quædam enim paludibus enascuntur: aliæ in lacubus. & stagnantibus aquis exiliunt: aliæ litora, & fluuiorum ripas desiderant: quædam humidos, aquosos, uliginososq; amant tractus: quædam aquas odere, & ob id arida, & saxosa sequuntur. Nec etiam desunt quæ in humidis & siccis locis uitam aucipitè agant. Sunt deinde quæ in campestribus degere cupiāt, quæ uinetis lætentur, quæ pratis gaudeant: præterea quæ ualles, quæ colles, quæ deniq; editos querant situs. Aliæ quoq; urbanioribus locis allecæ iuxta urbium, & oppidorum moenia in macerijs, & rudibus prodeunt. In palustribus, & humentibus locis, ac secus magnarum scrobium aggeres feliciter enascuntur plantago, coronopus, poterium, scordium, ramunculum, leoselinum, sphondylium, lysimachia, aliflua, chelidonium minus, epimedium, pentaphyllum, erinus, equisetum, limonium, heliotropium paruum, uerbenaca, tusilago, hydrophyllum, onobrychis, conyza tertij generis. Et magis palustribus gaudent cyperus, typha, sparganium, iuncus. At tam lacinosi, quàm admodum palustribus innatant nymphaea, potamogetum, lotus Aegyptia, colocasia, folijs & in aquis conditis, & extra eminentibus. Malabathrum similiter in Indiæ paludibus nascitur, atq; nobis in Italia oryza, hippolapathou, ac millefolium stratiotes. Tribulus æquè in lacubus, paludibus, fluuminibus nascitur, atq; in mari: quorum litoribus, ac ripis familiare spectatur nerium. Adiantum, itemq; trichomanes uliginosis specubus gaudent, præsertim si secundum annes existant: aut asperginosas sequuntur ripas, quæ præruptis locis inherant. Vitex deinde, elichryson, bubonium, botrys, rha fluminum ripas accolunt. Crithamum uerò, brassica marina, chamaeleo niger, androsaces, corniculatum papauer, dorycnium, solanum somniferum, glaux, hippophaes, hypophasiolum, tragium, tithymalus paralius, peplis, alypon, absinthium seriphium in maritimis tum litoribus, tum scopulis, tum etiam collibus emergunt. Tripolium etiam in maritimis exurgit, ubi scilicet allidit uida, iterumq; recedit, modò in mari, modò in sicco degens. Non nisi aquis proueniunt bryon thalassion, corallium, & alga. At in riguis fontium, præsertim quæ hyeme tepefunt, sion, atq; aquaticum siymbrium uia innatant, ut quasi inuicem frateruam uideantur inisse amicitiam. Ceterum ex his, quæ in continenti nascuntur, arida, & siticulosa loca petunt eryngium, satureia, lythospermon, lycium, salvia, stachys, onosma, lonchitis, cynoglossum, ecbium, buglossum, chamaepitys, neratrum nigrum. Aridissimis, & saxosis exurgunt caparis, libanotis, synphytum petraeum, saxifragum, helxine, benionitis, fedi utrumq; genus, cotyledon, cymbalion, polytrichon, paronychia, asplenium, clinopodium, circæa, licben, ita ut barum plerq; sepius in ædificiorum ruinis, ac saxosis admodum locis uircescant. In opacis autem sinuul & aridis nascuntur helebium, chrysocome, asarum, uiola purpurea, astragalus, & cyclaminus. In humidis elematis prima, quæ & secus aggeres inuenitur, item phyllitis. Collum amœnitatem capiuntur spartium, nepeta, sylvestre cuminum, chamedrys, etsi non oderit etiam aspera, & saxosa: item phalangium, thymum, quod etiam petroso solo nasci uidemus: quin & holostium. Culta deinde uirent lagopode, elatine, ornithogalo, coriandro, hyacintho, hypecoo, apio alio ab hortenst, chamaecisso, egilope, osyride, aphaca, orobanche, melanthio, bupthalamo, anthemide, sylvestri papauere, xypbio, leontopetalo, phenice, hyperico, cyano. Inculta uerò uirent psyllio, hieracio. Pratis lætantur trifolium, lotus sylvestris, anonis, daucus, carum, tragopogon, oxylapathum, centaurium minus, hemerocallis, colchicum, betonica: quanquam hac & colles, & montes abunde scatant. In uinetis aluntur telephium, portulaca sylvestris, peplus, helxine, bederacea, ampeeloprasum, capnos. Tam intra, quàm extra oppida, & urbes in plateis, monumentis, parietinis, rudicibus, propter muros, & hortorum sepimenta uisuntur uerbascum, blattaria, tblaspi, iberis, malua, chelidonium maius, urtica, ebulus, sambucus, erysimum, aristolochia longa, uarrubium, chrysanthemum, galiopsis, senecio, terrestres tribulus, sideritis, eupatorium, hyoscyamus, cicuta, persohnata, xanthium, sylvestris cucumis. Campestria cardui omni genere borreut, atrachyli, ferulis, sylvestri feniculo, gramine, thalictro, bunio. Agrorum, & pratorum sepibus hærent ruscum, asparagus, rubus, rhamnus ligustrum, rubia. Ephemero autem, hippoglossio, filice, planitierum syluæ uirescunt. Montes adamant nardum tam Indicum, & Syriacum, quàm Celticum, & montanum, centaurium maius, mandragoras, hastula regia, satyrium, gentiana, ligusticum, alysson, symyrium, ueratrum album, ruta sylvestris, polemonia, polygonatum, tithymalus characias, polium ptarmica, thymelæa, chamaelea, glycyrrhiza, asclepias, narcissus, thapsia, pæonia, æthiops, clymenium, onagra, caca-

Stirpium mutatio.

Platæ melior reserunt celi clementia, & loci amicitia

Plantarum situt naturales ubi lætæ nascuntur.



lia, aconitum, daphnoides, hyssopum agreste, peucedanum, chanaedaphne. In sylvis montanis enicat leueo canthā, atq; inibi in prærupis locis petroselinum, & Rhodia radix. Sunt præterea, quæ arboribus innasci uelint, in quibus resident, atq; ab iisdem suscipiunt alimentum, ut agaricum, uiscum, sphagnos, polypodium, dryopteris, lichen. Aliæ qui dem in arboribus conspiciuntur, aliæ uerò prius è terra exortæ, per arbores repunt, quemadmodum labrusca, uitis nigra, bryonia, hedera, clematis altera, sinylax tam leuis, quàm aspera, lupus salictarius, conuolulus, periclymenum. Non desunt etiam herbæ, quæ sine radicibus in alijs herbis profoliant, neq; alibi, quàm in illis reperiantur, ut casusutha, epithymum, epithymbrum, & epistæbe. Veruntamen illud scire conuenit, quòd etsi harum omnium quæque sua natura felicius proueniant in prædictis locis, suosq; unaquæq; sequatur situs; nihil tamen obstat, quin eadem modò in montibus, modò in planis, nunc in collibus, sepe in uallibus, nonnunquam in agris, & pratis, ac etiam in alijs uarijs locis nullo discrimine inueniri possint. Et hæc satis sint quantū ad natalem plantarum situm. Cæterum ut, quantum per me fieri potest, harum rerum non minus utilis, quàm uecessaria doctrina excitetur, augeaturq; iam ad singulas herbarum partes noster se conuertet sermo, & de radicibus, folijs, caulibus, floribus, ac seminibus differemus, primò à radicibus, ueluti à basi aliarum partium, rem ipsam exordientes. Frumentacea igitur omnia multis nituntur radicibus, ijsq; tenuibus. Legumina uero singulas habent radices præter fabam, easq; surculosas, & duras. Sic & olera ferè omnia singulari radice coherent, ut lactuca, apium, beta, buglossum, intubus, cichorium. Quinetiam radice singulari sustinentur syluestris ruta, quam barmalam uocant, peplos, crateogonum, ephemerum, & sæpius uerbeuta. Contra numerosis radicibus donantur asarum, phu, baccaris, ueratri genus utrunq; cappar, crithamum, hastula regia, chelidonium minus, asclepias, circæa, alcea, æthiopis, granæ filix foemina, muris auricula altera, plātago, chrysocome, asparagus, ruscus, hippoglossum, panaces Heracleum, hemionitis, pæonia foemina, alifina. At nardi Indici, & Celtici radix in spicæ modum capillatur. Prægrandi, firmaq; radice exurgunt belenium, bryonia, mandragoras, scanmonium, syluestris cucumis, uitis nigra, rapum, nimpheæ, colocasta, radix Rhodia, & China nuper ex Indijs occidentilibus importata, dracunculus, aloë, centaurium maius, libanotis, sphondylium, cœnanthe, symphitum secundum, papauer corniculatum, raphanus, carduus, periclinenum, solanum somniferum, similax aspera, thapsia, hippophaes, hippophæstum, tithymalus characias, pityusa. Contrà exiguam, tenuemq; radicem gignunt hydropiper, catanances chis, hœstium, britanica, epimedium, onagra, tragium secundum, leontopodium, uerbenaca supina, phyteuma, pæcratium, aconiti tertium genus, chamæcissos, asarum, utrunq; ueratrum, plantago minor, coronopus, sesamoides, origanum syluestre, alypon, atractylis, heliotropium maius, onosma, rubia, cepæa, alifina, betonica, chamæsyce, meon, gingidium, centaurium minus. Radices in lignum durescunt æthiopi, similaci asperæ, poterio, laucacanthæ, astragalo, tithymalo characiæ, cypero, rhododendro. At molli, lentaq; radice constant althæa, acanthus, alcea, malua. Geniculatæ ueluti arūdinibus, sunt iridi, acoro, polygonato, rusco, nymphææ, xyridi, hippoglossi, gramini, lauro Alexandrine, colocastæ, galangæ, gingiberi, radici Chinæ nuper inuenta, & Rhodiæ. Radicem digiti crassitudine fundunt orobanche, eryngium, polygonatum, pæonia mas, pyrethrum, daucus, pastinaca syluestris, symphitum petraeum, dorycnium, ebulum, echium, crithamum, elaphoboscum. Pulbusæ autem insunt caparum modo, lilio, hemerocalli, æpis, bulbis, hastule regie, allio, porro, croco, narcisso, xiphio, testiculorum omni generi, satyrio, ornithogalo, utrisque ephemeris, arisaro, hyacinto, dracunculo, ampelopraso, scorodopraso, moly. In globum extuberant radices aristolochiæ rotundæ, cyclamini, apij uomitorij, leontopetali, cœnanthes, pæoniæ foemine, rapi, chrysogoni, periclymeni, cyperi, argemones, catanances secundæ, pycnoconi. Insuper radices inter se disident, tum colore, tum odore, tum sapore: quæ discrimina si rectè cognoscantur ab his, qui breui hanc fecultatem assequi desiderant, non parum inde haurient utilitatis. Sicuti & maxime confert scire, quæ sint radices magnæ uel paruæ, quæ duræ uel molles, quæ numerosæ uel paucæ, quæ caparum uel tuberculorum effigie, quæ denique geniculatæ, de quibus hucusq; abunde differuimus. Sed iam de coloribus agamus. Nigricat foris chysogoni radix, etsi candicet intus: item papaueris cornuti, nardi montani, helenij secundi, cyclamini, chamæleonis, cardui, hastule regie, libanotidis, rbapontici, quanquam huius interna rubescant, peucedanis, leontopetali, epimedi, nymphææ eryngi, symphiti secundi, smirni, echij, ueratri nigri, astragali, anemones, mandragoræ, aconiti tertij generis, thapsiæ, personatæ, filicis maris, uitis nigre, aristolochiæ utriusque, quarum tamen interna buxæ colore pallent, pæoniæ foemine: tametsi huic, sicut etiam thapsiæ, & mandragoræ delibrata exalbeat. Contrà è candida proueniunt radice plantago, polygonatum, dracunculus, arum, arisarum, ranunculum, ueratrum album, anonis, ligusticum, asparagus, ruscus, hippoglossum, elaphoboscum, libanotis, sphondylium, rapum, radix, circæa, alcea, hœstium, tragum, trifolium, narcissus, allium, porrum, gingidium, iberis, hippocelinum, tripolium, iris, panaces Heracleum, tragium, somniferum, solanum, arction, onagra, chamæcissos, scanmonium, althæa, pityusa. At nou propterea alba, sed subalbide radices tributæ sunt aro, polemonie, belenio primo. Rubent rubiæ, centaureo magno, rubiæ pontico, rhabarbato, tametsi tria hæc exterius nomihil nigricent: item pentaphyllo, heptaphyllo, betæ tertij generis, blito, carotæ, anchusæ, licopfi, onosmati, chysogono, quanquam exterius nigricant. Non planè rubra, sed subrubra radice sunt acanthus, phu, satyrium, erythronium, xyris, radix Rhodia, solanum somniferum, alypum, costus. Ex atro rubescunt filici foemine, cypero, pycnocono, ephemero Colchico. Rubro colore purpurascunt radices symphyti petraei, capari, scillæ, pæcratij. Flaua intus radice sunt aristolochia rotunda, glycyrrhiza, lapathum, hippolapathium, cyperus Babylonicus, argemone, chelidonium maius, gentiana. At herbaceo colore insunt polypodio, phalagio, smyrnio, & imperatoria. Odorata radice fragrant iris, acorus, meon, cyperus, galanga, zedoaria, nardum tam Gallicum, quàm Indicum, asarum, phu, caryophyllata, baccharis, ligusticum, pastinaca, angelica, seseli Massiliense, hyppocelinum, smyrnium, libanotis, asclepias, circæa, alifina, tripolium. quin & radix Rhodia odorem expirat non inuicem dum. Dulcedinē gustui præbēt glycyrrhiza, tragopogonis radix, centaurij maioris, chamæleonis albi, elaphobosci, gentianæ.

Plātaram in radicibus uarietas.

Radicum differentiæ in coloribus & saporibus.



ranij, arctij, polipodij. Amaritudinem uero gentianæ, ranunculi, helenij, dictamni candidi, leucacanthæ, panacis Heraclei, bippophæis, pancratij, scillæ, cichorij, asparagi, rusci, centaurij minoris, chelidonij maioris, asphodeli, cyclamini. Acri autem radice deprehenduntur gingiber, acorus, galanga, zedoaria, imperatoria, crocodilium, angelica, panaces Chironium, smyrnium, pyrethrum, alisma, tripolium, raphanus tum satius, tum sylvestris, utraque iberis, nasturtium, thlaspi, argemone, hydropiper, arum, dracunculus, crysimum, ophioscorodon, anapelloraphum, scorodoprasum, cæpa, allium, porrum, scandix. Quo fit, ut, si exacta notitia desiderentiarum habeatur, quæ in radicibus forma, numero, colore, odore, ac sapore notantur, maximum inde percipiant emolumentum, qui magna animi delectatione in hac simplicium medicamentorum facultate operam impenderint. Ac præterea plurimum ipsdem contulerit, si omnes stirpium delineationes, similitudinesq; (de ijs intellige, quæ scriptis tradi possunt) tum earum pariter et odores, et sapes assequantur, eo inquam modo, ac ratione, quo hic à nobis adnotata reperiuntur. In primis igitur à similitudine, quam inter se ineunt plantæ, exorsus, pro uiribus enitar, ut quæ plurimis ignota sunt, ijs, quæ omnibus sanè vulgares apparent, recte comparentur. quapropter ab hædera primum, ut quæ neminem lateat, rem ipsam auspicabor. Hæderam igitur folijs emulantur, etsi quædam maiora, quædam uero minora cernantur, scammonium, asarum, uterq; cyclaminus, smylax aspera, leuis, et bortenensis, iitis nigra, marina brassica, Aethiopicum seseli, periclymenon, aristolochia utraq; asclepias, epimedium, gramen parnassi, apocynum, uiola purpurea, chamæcissos, belxine cognomento cissampelos, cynocrambe, hortense solanum, halicacabum, circea, cucumis tam sylvestris, quam satius, utraq; clematis. Vitigineum folium representant platanus, acer, lupinus, ricinus, bryonia, ueratrum uigrum, balsanina, colocynthis, cucumis, quem Veneti anguriam uocant. Alba spina, et acanthium simili uirent folio: sicuti abrotonum femina, et absinthium seriphium uocatum folijs se inuicem imitantur. Vitex, et anagyris et folijs, et ramis conueniunt. Apij folia referunt calicis, secundum dauci genus, laferpitium, smyrnium, buni: Amygdalæ fronde uestiuntur persicus, rhododendrum ebulus, sambucus staphylodendron, lathyris, quam officinæ cataputiam nominant. Anisum deinde isopyro folijs adtimpulatur, anagallis antyrrhino, atriplex xanthio. Vtriusq; rubiæ folia imitatur aparine, ac galium: quanquam illis maiora, huic uero minora spectentur. Porri, bulbiq; folia præ se ferunt hyacinthus, narcissus, allium, colchicum, cyperus, hastula regia, anapelloraphum, scorodoprasum, canini testiculii, lonchitis. Buxus, et lycium consimili comantur fronde. Vitis alba anomo folijs correspondet, pyrethrum sylvestri dauco, hemionitis dracunculo, coris ericæ. Fœniculi folia emittunt altis asparagus, panaces Asclepium, seseli, daucum Creticum, anthemis, libanotis, buphthalmos, anethum, thapsia. Anethi folijs assurgit meon. Plantagini nō dissimilia sunt folia candidi ueratri, gentianæ, alismatis, et clymeni. Phœnij folium geranium exprimit. Filicem folio emulantur sideritis secundum genus, polypodium, dryopteris. Ferula cicutam foliorum imagine refert, hæc uero myrrhidem. Buglossum, uerbascum, et cirsum consimili modo foliantur. Graminis folium proferunt moly, holostium, gramen arundinaceum, coronopus. Huius uero folia habent catanance, psyllium. Cichorium, chondrylla utrunq; genus, et quod quibusdā dens caninus dicitur, cōsimili sunt folio. Cnico atraylis folio assimilatur, chamæleoni nigro crocodilium, chamæloni albo silybum. Glasto tripolium simile est. Coriandri folijs comantur parthenium, adianthum, sideritis terti, omnia ranunculi genera (quorum tamen quædam propius, quædam longius eius speciem sequuntur) uterq; daucus, thalictum, capnos. Helxines folia produunt anagallis, alsine, muris auricula: cannabis, aut quinquæfolij eupatorium, sed quæ quadripartito diuidantur. Cotonei mali frondem exhibent capparis solanum somniferum. Smyrni folium præstant phu, lauer. Cupressi effigiem promit sabina: iuniperi cedrus. Hypericum, androsæmum, ascyrum, folio non discrepant. Cistus, et ladanus sicuti in specie, ita et in folijs conueniunt. Cyclamini folium pandit aconitum primum: ciceris teucrium, securidaca: cumini sylvestris stratiotes millefolium: cucurbitæ personata: lolij phœnix: iuglandis centaurium maius, peonia mas, gentiana; etsi huic magis cum plantagine conueniat. Iridis folia reddunt acorum, medion, sylvestris iris: item gladiolus, nisi hic breuiora, angustioraq; folia sibi uendicasset. In iunci specie collocandum esset utrunq; equisetum, sed inani caule assurgit. Lenticule folium simulant aphaca, onobrychis, chamæsyce, helenium alterum, anonis, trichomanes, polygala, glaux. Laureæ fronde uirent polygonatum, clematis prima, daphnoides, uerium, chamædaphne. Lili folia spargunt hemerocallis, pancratium, satyrium, martagon (sic enim appellant liliū quoddam agreste) ephemereum, onagra. Lenticulum referunt glycyrrhiza, tragus. Nec lepidium arabis dissimulat. Lactucæ effigie folia ferunt dipsacus, sylvestris lactuca, lycopsis, anchusa, sylvestre glastum, mandragoras femina. Lingæ bubulæ similia sunt symphyti alterius folia. Myrti folia ruscus habet, tithymalus femina, et caniribus. Mentham satiuam folio expriment silybrium, hydropiper, pentaphyllon. Marrubij effigie assurgit apiastrum, hallote, horminum, sideritis prima. Mercurialis folio uirent belxine, elatine, cynocrambe. Nasturtij folijs iberis nō refragatur. Oleam amula foliorum facie representant balimus, ptarmica, phillyrea, ligustrum, uitex, conyza, thelygonum, caninus testiculus, lithospermum, dorycnium, hyppophæes. Platanum folio imitantur ricinus, nigrum ueratrum, sphondylium, aconitum cynoctonum. Verbasci folia sundunt beleuium, aethiopis, arctium, buglossum, et tithymali genus latifolium. Pastinaca, et gingidium folijs inter se non dissident. Portulacæ folio assimilantur telephium, cepæa, critbanum, terrestris tribulus, tithymalus belioscopius. Trifolio correspondent lotus sylvestris, medica, cytisis, fertula Campana. Tbymum, stœchadum, satureiam simile comat folium. Acuta spina, et mespilum primum genus simili uirent folio. Nec dissimili pulegio, dictamnium et calaminta comantur. Myrice sabina, et cupressus: serpylli clinopodium: saluicæ sideritis prima, horminum, uerbascum sylvestre, folijs uestiuntur. Piceæ foliū ferunt polygonum, et pityusa: quercus uero chamædryas, teucrium, scordium, betonica, sideritis prima. Neq; à rutæ folijs dissident acacia, centaurium minus, serpyllum sylvestre, ambrosia, polygonum primum, androsænum, polemonia, speplus, paronychia, hypericum, apios. Aloæ, et scillæ similia tributa sunt folia. Sampsuchi folium ostendunt marum, et panaces chironium. Solani folio germinant circea, halicacabus. Rumicis folia emulantur arum, phyllitis, brianica,

Foliorum in plantis comparatio, & similitudo inter se.



Foliorum in  
coloribus de  
scrimen.

tanica, et quæ uulgò bistorta dicitur. Foliorum similitudine inter se certant ruscus, hippoglossum, laurus Alexandri-  
na. Asplenii imaginem præbent muris auricula altera, et altera lonchitis: sicuti semperuini minoris tertia aiugæ spes-  
cies, aristolochia clematidis. Salicis fronde prouenit lysimachia, fertula Campanæ ligustici. Silybus, chamæleo albus,  
carduus, alba spina, sese folijs imitantur. Ex his igitur faciliè quisq; herbarum germanitatem, cognationem, similitudi-  
nemq; perdiscere poterit. quæ omnia in dignoscendis stirpibus non paruam adferunt utilitatem. Cæterum plantarum  
omnium folia non modicam in coloribus differentiam habent, tametsi folia ipsa coloribus adeò perspicuis, uti flo-  
res haud quauquam splendeant. Niger sanè color in nullis reperitur herbis, neque arboribus. quanuis nonnulla atro  
quodam uirore sint suffusa, ita ut paululum nigricent, sicut phillyrea, buxus, ligustrum, hortense solanum, nigra ui-  
ola, osyris, hyoscyamus, utraque clematis. Contrà nec folia habentur, quæ niueum candorem expriment. uerum ple-  
raque, quæ incana sunt, subalbicant, ut crithamo, echio, ranunculo, abrotono, absinthio, saluia, calaminthæ, maro,  
periclymeno, corniculato papaueri, stachy, menthastro, althææ, polio, uerbasco, utriq; lychnidi, et mandragore  
mari; quæ omnibus superne candicant, quemadmodum infernè rosmarino coronario, bechio, olea, populo, artemi-  
sia, et alijs multis. Rubent punice malo amygdalo, lentisco, terebintho, rhoi, cyclamino, botrys, cori, androsamo,  
ascyro, lonchiti, osyri, blito, amaranto, phyco marino, sesamæ, irioni, atriplici, alypo, Celtico nardo, et euidam  
betæ generi. Folia, quæ lanugine pubent, insunt dictamnio, uerbasco, lychnidi, gnaphalio, acanthio, althææ, men-  
thastro. Aspera sunt symphyto alteri, marrubio, fico, saluia, ballotæ, et hormino. Aculeis horrent folia buglosi,  
echij, urticæ, eryngij, rusci, lycij, atractylis, sonchi, chamæleonis utriusque, dipsaci: quinetiam cardui omne genus.  
Humi iacent panacis folia, coronopi, anchusæ, mandragoræ, utriusque anagallidis, cynoglossi, glauci, catanacæ  
secundi generis. Reptant etiam humi lithospermi, graminis, onosmatidis, canis testiculi, albiq; chamæleonis. In uni-  
uersum plantæ omnes, quæ caule et floribus oriantur, folia per terram spargunt. Acuta folia, ut quæ olfactu na-  
res feriant, data sunt allio, capis, nasturtio utrique tam aquatico, quam terrestri, sinapi, erucæ, lepidio, gingidio,  
hydropiperi, erysimo, clematidi secundæ, thlaspi, serpyllo, thymo, thymbræ, sisymbrio, pulegio, calaminthæ, dic-  
tamno, dracunculo, arò, flammulæ, origano. quæ omnia non modò olfactu, sed magis etiani gustu acrimoniam præ-  
bent. At amaritudinem possident chondrylla, cichorium, gentiana, ruta, absinthium, aphaca, abrotonum, scandix,  
aloe, santonicum, seriphium, chamædryis, marrubium, scordium, glaucium, chamælea, empetrum, et quæ uulgò  
gratia Dei deiectionis facultatis herba dicitur. Odorata folia sunt asaro, sio, sisymbrio, menthæ, menthastro, cal-  
aminthæ, pulegio, saluia, ladano, hyssopo, sampsocho, origano, thymo, serpyllo, satureia, symphyto petraeo,  
rosmarino, ligustico, stachy, malabathro. Nec insuauem efflant odorem chamædryis, baccaris, artemisia minor,  
et herba illa, quam aliqui selæreæ, nonnulli herbam sancti Iohannis, et plerique matrisaluiam nuncupant. Nec dea  
sunt stirpium folia, quæ ab alijs tum plantis, tum liquoribus odorem emendicasse uidentur, ut scordium ab allio, trifolium  
à ruta, et bitumine, cytisus ab eruca, apiastrum à citreo malo, chamæfytis à pino, xanthium à nasturtio: ita  
denique hydropiper à pipere mutuatur odorem. Grauius olent absinthium, abrotonum, seriphium, ballotæ, po-  
lium, ebulus, botrys, aristolochia, cannabis, anagiris, galiopsis, cicuta, mandragoras, apocynum, glaucium.

Caulium in  
plantis diffe-  
rentiæ.

Non parum quoque discriminis in plantarum tum caulibus, tum stolonibus reperitur. quandoquidem ex eis quæ  
dam singularem, simplicemq; caulem proferunt: aliæ numerosos cauliculos edunt, quibusdam crassi caules insunt:  
alii tenues asurgunt: alij inanes, et uacui eriguntur, fistularum, et arundinum instar: alij pleni conspiciuntur:  
quibusdam item longus profilit caulis, quibusdam uerò breuior: nonnulli caules geniculis scatent, alij enodes exeunt,  
alii leuore, alij scabritia, alij duritia, alij lentore notantur. Nec desunt, qui lanugine uestiuntur, et qui spinis, et  
aculeis rigeant. Quibusdam plantis teretes sunt, nonnullis quadranguli, et aliquibus striati. Alij denique sursum  
eriguntur, alij per terram serpunt, ac repunt. Dissident præterea inter se stirpium caules colore, rectitudine, et  
curuitate: tanta fuit naturæ in plantis formandis uarietas, atque solertia. Plures igitur caules ab una tantum ra-  
dice exiliunt glasto syluestri, ptarmicæ, plantagini, muris auriculæ, telephio, aristolochiæ utrique, rutæ syluestri,  
hyperico, elatina, phœnici, trago, solano sonuifero, et manico, minori sedo, chamæcisso, glauci, osyri, tithymæ-  
lo parolio, et helioscopio, thymelææ, heliotropio magno. Ramoso, ac pariter surculo caule fruticant saluia,  
satureia, thymum maius, origanum, hyssopum, absinthium, abrotonum, ruta, stæchas, ocimum, anaracum, sym-  
phytum petreum: et ut summam rem complectar, omnes deniq; plantæ, quæ suffrutices appellantur. Crassum caulem  
mittunt dracunculus, chamæleo niger, ænanthe, helenium, symphytum alterum, hyoscyamus, personata, sedum ma-  
ius. Contrà proditur tenuis ornithogalo, thlaspi, polemoniæ, ranunculo, limonio, anemone, ligustico, panaci Asclepio,  
peucedano, artemisiæ, phyllo, cynocrambæ, buphtalmo, alismati, betonicæ, echio, eupatorio, plantagini, chelidonio ma-  
iori, muri auriculæ, aristolochiæ utriq; seripho, tragorigano, menthæ, sisymbrio, lysimachia, rutæ syluestri, delphini-  
nio, melanthio, agresti cumino, aparina, chamædry, scordio, teucro, trifolio hyperico, sideriti secundæ, elatina, peti-  
taphyllo, ueneris umbilico, chamædaphnæ, tithymalo helioscopio, thymelææ alypo. Inanes in uniuersum, ac fistulosos  
caules habent frumenta, legumina, et olera. Particulatim uerò cauis emicant colliculis phu, apium montanum, son-  
chus, ueratrum album, gentiana, equisetum narcissus, ricinus, cicuta, lathyrus, hieracium maius, symphitum secundum,  
spina alba, cape, porrum, hipposelinum, thapsia, ferula omne genus, omnesq; plantæ ferulacæ, qualis cicuta, panac-  
es, laserpitium, seseli Peloponnese, et quæ guttatim stillant sagapenum, galbanum, et ammoniacum. Geniculatum  
culmum gerunt cerealium omnia: quin et ebulus, sambucus, phu, cyclaminus secundus, gentiana, panaces Asclepium,  
polycnemum, crategomum, polygonum, equisetum, ferula, cicuta, meon, odoratus iuncus, pityusa, arundinum omne  
genus, hydropiper, ligusticum, xybium, et omnes deniq; plantæ, quæ foeniculaceo caule assurgunt, ut elaphoboscum,  
anethum, seseli Masiliense, pyrethrum, spondylium, peucedanum: Leui constant caule dracunculus, bastula regia,  
typha, nymphæa, sideritis tertium genus, chrysanthemum, aconitum lycostonum, gentiana, acanthus, aloë, iberis, hyssopus,  
cynthus.



cinthus, millefolium, chamædaphne. Dodranti caule exeunt chamæleo niger, tripolium, hyacinthus, arum, sesamoides, daucum Creticum, caucalis, caninus testiculus, epimedium, hypericum, sideritis tertium genus, centaurium minus, anonis, sylvestre cuminum, tusilago, cenanthe, anthyllis, anthenis, coris, ocimoides, achillea, elatine, pentaphylli, tragus, ageratum, papauer spumeum, psyllium, aconitum primum, colchicum, semperuium minus, umbilicus ueneris, stratiotes millefolium, chamæcissos, glaux, polygala, laurus Alexandrina, tithimalus myrsinites, paralius, helioscopius, & cyparissias: item chamælea, & uerbenaca. Dum uero palmorum longitudine caules extollunt phalaris, thlaspi, melanthium, pæonia, ueratrum album, cyuocrambe. Caulis cubiti altitudine adolefcit petasite, plantagini minori, ranunculo, phu, rosmarino, chelidonio maiori, bacchari, panaci Aselepio, sphondylis, satyrio, alfine, betonica, faba Aegyptia, cirtamo, arabidis, asphodelo, lepidio, xyridi, eupatorio, sylvestri papaueri, aconito tertio, semperuium maiori, senecioni, uerbasco fœmine, cytiso, xanthio, rusco, daphnoidi, chamædaphnæ, lathyri, primo filicis generi, cnico, gladiolo, ascyro, lysimachia. Interdum cubiti longitudinem caule excedunt alifina, cyperus, tithymalus characius, pietyusa. At horminum semicubitali caule contentum est. Buium cubitorum longitudinem caule æquant dracunculus, gentiana, spina alba, acanthus, conyza maior, althæa, symphytum secundum, helenium, glastum, glycyrrhiza, centaurium minus, dipfacium, carduus, scfeli Aethiopicum, lycopsis, sideritis secunda, manicum solanum, sylvestris lotus, cirsum. Quaternum cubitorum caulis exit moly: tricubitalis uero Medio. Duris lignosisq; nituntur cauliculis hyperici, chamædrys, teucrium, symphytum petreum, androsenum, ascyrum, satureia, thymum, origanum, millefolium, eupatorium, aster Atticus, hyssopus, stæchas. Lentore & mollitia caules languescunt irioni, poterio, malua, simlacibus omnibus, cucurbitis, peponibus, & melopeponibus, cucumeribus, lupino, periclymeno, bryonia, uiti nigra, uicia, helxina, quam cassampelon cognominant, scammonio, iunco, typha, althæa, alcea, solano somnifero, osyris, rusco, daphnoidi. Spinis horridum gerunt caulem dipfacium, poterium, agriacanthæ, scolymos, paliurus, rubus, canirubus, hieracium minus, stæbe, rosa. Spinosa prorsus lanugine obducuntur urtica caules, echii, anchusæ, lycopsis, buglosi. Hirsutus caulis uisitur menthastrum, orobanche, belenio, ocimoidi, eupatorio, herbæ quam pilosellam uocant, secundo symphyti generi. Lanugineum caulem nutriunt acanthium, gnaphalium, uerbascum, lychnis utraq; tusilago, althæa, anemone, pænaces Heraclium. Scabritia & asperitate caulium sunt pastinaca, rubia utraq; lupus salictarius, aparine, baccharis, sylvestris enicis, æthiopsis, equisetum, ueratrum nigrum, papauer sylvestre, & corniculatum. Humi cauliculis repunt polygonum, lithospermum, anagallis, clematis prima, holostium, tribulus terrestris, peplos. Caules edunt quadrægulos sideritis prima, apiastrum, marubium, ballote, cyperus, centaurium minus, mentha, calamintha, baccharis, horminum, aparine, rubia, chamædrys, stachys, scordium, teucrium, betonica, symphytum secundum, clymenum, uerbenaca, urtica, galiopsis, æthiopsis, lotus Aegyptia, bunium, xanthium, ebulus, pycnocomum. Triangulares insunt cirso, & quandoq; etiam cypero. Cæteri caules albicant moly, utriq; iberidi, nasturtio, cnico, cacalia, cynocrambe. Rubescunt minori hieracio, soncho, artemisia, hyperico, ascyro, phu, uirga aurea, helxina, senecioni, myriophyllo, orobanche. Caule destituuntur chamæleo albus, phyllitis, filix, cynoglossum, dryopteris, polypodium, onosma, trichomanes, asplenium, hemionitis, lichen, paronychia, adiantum, hyppophæstum, chamaelyce. Ad hæc non parum quoq; in stirpibus dignoscendis utilitatis præstat florum tum coloris, tum firmæ cognitio. quippe cum nulla sit earum pars, quæ prius nostris sese offerat oculis uere, & æstate, quam flores, uaria colorum pictura, quæ in eis resulget. Quapropter non absuerit, horum differentiâs edocere, quæ in coloribus ita se habent. Plantæ igitur, quæ flore candido decorantur, sunt ut oxyacantha, ligustrum, orneoglossum, fraxinus, rosæ, quibus tum ruber, tum etiam purpureus erumpit. Item olea, myrtus, cerasus, malus, pyrus, mespilus, prunus, arbutus, iberis, raphanus, siser, cucurbita, caucalis, eruca, ocimum, oronithogalum, cyclamini secunda species, hastula regia, capparis, poterium, thymus, moly, aparine, phalangium, trifolium, sed cui flos quandoq; rubescat, polium, cenanthe, alba uiola, nymphæa prima, althæa, polygonatum, clematis altera, ocimastrum, erinus, achillea, helxine cassampelos dicta, conuoluius, dorycnium, ephemeron secundum, stratiotes millefolium, lotus Aegyptia, chamæfice sesamoides magnum, narcissus, scammonia, thymælea, sambucus, ebulus, angelica, filipendula, uiburnum, flammula, fragaria, imperatoria, liliu conuallium dictum, et uincetoxicum. Rubri flores emicant rosis, in quibus tamen uariant, nam alij candidi, alij purpurei, alij lutei reperiuntur: item malis puniceis, faba Aegyptia, runci, oxylapatho, oxalidi, blito, aphaca, ophioscorodo, anemone primo generi, argemone, anagallidi masculæ, papaueri sylvestri, solano somnifero, onagra, & caryophyllis uocatis, quem florem recentiores quidam, nescio qua auctoritate ducti, uetonicum appellant. quanquam & hi purpurei emergant, & quandoque uaria colorum mixtura inficiantur. Flores menthe, sisymbrij, & hydropiperis colore subrubro apparent. In purpura albicantes insunt phu, rosas, persico, amygdalo, eruo, bacchari, trifolio, alcea, periclymeno, rhododendro, pæonia. Purpurei exeunt asaro, croco, uitici, uicia, cyclamini primo, latici, centaurio minori, albæ spinæ, origano, pulegio, saluæ, calaminthæ, thymo satureiæ simili, thymbræ, serpyllo, sed qui in album quandoq; uariant, pseudomelanthio, chamædry, liehnidi, scordio, uiolæ purpureæ, canis testiculo, onobrychi, betonica, symphyto utriq;: et si secundum modum candido, modo luteo flore latetur. Item medio, gladiolo, anchusæ, lycopsi, echio, sideriti tertiæ, uerbenacæ, astragalo, hyacintho, cirso, scapno, bubonio, sed cuius interna flauescant, antirrhino, acanthio, glauci, ueratro nigro: tametsi quandoq; huic puniceæ, herbaceæ, candidi, & in purpuram albicantes flores reperiuntur. Item sesamoidi maiori, ricino, amaranto, galeæ, personatæ, xanthio, hormino, martago (sic uocant recentiores liliu quoddam) scrofulariæ maiori, geranio. At in purpura nigricantes insunt uiolis, leontopodio, delphinio, napello, pulsatilla. Aureis floribus coronantur helenium, cornus, rapum, napus, lampsa, harsica, crithamum, sonchus, aphaca cichorij genus, tragopogon, cucumis tærraticus, quam satius pepo lactuca, irio, ranunculus, anemone secunda, aconitum lycoctonon, chelidonium utrunque, sertula Campana, ruta, hieracium, atractylis, tusilago, conyza, hemerocallis, uiola aurea, nymphæa secunda, anagyris, alifina, hypericum, ascyrum, androsenum, chamæpitys, spartium, lysimachia, eupatorium, pentaphyllum, cerys.

Florū in, plā  
tis varietas.



socome, chrysogonon, chrysanthemum, ageratum, papauer corniculatum, hyoscyamus, galium, senecio, uerbascum, lotus urbana, et sylvestris, buniū, osyris, colocynthis, enicū, uirga aurea, balsamina, blattaria, caltha, colutea, tanaetum, et quā falsō oxyacantha recentiores nuncupant, abrotonum foemina, pilosella, potentilla, sena, sinapi. Anthemidi flores exoriuntur in medio lutei, circinato orbe candidi, sicuti et parthenio, buphtbalmo, bellidi, et cotule satida. Cæruleum florem edunt linum, intubus, cichoriū, chondrilla, anagallis foemina, muris auricula, clematis prima, buglossum, melanthium, eryngium, jacobiosa, et quæ à uulgaribus morsus diaboli appellatur: item cyanus, et quæ trinitas recentioribus dicitur. Hyacinthino colore placent flores centaurij maioris, chamæleonis nigri, cinare: et uaria cardui genera. Vario colore inficiuntur iridi, tripolio, malua, euphragie. Spicati insident blito, plantagini, hyssopo, menthe, menthastro, sisymbrio, hydropiperi, saluie, sampsucho, stachy, betonica, amarato, uirga aurea, stachadi, ladano, lauendula utriq; . Floris effigie lilium emulantur hemerocallis, martagon, ornithogalum, nymphaea alba, helxine cognomento cissampelos, lotus Aegyptia, narcissus, crocus, conuoluulus, ephemerum primum. Flores, qui rose referant similitudinem, profiliunt malo cydonia, mespilo, althea, rhododædro, pæonia, ueratro nigro, colocasia, corniculato papaueri. Echinatis capitulis flores conduunt uterq; chamæleo, centaurium maius, crocodilium, spina alba, dipsacus, spina Arabica, poterium, acanthium, cinara, leucacantha, atractylis, enicū, et reliqua carduorum genera. Muscosos gestant flores laurus, labrusca, myrica, erica, ligustrum, olea, quercus, castanea, cornus, galium. Flores in umbellas radiantes, uel muscarijs emicantes insunt Meo, sisaro, crithamo, caucalidi, origano, panaci, ligustico, pastinaca, seseli omni, sisoni, aniso, caro, anetho, cumino, ammi, coriandro, apio, smyrnio, elaphobosco, fœniculo, dauco, pyrethro, libanotidi, sphondylidio, ferularum omni generi, peucedano, laserpitio, sagapeno, galbano, panaci, ammoniac, achillea, chrysocoma, agerato, cicuta, stratiote, millefolio, myrrhidi, thapsia, sambuco, ebulo, angelica, filipendula, uiburno, imperatoria, etiq; pinipinella generi, quæ nonnullis hircinum saxifragum uocatur, quod hircum maxime oleat. Cytini imaginem repræsentant flores asari, hyoscyami, cisti, arbuti. Corymbis similes racematim coherent botry, ambrosia, anagryi, urtica, lunaria minori, hippophai. Lanugine quadam obducuntur, atque in pappos euascent flores omnium carduorum, sonchi, tragopogoni, centaurij maioris, utriusq; chamæleonis, utriusq; hieracii, senecionis, cirsij. Stellarum, solisq; flore imaginem refruunt eryngium, aster Atticus, anthemis, parthenium, buphtbalmus, bellis, hypericum, pentaphyllum, intubus utraq; cyanus. Preterea exquisitam prorsus plantarum cognitionem quis assequi poterit, si seminis, fructusq; , quos plantæ ferunt, delineationes habeat. quare non inutile fuerit earum tum figuras, tum discrimina, tum etiam similitudines prosequi. Fructus itaque racemosos proferunt terebinthus, lentiscus, populus utraq; oxyacantha, uitis nigra, uitis alba, cyclaminus secunda. Corymbaceos uero hedera, periclymenus, solanum hortense, et manicum, smilax aspera, polycnemum, hippophaes. Semina autem racematim coherent artemisia, ambrosia, botry, urtica nostrati, mercuriali foemina, hydropiperi, ricino. Acinosa sunt asaro, taxo, uesticaria, asparago, rusco, lauro Alexandrina. Semen folliculari specie inest fraxino, rhamno, sed quod uerticilli referat imaginem, nasturtio, thlaspi, androsacea. At in squamosis folliculis occluditur gentiana, cumino sylvestri, atriplicis, sphondylidio, œnanthe, ferule, et thapsia. Pincam nucem imitantur, et ueluti nucemeta sunt fructus piceæ, laricis, et cupressi. Baccas gerunt olea, laurus, zizyphus, cornus, rosa, capparis. Oblongæ, et quæ magnitudine cedant olis, uisuntur myrto, thymelæa, polygonato. Rotundæ sunt ligustro, iunipero, hedera periclymeno, lycio, cedro, oxyacantha, sabine. Ceterum fructum semenq; siliquis includunt acacia, anagyris, genista, siliqua arbor, castia nigra, doryenium, apocynum, staphis agria, delphinium, cicer, faba, lens, phasolus, lupinus, pisum, eruum, sena, smilax hortensis, medica, aphaca, uicia, pæonia, leontopetalon, xyris, solanum somniferum, et tertium aconiti genus. In folliculis uero additur halicacabo, colutea, colchico, et staphylodædro: suumq; in corniculis modò aduncis, modò rectis ferunt delphinium, fœnum græcum, lotus sylvestris, rapa, napus, rapbanus, lamsana, brassica, eruca, sinapi, erysimum, circea, leucocium, hedyсарum, papauer corniculatum. Capitibus semina conduunt colocasia, anemone, argemone, melanthium, ocimoides, papauer tam satium, quàm erraticum, hyoscyamus, lotus Aegyptia, xyris. At capitulis paruis conscipiuntur lino, ptarnice, cumino sylvestri, sparganio, psyllio, uerbasco, serofularia, isopyro, ricino, tithymalo parualio, et helioscopio. Semina in flocci modum conclusa afferunt porrum, ampeloprasum, scorodoprasum, cæpa, allium, et si prius folliculo quodam claudantur. Umbellis nuda resident semina omnibus panacis generibus: itemq; seseli, ligustico, apij omni generi, aniso, caro, anetho, cumino satiuo, ammi, elaphobosco, dauco, sphondylidio, peucedano, elia chryso, cicuta, mirrhidi, angelica, imperatoria, thapsia, coriandro, smyrnio, fœniculo, pyrethro, ferulis omnibus, achillea, agerato, stratiote, millefolio, sambuco, ebulo. Semen ueluti spicis cōtinetur origano tam satiuo, quàm sylvestri: quin et sampsucho. Papaueris imaginem semine repræsentant phyllum, nymphaea alba, hyoscyamus, lotus Aegyptia, peplis, peplos, chamæscia. Piperis similitudinem exhibent semina tum lycij, tum etiam uiticis. Compresso, atq; rotundo semine habentur malua, althea, alcea, smilax leuis. Neque seminis effigie ab epithymo disidet alypon: à lolio phoenix: à uiola alba chamæcissos: à salua horninum. Hirsuto semine, ac aspero, adeo ut id tactum uestibus adhaereat, sunt personata, eupatorium, aparine, helxine, xanthium, et uulgare cynoglossum. Capiti uiperarum simile fert echium, et uituli non dissimile antirrhinum. Mucronatum ostendunt tragos, spinachium sic uulgò uocatum, tribulus tam aquaticus, quàm terrestris. A fœni greci semine non desciuit semen myagri, item et loti sylvestris. Semen fœniculi modo ferunt ligusticum, sison, cicuta, cuminum, carum. Anisi uero semina, apij, et ammi consimilem nata sunt formam. Cnici semen suam impartitur imaginem minori centaurio, utriq; chamæleoni, spine alba, et Arabica, atractylis, cinara, Medio, nigro ueratro, et omnibus ferè cardui generibus. Milij semine constant circea, crateogonum, panicum, sesamum, lithospermum, lotus Aegyptia, sesamoides. Erui semen possident catanance, tithymalus paralius aphaca. Semine marrubium emulantur ballote, clinopodium, sideritis prima, pycnocomum. Consimili nascuntur semine libanotis, et crithamum: ut etiam semine conueniunt linum, satyrium erythronium, et quoddam urticae genus.

Seminū, & fru  
ctuū in plātis  
discrimina.



Semine caudæ scorpionis effigie cernitur scorpionides : & uerrucarum modo pendet minori heliotropio. Semina, quæ fructibus carnosissimis tam arborum, quam herbarum delitescunt, gestant aluo mala, cotonea, pyra, citria, limones, aurantia, punica, mespila, cucurbita, pepones, melopepones, cucumeres, colocynthis : item balsaminæ uulgo uocata fructus, mandragoræ, aristolochiæ, halicacabi. quin & mala insana consimili modo suum recondunt semina. Minutum habent semen ruta, iberis, cupressus, circææ, psyllium, mandragoras, apios, cynocrambe, papauer, hyoscyamus, ocimum. Differrunt etiamnum colore inter se semina : siquidem albicant dauco, rosmarino, circææ, lactucæ, papaueri satiuo, & spinoso, cucurbitæ, peponi, cucumeri, sesamæ, litospermo. Vt fructu rubent oxyacantha, terebinthus, cedrus, cornus, zizyphus, rosa, punica, arbutus, taxus, cerasus : ita similiter semine rubescunt asparagus, halicacabus, ruscus, hippoglossum, rumex, dracunculus, arum, acanthium, peonia, rubia, tragus, iuncus, coccum insectorium, aspera smilax, chamedaphne, sesamoides. Succo sanguineo manant ascyri, androsæmi, & hyperici grana. Nigrum inest ligustro, & lycio, myrtillo, oleæ. Quin & semina nigricant ocimo, hirci barbule, porro, allio, capis, ampelopraso, hyacintho, scorodopraso, ophioscorodo, saluæ, rutæ, hormino, ligustico, seseli Aethiopico, sisoni, hipposelino, sinirmio, melanthio, phalangio, rubiæ, sideriti primæ, uerbasco, laureolæ, narcisso, syluestri cucumeri. In longum uero protensum proferunt semen seseli Massiliense, ligusticum, sison, hipposelinum, cuminum, narcissus, fœniculum. Quadratum spectatur seseli Massiliense, & libanotidi : triquetrum uero staphidi agriæ, & lathyri. Geminatum semen ferunt tordylium, alysson, æthiopis, mercurialis altera. Dissident etiam sapore semina : namque acra id proferunt porrum, capæ, allium, ampeloprasum, scorodoprasum, sinapis, nasturtium, erysimum, struthium, cyclaminus altera, dracunculus, origanum, panax Herculeum, seseli Massiliense, tordylium, anisimi, hipposelinum, fœniculum, pyrethrum, peucedanum, cardamomum, clematis secunda, smilax aspera, thlaspi, hydropiter, ptarmica, arum, lepidium, ligusticum, & siliquastrum, quod Indicum appellant piper. Odorato semine pollent omnia cardamomi Arabici genera, panaces Herculeum, meon, carum, panaces Asclepium, elaphoboscum, ligusticum, hipposelinum, styracium, fœniculum, daucus, pastinaca sylvestris, melanthium, isopyrum, buuium, origanum, ammi, libanotis. Amarum semen inest Aethiopico seseli, omni absinthiorum generi, abrotano, chamæcisso, gentianæ, sesamoidi. In magnam denique duritiem semen coalescit asparago, periclymenon, & rusco. Harum itaque rerum, qui exactam cognitionem fuerit adeptus, is in hac præstantissima facultate absque ullo impedimento poterit peritissimus euadere. Verum enim uero ne quid intactum relinquatur, quod in hac facultate tum utile, tum necessarium existimari possit, ob id scire conuenit, quod permulta creauit natura rerum omnium parens, quæ inter se uel maxime consentiunt, uel admodum dissentiunt. Quo fit, ut nihil hac re admirabilius sit in tota natura, nihilque scitu exoptatius. Quapropter nec ab re quidẽ fuerit hæc etiam cæteris adnectere, paucisque perstringere, & de his præsertim agere quæ ad simplicium medicamentorum materiã spectant. Tã igitur pertinenaci odio sese prosequuntur quercus, et olea, ut non solum non uiuant, neque germinant, si altera effossa, in eius scrobe altera implantetur : sed etiam altera alteram interficiat, si forte propè oriantur. Nec minor inter brassicam, & uiti antipathia cernitur : quandoquidem obseruatum sit, uitum ad cuius radices assita fuerit brassica non paruo intervallo sponte sua refugere. Ideo nil mirum, si tantum brassicam contra temulentiam pollere credant, quodque Germani quotidianis mensis id olus semper apponant, ut uini noxam effugiant. Nec secus brassicam oderunt origanum, rutam, & cyclaminus, atque illa uites : quippe perspectum est, quod si seratur brassica iuxta quamlibet explicatarum, confestim cadit, totaque contabescit. Scilla adeo ueneficiis, & aduermurantium incantationibus aduersatur, ut in limine ne ianua domus integra suspensa ab omni eorum noxa eos, qui inhabitant, uindictet. Quocirca non temere à doctissimis rerum naturalium inuestigatoribus memoriæ proditum est, omnes in uniuersum stirpes, quibus scilla adfita profoliat, non modo asseruari ab omni aeris intemperie, animaliumque noxa, sed etiam letiores, feracioresque euadere. Fœcula in pabulo asinis gratissima est, cosque mirifice alit : quæ tamen, si ab equis, uel bobus edatur, ueneni præsentanei modo eos interficit : tamen si nulla prorsus noxa ea quoque ab hominibus edatur prima foliorum germinatione. Rhododendri flores, & folia mulis, canibus, asinis, & quadrupedum plurimis uenena sunt : hominibus uero contra serpentium morsus præsidia. Cicuta esitata homines enecat : item & quadrupedes. nihilominus sturni innocuæ eius semine uescuntur. Cucumeres aquam ita diligunt, ut si uas aquæ plenum, dum plantis inheret, illis subiiciatur, admodum longiores effecti, mire in illam descendunt. Contra oleum suppositum sic refugiunt, ut in hamos recurrunt. Quandoquidem in uniuersum oleum omnibus, quæ seruntur plantis, inimicum est. Quo fit, ut planta quælibet, quæ fuerit eo peruncta, facile perarescat, & moriatur. Ob id enim admirandum non est, si arbores, quæ oleum ferunt, ac restam mittunt, cæterarum insitiones aspernantur : quemadmodum eas non respuunt aliarum nonnullæ, quæ uel oleum nec resnam fundunt. siquidem sæpe conspecta est quercus pyra ferre, platani poma, myrtus punica mala, oxyacantha mespila. At nunquam uise sunt pinus, larix, picea, abies, olea, insitionis adminiculo, alios ferre fructus, quam pro prios. Grandinis impetum, item & fulminis ictum arcet pellis hyenæ, crocodili, hippopotami, & uituli marini : neque fulmine iciuntur ficus, & laurus. Caprificorum grossi domesticis ficis appensi, non solum eorum fructus decidere prohibent, sed etiam caducos ad maturitatem usque remorantur. Apium tantò celerius adolescit in hortis, quanto magis atteritur, & calcatur : cum tamen secus, & contra eueniat de reliquis plantis. Tenerescunt galli, esuique aptiores redduntur, qui iugulati prius in arbore fici pependerit. Carues putredine diutius illas asseruantur, quibus æneus clauus fuerit infixus. Corpora icta fulmine, etsi excidentur, nunquam tamen putrescunt. Quare non immerito poeta ille damnatur, qui Phaethontem cecinit de cælo tactum quibusdam in uallibus computruisse. Sed maiore miraculo nobis illud sese offert, quod scilicet fulminis ictu è loculis aurum adinatur illis illæsis, ac ne confuso quidem ceræ signo : pariterque ex dolio unum euanescat, dolio nullibi fracto. Quid enim hoc mirabilius ? Martia princeps Romanarum grauida icta fulmine, partu exanimata, ipsa citra ullum aliud incommodum uixit. Mentha lacti imposita densari ipsum in caseum non sinit. Murenæ pisces ferula tactæ statim moriuntur. Scorpiones item admota delphinio herba, aut

Sympathia,  
& antipathia  
rerum quarundã  
pro simplici  
materiã.



lychnide sylvestri, aut aconiti radice, quod pardalianches uocant, adeo torpescunt, & stupidi redduntur, ut potius mortui, quam uiui existimentur: ueruntamen albi ueratri contactu mirificè excitantur, uiresq; deperditas recuperant. Succo cotulae manus illitæ apum, uespriumq; aculco non infestantur. Quod item malua præstat oleo contusa, corporisq; membris illita. Qui polemonie radicem gestauerit, à scorpionibus non icitur: etsi ictus sit, nulla neque molestia, neque noxa afficitur. Porro tanta est arundinis, & filicis discordia, ut arundine uomeri annexa, filices in agro enate penitus deperdantur. At contrà magnam inter se ineunt amicitiam arundines, & asparagi: quippe in arundinetis sati longè letiores, quàm alibi adolescunt: quemadmodum & uites, quæ ulmos, populosq; scandunt. Magna insuper conueniunt amicitia myrtus, & olea: item hæc, & ficus. Orobanche sola præsentia legumina strangulat. Metellarum nucum esu peculiarius enecantur canes, quàm cætera animalia. Cunicos lectularii si uini deuorentur, non solum quartanis febribus remedio sunt, sed etiam percussis ab aspidē profunt. Martyres, feles, & mustela gallinas non attingunt, quæ rutæ succo fuerint perunctæ: neque uulpes eas inuadunt, quæ pulmonem uulpinum comedierint. Vipera fagi ramulo obuian facta gressum sistit, & ueluti attonita manet, quod item facit arundine etiam leuiter percussa. Furcens elephas aricte tantum conspecto mansuescit: nec est taurus tam ferox, qui fico arbori adaligatus non mitescat. Magnes lapis mirè ferrum ad se trahit: at si alio confricetur, id neuiquam agit, nisi sanguine hircino lotus nim ab alio obfessum redimat. Succinum paleas, & festucas ad se trahit: nihilominus oleo illitum eas respuit. Equi, quos lupo momorderit, & pernici cursu, & prolifica probitate pollebunt: at si luporum uestigia calcauerint, cruribus obstupefcunt, ac conuelluntur. Carnes ouillæ à luporum morsibus dilaniatæ, cæteris teneriores, & gustatu suauiores existunt: at earum lana uestibus contexta, pediculos creat. Leo animal ferocissimum præsentē gallum mirum in modum ucretur, ac magis terrore concutitur audito eius cantu. Gallinacei pulli elephantem, bouē, & equum minime metuunt: atqui si umbram tantum milui in aere uolantis cospexerint, ad matrem matrem perterriti confugiunt. Nec secus agunt oues, & agni lupo conspecto. Idem lupo scilla bulbo contacto quàm primum sideratur. Hyenæ umbra contexti canes obmutescunt, item hyenæ ipsius lingua à latratu, ac morsu canum etiam mordacissimorum ferentem uindicat. Polypodium herba cancro animali adnota efficit, ut is paruo temporis tractu tum integentes crustas, tum unguis è pedibus abiciat. Ciconiæ platani foliis uidos implent, ut inde uespertilionibus abigant, quibus cum ingens odium gerunt. Hirundines apium comportant, ut tineas, & blattas nidis inimicas arceant; item & chelidonium maius, quod obcecatis pullis uisum restituant. Cæterū lauri folia nidulis important palumbes, accipitres hieracium, corui arum, upuæ adiantū, cornices supinam uerbenacam, turdus myrtum, perdid arundinem, ardeola carum, aquila callitricum, gallerita gramen, cygni uiticem, ut à diuersis animalium iniurijs se uindictent, aut ab alio quocunque, quod noxam adferre possit: tam admirabilis in uolatilibus, & quadrupedibus habetur ipsius naturæ instinctus, circa rerum uires absconditas. Catus quadam herba adeo gaudet, ut illi catariæ nomen recentiores indiderint. Ranae iuncum, ranunculum, & stœbem diligunt. Testudines, & ciconiæ origanum adamant. Serpentes foeniculi affricatu uisum recuperant. Leo deuorata simia febrem efficacissimè discutit. Ceruæ, & feræ capre non modò dictam pabulo illata uulnera in Creta insula sanant, sed & infixa tela uenatoribus reijciunt. Vrsi formicas deuorant, ubi mandragoram degustauerint, quibus mirificè sanantur. Elephantēs deuorato chamæleonte animali olea stri frondes depascuntur, quibus incolumes euadunt. Anseres, anates, ac reliquæ aquaticæ aues siderite tantum herba suis incommodis medentur: sicuti gallinæ helixinem deuorant, grues iuncos, pantheræ humanum sterces, apri herderam, & cinaram ceruæ. Præterea rhabarbaro flaua bilis è corpore deijcitur, itemq; manna, & scammonio: pituita colocynthide, & turpeto: bilis uerò atra helleboro, & Armenio lapide: sicuti & uenena theriaca superantur. Oculorum ægri tudines curant solo contactu sapphiri & anthracis. Ebrietas amethysto lapide arcetur. Sanguinis defluxus iaspide sistitur. Topatio appenso uenus infirma redditur: item & uitice lecto cubantibus strata. Formicæ alis uespertilionis, & upuæ corde fugantur. Qui & serpentes ueterum calciamentorum suffitu abiguntur: ut blattæ, & papiliones hircino iocinore incenso. Torpedo piscis non modò manu, sed & longiori hasta contacta tægentis brachium stupidum reddit, quauis ualidissimis musculis constet. Catablepha quemcunque oculo conspexerit, enecat, & si per mille passus distet. Nec inter homines desunt, qui laudibus, & oculorum intuitu conspectos effascinent. Cæterum si cæterarum uolatilium pennæ aquilinis permisceantur, breui carie contabescunt: quemadmodum testudinum chorde contactæ disrumpuntur, si una tantum ex lupi intestino parata inter eas resonet. Eodem pariter modo tympana ouina pelle constructa franguntur, si tympanum lupina membrana contextum inter alia pulsatur. Tanta musicis, tibij, cæterisq; id genus instrumentis facultas aduersus tarantulæ uenenum inest, ut languentes etiā inuitos non modò ad choreas, saltationesq; alliciat, sed etiam persanet. Quinetiam tanta ui pollent Marsi, ac Psylli contra serpentes, ut eos solo contactu enecent. Taurus perunctis rosacco naribus statim uertigine corripitur. Lapis Thracius aqua madens igni admotus præter rerum naturam flammam statim concipit, nec restinguitur, nisi affuso oleo. Sed de his hæc ætemus: quadoquidem breuitati studentes plura adhuc silentio prætereunda duximus.

† Hic locus (ut mihi retulit excellentiss. medicus Augustinus Gadaldinus) in antiquo codice ita legebatur: *eis dýκων διαφοράς ἐκαστον αὐτῶν ἀναφέροντες*. Id est: in tumorum differentias unumquodque ipsorum referentes. Quæ lectio non solum ob id magis probari posset, quàm uulgata, quòd dogmatica sit, illudq; dogma innuat, quòd facultatum medicamentorum causam in tumores, & meatus referebat; sed quòd etiam eius dogmatis meminerit Galenus libro primo de simpl. medicamentorum facultate cap. primo, his uerbis. *τινὲς μὲν γὰρ εἰς τὰ μέγιστα, καὶ τὰ μικρὰ, καὶ τὰς βλάβεις τῶν ὀνυχῶν καὶ πόνων ἀναφέρονται*. Hoc est: Quidam enim in magnitudines, figuras & situs tumorum & meatuum referunt.



IRIS DOMESTICA.

IRIS SYLVESTRIS.



Iris.



Cap. I.



**I**RIS à cœlestis arcus similitudine nomen accepit. Folia fert gladioli, sed maiora, latiora, & pinguiora. Flores † in summitate cuiusque caulis, æqualibus inter se spatijs distant, incurui, uarij: siquidem candidi, pallentes, lutei, purpurei, aut cærulei conspiciuntur: quæ diuersi coloris specie, quædam cœlestis arcus imago re præsentari uidetur. Radices subiacent geniculatæ, solidæ, odoratæ: quæ frustatim dissectæ, in umbra siccantur, & traiectæ limo reconduntur. Melior est Illirica, &

- 40 Macedonica: & inter has laudatissima, quæ mutila ferè, & densa constat radice, frangenti contumax, subrufo colore, gustu amaro, odore perquam grato, & syncero, ita ut nullum prorsus situm redoleat: quæ dum tunditur, sternutamenta mouet. Secundum locum habet Africana, candicans gustuque amara. Terebines in uetustate sentiunt; tunc tamen odoratiores reddi solent. Vis omnibus exca-
- 50 toria, extenuans, contra tussim efficax: humorum, qui ægrè reijciuntur, crassitiem digerunt: bilem, crassamque pituitam ex hydromelite drachmis septem epotæ purgant: somnum conciliant, lacrymas ciunt, torminibus medentur. Eadem potæ ex aceto auxiliantur serpentium ictibus, lienosis, conuulsis, perfriktionibus, horroribus, & quibus genitura effluit: menses ex uino potæ pellunt. Decoctum earum, sceminarum fotibus utiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandaque in eis uenarum spiracula: ischiadicis infunditur: fistulas, ac sinus carne explet. Radices ex melle glandis modo subditæ, partus extrahunt: quinetiam coctæ & illitæ, strumas, ueteresque duritias emolliunt.
- 60 Siccæ quoque ulcera replent, & cum melle purgant: nudata ossa corpore operiunt: doloribus capitis cum aceto, & rosaceo magna utilitate illinuntur. Admotæ cum albo ueratro, & duabus mellis partibus, lentigines & uitia cutis in facie à sole contracta emaculat. Pessis, malagmatis, & acopis inferuntur. In uniuersum magni ad omnia usus.

**I**RIS in uniuersum satiuæ est, & sylvestris. Hæc duorum est generum: altera satiuæ, & uulgari similis, folijs tamē, flore, caule, radiceq; paulò minoribus. **A**LTERA folijs gladioli longioribus: radice tenui, lignosa, geniculata, subrufo, inodoraq;: caule breui: flore cæteris longè minori, odore Armeniaci mali. constat hic folijs nouem purpureis, quorum extrema, superiore tantum parte, aureis pinguntur lineis. Sunt qui hanc legitimam Illyricam putent, Illyricam ab Italica differre existimantes. In quorum sententiam etsi iam pridem deuenim; tamen longè aliter rem se habere postmodum comperi. Quandoquidem præferri Illyricam nouerim, non quod genere, uel specie à nostrate differat,

Iridis genera eiusq; consideratio.



## IRIS SYLV. ALTERA.



Opinio re-  
probata.

Plinii contra  
dictio.

Iridis uires  
præter tradi-  
tas à Diosco.

Iris cogno-  
mento aut ra-  
galiris.

ferat, sed quod celi, soli; illius convenientia, præstantioribus polleat facultatibus: ut absinthium, quod in Ponto nascitur: acorum, quod in Colchide, & Galatia: cyperus, qui in Syria, & Cycladibus insulis: costus, qui in Arabia: crocus, qui in Coryco monte: myrrha, quæ apud Troglodytas, & Minæos legitur: & alia quam plurima præferuntur à locis, quorum dote selectissima, præstantissimaque proueniunt. Id enim aperte testatur grauiusculus auctor Galenus lib. primo de antidotis, his uerbis. Omnes itaque herbarii unanimes scripserunt Irim in Illyrio natam optimam esse: petroselinum uero, quod in Macedonia prouenit: bitumen e Iudæa aduectum, item & opobalsamum. Idem & in reliquis fecerunt, quorum dotes à regionibus acceptas, cum priuatim de unoquoque loquemur, ne omittamus. Hæc Galenus. Docuit id etiam ante Galenum Theophrastus lib. I x. cap. v I I. de historia plantarum, sic inquit. In Europa nihil præter irim inueneris, quæ optima apud Illyrios exit, non tamen parte maritima, sed mediterranea, magis: ad septentrionem sita. Verum loci à locis differunt, ita ut producere meliorem possint. Quibus palam est, Illyricam Irim non genere, & facie, sed uiribus tantum à nostrate distingu. Satis uero (ut arbitror) ex agresti originem duxit, quemadmodum plantarum aliarum pleræque, cultu tamen uegetior grandiorque effecta. Seritur iam & altera, quam flore & folijs minorem esse diximus, quæ etiam in hortis frequens est, tum ipsius floris amœnitate, tum odoris præstantia, tum etiam quod nouis floribus delectentur homines. adeo ut iam tot satiuæ, quot sylvestris habeantur genera. Sunt tamen, qui putent nullam Irim domesticam reperiri, quod scripserit Theophrastus loco antè citato, nullum Iridi cultum accommodari. Sed ij, meo quidem iudicio, decipiuntur. quandoquidem Theophrastus eo in loco non de omni in uniuersum Iride differit, sed de Illyrica tantum: quæ cum loci ac coeli clementia in Illyrico tractu optima sponte proueniat, non est necessarium

se, ut colatur. Præterea cum hodie Iris domestica passim in Italiae hortis læta, uirens, pulchraque spectetur: sylvestris autem in plurimis montibus sponte nascatur, floribus & folijs satiuæ longè minoribus, radice tenuiore, breuiore, & aridiore; nulli quidem absurdum uideri debet, si nos utranque depingi curauimus. Quinetiam compertum habeo, ueteres quoque Iridis sylvestris mentionem fecisse, non solum Marcelli medici auctoritate cap. x x I I I. qui præterea Irim domesticam cultamque illis fuisse ostendit; sed Galeni quidem testimonio. is enim Iridis sylvestris mentionit lib. x. de comp. medic. secundum locos, dum uenethicas compositiones ab Asclepiade conscriptas recenset. Sylvestris utriusque generis plurima oritur in Goritiensi agro Saluatino monte, & Iapidie collibus inter saxa, odore non ingrato; quamuis etiam ambas uiderim in campatribus non longè à Sontij ripis. Est præterea in satiuarum genere, quæ flores niuei candoris proferat (hanc in pluribus Hetruriæ locis uidimus) cuius radix odoris fragrantia, & uirium robore Illyricam ferè æqueat. Iridis meminit Plinius lib. x x I. cap. v I I. sic inquit. Iris radice tantum commendatur, unguentis, & medicinae nascens. Laudatissima in Illyrico: & ibi quoque non in maritimis, sed in sylvestribus Drilonis, & Narone. Proxima in Macedonia: longissima hæc, & candidans, & exilis. Tertium locum habet Africana, amplissima inter omnes, gustuque amarissima. Illyrica quoque duorum generum est: raphanitis à similitudine, quæ & melior: rhizotomos subrusa. Et cap. x x. eiusdem libri: Iris rufa (inquit) melior est, quam candida. Quibus in locis sibi manifestè repugnare uidetur Plinius: quod superius raphanitem, quæ candidat, rhizotomo, quæ rufescit, anteposuerit, hic uero contra. Dioscoridi præstat, quæ subruso constat colore, qualis Plinio rhizotomos. Ceterum (si Theophrasto, & Plinio credamus) non omnis Illyrica præstat, sed quæ tantum in sylvestribus nascitur. siquidem quæ in maritimis foditur, humore prægnans improbat, quod subinde flaccescens contrahatur in rugas. Succus hydropicis propinandus, quoniam recenti Illyrica destituimur, è nostrate elicitur, ducitque abunde aquas. Excalfacit Iris ordine secundo completo, uel tertio inchoante, & pariter siccatur. Atque præter uires, quas illi adscribit Dioscorides, alijs pluribus pollet, quandoquidem compertum est, mansani oris halitum commendare: dentium dolores mulcere, si radice decocto idem foueantur. coquit item, abstergit, digerit, resoluit, lenit, refect, expurgat, & deiecit: uulnerarijs medicamentis immista sarcotica est. Radicis expressus succus bilem flauam, pituitam, & aquas cutem subeuntes pellit: hæmorrhoidas fœtu elicit. Radix ipsa contrita, & ex aceto bibita, omnibus aduersatur uenenis. Succus naribus infusus, cerebrum à pituita mirifice purgat: uentriculo tamen nocet, cum per se tantum bibitur. ideoque à peritis medicis exhiberi non solet, nisi admista mulla, & Indica nardo. Reperio quoddam esse Iridis genus, quæ Astragalitis cognomine dicitur. Id enim ostendit Galenus lib. I. de compositione medicamentorum secundum locos cap. primo ex Sorano transcribens: item Aetius lib. x I I I. cap. I I I. qui quibusdam in emplastris Irim astragalitidem imponunt. Veruntamen cum antiquorum, uel recentiorum repererim neminem, qui in simplicium medicamentorum libris huiusce Iridis meminerit, quid certi de hac re proferam, sanè non habeo. Ceterum



terum Cornarius, qui in prædictos Galeni libros commentarios edidit, Irim astragalitem, & astragalum idem esse existimat: hoc argumento ductus, quod Plinius Iridem duplicem esse tradiderit; alteram, quæ raphanitis à similitudine; alteram, quæ rhizotomos dicitur. At cum astragalus radicem raphani modo ferat, inde Iridem astragalitem Astragalum esse coniecit. quin & Plinio per Iridem raphanitem, astragalum intelligi censet. Sed mea quidem sententia rectius fortasse rem hanc explicasset, si per eam Iridem, quæ à similitudine raphanitis uocatur, astragalitem ideo designari dixisset, quod ut astragalus, raphani modo radicem gerat: siquidem Plinio Iris raphanitis astragalus non est, sed altera Iridis Illyricæ species. Quamobrem ita Iridem astragalitum à Galeno cognominatam esse putauerim, quod radice referat astragalum: quemadmodum raphanitis à Plinio dicta est, quod radice raphanum representet. Iridem memoriæ proditam fuisse Galeno in libris simplicium medicamentorum sanè nusquam reperi: tametsi libro primo de antidotis eius postmodum meminerit his uerbis. Andromachus rosis Iridem Illyricam adiungit. quæ uerba non frustra, negligenterq; excipienda sunt, ueluti nec cum aliis medicinis patriæ nomen apponit, de quibus paulo post differentes, quid quoque in genere optimum sit, demonstrabimus. Polium ergo, & chamædrys Romam afferuntur, natis in Italia paulo meliora. in aliquot siquidem Italiæ locis haud multo deteriora proueniunt illis annis, quibus uer totum humidum non fuerit, sed sicuti sepe contingit, æstiuo tempori simile. Quod si ueris constitutio stecior obuenerit, multa, quæ in Italia nascuntur, pluribus Creta allatis paria erunt, aut non multo inferiora, ueluti chamædrys, chamæpitys, hypericum, gentiana, thlaspi, ueratrum nigrum, & id genus alia. At uerò, quod ad Irim pertinet secus se res habet: si enim Iris Lybica, quæ plurima ex Africa Romam affertur, Illyricæ comparatur, tantum ipsi cedit, quantum cadaver uiui corpori: non tamen alijs in gentibus orta tam multum ab Illyricæ degenerare Iris uidetur. Irim igitur, uelut & reliquas medicinas, odoratiorem eligito: nam unumquodque optimum est, quod proprium sui generis odorem uehementissimum habet, qui quidem ex multorum inspectione manifestus unicuique sit. Ac de gustu quidem perceptis qualitatibus eodem modo censendum est: id enim optimum medicamentum esse constat, in quo id, quod suo generi proprium est, exuperat: pessimum uerò quod sui generis alijs & tenuius, & exilius est. Meliora namque sunt omni in specie, quæcunque nec rugosa, nec exilia fuerint: sicut quæ convenientem sibi magnitudinem excessere, peiora sunt iis, quæ bene nutritam, & astrictam habent substantiam. Quamobrem, ut dixi, multa sepius inspexisse operæ pretium est, & maxime optima, & quæ longo iam tempore sui experientiam ipsis nascendi inijs præbuerit, quæque uno ore à peritis medicæ materiæ sunt commendata. Opines igitur herbarij unanimes scripserunt Irim in Illyrio natam optimam esse. Hæc Galenus. Plantæque Græcis Ἴρις, Latinis item Iris nominatur: Arabibus, Asmeni iuni, siue Aiersa: Italis, Irìde, Giglio azzurro, aut Giglio Cœlestè: Germanis, Blauu gilgen, Blauu schuuertel, Viel uurtz, Himel schuuertel: Hispanis, Lirio cardenò: Gallis, Glaieul, aut Flambe.

Iridis mēcio  
ex Galeno.

Nomina.

## ACORVM.



† Malui hoc in loco Marcelli interpretationem sequi, quem admodum alibi quandoque facturus sum, quàm Ruellij, cui non semper addictus ero: quod in aliquot Græcis codicibus legatur ἀπὸ καύλα, quæ uox in summitate cuiusque caulis significare uidetur, quodq; natura in planta ipsa illud manifestè demonstret.

## Acorum Cap. II.

ACORVM folia iridis, habet, angustiora tamen: radices non dissimiles, complicatas, non in rectum, sed obliquum actas, & summo cespite sparsas, geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratas. Optimum est densum, candidum, plenum, carie non exesum, odoratum: cuiusmodi Colchidicum, & Galaticum, quod aspletion dicunt. Radici uis calfactoria. Decoctum potu urinam cit: prodest lateris doloribus, & iocineris, atque thoracis: item torminibus, uulsis, ruptis. lienem absomit: urinæ stillicidio, & serpentum ictibus auxiliatur: insidentibus ad mulieres affectus, iridis modo, utiliter imponitur. oculorum caligines succo discutit. Antidotis radix magno usu commiscetur.

FECIT diuturna rei herbariæ ignorantia, ut hætenus non in Italia solū, sed in quocunque terrarum loco, ubi seplastarij, & medici habeantur, in legitimi Acori locum rufa quædam radix successerit, quæ passim in palustribus, & uliginosis locis inutilis, & inodora plurima nascitur eo sanè argumēto, quod folia, et radices iridis proferat; quæuis hæ colore rufa, illa uerò iridis longiora spectentur. Hæc itaque radix apud omnes, qui plantarum historias neglexerunt, in hoc usque æuum legitimi Acori munere

Acori cōside  
ratio.



## ACORVM FALSVM.



Brafauli error.

Fuchij error

Acorum legitimum.

dere possum, quod eadem aliqua ex parte subalbescunt, ut de Acori radicibus scribit Dioscorides: quin potius tantum intus, quam extra non obscure rufescunt. Quod autem gustu sint acris, atque mordaci, qui neget, nullus est. Sed non tamen ob id dicendum erit, galangam esse Acorum, alijs non concurrentibus notis: praesertim cum Dioscoridis testimonio Acorum esse debeat acre, non autem acerrimum, nec galangae modo linguam adurens. Brafaulian secutus est Fuchsius medicus clarissimus. is, cum sibi nimis pumila uiderentur prioris galangae radices, quam ut Acori radices referrent, atque propterea Brafauli sententiam non probandam duceret, in suis de stirpibus commentarijs, alteram crassiorem galangam, quae iam pridem in Italiam fertur, Acorum esse contendit. Verum si animaduertatur, quod ea non sit iridi similis, multoque magis rufescat, quam quod haec dictio *ὑπολευκός* designet, quae albicantes, et non rubentes denotat, facile palam fiet, quod uia cum Brafaulo ipse quoque aberrauerit. Sed praeter haec ijs etiam refutatur Galenus lib. VI. de simp. med. facult. quod asserat Acori radicem gustui non modo acrem esse, sed etiam subamaram: quae tamen modica amaritudo neque in hac, neque in illa reperitur galanga: etsi inualidis quibusdam argumentis suo ultimo examine contendat Brafaulus, quod galanga praeter acerrimam facultatem etiam sit amara. sed uereor, ne is tunc bile persusus suam degustauerit galangam. Comprobatur praeterea aliud esse Acorum, et aliud esse galangam Serapionis testimonio: qui, cum sciret non parum discriminis inter has radices esse, de ijs seorsum egit per propria capita, utpote de rebus genere et facultate diuersis. Hoc idem probatur ex Actuarij etiam monumentis. siquidem in compositione aureae Alexandrinae et Acorum, et galangam imponit, quemadmodum et Nicolaus Myrepsicus, tanquam inter se genere diuersa. His itaque tum rationibus, tum auctoritatibus adductis, a Brafaulo, et Fuchio diuersus esse cogor. Nec equidem intellexerim unquam, quomodo factum sit, quod galanga maior, quae a minore non genere, et facultate, sed tantum specie differt, cum primum huc a Syria aduecta est, in Acorum se commutauerit. sed qui haec intelligunt, diiudicent. Ceterum, ut dicam quid hac in re sentio, crediderim ego unam cum Manardo Ferrariensi, alijsque nonnullis huius aetatis in simplicium medicamentorum facultate doctissimis uiris, id omnino legitimum esse Acorum, quod non modo seplasia, sed omnes in uniuersum falso Calamum odoratum uocant. Si quidem radices primum iridi persimiles sunt, geniculis distinctae, reflexae, subalbidae, acres, odore praestantes, et (ut inquit Galenus) etiam subanae. insuper et folia, quae integra ad nos una cum radicibus (ut haec pictura demonstrat) a Constantinopoli allata sunt, id apertius affirmant: sunt enim ferme iridis. Ad haec ut Aenipontici (Germani Ispruch dicunt) retulit mihi clarissimus medicus Ioannes Merula, qui pluribus annis degit apud Lituanos, quod passim calamum aromaticum uocant, frequentissimum in Lituania, et circa Tartarorum fines, nascitur: folijs iridi emulis: flore etiam simili, colore roseo purpurascens, nulla ex parte uariop: caule iridis longiore gracilioreque, a quo tamen nullus exoritur calamus: uocaturque ab incolis suo idiomate Tattarschi xelij, id est, herba Tartarica, quod forsasse a uicinis Tartaris in Lituaniam primum fuerit allata. Ideoque Plinio memoria recte proditum est lib. x. v. cap. XIII. optimum id esse Acorum, quod ex Ponto aduehitur. Pontus enim his Tartaris fere iungitur, qui ultra Lituaniam inhabitant.

munere functa est: a qua quantum tum qualitatibus, tum facultatibus recedat, ex Dioscoride patet. quandoquidem palustris haec nec candicans, nec gustu sit acris, nec ullo prorsus commendetur odore. At quamuis hac tempestate a peritis rei herbariae medicis non parum improbentur ijs, qui non in hac tantum stirpe, sed etiam in alijs quam plurimis descere, cum tamen ipsi probatissimos aut flores nusquam legerint, potius excusandi sunt, quam quidam forsasse aetatis nostrae scriptores, tam Graecae, quam Latinae linguae peritissimi; quibus res sole clariores propositae sunt, quique in simplicium medicamentorum cognitione ceteris praestantiores haberi nolunt, et ijs longius nihilominus (ut arbitror) aberrant, quam ceteri. E quorum numero est Brafaulus Ferrariensis, uir sane doctrina, et fama clarissimus: qui dum innumera simplicia medicamenta declarare, explicare, et palam facere in suo simplicium examine studium impendit, etsi id in plurimis assecutus fuerit; in hoc tamen, alijsque nonnullis (ut suis locis in his nostris commentarijs ostendemus) in tanto illustrium auctorum lumine mihi magis cecutire uidetur, quam qui ante ipsum in tenebris errauerunt. Is enim constanter asserit, Acorum a Dioscoride descriptum aliud non esse, quam eam acerrimam, et odoratam radicem, quam officina Mauritanos secuta Galangam uocant, adeo ut maluerit cum Leoniceo errare, tantum sibi praecceptorum suo addictus, quam cum Manardo bene sentire. Sed quantum eius opinio a ueritate, quantumque ab Acori historia recesserit, per quam facile probari potest. Quippe galangae folia iridis proferre apud Syrios nullo nobis testimonio constat: uerum quia cum cypero adeo conuenit, ut is syluestris Galanga nonnullis dicatur; ideo non ab re credendum fuerit, galangam potius cyperi, quam iridis folio provenire. Praeterea quod galanga radices habeat iridis, nec mihi quidem uidetur, nec ullum id affirmare existimo. neque illud etiam uisum



inhabitant, ubi apud probatissimos auctores nusquam legitur, odoratum calamum oriri. Quamobrem non potui nō maxime Brasauolum admirari, quod sibi tam facile persuaserit, uulgarem calamum legitimum, & odoratum calamum esse, à Dioscoride, Theopraſto, Galeno, & Plinio non in radicem, sed in arundinum genere descriptum. nam (ut suo loco de calamo odorato agentes latius explicabimus) is arundinea est fistula, non autem radix. Sed de his haecenus. Acori meminit Galenus lib. vi. de simplicium medicamentorum facult. sic inquit. Acori utimur radice, quae gustu acris est, & modice amara, odoreq; non iniucunda. Unde constat, quod facultatis calidæ est, & consistentiæ tenuis. Huic consentaneum est, ut urinam moueat, & lienes induratos inuet, tum ceratoidis crassitiam detergeat, simulq; extenuet. Sed ad hoc melior est ipsius succus. Omnino uero siccificum esse clarum est. Et sanè ordinis esto tertij in utroque, in calfaciendo scilicet, & desiccando. Hec Galenus. Sed quando hic aliquid dicere de Galanga occurrerit, cum à Dioscoride, alijsq; antiquioribus, Graecis nihil de ea memoriae pròditum sit, differam ego de hac, quæ à Mauritanijs, & alijs sum consecutus. Est itaque GALANGA duplex: maior altera, altera minor. Minor tenuis est radix, interius & exterius in purpura rufescens, geniculata, internodijs quibusdam reflexa, odorata, sapore admodum acri, adeo ut mansa piperis, & gingiberis modo linguam, & fauces exurat, odore formaq; cypero similis, quapropter quibusdam cyperus Babylonicus dicitur. In Italiam namq; tam ex Memphis, quam ex Syria transfertur. Optima quæ fuerit grauis, densa, saturatè rufa, odorata, & gustu acerrima: Non desunt tamen impostores, qui cyperi radices contorquentes, aceto, & pipere macerent, & pro Galanga uendunt. uerum fraus facillè deprehenditur: quippe abraso exteriori cortice, nulla in radicis substantia acedinis nota, nullusq; galangæ sapor percipitur. At maior, tametsi longè crassior sit radix, ignauior tamen est, & uiribus infirmior, colore etiam dilutior, minusq; odorata. Galanga calfacit, & siccatur ordine tertio. Proinde uentriculum roborat, & eius dolores tollit; si tamen à frigore, uel flatu proueniant. Naribus admota frigesfacto cerebro utilis est: ore retenta anhelitum commendat. Facit & ad cordis palpitacionem, si è plantaginiis succo bibatur: celiacos sanat, & coli dolores mulcet, qui à flatu oriuntur. Prodest flatuosis uteri affectibus: uenerem roborat: renes refrigeratos calefacit in summa frigidis morbis omnibus succurrit. Ceterum omnino explodenda est Monachorum in Mesue scribentium opinio, qui contra Brasauolum & Fuchsum quasi uelle uidentur, Galangam potius odoratum inuncum esse, quam Acorum. quod tamen planè falsum omnibus iam compertum esse non dubitamus. Quod Græce Ἀκόρον, Latine etiam Acorum appellatur: Arabicè, Vage, seu Vgi; Italicè, Acoro: Vulgo medicorum, & seplasiariorum Calamus aromaticus.

Acori uircus  
ex Galeno.

Galangæ cōsideratio.

Monachorū opinio falsa.

Nomina.


## Meon.

## Cap. III.

MEON, quod Athamanticum uocant, in Macedonia, & Hispania plurimum gignitur, anetho folijs & caule simile, sed crassius: binum ferme cubitorum altitudine attollitur: sparsis in obliquum, rectumq; radicibus, longis, tenuibus, odoratis, linguam excalficientibus: Quæ feruefactæ ex aqua, uel tritæ citra coctionem, præcluserum renum, uescicæque sacæ uitia potu leniunt: urinæ difficultati medentur: stomachi inflationes discutiunt. Torminibus, affectæ uulua, articulorum doloribus, atque fluxionibus pectoris, tritæ cum melle in eclegmate auxiliantur. Sanguinem per menstrua pellunt, deflectionibus feruefactæ: infantibus autē illitæ imo uentri, urinas mouent. Quod si plus quam deceat, ex his bibatur, caput dolore afficiunt.

CREDIDIMVS superioribus annis, legitimum Meon non oriri in Italia, nec cō aliunde aduehi: primum quod Mei uicē uterentur seplasiarij quibusdam albicantibus radicibus, sapore pastinacæ simili: deinde quod etiam Plinij tempore rarū esset in Italia. quippe qui scripserit non ferè in Italia Meon, nisi à medicis, ijsq; admodum paucis. Quod procul dubio indicare uideatur, usque ad Plinij æuum peregrinum in Italia fuisse Meon. Sed cum herbariorum quorundam diligentia, quædam nuper reperta sit planta quæ folijs constat anethi, caule, bicubitali, radicibus nigricantibus, longis, & in obliquum, rectumq; sparsis, grauius odoratis, acrisq; quàm legitimum esse Meon, omnes ferè rei herbariæ periti unanimes affirmant, ne uidear mordicus tenere opinionem, facere equidem non possum, quin in eorum sententiam deueniam: tametsi in contrarium aliqua sese offerat ratio,

Mei confideratio.



quod scilicet huiusce plantæ radices odorem non usque adeo gratum spirent, sed quãdantenus grauius oleant, nec tenues cernantur, ut Dioscorides inquit. Plinius Meo folia aniso similia reddidit, uocum fortasse similitudine deceptus. siquidem Dioscorides anethi folijs Meum oriri tradidit. Nobilius quod Athamanticum uocant, ita dictū, quod



Mei uires ex  
Gale no.

Nomina.

ab Athamante Aeoli filio inuentum sit, uel quod præstantissimum in Athamante Phthiotidis proueniat. Meminit Mei Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, his uerbis. Mei radices peritiles sunt, calida tertio ordine, sicca secundo: proinde urinam, mensesq; ciere uolentes hoc utuntur pharmaco. Sed si plusculum sumatur, capiti dolorem mouet, utpote cum plusculum sit calidum, quam siccum. quippe quod eius caliditas humiditatem crudiorē etiānum, & flatuosiorē ad caput deferat, atque ita ipsum afficiat ledatq;. Mñov ita Grecis uocatum, Latinis Meum dicitur: Arabibus, Mu: Italis, Meo: Germanis, Baer uurtz, seu Hertz uurtz: Hispanis, Pinillo.

## Cyperus.

## Cap. IIII.



Cyperigeni  
ra, & confide  
ratio.

CYPERVS, quem aliqui eryscephtrum, ut aspalathum appellant, folia fert porraceis proxima, sed longiora, & exiliora: caulem odorati iunci cubitalem, aut maiorem, angulosum: in cuius cacumine minuta folia cum semine exoriuntur: radices, quarum in medicina est usus, coherentes inter se, oleis oblongis similes, aut rotundæ, nigro colore, suauis odore, amaro gustu. In lacunosis, palustribus, & cultis enascitur. Optima est grauiissima, densa, fractu contumax, plena, & aspera, odoris cum quadam acrimonia iucundi: qualis est Cicilia, Syriaca, & quæ à Cycladibus insulis petitur. Huic calida uis inest. Venarum spiracula laxat: urinam ciet: ad calculos, aquamque subter cutem utilissimè bibitur: aduersus scorpionum ictus remedio est: perfriktionibus uulnæ & præclusionibus fotu prodest: pellit menses. Contra ulcera oris etiam si depascent, uorentque, farina eius efficax est. Malagmatis calefacientibus, & unguentorum spissamentis benè adijci solet. Aliud Cyperi genus tradunt in India nasci, gingiberis effigie: quod manducatum croci uim reddit, gustu amaro sentitur, & illitum præsentem phloethri uim exhibet.

TAMETSI unum tantum Cyperi genus memoriæ prodiderit Dioscorides, cuius radices inter se coherentes oblongas referunt oleas, aut omnino rotundæ sunt: uisitur tamen Cyperus in pluribus Italiae locis, qui radicibus constat lōgis, geniculatis summo cespite uagantibus, colore in purpuram nigricante. Nascitur hoc Cyperi genus laudatissimum prope Timai fontes circumstantibus palustribus locis in lapidie finibus, galangæ uocatæ (ut paulo ante diximus) persimile, non tantum facie, sed etiam odore.

Commendatur etiamnum odore is, qui in Hetruria prouenit, radicibus ferè filipendulæ æmulis. sed non ob id illi ferè præferendus, quem Syria mittit, quandoquidem hic longè odoratior est, & subamarus. Cyperi meminit Plinius lib. XXI. cap. XVIII. ubi de iuncis egit, sic inquit. Quidam etiānum unum genus faciunt iunci trianguli, cyperon uocant. Et paulo inferius: Cyperos, ait, iuncus est, ut diximus, angulosus, iuxta terram candidus, cacumine niger, pinguisq;: folia ima porraceis exiliora, in cacumine minuta, inter quæ est semen: radix oliuæ nigre similis, quam, cum oblonga est, cyperida uocant, magni in medicina usus. Reperitur Cyperus quandoque etiam quadrangulæ caule. unde non mirum, si quadratum iuncum eum uocauerit Cornelius Celsus lib. III. cap. XXI. At Dioscorides in hac facultate præclarissimus, utranque differentiam colligens, nec triangulum, nec quadrangulum Cyperum dixit, sed angulosum. Optimus desertur ad nos ex Syria, & Alexandria Aegypti, in cuius defectu Italicum supponunt officinæ. Non desunt, qui differentiam ponant inter Cyperum, & Cypirum Plinium secuti, qui libro, & capite citatis, Cypirum gladiolum esse affirmat, Cyperum uerò angulosum odoratum iuncum. Sunt tamen Dioscoridis interpretes, qui utroque uocabulo pro eodem indifferenter utantur, eo quod (ut rectè Hermolaus adnotauit) penultimam Cyperi quandoque diphthongo longam, quandoque uocali breuem Græci scribant. Est apud Plinium & cypirus arbor ocysini crescens, & pseudocypirus frutex, ut lib. XVII. cap. XIII. ipse scriptum reliquit. Caterum id Cyperi genus, gingiberis effigie, quod India mittit, eam esse radicem peritiores medici putant, quam officinæ Mauritanos secutæ Curcumam uocant. Nempe præ se fert hæc notas sanè omnes, quas Indico Cypero reddidit Dioscorides. quandoquidem gingiberi similis est, eius odorem ferè redolet, gustu subamarefcit, & mansa croci modo inficit. Quibus illud etiam accedit, quod depilatorijs medicamentis quibusdam immiscetur. Verumtamen sciendum est, hanc non esse Curcumam à Serapionis interprete pro chelidonio descriptam: ipse enim nil aliud pro curcuma intelligit, quam Dioscoridis chelidonium. quo fit, ut non desit suspicio erroris, uel interpretis, uel scriptoris, cum curcuma neque Mauritanum, neque Græcum sit uocabulum: Aphri enim chelidonium Kauroch appellant. unde palam est, Curcumam pro Kauroch in Serapione deprauate legi. Quo factum est, ut priores tum medici, tum seplastarij, qui nunquam hæc perpenderunt, fuerint hallucinati. quippe cum eos lateret, cuiusnam plantæ

Curcuma cy  
peri genus.

Leſtio Sera  
pionis deprauata.



te radicem Indica Cyperus referret, chelidoni maioris radicem esse crediderunt ob crocei succi similitudinem. Itaq; Serapionis deprauatam lectionem secuti, Indicū Cyperum curcumam uocauere. Indici cyperi meminit Serapio Dioscoridem secutus, proprio capite de Cypero. Ex quo aperte constat, curcumam Serapioni deprauatē inscriptam, seplasiarum curcumam, quæ procul dubio Indicus est Cyperus, esse nequaquam. Cyperum recensuit Gal. lib. VII. simplicium med. ubi sic inquit. Cyperi radices maxime usui sunt, excafacientes pariter & exiccantes absque mordacitate. Itaq; ulceribus, quæ præ nimia humiditate cicatricem difficulter admittunt, mirifice prouocant: habent enim quiddam etiam adstringens: quapropter ulceribus item oris conueniunt. Quin & incidendi uim quampiam illis inesse testificandum, quæ & calculo uexatis congruunt, & urinam, mensesq; prouocant. Planta, quæ Græca uoce κύπερος, Latina Cyperus nuncupatur: Arabica, Saherade: Germanica, Vuilder galagan: Hispanica, Iuncia de olor, & Iuncia auellanda: Gallica, Souchet.

Cyperii uires  
ex Galeno.

Nomina.

## Cardamomum.

## Cap. V.

CARDOMOMVM optimum est, quod ex Comagene, Armenia, Bosphoroque deuehitur. in India quoque, & Arabia prouenit. Eligi debet plenum, frangenti contumax, occlusum, farctumque (quod enim huiusmodi non est, exoletum iudicatur) & gustu acre, subamarum, & odore caput tentans. Excafacioriam uim habet: potumque ex aqua facit ad comitiales, ischiadicos, tussis, neruorum resolutionem: item ad rupta, uulsa, torminalatas uentris tineas excutit. Ex uino autem potum, renibus, difficultati urinæ, à scorpione ictis, neque nō omnibus uenenum uibrantibus, auxilio est. Cum cortice radice lauri epota drachma, calculos comminuit: partus suffitu enecat: scabiem ex aceto illitum adimit. Et ad unguentorum spissamenta additur.

LEGITIMVM Cardamomum nostra tempestate nec cognosci, nec minus à mercatoribus, qui ex Syria, uel Aegypto aromata ad nos conuehant, deferri compertum habeo. Quo fit, ut medici, ac pharmacopœi in componendis medicamentis æquē errent in Cardamomo, atque in alijs compluribus, quod Cardamomi loco uarijs quibusdam seminibus, odoratis tamen, indifferenter utantur. Quorum primum Cardamomum maius: secundum Nigellam, quod melanthij est genus: tertium uerò Melegheetas, uel grana paradisi nuncupant; cum tamen eorum nullum nec Græcum, nec Mauritanum sit Cardamomum. quandoquidem aliud Græci, aliud uerò Afri pro Cardamomo intelligunt, ut apertissime testatur Serapio, qui quàm plurima simplicia medicamenta ex Dioscoride, & Galeno transcripsit. Is enim (ut sua declarant monumenta) Dioscoridis Cardamomum Cordumenum appellat. deinde auctore Isach Arabo sui Cardamomi peculiare caput instituit, idq; Saccolam sua lingua nominat: quin & duum esse generum tradit, alterum maius, alterū uerò minus. quorum nullum non modò Dioscoridis Cardamomo respondet, sed nec etiam ulli eorum, quibus officinæ indifferenter utuntur. Probatur itaque primum, quod omne officinarum Cardamomum Dioscoridis Cardamomum esse nō possit, pluribus tum notis, tum etiam qualitibus. quippe quod hæc in uniuersum parum, uel ferè tantillum densa sint, frangenti non contumacia, & gustui nihil amaroris relinquunt. Quod præterea ab Arabicis distent, si cum illis comparentur, facile disparitasprehenditur. siquidem Serapioni maius Cardamomum semen est plantæ, quod oblongis quibusdam concluditur capitibus, ijs sanè similibus, quæ è rosis prodeunt, granis obnigris, rotundis, pipere longè maioribus, in quibus minuta semina concluduntur, angulosa, farcta, & odorata: minus uerò nullo contegitur capitulo maioris modo, quanquam colore conueniant. Quod planè indicat, omne officinarum Cardamomum nec Arabum esse, nec pariter Græcorum, sed potius ab utrisque maximè differre. Quare putauerim, illud falsò sibi persuasisse Monachos, qui in Mesuem scripsere, quod Arabum Cardamomum minus illud semen sit, quod seplasiæ Melegheetas uocant, Andrea Bellunensis, qui Auicennam mendis expurgauit, auctoritate freti. Sed cum Bellunensis id asserat uulgari tantum opinione ductus; cumq; notæ minimè eorū sententiæ adstipulentur, errasse Monachi facillè deprehenduntur. Semina enim, quæ Melegheetas appellant (ut omnibus planè constat) capitulis excepta suboriuntur. Idq; minori Serapionis Cardamomo nō euenit. Crediderunt, Ruellius in suis de natura stirpiū libris, & Fuchsius in sua methodo, id omnino Mauritanorum esse Cardamomum, quod nos PIPER INDICVM, alijs siliquastrum appellant. uerum cum planta hæc folijs exeat hortensil solano similibus floribus luteolis, fructu longo corniculorū instar, qui primo exortu uirescat, maturus uerò adeò rufescat, ac leuore quodā ita pel-

Cardamomi  
consideratio.Monachorū  
error.Ruellij & Fuchij lapsus.  
Piperis Indici mentio.

## PIPER INDICVM.



terum maius, alterū uerò minus. quorum nullum non modò Dioscoridis Cardamomo respondet, sed nec etiam ulli eorum, quibus officinæ indifferenter utuntur. Probatur itaque primum, quod omne officinarum Cardamomum Dioscoridis Cardamomum esse nō possit, pluribus tum notis, tum etiam qualitibus. quippe quod hæc in uniuersum parum, uel ferè tantillum densa sint, frangenti non contumacia, & gustui nihil amaroris relinquunt. Quod præterea ab Arabicis distent, si cum illis comparentur, facile disparitasprehenditur. siquidem Serapioni maius Cardamomum semen est plantæ, quod oblongis quibusdam concluditur capitibus, ijs sanè similibus, quæ è rosis prodeunt, granis obnigris, rotundis, pipere longè maioribus, in quibus minuta semina concluduntur, angulosa, farcta, & odorata: minus uerò nullo contegitur capitulo maioris modo, quanquam colore conueniant. Quod planè indicat, omne officinarum Cardamomum nec Arabum esse, nec pariter Græcorum, sed potius ab utrisque maximè differre. Quare putauerim, illud falsò sibi persuasisse Monachos, qui in Mesuem scripsere, quod Arabum Cardamomum minus illud semen sit, quod seplasiæ Melegheetas uocant, Andrea Bellunensis, qui Auicennam mendis expurgauit, auctoritate freti. Sed cum Bellunensis id asserat uulgari tantum opinione ductus; cumq; notæ minimè eorū sententiæ adstipulentur, errasse Monachi facillè deprehenduntur. Semina enim, quæ Melegheetas appellant (ut omnibus planè constat) capitulis excepta suboriuntur. Idq; minori Serapionis Cardamomo nō euenit. Crediderunt, Ruellius in suis de natura stirpiū libris, & Fuchsius in sua methodo, id omnino Mauritanorum esse Cardamomum, quod nos PIPER INDICVM, alijs siliquastrum appellant. uerum cum planta hæc folijs exeat hortensil solano similibus floribus luteolis, fructu longo corniculorū instar, qui primo exortu uirescat, maturus uerò adeò rufescat, ac leuore quodā ita pel-

lenticum



lentium modo compressum, usque adeo acre, ut ori tantum admotum maxime linguam, & palatum exurat, exulceretq; ambo hac in re lapsi deprehenduntur. Nam etsi Indicum piper in hisce corniculis rosarum fere modo suum includat semen, reliqua tamen Serapionis Cardamomo nullis notis correspondent: hoc enim suis in uasculis globulos quosdam concludit, non lenticulis similes, sed rotundos, & pipere crassiores, qui intra se minutum quoddam semen continent. Huc etiam accedit, quod cum hoc piper corniculatum, tum semine, tum corniculis ipsis tanta sit acrimonia præditum, ut non modo mansuui, sed ori tantum admotum statim quasi ignis exurat, absurdum utique fuerit credere Serapionis Cardamomum esse, cum dixerit ipse uagis adstrictoria facultate pollere, quam acri. Ceterum scribit Auicenna maius Cardamomum grana ciceribus atris, minus uero lentibus minora proferre. Quod cum fortasse Ruellius haud recte percepisset, ei errandi ansam præbuit. quippe minori Cardamomo, non autem maiori semina lentium modo nasci ait Auicenna: quanquam Ruellius, ut suam tueatur sententiam, secus fortè legerit Auicennam.

Cardamomi  
genera ex Plinio.

Cardamomi  
uires ex Galeno.

Nomina.

Plinius lib. XII. cap. XIII. quadruplex esse Cardamomi genus scribit, sic inquit. Simile est amomo Cardamomum & nomine, & frutice, semine oblongo. Metitur eodem modo & in Arabia. Quatuor eius genera. uiridissimum ac piugue, acutis angulis, contumax, fricanti, quod maxime laudatur, proximum è rufo candicans: tertium breuius, atque nigrius: peius tamen uarium, & facile tritu, odorisq; prauum, quod uerius costo uicinius esse debet. Hoc & apud Medos nascitur. haftenus Plinius. Sed nescio quos auctores sit secutus. quandoquidem tam Dioscoridi, quam cæteris Græcis, unum tantum extet Cardamomi genus. In cuius defectu supponit Galenus aut myrtum, aut cyperum. Qui præterea Cardamomi meminit lib. VII. simplicium medic. his uerbis. Cardamomum est sane facultatis admodum calide, non tamen usque adeo, ut nasturtium; sed quanto suauius, magisque, fragrans est nasturtio, tanto & imbecillior ei calida facultas inest: nec enim ulcerare idoneum est uel ipsum per se illitum. Porro adiunctum habet quiddam etiam amaritudinis, qua lumbricos interficit, & cum aceto ualenter psoras detergit. Cardamomum, καρδάμωμον, quod non secus Latine atque Græce uocatur: Arabibus Cardamēni: seu Cordumēni: Germanis, Cardamomelin.

## Nardus Indicus.

## Cap. VI.



Duo Nardi genera: unum Indicum, alterum Syriacum appellatur, non quod in Syria proueniat, sed quod montis, in quo oritur, pars una ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex hoc Syriaci genere, præcipuum est recens, & leue, largam gerens comam, flauum colore, perquam odoratum, ac cyperum redolens, breui spica, amaro sapore, linguam siccante, quod diu in sua odoris gratia permaneat. Ex Indico autem Nardo quoddam Gangitis uocatur, à fluuio Gange, apud quem enascitur, montem præterfluente: quod genus ob multam loci, in quo prodit, uliginem uiribus infirmius est, atque procerius adolefcit, plures ferens spicas, ab unica radice comosas, unaque conuolutas, ac grauiter olentes. Montanum autem odoratius, spica breui ac mutila, odore cypero uicino, cæteras habens Syriaci dotēs. Est & genus quoddam, cui Sampharitico nomen locus indidit, frutice breui, in magnas se spargentes spicas, candidiore inter-

rim medio caule, hircorum uirus supra modum redolente: quod improbat. Madefactum uendi solet. quod uitium ex eo deprehenditur, quod candida sit spica, & squallida, suaque careat lanugine. Adulteratur sibi cum aqua, aut palmeo uino, inspissationis ponderisq; causa inspirato. Intueri autem oportet, si lutum radicibus insideat, & incerniculo puluerem excutere, eluendis manibus utilem. Vim habent excafactoriam, & exiccantem. Vrinam mouent: aluum potu sistunt: uuluerum profluvia, saniemque apposita supprimunt. Nauseæ ex aqua frigida auxiliantur, & stomachi rofionibus, inflationi, iecinori, regio morbo, renum uitij. Aquæ autem incoctæ fotu ad infesum, uuluerum inflammationibus medentur. ad glabras oculorum genas ualent: siquidem eas ad densiorem pilum reducunt. perfusis humore corporibus insparguntur. Miscentur antidotis, & in fistili nouo non picato ad ocularia medicamenta reconduntur, trita in farinam, & cum uino in pastillos coacta.

Nardi Indicæ  
& Syriacæ consideratio.

NARDVS officinæ Nardi spicam appellant. Sed non desunt, qui credant Indicam nardum in Italiam non aduehi ob regionis distantiam, Syriacam opinantes esse, qua nostro æuo seplasiarij utuntur: tamen si (ut inquit Dioscorides) in Syria non oriatur, uerum ideo Syriacam dici, quod ea montis parte proueniat, quæ flectitur ad Syrios. At cum inter Indos, & Syrios amplissimæ interponantur regiones, nempe deserta Arabia, Persis, Carmania, Gedrosia, Darangia, aliæque non nullæ, quæ ultra quatuor milla milliariorum continent, nesciuerim profecto, quoniam pacto fieri possit, ut mons ille ad Gangem positus, altera parte Syriam tam facile respiciat, ut Nardus ea parte proueniens Syriaca dici mereatur. Quo fit, ut quandoque mecum disquirere licuerit, eam potius à Syriacæ regione, quam ad Indicam fluuium est, Syrii nomen sibi asciuisse, quam à Syria. quandoquidem, si Ptolemeus uera refert, mons



in India uisitur, qui à Gange fluuio ad Syrtastem extenditur. Absurdum enim esset credere, Nardum ad nos non deferri ex India, cum in Syria nusquam proueniat, cumq; multa Indiæ aromata, nulla distantie habita ratione, per carouanas (ut uocant) in Alexandriam Aegypti contransportantur: cum quibus nec temere credendum est, quin Nardum etiam conuehant mercatores; præsertim cum certò sciant, Nardum Venetias ex Alexandria afferri: nec eam alibi; quam in India nasci, Dioscoridis testimonio satis apertè monstratur; etsi Plinius contrà scribat nasci in Syria Nardum, præter eam quam India mittit Syriacam Dioscoridi appellatam. Ceterum Manardus Ferrariensis, officinarum nardum nec Indicam, nec Syriacam esse censet. In cuius sententiam non equidem pedibus eo, etsi medicæ materiæ is clarissimus fuerit indagator. quippe quoniam Venetijs pluribus in locis Nardi ingentem copiam uidi, leuis, comose, perquam odoratæ, cyperum redolentis, flauæ, subamaræ, et mansæ non modo linguam exiccantis, sed odoranti etiam non iniucundum per os aspergentis, nullisq; deficientibus notis, quibus optima nardus ex Dioscoridis sententia explorari potest. Sed plerumq; accidit, dum per Indicam, et Arabicum mare in Alexandriam deferitur, et inde Venetias, ut a seculo sibi maris humore (id nanq; facile fit, quòd Nardus sit siccißima) uel situm contrahat, uel subputrescat: unde postea amissi suauolentia, grauius olcat. Quo fit, ut hac in re Manardum longè hallucinatum crediderim: qui si rectè expendisset, quæ Nardi pars sit spica, atq; in emporijs, ubi numerosa, præstantissimaq; uisitur, accuratius ipsam expendisset, non equidem uereor, quin aliter de ea scripsisset. Verum enim uero cum planè ignorasset, quæ nardi pars spica esset, selectamq; et incorruptam Nardum minime nouisset lib. VI. epist. I. I. I. scribit, Galenum de nardi spica, quæ antidotis admiscetur, loquentem, radicem quidem, non spicam intelligere. Et utinam, inquit, quæ nobis affertur, legitima esset: sed quòd ea ipsa non sit, cognoscitur, quòd nulla odoris suauitate commendetur. Et lib. V. I. I. epist. I. inquit. Galenus lib. I. de antidotis in theriacæ compositione Nardi radicem tantummodo adniscet, eo quòd uiribus ipsa præstantior sit: spicam uero paruipendit, et pro uibilo habet. Quod sanè declarat, Manardum hanc Galeni sententiam perperam accepisse, atque etiam Nardi historiam ignorasse. quandoquidem nardi radix nil aliud est, quam spica, ut ipsemet testatur Galenus eodem de antidotis libro, sic inquit. Iubet Andromachus adijcere nardum Indicam: ea uero est, quam spicam uocant, non quòd spica sit, radix etenim est; sed quòd spicæ formam referat. Quibus palàm est, idem esse nardi spicam, et nardi radicem, ut etiamnum declarat idem Galenus lib. IX. de compositione medicamentorum secundum locos in Philonis antidotum scribens; dum inquit. Quin et nardi ipsius drachmam unam coniiciendam censet, quam falsè nominis radicem dixit, quandoquidem spica nardi nominatur. Quapropter idem lib. VII. I. simp. medic. de Nardo caput facturus, illud inscripsit Nardi spica, utpote quæ pars sit in tota stirpe præstantior, minime quidem ignorans, se radicem nardi describere. Nam si sensisset, spicam à radice differre; eam planè silentio præterisset tanquam inutilem, et capiti nomen indidisset aut generaliter ab ipsa Nardo, aut à radice tantum, uti uiribus præstantiore. In hoc, ac longè maiori uersatur errore Brasauolus. siquidem suo de simplicium examine Nardi spicam non modò non esse radicem censet, sed nullius usus eam existimat, sic inquit. Venetijs spicam, caulem, et radicem emes, quanuis et ipsi adulterent. Iubeo autem radicem, et caulem emere, quoniam hæc apud antiquos auctores, ut Dioscoridem, et Galenum magis in usu medico sunt, quam spica: quippe folia abiicit Dioscorides; ad nos tamen spica non deferitur, sed radix. Hæc ille. Sed mehercule quantum ex Dioscoridis scriptis percipere potui, nunquam hætenus sum consecutus, quòd ipse ex omnibus nardi partibus aliam præferat, quam spicam. Quòd autem crediderit ipse spicam in Nardo uiribus magis præstare, quam cæteræ eius partes; quòdq; cum de Nardo scribit, tantum de spica intelligat, apertè ostendit, cum inquit. Ex nardo Syriaca dicta melior est recens, et leuis, largam gerens comam, &c. Quippe leuitas, ac comæ magnitudo, nullis nardi partibus, præterquam spicæ competunt; præsertimq; cum ipsa non uacet cæteris notis, quas illi tribuit Dioscorides. Ad hæc nulli sanè incompetum existimo, Dioscoridem huiusce libri initio in probandis tantum radicibus, quæ odore commendantur, operam impendere, nempe iridis, acori, mei, nardi, phasari, et huiusmodi stirpium generum, non autem in efferendis caulibus, floribus, folijs, ac spicis, quæ caulium summitatibus innascantur. Quo fit, ut etiam fateri liceat, Brasauolum ignorasse spicam ipsam esse nardi radicem: quin potius pro certo credidisse in plantæ ipsius nardi cacumine, non in radice oriri spicam, quæ tamen Galeno teste radix est, et cæteris nardi partibus præstantior. quandoquidem si aliter res se haberet, comoda longè plura radicibus ex more redderet Dioscorides, quam spicæ. Quòd præterea Galenus plus laudauerit Nardi caules, quam spicam (ut asserit Brasauolus) nusquam comper tum habeo. Ceterum quanta sententiæ inconstantia Nardi historiam idem descripserit, ex suo posteriori simplicium examine, in quo ultimam manum imposuisse fatetur, facile conicitur, dum senem secum colloquentem instruit, his uerbis. Ne igitur in his montibus nardum quæras, sed Venetijs spicam, caulem, et radicem emes. At sui ipsius statim oblitus uidetur non multis post lineis, cum inquit. Aliud uero sunt spica, et flos, quæ ad uos non afferuntur. Ex quo facile crediderim, ipsum non modò Nardi historiam confudisse, atque etiã, quod peius est, corrupisse; sed etiam sibi ipsi, uel potius seni uerba dedisse, primum nanq; ait Venetijs spicam, caulem, et radicem reperiri: mox spicam ad nos aduehi negat. Sed ante hos hac in re Plinium quoque grauius hallucinatum inuenio: quippe qui libro et capite XII. in Nardi ipsius historia longè dissideat à Dioscoride et Galeno, quin et à cæteris materiæ medicæ auctoribus, dum ita scribit. Nardum frutex est graui, et crassa radice, sed breui, ac nigra, fragiliq; quanuis pingui, situm redolente, cyperi odore, aspero sapore: folio paruo; densoq;. Cacumina in aristas se spargunt: ideo gemina dote laus, et Ruellius, ipsi quoque pariter aberrarunt. siquidem Ruellius (ut puto) nulla alia de causa asserit, se in officinis Nardum uidisse, cui inerant dotes omnes illi à Plinio redditæ, quam ut Plinianam tueretur lectionem. Quòd tamen falsum esse arbitramur. Ego enim tametsi Nardi quam plurimum in Venetijs officinis diligenter examinauerim, ac selegem; aliud tamen, quam spicam uidere mihi non licuit. Quapropter nullum inueniri Nardum existimo, quod

Manardi opinio reprobata.

Brasauoli error.

Plinii lapsus.

Ruell. &amp; Hermolai error.




Dilutio cuius-  
dam obiectio-  
nis.

Quod in caulium cacumine spicas proferat, quemadmodum tradidit Plinius, asserit Ruellius, & contendit Brasauolus, contra Galeni, & Dioscoridis sententiam. Qui Nardum describit plures ferre spicas, non quidem à caulibus, sed ab una tantum radice provenientes: non tamen quod alia radix uiribus præstans spicis ipsis subsit, sed quoniam, cum plures in radice sint spicae, necesse est, ut basi, uel firmamento aliquo consistant, à quo originem trahant, ut in allio & lilij radicibus conspicitur. Quod pro explorato confiteri possum, cum saepenumero Venetijs Nardi spicae cespites uiderim, tum figura, tum etiam spicarum connexu allium referentes, ut unusquisque pro arbitrio experiri poterit. Verum enimvero ut probè responsum sit omnibus ferè obiectioibus, dicimus, quod si fortè reperirentur, qui assererent illas esse proprias Nardi radices, quæ capillaceis fibris à spicarum basi oriuntur, ut in allio, capis, ac bulbaceis omnibus uisitur, & ea propter spicas ijs adnexas non esse Nardi radices, sed per se partes ab his admodum differentes, potest eorum obiectio facile dilui Theophrasti testimonio. Siquidem is lib. primo cap. x. de plantarum historia aperte declarat, in allio, capis, bulbis, lilij, ac alijs eius generis, & per consequens in spica non solum dici radices ea capillamenta, quæ bulbaceis illarum plantarum capitibus subiunguntur, sed etiam id bulbaceum totum, quod terra reconditur. Et ut res ipsa clarior omnibus sit, generali regula expressum uoluit, quod totum id in quauis planta, quod sub terra obruitur, radix commodissime dicatur. Proinde uidetur Nardum ipsam inter radices idem memorasse Theophrastus lib. ix. cap. vii. de plantarum historia, his uerbis. Quibus ad unguenta utuntur, hæc ferè sunt, cassia, cinnamomum, cardamomum, nardus, nærum, balsamum, aspalathus, styrax, iris, narta, costus, panaces, crocum, myrrha, cyperus, iuncus, calamus, sampsuchum, lotus, anethum. Horum alia radices, alia cortices, alia rami, alia ligna, alia semina, alia lacrymæ, alia flores. Quibus palàm est, non posse Nardum nisi inter radices recenseri, cum nec corticis, nec ligni, nec rami, nec floris, nec seminis, nec tandem lacrymæ speciem præ se ferat. Quod cum rectè sciuisset Galenus tum lib. i. de antidotis, tum ix. de comp. medic. secundum locos, Nardi spicam radicem esse declarauit. Verum longè ab omni Nardo distat NARDVS ITALICA, quæ nostris uulgò uocatur Spigo.

NARDVS ITALICA.

LAVENDULA.



Nardi Itali-  
cæ genera, &  
uirtutes.

Cuius etiam generis ea est planta, quam aliqui uulgò appellant Lauanda, alij uerò Lauendula: adeò ut hæc fœmina, illa uerò mas in eo genere à quàm plurimis uocentur. Mas folio constat latiore, longiore, crassiore, robustiore, albidiorèq; quàm fœmina. Sed utraque planta fruticosa, & rosinarini modo, innumeris referta est folijs: è quorum medio iuncea exeunt canliculi, quadranguli, tenues, dodrantalem longitudinem excedentes: in quorum cacumine flores exeunt spicati, colore purpureo, quauis in fœmina dilutiores, patentioreq; odore fragrant, uerum usque adeo acuto, ut nares feriat. Excalfaciunt, & exiccant ambo ordine secundo completo, uel tertio inchoante, uiribus à Nardis omnibus non longè recedentibus. Conferunt omnibus cerebri ægritudinibus à frigido proueniētibus: comul-  
sis, resolutisq; auxiliantur: uentriculū roborant, & iecur ab infarctū liberant: quin & obstruosos lienes inuant: uterum



rum calefaciunt, & menses, & secundas educunt. Fit ē floribus stillatitium oleum vitreis organis, quod proprie unguentarij unguo vocant olio di Spigo, odoris adeo acerrimi, ut cetera odoramenta superet. quo fit, ut extra officinas illud afferuent, ne moschi, ambari, zibetti, aliorumq; unguentorum, & aromati suauitatem intercipiat. Nardi Indicę vires scripsit Galenus lib. VII. de simplicium medicamentorum facultate, sic inquit. Nardi spica ex calfacit excessu primo, & desiccatur secundo iam completō. Composita est ex adstringente sufficienter substantia, & acri calida non multa, & quadam leuiter amara. Ex his constans facultatibus radix & ad iecur, & ad stomachum rationabiliter conuenit, tum pota, tum extrinsecus imposita. Urinam cit, morsus stomachi sanat: in uentre, ac intestinis consistentes fluxiones desiccatur, ad hęc & eas, quę in capite, & thorace. Valentior est uocata Indica, nigriorq; quā Syriaca uocata. Nādos, & Nādos sāxos, sic Gręcis dicitur, ut Latinis Nardum, & Nardus, seu Nardi spica: Mauritanis, Stumbel, aut Seubel: Germanis, Edelfrembd, Vuolricchent, Spicken nardi: Hispanis, Azumbar, aut Espiga sil: Gallis, Aspic do ultremer.


Nardi Indicę vires ex Gal.

Nomina.

## Nardum Celticum.

## Cap. VII.

**CELTICVM.** Nardum nascitur in Liguria alpibus, aliungia patrio nomine appellatum: prouenitque in Istria. Exiguę fruticat, & cum radicibus in manuales fasciculos componitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido: florem luteum. Caulium, & radicum duntaxat vltus est; & odoris suauitas. unde pridie fasciculos aqua ablucere expedit, & exempta terra, pauco solo atque humenti, subiecta charta reponere: postridie repurgare. siquidem utile, cum aceroso alienoq; propter humoris uim, non excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quę hirculus uocatur, ab odoris grauitate. Sed facilis cognitio: nanque herba candidior est, sine caule, minus oblongis folijs, radice neque amara, neque odorata, uti nerum Nardum est. Itaque radices, atque cauliculi, abiectis folijs, triti secerantur, uino excipiuntur, digerunturq; in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, assuari debent. Laudatur maximē, recens, iucundi odoris, radice numerosa cohærens, plenum, nec fragile. Ad eadem, quę Syriacum, pollet: sed uehementius urinam cit. & stomacho utilius est. Inflammationibus iecinoris, & felle suffusus auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum absinthij decocto bibitur: item aduersus lienem, renum & uesicę uiria, & uenenatos ictus, ex uino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia unguenta.



**TANTA** fuit ueterum, qui nos præcesserunt, negligentia, ne dicam ignorantia, ut non modò in ueram simplicium medicamentorum cognitionem, quę peregrina ex longinquis terrarum partibus aduehantur, probatissimorum auctorum ope, uenire non elaborauerint; sed ne minimam quidem curam adhibuerint, communi reipublicę beneficio, ut de his saltem, quę in quā plurimis Italię locis, ac alijs non longē distantibus inueniuntur, quicquā lucis assequerentur, ac posteris relinquerent. quin potius in suis multò uidentur negligentiores, quā in alienis. Nascitur Celtica nardus in Liguria alpibus, nascitur & in Istria, pariterq; in montibus non longē à Villaco Carinthiæ oppido, & Indemburgio Stirię: attamen non ob id legitima in multis uisitur officinis: nec fortasse in ijs uideretur, nisi his nostris lucubrationibus annis superioribus Italico sermone editis, pharmacopole plures diligentiores redditi, medicam materiam accuratius expendere cœpissent. Sed id magis detestandum uidetur, quod ijs in regionibus, ubi Celtica nardus nascitur, magis ballucinentur homines, quā alibi. siquidem Genuę, quę Liguria est ciuitas (nisi iam admoniti resipiscant) alijsq; finitimis locis, ubi Celtica nardus facili haberi potest, tam uedici, quā seplasiarij aliorum ignorantiam secuti, illius loco, Lauanda sic uocata, uel nostrate Nardo passim utuntur. Quę quantum in historia omnibus notis, non dicam uiribus, à Celtica nardo discrepent, quicunque primū rem optime perpenderit, ac deinde notas, & qualitates illi à Dioscoride redditas, cum Lauandę, nostratisq; Nardi notis comparauerit, manifestum eorum lapsum facile incusare poterit. quippe Celtica nardus in breuem, densissimisq; plantam confurgit: Lauanda uerò, & socia nardus magno exoriantur cespite, ramusculis proceris, densissimisq; comantibus folijs. Illa folia fert subrubra, & flores flauo colore: hæ autem folijs confurgunt incanis, floribus spicatis, & colore purpureo sentibus. Illius caule, & radicibus utimur, quod hisce partibus maximē polleat: harum uerò tantum flores commendantur. Quod satis clarē demonstrat, quā facile decipiantur, qui tam leuibus & falsis feruntur opinionibus. Verum quāquam (ut in superioris Nardi mentione diximus) communi omnium sententia competiti sit, Lauandę, spicęq; nostratis facultas ad omnia Nardi genera propius accedere; hoc tamen eos ab errore non uindict, qui Lauandam Celticam nardum esse contendunt. Præterea non desunt pharmacopole rei herbariæ penitus ignari, qui

Nardi Celticę consideratio.

Seplasiariorū quorundā error,



pro Celtica nardo plantam quandam incognitam emant arborescendentem, caule longo reflexoq; , cuius folia, quæ colore subflauo constant, adeo densa ac minuta sunt, ut potius muscosam arborum, & lapidum materiam, quam aliud representent. At quod in uestiendis caulis ipsius ramusculis, eos tam dense circumdat, ut ferè spica effigiem præ se ferant, pro Celtica nardo ab impostoribus uenditur; sed hæc haud amarescit, nec ulla odoris præstantia commendatur. Ceterum ingens legitime nardi Celticæ proventus habetur in Stiria Austria, & Carinthiæ contermina, ubi Iudemburgensia rura suis è montibus quotannis innumeros comportant fasciculos, quibus magnos admodum replent saccos, & mercatoribus uendunt, qui in Syriam, & Aegyptum mercinonia conuehant. Siquidem (ut ferunt) Syrijs, & Aegyptijs Celtica nardus maxime expetitur, ut balneis eam imponant, quibus frequenter utuntur. Celticam nardum ad me primum misit Petrus Salicetus clarissimus medicus ex Grazio Stiria oppido: in cuius plantis & spica in radicibus, & folia, & flores in caule (ut appicta figura demonstrat) nullo impedimento cernebantur, adeo ut à Dioscoridis historia nulla ex parte recederent: nec ulla tamen spica in eius cacumine uidebatur, uti Ruellius & Brasauolus in Indica nasci scripserunt. Quamobrem nobis quoque iam liceat literis memoriæq; mandare, Celticam nardum non modò in Liguria, & Istria provenire; sed etiam in Stiria, Carinthia, ac etiam alijs fortasse locis. quippe superiore anno ego huius nardi nonnullas inueni plantas in quodam Vipaci monte, qui tantum uiginti millia passuum à Goritia distat, Verum si eo destituantur medici, commode Indicam supponere poterunt. An uerò Celtica nardus sit Saliunca, aut non, de qua Virgilius, & Plinius scripsere, etsi hæc inter se nullam habere cognitionem pluribus comprobare possem; cum tamen ea parum, uel nihil rei medicæ conferant, silentio inuoluenda duximus, quanquam eruditissimus Leoniceus non animaduertens Dioscoridem Aliungiam, non Saliuncam Celticam nardum appellasse, Plinium accusat, qua in re ipse potius deceptus fuisse uidetur; quemadmodum & Fuchsius, uir aliqui nostræ ætatis clarissimus. Is quidem in suo libro de componendis medicamentis, quem ultimo loco auctum edidit, ubi Diathamas non expendit, Celticam nardum à Saliunca nihil differre existimat, Plinius tamen locis separatis de utraque, tamquam herbis inter se differentibus tractauit. Neque eæ notis tantum dissident apud antiquos auctores, sed etiam natali solo. Dioscoridi enim Celtica nardus in Liguria alpibus, atque in Istria provenit. Plinio uerò Saliunca in Panonia, & Noricis nascitur. Itaque Fuchsius ut Ruellij sententiam secutus, qui Celticam nardum Dioscoridi Saliuncam appellari affirmat, ita mihi & à ueritate defecisse, & unà cum illo errasse creditur. quandoquidem Celtica nardus Dioscoridi ἀλιούγγια, non σαλιούγγια uocatur: Meminit Celticæ nardi Galenus lib. VIII. de simpl. med. facul. his uerbis. Nardus Celtica iam dictis nardis similis quadantenus in genere facultatis est. Ceterum ad omnia imbecillior, præterquam ad prouocandam urinam. si quidem calidior illis est, sed minus adstringit. Quæ plantæ Græcis νάρδος κελτικὴ, Latinis item Nardus Celtica: seu Nardum Celticum appellatur: Italis uerò Nardo Celtico.

Leoniceus, & Fuchsij opinio.

Nardi Celticæ vires ex Galeno.

## Nardum montanum,

## Cap. VIII.

MONTANVM Nardum, quod ab aliquibus thylacitis, & niris appellatur, in Cilicia, & Syria nascitur: caule & folijs eryngio similibus, minoribus, minimè tamen spinosis, asperisque. Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu hastule regie, sed longè gracilioribus, † & longè minoribus. † Neque caulem, neque fructum, neque florem profert. Ad eadem, ad quæ Celticum efficax.

Nardi montanæ consideratio.

VIDETVR in hoc capite Dioscorides non parum à se ipso dissentire, quod scripserit primum montanum Nardum caule, & folijs esse eryngio similibus: mox prope capitis calcem eam scribat neq; caulem, neq; fructum, neq; florem proferre. Quapropter existimant tum Ruellius, tum etiam Marcellus id facile accidisse scriptorum incuriam, qui uocum uicinitate decepti καυλός pro κλῆδος, uel κλῆδας scripserunt. Verum cum hæc dictiones ramos, uel surculos designent, quæ nomina potius arboribus conueniunt, quam herbis, sintq; idem rami in arboribus, quod caules in herbis; idcirco non uidetur hic locus, ut illi fortasse putant, à mendis uindictus. Ceterum non crediderim ego, Dioscoridem, qui est hac in facultate facile princeps, & quem antiqua, & secuta ætas tantopere commendat, in tantis paucis sui oblitum, adeoq; turpiter lapsum fuisse, quinimo nobis relinquitur suspicio, quod omnino in altera capitis parte uitium aliquod acceperit, non harum uocum uicinitate, sed potius scriptorum dormitantium negligentia, uel uigilantium temeritate. Quo factum est, ut hætenus incertus dubiusq; fuerim, an hæc planta in Italia proveniat, uel aliunde eò afferatur. Quidam tamen ex his, qui rei herbariæ dant operam, ad nos hoc anno stirpem misit, cui binæ inherabant radices asphodeli figura, sed longè minores, pbu, uel nardum redolentes: adeo ut hac parte montanum Nardum pulchrè præ se ferre uiderentur. Sed quoniam folia, & caulis plu potius referebant, quam eryngium, quemadmodum & umbella, cur eam montanum Nardum fuisse comprobem, sanè non habeo: cum planè sciri non possit, an in priori, an in posteriori, an in alia huius capitis parte lateant menda. Itaque si fortè aliquod ad manus esset medicamentum, quod Montanum nardum exciperet, supponant audacter pharmacopola Indicam, uel Celticam. Tamen si in suo de simplicium examine asseueret Brasauolus Ferrariensis Indicæ nardi uice montanæ plurimum ad nos asferri è Cilicia; eamq; propriè montanam existimat, cuius passim in officinis est usus. Sed qua ratione ductus nouam hanc protulerit opinionem, ipse certè nescio: Nardus enim montana radices habet asphodelo similes, non utique spicas, leues, comosas, quemadmodum ea, qua utimur ex India aduecta. Nisi fortasse Brasauolus uoluerit Indicam nardum ideo montanum appellare, quod in montibus oriatur. Ita quidem eius sententiam ueram esse putarem, non tamen à rei herbariæ peritis acceptam iri. Nardi montanæ vires scripsit Galenus lib. VIII. simp. med. sic inquit. Νάρδος ὀρεινὴ Græcis, Nardus montana, siue Nardum montanum Latinis, Nardo montano Italis nominatur. † In

Bras. opinio non accepta.

Nardi montanæ vires ex Gal. Nomina.







Quamobrem subeuntibus cutem aquis, fellisq; suffusionibus datur maximo inuamento uino maceratum. Confert item diuturnis febribus, ijsq; presertim, quæ ex contumaci infarctu proueniunt. Oleum macerationis ipsius admisto ladanum, dorseti spondylis inunctum sudorem commouet: leuiter tamen coqui debet, nam si diu ferueat, uim fere omnem deperdit. neque etiam diuturnum indiget contritione: diutius enim contritum facilius uomitiones, quam aluum ciet.

Asari uires  
ex Galeno.

Asari meminit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Asari radices utiles sunt, facultate similes radicibus acori, intensiores tamen. Itaque ex ijs, quæ de illis prodita sunt hic faciendæ coniectura. Hactenus Galenus. A cuius sententia (sit tamen cum uenia dictum) maxime dissentio. siquidem cum nulla in acoro deiectionis sit facultas, et Asarum, ut Dioscorides inquit, Mesues fatetur, et nobis experimento compertum est, ueratri modo expurget, et bilem, pituitamq; et supernæ, et infernæ propellat, non uideo sanè, cur acoro in omnibus suis facultatibus tam facile comparari possit. Planta Græcis ἀσάρον ac etiam ῥέπος ἀγρία uocata, Latinis Asarum, et Nardum sylvestre appellatur: Arabibus, Asaron: Italis Asaro, et Bacchara: Germanis, Hasel uurtz: Hispanis, Asara baccara: Gallis, Cabaret.

Nomina.


† Hæc uerba ut in Ruellio inuenimus, ita reliquimus. Sed admonendum esse lectorem duximus, ea non legi in Græcis nostris codicibus, neque à Serapione referri. quod argumento est illa Dioscoridi accreuisse. Sufficionem augere, uel potius ita esse confirmare potest Oribasius, qui Dioscoridem transcripsit, et hæc uerba non habet. Sunt tamen Græcè sic scripta: ἔχον καυλίᾳ γωνιοειδῇ, ὑποτραχέα, ἀσπεύ. Id est: Habens cauliculos angulosos, subasperos ramos.

Phu magnum.



Phu.

Phu paruum.



CAP. X.

PHU, quod & aliqui sylvestrem nardum appellant, nascitur in Ponto: folio olusatri, aut elaphobosci: caule cubitali, aut altiore, læui, cauo, molli, in purpuram uergente, geniculis intercepto: floribus narcisso proximis, maioribus, tenerioribus, & ex albicante purpureis: radice superius ad digitum minoris crassitudinem, ex obliquo uillosa in nigri ueratri, aut iunci odorati modum: capillamentis inuicem contextis, flauescens, odoratis, cum quadam odoris grauitate nardum æmulantibus.

Excalfacit: urinam mouet, si sicca potui detur. Decoctum eadem præstare potest. ad lateris etiam dolorem efficax: mensis cit. antidotis inferitur. Adulteratur radice rusci admixta. Sed maleficium deprehenditur: quoniam hæc dura est, & frangenti contumax, sine ulla odoris gratia.

Phu consideratio.

NON possum non fateri, eos omnes bene sentire, qui maiorem Valerianam sic uocatam, quæ passim in Italia nascitur, legitimum esse Phu asserunt. Quippe radices primum forma, odore, colore, ac cæteris in uniuersum notis ab ijs,



ijs, quæ sibi Phu ipsum adsciscit, haud quaquam recedunt. Inducant idem & folia, & caules: illa enim olusatro non sunt dissimilia: hi uerò adolefcunt cubitali mensura proceriores, leues, inanes, molles, gemculati, & in purpuram uergentes. Flores tamen ob stare uidentur, qui in Phu lilij, uel narcissi effigiem præ se ferunt, non autem umbellæ, uel narcissi speciem, ut in maiori Valeriana uisuntur: quanquam flosculi per se omnes, qui umbellam conspiciunt, forma narcissinos referant, in purpuram albicantes. Quo fit, ut cum Ruellio existimandum putauerim, hæc de floribus uerba esse à scriptoribus in Dioscoride deprauata. Nanque uidetur nostras Valeriana, omnibus tum notis, tum qualitatibus adeo cum Phu conuenire, ut re uera dici possit, non aliud, quam ipsum Phu ad unguem referre. Etsi non desint (ut audio) qui profiteantur Phu alterum à Valeriana se innuisse, quod floribus narcissi proueniat. At quia id pro certo compertum non habeo, & quia non desunt, qui talia fabulentur, non est, quid hac in re certi affirmare possim. Est & Valeriana alterum genus, quod minus appellant, cuius caulis iuxta folia, quæ quadantenus maioris similitudinem referunt, molli lanugine pubet, reliqua uerò parte maiori non absimile assurgit, floribus subpurpureis, in umbellæ similes cœmentibus. Radices mittit hæc tenues, quæ in multifidas conglomerantur fibras, odore misto inter iridem, & nardum. Vtraq; odore commendatur: proinde eas uestibus quidam interponunt. Phu (ut scriptum reliquit Galenus lib. viii. simplicium med.) odoratum quodammodo est. Huius herbæ radix nardo uiribus similis, sed tamen ad pleraq; infirmior. Vrinam plus mouet, quam aut Indica, aut Syriaca nardus: similiter autem ut Celtica. Simile Phu asserit ipse Galenus esse Carpesium, cuius cum nullibi meminerit Dioscorides, ut recte sciri possit quidnam senioribus Græcis fuerit Carpesium, in primis Galeni testimonio eius uires & formam describam: is enim lib. vii. simpl. med. sic habet. CARPESIUM simile est uocato Phu, non gustu tantum, sed & facultate. Sed plus habet tenuitatis: proinde magis eo etiam uiscerum obstructions extergit, & urinam mouet, renesq; calculis degranatos expurgat. Non tamen cætemus tenuium est partium, ut liceat loco cinnamomi, si non ad manum sit, usurpare, sicut i faciebat Quintus. Prestantius est Carpesium ponticum laertio: non tamen uel ipsum cinnamomi uiribus nicinum est, imò non paruo detrius optima cassia. Nuncupatur utrunq; à montibus quibusdam Pamphiliæ, in quibus nascitur. Ingensq; eius prouentus est in Syria. Et primo libro de antidotis inquit. Quintus (ut aiunt) quoties cinnamomum deerat, Carpesium, ut quod uiribus nihil ab optima cassia differret, in theriacæ compositione imponebat. Ego ideo eius plurimum mecum attuli ex ea peregrinatione, qua orientis prouincias adi, diligenterq; repositum nunc usq; multum seruo: quod odorem etiamnum & saporem, si non qualem prius habebat, certè nondum exoletum retinet. Est autem Carpesium herbæ phu appellato genere similis, ualentior tamen, atq; odoratum quiddam spirans. Plurimum hoc in Sida Pamphiliæ nascitur, emiturq; propterea illic uilissimo pretio. Quocirca si quis uestrum illuc accesserit, Carpesij plurimum emat, cum id sibi longo tempore duraturum noverit. Tenuia autem sunt sarmenta, cinnamomi uirgultis similia. Eius duo reperiuntur genera; unum quod laertium, alterum, quod ponticum cognominatur, à monte, in quo nascuntur, utraq; nomen adepta, sed poticum melius est. Quod cum eius non parum haberem, per multis medicamentis admiscui, in quibus phu uocata imponi debuerat. Est enim Carpesium phu simile, ualentius tamen, & in quo (ut dixi) nonnihil odorate qualitatis gustu odoratq; sentitur. hæcenus Galenus. Verum quid hac tempestate sit Carpesium, arduum sanè fuerit explicare & mihi, & cæteris materie medicæ scriptoribus. Tametsi Hermolaus, Ruellius, Fuchsius, ac etiam Monachi Mesuem exponentes pro certo exploratum habeant, Auicenna, Serapionis, & Actuarij auctoritatibus inuixi, fructus piperi similes, qui uulgo Cubebe uocantur, legitimum esse carpesium. Siquidem Serapio quod Galeno carpesium uocatur, sub cubebe nomine ipsius Galeni testimonio sic describit. Cubebe est medicina facultate, & sapore phu non absimilis, quanuis longe tenuior. quare obstructions totius corporis aperit, urinam ciet, & calculos renum pellit. In hac ferè sententia uersatur & Auicenna cubebas carpesium appellans: quemadmodum & Actuarius, qui Mauritanorum nomina secutus, in quibusdam medicamentis Carpesium imponit, quod à barbaris *καρβέβας* uocari ait. Quibus auctoritatibus luce clarius patet, quod Galeni carpesium, & Arabum cubebe nulla ex parte differunt. Veruntamen illud animaduertendum est, quod eos in errore uersari existimem, qui credunt (ut Hermolaus, Ruellius, & Fuchsius) uulgares seplasiariorum cubebas illas referre, de quibus scripsere Serapio, Auicenna, & Actuarius. quandoquidem qui dixerit cubebas plantæ fructum, uel semen esse, eorum reperio neminem: nec minus probari posse putem, id usquam dixisse Galenum. qui carpesium describit his uerbis. *κατὰ δὲ ἐστὶ τὰ κάρβον, παραπλησια τοῖς ἀρβέβοις τὴν οὐρανίαν*. hoc est. Sunt autem tenuia sarmenta, cinnamomi uirgultis similia. Ipsumq; phu & odore, & facultatibus adsimilat. Quapropter cum tantum phu radices in usum medicum ueniant, facile dici potest, carpesium Galeno potius radicem esse sarmenta, quam caulium, & præcipue cum asserat diu asseruari posse. quandoquidem solidiores sunt radices, quam caules, qui facile in omni barbarum genere flaccescunt, & pereunt. Preterea cum Galenus aliàs cinnamomi uirgulta ellebori radicibus comparauerit, hic mirum uideri non debet, quod idem contrà sarmentosa carpesij radices cinnamomi uirgultis similes fecerit. Adde etiam, quod in plantis non solum caules sarmentosi, uerum etiam radices plures sarmentosa Dioscoridi appellantur. Quo fit, ut crediderim Fuchsiū in suis Paradoxis immeritò impugnasse Leoniceum. Ad hæc gustantibus nobis uulgares officinarum cubebas, nullum prorsus phu saporem deprehendimus. Quod manifestè indicat uulgares cubebas, nec Arabum cubebas esse, nec Galeni carpesium. Ob id igitur, ubi apud Græcos carpesium medicamentis admistum reperitur, & cubebe apud Mauritanos, phu eorum uice, cum sit carpesio in omnibus persimile, uel cassia, potius quam cubebe uulgaris usus, erunt subiicienda. Iacobus Syluius inter recentiores apprime doctus, quanquam nonit cubebas nostrates carpesium non esse; non tamen animaduertit, nec etiam Serapionis, aliorumq; Arabum esse cubebas. Aberrauit in cubebarum historia etiam Serapio, quippe quicquid Dioscorides de rusco scriptum reliquit, is cubebis perperam reddit. Cuius autem stirpis fructus uulgares CUBEBAE sint; quid affirmare possim non habeo, cum ex orientali plaga nobis peregrinæ afferantur. Etsi eas dixerim odoratas esse baccas, racematim coherentes, corymborum hedera modo: qui

Valeriana maior.

Valeriana minor.

Phu uires ex Galeno.

Carpesij consideratio.

Quorundam opinio.

Hermo. Ruel li &amp; Fuchsi error.

Serapionis lapsus. Cubebarum uulgariū consideratio.



Nomina.

gustui præter odoris gratiam, acrimoniam & amaroris tantillum relinquunt. Quibus constat, quod excalfacere ualeant tertij ordinis initio, & siccant in fine eius. Quamobrem languentem ex pituita uentriculum, uel etiam ex flatu roborant: pectus à lentis crassisque humoribus expurgant. Lienem iuuant, flatu discutiunt, & frigidis uteri affectibus auxiliantur. Diu cum mastiche mansæ, pituitam à capite trahunt, & cerebrum roborant. Quod & u Græcis omnibus, aliquibus etiam ἀγρία λέγεται dicitur: Latinis, Phu, & sylvestris Nardus: Arabibus, Fu: Italis, Valeriana: Germanis, Baldrian: Hispanis, herua benedicta: Gallis, Valeriane.

## Malabathrum

## Cap. XI.

MALABATHRVM arbitrantur aliqui esse Indici nardi folium, falsi quadam odoris cognatione: permulta enim nardum olent, quemadmodum phu, asarum, niris. Secus autem res se habet: nanque Malabathrum folium sui generis est, quod Indicæ gignunt paludes, lentis palustris modo innatas aquis, sine radice. Id collectum statim lino transfuitur, & siccatum reconditur. Tradunt siccatis æstiuo feruore aquis, humum aridis fruticibus uri: quod ubi non euenerit, ne amplius quidem renasci. Laudatur recens, ex candido nigricans, integrum, nec fragile, odore caput feriens, quod diu in sua ui odore permaneat, & nardum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirmum uero, & minutim contusum, præsertim si cariosum uirus olet, uitiosum est. Eisdem nardo fortitur uires: sed efficacius omnia prestat. Vrinam uehementius ciet, ac stomacho magis prodest Malabathri uis. Lippitudinibus, inflammationibusque tritum, & in uino seruifacitum commodè illinitur. Subditum lingue, oris halitum, & suauitatem commendat. Vestium quoque odorem interpositum seruat, & ab erosione tuetur.

Malabathri  
consideratio.

MALABATHRVM, quod plerique folium Indicum uocant, qui hac ætate uiderit, habeo neminem. Nasceitur (ut Dioscorides inquit) in India palustribus tantum locis, aquis absque radice innatans, lenticule aquaticæ modo. Sed nec inde amplius ad nos aduehitur, quod fortasse indigenarum culpa perierit in India, quemadmodum & balsamum in Syria. Etenim Dioscorides refert, Malabathrum non renasci, nisi siccatis æstiuo feruore aquis, humum aridis fruticibus peruratur. Quod cum iamdudum forte non sit à natura factum, uel potius sit ab indigenis omissum ob eorum negligentiam, facile postea euenire potuit, ut Malabathri genus omnino deperditum sit. Plinius lib. XII. cap. XXVI. duorum generum, quorum alterum arboris cuiusdam Syriacæ folium esse ait, his uerbis. Dat & Malabathrum Syria, arborum folio composito, arido colore, ex quo exprimitur oleum ad unguenta. Fertilius est eiusdem Aegyptus: laudatius tamen ex India uenit. In paludibus ibi gigni tradunt lentis modo, odoratus croco, nigricans, scabrumque, quodam salis gustu. Minus probatur candidum. Celerrimè situm in uetustate sentit. Sapor eius nardo similis esse debet sub lingua. Odor uero in uino subseruifacit antecedit alios. hætenus Plinius. Qui tamen præter Dioscoridis sententiam præstantius Malabathrum duxit, quod falsum est, non quod insulsum. Ceterum non desunt, qui Indici folij loco, cassiæ odoratæ, uel cinnamomi folia suppeditent, quæ esse caryophylli existimat Brasauolus. Nonnulli præterea, quædam arborum folia, ex Alexandria aduecta, quæ lauri, uel arbuti frondes referunt, in Malabathri usum uendicant. Hæc Hermolaus, Ruellius, pariterque Brasauolus eos secutus, nulla (quod equidem sciam) auctoritate, Nigritarum Tenabulum esse arbitrantur. Verum cum adhuc eorum, qui Tenabuli historiam, & uotas scribant, inuenerim profectò neminem, quanuis de eo Auicenna breuiter scripserit; idcirco illa potius asseram arborum folia esse nobis penitus incognita, quam horum sequar opinionem. Nullo itaque modo hæc ad usum ueniunt admittenda. siquidem cum eorum saccultates nos lateant, non est cur ea comprobare ualeamus. Sed ubi Malabathro opus sit, cassiam odoratam, uel Indicæ nardum supponendam putamus, Galenum secuti. qui ita decreuit tum in succidaneis, tum etià lib. VII. & VIII. simplicium medicamentorum. Quamquam Fuchsius in libro, quem de compositione medicamentorum nonisimè edidit, dum ea perpendit, quæ Auream Alexandrinam consciunt, Malabathri loco Atractylum statuit subiiciendam, Galenum (ut inquit) in libello de substitutis medicamentis secutus. Sed certè non satis possum mirari Fuchsium, uirum alioqui doctrinæ & iudicio clarum, in hac re (ut mihi quidem uidetur) manifesta, minus rectè sensisse. Nam ut omittam, in libro illo de medicamentis, quæ inter se commutari possunt, qui tamen liber Galeno adscriptus censetur, me nupquam legisse, quod atractylis Malabathri uicem suppleat, sed cassia odorata, & nardi spica; est Dioscorides hoc loco, est Galenus locis antè citatis in simplicium censu: qui uno quasi ore fatentur, eandem uim habere malabathrum, quam nardum. Quorum equidem auctoritati grauissimæ longè satius adherendum existimo, quam ut temere fortasse sit atractylis in malabathri locum substituenda, præsertim cum nobis non desit copia nardi, & cassiæ odoratæ: atractylis autem uera hætenus, mea opinione, desideretur, ut libro tertio suo loco latius ostendemus. Quod etsi concedamus, hanc aliquibus compertam esse, tamen quis audebit ea uti pro malabathro? etenim nullus, quod sciam, atractylum odore commendauit: at malabathrum Dioscorides non solum odoratum facit, sed etiam idipsum ἐν τῇ οὐδυνῇ hoc est, in odoris bonitate permanere affirmat. Excalfacit Malabathrum (ut auctor est Auicenna) siccatur ordine secundo. Μαλαβάρων, καὶ φύλλον sic Græcè, Latine autem Malabathrum, & Folium appellatur: Italicè, Malabathro, & Folio Indiano.

Fuchsi opinio  
explosa.Hermolai,  
Ruel. & Bras.  
opinio.

Nomina.

## Cassia.

## Cap. XII.

CASSIA, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiam gignitur, crassi corticis sarmento: folijs piperis. Eligenda est fuluescens, pulchri coloris, corallij æmula, perquam angusta, longa,



ga, crassa, & fistulosa, gustu mordens, & cum aliquanto feruore astringens, aromatica, uinoso odore: cuiusmodi est, quæ ab incolis achy appellatur, ab Alexandria negotiatoribus daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, zigir cognomine, quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina usus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia, cui Mosylitico blasto, id est, germi cogno-  
men est: Reliquæ uiles, ut quæ asyphenum dicitur, nigra, insuauis, cortice tenui, ac rimoso: & quæ darca, & citto uocatur barbaro nomine. Similior huic est pseudocassia, quam ut explicari possit, quæ gustu coarguitur, cum nec acris, nec odorata sit, hærentemque medullæ corticem habeat. Inuenitur etiam lata quædam fistula, mollis, leuis, furculosa, quæ antedictæ præfertur. Damnatur can-  
dicans, scabra, hircinum uirus redolens, & quæ tenui fistula, & scabra cutē sit. Vim obtinet calfa-  
ciendi, urinam ciendi, siccaudi, & leniter adstringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, quæ præstandæ claritatis gratia concinnantur, & ad malagmata: lentigines tollit cum melle illita: menscs trahit: contra uiperarum ictus pota auxiliatur: aduersus intestinas inflammationes omnes, & renum uitia, pota proficit: sceminis in folio desidentibus, aut suffimentis, prodest ad dilatationem uulvæ. Et duplo pondere medicamenti mista, cinnamomi uicem supplet, si ipsum desit: nam eodem effe-  
ctus præbet: Ad plurima perquam utilis est.

## Cinnamomum.

## Cap. XIII.

CINNAMOMI genera plura, patrium sibi nomen uendicantia. Præfertur tamen Mosyliticum, quod cassiæ, cui mosyliti nomen est, aliquam referat effigiem: sed in eo genere recens, nigrum, ex ui-  
noso in cinereum uergens, læue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, perquam iucun-  
dè olens. Optimi ferè indicium, iucundi odoris proprietate constat: inuenitur enim cum optimo, eoque quod peculiare est, odor rutæ, aut cardamomo proximus. Insuper acre, mordens, & cum cal-  
factione quadantenus salsum, quod non citò confricanti asperum, aut frianti lanuginosum, læuibus tamen internodiis appareat. Si certior fieri uoles, uellito ab radice furculum. facilis est huiusmodi probatio: nanque fragmenta miscellanea quædam esse uidentur. Quæ autem melius spirant, suo ha-  
litu, cum nares primum consuluntur, olfactum expleant, deterioris dignotionem impediunt. Est etiam montanum, crassum, pumilum, fuluescens admodum. Tertium à Mosylitico, perquam sua-  
uiter olet, nigrum, fruticosum, paucis intercedentibus geniculis. Quartum fungosum, candicans, aspectu tuberosum, uile, ac friabile, magnam habens radicem, quæ cassiam planè repræsentat. Quin-  
tum genus odore nares feriens, subrufum, & cortice fulvæ cassiæ simile, tangenti firmum, minus neruosum, densa radice firmatum. Iis, quæ thuris, cassiæ, myrti, aut amomi odorem spirant, minus suauitatis inest. Deligito scabrum, album, rugosum: at læue, & lignosum circa radicem, ut inutile, reijcito. Est etiamnum simile aliud, cui pseudocinnamomo cognomen est, uile, inualidi odoris, so-  
lutarumque uirium. Vocatur etiam zingiber, cum tamen sit xylocinnamomum, præbens quandam cinnamomi faciem. Est autem lignosum cinnamomum, sarmenta longa robustaque ferens, odore longè cinnamomo inferiore. Sunt qui xylocinnamomum à cinnamomo genere differre dicant, quod à natura eius abhorreat. Cinnamomum omne excalfacit, emollit, & concoquit: urinam ciēt: tam-  
mens, quàm partus potum, aut ex myrrha impositum pellit: contra bestias, quæ uirus eiuculantur, uenenaque conuenit: caliginem pupillis oculorum obuersantem discutit: crassitiem extenuat: lentigines, & uitia cutis in facie ex melle illitum detergit: contra tussis, defluxiones, aquam subter cutem fusam, renum uitia, & urinæ difficultatem efficax est. Unguentis pretiosis inferi solet. Et in summa, magni ad omnia usus. Tritum uiuo excipitur, umbraque siccatum, quò diutius edu-  
ret, reconditur.

NATURA omnium rerum parens in hoc terrarum orbe quædam stirpium genera adeo inexorabilia procrea-  
uit, ut ne quàm plurimis quidem delicijs, blanditijs, officijs, obsequijsq; ea apud nos quispian retinere potuerit. Si-  
quidem stirpes ipsæ uiuere coactæ in hortis, uiridarijs, mitioribusq; Italiæ locis, ceu Tempe, omni amœnitate refer-  
tis. quemadmodum alpini homines delicias urbium, et maiestatem aspernantes, politicis moribus omnino neglectis, non alibi, quàm in suis mapalijs hilariter, ac iucundè uiuere possunt: ita et ipsæ relictæ celi clementia, hortorumq;  
amœnitate, spreto item fontium oblectamento, omniumq; urbanarum ac familiarium stirpium consortio in deserta so-  
litudinesq; suas, à quibus primam duxerunt originem, se tandem recepere. tantum patriæ, natalisq; soli amor in rerū natura potest. In quarum genere Cassia connumeranda uenit: quæ tanetsi in maiore illa Romania gentis fortuna mul-  
tis ac uarijs hortorū locis consita habebatur; nullibi tamen hac ætate (quod nouerim) in Italia, ne in tota dicam Eu-  
ropa inuenitur. Sed hæc de Cassia dixisse uolumus simplicium medicamentorum peritisimos secuti, qui (ut eorum te-  
stantur uolumina) nihil inuicem differre censent, Cassiam, quæ in arborum genere Dioscoridi, & Galeno recensetur, et eam, quæ antiquis in uer coronarias numerabatur herbas, quæq; olim passim circa apum aluearia serebatur in Ita-  
lia, quod ea maxime apes delectentur, et in hortis, et uiridarijs coronis maxime expetita. Verum enimuero lon-  
gè aliter hæc res intelligi postulat, quod aliam reppererim fuisse Cassiam (ut Dioscorides inquit) è felici Arabia alla-  
tam ex arbore (auctore Theophrasto) uiticis magnitudine, ab hac longe diuersam, quam apibus, et coronis serebat  
antiquitas. quandoquidem fuerit hæc herba, illa uerò arbor: præsertim cum nullus (quod sciam) extet auctor, qui po-  
steritatis memoriæ mandauerit, Cassiam adeo copiosam in Romanorum triumphis ex Arabia conuehi solitam, ut inde  
uulgari

Cassia con-  
deratio.Cassia odo-  
rata, & coro-  
nariæ disci-  
men.



uulgaris facta, ubiq; passim & reperiretur, & sereretur ab omnibus. Quod si forte euenisset, nunquam tamen mihi persuaserim, quod Galenus hac inscientia, & facultate omnium diligentissimus, & qui Romæ diu uitam duxit, Italicæ Cassiæ historiam silentio inuoluisset. Plinius lib. XXI. cap. IX. nonnullas memorans herbas, quorum folia odoris gratia in usum coronarum uenerant, inquit. Ergo in coronamenta folio uenere malothrois, spireon, trigonon, cneoreon, quod cassiam Higinus uocat. Id quod ante ipsum palam fecerat Virgilius Cassiam inter coronarias herbas recens in Bucolicis ecloga ij. his uersibus.

Tum cassia, atq; alijs intexens suauibus herbis,

Mollia luteola pingit uacinia caltha,

Vix humiles apibus cassias, rorenq; ministrat.

Nec circum cassiæ uirides, & olentia latè

Serpylla, & grauius spirantis copia thymbræ

Floreat, irriguumq; bibit uiolaria fontem.

Et in Georgicis lib. II.

Item Georgicorum lib. IIII.

Hæc Maro. Quibus palam est, Cassiam coronariam, & qua tantopere delectantur apes, herbam, non arborem fuisse. Quod etiam testatur Plinius libro superius citato cap. XII. his uerbis. Verum hortis coronamentisq; maxime aluearia, & apes conueniunt, res præcipui quæstus, compendijq; cum fauit. Harum ergo causa oportet serere thymum, apiastrum, rosam, uiolas, lilium, cytisum, fabam, eruilum, cunilam, papauer, conyxam, cassiam, melilotum, melissophyllum (lego myriophyllum) cerinthen. Hactenus Plinius. His itaq; rationibus, auctorumq; ueterum testimonijs innixus Theodorus cneoron Theophrasto cassiam appellat. Quamobrem potius fuerit credendum, cneoron Græcis uocatum antiquis coronariam fuisse. Cassiam apibus gratissimam, quam eam, quæ in India & felici Arabia prouenit, cinnamomo persimilis, odoramenti & antidotis expetita, & qua per longas ætates cinnamomi uice usi sunt medici. Neque tamen propterea opinioni nostræ refragari putamus Columellam lib. III. cap. VIII. de re rustica, ubi ita scriptum reliquit. Iudeam & Arabiam pretiosis odoribus illustrem haberi, sed nec nostram ciuitatem prædictis egere stirpibus: quippe cum pluribus locis urbis iam cassiam frondentem conspiciamus, iam thuream plantam, florentesq; hortos myrrha & croco. Nam quamuis concedi possit Columellæ, cassiam ex Arabia allatam urbis illustrandæ gratia Romæ suo tempore conspicuam fuisse in hortis procerum & imperatorum; hoc tamen non prohibet, quin cassia, quam prope apum aluearia passim seuit antiquitas, alia fuerit planta: præsertim cum hæc inter herbas coronarias, illa uero inter arbores odoratas recensetur. CNEORON autem describit Theophrastus lib. VI. cap. II. de plantarum historia, his uerbis. Cneori duo genera, aliud enim candidum, aliud nigrum. Candido folium cutaneum, oblongum, figura quasi oleagineum: nigro quale tamarici, carnosum. Candidum magis se humi spargit, odoratumq; est: nigrum odore caret. Radix ambobus, quæ altè descendit, grandis: ramiq; permulti, crassi, surculosiq; ab ipsa protinus telure, aut paulò superius sparsi, lenti admodum constant. Quamobrem hisce ad colligandum iunci modo utuntur. Germinant, florentq; post æquinoctium autumnii, & multum deniq; temporis florent. Hæc Theophrastus. Sed quantum plantæ oriantur in Italia, uel aliunde eò afferantur, quæ Cneoron referant, quid ueri referam sanc non habeo. Sed iam ad Cassiam odoratam redcamus. ob cuius cognitionem postmodum factum est, ut recentioribus medicis, in ea res superanda, inuestigandaq; multum negocij accesserit. Namq; hactenus tum medici, tum seplastarij (et si plures iam respiciant) odoratæ cassiæ loco quædam incognite arboris segmenta, nec odore, nec uiribus prædita semper capessunt. Veruntamen postquam nonnulli ætatis nostræ doctissimi uiri, stirpium historias diligenter examinarunt, detecta fraude, mercatores ex Alexandria mercimonia Venetijs comportantes, cum suam imposturam deprehensam cernerent, à negotio desciscientes in aliud nouum Cassiæ genus segmenta illa commutarunt. Quæ sanè præter odorem, pariterq; saporem, quibus ferè penitus exoluta sentitur, cassiæ à Dioscoride descriptæ admodum habetur consimilis. Quapropter nec eos errasse crediderim, qui dicerent, hanc Dioscoridis pseudocassiam esse. quippe & crasso cortice constat, & in eius cavitare lignosa etiam uisitur materies, paululumq; est odorata, minimeq; acris. Nonnulli hac non contenti, quædam uocati cinnamomi fragmina Cassiæ uice usurpant: quæ cum uulgo odore saporeq; commendentur, potius quercum, uel fagum, quam Cassiam referunt. Cæterum, ut dicam quid ego sentio, si quis fistulam, quam Cinnamomum perperam appellamus, & uulgo Camella, Cassiæ generibus rectè comparauerit, facillè nouerit uulgaris usus cinnamomum legitimam Cassiam procul dubio referre. quiniuo diligenter inquisituris, iudicijq; trutinæ examinationis huiusmodi cinnamomi ingentem copiam, quæ magnis saccis Venetijs in mercatorum repositorijs asseruatur, nimirum omnia illa Cassiæ genera, quæ à Dioscoride describuntur, facillè sese offerent. quandoquidem mercatores (ut semper assolent) ad expediendas deteriores merces bonarum lenocinio, quas illis admiscunt, pro uirili utuntur. Galenus itaq; libro primo de antidotis multa Cassiæ genera recensuit, ubi sanc Dioscoridem secutus, eam cæteris præferre satetur, quæ zigi cognomine dicitur, hancq; asserit cinnamomum usque adeò æmulari, ut essent, qui suo eodè eam cinnamomi loco uenderent. Quo fit, ut admirari non liceat, si hodie quoq; tot annis hac deducta, protractaq; consuetudine, ubique cassia pro cinnamomo uenundetur. Nec quidem longè aberrarent, si modò optimam seligerent: quandoquidem Galenus eodem loco palam prodit, Cassiam sæpe in cinnamomum transmutari, sateturq; se iam uidisse eximie Cassiæ ramulos omni ex parte cinnamomum referentes. Contra pariter inspexisse cinnamomi surculos Cassiæ prorsus persimiles: adeò ut asserat pro qualibet cinnamomi parte in componendis medicamentis duas et hæc cassiæ adhiberi posse. Describit item Galenus quoddam aliud deterius Cassiæ genus, quod tradit iuniorum Anadromachum Cassiam fistulam nominasse, cum fistularum modo, inanis cauq; sit, & crassi corticis: cuiusmodi in uulgari cinnamomo frequentissima conspicitur. Huius sanè ea uidetur esse generis, quam in suo consiciendorum pharmacorum libello præfert Cordus, quod uelit cassiam, præter Dioscoridis & Galeni sententiam, lubrici esse gustus. Porro Cassiæ odoratæ frustulum cum cortice & ligno suo interiore nuper dono mihi dedit Serenissimus Princeps Ferdinandus

Cneori descripio.

Medicorū, & seplastiariorū error.

Cassia legitima.



Ferdinandus Archidux Austrie dominus mihi clementissimus, ab integro ramulo abscissum, quem ille inter plures alias res non minus pretiosas quam raras, reconditum habet. Huius cortex colore quidem cinereo à nostro vulgari cinnamomo dissidet, non tamen odore ac gustu: quandoquidem māsus idipsum, quod vulgus Cannellam uocat, oripiane representat. At lignum, quod cortice contegitur, fragili constat materie, neq; ullo prorsus odore, saporeq; commendatur. Quare hinc facile colligi potest, corticis tantum eius usum esse: atq; etiam Theophrastum non ab rememoriae prodidisse, huius uirgas in frustra secari, recentiq; bouis corio hæc consui, ut uermiculis, qui ex eo nascuntur, lignū illud inutile erodatur. Ceterum odorata cassia meminit etiam Virgilius præter coronaria lib. II. Georg. ubi cecinit hoc carmine. Nec cassia liquidi corrumpitur usus oliui. Quin & Plinius Cassia meminit lib. XII. cap. XIX. his uerbis. Frutex & Cassia est, iuxtaq; cinnamomi campos nascitur, sed in montibus, crassiore sarniento, tenui cute, uerius quam cortice: quem contra atq; in cinnamomo leuari, & exinauri pretium est. Amplitudo fruticis trium cubitorum. Colos triplex: cum primum enicat, candidus pedali mensura: deinde rubescit addito semipede: ultra nigricans. Hæc pars maxime laudatur, ac deinde proxima: damnatur uero candida. Consecant surculos longitudine binum cubitorum: mox præsuunt recentibus corijs quadrupedum ob id interemptarum, ut ijs putrescentibus, uermiculi lignum erodant, & excanent corticem tutum acrimonia, & amaritudine. Probatur recens maxime, & quæ sit odoris mollissimi, gustuque quam maxime seruens, potius quam lento tepore leuiter mordens, colore purpureo, quæq; plurima minimum ponderis faciat, breui tunicarum fistula, & non fragili. Hæc Plinius, quorum plura à Theophrasto transcribit. Qui cassia historiam tradidit lib. IX. cap. V. de historia plantarum, eamq; fruticem esse amerinae magnitudine scribit: quæ cum nullo pacto decorticari possit à ligno, cortexq; tantum utilis sit, ob id hominum industria inuentum esse ait, ut corijs quadrupedum consuta, interius lignum uermiculis deuoretur. Ceterum planè hallucinantur ij, qui Cassia fistula loco, siliquam Aegyptiam, siue Cassiam solutiuam uulgo dictam, atra medulla, semine duro, lignosisq; membranis consarctam, medicamentis admiscuit Mauritanos secuti. siquidem Serapio, Auicenna, paterq; Mesues, siue sit ipsorum, siue interpretum lapsus, pari consensu Cassiam nigram Cassiam fistulam uocauerunt: legitimam uero Cassiam, de qua hic differit Dioscorides, Cassiam ligneam. Quamobrem certo crediderim, quòd cistera omnem censuram dici possit, in omnibus ijs medicamentis à Mauritanis inuentis, quæ Cassiam fistulam expetunt, solutiuam illam esse inferendam. Si uero in Græcorum monumentis (excipio Actuarius, & Nicolaum Myrepsicum, qui à Mauritanis multa acceperunt) Cassia fistula inuenta fuerit, uel in Mauritanorum compositionibus à Græcis traditis, Cassiam odoratam, à Dioscoride & Galeno descriptam, semper adhibendam existimo. Nisi medici secus intelligentes in eum errorem labi uelint, in quem Leoniceus quosdam ætatis nostræ medicos (quæ profecto imperitia multorum est) temerè incurrisse testatur, qui ad commouendos menses, difficiles partus, remorantesq; secundas, Cassia deiectionis corticibus, odorata loco usquequaq; utebantur. CINNAMOMVM uero, quod legitimum sit, quanquam diu multumq; tunc Venetijs, tunc Neapoli, & apud mercatores, qui ferè quotannis in Alexandriam nauigant, diligenter conquisiuerim, nusquam id tamen mihi uidere licuit, neq; etiam percipere potui, num hoc tempore apud magnos negotiatores, qui è Lusitania Indiam, & felicem Arabiam classe paratissima petunt, uel apud quempiam principem, regem, uel imperatorem legitimum reperiri possit. Quæ de re minime demiror, cum & Galeni tempore huius magna in Italia fuerit penuria, adeo ut Cinnamomum nullibi reperiretur, nisi apud Imperatores, qui admirabili custodia inter alia pretiosa illud asseruari curabant. Cuius rei historia in medium affert Galenus libro primo de antidotis, sic inquit. De Cinnamomo contraria ijs, quæ de opobalsamo narrauimus, compertum habeo. Persuasum namq; mihi est, ipsum omnium cognitu facillimum esse illis, qui sæpe optimum cinnamomum uiderint. Optimum uero consequi nemo potest, nisi repositum ab imperatoribus inueatur, sex generibus quodammodo distributum. siquidem & in hoc ipso, uelut & in cassia, optimi ad deterrimum tam magna differentia est, ut optima cassia à pessimo cinnamomo parum distet. Neq; uero Cinnamomi uirtus ad usum apta longo tempore durat: ad triginta siquidem annos, quam à principio uim habuit, integram non conseruat. Nugantur autem, qui Cinnamomū ex hisce medicinis esse dicunt, quæ sanectutem non sentiant. Atqui ego non centum, neq; ducentum annorum interuentu, sed pauciorū, si quis ad tantum uenerum conferat, iam aliquam mutationem uetustiori cinnamomo factam obseruari. Quo tempore siquidem Antonino imperatori theriacam parauit, uasa lignea, in quibus eiusdem generis Cinnamomum inerat, multa conspexi, alia Traiani, quædam Adriani, nonnulla Antonini, qui post Adrianum imperator fuit, ætate reposita: omniaq; hæc sese & saporis, & odoris imbecillitate, uehementiaq; tantum planè superabant, quantum & tempore differebant. Olim è barbarorum terris arca cubitos quatuor & medium longa, Romam perlata cum fuisset, in qua Cinnamomi primi generis integra arbor erat, ex eoq; Marco Antonino imperatori antidotū quandam composuissim, ipsam ceteris multum præstare, deprebendi, adeo ut Imperator quoq; ea degustata medicine concoctionem, uelut in alijs fieri solet, expectare noluerit, sed statim ea usus sit nondum integre duobus mensibus elapsis. Antonino subsecutus est Commodus, qui nec theriacæ, nec cinnamomi curam ullam habuit, sub quo non solum arboris illius, quod superauerat, omne dissipatum est, uerum etiam quodcumq; post Adriani tempora comportatum fuerat. Quo factum est, ut nunc imperator noster Seuerus, cum me sibi antidotum eo modo conficere iussisset, quo Antonino confeceram, ex Cinnamomo Traiani, & Adriani tempore reposito sumere coactus sim, imbecillioraq; planè mihi uisa sunt, & tamen nondum anni triginta intercesserant. Hic nos optimi Cinnamomi notas quasdam necessarias subijcere uolumus, ipsum scilicet summopere bene olere, inexplicabilem præ ceteris bonum quandam odorem spirare, ac calidum gustantibus se multum exhibere, non ita tamen ut mordicando tristitiam palato inferat: colorem deniq; talem habere, qualem si quis lacti nigrum colorem admisceat, atq; cærulei, quem uocant, aliquantulum addat. Ex hoc igitur quantum uolebam, ut mos mihi fuit, cum accepiissem, ramusculos paucos apud me reposui in ea apotheca, in qua res meas omnes pretiosas seruabam. uerum ipsa combusta, qua tempestate & delubrum pacis incensum est, & hæc & alia quinq; Cinnamomi

Error quorūdam.

Cinnamomi consideratio.

Cinnam. hist. ex Galeno.

Cinnamomi optimi notæ.



Cinnamomi  
penuria unde  
hic.

Opinio quo  
rundam falsa  
est.

Cinnamomi  
differentia ex  
Theoph.

namomi species, quas mihi conquisteram, periire. Nunc itaq; cum imperatori nostro Seuero theriacam componere, ex Cinnamomo Adriani tempore reposito, quod optimum uisum est elegi, de quo etiam utile quiddam lecturis subdere, cum possim, id facere non grauabor. Super sunt adhuc ibi multa uasa lignea, quae omnia habent plurimum radicum, uel plurimum ramorum, uel ut quispiam dicere uelit, Cinnamomorum differentias: nullum tamen ueluti truncus, in ramos plures diuisus attollitur, sed ueratri utriusq; figuram praese fert, atq; etiam magis damasonij uocati, quod e Creta ad nos adfertur. Quaeuis autem Cinnamomi species ab una radice, seu frutex quiddam paruus consurgit, emitte titq; haec sex, illa semptem uirgulta, uel paulo plura, paucioraue, non aequali tamen omnia longitudine sunt: uerum quod maximum est, pedis Romani dimidium non excedit. Vniuersa autem Cinnamomi natura similis est quodammodo optima casia. Haecenus de Cinnamomo Galenus. Cuius uerba hic recensere libuit, ut omnibus palam sit, quod cum sub ijs tam magnis Imperatoribus, qui toti fere orbi imperabant, tanta esset Cinnamomi penuria, admirari non debeamus, si se nobis penitus incognitum, rarissimumq; reddiderit. Sed potius id mirum fuerit, quod cum hac etate casia plurimum afferatur, quae, ut Theophrastus, & Plinius inquit, nascitur iuxta cinnamomi campos, sed in montibus, Cinnamomi tamen nihil importetur. Quare non deest suspicio, quin omne fere Cinnamomi genus deperierit in Arabia, quemadmodum & balsamum in Iudaea. Quandoquidem scripserit Plinius lib. xxi. cap. xix. combustas iam esse plurimas Cinnamomi sylvas, his uerbis. Cinnamomi pretia fuisse quondam in libras denariorum mille. Sed postea actum id parte dimidia est, incensis (ut ferunt) syluis ira barbarorum. Id acciderit ne ob iniquitatem praepotentium, an forte, non satis constat. Austros ibi tam ardens flare, ut aestibus syluas accendant, inuenimus apud auctores. Quod fit, ut facile credi possit à Plinio quo id, quod Cinnamomi reliquum erat, pariter uel barbarorum bello, uel igneis flammis deperisse. Nam si aliter res se haberet, qui casiam ad nos deferunt, cum multo plus lucri ex cinnamomo, quam ex casia se consecuturos sciant, Cinnamomum etiam una cum casia ueherent. Haec autem dixisse uolui, non ut hac in re certi aliquid, exploratiq; habeant, cum tantum coniecturis agam, sed ut alijs ulterius explorandi latius pateat iter. Ceterum Strabo non modo cum Theophrasto, Dioscoride, Galeno, Plinioq; cinnamomum in Arabia nasci scribit, sed etiam in India, ea scilicet parte, quae ad austrum uergit, quippe cum hac Arabia, & Aethiopiae sole persimilis sit, ea omnia (ut ipse ait) gignit aromata, nempe cinnamomum, casiam, & alia, perinde ac illae. Veruntamen cur nec inde ad nos afferantur, an quod etiam ibi perierit, an aliam ob causam, ij manifestius refrant, qui hoc tempore liburnicis eo ad aromata conquirenda quotidie nauigant. Sed uidetur Galenus satis perplexus de Cinnamomo scriptitasse, quippe primum arcam Romam delatam prodidit e barbarorum regione longitudine cubitorum quatuor cum dimidio, in qua integra cinnamomi arbor erat. quibus omnino denotat Cinnamomum esse arborem. Deinde uero unamquamq; Cinnamomi speciem scribit, ab una radice, seu frutex quiddam paruus consurgere, adeo ut maiora eius uirgulta dimidium Romanum pedem non excedant. quibus procul dubio fatetur, Cinnamomum esse in paruorum fruticum genere. Vnde certe nesciuerim, ego explicare, quid sibi hac in historia uoluerit Galenus; praesertimq; cum tam tenui ipsum samento esse tradiderit, ut ueratri, uel damasonij radicibus comparauerit. Sed illud etiam mirum mihi uidetur, quod ex casia (ut ipse ait) Cinnamomum oriatur, spectenturq; nonnunquam casiae arbores integrae, in quibus aliqua cinnamomi uirgulta e casiae ramis prodeant, cum tamen cinnamomum, & casia diuersae inter se sint plantae. Nisi fortasse inter utranque tanta sit generis cognatio, ut aliquando iuuenta sint casiae uirgulta tanta odoris saporisq; fragrantia, ut omni ex parte cinnamomum referrent, etsi legitima fuerit casia. Praeterea non desunt, qui putauerint hac Galeni auctoritate freti, casiam & cinnamomum ex una, & eadem arbore prouenire, quae dum pumila sit, cinnamomum edat, dum uero adoleuerit, casiam. Sed cum dicat Galenus, casiam mutari in cinnamomum, non autem cinnamomum in casiam, cadit eorum sententia. Quibus etiam refragatur Theophrastus lib. ix. de plantarum historia cap. v. ubi casiam, & cinnamomum ostendit diuersas esse plantas: licet de earum forma, & proceritate nihil certi exploratiq; affirmet. Quandoquidem initio capituli non ex sua, sed aliorum sententia scribit, cinnamomum & casiam frutices esse magnitudine amerinae: deinde uero alios etiam secutus auctores, cinnamomum fruticosum facit. Ceterum cum scribat Strabo Arabas cinnamomo, & casia uti ad ignem parandum, ceterorum lignorum loco, uidentur haec plantae non esse adeo pumilae, ut quidam scribunt. Quod de casia facile dici potest. siquidem Venetijs casiae Cannellae uocatae fistulae uisuntur tantae crassitudinis, longitudinisq;, ut facile quisq; iudicare possit eas e ramis, seu uirgultis non sane breuib; fuisse decerptas. Cinnamomi deniq; sex genera esse produntur à Dioscoride, & Galeno: sed is nullibi (quod sciuimus) praeterquam in libro de theriaca ad Pisonem, quem tamen librum spurium putamus, ea per genera descripsit, fortasse (ut solet) Dioscoridi se renittens, qui etiam tantum à locis, ubi nascuntur, plus minusue praestantiae huic, quam illi reddidit. At Theophrastus citato nuper loco longe aliter cinnamomi differentias haberi ait, his uerbis. Cinnamomum decerptum in quinque partes discerni narrant, & esse praecipue bonitatis, quod germinibus proximum fuerit, idq; ad palmi longitudinem caedi, aut paulo maius. Secundum, quod sequitur, quod etiam minus cesura est. Tertium deinde, & quartum notatur. Vltimum uero, quod deterrimum, proximumque radici: hoc enim minimum corticis habet, in quo summa gratia est, non in ligno. quae de causa praeferrri cacumina solent, quod corticis plurimum habeant. Quidam sic aiunt. Alij uero Cinnamomum fruticosum enarrant, eiusq; genera duo, alterum nigrum, alterum candidum. Haec Theophrastus. Veruntamen cum nec is hac in historia aliquid constanter affirmantq; scribat, Imperatorem, Regem uel quempiam desiderarem, qui humanam rempublicam miseratus, explorandi Cinnamomi gratia in Arabiam, & Indiam mitteret, magnanimosq; illos imitaretur Imperatores, qui ipsius Galeni uero ex iisdem regionibus sibi Cinnamomum comparabant. Id enim Caesar noster Carolus quintus, si illi Deus opt. max. Christianam remp. pacatam redderet, commodè consequi posset. uel fortasse commodius Rex Lusitanus, qui in orientalem Indiam saepe ad aromata conquirenda suas liburnicas mittit, quo in itinere uniuersas felices Arabiae oras explorare posset: quemadmodum & uniuersam Indiae partem, quae ad austrum spectat, ubi inquit Strabo

Cinnamomum



Cinnamomum pariter nasci. Sed o clarissimi Lusitaniæ medici, si res medica uobis cordi est, si nostram cupitis ditare facultatem, medicumq; nomen extollere, si charitas uos tenet, si naturalis humani generis iuuandi amor uobis instus est, iamiam prouinciam hanc suscipite. Quippe si princeps uester hinc sibi immortale nomē, uniuersæ uerò rei publicæ commodum perquam maximum comparare posse à uobis intellexerit, cum omni pietate ac magnanimitate (ut audio) præditus sit, nulli dubium est, quin omne studium, auxiliumq; impendat, ut non modò Cinnamomum ipsi sum reuocetur in lucem, sed et alia fortasse pleraq; medicamenta, quibus antiqua medicorum familia suas illustrauit antidotos. Porro tanetsi hæcenus illud mihi abunde probatum esse uideatur, quòd cassiam ueram habeamus, desideremus autem optimum et legitimum Cinnamomum; sunt tamen hac ætate scriptores, qui non cassiæ solùm, sed etiam cinnamomi genera inueniri tradunt. inter quos extat Fuchsius uir clarissimus, qui libro illo de compositione medicamentorum, quem locupletatum postremò edidit, de cinnamomo differens, ita scribit. Sed haud dubiè in capsis cannella refertis et cassiæ, et cinnamomi genera reperiuntur, quare delectu opus erit, qui illa distinguere uelit: distinguet autem notis utriusque diligenter expensis. His nimirum uerbis Fuchsius cinnamomum nobis uerum nò deesse asseuerat. Sed quibus id rationibus, aut auctoritatibus comprobet, non uideo: nisi hoc acceptum referat Amato Lusitano, qui cò amentie deuenisse uidetur in suis enarrationibus, quas in Dioscoridem scripsit, ut apud nos cinnamomi genera inueniri, atque etiam illud aroma notissimum esse contendat. Verùm huius ineptias ac uanitates plurimas alibi persequimur, ubi nos ab eius calumnijs defendimus. hic enim quod de materia medica sentiuus, et ingenuè profiteri possimus, libenter scribimus. Quare ea sit nostra de cinnamomo sententia, quæ à nobis antea fusius probata est, quam modò oporteat pluribus Fuchsiu refellere. quem tamen doleo maiorem fidem præstitisse Lusitani illius ineptijs et mendacijs, quam uirum peritum deceat. Ceterum illud tantum addam, quòd nobis, qui cinnamomum lignum non corticem esse ostendimus, mirari quidem subit Fuchsiu, qui libro supra citato eodem loco paulò post contrarium scripsit, ut eius uerba, quæ subiiciam, aperte testantur. Cinnamomum, inquit, quod nobis Zeilani insula mittit, cortex est arboris quatuor fere cubitorum altæ, crassitudinis brachialis, sex uel septem è trunco mittentis ramulos, qui singulis annis amputantur, atque iterum pullulant: quorum cortex, qui cinnamomum est, sit tenuis, odoratissimus, gustatu acris, et ualde mordax, non tamen adeò ut molestè rodatur, mansum rutam oleat, etc. In hanc, meo quidem iudicio, uanam opinionem Fuchsius non secus atque in superiorem uenisse deprehenditur secutus Amatum Lusitanum: qui eandem fere prius, quam ille post cinnamomo effigiem reddidit, quanquam eam à quodam accepisse fatetur. Cinnamomi uires scribit Galenus lib. vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Cinnamomum summè tenuium est partium, non summè tamen calidum, sed ex tertio ordine. Nihil autem æquè desiccet eorum, quæ pari sunt excoalscendi facultate propter tenuitatem scilicet essentie. At Cinnamomis est uelut imbecillissimum: nonnulli ipsam pseudocinnamomum nuncupant. Meminit et Cassiæ eodem libro citato, ubi sic habet. Cassia exiccatur, et excoalscit tercio quodammodo ordine, sed et tenuium admodum est partium, gustu uerò plurimum in se acris deprehenditur, leniter quoque nonnihil adstringens. Quamobrem ob hæc omnia incidit, simulq; digerit, quæ in corpore sunt recrementa, et ad hæc robur etiam instrumentis addit. Idoneum uerò etiam suppressis mensibus, cum uidelicet à copia simul et crassitudine excrementorum, quod sufficiat, euacuari nequit. hæcenus Galenus. Ceterum ex uulgaris cinnamomo fit aqua stillatitia, quæ et odore et sapore idipsum pulchrè representat. eam autem extrahendi ratio hæc est. Sumito dicti cinnamomi quantum licet optimi libram, idq; leniter contusum in uas uitreum uel æneum, quod matulæ formam referat, conijcito: dein aquæ rosarum stillatitiæ libras quatuor, et uini albi odorati selibram infundito. uas illud in balneum aquæ tepentis, et non feruentis inponito, atque inbiore uasis prius obturato, uiginti quatuor horis macerari sinito. post id tempus uitreo organo rostrato, quod ab effecti galero uocant, uas antedictum cooperito, et igne fornaci succenso, per balneum aquæ feruentis aquam stillatitiam elicito. Verùm canna stagnæ, uel uitrea, quæ duorum circiter cubitorum longitudinem expleat, organi uitrei rostro admouenda inferendaq; est. illi postremò uas uitreum subijcito, quod manantem aquam excipiat. insuper prouidendum est, ut omnia uasorum orificia diligenter obstruantur, ne quid expirare possit. Hæc aqua contra omnes ægitudines, quas frigus excitanerit, efficax est: utpote quæ pituitam humorumq; lentitiam digerat, incidat, et absumat, statusq; discutiat. Priuatim uerò uentriculum, iecur, lienem, cerebrum, nervosq; iuuat et roborat: animi deliquio, cardiacisq; affectibus præsentano remedio succurrit: uenenis uenenosorumq; animalium morsibus aduersatur: menses pellit, et urinam ciet: coeliacis auxiliatur: nauseam sedat, et fastidium abigit. uteri morbis perquam utilis est: prodest suspiriosis, resolutis, conuulsis, et comitiali morbo laborantibus: gustui gratissima est, atque oris habitum commendat. In summa ubi excoalscere, aperire, incidere, digerere, et roborare sit opus, huius aquæ usus maximam præstat utilitatem. Veruntamen quoniam nec Dioscorides, nec ueterum Græcorum quisquam meminit CASSIÆ SOLUTIVÆ dictæ, qua hoc tempore ad citandam aluum frequentissimè utuntur medici, quamq; Aegyptiam siliquam recentiorum quidam appellant, ne hæc nostræ lucubrationes tam nobili, tam præstanti, tanq; humane salutis necessario medicamento destituantur, differam hic de eo, quicquid ex Mauritanis compertum habeo. Aegyptie itaq; siliquæ arbor inter ualde proceras annumerari potest. Huius materies solida, còpactaq; nititur, corticetenus buxæo colore, medullitus uerò nigra, non secus ac ebenum, siue guaiacum. Recens grauitè olet, sicca tamen minime. Folio constat siliquæ, sed magis in acutum tendente, cortice cineritio, radicibus magnis inuolans modo. A ramis siliquæ pendent prælongæ, teretes, densæ, et cum maturitatem senserint, colore in rubrum nigricante. Hæ nigra, dulciq; replentur medulla, leni ac lento cremori simili, non tamen ut in osibus contrinua, sed crebris lignosisq; membranis distincta. Inheret unicuique membranæ semen durum, siliquarum semini adeò simile, ut alterum ab altero discerni non possit. ex quo enim non errasse putauerim, qui crediderit, has plantas esse congeneres. Eligenda est, quæ ex Memphi, et Alexandria Aegypti conuehitur, non admodum crassa, pellucens;

Fuchsi, & Amato opiniones reprobata.

Cinnamomi vires ex Galeno.


Cassiæ vires ex eodem.

Cinnamomi vulgaris aqua stillatitia.

Cassiæ solutivæ confectio.



## CASSIA SOLUTIVA.



Nomina.

Amomum.

Cap. XIII.

AMOMVM exiguè fruticat, ex ligno se conuoluens in racemi modum: flore, ceu candidæ violæ, paruo: folijs bryoniæ similibus. Laudatur quàm maximè Armeniacum, colore ad aurum uergens: ligno subrufo, abunde odorato. Medicum, quoniam in campestribus, & aquosis enascitur, infirmius esse constat: est autem magnum, subuiride, tactu tenerum, frutice uenoso, odore origani. Ponticum uerò subrufum, paruum, fragile, racemosum, fructu turgens, & odore nares feriens. Deligito recens, candidum, uel subrubrum, quod nec adstrictum cohereat, nec conuoluatur, sed solum diffundatur: semine plenum, uis paruis simile, graue, ualde odoratum; modò cariem non contraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore non euariante. Vim habet calfaciendi, adstringendi, exiccandi. Somnum allicit: & illitum fronti, doloris sensum aufert: inflammationes, & meliceridas concoquit, discutitq;: iuuat quos scorpius percussit, ex ocimo illitum: & podagricis confert: inflammationes oculorum, uiscerumq; lenit ex uua passa: ad uuluarum uitia in pesis, aut infestationibus utile est. Decoctum iocineri, renibus, podagræ, potu conuenit. Antidotis immiscetur, & pretiosissimis unguentis. Adulteratur Amomum herba simili, quæ Amomis uocatur, sed sine odore, sine fructu. Nascitur in Armenia, flore origani. Quare in huiusmodi rerum probationibus fragmenta fugienda sunt: eligenda autem, quæ ab una radice suos integros furculos emittunt.

## Amomi consideratio.

TANTA medicorum, qui nos præcesserunt, in simplicium medicamentorum historia, & facultatibus ignorantia, segnitiaq; extitit, ut nisi Deus opt. max. acerrimi, & ferè diuini ingenij uiros, hac ætate nobis produxisset in lucem, qui præter id, quòd uniuersam medicam facultatem ab erroribus sanè innumeris expurgauerint, eandemq; illustrauerint, uera quidem simplicia medicamenta inuestigarunt; minime profectò nerendum fuerat, quin paruo temporis tractu ars medica penitus subuersa, extinctaq; remansisset. Et certè si longiori tempore res ita se habuisset, nulli dubium est, quin huiusce facultatis cognitio in auram euolasset. quandoquidem hæc pestis radices tam in altum fixerat, ac tam latè se diffuderat, ut tametsi nonnulli ingenio, & doctrina præstantes plurimum insudauerint, omneq; studium, & operam quàm diligentissimè impenderint, quo errores, qui ignauia & negligentia emerferant, à re medica excluderentur, eos tamen hætenus radicibus euellere nequuerunt. Siquidem non desunt, qui (quanuis hæc percipiant rationes) malint suos prosequi abusus, omni ex parte detestandos, quàm candidissimè inherere ueritati. Quo fit, ut unà cum alijs innumeris simplicibus medicamentis etiam legitimo Amomo careamus. Cuius uice quidam

recens, granis, fæcta, & quæ concussa, inclusis seminibus minime constrepit. Pulpa exalfacit, & humectat ordine primo. Eadem lenit, resoluit, sanguinem mandat, bilisq; feruorem extinguit: alui item comodissimè citat, eiusq; uis uentriculum non pertransit. quæ propter securissimè datur à medicis inchoatibus febribus, alijsq; calidis morbis ante uenæ sectionem, quòd tantum uentriculū repurgat, et alui emolliat. Nocet tamè intestinorū imbecillitate affectis, et ijs, qui admodū lubrici sunt: aliàs omnino habetur innoxia. Toleratur id noxæ admistis myrobalanis, rhubarbaro, nardo, et mastiche. Constipatis si detur, augenda est eius facultas ijs, quæ magis eadem ui pollent: proinde sunt, qui addant amygdalinum oleum, & psyllij spissamentum. Urinæ difficultatibus mirificè auxiliatur, si cum urinam cientibus medicamentis hauriatur, uel deuoretur. Ac grè aluum excernit: eaq; propter nonnulli roborant eius uires, addito hyssopo, uel caprino sero. Bilem, & pituitam excernit, nullo sanè incommodo: pectus, & fauces mulcet, & eorum inflammationes resoluit: renes à calculis, & sabulo expedit; præsertim si cum glycyrrhizæ decocto, alijsue medicamentis urinam cientibus bibatur. quinetiam frequenter deuorata calculos reuasci prohibet. Admodum præter hæc calidis confert febribus. Ceterum exterius illita erysipelas extinguit, ceterasq; inflammationes, quæ cutètenus emergunt. Sunt è recentioribus medicis, qui eam nunquam suis ægotantibus exhibeant, nisi picæ puluerem admisceant. quod consultè factum existimo: præsertim ubi uentriculū & intestinorum imbecillitas adsit. Quæ Græcis κασσία, Latinitis item Cassia nominatur: Arabibus, Selicha, Selche, aut Selihacha: Italis, Cassia, atque etiam Italarum uulgo Camella: Germanis, Zimmet, seu Zimmet roerlim: Hispanis, Canela: Galilis, Canelle. Quod uerò Græci κιννάμωμον, Latini quoq; Cinnamomum dicunt: Arabes, Darseni: Itali, Cinnamomo.



dam stirpium in postores ex Gargano Apulie monte profecti, pumilum quoddam semen supponunt, colore nigro, odore melanthij. Quod cum tantillum aromatis respiciat, & gustu acri deprehendatur, excogitarunt, ut facilius ipsum corraderent, in hominum animis inducere, id procul dubio legitimum esse Amomum. Quod tamen (si Dioscoridi fides est adhibenda) semen edit uuarum racemis simile, non autem minutum, quale illud uisitur. Insuper mihi sane non constat, Dioscoridem semen in Amomo approbasse, sed potius ligneam arbuscule materiem, ut in cinamomo & cassia uidere est. quo fit, ut legi innum Amomum lignum potius, quam semen existimauerim. Sed & turpiter aberrant, qui Serapionis interprete decepti, herbam Pedem columbinum quibusdam uocatam, quæ geranij præ se fert speciem, Amomum esse contendunt, & in Amomi locum substituant, nullam de his historiam inquirentes. Cæterum Amomum, quod iure probari possit, nullibi (quod scierim) in Italia prouenit, nec eò aliunde translatum habere nec decens est, nec tutum. Sed potius Galeno mos gerendus fuerit, qui acoro, & Amomo uires consimiles tribuit. Acorum itaq; locum Amomi supplere poterit. Porro & hi omnino explodendi sunt, qui pro certo asserere non uerentur, eam stirpem esse Amomum, quam Hiericuntam à Hierico Palæstinæ oppido appellant. Plantam hanc plerumque ad nos è Hierico deferunt ij, qui ad sanctissimum REDEMPTORIS nostri sepulchrum peregre proficiunt. Ea enim est, quam nostrates mulieres rosam diuæ Mariæ uocant. Constat hanc Amomum non esse, quod folia albæ uitis non proferat, nec ullo spiret odore. Legitimum enim ualde odoratum est, adeo ut nares feriat primo statim occurso, origanumq; respiciat. Cordus libello de conficiendis pharmacis satis inconstanter de Amomo disseruit, quippe in compositione aureæ Alexandrinæ pro certo asserit Amomum uerum esse rosam Hiericuntis: in compositione uero theriacæ, sui ipsius oblitus habere nos Amomum negat. Utuntur Hiericunta nostrates mulieres tempore partus ad inuestigandam pariendi horam. quandoquidem (ut ipsæ fatentur) in aquam demissa non prius fatiscit, quam foetus nasci incipiat: tanta inter christicolas irrepsit superstitio. Fuchsius medicus hac nostra ætate celebris in libro de componendis medicamentis, quem nuper locupletatum edidit, dum ea simplicia examinat, quæ Theriacam ingrediuntur, eò productus, ubi Amomi racemosi carmine meminit Andromachus senior, omnes Galeni interpretes insinuat his uerbis. Botryos) Græcè est βότρυος. In hac uoce interpretanda omnes Galeni, qui hanc compositionem tradit, interpretes hallucinati sunt. Siquidem Anderiacus libro primo de antidotis, uix conuertit: alij omnes, & cum ijs Cordus, racemosi, βότρυος uocem cum Amomi dictione, quæ præcedit, coniungentes, quasi uero Andromachus de Amomo racemoso locutus sit: quod certè Dioscorides non βότρυον, sed βότρυος ἀμώμου appellat. Separandæ igitur hæ duæ dictiones per interiectum coma erunt, hoc nimirum modo, ἀμώμου, βότρυος, ut nos conuertimus: ut intelligamus Andromachum de duobus inter se differentibus herbis esse locutum, nempe Amomo, & botry. hæc ille. Ex quibus utique abunde liquet Fuchsum sensisse, botryn quoq; herbam, de qua Dioscorides, agit libro tertio, in theriacam addendam esse. Veruntamen in hoc nos à Fuchso, uiro alioqui doctissimo, planè dissentimus: quandoquidem Andromachum non botryn, sed amomum racemosum intellexisse putamus, idq; non sine rationibus, & coniecturis. Et ne longè progrediamur, in primis Andromachus ipse senior Fuchso aperte refragatur: illum enim non inuenio in suis carminibus, quæ libro primo de antidotis in Galeno leguntur, aliter de amomo cecinisse, quam ut βότρυος ἀμώμου. quæ quidem duæ dictiones non ita separari possunt, ut Fuchsius opinatur: neque prior illud unquam significabit, quod idem perperam accipit. Ad hæc non minus, quam senior, nostræ sententiæ ad stipulari deprehenditur iunior Andromachus: utpote qui in tradenda theriacæ compositione, quam soluta oratione descripsit, nusquam (quod equidem legerim) botryn commemoret, sed amomum tantum. Quod etsi Damocrates in eadem antidoto describenda carminibus, quæ loco citato à Galeno referuntur, cecinerit βότρυος ἀμώμου; hæc tamen duæ dictiones non sunt temere, meo iudicio, separandæ: nam eas auctor consultò coniunxisse uidetur. Quid præterea de Galeno dicemus: etenim is quanquam libro ante dicto sigillatim enumerat, ac diligenter expendit simplicia medicamenta, quæ in theriacam adduntur; tamen nusquam (quantum inuenerim) botryos mentionem facit: neq; etiam eius meminit de theriacâ ad Pamphilianum scribens. quid, si eandem plantam apud Galenum in simplicium medicamentorum censu desiderari omnibus uotum est. Addam illud postremo quod inter recentiores Græcos Paulus, & inter Arabas Auicenna botryn herbam theriacis non inferunt suis. Quæ sanè omnia nostram augent, & confirmant opinionem. Cui si illud obieciat Fuchsius quod Nicolaus Myrepsicus in sua theriacâ botryn Gallicam habeat; respondebo ego, quod Nicolai codex Græcus deprauatus est, & innumcris scatet mendis: id quod ipse Fuchsius non negabit, quod idem de Nicholai codice sæpenumero polliceatur. Ex his itaq; satis manifestum fieri arbitror, quod ut Fuchsij sententia, quæ theriacæ botryn adijcere contendit, refellenda est; ita Galeni interpretes, qui Amomum racemosum uertunt, probandi sunt, ut qui sunt cum Andromacho Dioscoridem secuti. is enim Amomi Pontici notas perstringens, ipsum racemosum fecit, ut supra in eius uentione legitur. Amomi meminit Galenus lib. vi. simpl. med. sic inquit. Amomum acoro similem facultatem obtinet: nisi quod acorum stecius sit, maiore autem concoquendi facultate Amomum. Hoc Græco nomine ἀμώμου dicitur: Latino item Amomum: Arabico, Hamemis, aut Hamama: Italico, Amomo.

Amomū spurium.

Serapionis interpretis lapsus.

Error quorūdam.

Fuchsij opinio reprobata.

Amomi uires ex Galeno: Nomina.

## Costus

## Cap. XV.

PRAECOLLIT Arabicus, candidus, leuis, eximia odoris suauitate. Secundum locum sibi uendicat Indicus, leuis, uber, ut ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxeus, & odore feriens. Optimus est recens, albus, abunde plenus, densus, aridus, à teredinibus non erosus, sine graue uolentia, gustu calidus ac mordens. Vis ei exsiccatoria: urinam ciet: menses pellit: uitij, quæ uulnam, malè habent, tam imposito, quam fotu, & suffitu auxiliatur. Contra uiperarum morsus



extantem bibere prodest: item aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflationesque ex uino & absinthio: uenerem ex mulso stimulat: latas uentris tineas ex aqua pellit: horroribus ex oleo ante febrium accessiones, & neruorum resolutionibus oblituitur: uitia cutis in facie, cum aqua, uel melle illitus, emendat. Additur in antidota, & malaginata. Sunt qui, admittis helenij Comageni præduris radicibus, adulterent. Quod deprehensu facile est: siquidem neque gustu feruet helenium, neque ualidum odorem uibrat, ut caput tentare possit.

Costi confectio.

**COSTVS**, quousa sunt officina per longas atates, in amarum, & dulcem diuidi solet, tametsi tum Dioscorides, tum etiam Plinius nec dulcis, nec amari meminerint, sed nigri duntaxat, & albi. Galenus quidem scribit leuiculam Costo inesse amaritudinem: sed qui inter Græcos scripserit Costum inueniri dulcem, hætenus compertum non

**PSEUDOCOSTVS.**



Costi quæ uicē suppleat.

habeo: quamuis Mauritani, & eos secuti, dulcis, & amari quædamque mentionem fecerint. Qui in myropoljs passim habetur, adulterinus est. quippe nec ulla odoris suauitate commendatur; nec gustu adeo acri deprehenditur, ut admotus exulceret, ut Galenus inquit. Proinde medicamentis, quæ Costum excipiunt, non erit, meo iudicio, imponendus, cum præterea nos planè lateat, cuius nam plantæ sit radix. Porro non desunt hodie impostores, qui ex Gargano Apulie monte quotannis ad nos conuehant Pseudocosti cuiusdam radices, amari saporis, quæ facie quadantenus Rhodiam radicem representant. Eas autem pro legitimo costo uendunt nostratibus pharmacopœis, ijs præsertim, qui in rei herbariæ cognitionem negligentius incumbunt. Plantam nos habere, atque etiam depingi curauimus (ea enim alioqui non est uulgaris iudicanda) ex eius imagine, quam hic damus, discant imperiti cuius plantæ sint radices illæ. Hinc fortasse fiet, ut si illi imposturam hæc omnibus cognitam esse intelligent, eam desinant posthac facere. Inuenitur Costus (ut audio) apud quosdam Venetijs, sed admodum rarus, quem legitimi notas habere aiunt. Verum cum hætenus eum non uiderim, non est, cur eum probem, uel improbem. Ceterum seplastarij, si legitimum consequi nequeunt, à pseudocostis absterneant. & Galenum, uel auctorem illum sequantur: qui si Costus defecerit, ammoniacum, uel helenium supponi iubet. erit enim eis hoc satius, quam uti adulterino. Sed quidam adeo suis pandectis, & luminaribus addicti sunt (quæ est eorum tum inscientia, tum pertinacia) ut nullis unquam auctoritatibus, atque rationibus suaderi possint, ut ucterem semitam penitus detestandam relinquere uelint, quæ plerumque est agris detrimento, & sibi, & medicis dedecori. Sunt insuper, qui Costi loco Angelicam recentiori bus uocatam supponendam existiment. quorum sententiam magis probandam censerem, quam eorum, qui pseudocostis utuntur. Costum enim hæc radix non obscure refert: quandoquidem eximia illa odoris suauitate tam incunde spirat, ut angelicæ nomen sibi merito uendicasse uideatur. Acris præterea est, nec amaroris omnino expers. Quapropter eos haudquaquam damnandos putauerim, qui Angelicam Costi genus esse crediderint. Costi uires scribit Galenus lib. VII. de simplicium medicamentorum facultatibus, sic inquit. Costus leuiculam planè anaram, plurimam autem acrem, & calidam in se qualitatem simul & facultatem continet, adeo ut etiam exulceret. Vnde ipso cum oleo perfricant corpus ante accessionem in rigoribus per circuitus redeuntibus. Sic uero etiam in resolutis, & ischiadicis, atque in summa in quibus exalfacere partem quamuis, aut ex alto in superficiem extrahere aliquem humorem est opus, ad costum confugitur. Eadem de causa urinas, mensesque prouocat: & ad rupta, conuulsa, ac laterum dolores conuenit. Porro ob amaritatem, quæ illi inest, lumbricos latos enecat. Ob eandem & ad contractas uelut ex sole maculas, & iudæi Græci uocant, cum aqua, aut melle usurpant. Inest item statuosa quædam illi temperiei humilitas, per quam & uenerem excitat cum uino mulso. Κόστος ita Græcè nominatur, quemadmodum Latiùe Costus, Arabice Kostos, siue Chast, & Italicè Costo.

Costi uires ex Galeno.

Nomina.

**Iuncus odoratus.**

**Cap. XVI.**

**ODORATVS** Iuncus in Africa, & Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa; proximus Arabicus, quem aliqui Babylonium cognominant, alij teuchitin: pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manibus confricando rosæ odorem emittit, igneæ mordacitatis ad linguam. Floris, culmorum, radicisque est usus. Vim urinæ ciundæ habet: menses pellit, discutit inflationes, caput aggrauat, modicè adstringit, comminuit, excoquit,



## IUNCVS ODORATVS.



excoquit, ac uenarum spiracula laxat. Flos eius in potu utilis sanguinem reijcientibus: doloribus stomachi, pulmonis, iocineris, & renum. miscetur antidotis. Radix adstringentior est: ideo fastidijs stomachi, hydropicis, conuulsis, drachma una cum pari pondere piperis, per dies aliquot datur. Decoctum uulux inflammationibus ad desidentium fatus, utile est.

IUNCVS odoratus officinis Squinanthum uocatur. Quæ uox, quanuis deprauatè, ex plantæ, & floris nomine componitur, in unam utrisq; iunctis dictionibus. Nanque squinanthum si ad rectâ etymologiam referatur, nō aliud inferet, quam duas hasce Græcas dictiones *σχοῖνον* & *ἄνθος*, quæ Latine florem iunci significant: *σχοῖνος* enim iuncum, *ἄνθος* uerò florem Græcis designat. Verum tamen flos ad nos non importatur. quod tamen mirum non est, cum etiam Galeni tēpore nō haberetur. Proinde inquit libro primo de antidotis. His præterea Iuncum odoratū ex Arabia allatum innotuit præcipit, quem nescio quomodo schoeni anthos, id est, iunci odorati florem multi uocent, cum nobis floris copia non adeo suppeditet. Nam etsi tota aduehatur herba, sunt tamen eius superiores partes à camelis sæpe depastæ: uestiuntur enim ea, & delectantur maxime. hæc Galenus. Quæ (si licet nobis dicere quod sentinus) potius ridenda, quam probanda uidentur. Arduum quippe fuerit credere, tam ingentem esse camelorum numerum, qui locustarum modo in uniuersum schoeni flores depascatur, ut nulla penitus supersit planta, cui flos non deuoretur. Referunt quidam nasci odoratum Iuncum etiam in Apulia. quin & in Campania prouenit, ut Brasæ uolus inquit Plinij auctoritate. Sed uereor, ne hallucinentur, quod nec inde flores afferantur, nec paleæ: neque etiam id Plinius affirmanter asserat. Is, quo Seplastarij passim utuntur, non affertur aliunde, quam ex Alexandria. Caterum non parua quidem diligen-

Iunciodorati  
consideratio.

tia, dum emitur, est adhibenda. quandoquidem non desunt impostores, qui ad merces augendas, schoenorum palearum, et herbarum quibusdam fistucis adulterent. Præterea uidendū est, ne uetustate exoluerit: facile enim (ut in libro de antidotis docuit Galenus) ab hoc uis omnis euanesceat. Scribunt Monachi illi, qui in Mesuem commentarios ediderunt, odoratum Iuncum, quo passim officine utuntur, spurium & illegitimum esse, cum hæc paleæ (ut eorum uerbis utar) Dioscoridis schoenium minime referant. Siquidem radices primum medicine usui congruas illi non inesse contendit, sed capillorum modo tenues: deinde paleas ipsas nullam gustantibus acrimoniam relinquere, nulloq; rosarum odore fragrare, si manibus confricentur: nec postremo iuncum aliquem proferre, sed calamos geniculis interceptos tritici, uel hordei modo. Quæ in re (pace eorum dixerim) duplici errore notantur, primum quod Dioscoridem oscitater legerint: deinde quod illud affirmant, quod experimento procul dubio falsum esse deprehenditur. Quod autem Dioscoridē oscitater legerint, cum dicunt schoenium iuncum proferre, non calamum, facile patet. quandoquidem contrarium scribit Dioscorides, ubi schoeni usum reddit his uerbis. *ἡνθὸς δὲ τῶ ἄνθους, καὶ τῶν καλῶν, καὶ τῶν πικρῶν*. id est. Usus est floris, calaniorum, & radices. Præterea quod communis usus schoenos acrimoniam non habeat, pariter falsum est. quippe, ut experimento quotidie comprobari potest, qui nō longo tempore consenuerit, linguam mansu uellicat. Quibus palam est, Monachos uel nunquam schoenium degustasse, uel si degustarunt, illum adeo uetustate exoleum fuisse, ut (quemadmodum Galenus inquit) omnē acrimoniam, odoremq; amiserit. Quod autem nostri schoeni radices tenues sint, nihil ad historiam refert: siue enim tenues sint, siue crassæ, eas non descripsit Dioscorides. Schoeni flores ex Alexandria una cum integra planta allatos ego in manibus habui, qui digitis attriti rosarum odorem emittebant. Quanobrem non temerè contra Monachorum sententiam affirmandum putauerim, communis usus schoenium legitimum, et probatissimū esse. Sed ij quidem adhuc magis reprehendendi uidentur (nō tamen ut eorum dignitati aliquid derogetur) quod in Dialange compositione scripserint radicem galagan uocatam legitimum esse schoenium ipsamq; galangā ad nos afferri. quod prorsus à ueritate alienum deprehenditur. Caterum & in hoc pariter Fuchsum errasse crediderim. quippe qui scripserit sua in methodo schoeni anthi stipites nullam acrimoniam mansu relinquere, Schoeni uires prodidit Galenus lib. V III. simp. med. ubi sic habet. Schoeni anthos modicè calfacit, modicèq; etiam adstringit, nec planè à tenuitatis natura alienus est. Quocirca his de causis urinam mouet, mensesq; ciet adhibitum siue in fomentationem, siue in potionē. prodest & iecoris, & stomachi, ac uentris inflammationibus. Magis eo astringit radix. Quod uerò florem uocant, calidius est. Porro in omnibus sui partibus, in alijs magis, alijs minus, gustantibus apparet adstrictio: proinde medicinis, quæ hæmoptoicis, siue sanguinem reijcientibus exhibentur, commiscetur. *Σχοῖνος ἀρωματιστός*, Græcis: Iuncus odoratus, Latinis: Adcher, Arabibus: Giunco odorato, & Squinantho, Italis: Ramelstro, Germanis: Paya de la Mequa, siue Paya de chamellios, Hispanis: Paisture di chameaulx, Gallis nominatur.

Monachorū  
opinio explō  
sa.

Fuch. lapsus.  
Iunciodorati  
uires ex Gal.

Nomina.



## Calamus odoratus.

## Cap. XVII.



Calami odo-  
rati historia  
ex Theo.

Brasapoli ex  
zor.

Fuch. opinio  
improbata.

Calami odo-  
rati uires ex  
Galen.

**CALAMVS** odoratus in India nascitur. Melior est fuluus, densè geniculatus, & qui assulosè frangitur, plena araneorum fistula, albicàs, lentus in mandendo, & adstringens, cum aliquanta acrimonia. Vrinam potu ciet: quare cum graminis, aut apij semine coctus, in aquæ subter cutem fusæ morbo, renum uitijs, stillicidio urinæ, ruptisq; commodè bibitur: menses & potu, & appositu pellit: tussi suffitu in edetur per se, aut ex resina terebinthina, hausto per arundinem fumo: ad muliebres infessus decoquitur, & clysteribus imponitur. Malagmatis, & suffitionibus odoris gratia commiscetur.

**CALAMVS**, & **Iuncus odoratus** (ut Theophrastus est auctor lib. IX. cap. VII. de historia plantarum) trans Libanum montem, inter ipsum Libanum, & alium quendam montem paruum ualle minima exeunt: non, ut quidam dixerunt, inter Libanum atq; Antilibanum. Inter quos campus amplissimus, & pulcherrimus est, quem Aulonem appellant. Quæ uero calamus, & iuncus proueniunt, laeus in amplum spatium, iuxtaq; eum palustribus siccatis isti assurgunt. Occupant locum plus quam triginta stadia. Virides nequam esse uidentur, sed sicci: forma uero nihil ab alijs differunt. Locum ingredienti protinus odor aspirat, nō tamen longius spirat, ut quidam referūt. Hic enim locus à mari plus est, quam stadia centum quinquaginta. Sed in Arabia aspirationem agri odoratissimam esse inter omnes constat. hæc de Calamo Theophrastus. Cui etiam subscribit Plinius libro XII. cap. XXII. ubi sic habet. Calamus quoq; odoratus in Arabia nascens communis Indis, atq; Syriæ est: in qua uincit omnis à nostro mari cētum quinquaginta stadijs. Inter Libanum montem aliumq; ignobilem, non, ut quidam existima-

pere) Antilibanum in conualle modica iuxta lacum, cuius palustria estate siccantur, tricenis ab eo stadijs calamus & iuncus odorati gignuntur. Nihil ergo à cæteris sui generis differunt aspectu. Sed Calamus præstantior odore statim uocant florem. Præstantior est, cui minus fragilis, & qui assulosè frangitur. Inest fistule araneum, quod uior, & crassior, lentusq; in frangendo. hæc tenus Plinius. Sed certè satis palam esse arbitror (ut in acori commentarijs diximus) quam magno ducatur errore Brasanolus Ferrariensis, quod tan facile sibi persuaserit, legitimum odoratum Calamum illam esse radicem, quæ temerè omnibus in pharmacopolijs illius uicem explet, quamq; uerum esse acorum superius pluribus rationibus comprobauimus. Quandoquidem primum ex ipsa Calami appellatione, deinde ex eo, quod dixerint Theophrastus, & Plinius non differre hunc formam à reliquis sui generis, id est, ab omni arundinis genere, utique constat odoratum Calamum genere, & forma arundinem præ se ferre, odoratam tamen, non autem esse radicem. Quocirca Plinius Dioscoridem fortasse secutus, dixit. Fistula (hoc est cavitati) inest araneum, quod uocant florem: non autem radici, ut falsò contendit Brasanolus, araneum illud inueniri in uulgari illo officinarum. Ad hæc Plinius lib. XXIII. cap. XI. dum plura arundinum genera, & uires recenset, idem apertissime ostendit, his uerbis. Arundinis genera XXIX. demonstrauimus, non aliter euidentiore illa natura, quam continuis ijs uoluntibus tractauimus. Et quoniam plura genera fecimus, illa, quæ in India Syriæq; nascitur, odorum unguentorumq; causa, urinam mouet cum gramine, aut apij semine decocta: cit & menstrua admotu: medetur conuulsis duobus obolis pota, iocinori, renibus, hydropi, tussi etiam suffitu, magisq; cum resina. hæc Plinius. Sed præterea uulgares calami radices, quas acori esse censemus, assulosè nequaquam frangi possunt, sed tranuersim, quemadmodum & iridis. Quo fit, ut eorum innotescat lapsus, qui Calamum odoratum radicem esse contendunt, qui tamen (ut aperte ostendimus) nil aliud est, quam arundo. Cæterum si quispiam dixerit, has radices, quarum est usus, esse calami odorati proprias, non acori, illud sanè argumentum destruit, quod intuentibus euidenter apparet. quandoquidem etsi complures illius acori radices habeantur, quæ sicca gerunt in cacumine folia, iridi omni ex parte similia; nulla tamen usquam inuenta est, quæ secum arundinis trunculum cacumini annexum deferat. nempe acori proprium, non odorati calami est, iridis similia ferre. His itaq; rationibus Fuchsij quoq; sententia improbanda mihi uidetur. quippe qui putauerit in sua methodo, uulgarem officinarum calamum ueri odorati calami esse radicem. Porro minime quidem compertum habeo, Dioscoridem, nedum Galenum, qui ex odoribus, ac saporibus uires aquæ, ac qualitates omnium simplicium medicamentorum accuratissime inuestigauit, dixisse aliquid odorato Calamo inesse amaritudinis, quæ tamē in acoro haberi Galenus prodidit. Qui Calami odorati uires pluribus descripsit lib. VIII. simpl. medicamentorum, sic inquit. Calamus odoratus leuiculam quandam adstrictionem, ac minimam acrimoniam possidet: magna ex parte essentia eius terrena est, & aerea, in caliditatis frigiditatisq; coniugatione temperata. Quamobrem moderatè urinam mouet, & facultati-



bus, quæ iecori, & stomacho imponuntur, inisceri potest. tum in sementa quoque uteri, quæ phlegmones gratia, aut irritandis mensibus assumuntur, utiliter admiscetur. Ponatur itaq; habeaturq; secundi oridinis eorum, quæ ex calfa-  
ciunt, & desiccant: ualentius tamen desiccant, quàm ex calfaciant. Inest quoq; ei quædam partium tenuitas, uelut  
alijs omnibus odoratis. Ceterum illorum compluribus tenuium partium plurimum, calamo uerò non multum adest.  
hæc Galenus. Quibus facile patet, Calamum officinis uocatum, legitimum esse nequaquam: maior enim illi inest acri-  
monia, quàm suo referat Galenus. Eaq; propter legitimum calamo odorato nos esse hoc æuo destitutos fateri non du-  
bitauerim: id quod etiam aliquibus satis persuasum esse puto. Nam propterea sunt qui libellum secuti de substitutis me-  
dicamentis falso (ut mea quidem fert opinio) Galeno adscriptum, sphagnum, id est, muscum arboreum, calami odo-  
rati loco supponendum esse uelint. Quam equidem sententiam ut hætenus probaueram, ita etiam literis mandaueram.  
Nunc autem quoniam illud mihi absurdum uidetur, quòd ea menicamenta inter se commutari debeant, quæ contra-  
riam facultatem sortita sunt, cuiusmodi esse deprehenduntur calamus odoratus & sphagnos; ideo non temerè cogor  
mutare sententiam, atq; ab illis desciscere. Sed quid pro calamo odorato rectè substitui possè credamus, alibi, Deo  
concedente, explicabimus. Eius nomen Græcum est Κάλανος ἀρωματικός; Latinum, Calamus odoratus: Ara-  
bicum, Hasabel, aut Casab aldatira; Italicum, Calamo odorato.

Nomina.

## Balsamum.

## Cap. XVIII.

BALSAMVM arbor albæ uiolæ, lycij, siue pyracanthæ magnitudine conspicitur. Folium ru-  
ta proximum, longè candidius, perpetuò uirens. In Iudæa solum quadam ualle, & Aegypto nasci-  
tur: his differens modis, scabritia, proceritate, gracilitate. Quod igitur tenui, & capillacea coma est,  
theriistum uocant, quasi demersile: fortassis quoniam ob gracilitatem facile demetatur. Aestiuus  
sub ortu canis ardoribus, arboris unguibus ferreis inciditur, manatq; è plaga succus, quem Opobal-  
samum uocant: sed tam exiguo stillatu, ut annis singulis, ne plures quidem, quàm seni septeniue con-  
gii cogantur: inibi quæ pondus duplo rependitur argento. Succus probatio est, ut sit recens, ualidi o-  
doris, syncerus, non ad acorem uergens, dilui facilis, læuis, adstringens, ac modicè mordens gustu.  
Sed uariè utiatur, misto ab aliquibus terebinthi, cypri, lentisei, balani unguento: item fusino, me-  
topio, melle, aut Cypria cera liquida. Quod maleficium facilè deprehenditur: nanque merus in la-  
neam uestem fusus, neque maculam facit, neque si eluatur, notam relinquit: uitiatum autem inhæret,  
& lac instillatus coagulat, quod adulteratus non efficit. Quinetiam syncerus in aqua, aut lacte celer-  
rimè liquatur, coloreque lacteseit: uitiatum uerò olei modo innatat, se conuoluens, aut in stellæ mo-  
dum diffundens. Syncerus senescens crasseit, deteriorque redditur. Hallucinantur, qui aqua con-  
cretum pessum ire, & ad ima sidere arbitrantur: postea dissipatum supernatare. E ligni genere, quod  
Xylobalsamum uocant, probatur recens, sarmento tenui, fuluum, odoratum, quadantenus oppoba-  
samum spirans. Necessarius etiam feminis erumpit usus: quare eligatur flauum, plenum, grande,  
ponderosum, mordens gustu, feruens in ore, modicè opobalsamum olens. Adulteratur semine hy-  
perico simili, quod à Petra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, uirium ignauia.  
sapore piperis. Efficacissima uis inest succo, & quàm maximè calfaciens: abstergit quæ tenebras  
oculorum pupillis offundunt: medetur perfrictionibus uulvæ cum rosaceo cerato appositus: menses  
quoque, secundas, & partus extrahit: horrores illitu discutit: ulcera sordida expurgat, & cruda con-  
coquit: urinam potu ciet: ægrè spirantibus prodest: datur in lacte contra aconitum haustum, aut fer-  
pentium ictus. Miscetur acopis, malagmatis, & antidotis. In summa præcipua autoritas succo, se-  
cunda femini, minima ligno. Semen commodè potui datur doloribus lateris, pulmonum uitii, tussi,  
ischiadici, comitialibus, uertiginosis, orthopnicis, urinæ difficultati, torminibus, ac serpentium  
morsibus: ad muliebres suffitus perquam utile est: uuluum aperit in defectionibus balnearum decoctū,  
& humorem euocat. Lignum eisdem habet uires, aliquantò minores. Ex aqua potum cruditatibus,  
torminosi, uulsi, uenenatorum ictibus opitulatur: urinam cit: ad capitis uulnera cum sicca Iri con-  
uenit: squamas ofsium extrahit. & ad unguentorum spissamenta additur.

ANTIQUITVS Balsamum (ut Plinius lib. XII. cap. XXV. est auctor) in duobus tantum hortis, utroque  
regio, altero iugerum uiginti non amplius, altero pauciorum uni terrarum Iudææ concessum erat. Sed postea pro-  
pagata admodum fuit species, cum Iudæa ipsa simul cum balsamo Romani potiti sunt. Qui ueluti politicianum prætio-  
sarumq; rerum propagatores, tam dignam, claramq; stirpem raram esse non tulerunt. Itaq; eam malleolis ferendo,  
atq; iterando non secus ac uites in collibus propagantur, latius accreuerunt. Quocirca Iustinus quoq; hæc de Balsa-  
mo memoria prodidit. Opes genti Iudaicæ ex uestigialibus opobalsami creuere, quod in his tantum regionibus gigni-  
tur. Est namq; uallis, quæ continuis montibus, uelut muro quodam cinctæ ad instar castrorum clauditur. Spatium lo-  
ei ducenta nullia iugera, nomine Hierico dicitur. In ea ualle sylua est & ubertate, & amoenitate arborum insignis,  
siquidem palmeto, & opobalsamo distinguitur. quanguam species huius insignis, ac pretiosæ arboris plurimum adau-  
cta sit. hæc Iustinus. Scripsit Balsami historiam etiam Strabo lib. XVI. suæ geographiæ, ubi sic habet. Hiericus est  
campus à montana quadam circumdatus, quæ in theatri speciem ad ipsum declinat. Hoc in loco est palmetum palmis  
abundans spatio stadiorum centum, & totum irriguum, & habitationibus plenum, ubi & regia est, & Balsami uiri-  
darium. Quæ arbor odorata est, & fruticosa, cytiso, & terebintho persimilis. Eius corticem uulnerantes, succum  
in uasis suscipiunt tenaci lacti persimilem. Sed alibi etiam, quàm in Iudæa nasci Balsamum eodem libro idem testatur,

Balsami con-  
sideratio.



preter Plinij, & Solinij sententiam, cum inquit. Et apud Sabæos thus, & myrrha, & cinnamomum nascitur: in ora etiam Balsamum, & quedam alia planta ualde odorata. hæc ille. Oriri etiam Balsamum in Arabia testis est Faustus in Beoticis magnitudine fruticis myrti, folijs amaraci, sub cuius umbra innumere apricantur uiperæ, & suauissimi eius liquore aluntur. Sed quoniam modo sit factum (ut in Syriam peregrinantes uno ore fatentur) quod hoc tempore omnibus sanè Balsami plantis Iudæa sit penitus destituta, cum olim sola Balsami ferax à compluribus crederetur, quid certi dicam, & quibus auctoritatibus id comprobem, sanè non habeo. Verum cum certò sciam probatissimum uirorum testimonio, qui ex Italia soluentes pluries in Aegyptum nauigarunt, Memphi Balsami uiridarium extare, illud fortasse euenisse putandum est, quod è Iudæa ab Aegypti regibus, quibus uniuerfa subijciebatur Syria, omne in uniuerfum Balsamum eo fuerit translatum, quò decoris inde plurimum regiæ accederet. Quanquam Balsamum in Aegypto quoq; provenire antiquorum monumentis mandatum est, ut ex ipso Dioscoride constat, atq; etiam ex Galeno libro primo de antidotis, cap. IIII. ubi de melle agit componendis antidotis idoneo. Veruntamen diu est, quod in Italiam, ne in totam dicam Europam, neq; lacryma, neq; semen, neq; lignum, neq; cortex importantur, nisi adulteris, & imposturis uitiat. Cæterum non modo fuit id ætatis nostræ adulterium, sed & antiquorū, ut auctor est Theophrastus: qui hæc de Balsamo lib. IX. cap. VI. de historia plantarum posteritatis memoriæ mandauit. Balsamum in ualle Syriæ provenit. Eius hortos duos tantum affirmant, alterum uiginti iugerum, alterum multo minorem. Arboris magnitudo, quæ malo punice magnæ: rami multi: folium ruta simile, candidum tamen, perpetuò uirens: fructus similis terebintho tam magnitudine, & figura, quàm colore. Is quoq; admodum odoratus est, & magis quàm lacryma. Colligi lacrymam in caudice, & parte superna tradunt, facta incisura ungibus ferreis sub sydere, cum æstus maximè angit. Collectum uerò æstate fieri tota. Sed quod manat, nullum non esse: uix enim toto die coucham posse impleri: odorem tamen inferri eximium, & copiosum, adeo ut ex paruo spatium per longum odor ualeat permeare. Verum sincerum ad nos nullum aduchi, sed quod mistum colligitur: plurimis enim mistionibus uitari, quodq; Græciæ uenditur. Ideoq; Galenus lib. primo de antidotis narrabat, cum non ignoraret, opobalsamum diuersis modis adulterari posse, ita ut difficulter ementi discerni queat, se proprio oculorum intuitu cernere uoluisse & quomodo cresceret Balsamum, & quomodo lacrymam mitteret: uoluitq; sinceræ eius lacrymæ partem habere, ueluti regulam ad dignoscendum alios Balsami liquores, qui per orbem ab impostoribus uitati circumferebantur. Modus autem incidendi corticis, ut inde liquor effluat, apud auctores sanè uariis est. quandoquidem Theophrastus, & Dioscorides arborem dixerunt ungibus ferreis scalpi, ut inde uulnerato cortice fluat lacryma. Plinius uerò contrà, si ferro incidatur, statim siccari, atq; emori scribit: ob idq; qui opobalsamum colligunt, inquit, uitro, lapide, ossisq; cultellis ad corticem uulnerandum utuntur, deinde succum lana excipientes in corniculis colligunt. Cæterum cum mecum sæpius cogitauerim à tot imposturis, quæ indies fiunt, nos cauere non posse, non alienum fore duximus illud in hominum memoriam reuocare, quod si unquam opobalsamum uenale inueniatur (tametsi in Italia per longas ætates non amplius ipsum uenturum putem) non ematur, nisi prius de eo omne fiat periculum, quo clare cognoscatur omnibus ijs præstare tum nostris, tum facultatibus, quæ illi ab auctoribus tribuuntur. Ad hæc Balsami fructus, siue semen, quod Carpobalsamum uocant, ab eo quidem longè differt, quod his temporibus ex Alexandria comportatur. Siquidem optimum legitimum flammum sit oportet, factum, ponderosum, gustu mordens, & feruens in ore: non autè nigrum, leue, inane, non acre, & nullum spirans odorem, quale, quod circumfertur, deprehenditur. Quo sit, ut non aliud suspicandum sit, quàm quod hoc idem sit semen hyperico simile, quod etiam Dioscoridis æuò à Petra Palæstinæ oppido deferrebat. Hoc idem ligno euenit, quod Xylobalsamum uocant officinæ Græcos secutæ. quippe quod passim in ijs habetur, potius myrrin, quàm Balsamum refert. Corticis non meminit Dioscorides, quanuis dixerit Plinius libro & cap. superius citatis, ipsum quoq; in usu medentium esse. Balsamum memoriæ prodidit Galenus lib. VI. de simplicium medicamentorum facultatibus, sic inueniens. Balsamum desiccatur, & ex calcit secundo excessu. Est autem tenui partium, adeo ut odoratum sit. Sed liquor eius subtiliorum etiam partium est, quàm ipsa planta, non tamen adeo calidus, ut quidam existimant tenuitate partium falsi. Porro fructus eius persimilis genere facultatis est, cæterum longè in subtilitate partium inferior. Placet eidem Galeno (ut in libello de supposititijs medicamentis illi adscripto legitur) ut Balsami nice statim myrrhæ, aut oleum irinum, in compositis medicamentis commodè inseri possit: xylobalsami uerò loco leucioj radice. Porro quid carpobalsami uice supponendum sit, nullibi apud eundem reperi. tametsi in quodam incerti auctoris libello, quem seplasiarij Quid pro quo nuncupant, pro opobalsamo oleum terebinthinum, uel laurinum, uel gummi hederæ, subijciatur; pro carpobalsamo hederæ corymbus; & pro xylobalsamo hederæ ipsius lignum: tantam ille hederæ tribuit auctoritatem. Sed alia est opinio nostra: nam ipse libentius pro opobalsamo oleum myristicæ nucis, uel styracis cinum supposuerim, quàm terebinthinum, uel laurinum; pro xylobalsamo agallochum; & pro carpobalsamo uulgares cubebas. Quod autem Carpobalsami locum cubebæ rectè supplere possunt, pleriq; rei medicæ studiosi id mecum sentiunt. Sed addam præterea, quod si ex mandantur, dentibusue conficiantur, mordent gustum, feruentes in ore percipiuntur, & aromatis non modicum resipiunt. quas nimirum qualitates Balsami fructus inesse Dioscorides testatur.

Hinc igitur fit, ut in hoc à Fuchsio, uiro aliqui doctissimo, planè dissentiamus. namq; is in libro, quæ de compositione medicamentorum nuper auctum edidit, Carpobalsami loco leucioj radicem supponendam censet: eo quidè argumentum (ut inquit) quod ita scriptum repperit in eo Galeni libro, cui titulus est de substitutis medicamentis. Verum cum ipse nusquam (quod equidem legerim) in legitimis Galeni libris inuenerim, hunc auctorem, si desit Carpobalsamum, substituere, uel uiribus proximam facere leucioj radicem, cui nulla prorsus inest qualitas, neq; facultas, quæ Carpobalsamo respondeat, non est, cur in hoc Fuchsij probem sententiam. Cæterum assertur iam (ut audio) ex occidentalibus Indijs liquor odoratissimus liquido styraci admodum similis, quem qui deferunt, appellant Balsamum, quod notas nonnullas Balsami præ se ferat. Veruntamen cum teste Strabone Balsami lacryma lacteo colore sit, crediderim

Carpobalsamum non legitimum.

Balsami uires ex Gal.

Fuchsij opinio improba.



erediderim potius nouum liquorem hunc, ueram esse stactem, uel styracis liquorem, quam Balsami: ob idq; non esse penitus ab ressi quispiam eo Balsami loco uteretur. Quidam recentiores cum se Opobalsamo destitutos conspiceret, illud artificio quodam non sanè dammando componunt. Faciendi modum sic habeto: ego enim hac ratione pluries ipsum mihi confeci. Sumito resina terebinthina, abiegna, cuiusq; libram: thuris albi, ladani, cuiusque unc. sex: nardi Indici drac. duas: radicum phu, iridis, acori, asari, cyperi, singul. drachmam: mastiches, galangæ, caryophyllorum, cassiæ odoratæ, zedoariæ, cuiusq; drach. sex: nucum myristicarum unc. quatuor: macis unc. unam: agallochi unc. duas: gummi elemi unc. sex: aloes hepaticæ, myrrhæ, cuiusq; unc. unam & semis. castorei drach. decem: ofsum cariotarum, styracis calamiti pinguis, laseris odorati, sing. unciam: lacrymæ sanguinis draconis sex unciam: florum lauendulæ un c. quatuor: olei unguentariæ glandis unc. sex. Quæ ex his atterenda sunt, in puluerem conterito, liquoribusq; admisceto, & uitreo organo (si nescis, Chymistas consulito) diligentissimè ui commensurati ignis oleum elicit. Primum enim clarissima tenuissimaq; emanat aqua, tenuissimarum utiq; partium, quæ igni adnota modo quodam admirabi flagrat: hæc aqua Balsami dicitur. Deinde defluit oleum colore aureo, & substantia inter tenuè, & crassam, quod oleum Balsami uocant. Postremo uerò id manat, quod Balsanum uocant, rufo colore. Aqua, quæ prius fluxit, uentriculi imbecillitate affectos hausta mirum in modum iuuat: siquidem tum pituitam, tum flatum ualenter consumit. sed quòd acerrima sit, dari sanè per se nequit, nisi uino, aut iure aliquo admista. Liqueor deinde, qui secundo stillicidio fluxit, quem quidam cæteris præferunt, mirificè neruorum uulneribus, compaginum cruciatibus, conuulsis, resolutis, comitialibusq; succurrit. Vltimum uerò oleum hæc omnia similiter præstat, uerum debilius. Pollent hi liquores & ad alia innumera corporis incommoda, quæ breuitati consulentes silentio inuoluenda duximus. Balsamum sic Græcè dicitur, ut Latine etiam Balsamum: Arabicè, Balasem, Bolefma, aut Belfan: Italicè, Balsamo.

Balsami facti  
tij conficiendi  
ratio.

Nomina.

## Aspalathus.

## Cap. XIX.

ASPALATHVS, aliis erysiceptron, frutex est surculosus, multis spinis horrens. Nascitur in Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula: quo ad unguentorum spissamenta pigmentarii utuntur. Optimus est grauis, detracto cortice rubescens, aut in purpuram uergens, densus, odoratus, gustatu amarus. Est & alterum eius genus candidum, lignosum, sine odore: quod deterius habetur. Vim calfaciendi cum adstrictione obtinet. Vnde decoctum cum uino ad tetra oris ulcera colluenda conuenit: ad nomas genitalium, & sordida ulcera infunditur: subiectum in pecto, partum extrahit. Aleum fistit eius decoctum: & sanguinis reiectionem potu cohibet: urinæ difficultatem, inflationesq; discutit.

ASPALATHVS quidem ex Creta, Rhodo, uel Syria ad nos (quod ego sciam) non aduehitur: etsi existimauerint nonnulli santalum rubrum uocatum esse Aspalathum. Quorum errorem Serapio manifestè prodidit: quandoquidem de santalo agens, nullum (ut assolet) assertit Dioscoridis testimonium, sed tantum suæ gentis nititur auctoritatibus. Quod maximo argumento est, santalum rubrum nihil cum Aspalatho habere cognationis. Meminit tamen Serapio Aspalathi sub Arabico nomine Darisfaban, ubi leguntur omnia, quæ de ipso tradidit Dioscorides. Huic alia ualidior accedit ratio, siquidem Aloisius Cadamustus, Columbus, & Pinxonus in suis nauigationibus ad orientales Indias aliasq; ignotas terras, continuas santalorum recta proceritate syluas unanimiter uidisse narrant. Quod longè abest ab Aspalatho, qui frutex humilis est suauiter odoratus, amarulento gustu, quæ in rubro santalo non deprehenduntur, rubrum enim santalum odoratum non est. Quòd si quandoque odoratum sentitur, id (ut optimè norunt periti myropole) non euenit, quòd ex se tale sit, sed quòd, dum una cum albo, & flauo importatur, quæ odorata sunt ex illis sibi odorem ascieuerit, qui tamen tractu temporis facillè euanescit. Porro Ruellius mediocri censura non uacat, quòd pro certo asserat, id legitimum esse Aspalathum, quod Rhodium oleastrum nonnulli uocant: quo item quondam agallochi uice utebantur myropolia. Cuius materiem cum & in seplasijs, & apud artifices, qui precatorias (ut ita dicam) coronas ad Deipara uirginis salutationes torno conficiunt, diligentissimè sim perscrutatus, ea sanè nigra partim, partim uerò ex nigro, flauoq; uenosa mihi sese obtulit. Rubram autem, & subrubram (ut Ruellius inquit) nusquam me uidisse ingenue fateri possum. Adde etiānum, quòd sit (quemadmodum Rhodij narrant) hæc planta ex olearum genere Rhodio tractu abunde proueniens, quæ oliuas etiam proferat, sed nec multis spinis horrens, nec detracto cortice rubescens. Quamobrem (ut mea fert opinio) Aspalathus non erit Rhodium oleastrum, neq; santalum rubrum. Itaq; cum nobis Aspalathus desit, qui tamen facillè ex Rhodiorum insula asferri posset, suppleat eius locum uiticis semen: sic enim in Galeni succidaneis scriptum reperio. Meminit Aspalathi Galenus lib. vi. simp. med. sic inquit. Aspalathus gustu quidem acris simul & astringens est: facultate uerò ex dissimilibus constat, nempe partibus suis acris ex calfaciens, partibus uerò alijs, austeris scilicet, refrigerans. Itaq; utriusq; ratione desiccatur, & proinde ad putredines, & fluxiones est utilis. hætenus Galenus. Cæterum quòd etiam hi nostri commentarij Santala redoleant, posteaquam antiquiores Græci eorum non meminere, de his hic disserere non alienum duximus. SANTALVM itaq; in utraq; India syluis densissimis, ingentissimisq; nascitur. Cuius tria numerantur genera: quorum præfertur pallidum, secundum locum habet album, postremum rubrum, quòd nullo commendetur odore. priora duo suauiter spirant. Quapropter Mauritanorum sententiam minime probandam putauerim, qui Santalum tertio ordine frigefacere, siccare uerò secundo memoriæ prodiderunt. Rubrum (ut ipsi asserunt) priuatim defluxiones prohibet: incandescentibus inflammationibus, podagrisq; ex succo solani, aut sedi, uel portulacæ utiliter illinitur. Candidum, & pallidum, ex rosarum aqua fronti imposita, capitis dolores mulcent. Aduersantur omnia calidis febribus: epota & stuanti uentriculo mirificè auxiliantur. Fiunt ex ijs, & aqua rosarum epithemata, quæ uentriculo illita eius seruo-

Aspalathi cō  
sideratio.

Ruellius er-  
rore notatur.

Aspalathi ui-  
res ex Gal.

Santalorum  
consideratio,  
& uires.



Nomina.

rem in ardentissimis febribus extinguunt. Ad hæc (ut auctor est Auicenna libro de uiribus cordis) Santalum non modo cordi efficacissimè lætitiæ affert, sed & robur non paruum addit. Quare his immiscetur medicamentis, quæ cordi, & cordis palpitatiõni maximam opem præstant. Quod *απ' αλδος* Græcis, Latinis item Aspalathus uocatur: Arabibus, Darisfahan: Italis, Aspalatho.

## Muscus.

## Cap. XX.



Musci arborum hist.

BRYON, id est, Muscus, à quibusdam splachnon appellatur. In cedro arbore, populo alba, & quercu inuenitur. Optimum est cedrinum, proximum populneum: in quo genere candidum, & odoratius præstat: nigricans improbat. Adstringendi uim habet. Decoctum insidentium uuluis utile. Unguento balanino, oleisque inspissandi gratia inseritur: thymiamatum, acoporumque compositionibus conueniens.

GALENUS lib. VI. de simplicium med. facultate, & post ipsum Paulus, non modo Muscum, qui cedris innascitur, intactum non reliquere; sed præterquam quod populnei, & querni meminerint, de eo etiammum, qui in picea arbore abieti cognata oritur tradiderunt. A qua ipse quidem in uallis Ananie montibus supra Tridentum muscum admodum uillosum proprijs manibus, quampluries decerpit, multò sanè odoratiorem, pulchrioremque, quam qui in populo, & quercu prouenit. Nec minus piceo suauiter olet abiegnus, quo in eorundem montium syluis, abietes innumeras adeò uillosas, incanasque mihi uidere sæpius contigit, ut prima statim facie crediderim ullos frondium loco ipsi in arboribus genitos esse. Sortitur arboreus Muscus uaria, ac diuersa nomina: quippe & muscus, & bryon, & sphagnos, & splachnon, & hypnon appellatur. Meminit huius Plinius lib. XII. cap. XXIII. sic inquit. Sphagnos in Cyrenaica prouincia maximè probatur: alij bryon uocant. Secundum locum obtinet Cyprius, tertium Phœnicus. Fertur & in Aegypto nasci: quin & in Gallia non dubitauerim. Sunt enim hoc nomine cani arborum uilli, quales in quercu maxime uidemus, sed odore præstantes. Laus prima candidissimis, atque altissimis: secunda rutilis: nulla nigris. Et in insulis, petrisque maxime

improbantur, onuesque, quibus palmarum, atque non suus odor inest. hætenus Plinius. Ceterum in eo genere, quod in Italia prouenit, is & nobilior, & odoratior apparet, qui in larice nascitur: quapropter & uiribus fortasse præstantior erit. Nimirum recordor me non parum eo quandoque fuisse oblectatum, dum nocturno tempore quibusdam in montibus super fœno recumberem, ex conquisitis plantis defatigatus, ubi larices innumerae erant omni ex parte uilloso musco incane. Quandoquidem pastores, ut nos ueluti re noua, & uoluptuosa reficerent, quodam paruorum ignis lumine hos uillos incendebant, qui tanto flagrabant impetu, & crepitu, ut nobis quidem uiderentur tormentorum puluerem facile superare. Quippe flammæ una cum ingenti fauillarum copia, in obscuræ noctis silentio ad astra tolli uidebantur, relicto sui odoris oblectamento. Vnde illud existimauerim, quod Galenus, cum bryon in quercubus, & piceis inueniri tradiderit, non solum de picea intellexerit, sed etiam de congeneribus plantis, nempe abiete, larice, & pinu. Is autem lib. VI. simpl. med. citato, ita de eo scriptum reliquit. Bryon, quidam uero splachnon. Inuenitur autem in quercubus, & piceis, & populis albis. Vinum habet astringentem, inuolidam. Nec enim multum est frigidum, sed propinquum ferme medijs; quia uidelicet & digerendi, & emolliendi facultatis est particeps, maxime quod in cedrinis lignis reperitur. Muscum officinæ Arabes secutæ Vsnæam uocant. Inter quos Serapio epotum uinum retulit, in quo diebus aliquot usnea maduerit, altum somnum inducere, uentriculum roborare, uomitiones compefcere, & aluum sistere. Ad hæc Muscus (ut Auicenna inquit) utiliter inter cordis medicamenta inseritur, quod odoris fragrantia animi defectus iuuat. Sed quoniam arboreus muscus odoratissimum Moschon mihi in memoriam redegit, qui ab oriente, & occidente, quibusdam pilosis utriculis conclusus defertur, etsi Dioscoridis Galeni; eum hunc silentio præterierit; nos tamen haud quaquam dissimulanda putauimus, quæ ad hanc rem pertinere arbitramur. Siquidem hi nostri commentarii merito de me conqueri potuissent, si eos tanta odoris suauitate destitutos reliquisset; præsertim cum omnibus palam sit ubique terrarum Moschum inter pretiosa odora prima sibi comparasse se ore retentus, & barba & supercilijs inunctus defertur Moschus, quo alarum, nariumque tædia, sudoris graecolentia, & insuauis corporis halitus occultantur, lasciuiæ oblectamenta augeantur, molliorque politia fiat; sed etiam ut odoris peruentum est) Moschum ipsum in orbiculos componunt, quibus funiculo traiectis agelicas salutationes in celum eructant. Omnia denique, quibus miscetur Moschus, sua odoris iucunditate commendat. Quod si hæc lucubrationes eo forte

Musci arborum uires ex Gal. &amp; Arabibus.



forte caruissent, uerendum quidem erat, ne cum illis gratiam iniissent, qui mira undique odoramentorum fragrantia redolent. Quamobrem ut & ijs sibi unguenta omnium præstantissima, odoratissimaq; comparare ualeant, Moschi primum, deinde uerò liquoris Zibetti uocati, & Ambari denique historiam, & facultates describam. Moschi odorati historia.

CHVS itaq; (ut Ruellius ex Actio transcribit, si tamen ea Aetij legitima sunt, cum potius Symeonis Sethi esse uideantur) plura habet genera. Præfertur qui in municipio quodam nascitur, quod magis, quàm Chorasa ciuitas ad orientem uergit: hoc barbaro nomine Pat dicitur, colore sublauro. Secundam sibi sedem arrogat, qui ab India defertur, priori bonitate cedens, colore subnigro. Eo infirmior censetur, qui à Sinarum agro mittitur. At Moschus omnis in umbilico cuiusdam animalis gignitur, quod caprea simile est, unico armatum cornu, prægrandi corpore. Huic cum in uenerem agitur, furoris uehementia umbilicus intumescit, fitq; uomica prægnans congesto inibi crassiore sanguine: quo tempore & pabulo, & potu ferum animal abstinet, humiq; crebro uoluitur: qua uersatione umbilicus lutofo, saculentoq; sanguine turgentem exprimit. Ceterum emissa sanies post aliquod tempus sibi magnam odoris suauitatem adsciscit. De Moscho inter Arabas scripsit diligenter accurateq; Serapio, his uerbis. Animalia capreis non absimilia, quæ moschum gignunt, in Tumbascorum, & Sinarum agro potissimum habentur, loca inuicem contermina. Tumbascinus Sinico longè præstantior est, quod caprea moschum gignentem & nardum, & alias odoratissimas plantas depascantur. Quod Sinis non euenit. nam etsi hæc quoq; odoratis uescantur herbis; ea tamen odoris, & facultatis præstantia, nardum, & ceteras Tumbasci plantas non æquant. Quinetiam in causa est demetendi ratio. quippe Tumbascini è uomica folliculo saniem nunquam eruunt, quod adulteria permisceant, & non nisi sereno celo sincerum legunt. Sinici uerò uomicae utriculum exprimunt, & exclusa sanie imposturas quasdam admiscunt, núbilo parumq; arridente celo, & alabastris recondunt. Is ceteris præstat, qui maiore odoris fragrantia redolet, & qui è uomica maximè matura eruitur. Sunt & inter hæc animalia, quæ ab alijs moschum ferentibus nullo discrimine differunt, præterquàm caninis uocatis dentibus. quippe hæc uerrium modo exortos palui longitudine dentes habent, & pariter moschum præstantissimum gignunt. Moschus præcox tetro, & insuaui odore displicet. uerum uenatores immaturi folliculos excutientes, tantisper eum libero aere suspendunt, dum abacto prorsus fetore maturuerit. Is enim aeris coctione perfecta, miram sibi conciliat odoris suauitatem. Veruntamen præcipuus habetur, qui suapte natura in animalis utriculo sibi maturitatem cõparauerit. Hunc incolæ per saxa metunt, & arborum truncos. namq; animal cum uomicam maturam esse præsentit, saxis & truncis sese magno oblectamento affricat, donec facto uomicae emissario tota saniei uis effundatur. Hic ceteros sanè antecellit, tanquam solis coctione, & celi benignitate maturitatem ultimam consecutus. Hunc itaq; moschum inde uenatores colligentes eorum animalium utriculis asseruant, quæ aliàs uenatione captauerant. Isq; ille moschus est, quo reges & donantur, & utuntur. Moschus excalfacit ordine secundo, siccat uerò tertio. Cor frigidum, ac tremulum roborat, & omnibus ipsius affectibus opem præstat potus, atq; illius. Detergit tenues oculorum albugines, & humidæ defluxiones exiccat: cerebrum roborat, & diuturnum capitis dolorem mulcet, si tamen pituitæ redundantia pronemiat. Coles ex eo cicino oleo macerato perunctus, promptius in uenerem excitatur. Probant nonnulli an Moschus legitimus sit, hoc modo. Pondus libra examinatam in labellum humore perfusum inmittunt, tum paulò post iterum æqua lance ponderant. Quod si superferatur, sincerum & legitimum existimant: sin cedat, spurium, & adulteratum putant. Huic simile aliud quodpiam habemus, sed præterquàm quod mirum in modum oleat, primo statim occurfu odoris uehementia nares admodum ferit.

Moschi odorati uires.

Zibetti historia, &amp; facult.

## ANIMAL ZIBETTVM PROFERENS.



50

Hoc uulgari sermone uocamus ZIBETTO, unguentarijs maximè expetitur ad ea odoramenta componenda, quæ proprio misturas appellant. Gignitur id in exteriori testiculorum utriculo cuiusdam animalis, felis, qui ueteribus ædificiorum ruinis oberrat, non absimilis. Catos hæc animalia uocant, quos sæpius Venetijs uidi ex Syria delatos. Est autem Zibettum tanquam sudor inter huiusce animalis testiculos concrefcens, calidæ, humidæq; facultatis. Id caueruile umbilici impostum uulue strangulationibus mirificè prodest: proinde nec mirum est, si eo uiri peni circumlito magnæ mulieribus in coitu afferant solatium. Porro ex quo AMBARVM aliud odoramenti genus gignatur, quod nos uulgò uocamus Ambracane, uarij uariè opinantur. Alij nanq; tradunt ipsum in maris alueo non secus, atq; in terra fungos oriri, ac deinde seuientibus procellis, è profundo elici, & in litus expui. Nonnulli uerò referunt piscem Azelum nomine Ambarum hoc audissimè prosequi, cuius esu necem sibi statim consciscere. Quod cum sciant piscatores huius rei periti piscem hunc mortuum, undisq; fluctuantem coniectis uncis & funibus extrahunt: & Ambarum scisso animalis uentre cruunt. Quod uerò (ut perhibent) proximè dorst spinam inuenitur, id maximè præferatur.

Ambari historia uaria.



Ambari gene-  
ra, & uires.

Fuchſij opi-  
nio.

Nomina.

tur alio. Quidam præterea in fontibus quibusdam Ambarum natæ scribunt, qui bituminis modo illud eructant. Huius sententiæ e recentioribus Græcis inuenio Symeonem Sethi, qui Ambarum describit his uerbis. Ampar, quod & Ambar appellatur, in diuersis locis scaturit. Sunt enim eius fontes ut bituminis, & sulphuris, & rerum similium. Tria Ambari faciunt genera. Præfertur colore fuluum e Selachito Indiæ petatum. Aliud subalbidum, quod e Sinechrio felicitis Arabiæ oppido aduehitur. Tertium atrum, & cæteris uiribus imbecillius. Excalscit Ambarum, & seccat: ce rebrum, & cor olfactu roborat. Senibus, & natura frigidis opem mirifice præstat. Quare iisdem potius, quàm inueni- nibus chirothecæ Ambaro imbutæ concedi deberent. Vino infusum temulentos efficit. Cæterum ex antedictis que sit Ambari historia ut uerior accipienda, non equidem ausim decernere, quod nihil adhuc certi atq; explorati habeam. Neq; etiam libet subscribere sententiæ Fuchſij, quanuis uiri eruditissimi: qui in libro de componendis medicamentis, quem ultimo loco auctum edidit, Ambarum nostri usus factitium esse censet, atq; legitimum Ambarum, de quo scrip- serunt Mauritanii, quodq; ipse succini generi adscribit, desiderari. Siquidem non uideo, quibus rationibus, uel aucto- rum testimonijs hanc suam comprobet sententiam. Muscus arboreus βρύον, ἢ σολάγγρον Græcis appellatur: Muscus, Latinis: Axnech, aut Vſnee, Arabibus: Mosco, Italis: Moosch, Germanis. At Moschus odoratus μόσχος Græcis recentioribus nominatur: Moschus, Latinis: Misch, seu Mesch, Arabibus: Muschio, Italis.

## Agallochum.

## Cap. XXI.

AGALLOCHVM lignum est, quod ex India, atque Arabia deportatur, thuiæ ligno simile, maculatum, odoratum, gustu adstringens cum quadam amaritudine: cute uerius quàm cortice uestitur, aliquantulum uersicolore. Manditur, aut decocto os colluitur, commendandi halitus gratia: sudores arcet toto corpori insparsum: pro thure ad suffimenta substituitur. Radix epota drachmæ unius pondere, humida stomachi uitia, & imbecillitatem, feruoremq; mulcet: si lateris, iocinerisue dolor excruciat, si dysenterix, aut tormina infestant, ex aqua bibere prodest.

Agallochi co-  
sideratio.

AGALLOCHVM à Græcis, & Latinis recentioribus, sicuti ab Aphis Lignum aloes appellatur. Optimum à Lusitanis e Calecut Indiæ emporio ad nos conuehitur. Etsi etiam Venetias hac ætate ex Alexandria Aegypti præstantissimum afferatur: siquidem igni accensum suauissimum, ac pericundum spirat odorem. Nec ob id putandum hoc illegitimum esse, quod ἐστυμένον, id est punctis maculatum non sit: quoniam Oribasius non legit ἐστυμένον, sed ἐστὶ μὲν ἐν τῷ ἐνός, id est. Est igitur odoratum &c. Quemadmodum nec id etiam legit Serapio, qui nec punctorum, nec macula- tarum meminit: sicuti nec Paulus. Cæterum non diu est, quod legitimum importari coepit: nam licet antea, quibusdam non deesset Agallochum uerum, nihilominus, quod rarissimum esset, officinæ ferè omnes eius loco, ut superius diximus, oleastrum Rhodium suppeditabant: quem falsò existimauit Ruellius aspalathum esse. Nascitur Agallochum (ut Lusitani per meredem in oriente nauigantes testantur) in insula Taprobana, alijsq; consinibus locis, cuius integros truncos in Lusitaniam, & Hispaniam iisdem secum attulere, qui non modò incensæ, sed manuum tantum attritu suauiter (ut aiunt) redolent. Porro ubiq; pretiosum Agallochum est: nam & in locis, ubi nascitur, plurimi penditur. Verum Agallochum, quod tantopere præstet, hætenus mihi uidere non licuit. Sunt, qui somniantes dixerint, Agallochi arborem uidisse neminem, cum terrestri tantum paradiso proueniat: illudq; ferri fabulantur fluminibus, quæ (ut sacra testantur monumenta) ex eo manant. Atqui pro comperto habetur (ut paucis innuit Serapio) Gangem Indiæ amplissimum fluium quàm plurima secum Agallochi fragmina uehere, quæ tamè in ipsum ducuntur aliorum fluminum cursu, qui in eum conflunt. Quippe cum fluiui transluant loca, ubi Agallochum prouenit, aquarum inundationibus turgentes, huius truncos fragmina, ac ramenta rapiunt unà cum alijs uarij generis lignis, & in Gangem transferunt: quemadmodum in nostris etiam fluminibus sepe ac sepius uisitur. Cuius rei indicium affert illud, quod Venetijs uenditur, utpote quod longo aquarum discursu omni ex parte laceratum, exesum, cominutumq; spectetur. Quamobrem mirum non est, si dum manibus tractatur id odoris non præstet, quo illud fragrare prædicant ex natali solo in Lusitaniam aduectum. Eius plura numerantur genera, si Serapioni fides est adhibenda, qui ex Abohanifa Arabo ita transcribit.

Agallochi hi-  
storia ex Se-  
rap. & Sym.

Dicunt Agallochum in Arabia nunquam oriri; tametsi quædam ibi crescat planta neuig uocata, quæ quadamtenus Agallochum refert. Verum præstantissimum India mittit, & quanuis hoc genere differat (plura enim Indis Agallochi sunt genera) id tamen quod uiribus cætera præcellit per excellentiam Indum peculiariter uocant, quemadmodum nigra myrobalana, quod cæteris præstent, Inda pariter appellant. Indum in quadam Indiæ insula inuenitur, quæ Fimua nominatur. Selectissimum est nigrum, quod uarium ostendat colorem, succi plenum, ponderosum, duritie compactum, crassum, non albicans, & quod accensum agerrimè flagret. Secundæ bonitatis est Mondunum à Mondel Indiæ urbe denominatum. Tertium est Seificum, quod non obscure bonitatis præsumitur, quod sua præstanti ui, ac graue dine in aqua coniectum, non innatet, sed statim subſadat. porro ex hoc genere id magis præstat, quod crassum est, & plurimo humore prægnans. Postremam sedem habet Alcumericū Seifico bonitate cedens: tametsi Alcumeri non longius à Seifi distet, quàm itinere triduo. Præstat in Alcumerici genere nigrum uulla albedine uarium, graue, ignium flammis diu resistens, ueruntamen uiribus Seifico infirmius est. Item ex auctoritate Chealsitebeni idem ita scribit. Fecit cortex, quod incolæ Agallochum statim ab arbore dissectum integro anno sepeliunt, ut ita terra obrutum mar- tabentes ex Agallochi arboribus ramos, raptos à fluminum inundationibus per circumstantes regiones deferri. hæc Serapio. Cui subscribit e recentioribus Græcis Symeon Sethi, causam etiam reddens, cur annua sepultura dissectum Agallochum recondatur, cum inquit. Non alias odoratus futurum existimant, nisi prius marcorem aliquem & terebinem



teredinem senferit: proinde harum regionum incolæ dissectum sub terra condunt, suoq; tempore eximunt, & negotiatoribus uedunt. Nicolaus Myrepsicus sapiens in suis componendis medicamentis Agallochi crudi meminit, ubi Fuchsij prima de antidotis sectione, sic adnotauit. Saepè Agallochi crudi metionem facit Nicolaus, ideoq; hoc loco, quæ nostra de illo sit sententia, exponemus. Per crudum itaq; lignum intelligo, quod non putruit: nam (ut testis est Symeon Sethi) eius regionis, in qua prouenit, incolæ id ipsum concidunt, & sub terra multo puluere obrunt, & post aliquod temporis spatium, quantum scilicet sufficere uidetur, ligni partes educunt, & mercatoribus vendunt. crudum itaq; erit, quod terra non obruitur, sed statim ab arbore excisum ad usum rapitur. hæc Fuchsij sententia. A quo tamen nos pace sua dissentimus. nam si in componendis medicamentis præstantiora simplicia semper exposcimus, sitq; Agallochum illud præstantius, odoratiusrq; (ut etiam Symeon ille refert) quod terra, uel puluere fuerit sepultum, non uideo, cur potius insepultum, & statim ab ipsa arbore excisum (idenim ob locorum distantiam recens habere nequimus) cridum uocauerit Nicolaus, præstantiusq; existimauerit. Puluere enim uel terra conditum coqui non potest, quod nullus ibi sit ignis, neq; calor, sed potius recrementitia humiditate exui, quæ fortasse odorem eius obtundit. Verum crediderim potius, per cridum Agallochum Nicolao illud designari, quod non fuerit antea elixum: quod inde fortassis odoratissima lauacra ex Agallochi decocto sibi conficiant Indi, aliq; odoramenta in regales præparent usus, ut etiam cum rhubarbaro fieri narrant. Vel fortè per crudum illud intelligit Nicolaus, quod impetu fluminum, longq; eorum ductu per regiones non deferretur. In his namque calorificis regionibus aquæ à solibus non obscure calefactæ non modo illud omni ex parte diluunt, sed etiam elixant. Illud præterea addiderim, quod cum non modo crudum, sed etiam bonum addiderit Nicolaus, nullum aliud expetere uidetur, quam quod sepultum præstantissimum euaserit. Ceterum Agallochi omne genus excolat, & exiccat ordine secundo. Facit, Agallochi fa-  
ut Auicenna scribit, ad cordis affectus: ob idq; inter ea medicamenta, quæ cordi præsidio sunt, Agallochum recens- cultas.  
uit. Huius non reperio meminisse Galenū alibi, quam in succidaneis, ubi centaurium supplet pro Agallocho. Li- Nomina.  
gnum, quod Græci αγγάλλοχον, Latini similiter Agallochum dicunt. Verum recentioribus Græcis ἄγγελλον nomi-  
natur, ut officinis Lignum aloës: Mauritanis, Hoad, Agabian, Agalungin, aut Agalugen: Italis, Agallocho, &  
Legno aloë: Germanis, Aloes holtz, seu Kreuz holtz: Hispanis, Lin aloë.

## Narcaphthum

## Cap. XXII.

NARCAPHTHVM ex India deferretur, corticosum, simile sycomori libro: quod incundi odoris gratia sufficitur. Miscetur thymiamatis compositis. Constrictionibus vuluæ suffitu prodest.

TAM breuiter, tamq; parcè de Narcaphtho scripsit Dioscorides, ut nimirum mihi perdifficile sit explicare, quidnam hac ætate ad nos ex India afferatur, quod legitimum Narcaphthum referat. Eoq; magis quod nihil de hoc (quod equidem sciam) Theophrastus, & Plinius suis monumentis posteritatis memoriæ prodiderunt. Attamen non desunt indicia, quæ præ se ferant (si modò ad nos deferatur) id omnino esse Narcaphthum, quod uulgò officinæ uocant Tigname. nam tigname non aliud integrat, quam thymiana apud Græcos, quod apud Latinos suffimentum significat. Proinde cum huius insuffimentis frequentissimus sit usus, nil mirum si nouum ex usu sibi uendicauerit nomen, quod est thymiana. Id quod corruptentes posteri tigname pro thymiamate dixere. Ad hæc (ut Dioscorides inquit) incundi odoris gratia per se sufficitur, ac etiam alijs suffimentis inseritur. Quod in Tigname facile probatur. quippe id tantum usu uenit in cõpositis odoramentis, quæ ad suffiendum parantur, ita ut præterquam quod per se id munus præstet, rarè quoq; sūt suffimentorū compositiones, quæ ipsam non recipiant. Quare admirari sinamus, si relicto proprio suæ arboris nomine, sibi ascititiam nomenclaturā ex suffimentis usurpauerit. Serapio Narcaphthū Λασηάτην uocat: & illud odorati calami uice supponi posse auctoritatē. Νάρφαθρον Græcè, sicut Narcaphthum Latine appellatur: Arabicè, Nabach, siue Lasahaten: Italicè, Tigname, ueluti seplasarum uulgo.

## Cancamum.

## Cap. XXIII.

CANCAMVM Arabici ligni lacryma est, myrrhæ quodammodo similis, uirosi gustus, quam ad suffimenta usurpant. Vestes eo, additis styrace, & myrrha, suffiuntur. Vim proditur obtinere extenuandi obesos, si ternum obolorum pondere ex aqua, aut mulso aceto plusculos dies ebibatur: lenosis datur, comitialibus. & suspiriosis: menses cum aqua mulsa pellit: oculorum cicatrices confestim emendat: uino madefactum medetur eorundem hebetudinibus. aduersus gingiuas humore prægnantes, doloresq; dentium, non aliud efficacius.

CANCAMVM, quod notis omnibus Dioscoridis historiam referat (ut recentiorum ferè omnium medicæ materie studiosorum fert opinio) nec ex Arabia, nec aliunde ad nos aduehitur. Quidam tamen pro Cancamo gummi quoddam rufum, ac pellucens ostendunt, quod surculos incognitæ arboris undique circumuestit, myrrhæ quadantenus simile. Verum tamen quod nulla (ut Dioscorides inquit) in eo manso saporis uirositas deprehendatur, alij id potius mentiri, quam esse legitimum Cancamum uolunt. Expetitur hoc gummi genus hoc tempore maxime insectoribus ad inscienda serica stamina, idq; uulgari sermone quidam in Italia appellant Lacca, quidam diminutè Lacchetta. Cuius duo habentur genera, quæ tantū (ut opinor) bonitate differunt. Præstantius uulgò appellant Lacca sinetrix: quod uerò deterius est, Lacca comberti, cognomentis fortasse à locis Arabum, à quibus deferuntur, acceptis. Primum surculis perpetuò obuiolum uisitur: alterum absque surculis in glebas concretum myrrhæ modo, quod etiam uiliori pretio uendunt. Hinc itaq; factum est, ut crediderint illi Serapionis auctoritate freti, hoc legitimum esse Cancamum: nempe quod



Lacæ Arabi  
opinio varia.

quod is Cancamū Laccam appellet, & quod arboris sit gummi, uel lacryma myrrham quadantenus referens: quodq; etiam eius meminerit Serapio, postquam de Dioscoridis & Pauli Cancamo egit, his uerbis. L A C C A ( ut inquit Isaac antran) res quædam est rubea, quæ tenuibus lignorum surculis inheret, sapore nō ingrato. Coquitur hæc, & inficiuntur inde panni rubeo colore, quam infecturam chermes appellant. Quod uerò post infecturam subsidet, & infectioribus remanet, pariter Laccam uocant. Cæterum Lacca ex Armenia defertur exiccans, & excalcificiens ordine secundo. Ventericulum, & iecur roborat, corumq; infarctus expedit, ictericos iuuat, & aquas pellit. Eluitur ad medicamenta hac ratione. Ramuli, qui hoc secant gummi, diligenter franguntur, ac subinde aqua perfunduntur, in qua odoratus uiscus aristolochiæq; inferbuerint, deinde pistillo agitantur, cum autem ab agitatione resederint, aqua leniter abijcitur, quod si una tantum lotionis non pelluceat, secundo item repurgetur, demum sicceat in umbra, & recondatur in uase uitreo, hæc Serapio. Quibus palam est, gummi, quod infectioribus uulgò Lacca dicitur, Laccam esse Arabum, & à Græcorum Cancamo differre; quod Dioscoridi Cancamum lacryma sit Arabicæ arboris, uirosi gustus: Serapioni uerò res quædam rubea, ex Armenia, non ex Arabia allata, tenuibus lignorum surculis inherens, sapore non ingrato. Item Dioscoridi Cancamum obesos extenuat, lienosos iuuat, suspiriosis, & comitialibus prodest, menses pellit, oculorum cicatrices delet, & hebetudinem curat, tumentes gingiuas cohibet, & dentium dolores tollit. Serapioni autem tantum obstructions aperit, uiscera imbecilla roborat, iccoris dolores mulcet, & regium morbum, & hydropem sanat. quæ omnia medicamentorum diuersitatem præ se ferunt. Quo fit, ut non ab re existimauerint peritiores medici, nos omnia nō Dioscoridis Cancamo esse destitutos. Veruntamen non desunt rationes, nec probatissimorum auctorum testimonia, quibus etiam probari possit, Græcorum Cancamum, & Arabum Laccā idem esse. Nam & si hæc, quæ allata sunt, omni ex parte uera uideantur; si quis tamen Dioscoridis codicem hoc capite secutere mendis animaduenerit, & rem omnem accuratius, diligentiusq; perpenderit, certior fortasse fiet, uos Cancamo non omnino destitui. Ego enim cum Paulum, qui in omni simplicium censu omnia ex Dioscoride transcripsit, accuratius perlegerem, inuenissemq; illi Cancamum lacrymam esse Arabicæ arboris, myrrhæ similem, odore grato, & quod nullius uirosi gustus meninerit, illico orta est suspicio, quod ea particula Dioscoridi illegitimè accesserit. Auxit deinde suspicionem hanc Serapio: quippe qui capite de Lacca de Cancamo agens, dum ( ut assolet) ex Dioscoride transcribit, nusquam huius particule mentionem fecerit. quod fortasse Dioscoridis codex, à quo transcripsit, hac menda facile uacaret. Sed illud adhuc magis rem ita se habere mihi persuasit, quod primum legatur in Dioscoride, Cancamum uirosi esse gustus, quod fetoris, non suauolentiae indicium est: mox cum styrace, & myrrhæ ad suffiendas uestes expeti, ut grato commendentur odore. quæ inter se maxime repugnant, ita etiam deprauatæ lectionis præbent suspicionem. His itaq; rationibus, & auctoritatibus non ab re adductus esse uideor, ut quasi crediderim Dioscoridis codicem hoc in loco uitiatum fuisse. Unde postea factum sit, ut eius Cancamū ab Arabico diuersum sese ostenderit. Neq; sanè huic opinioni illud obstare uidetur, quod plura in morbis curandis Cancamo assignauerit Dioscorides, quam Serapio. siquidē nulli dubium est, quin ea medicamenta, quæ obesos extenuant, lienosos iuuant, & menses cient, possint pariter uentericulū & iecur roborare, corumq; infarctus expedire, & cutem subeuntes aquas, & felle suffusos sanare. Hæc autem silentio inuoluenda non duximus, non ut nostra hæc probetur, uel improbetur opinio, sed ut alijs ueritatis inuestigandæ pateat aditus. Sunt etiam factitiae Laccæ plura genera: quæ ex diuersarum infectionum sedimento pictoribus tantum parantur. Alia nanque conficitur ex pimpinellæ bacca, quam uulgò uocant Cremesc, & Cremesino: ex infectorio cocco alia: alia ex natua Serapionis lacca: alia denique ex ligno, quod brasiliū uocant, omnium deterrima. quarum nulla ad medicamenta admittitur. Non tamen desunt, qui credant, chermesium infectioribus uocatum esse arboris gummi: imò illud idem, quod Serapio, auctore Isaac, rem rubeam (ut paulò antè diximus) esse ait, quæ tenuibus lignorum surculis inheret, & quod ea inficiantur panni rubeo colore, quem chermes appellant. quandoquidem huius sententiæ reperio fuisse Fuchsum. Sed meo iudicio nō exactè rem explorasse uidetur. quippe chermesium, quo puniceo, & purpureo colore serica stamina inficiuntur, est (ut Itali optime norunt) pilula, uel bacca exigua pimpinellæ radicibus in orientalibus regionibus adnascens, non autem gummi, uel roscidum, uel aliud per se manans, ab eo perquam longè diuersum. Siquidem hoc nil aliud est, quam natua Serapionis lacca, quam proprie Itali uocant uulgò lacca & lacchetta, infectioribus tantum ex petita ijs inficiendis sericis, quæ uiliori uenunt pretio. Nec obstat, quod dixerit Serapio, quæ hic secutus est Fuchsius huiusce laccæ infecturā uocari chermes: quippe proprio capite de chermes, nil sanè aliud per chermes intelligit, quam coecum infectorium Dioscoridis. quo fit, ut existimauerim in eo capite de lacca omnino subesse mendam, uel auctoris uel interpretis: & fortè melior hæc esset lectio. Coquitur hæc, & inficiuntur inde panni rubeo colore, adeo ut coecine uiuantur: uel adeo ut ijs similes sint, quorum infecturis iniicitur chermes. Aberrant præterea pharmacopolari quam plurimi Dialaccam antidotū componentes, quod legitimæ Armeniacæ laccæ loco, quam Arabes prodidere, factitias, & pictoribus tantum dicatas immisceant. Sed caueant, quæso, ne hunc errorem corrigentes in alterum non minus detestandū incidant: id nanq; ijs facile continget, si Monachis, qui in Mesuem scripserunt, more gerent. Hi enim iam rei medicæ professores asserere non dubitarunt, immiscendam esse loco cancami, seu laccæ in magnā dialaccā antidotum eam Aphricæ arboris lacrymam, quam seplaste sanguinem draconis appellant, quæq; Dioscoridis cinnabaris ab omnibus esse censetur. Sed certè ij magis hallucinantur, quam ut reselli debeant, quod ea lacryma in compluribus facultatibus cancamo aduersetur. Quippe Arabicum Cancamum, quod potissimè antidotus illa exposcit, tanquam à Mauritanijs inuentum, præterquam quod uentericulum, & iecur roborat; adeo eorum infarctus, & obstructions expedit, ut ictericos quidem, & aqua intercute laborantes iuuat. Contrā uerò draconis lacryma propria ui efficaciter adstringit, ita ut scriptum reliquerit Dioscoridis, eam lacrymam iisdem pollere uiribus, quibus hematitis lapis: cuius tamen uis est, ut mensium profluvia sistat, non autem ut eliciat, Cancami modo, præsertim ubi uasorum infarctus remouentur. ob idq; maxime expetitur ad sanguinis emanationes, ad uulnèra cohibenda, & osium fracturas ferruminandas.

Cācamum &  
lacca quodd  
idē sint, pro-  
batur.

Lacæ facti-  
tiae genera.

Fuchsi opi-  
nio improba  
ta.

Pharmacopo-  
larum error.

Monachorū  
lapsus.



Sed monachos missos faciamus : & seplastarios admoneamus , ut si nostro consilio uti uelint , non aliud pro lacca in eam antidotum imponant , quàm laccam ipsam Serapionis . quæ natiua ex Armenia ad sericorum uellerum infectum copiosissima ad nos defertur . siquidem de hac intellexerunt Mauritanii : quos secutus Nicolaus Myrepsicus in sua Dialacca confectioe laccam infectorum inmiscuit . Quod *καζυκαριον* Græci , Latini item Cancamum uocant : Arabes , Sach , siue Lach : Itali , Cancamo : uulguz officinarum , Lacca .

## Ciphi.

## Cap. XXIII.

CYPHI odorati suffimenti compositio est , dicata dijs : qua abunde Aegyptij sacerdotes utuntur . In antidota misceri solet : suspiriosis datur in potu . Permultæ componendi rationes , quarum una hæc est . Sumito cyperi dimidium sextarium , cum pari baccarum iuniperi adultæ modo : vix passæ pinguis , exemptis uinaceis , minas duodecim : resinæ purgatæ minas quinque : calami , & iunci odoratorum , & aspalathi , singulorum minam : myrrhæ duodecim : uini ucteris sextarios nouem , cum duabus mellis minis . Vuam passam , detractis uinaceis , tusam cum uino , & myrrha subigito : cætera tusa , & cribrata adjcito : die vno humorem combibere finito . dein mel coquito , dum sibi glutinis adfiscat crassitudinem : eliquatam resinam accuratè permisceto cum reliquis diligenter contritis , & inficile uas recondito .

NON omnes sanè Dioscoridis codices , præsertimq; uetustiores hoc Cyphi caput recipiunt . Quo sit , ut crediderim cum plerisque rei medicæ peritis , id illegitimè huc accessisse . siquidem non rationi consentaneum esse uidetur , Dioscoridem hic de simplicium materia scribentem , composita medicamenta tam inconsultè , ac præter rem simplicibus inseruisse : præsertim cum id nulli superiorum commodè adnecti possit , quemadmodum est de multis alijs compositionibus . Vt *κῡπῖ* Græcis , ita etiam Latinis , & Italis , Cyphi appellatur .

Cyphi caput  
adscititium .

Nomina .

## Crocum.

## Cap. XXV.



CROCVM optimum in medendi vsu Coryceum , recens , & boni coloris , paulum candidi gerens in capricolo , oblongum , omnibus suis partibus constans , non fragile , plenum , à quo detractum est nihil , quod madefactum manus inficit , nec situm redolet , aut cariem sentit , subacere : sin huius generis non est , aut uetus , aut humore perfusum creditur . Secundus locus datur Coryceo , è tractu Lyciæ contermino . Tertius Lycio , è monte Olympo . Dein ex Aegibus Actoliæ . Cyrenaicum & Centuripinū inter Siciliæ omnia uiribus infirmius est . Omnium natura oleracea . Itali tamen ob succi copiam , & coloris uenustatem , tingendis mortarijs dicauerunt : quibus de caulis magno venditur . Vtilissimum in medicina quod antè descripsimus . Adulteratur immisto crocomagmate tuso , atque etiam sapæ subtilu : contrita , quò pondus adiciatur , simul argenti spuma , aut plumbagine . Sed maleficium declarat insidens puluis , præsertim si defrutum in odorando subolet . Thessalus ipsum tantum odoratum esse uoluit . Alij exitiosum , tribus drachmis ex aqua potis . Procul dubio vim coquendi , emolliendi , atque substringendi habet : vrinam citè elegantem colorem præstat : qui ex passo biberint , crapulam non sentiant : oculorum fluxiones illitum cum humano lacte cohibet : additur in potiones , quæ interancorum causa temperantur : ad vuluæ etiam , sedisq; cataplasmata , vtiliter inditur : vencrem stimulat : vergentes ad ignem sacrum inflammations muleet : auriculariis collectionibus utile . Quò facilius conteratur , in calido sicili sole sicari oportet , celeriterq; versari . Vrinam mouet radix ex passo pota .

## Crocomagma.

## Cap. XXVI.

CROCOMAGMA sit expressis unguenti crocini odoramentis , & in formas digestis . Optimum est odoratum , modicè myrrham olens , graue , nigrum , ligni expers , læue , subamarum , quod madefactum croci colorem reddit , gustatumq; uehementer dentes ac linguam inficit , multis durans annis : quale est quod à Syria defertur . Habet suas vires ad delenda , quæ caliginem oculis obuersant :  
c 2 urinam



vrinam cit, calfacit, concoquit, & emollit: Vires croci proportionē quadāntenus repræsentat: quandoquidem plurimam croci partem sibi Crocomagma uendicat.

Croci consideratio.

Croci uires ex Galeno.

Nomina.

CROCVM quidem ubique terrarum cognoscitur. In Italia, & præsertim in Hetruria, Mauritanorum modo uulgò uocatur Zaffarano: quanquam non desunt rura in agro nostro Senensi, quæ corrupto à Croco uocabulo ipsū appelliant Gruogo. Caterum crocum Coryceum, & Lycium in Olympo monte decerptum (quod sciens ad nos non aduehitur. Quapropter quod ab Aquila Vestinorum urbe affertur, primum sibi locum uendicat in Italia. Constat optimum esse, & Aquilano longè præstantius, quod in Germania oritur, è Vienna Austriæ metropoli decessum. Sed huiusmodi sanè perexiguū est, idq; difficulter transit ad Italos, ob eius frequentissimū in cibis usum apud Pannonios, & Germanos. Floret Crocum (ut Theophrastus auctor est) uergiliarum occasu, paucisq; diebus: consistim uero cum folio florem quoque expellit. Gaudet calcari, & melius ita euadit. Croci meminī Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Crocus paululum etiam adstringens quid obtinet, quod terremū, frigidumq; ostendimus. Sed superat in eo calfaciens & qualitas, & facultas, ut tota eius essentia secundi sit ordinis excalfacientium, & primi exiccantium, proinde concoquendi quoque uim quandam habet, adiuuante scilicet in hoc & pauca adstrictione. Quippe quibus medicamentis, cum non admodum excalfaciant, paucula adest adstrictio, eā parem facultatem habent essentis emplasticis uocatis, quæ cum iunctas esse caliditati non uehementi contigerit, concoquentes esse ostendimus. Et lib. II. de comp. med. secundum locos: Crocum, ait, suo odore caput frigit, & mentem tentat, peucedani, & fructuum lentisci modo. Κρόκος, Græcè: Crocus, Latine nominatur: Zafafaran, aut Zafaran, Arabicè: Zaffarano, Italicè: Saffran, Germanicè: Azafan, Hispanicè: Saffran, Gallicè. Κρόκος uero quæ idem nomen retinet apud Græcos, Latinos, & Italos.

## Helenium.

## Cap. XXVII.



Helenij consideratio.

HELENIVM folia habet uerbasci angustioris folij, asperiora, oblonga: caulem quibusdam in locis non emittit: radicem subalbidam, interdum subrusam, odoratam, subacrem, vegetam, magnam: ex qua agnatae propagines liliorum, aut ari modo feruntur. Montanis, umbrosis, & siccis locis prouenit. Foditur æstate radix, particulatimque dissecta siccatur. Potum radice decoctum menses, & vrinas cit. Ipsaq; in eclegmate ex mele prodest tussi, orthopnææ, ruptis, conuulsis, inflammationibus, & serpentum morsibus. In summa excalfaciens est. Folia eius ex uino cocta utiliter ischiadicis illinuntur. Helenij radix & stomacho utilis est in passo condita: siquidem salgamarij paululum siccata eam, mox decoctam, & frigida aqua madefactam, in sapam coniungunt, & ad vsus recondunt. Trita, potaque ad cruentas excreationes efficax est. Alterum Helenij genus in Aegypto gigni Crateuas tradit. Herba est cubitalibus ramis, serpylli modo per humū repentibus. folijs læteticulæ circa ramos, sed lōgioribus crebrisq;: radice pallida, digiti minoris crassitudine, per ima tenui, supernè crassiore, cortice nigro. Nascitur in maritimis, collibusq;: Radix una in uino epota, contra serpentium ictus auxiliatur.

HELENIVM, quod Latinis etiam Inula dicitur, planta est uulgaris uotitia. Quod autem in Italia prouenit, folio est longè maiore, quàm tradiderit Dioscorides. Quippe non solum uerbasci angustifolio Inula Italica maiora insunt folia; uerum etiam ea magnitudine longè superant, quæ latifolio exoriuntur. Quod tamen si pro locorum uarietate cuenire facillè possit, crediderim

tamen hoc in loco Dioscoridis codicem pluribus scaterere mendis. Siquidem testatur Marcellus Florentinus uir quidē apprime doctus, se habuisse Dioscoridis uetustissimū, ac probatissimū codicem, in quo longè plura legebantur, quàm in cæteris fere cunctis Græcis exemplaribus. Sed præsertim in hoc capite hæc de caule, floribus, & serpine habebantur. Caulē ex se mittit Helenium crassum, hirsutum, cubitalem, & aliquando maiorem, angulosumq;: flores luteos: & in his semen uerbasci simile, tactu prurimum faciens. Quare mirum non est, si etiam alia hic desiderari possint, cum non facillè adducar, ut credam, Dioscoridem Helenij radice, cuius tantum est in medicamentis usus, tuam amaritudinem, tum formam subticuisse. Meminit Inula Plinius lib. XIX. cap. V. ubi sic habet. Sifer his feritur mensibus, februario, martio, aprili, augusto, septembri, octobri. Breuior his est, sed torosior amariorq;: Inula, per se stomacho inimicissima. Eadem dulcibus mistis saluberrima. Illustrata maxime Iulia Augusta quotidiano cibo. Superuacuum eius semen, quoniam oculis ex radice excisis, ut arundo feritur. Item lib. XX. cap. V. Inula quoque inquit, à ieiuniis commenducata dentes confirmat, si ut eruta est, terram non attingat. Condita tussim emendat. Radix



cis uerò decoctæ succus tineas pellit. Siccatur autem in umbra farina, tussis, & conuulsis, & inflationibus, & artibus medetur. Venenatorum morsus abigit. Folia ex uino lumborum dolori illinuntur. hæcenus Plinius. Ceterum Aegyptium helenium, quod Crateus auctoritate memoriæ prodidit Dioscorides, ad nos (quod ego sciam) non defertur, nec in Italia prouenit. Hoc à nostrate non distinxit Auicenna, sed utrumque simul confudit. Meminit huius etiam Plinius lib. XXI. cap. X. his uerbis. Helenium è lacrymis Helenæ dicitur natum: & ideo in Helena insula laudatissimum. Est autem frutex humi se spargens, dodrantalibus ramulis, folio simili serpyllo. Item lib. eodem cap. XXI. Helenium, inquit, ab Helenæ lacrymis (ut diximus) natum, fauere creditur formæ: cutem mulierum in facie, reliquoque corpore nutrire incorruptam. Præterea putant usu eius quandam gratiam ipsi, ueneremque conciliari. Attribuant & hilaritatis effectum eidem potæ in uino, eumque quem habuerit nepenthes illud prædicatum ab Homero. Quod tristitia omnis aboleatur. Est autem succi prædulcis. Prodest & orthopnoicis radix eius in aqua ieiunis pota. Est autem candida intus, & dulcis. Bibitur & contra serpentium ictus ex uino. Mures quoque contrita dicitur necare. hæc Plinius. Quibus satis constat, non modo in Aegypto hoc Helenij genus prouenire, sed etiam in Helena Aegæi insula præstantissimum haberi. Helenij uires scripsit Galenus libro VI. simpl. medic. sic inquit. Helenij herbe radix maxime utilis est, non primo statim occursum excalfaciens: ac proinde non dicenda est calida, & sicca exaetate, ceu piper tum atrum, tum candidum, sed cum recrementis humoris. Quapropter ecligmatis, quæ faciunt ad educendos ex thorace, & pulmone crassos, lentosque humores idonee commiscetur. Rubrificant quoque ea partes frigidas, ac diuturnis uexatas affectibus, cuiusmodi sunt nonnullæ coxarum passionēs, ischiadas uocant, & exigua assidueque articulorum quorundam præ humiditate procidentia, ac luxationes. hæc ille. Ceterum sunt, qui dicunt (ut etiam testatur Galenus libro de theriaca ad Pisonem, si tamen liber ille Galeni legitimus est) quod si Helenij succo tela uenatoria inficiantur, uenenata efficiuntur, idque in Dalmatia fieri narrant, ut feras omnino perdant. Quod tamen potius fabulosum, quam historicum crediderim. Planta, quæ Græco nomine ἐλένιον, Latino Helenium, & Inula dicitur: Arabico, Iasim, siue Rasen: Italico, Lella, Enoa, aut Enola: Germanico, Alant: Hispanico, Raiz de alla: Gallico, Aulnee.

Helenij Aegypt. confid.

Helenij uires ex Gal.

Fabulosum.

Nomina.

## Omphacinum, &amp; omne Oleum.

## Cap. XXVIII.

OLEVM, quod ex immaturis oliuis exprimitur, ad multos usus rectè valentibus accommodatissimum est. omphacinum id appellatur. Præstat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale vnguentorum compositionibus idoneum intelligitur. Stomaco utile est, quod astringat: gingiuas contrahit, dentes firmat, si contineatur in ore: sudores cohibet. quod autem uetustius, ac pinguius, eò ad medicamenta aptius est. Et (ut reliqua in commune dicantur) omne oleum calfacit, emollit uentrem, à perfrictionibus corpus tuetur, ipsumque promptius ad obeunda munera reddit. aluum emollit, vlcérantium medicamentorum uires permixtum hebetat: contra uenena datur, assidue potum, redditumque uomitionibus: soluit aluum hemina mensura cum pari ptisanæ succo, aut aqua potum: ad tormina calidum simul decocta ruta tribus sextariis in potu datur: ventris animalia pellit: idem maxime ilei intestini morbo laborantibus infunditur. Vetus magis calfacit, & uehementius discutit: oculorum claritati sublitum confert. Si uetusti non sit occasio, in uase decoquitur ad mellis crassitudinem, ut uetustatem representet.

## Oleum syluestris oliuæ.

## Cap. XXIX.

OLEVM, quod syluestres oliuæ fundunt, uehementer astringit, & ad sanorum usus secundum sibi locum vendicat. In doloribus capitis utiliter pro rosaceo substituitur: sudores arcet, defluentes capillos inhibet: furfures, vlcera capitis manantia, scabiem, leprasque abstergit: tardius canitiem sentiunt, qui eo quotidie perunguntur. Candidum oleum fit hoc modo. Album colore, nec anniculo uetustius, in nouum fictile oris patuli funditur, centum heminarum mensura, & sub solem media quaque die concha refunditur, ex altoque demittitur, ut assidua deuolutione, ictuque agitatum respuet: octaua die scenum græcum mundum quinquaginta denariorum pondere, calida aqua madefactum, donec emollescat, in supradictum oleum deijcitur, ita ne extillet aqua: postea tedæ præpinguis picæ, affulatum cæxæ æquale pondus adiicitur, & transactis octo diebus, oleum concha mouetur. Vbi candorem contraxerit, in uas nouum uetere uino affusum recondi debet, substratis fertulæ Campanæ corollis drachmas undecim pendentes, cum pari iridis pondere, sin minus, rursus soli mandandum, & idem munus obeundum, usque dum inalbescat.

## Sicyonium oleum.

## Cap. XXX.

SICYONIUM componendi ratio hæc est. In lebetem oris lati, stanno inductum, funditur noui olei albi, quod crudæ oliuæ reddiderunt, congius vnus: aquæ semicongius. Leui id igne coquitur, leniter mouendo: at ubi bis efferbuit, & subtracto igne refrigit, innatans oleum concha decapalatur, & adiecta noua aqua conferuescit, & reliquis, ut diximus, peractis reponitur. In Sicyonia maxime fieri cōsuevit, Sicyonij inde accepto cognomine. Calfactariam ad quandam usque modum vim habet. Fæbri, ac neruorum vitijis prodest. fæminæ ad commendandum faciei nitorem eo vtuntur.

c 2 Strigmen-



## Strigmentum.

## Cap. XXXI.

**STRIGMENTA** à balneis calfaciunt, molliunt, discutiunt: ad sedis rimas, & condylomata illinuntur. Illa verò, quæ ex palæstris puluerem sibi adsciuerunt, in sordis speciem redacta, articulorum nodos imposita adiuuant: ischiadicis in fots, aut malagmatis locum, calida commodè sufficiuntur. Derafæ gymnasiorum parietibus, simulacrisque sordes, calfaciunt: tubercula, quæ ægrè ad coctionem producuntur, dissipant: desquamatis, & ulceribus antiquis profunt.

Olei confide-  
ratio.

Olei usus apud veteres.

Olei facultates ex Gal.

Oleum sylue-  
stre.

Nomina.

**MULTO** quidem artificio ueteres utebantur ad componendum multifariam oleum, ut ex Dioscoride satis superq; constat. Quod tamen hac tempestate à nobis fieri non solet: quanvis fortasse apud Græcos eiusmodi parandi olei consuetudo minime exoleuerit. Quippe id tantum in communi omnium usu apud nos habetur, quod è maturis oliuis exprimitur: tametsi quidam, quod & gustatu iucundius, & sanitati conducibilius sibi oleum comparare uelint, id ab immaturis oliuis exprimant, quas eo tempore legunt, cum ipse iam plenè flauæ tantillum subrubescere cœperint. Ceterum non mirum est, si ueteres & illud candidum reddere, & multis parare modis curabant: siquidem non modò in ciborum condimentis oleo frequenter utebantur; sed etiam ut agiliores, promptiores, ac expeditiores euaderent ad obeunda corporis munera, frequentius sibi totum corpus oleo perungebat. Qua de causa & balneis frequentabant, & thermas. namq; olei contracta sordes, ut corpora sæpius perluerentur, maxime expetebat. Obiabant autem id muneris serui in balneis, qui non modò corpus totum intransibis abluebant; sed & ipsum quibusdā strigilibus abradebant ad hoc opus aptissimis, quas alij ex auro, nonnulli ex argento; quidam ex ferro, aliqui ex ebena, ac etiam ex præclaris lapidibus sibi comparabant, deniq; pro nobilitate, & facultate eorum, qui ad balneas confluebant. Quapropter dum se in ipsis balneis abradere, sudoremq; emanantem detergere curabant, olei strigmenta, quos se prius perunxerant, in balnei aquam decidebant: quorū hic meminit Dioscorides. Fuit præterea in magno, ac præcipuo usu apud ueteres oleum ad perungendos athletas, qui in theatris palæstræ nudi luctabantur, non solum ut corpora agilia, expeditioraq; in certamine redderentur, sed ut etiam ij difficiliter sese manibus comprehenderent. Cuiusmodi autem ibi pulvis ob pedum frequentiore motum concitaretur, athletæ ipsi oleo affatim peruncti, illū in se facillè contraherent; ac multo magis cum in terram alter alterum consternebat. Quare balucum ingressi, strigilibusq; abradi cœnosa strigmenta relinquebāt, quibus artium affectibus Dioscorides mederi tradidit. Sed etiam plurimi athlete oleo copiose peruncti inter luctandum palæstræ parietibus, ac statuis lapideis sese sæpius affricarent, contracta loca olei pinguedinem contraherent. quo facile fiebat, ut adueniente puluere cœnosum quoddam unguē parietibus inhæresceret: de quo etiam Dioscorides differuit. Olei facultates fusius prosecutus est Galenus lib. vi. de simplicium medic. facult. sic inquit. Oleum, quod ex oliuis conficitur, quod sanè propriissimo nomine oleum appellamus: cuiusmodi sit temperatura, superioribus libris definitum est. quippe humectatorium esse, & moderatè calidum ostendimus. Eiusmodi est, quod est dulcissimum, sitq; potissimum ex oliuis, quas Græci ὀλιβίς uocant, nos drupas. Ceterum quod omotribes, & omphacinum nuncupant, id quantum in se habet adstrictionis, tantum etiam illi inest frigiditatis. Porro oleum uetus, quod quidem ex dulci inueterato efficitur, & calidius est, & magis discussorium. Quod uerò ex immaturo, id dum reliquum quippiam seruauerit adstrictionis, mista permanet facultatis: ubi uerò illam abiecerit, reliquo sit simile. Quinetiā quicumq; in præparando genuina iniiciunt, ij & ipsi omphacinum simile oleū efficiunt. Ceterum rogandum non est, quo pacto sit præparatum, sed gustandum est potius: ac si præferat adstrictionis quippiam, eatenus etiā frigidum esse existimandum, ceterum illud, quod ab Iberia portatur, quod Spaniū, id est Hispanicum nominant. Quod si nequaquā gustantibus adstringere appareat, sed ad amussim uideatur dulce, id modicè esse calidum putandum. Porro si tenue quocq; cernatur (tale est, quod purū est, quodq; intuenti translucidum uidetur) ac modicum eius latissimè per cutem extensum sibi maneat continuū, celeriterq; à cute combibatur, id utiq; pro optimo ducendum, ac olei uirtute quàm maxime pollere, quale est Sabinum. Porro quod oleū lotum maxime expers sit mordacitatis, si præpositum est. Ceterum quo potissimum modo id probissimè laues, in sequenti tradam opere, quod inscribetur de medicaminum cōpositione, ubi & de Sicyonio, & si quod eius generis præterea oleum est, agetur. nunc simplicia prosequor, adjiciamq; & de alijs olei speciebus sermonem. Iam quod ex agrestis oliua oleum exprimitur, non simplicem temperaturam obtinet; sed extergit, simulq; adstringit. Squalidissimum id est ex omni olei genere, & post Istrium quocq; deinceps illis est Hispanum. Pinguisimum est Libycum, et Cilicium: simul autem pingue, & tenue Sabinum. In medio comprehensorum omnium sunt tum id, quod per Cyclades insulas nascitur, tum quod per Græciam, Asianq; Porro oleum pingue æstimatur, iudicaturq; uiscositate: tenue uerò si perluceat, si purum sit, si plurimum à minima eius portione inungatur, si facillè à cute combibatur. Ex dictis cognoscere iam liceat & de alijs olei generibus, quæ æquiuocè ipsis dicuntur unguentis, puta rosaceo, melino liliaceo, & quæcunq; id genus floribus, fructibus, germinibus, folijs in oleo maceratis conficiuntur. Horum quocq; ubi unā cum aromatibus præparantur, unguentum efficitur. Pro cuiusq; iniectionum natura oleum uariari contingit. Ex ijs ergo, quæ in toto hoc opere de quoque iniiciendorum generatim disces, sigillatim quocq; confectum ex iisdem oleum cognoscere dabitur. Quod Græci ἔλαιον, Latini Oleum dicunt. id Arabibus Cait, seu Zait nominatur: Italis, Olio: Germanis, Oel: Hispanis, Azeyte: Gallis, Huyle.

## Elæomeli.

## Cap. XXXII.

**IN PALMYRIS** Syriæ, quod elæomeli uocant, ex quodam caudice manat, oleum melle crassius, sapore dulci. Bilem, cruditatesque detrahit, sextario cum una aquæ hemina dato. Sed qui sumpsere,



psere, torpescunt, & uiribus deficiunt. quod minimè uerei oportet: verùm crebro excitare, ne ueterno pressis somnos capient. Fit & oleum è pinguitudine furculorum. Optimum uetus, crassum, pingue, non turbidum. Calfacit: priuatim caligimbus oculorum illinitur: lepras, neruorumque dolores illitum emendat.

QUANQVAM quotidie plura, uariaq; mercimoniorum genera nobis ex Syria conuehantur; Elæomeli tamē (quod sciam) non modò non conuehitur, sed ne ullum quidē unquam audiui, qui ipsum uiderit, uel nouerit. Ceterum Hermolai lapsus. Her-  
molaus uir quidem præstantissimus dubitat, utrum elæomeli sit manna, elæomelitis, & aeromelitis, quod mel aeris significat, uicinitate deceptus. Quapropter non possum non admirari, doctissimum uirum hac in re dubitasse, cum tum Dioscorides, tum etiam Plinius, quibus cum longam contraxerat consuetudinem, conuenerint sententia scribant, elæomeli oleum esse è quodam arboris candice manans in Syria Palmyris, non mel aereum, neque rorem, qui ab æthere cadat. Eoq; magis, cum addiderit Dioscorides, non modò elæomeli per se ex arbore manare, sed & factitium haberi iussit, expressisq; arboris furculis.

## Cicinum Oleum.

## Cap. XXXIII.

CICINVM oleum hoc modo temperatur. Maturi ricini, qua uoles quantitate, torrido sole flaccescunt, & aliorum more cratibus instrati tantisper insolantur, dum uestiens cortex fractus decidat. Caro colligitur, & coniecta in pilam diligenter tunditur: postea in lebetem stanno illitum, qui aquam habeat, demittitur, subiectoq; igni feruescunt: & ubi insitum prorsus humorem reddiderunt, sublato ab igni vase, innatans oleum concha tollitur, & reconditur. Sed in Aegypto, ubi largior increbuit usus, longè secus fieri solet. Nam repurgatos ricinos molæ mandant, & accuratè mollitos per sportulâ torculo expriment. Tum quidem ematuruerunt ricini, cum continentibus orbiculis exuuntur. Cicinum oleum ad psoras, & ulcera capitis manantia ualet: prodest sedis inflammationibus, uuluis conuersis, atque præclufis: item indecoris cicatricibus, & aurium doloribus: emplastra efficaciora reddit additum: potu aquam aluo extrahit: ventris animalia pellit.

RICININVM, siue Cicinum oleum, Cheruæ oleum officinis dicitur; quanuis rarioris sit usus. Nanque semen Ricini olei  
plantæ, quam Dioscorides ricinum appellat, Arabum esse cheruam nemo est, qui ignoret: quod etiam Serapio pen-  
tadastylum uocat, ut diffusius suo loco libro quarto explicabitur. Ceterum ricinus animalculum est fœdum, liuidû,  
& sanguine plenum, quod Italis zecca uocatur, suisq; canibus, capellis, & id genus animalibus infestissimum. Cui Ricinus unde  
cum hoc semen formæ, & colore sit quàm simillimum; idcirco Ricini nomen sibi comparauit. Meminit huius olei  
etiam Mesues, qui præter uires ei à Dioscoride redditas, addidit, id ualidè crassas coercere inflationes. Proinde uen-  
triculo, laterum, coliq; doloribus prodesse illitum, & infusum.

## Amygdalinum Oleum.

## Cap. XXXIIII.

AMYGDALINVM oleum, quod aliqui metopium uocant, hoc fit modo. Semodius ex amaris nucibus repurgatis, siccatisque, in pila ligneo pistillo leniter tunditur in offas, aquæ, quæ ferbuerit, sextarius adjicitur, & ubi dimidia hora humorem hauserit, uehementius quàm antea tunditur: mox tabellis premitur, & quod digitis hæsit, concha excipitur. Pressis nucibus rursum hemina aquæ inspergitur, & postquàm ebiberint, idem opus prosequendum. singulas heminas reddunt singuli modij. Contra uuluarum dolores, strangulatus, conuersiones, & eorundem locorum inflammationes efficacis est: vitijs renum, calculosis, difficili urinæ, suspiriosis, lienosisque proficit: dolores capitis, grauitatem auditus, sonos incertos, tinnitusque discutit. maculas, & uitia cutis tollit è facie: & eam erugat cum melle, radice lilij, & Cypria cera, aut rosaceo cerato: & oculorum hebetudines emendat. ulcera capitis manantia, & furfures cum uino abstergit.

CVM amarum omnino dulci sit temperandum, delinquere sanè existimarem, si oleum ex dulcibus amygdalis expressum (et si illud Dioscorides silentio inuoluerit) ex amaris confecto non adijcerem, rectumq; conficiendi modum non explicarem: præsertim cum nostræ ætatis medicis maximo sit usui, & pauci sint myropolarum, qui ipsum rectè probeq; conficiant. Parandi igitur rationem (ut Mesues tradidit) sic habeto. Præstantiores, dulcioresq; amygdalæ, quæ lubet quantitate, ab utrisq; corticibus repurgatæ, optimè in lapideo mortario tunduntur, et in loco calido reponuntur, quinq; horarum spatio. dein parum interum contunduntur: mox prælo tandiu premuntur, quousque omne, quod continent, effluat oleum. Elicitur etiam hoc modo. Collocantur delibratæ, contusæq; amygdalæ in uitreo, uel stanno uase, infunditurq; uas in balneo calentis aquæ. eximitur deinde tribus peractis horis, extrahunturq; amygdalæ, & statim prælo calentes subiiciuntur: itaq; oleum copiosius excipitur. Tritæ rursum amygdalæ, & repurgatæ in sacculis panno duplicato inuolutis sub arenâ, cinerè calido reconduntur, & postquàm efferbuerint, prælo oleum elicitur. Sed nostrates seplasiarum plurimum negligentia, segnitieq; indulgentes non modò amygdalas non repurgant, neq; delibrant; sed & amaras, & rancidas commiscet, & omnes simul conterentes, in æreum cacabum iniiciunt, igniq; admouent affuso aquæ tantillo, ne penitus torreantur: deinde in sacculum coniiciunt, et prælo submitunt, et quod inde fluit oleum excipiunt, quod plerumq; exustionis nidorem tantum obolet, ut haurientibus illico euomendi pariat nau-  
seam. Qui autem sic parant oleum amygdalinum, eius lenientem facultatem peruertunt, ac destruunt: siquidē con-  
tusus

Amygdalini  
parandi ratio.

Myropolarum  
ignauia, & la-  
pius.



Amygdalini  
uires.

tussis amygdalis non delibratis, oleum inde confectum corticum uires asseruat. Proinde & conspiciat, & exasperat, & scabritie inducit. id quod etiam adauget ignis uolentia, dum in lebetibus amygdala torrentur. Hoc itaq; diligenter animaduertens optimus Mesues Amygdalini faciendi rationem prodidit, ut uidelicet, cum purgata, contusaq; essent amygdala, calore quodam suauis, ac lento leniter calefierent, sicut diximus, non autem carbonibus ardentibus. quema admodum hodie ij faciunt myropole, qui etiam alia pleraq; consundunt. Amygdalinum igitur, si recte, probeq; conficiatur, mirifice lenit. quare potum ad libræ dimidium aluum leniter deiecit: aspera arteria, pulmonis, ac pectoris scabritias tollit: duritias omnes emollit: & compaginum, & membrorum omnium siccitates, humectat. quocirca he Eticis plurimum conducit. Contra uuluarum dolores illitum & potum facile prestat: sicuti uesticae crutiatibus est efficax, si argentea fistula coniectum impulsorio instrumeto iniiciatur. Quod autem ex amaris amygdalis exprimitur, dulci in omnibus efficacius habetur. Idcirco in prouocandis lapillis, conciliandisq; uiscerum crutiatibus à flatu crasso flore genitis, dulci longè præstantius reperitur. Nimirum & obstructions aperit, & interaneorum tineas enecat.

### Balaninum Oleum.

### Cap. XXXV.

SIMILI modo fit Balaninum oleum. Quod repurgat maculas, lentigines, varos, & cicatrices nigras: aluum soluit, stomaco aduersatur: contra aurium dolorem, sonos, & tinnitus auxilio est, cum anserino adipe instillatum. Similis sesaminum ex sesamo conficiendi ratio. Fit etiam è nuce iuglande oleum, quod caryinum uocant. Eandem uim habet, quam balaninum.

Balanini con  
sideratio.

Balanini fa-  
cultates.

Sesaminū, &  
eius uires.

Oleum è nu-  
cibus iuglan-  
dibus.

OLEUM unguentariae glandis, quod Balaninum uocant, à pharmacopolis, & unguentarijs oleum de Ben appellatur: quoniam myrobalaum, quod Latini unguentariam nucem dicunt, ex qua hoc conficitur oleum, Mauritanii Ben appellant, ut latius libro quarto differemus. Consimili modo id Mesues fieri tradit. Et (ut idem etiam est auctor) abstergit, mundat, & obstructions aperit. Illitum strumas dissoluit, durosq; tumores. Frigidis tum iocineris, tum lienis affectibus opem mirifice prestat: facit & ad frigidas neruorum conuulsiones, & compaginum cruciatus. Sed illud sibi peculiariter adsciuit, quod etiam si diu uetescat haud quaquam rancidum euadit. Ideoq; unguentarijs expetit ad suauissima odoraamenta excipienda; praesertim cum moscho, & ambaro chirothecas illinunt. quo fit, ut nullo temporis tractu rancorem unquam respiciant, ut facile eueniret, si alio quouis oleo eo in opere uterentur. Quam obrem mirari non licet, si ueteres fructum, à quo elicitor hoc oleum, glandem unguentariam nominauerint. Sesaminum uero (ut Mesues inquit) amygdalini modo exprimitur. Quippe sesami repurgatum semen primò cōtunditur, deinde eodem artificio calefactum prelo supponitur, tandiuq; premitur: quousq; oleum reddat. Id (ut idem testatur) pingue ministrat alimentum: semen adauget, asperitates quasq; lenit, sed praecipue gula: uocem expedit, & duriora apostemata mollit. Adijcitur Sesaminum plerisq; unguentorum compositionibus, quorum in officinis est usus. Verum quod è iuglandibus nucibus elicitor, nullius in medicina usus esse reperio, etsi lucernis, & lampadibus, qui parastomonia student, id maximopere expetant. quippe ignis funiculo non tam citò consumitur, quam id, quod ex oliuis paratur. Praefertur etiam pictoribus eo, quod è lini semine exprimitur. siquidem hoc cerusse admistum tractu temporis uis colorem immutat, illud uero incorruptum perpetuò asseruat.

### Hyoscyaminum Oleum.

### Cap. XXXVI.

HYOSCYAMINUM sic fit. Semen candidum, recens, ac siccum tunditur, & calida aspergitur aqua, ut in amygdalino diximus: dumque insolatur, siccatae, quae sub manu sunt, partes cum reliqua massa permisceantur: hoc autem fieri oportet, dum nigrescat, & grauiter oleat: mox pressura, atque excolatum reconditur. Ad aurium dolores efficax est: pessis miscetur, ad emolliendum utile. Fit & è grano gnidio purgato, & tuso. Vis ei aluum soluere potu. Non secus enicinum oleum temperatur. cui facultas eadem est, quae factò è gnidio grano, verum inualidior. Raphaninum è raphani semine fieri solet, cæterorum more. Phthiriasis mala ualitudine contracta tollit: scabritias cutis in facie emendat. Ad obsonia utuntur Aegyptij. Melanthinum idem, quod raphaninum potest, eodemque modo paratur. Tritum sinapis semen, & calida aqua madefactum, adiectione postea oleo exprimitur. Id ad diurnos dolores efficax est: transfert humores, qui in aliqua parte concreuerunt.

Hyoscyami-  
ni uires.

Hyoscyam.  
paradi ratio.

Gnidinum.

TAMETSÌ perpauci reperiantur medici, qui Hyoscyaminum oleum nonerint, ne dum in usum receperint unquam; ego tamen id ipsum pluries confeci. Siquidem ad tollendos omne genus dolores, ubi cætera praesidia non inuenerint, efficacissimum est medicamentum, praesertimq; inflammationibus pudendorum utriusque sexus. Item acutissimis aurium doloribus medetur cum castoreo, uel croco instillatum. Prohibet praeterea gonorrhoeam, renibus & testibus illitum. Menstrui exuberantiam cohibet, & albicantia uteri profluvia, tum pubi & lumbis perunctum, tum pessis infusum. Mammis à partu inflammatis utiliter illinitur. Dentium dolores mirifice mulcet, si tepidum in ore continetur. Pilorum exortum admodum retardat, alijs quibusdam additis, ita ut euulsi pili integro anno non renascantur, si eodem depilata loca saepius perungantur. At ipse in eo faciundo Dioscoridem minimè secutus sum, sed aliam paradi rationem adinueni, quae hæc est. Sumito nouum, siccumq; hyoscyami semen, tundito deinde,positoq; in stanneo, uel uitreo uase, ardenti aqua, quae è uino fit, parumper prius affusum. His factis ponito uas in calentis aquae balneo die, ac nocte, demum adhuc feruens sacculis imposito, & prelo subijcito, sicq; oleum habeto. Quod autem è grano Gnidio, quod rustici Auanienses montanum piper appellant, paratur, recessit hoc a medicorum usu, eo quod in deiciendo a aluo



da aluo uiolentiſſimum ſit medicamentum, ruſticis tamen aptiſſimum, cum ſæpius, ne medicos conſulant, coccum Gu= dium deuorent : quo etiam ſæpius morte occumbunt . Porro Cnicinum (ut Meſues inquit) potum aqua intercite la= borantibus, uifcerum obſtructionibus, uentriculi, & coli cruciatibus à flatuoſitate genitus, efficaſ eſt. Suſpirioſis mi= riſicè prodeſt, & uocem clarificat . Epotum pituitam tum uomitionibus elicit, tum per inferus ducit. Rbaphanum præterea, & Melanthinum aboleuerunt, ſicuti etiam Sinapinum : eſi ubi ad ſummum excalfacere opus fuerit, maxi= mam opem præſtare ualeant . Sinapinum uerò non niſi collacrymantibus oculis exprimi poteſt : tanta enim eſt uapo= ris acrimonia, ut concepto uapore, illico prodeant lacrymæ . Miſcetur quandoq; cum eo, quod eſt piſtaceis nucibus eli= citur : perungunturq; eo genitalia in frigidis, ut felicius cocant, addito laſere, & moſcho .

Cnicinum .

Rbaphaninũ  
Melanthinũ.

Sinapinum.

## Myrteum Oleum .

## Cap. XXXVII.

MYRTEI faciundi ratio hæc eſt . E' myrto nigra ſylueſtri, aut ſatiua, foliorum molliſſima quæque tuſa premuntur : ſucco pares omphacini olei portiones adiſciuntur, ſubiectisq; carboni= bus inferueſcunt, donec concoquantur : innatans oieum deraditur . Sed longè facilior hæc compoſi= tio . Tenera folia contuſa coquuntur in oleo & aqua, & quod innatat, eximitur . Priuatim ali j deie= cta in oleum folia in ſole macerant : ali j prius oleum inſpiſſant malicorio, cupreſſo, cypero, & iun= co odorato . Efficacius eſt amarum guſtu, & oleoſum, uiride, translucens, & olens myrtum . Aſtrin= git, & indurat : ideo medicamentis miſcetur, quæ cicatricem obducunt : prodeſt ulceribus in capite manantibus, ambuſtis igni, & papularum eruptionibus . Facit ad attrita, & furfures, ſedis rimas, con= dylomata, articulos lavatos : corporis ſudores compeſcit : & ad omnia ualet, quæ aſtrictionem, in= ſpiſſationemq; deſiderant .

MYRTEVM myropole ſerè omnes non quidem ex tenellis myrti frondibus, Dioſcoridis more, conſciunt, ſed e' fructibus tantum, nulla ſeruata parandi ratione . Quandoquidem myrti baccas contundentes, oleo, nigroq; uino im= miſcent, & in æneum cacabum transferunt, ſubduntq; (ut citius opus expediant) ignitos carbones, ibiq; tandu inferue= ſcere ſinunt, donec uinum totum abſumatur : mox ab igne tollunt, percolant, & aſſeruant . Neq; animaduertunt con= ſciendi regulam à Meſue explicatam . ſiquidem is in calentis aquæ balneo, non quidem uiolento carbonum igne Myr= teum parari iubet : ex oleoq; omphacino fieri, non (ut ipſi parant) ex maturis oliuis expreſſo . Nanq; ut balnei humen= ti, ac leni calore olei compoſitio niriſicè digeritur ac eius omnes conſeruantur partes : ſic contrà uiolento igne ſub= dito peruertitur, & deſtruitur tota rei compoſitio . Sed quoniam reipublicæ beneficio (ut etiam ab ipſo exordio poli= licitus ſum) decreui non prætermittre quicquam, quò errores, qui indies contingunt, c' medio tollantur, dico, oleum omne, quod officinæ ad medicamenta uſurpant (illud excipio, quod ab arborum reſinis, ſtirpiumq; aliarum gummi, ui= treis organis per ſublimationem, ut chymiſtæ uocant, elicitur) uafe uitreo, uel ſalteni ſtanneo in balneo calentis aquæ fieri debere : & inibi priuim impositis imponendis tribus diebus macerari : poſt tertium uerò diem expreſſis cunctis prius impositis, & recentibus infuſis pari temporis ſpatio, eodem in balneo, eadem macerari . Itaq; tandu opus proſe= quendum, donec ſibi oleum ampliſſimas exceptorum medicaminum comparauerit uires . Verum ingens hominum lucri= auditas, auriq; ingluuies, ut admodum ſuperlucrentur, arcanq; auro ad ſummum uſq; impleant, non patitur myro= polas neceſſarium tempus impendere ad medicamenta exactè p'randi : eos, inquam, qui continuè magis crumenis in= tendunt, & inbiant, quàm ut uitæ agrotantium ſatagant . Probi tamen, & diligentes hæc mea uerba boni conſulant , his uerò mali errores emendèt ſuos . Idcirco Myrteum oleum, quod myrti præſtantiam ad plenum referat, hoc ino= do temperatur . Sumito fructuum myrti libram, foliorum eius recentium uncias decem, uini nigri adſtringentis libras duas, olei omphacini libras quinque : deinde contuſis baccis, ac ſolijs omnia oleo excipito, & uafe uitreo, uel ſtanneo reponito, teſtoq; uafis ore in balneo calentis aquæ immergito, & poſt tres dies extrahito, ac percolato . Rurſus aſ= ſumptis recentibus baccis, ſolijs, & uino, ut antea oleo exceptis, in eodem balneo omnia recondito ad tertium uſq; diè . At poſtremo uafis ore detecto, tandu id apertum ſinito, donec balnei ſeruore uinum totum exiliat, & oleum tantum remaneat . Nec audiendi ſunt ij, qui Dioſcoridis teſtimonio, æneo cacabo ( ut ſuprà dictum eſt ) ſubſtratis carbonibus Myrtinum conſciunt . Quippe Dioſcoridis tempore ars medica non adeo exculta erat, quin nec ſeplaſtaria, ut noſtra hæc ætate eſſe uiſitur . Quamobrem putandum, quòd ſi huius balnei artificio Dioſcoridi innotuiſſet, ipſum hau dqua= quam ſilentio præteriſſet, ueluti nec illud Meſues, nec ali j complures præterierunt, qui ſummo ſtudio, & diligentia medicani facultatem excoluerunt, & in ordinem redegerunt .

In myrteo  
officinarũ la=  
pſus .Olei omnis  
generis parã  
di ratio .Myrtei parã  
di ratio .

## Laurinum Oleum .

## Cap. XXXVIII.

LAURINVM ſi hoc modo . Lauri bæcæ cum maturæ ſunt, in aqua coquuntur : ſiquidem ex obducto cortice quandam pinguitudinem reddunt, quæ manibus ſubacta, concha excipitur . Alij omphacinum prius oleum cypero, iunco odorato, & calamo inſpiſſant, deinde tenera lauri folia con= coquunt . ali j etiam bæccas, donec oleum odorem contraxerit . ali j ſtyracem, & myrtum addunt . Optima laurus ad id latifolia, & montana . Oleum laurinum utiliſ, quò recentius, quoq; uiridius colore, amatiſſimum, & acre . Viſ ci excalfactoria, emolliens : venarum ſpiracula aperit, laſitudi= nes diſcutit : omnibus neruorum uitijſ, algoribus, deſtillationibus, aurium doloribus, malis renum frigore contractis, illitum non aliud iuuantiſ : attamen potum nauſeam parit .

LAURINI



Laurini con-  
sideratio.

Laurini vires  
ex Mesue.

**L A V R I N I** conficiendi rationem aliter à Mesue institutam legimus, sed tamen ab hac parum recedentem. Ideoq; quòd id parum, uel nihil referat, rem ipsam silentio prætereundam duximus: præsertimq; quòd non me latet, Laurinum, cuius est usus in officinis, à seplastiarijs nequaquam fieri, sed ab alijs confectum emi, qui lecta magna lauri baccarum quantitate ipsum eliciendi artem exercent. Mesues præter facultates à Dioscoride traditas, id summè laudauit & ad iocineris dolores, & ad hemicraniam, quæ frigidis contrahitur succis. Quin & ad uentriculi dolores, colicæ, uulvæ, & lienis efficax esse tradidit.

### Lentiscinum Oleum.

### Cap. XXXIX.

**S I M I L I S** Lentiscini ratio. Nam è maturo fructu temperatur, factis prius spissamentis, ut in Laurino diximus. Hoc scabiem, iumentorum, canumq; sanat: utilissimum pelsis, acopis, & leprarum medicamentis: sudores cohibet. Nee secus Terebinthinum fieri solet: quod † refrigerat, & astringit.

Lentiscini pa-  
rati ratio, &  
uires.

Terebinthini  
confideratio,  
& uires.

**L E N T I S C I N V M** pluribus in locis Hetruriæ conficitur, sed præsertim in agro nostro Senensi, Ilua, & Gilio Tyrrheni insulis, non longè à continenti nostra distantibus. Fit autem ab incolis hoc modo. Racemosas lentisci baccas assumunt, & à putaminibus cunctis expurgant, permittuntq; aliquot diebus simul flaccescere: deinde magnum in ahenum collocant, affusa aqua: & igni tandiu feruent, donec bacca debiscant: demum eas extrahunt, & saccis includunt, præloq; subiiciunt, expressumq; asseruant oleum. Quod & quibusdam Adriatici insulis hac similiter ratione confici audio absque alterius cuiusuis olei admixtulo: siquidem fructus is per se olei satis emittit. Incole (ut experimento comprobatum affirmant) ad acuem oculorum aqiem, caliginesq; delendas, illud cibus commiscunt. At ego eosæpius usus sum magno sanè iuuamento in dysentericis, non quidem potu exhibito, sed chysteribus infuso. Lentiscinū summis laudibus extulit Galenus lib. v. de compos. medic. secundum locos, ad gingiuarū, & linguæ inflammationes, si eo colluatur. Quod autem sit è fructibus terebinthi, quos Mauritanii grana uirida nunc cupant, non fit in Italia, neq; ad nos (quod equidem sciam) aliunde conuehitur: proinde non uenit in usum. Hoc tamē (ut Mesues inquit) uulnera consolidat. Medetur item conuulsis, opisthotonicis, neruorumq; duritijs, & creberrimè cataplasmatibus admiscetur.

† In his uerbis mendū subesse putamus, ut etiam doctissime adnotauit Manardus Ferrariensis lib. viii. epist. prima. Aliàs siquidem sibi ipsi repugnasset Dioscorides, cum scripserit in Terebinthi mentione eius fructus excalescere; hic uerò dicatur, oleo ex eisdem parato inesse refrigerandi facultatem. Huic deprauatæ lectioni illud quoq; res fragatur, quòd sint nobis Græci Dioscoridis codices, in quibus uerba illa de Terebinthini olei facultatibus non leguntur, sed de eius tantum conficiendi ratione mentio habetur.

### Mastichinum Oleum.

### Cap. XL.

**M A S T I C H I N V M** è trita fit mastiche. Quod contra omnia uulvæ mala efficax est: medicriter calfacit, astringit, & emollit. Aduersus prominentes stomachi duritias, celiacorum, dysentericorumq; cruciatus utile: faciem emaculat, & colorem nitidum facit. optimum in Chio insula componitur.

Seplastiariorū  
lapsus.

**M A S T I C H I N I** parandi rationem, sanè quàm paucis Dioscorides perstrinxit. quippe è trita tantum Mastiche fieri tradidit, nulla alia explicata conficiendi ratione. Seplastiarij autem nonnulli prorsus obliti, scripserunt Mesuem in balneo calentis aquæ Mastichinum confici debere, communi oleo, albo uino permisto: mastichen admiscēt, & æreo uase carbonum igni admovent, ibiq; tanto tempore efferuescere sinunt, quoad uinum prorsus exiliat, ac inde usui asseruant. At ipse uitreis organis è purissimo tantum mastiche illud sæpius confici.

### Vnguentorum compositio.

### Cap. XLI.

**D E R A T I O N E** vnguentorum consequenter tractandum existimauius: quandoquidem ea in nullis corporum uitijs, aut medicamentis mista, aut corporis perfusa, aut naribus obiecta, plurimum profunt. in quorum probationibus consulere nares oppotet, an ea oleant, ex quibus temperantur. Optimum huiusmodi indicium. quod tamen in quibusdam planè obseruari non potest, propter ea, quæ admiscuntur, odore cæteris præualentia: ut in amaracino, & erocino, telino, & plerisq; alijs, quæ crebra circa hæc meditatione experiri conueniet.

### Rosaceum.

### Cap. XLII.

**R O S A C E V M** sic fit. Iunci odorati quinque libras & bessiem tundito, & subactas aqua in viginti olei libris, & quincuncem subinde mouendo, coquito: dumque pereolaueris, in olei libras uiginti, & quincuncem, adijcito rosas non madefactas numero mille, & manibus melle perunctis identidem moueto, interdiu premens, finito nocte tota macerari, postea exprimito: & ubi recrementum pressum ierit, mutato uase, in craterem melle illitum recondito, Cæterum rosas, quæ antea pressæ fuerunt, in labellum demittito, & affusis octo libris & quadrante spissati olei, iterum premito, critque secundarium oleum. Quòd si tertias usque, quartasue perfusiones infundens exprimere uoles, secundarium



## ROSACEVM



cundarium fiet, tertiarium, & quartarium vnguentum. Sed quoties id feceris, vasa melle oblini debent. Si uero secundam infusionem instituere libet, in expressum oleum, numero pari recentes rosas, nullo humore imbutas inijcito: manibus melle præmadefactis agitans premito: & iterum tertio, aut quarto simili modo exprimēs facito: totiesque recentes rosas detractis unguibus immitto: fiet enim ita oleum multo validius. nam septies oleum rosarum infusionem admittit, nec amplius. Prælum melle perungatur, oleum à succo diligenter secerni oportet: nam si minimum quid relinquatur, vnguentum corrumpet. Alij autem detractis unguibus, rosas tantum olco macerant in sole hoc modo. Rosæ, quæ selibrâ pondere æquant, in sextario olei diebus octo madescent, & usque tertiam perfusionem quadraginta diebus insolantur, & sic oleum reconditur. Alij calamo, aut aspalatho prius olei spissamenta faciunt. Alij coloris causa anchusam admiscent, & salem, quod minus oleat. Vim astringendi, & refrigerandi obtinet: fomentis, & cataplasmatibus utile. Potum soluit aluum: stomachi ardorem restinguit: vlcera caua replet, & mulcet, quæ cacoethe uocantur: vlcibus in capite manantibus, atq; feruidis eruptionibus illinitur: caput dolens eo perfunditur: dentes inter initia doloris collui prodest: ad genarum duritias illitum efficax est. ad lacerata interanea, & concitatas vulvas vtilissimè subijcitur,

Hoc sub olei nomine comprehendit Dioscorides oleum omne, quod per se tantum, nulla alterius olei admistione, aut ex arborum fructibus, aut herbarum diuersorum generum seminibus, aut stirpium resinis elicitur. Sed unguenti appellatione intelligit

Vnguëtorum confidet.

oleum omne genus, cui & odoramenta, & alia simplicia medicamenta admiscuntur, ut in præsentia de Rosaceo agēs, & deinde in sequentibus manifestè ostendit. Quo fit, ut apud Dioscoridem oleum uocetur, quod simpliciter expressum sit: unguentum uero oleum quodlibet, cuius componendi ratio pluribus constet medicamentis. Quapropter Galenus lib. vi. simpl. medicamentorum de oleo agens, sic inquit. Ex dictis cognoscere iam liceat, & de alijs olei generibus, quæ æquiuocè ipsis dicuntur unguentis, puta rosaceo, melino, liliaceo, & quæcunque id genus floribus, fructibus, germinibus, folijs in oleo maceratis conficiuntur. Horum quodque ubi unâ cum aromatibus præparantur, unguentum efficitur. Ceterum oleum rosaceum, quod hoc tempore officinæ cõpletum appellant, à Dioscoridis rosaceo longè disidet, quod etiam eo præstantius existimandum est, summum ob artificium, quod in ipsa parandi ratione diligentes adhibent myropolæ. Quod eorum tamen perpauci (ita ut ingenium est multorum à labore procliuè ad ignauiam) illud secundum Mesuem temperant; tamen si plures ab eo optimi rosacei conficiendi modum sint consecuti. Fit etiam unum rosaceum rosis non affatim dehiscentibus in omphacinum demissis, modo calentis balnei uiribus (ut in quibusdam alijs superius adnotauimus) modo insolatu perquam longo. Sunt & qui, ut magis uiribus præstet, oleum prius ex aqua rosacea lauent, deinde plusculo temporis spatio ter, aut quater rosas insundant, quæ haud penitus fatiscant: demum expressione peracta, immaturarum rosarum succum adijciunt, ac inde diu insolant. Postremo oleum à succo secernunt, & diligenter asseruant. Hoc inflammationes discutit, roborat, adstringit, fluxionesq; cohibet, ne ad ægras defluant partes. Potum torminibus dysentericis medetur. Capitis uulneribus aptissimum est, quod roboret, si caret, resoluat, inflammationesq; non modo prohibeat, sed etiam extinguat. Quocirca hac in re maxime probatur Galeno lib. ii. de comp. medic. secundū locos, ubi de dolore capitis scribit, qui uel ex uulnere, uel casu excitatur. Cuius etiam meminit lib. x. simp. medic. de sanguine agens.

Rosacci consideratio.

Rosaceū omphacinum.

Rosacei omphacini uires

## Elatinum.

FRACTA elate, tusa, & scarificata, in labellum deijcitur: omphacinum oleum triduo infunditur, mox per sportulam exprimitur: uerum pares esse debent utriusque portiones. dein mundo uase ad usum reconditur. Viribus rosaceo proportionē respondet: aluum tamen non mollit.

## Cap. XLIII.

ELATINVM, quod ex Dactylorum inuolucris antiquitus parabatur, hac nostra tempestate absoluit.

## Melinum.

MELINVM hoc modo temperatur. Olei congius decem aquæ sextarijs admiscetur. Adijcitur elatæ palmarum fractæ quadrans, & iunci odorati uncia: quæ die uno macerata coquantur, mox

## Cap. XLIIII.



mox in uas oris patuli oleum excolatur, & indita arundinacea crate, aut rara tegete, cotonea mala superponuntur, & uestimentis operta tantisper inibi resident, dum malorum uires ad se oleum alliciat. Aliqui cotonea decem dierum spatio operimentis inuoluunt, ut contineatur odoris suauitas, nec euanescat: postea biduo macerata oleo exprimuntur, oleumque reconditur. Id vim refrigeratoriam, & astringentem habet. Contra scabiola ulcera, & quæ serpunt, ac furfures, perniciososque effectum præbet: exulceratis uuluis infunditur: citatam urinam sistit infusum: sudores cohibet: contra cantharidas, buprestim, pinorum erucas, bibitur. Laudatur maximè quod cotonea mala olet.

Melini confid-  
deratio.

MELINVM oleum ad hodiernum officinarum usum hoc modo conficitur. Cotonea nondum planè matura in taleolis dissecta omphacino oleo macerantur, & uino ex eis expresso superaddito insolantur. Deinde in calentis aquæ balneo iterum, atque iterum perfunduntur, & extrahuntur, ut in alijs superius ostendimus.

### Oenanthinum.

### Cap. XLV.

OENANTHE è labrusca, optimè olens postquam emarcuit, deiecta in omphacinum oleum mouetur, uoluiturque: & cum biduo manserit, exprimitur, & reconditur. Astringit, proximum rosaceo effectum præbens: sed aluum non resoluit aut mollit. Probatissimum est, quod odore cœnathen refert.

OENANTHINVM nullam à nobis requirit explanationem: quoniam à Dioscoride tam apertè proditur eius parandi ratio, ut non sit opus, illud pluribus explicare.

### Telinum.

### Cap. XLVI.

FOENI græci libræ quinque, calami libra una, cyperi libræ duæ, olei libris nouem septenis diebus macerantur, quotidie ter mouentur, postea premuntur, & reponuntur. Aliqui pro calamo cardamomum substituunt, & cyperi loco xylobalsamum macerant. Alij oleo antea his odoribus spissato scœnum græcum macerantes exprimunt. Hoc telinum abscessus emollit, & concoquit: omnibus uuluarum duritijs magnopere conuenit, scœminis difficilè parientibus subiicitur, ubi præ excretis humoribus loci siccitatem contraxerunt: sed is inflammationes lenit, tenesmo subditum prodest: vlcera capitis manantia, furfuresque expurgat: ambustis, & pernionibus addita cera proficit: vitia cutis in facie emendat: pigmentis ad conciliandum faciei nitorem inseritur. Eligi oportet recens, quod non vehementer scœni græci odorem præ se ferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato: tale enim optimum iudicatur.

OFFICINARVM Luminaria ex Rasis auctoritate aliam, quamuis exoletam, Telini componendi rationem tradunt, in quo calamo odorato, & cypero elaterij bessem adiiciunt.

### Sampsuchinum.

### Cap. XLVII.

SERPYLEI, cassiæ, abrotoni, florum sisymbrij, frondium myrti, sampsuchi singulæ portiones, quadam pro uiribus ipsorum coniunctione, unà tunduntur, atque is omphacini olei modus adijcitur, qui madentium uires non euincat: hæc post quadriuum exprimuntur. denuo noua alia similis mensura, & æquali tempore macerata premuntur: ita enim ualidius reddi solet. Eligi oportet sampsuchum colore ex atro uiridi, plurimum redolens, mediocriter acre. Vim habet acrem, calfactoriam, extenuantem: aduersus vuluæ præclusiones, conuersionesque efficax est: menses, & secundas, & partus extrahit: vuluæ strangulatus recreat: lumborum, inguinumque dolores lenit: sed cum melle uti eo præstat; quandoquidem vehementia strictione locos indurat. Lassitudines illitum discutit: in opisthotonicorum, vulsorumque cataplasmata utilissimè additur.

Sampsuchini  
confid.

Solutio con-  
trouersia.

QUANQVAM ex Theophrasti, Dioscoridis, & Plinij sententia idem esse constat sampsuchum, & amaracum: cum tamen Galenus, & Paulus de his diuersis capitibus seorsum scripserint, eorumque temperamenta per gradus distingere tradiderint; non ab re credere nonnulli aliud esse sampsuchum, aliud uerò amaracum. Quorum opinionem auxit etiam Dioscorides, quod in his unguentorum compositionibus Sampsuchinum, & Amaracinum diuersis capitibus digesserit. Quod facile plerisque ad credendum induxit, has stirpes tum facie, tum uiribus differre. hac ratione freti, quod si alterum ab altero non distaret, omnino præter rationem de his uarijs in locis scripsisset Dioscorides, alterum unguentum Amaracinum, alterum uerò Sampsuchinum appellans. Porro ut huiusmodi controuersia tollatur, sciendum est, stirpem eam, quæ Galeno, & Paulo amaracum appellatur, id sanè amaracum non esse, quod Theophrastus Diosc. & Plinius sampsuchum uocauerunt, sed potius (ut ego existimo) marum, id quod etiam sentiunt clariores nostri seculi simplicium indagatores. Namq; mari nec Galenus, nec item Paulus quicquam prorsus in simplicium medicamentorum libris meminerunt. Quare non deest suspicio, quin librariorum culpa, in Galeno Mari titulus in amaracum abiit: quandoquidem in eius tum gradibus, tum facultatibus assignandis Galenus à Dioscoridis maro non longè recesserit.

Sunt



Opinioquo-  
rundam.

Cap. XLVIII.

## Abrotoninum.

Cap. XLIX.

## Anethinum.

Cap. L.

Sufinum.

Cap. LI.

S V S I N V M, quod alij liliū appellat, sic temperatur. Olei libræ nouem cum quincunce, calami libræ quinque & quadrans, myrrhæ uncia quinque, permisto odorifero uino decoquuntur, & colato oleo, cardamomi tusi & cœlesti aqua madefacti libræ tres & semis macerantur, premunturque, tres libræ cum semisse spissati olei assumuntur. mille lilia decerpitis folijs, in latum, non tamen profundum, labellum demittuntur: iniectum oleum manibus melle perunctis agitur: die noctuque conqueſcunt, & in pyxidem matutinis exprimuntur. quod defluet oleum, protinus ab aqua, quæ simul expressa fuerat, colo incerni oportet: non enim, ut rosaceum moram tollerat; nam concalfactum feruet, & computrescit: quare sæpius decapulandum. Vasa melle illinenda, tenuis sal inspargendus, & si qua sordes uasis faucibus hæsit, eximenda. Odoramentis iam expressis ex quasillo in labellum transfusis, rursus olei prius odoribus imbuendi, quod primum pondus æquet, & cardamomi tusi drachmæ decem conijciuntur. Hæc manibus scitè pressa, interiecta breui mora exprimuntur: quod profluit, repurgatur. Tertio eadem infunduntur, adiecto cardamomo, & sale, & manibus melle madefactis. Longè optimum erit, quod prius exprimitur: secundum, quod sequitur: tertium locum sibi uendicat, quod nouissimum prodit. Denuo in mille lilia euulsis folijs expressum primo oleum infunditur: tum eadem ratione prosequendum, idemque faciendum, ut prius: addito cardamomo, dein expresso, fac eadem in secundo, & tertio, ut dictum est: & quò frequentius recentia lilia maceraueris, eò ualidius unguentum efficies. Denique cum factum abunde uidebitur, singulis compositionibus miscere conuenit myrrhæ quàm optimæ duas & septuaginta drachmas, & croci decem, cardamomi quinque & septuaginta. Croci uerò, & cinnamomi pares portiones tunduntur, & cribratæ in lutram cum aqua demittuntur, expressumque primo unguentum infunditur, & paulò post excipiuntur uasculis siccis, myrrha, aut gummi antea perfusis.



fufis, & croco, & melle, & aqua madefactis. Eadem fiunt in altera, aut tertia exprefione. Aliqui fimplex ex balanino, alioque oleo, & lilij componunt. Optimum effe conftat in Phœnice, mox Aegyptio factum. fed cum primis laudatur, quod lilia redolet. Excalfacit, emollit: uulvæ præclufiones, & collectiones aperit: utiliffimum ad muliebria mala. ulcera in capite manantia, feruidas eruptiones, uaros, furfuresq; emendat: uibices, cicatricesq; celerrimè ad colorem reducit, ita ut sæpe falant. In fuma extenuat: potum bilem per alium extrahit, urinam ciet; fed ftomacho alienum eft, & naufeam parit.

*Hoc, quod ex lilij temperatur: illud item, quod ex ocimo, abrotono, anethoq; conficitur oleum, cum uniuscuiusque parandi ratio per fe clara fit, ideo noftris explanationibus non indigent. Ceterum Sufini compositio mihi quidem pluribus in locis librariorum potius, quam auctoris incuria deprauata uidetur.*

## Narciffinum.

## Cap. LII.

**NARCISSINI** spiffamenta ita fiunt. Sex libræ afpalathi cum sextante tunduntur, olei eloti libræ feptuaginta cum uncijis quinque affumuntur. Afpalathus aqua madefactus in tertia olei parte coquitur: quo exempto, calamus quinque libris & beffe adijcitur, cum myrrhæ gleba contunditur, cribrataque ac uino ueteri odorato immifta, decoquitur: fimul ac autem cum ijs efferbuerit, eximitur. refrigeratum oleum excolatur, cuius portio in labellum mittitur, flores narciffi quàmplurimi coniciuntur, qui bidui fpatio (ut in fufino dictum eft) permoti exprimuntur. Oleum fubinde decapulandum: fiquidem celerrimè putredinem fenit. Valet hoc ad emolliendas uulvæ duritias, præclufionesq; fed capitis dolores facit.

*NARCISSINVM, quod ego fciam, non paratur noftratibus myropolis. quod mirum non eft, cum id etiam Plinij ætate parari defiffet, ut ipfe libro XIII. cap. primo memoriæ prodidit.*

## Crocium.

## Cap. LIII.

**CVM** Crocium componere uoles, prius olei, ut in fufino diximus, spiffamenta facies, eifdem ponderibus, & menfuris: cuius olei libras tres & femiffem, croci unciam unam assumes, identidem quotidie moueto, & fexta die, quàm hoc afiduo peregeris, oleum à croco colis incernito, eidem croco partem olei modum adijcito, moue triduo, dein contufæ myrrhæ, atque cribratæ drachmas quadraginta permifceto, & in pila agitatum recondito. Aliqui oleo aromatibus ad cyprinum imbuto in croci compositione utuntur. Optimum eft, quod abunde crocum fpirat, in medendi ufu expetitur. Proximum quod myrrham refert. Calfacit, fomnum allicit; quare per fæpe phreniticis fubuenit perfufum; aut naribus admotum, aut illitum; pus mouet, ulcera purgat; contra uulvæ duritias, atque præclufiones, & ulcera, quæ cacoethe uocantur, prodeft cum croco, cera, medulla duplicato olei pondere, concoquit enim, emollit, humectat, & permulcet. ad oculorum glaucitates ex aqua illinitur. huic autem proportionem respondent butyrium, onychinum, & ftyracinum, quæ etfi nominibus diftant, uiribus, & compositione cognata funt.

## Cyprinum.

## Cap. LIIII.

**OLEI** omphacini clotipars una, aquæ cœleftis tantundem cum femiffe, cuius una parte oleum diluitur, altera adijciendis odoramentis admifcetur. Dein affumptis afpalathi libris quinque & femiffe, calami libris fex & femiffe, myrrhæ libra una, cardamomi libris tribus & dodrante, olei libris nouem & uncijis quinque, afpalathus tufus, & aqua affufus decoquitur in oleo, donec conferuefcant: myrrha autem uino uetere odorifero fubacta, contufusq; fimul calamus, digeruntur in offulas, quæ exempto afpalatho immittuntur, & ubi efferbuerint, fublato aheno oleum percolatur. Cardamomum tufum reliqua aqua afperfum infunditur, fpatha agitur, nulla, dum refrixerit, interpellatione. Post hæc colato oleo in uiginti octo libras olei, floris ligultri, quod cyprum uocant, fex & quadraginta libræ cum beffe instillantur, quæ fufficienter madefactæ per fportulam exprimuntur. Quod fi copiofius defideretur, idem recentium florum pondus iniectum fimili modo prematur: & iterum aut tertio, fi quis uelit, madefacere poterit, & ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonum, quod cum odoris fuauitate nares feriat. Aliqui cinnamomum addunt. Calfacit, emollit: ora uenarum adaperit: uulvæ, neruorumq; uitij conuenit, pleuriticis, fractisq; per fe, uel cerato immiftum. malagmatis imponi folet, quæ opifthotonicis, angina laborantibus, inflammationiq; inguinum opitulantur: item in acopa adijcitur.

## Irinum.

## Cap. LV.

**SPATHÆ** quàm minutiffimè contufæ fex libras cum beffe, in tribus & feptuaginta libris & quincunce olei, æreo uafe, additis decem aquæ heminis incoquito, quoad odorem acceperit: poftea in capfulam melle oblitam colato: ex eo aromatibus imbuto oleo, irinum primò temperatur, iride ex oleo infiffato



inspissato, macerata, ut scripsimus. Sed alia est componendi ratio. In olei septuaginta libris & quincunce, xylobalsami (ut dictum est) contusi libras quinque & sextantem excoquito: postea detracto xylobalsamo, tusi odorati calami nouem libras & dextantem adiecito, & myrrhæ glebam uetere uino odorato perfusam, & in olei ita odoribus imbuti quatuordecim libris, totidem tusæ iridis, binis diebus ac noctibus madefacito, strenuè, & uehementer dstringito. Quod si uis ualidius fieri, par pondus iterum ac tertio similiter maceratum exprimito. Longè optimum est, quod solam irin olet, quale illud est, quod in Perga Pamphiliæ, & Elide Achaïæ componitur. Vim habet calfactoriam, atque emollientem: crustas adimit, sordida ulcera & putrida purgat. confert fœminis uulvæ causariis: item inflammationibus eiusdem, atque præclusionibus: partus eiicit, hæmorrhoidas recludit: contra aurium sonitus ex aceto, ruta, & amaris amygdalis, prodest. diuturnis destillationibus, naribus illitum, & contra graueolentia earum ulcera, quas ozænas uocant, auxiliatur: aluum purgat cyathus epotus: facit ad ilei cruciatum, urinam mouet: difficiles uomitiones adiuvat, perunctis eo digitis & immisis, uel iis, quæ ad uomitum ciendum induntur: anginae etiam illinitur, aut ex aqua multa gargarizatur: item contra arteriæ scabritiam. datur etiam iis, qui cicutam, coriandrum, aut uenena fungorum hauserunt.

QUANQVAM Irini præparatio (est enim per se clara satis) non magis, quàm Crocini, & Ligustrini ex Irini consideratio. planari expostulat: illud tamen silentio minime prætereundum uidetur, quod non Iridis flores, sed radices, cum hæ odore fragrent, illi uerò malè oleant, in hoc olei spissamento imponi debent. Quod etsi Dioscorides non explicauerit; cum tamen unguenta odorum iucunditate commendentur, de Iridis radice, non de floribus intellexisse Dioscoridem existimandum. Quippe quæ & suauiter oleant, & ad unguentorum spissamenta floribus præstantiores habeantur.

## Gleucinum.

## Cap. LVI.

GLEUCINVM absolutè constat omphacino oleo, iunco odorato, calamo, Celtica nardō, spatha, aspalatho, fertula Campana, costo, & musto: circumdatis interim uinaceis uasi, quod aromata, uinum, & oleum conceperat. Tricenis diebus, bis in die mouetur, postea expressum oleum reconditur. Calfacit, emollit, remittit, horroribus, & neruorum, uulvæq; uitii auxiliatur. omni acopo iuuantius, quippe quod emolliat.

MINIME quidem mirari licet, quod Gleucini parandi rationem simplicem appellauerit Dioscorides. Siqui dentaliæ habentur unguentorum compositiones, quæ multo pluribus simplicibus constant odoramentis, sicuti Columella lib. XIII. capite I. aperte indicat. Cæterum non potest Gleucinum (si rectè admissa simplicia considerentur) non uehementer excalficere: tametsi Plinius lib. XXI. cap. III. id tum adstringere, tum refrigerare scripserit. Quod euidenti argumento est, aut Plinij gleucinum, siue musteum, ab hoc Dioscoridis, & Columellæ diuersum esse, aut Plinium non exactè illius temperamentum perpendisse. Verùm cum is lib. XV. cap. VII. scribat, gleucino mustum incoqui in uapore lento, non ut alia admoto igne, sed circumdatis uinaceis per se calentibus; uidetur non parum cum Dioscoride conuenire. Quamobrem crediderim potius Plinium, cum dixit gleucinum refrigerare, lapsus fuisse, quàm secus. Nam etsi oleum omphacinum, cum quo musteum conficitur, tantum (ut Galenus inquit) frigiditatis, quantum adstrictionis habeat: cum tamen sit aliarum qualitatatum susceptiuum, fieri quidem non potest, quin admistis calidis odoramentis, puta cypero, calamo odorato, Celtica nardō, dactylorum operimento, aspalatho, meliloto, & costo, ualde calidum euadat. Quippe eadem ratione aqua, cum frigida admodum sit, temperamentum permutat (ut Galenus asseruit, & experimento comprobatur) cum calida in ea macerantur medicamenta: quandoquidem & ipsa facile alias recipit qualitates.

## Amaracinum.

## Cap. LVII.

AMARACINVM longè optimum in Cyzico fieri solet ex omphacino oleo, & balanino: spissamentis è xylobalsamo, iunco odorato, & calamo factis: conditisq; amaraci, costi, amomi, nardi, cassiæ, carpobalsami, & myrrhæ odoribus, aliqui, quod pretiosius fiat, cinnamomum addunt. Mel autem, & uinum assumuntur: hoc in uasorum illitionem, illud ad cogendas tusorum aromatum offas. Amaracinum calfacit, soporem mouet, uenarum spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, urinam cit: putrilaginibus, ac fistulis perquam utile: necnon humentibus herniis, postquam medica manus operam suam impenderit: crustas, & tetra ulcera, quæ theriomata uocant, rumpit: difficili urinæ illita sedet, & eius inflammationibus auxiliatur, hæmorrhoidas illitu soluit, uulvæ subditum menstruos cursus enocat, duritias, ac uulvæ tumores discutit, uulneratis neruis, & musculis confert, lanceo centunculo modicè madefactum, & impositum.

SUPERIUS in sampsuchini commentario abunde de Amaracino à nobis dictum est, Quo fit, ut hic de eo plura scribere non sit opus. Huius meminit Galenus libro primo de antidotis, dum bedycrown explicat, quod theriacæ admiscetur, ubi diffusius de eo agens scribit, quod sui temporis unguentarij amaraci loco, ex quo in Cyzico antiquitus parabatur, marum imponebant, ut maiorem expiraret odorem. Cæterum se iussisse ait, ut legitimum experiretur amaracinum,



racinum, id sibi ex solo amaraco preparari, quod etsi odoris fragrantia uideretur inferius, non tamen uiribus imbecillius fuisse testatur.

## Megalinum.

## Cap. LVIII.

FACTITABATUR olim Megalinum, sed nunc compositio exoleuit, & prorsus oblitterata est. Cuius ad historię complementum meminisse non fuit alienum. Mistura cum amaracino eadem erat, sed resina exuperabat, hac tantum ratione differens. Quare leuiter emollit. Resina unguentis, neque tunc, neque uoluptatis gratia adijcitur, sed coloris, crassamentiq; causa. Ea tantisper coquitur, dum desinat olere: cuius coquendę ratio declarabitur, cum de resina differemus.

## Hedychroum.

## Cap. LIX.

QVOD Hedychroon uocant, in Co fieri solet: eisdem præditum uiribus, & misturis, quibus amaracinum, sed suauius spirat.

Hedichroi  
compositio ex  
Galeno.

HEDYCHROI compositionis meminit Galenus libro primo de antidotis, cum omnia, quę continet, odoramentis uino sabacta Andromachi theriaca recipiat. Ceterum etsi hedychroi parandi rationes plures dicat reperiri, unam tamen elegit, quam hoc modo descripsit. Hedychroum habet mari drachmas duas: asari, amaraci, aspalatbi, schœnobi calami odorati, phu pontici totidem: xylobalsami uero, & opobalsami, cinnamomi, costi, singulorum drachmas tres: myrrhę drachmas sex, totidem folij malabathrini, nardi Indicę, croci, casię: duplo autem plus amomi, aduectę uero ex Chio abundante plurimis fontibus insula mastiches drachmam unam: uino salerno omnia excipe. Cum igitur hæc miscueris, fac trochiscos similes theriacis, et scillinis, quos exiccabis eo modo, quo diximus. Productus fuit Galenus, ut hunc parandi modum describeret, tum quod Andromachus hedychroum (ut inquit) nullibi literis mandauerit: tum etiam ut rei medicę imperitos doceret, quidnam esset hedychroum in theriaca præparatione, ne in eum errorem caderent, in quem sua ætate medicum quendam Romę lapsum fuisse conueniunt: qui compositurus antidotum, querebat apud myropolas Hedychroum; existimans esse herbam, aut radicem, aut quodpiam simplex medicamentum. Id quod etiam hac nostra tempestate quàm plurimis euenisse comperimus. Auicenna, & ceteri Arabicę familię scriptores in sua theriaca compositione hedychroum trochiscos Alindaracaron appellauere: tradentes uarias eorum compositiones, in simplicibus medicamentis, pondere, & mensuris à Galeni doctrina plurimum differentes. Quare mirari non licet, si tandiu legitima Theriacę compositio infelicitè successerit; cum & ab Arabibus, & à myropoli, adulterinis medicamentis fuerit deprauata.

Theriace de  
prauatio.

## Metopium.

## Cap. LX.

FIT in Aegypto unguentum, quod Metopion patrio nomine appellatur, propter galbani mistionem: nam lignum, in quo galbanum nascitur, metopion uocant. Constat amygdalis amaris, omphacino oleo, cardamomo, odorato iunco, calamo, melle, uino, myrrha, balsami semine, galbano, & resina. Probatum pingue, graui odore, quod magis cardamomum, & myrrham, quàm galbanum respiciat. Calfacit uehementer, & adurit, atque extrahit: ora uenarum aperit: ulcera purgat, extrahitq;: ad præciosos nervos, & musculos, ad hernias humore contractas, cum erodentibus medicamentis efficax est. ceteratis, & malagmatis inseritur: horroribus, conuulsisq; præsertim quibus ceruix in scapulas deiecta, & retrorsum contracta est, utile habetur: sudores ciēt, uulnū spiracula recludit, & eiusdem duritias laxat. In summa molliendi naturam habet.

## Mendesium.

## Cap. LXI.

MENSESIUM constat balanino oleo, myrrha, casia, & resina. Aliqui tamē post singulorum pondera, cinnamomi exiguum addunt, nullo compendio: nam quę simul excocta non fuerint, uim nullam exhibent. Similem metopio uim obtinet; sed inferiorem multo.

## Staete.

## Cap. LXII.

STAETE uocatur pinguitudo recentis myrrhę cum exigua aqua tusę, & organo expressę. Ea per se quàm odorata, ac pretiosa est, atque unguentum per se facit, quod Staete nominatur. Maximè probatur, quę nullam olei mistionem admisit, cuius minima portio compos est uirium plurimarum. Vini calfactoriā, myrrhę, & calidis unguentis respondentem habet.

Staetes consi-  
deratio.

Styrax liqui-  
dus.

Medicam. pe-  
regrina cur-  
adulteretur.

STAETE Serapioni, quemadmodum & reliquis Mauritanis, pariterq; officinis Styrax liquidus appellatur, cuius copia non solum Venetijs ubiq; uenalis habetur, sed & in omnibus firē officinis reperitur, quę medicamentorum componendorum artem exercent. Quod autem Staete myrrhę sit liquidus uocatus Styrax, facile probat Serapio. quippe qui capite de Styrace calamita, liquidum styracem ex myrrha primum aqua confersa, ac deinde expressa, fieri tradidit: quæ in re Dioscoridem ad unguem imitatur. Cui quidem sententię illud ad stipulatur, quod liquidus Styrax (de legitimo sanē loquor) sit per quā odoratus, & gustui non obscure auarus. Porro animaduertendum est, quod hoc æuo syncerum haud facile inuenias, ut ferme euenit cum ceteris medicamentis, quę ex Alexandria Aegypti, uel Syria



Syria ad nos conuehantur. Siquidem cum omnia hæc per Mauritauorum, Turcarum, Iudeorumq; manus transeant, qui nobis Christiculis semper dolos, fraudesq; moluntur, Dijs sacrificium facere sibi persuadent, cum nos aliqua in re fallere possunt. Ceterum, ut redeam, unde diuenteram, mea quidem fert opiuio, si syuceram stacte uauiscisci possemus, non alieum fore, ipsam in myrrhe locum substituere. Sed certe perquam difficile erit legitimam inueniri. nisi forte uera stacte sit liquor ille, de quo superius in balsami commentatione diximus.

## Cinnamominum.

## Cap. LXIII.

CINNAMOMINVM confit è balanino oleo: & xylobalsami, calami, iunci odorati spissamētis: atq; cinnamomi, & seminis balsamini suauitate conditur, quadruplaque myrrhæ ad cinnamomum portione: mel ad cogenda omnia adijcitur. Laudatur non acre, molli odore, planè myrrham redolens, crassum, odoratum, gustu perquam amaro. Id non à resina, sed myrrha crassitudinem obtinuit: resina enim neque amaritudinem præbet, neque ullam odoris gratiam adijcit. Vin habet admodum acrem, amaram, & calfacientem. Itaque præuenarum aperit, calfacit, discutit, diffundit: humores & spiritus attrahit, caput aggrauat: contra vuluæ uitia cum duplo oleo, cera, & medulla efficax est. Ita enim ferè multum acrimonie exolefcit, & quædam emolliendi uis contrahitur: alioqui adurit, & præ omnibus crassis unguentis indurat. Facit mirum in modum ad fistulas, & ulcera, quæ putredinis uitium senserunt: item ad hernias humidiores, carbunculos, gangranasq; cum cardamomo: quin & ad febrium horrores, & tremores: aduersus serpentium morsus illinitur: scorpionum, & phalangiorum ictibus, cum tritis grossis imponitur.

## Nardinum.

## Cap. LXIIII.

RATIO Nardini faciendi euariat. Nam aut malabathrino folio, aut sine eo fit: plerunque autem balanino oleo, aut omphacino. Iuncus odoratus spissamēti gratia adijcitur: sicuti propter odoris suauitatem, costus, amomum, nardum, myrrha, balsamum. Laudatur tenue, non acre, nardi aridæ, aut amomi odorem referens. Vis ei extenuans, acris: expurgat, calfacit, absterget humores, rarefacit. Hoc liquidum est; nec habet strigenti crassitudinem, nisi resinam recipiat. Fit etiam simplex ex omphacino oleo, iunco, calamo, costo, & nardo.

## Malabathrinum.

## Cap. LXV.

MALABATHRINVM spissamenta nardini habet: insuper myrrhæ plusculum additur. Qua de causa calfacit, crocino, aut amaracino uiribus respondens.

## Iasminum.

## Cap. LXVI.

APVD Persas fit, quod Iasminum cognominatur, ex albis floribus violæ: quorum sextans in Italicum sextarium scfamini olei demittitur, uiolis, ut in lilino diximus, uicissim permutatis. Apud Persas inter epulandum usurpatur odoris causa. Quinetiam toti corpori conuenit; præsertim cum in balneas descensum est. Sed his opitulatur corporibus, quæ calfactionem, laxationemq; desiderant. grauius tamen spirat, quam ut libenter à plerisque recipiatur.

IASMINVM unguentum non eo quidem silentio prætereundum duximus, quo aliqua in præcedentibus à nobis ommissa sunt: in illis enim nihil sanè, in hoc uerò aliquid nobis se se offert declarandum. Itaq; primum scire cōuenit, quòd Iasme uocabulū apud Græcos, aliorum etiā testimonio, nil aliud significat, quam uiolaceum. Et certe cum scribat Dioscorides, unguentum hoc fieri ἐκ τῶν ἀρθῶν τῶν λευκῶν τῆ ἰε, hoc est uerbum uerbo reddeudo, ex floribus albis uiole, id uolaceum meritò appellari debet. Sunt tamen è recentioribus, qui pro certo sibi persuadeant, uocabulo- rum fortasse uicinitate decepti, illud ex floribus ijs perquam odoratis fieri, quos in Italia Gelsomini uulgò appellamus.

Quorum opinioni non parum suffragatur tum Hermolaus Barbarus, tum Marcellus Florentinus. Qui præcipue, ut suam comprobent sententiam, ueteres asserit, præsertimq; Dioscoridem, inter leucoij genera nostratem gelsiminum comprehendisse, illudq; speciatim gelsiminum intellexisse, quod floribus cæruleis prouenire nonnulli pro certo asserunt. Cuius sententiam non modò non probandam censeo, sed omnino refellendam existimo. siquidem nullo pacto cogitandum est, nedum credendum, quòd Dioscorides, qui in simplicium historia, & in eorum declarandis separandisq; generibus, omnium diligentissimus fuit, adeò imprudenter nullo discrimine existimauerit cæruleum leucoium gelsiminum esse: cum id filijs uiticuloso caule, radicibus, ramis, floribus, cæterisq; notis ab omni leucoio dissideat. Sed hoc uerum esse Marcellus concedamus, etsi minus concedendum sit, quānam ratione dicet unquam; Iasminum unguentū fieri ex floribus gelsimini, quod cæruleum Dioscoridis leucoium esse asserit, si Dioscorides ipse palam prodit, Iasminum ex albis uiolis temperari? Ad hæc differre gelsiminum à leucoio abunde ostendit Serapio, qui non modò fuit Dioscoridis imitator, sed etiam interpres, cum alterum ab altero diuersis capitibus distinxerit, & de utrisq; tanquam de rebus diuersis differuerit. Quinimo de gelsimino agens capite centesimo septuagesimo sexto nullam Dioscoridis, nec Galeni auctoritatem asserit, sed tantum suæ gentis monumentis inheret, asseritq; gelsiminum floribus tum albis, tum luteis, tum cæruleis reperiri, quale etiam ætate nostra uisitur. Quod nobis maximo argumento esse potest, ut credamus.

Iasmini consideratione.

Hermolai, & Marcelli opinio improbat.



Iesemin vn-  
de dictum.

GELSIMINVM.

Iesemini vi-  
res ex Serap.

Ioānis de Vi-  
go, lapsus.



pingui solo nascens: ea copiosam sudat stacten. Omnium prima est, quæ Troglodytica appellatur, accepto cognomine à loco, in quo prouenit, splendens, subuiridis, ac mordens. Quinetiam legitur tenuis quædam, quæ à Troglodytica secunda est, bdellij modo mollis, uerum odore grauiuscula, apricis nascens. Alia caucalis cognominatur præter modum exoleta, nigra, & retorrída. Omnium deterri-  
ma, quæ ergasima dicitur, pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummi imaginem vergens, & uiri-  
bus eius proxima. Improbatur aminnea cognomine. Ex ijs pastilli fiunt, sed è pinguibus pingues, &  
odorati: è siccoribus haudquaquam pingues, & inodorati. Minus odore pollet, quæ oleum non ad-  
misit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur maccrato gummi aqua, in qua myrrha maduerit. Eli-  
genda est recens, fragilis, leuis, undique concolor, quæ confracta uenas unguium modo candidas &  
laues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens. Superuacua, & inutilis est ponderosa,  
coloris picci. Calfacit, cohibet, soporem gignit, glutinat, siccit, astringit, uulnam emollit, & præ-  
clusam aperit: menses & partus celeriter extrahit cum absinthio, lupinorum cremore, uel succo rutæ  
admotæ: tuberculo fabæ deuoratur in uetere tussi, orthopnœa, in laterum pectorisque doloribus, in  
alui profluuiio, & dysenteria: horrores discutit duabus horis ante febrium accessiones fabæ magnitu-  
dine pota cum pipere, & aqua: subdita linguæ liquataque, scabritiem arteriæ expolit: obtusam uocem  
expedit, uentris tinea enecat, contra grauem oris halitum mandituro, & aduersus alarum tædia cum li-  
quido alumine illinitur: gingiuas, & dentes stabilit colluto cum uino, & oleo ore: uulnera capitis illi-  
tu glutinat: medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis, peruncta cum cochleæ carnibus: item puru-  
lenti auribus, inflammatisque cum meconio, castorio, & glaucio: ad uaros autem cum cassia, & mel-  
le illinitur: impetigines ex aceto purgat: defluentes capillos cum ladano, & uino myrteo illita, fir-  
mat: diuturnas destillationes lenit, & illitis penna naribus: oculorum ulcera complet, albugines tol-  
lit, caliginem discutit, scabritiem læuigat. Fit è myrrha, perinde atque thure, fuligo: & ut postea o-  
stendemus, ad eadem conueniens. Bœotica myrrha dissecta radix est arboris cuiusdam in Bœotia  
nascens. Melior est, quæ myrrham odoris suauitate repræsentat. Vis ei calfactoria inest, emollit, di-  
scutitque: suffimentis commodissime inferitur.

damus, gelsiminum Dioscoridi ceterisque ueteribus incognitum fuisse. Ceterum cur Arabes stirpem hanc IESEMIN appellauerint, causa facile assignari potest: quod cum gelsimini flores odoratos, albicantesque, albæ uiolæ modo conspicerent, Græcos barbarice imitari uolentes, ipsi uiolæ nomen indidere, quod est Iesemin: tamen si uernacula eorum lingua Zambach, siue Sambach uocitetur. Id autem sicut odore fragrat, ita & uiribus pollet: siquidem Serapionis testimonio, excalfacit ordine secundo, humores discutit, pituitæ lentitiâ senibus frigidis digerit, cruciatibusque ex pituitæ lentore proueniētibus mirifice prodest. Flores tam recentes, quam sicci, lentigines, & impetigines in facie abstergunt. Paratur ex ijs etiam oleum Zambachinum appellatum, quod frigidis affectibus non obscurum affert auxilium. Hoc unguentarij cum amygdalino oleo parant, hominum barbis odoris gratia perfumendum: quod tamen temperie calidis caput adeo excalfacit, ut quandoque è naribus sanguinem eliciat. Hallucinantur, qui falsi uocabuli similitudine Sambacinum, & Sambucinum idem esse existimant. Inter quos errore implicatur Ioannes de Vigo chirurgicus nostri temporis non obscurus capite de Sambuco in suo parauo de simplicium libello. Non diu est, quod Ieseminum, siue (ut nos) Gelsiminum in Italiam allatum est: quamuis nunc ubique horum opere topiario tum albis, tum luteis, tum etiam ceruleis gelsiminis ornetur.

## Myrrha.

## Cap. LXVII.

MYRRHA lacryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spinæ nõ dissimilis: è cuius uulnere defluit lacryma in subiectas tegetes: alia circum caudicem cõcre-  
scit. Dicitur ex his aliqua pedasimos præpinguis, quæ expressa, stacte emittitur. Alia gabirea pinguisima, læto &  
pingui solo nascens: ea copiosam sudat stacten. Omnium prima est, quæ Troglodytica appellatur, accepto cognomine à loco, in quo prouenit, splendens, subuiridis, ac mordens. Quinetiam legitur tenuis quædam, quæ à Troglodytica secunda est, bdellij modo mollis, uerum odore grauiuscula, apricis nascens. Alia caucalis cognominatur præter modum exoleta, nigra, & retorrída. Omnium deterri-  
ma, quæ ergasima dicitur, pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummi imaginem vergens, & uiri-  
bus eius proxima. Improbatur aminnea cognomine. Ex ijs pastilli fiunt, sed è pinguibus pingues, &  
odorati: è siccoribus haudquaquam pingues, & inodorati. Minus odore pollet, quæ oleum non ad-  
misit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur maccrato gummi aqua, in qua myrrha maduerit. Eli-  
genda est recens, fragilis, leuis, undique concolor, quæ confracta uenas unguium modo candidas &  
laues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens. Superuacua, & inutilis est ponderosa,  
coloris picci. Calfacit, cohibet, soporem gignit, glutinat, siccit, astringit, uulnam emollit, & præ-  
clusam aperit: menses & partus celeriter extrahit cum absinthio, lupinorum cremore, uel succo rutæ  
admotæ: tuberculo fabæ deuoratur in uetere tussi, orthopnœa, in laterum pectorisque doloribus, in  
alui profluuiio, & dysenteria: horrores discutit duabus horis ante febrium accessiones fabæ magnitu-  
dine pota cum pipere, & aqua: subdita linguæ liquataque, scabritiem arteriæ expolit: obtusam uocem  
expedit, uentris tinea enecat, contra grauem oris halitum mandituro, & aduersus alarum tædia cum li-  
quido alumine illinitur: gingiuas, & dentes stabilit colluto cum uino, & oleo ore: uulnera capitis illi-  
tu glutinat: medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis, peruncta cum cochleæ carnibus: item puru-  
lenti auribus, inflammatisque cum meconio, castorio, & glaucio: ad uaros autem cum cassia, & mel-  
le illinitur: impetigines ex aceto purgat: defluentes capillos cum ladano, & uino myrteo illita, fir-  
mat: diuturnas destillationes lenit, & illitis penna naribus: oculorum ulcera complet, albugines tol-  
lit, caliginem discutit, scabritiem læuigat. Fit è myrrha, perinde atque thure, fuligo: & ut postea o-  
stendemus, ad eadem conueniens. Bœotica myrrha dissecta radix est arboris cuiusdam in Bœotia  
nascens. Melior est, quæ myrrham odoris suauitate repræsentat. Vis ei calfactoria inest, emollit, di-  
scutitque: suffimentis commodissime inferitur.

Myrrhæ cõ-  
sideratio.

MYRRHA, quæ ex Alexandria Aegypti hac ætate ad nos affertur, admodum sanè ab ea differt, quam inter præstantissimas Myrrhæ species recensuit Dioscorides. Quippe uniuersa ferè myrrha, quæ in officinarum usu habetur, ijs omnibus qualitatibus, ac notis destituitur, quibus optima commendatur. Nanque ea (ut uidere est) minime uirescit, pinguis non est, non odorata, non undique concolor, nec confracta uenas unguium figura leues intus ostendit, nec sapore



saporem acrim deprehenditur; tamen si gustui amaritudinem relinquat. Verum si fortasse cuiusdam uideretur & hæc inter Myrrhæ species esse recipienda (quod tamen non satis cõpertum habeo) aut caualim, aut ergasimam, esse crediderim, aut potius quam Plinius ex India deferri ait, cum hæc ceteris deteriores habeantur, certoq; sciamus ex India in Alexandriam myrrham importari. Nam ea, quæ plurima ad nos affertur, non modo sicca, nigraq; est, sed etiam retorrída, macilentæ, & cano quodam siu obducta: & quanquam inter huiusmodi globulos aliquod quandoq; reperitur fragmentum, quod & clarum sit, & pellucens; confractum tamen diuersicolor apparet. Ecquid magis? nec gustui insigniter amarum, nec myrrhæ odore præditum sentitur. Quo fit, ut credere liceat, eiusmodi Myrrham aut è deterioribus esse, aut gummi alicuius, aliarumq; mistionum adulterio minime uacare: hæc enim impostura (ut Dioscorides inquit) myrrhæ adulterari solet. Sed hæc ita de illa conijcimus, quæ passim uulgaris habetur. Ceterum electam Myrrham iam ad nos aduehi scimus, quæ & legitima, & probatissima esse censetur. Verum ea hætenus tam rara est, ut non nisi ad ostentationem asserueretur, & ad aliarum dignoscendarum regulam. Adulterabatur myrrha Galeni tempore opocalpaso, quæ calpasi lethalis, uenenosaq; est lacryma. Idcirco libro primo de antidotis. Opocalpasum (inquit) exitiale est, multosq; nos sorte quadam uidimus nostræ ætatis decursu mori, quod insciji myrrham, cui opocalpasum admixtum erat, assumpsissent. De industria namq; nonnulli eorum, qui ipsam præparant, ut laudatissimam imponebant, eo quod uiderent collyris inditam optinuum esse medicamentum. Quippe quæ pus citra mordicationem discutiat, & interdum incipientem oculorum suffusionem substantia tenuem: siue autem in emplastrum, siue in ccratum, siue in aliquod digerens medicamentum, quod extrinsecus imponitur, huiusmodi myrrham iniicias, uim ipsius augebis: at intra corpus assumptum lethale est medicamentum. Hæc igitur fusius dicta sunt, tum quod orationis series ita exposculet, tum etiam quia hæc speculati non est inutile. hætenus Galenus. Adhibenda itaq; diligentia est, ne & nos Myrrham quandoq; opocalpaso adulteratam emamus. Ad hæc Brasauoli Ferrariensis animus inclinare uidetur, ut existimet Myrrham officinis uulgarem bdellium esse. Cui haud quaquam assentiendum putauerim; siquidem myrrha hæc pellucens adeo non est, nec taurino glutino similis, ut bdellium esse tradidit Dioscorides. Et licet quedam nostratis myrrhæ frustra quædamq; translucida reperiuntur; sunt tamen potius hæc (ut dictum est) gummi adulteria, quam myrrhæ, uel bdellium: nempe gustu maleficium detegitur. Præterea bdellii incensum (Dioscoridis testimonio) odorem unguibus odoratis similem spirat, quod in nostrate myrrha nunquam, facto periculo, sum consecutus. Huic etiam alia accedit ratio, quæ magis ac magis Brasauoli animum immutare poterit: quod scilicet bdellium diu digitis ductum, tractatumq; facile lentescat, & confractum pingue spectetur, myrrha uero, quæ officinis uenditur, digitorum attritu conteritur, & si frangatur perquam arida sese offert. Ceterum improauit Dioscorides, omniumq; Myrrhæ specierum deterrimam iudicauit, quæ aliquibus minea, alijs aminnea uocatur, quam cum Galenus probauerit libro primo de antidotis, omnibusq; Troglodyticis prætulit, factum est, ut existimauerint quidam, in hoc loco Dioscoridis codici mendam subesse. Sed cum in Dioscoride Græco legatur aminnea, & in Galeno minea, ego potius crediderim, eos non idem myrrhæ genus intellexisse. Plinius lib. XII. cap. XV. myrrhæ arboris faciem diligenter expressit, his uerbis. Myrrham in iisdem syluis, ubi & thuris, permixtam arborem nasci tradidere aliqui: pheres separatim. Quippe multis in locis Arabie gignitur. Cõnebitur & ex syluis laudata, petuntq; eam etiam à Troglodytis Sabæi transitu maris. Satina quoque prouenit multum syluestri prelata. Gaudet rastris, & ablaqueationibus: melior radice refrigerata. Arbori altitudo ad quinque cubita, nec sine spina: caudice duro, & intorto, crassiore quam thuris, & ab radice etiam, quam aliqua sui parte: corticem leuem, similemq; unedoni: scabrum alij spinosumq; dixere: folium oliuæ, uerum crispius, & aculeatum: iuba oliuæ satri. Aliqui similem iunipero, scabriorem tantum, spinisq; horridam, folio rotundiore, sed sapore iuniperi. Nec non fuere qui è thuris arbore, utrunq; nasci mentirentur. Inciduntur bis & ipse thuris modo, iisdemq; temporibus, sed à radice usq; ad ramos, qui ualent. Sudant autem sponte priusquam incidantur, statim dicta, cui nulla præfertur. Ab hac satina, & in syluestri quoq; melior astiua. Non dant ex myrrha portiones Deo, quoniam & apud alios nascitur. Et sequenti capite inquit. Adulteratur myrrha lentisci glebis, & gummi: item cucumeris succo amaritudinis causa, sicut ponderis argenti spuma. Reliqua uitia deprehenduntur sapore gummi dente lentescantis. Facillime autem adulteratur Indica myrrha, quæ ibi de quadam spina colligitur. Hoc solum peius India affert, facili distinctione, tanto deterior est. hæc Plinius. Quo fit, ut facile crediderim nostri usus myrrham Indicam esse. namque per mare rubrum, & inde per carouanas (ut dicunt) Alexandriam importatur. Myrrhæ quoq; historiam non iniucundè scripsit Theophrastus lib. IX. cap. IIII. de plantarum historia, sic inquit. Gignitur thus & myrrha regione Arabum media circa Saba, & Adramyttia, & Citibana, & Mamali: & exeunt thuris, myrrhæq; arbores aliæ super montem, aliæ in pedemontis culturis proprijs: quamobrem aliæ coluntur, aliæ uitam agunt incultæ. Montem istum præaltum affirmant, & ningi solitum: amnes quoq; de eo in plana fluere. Myrrhæ arborem thure altitudine minorem, fruticosioremq; narrant: caudice duro, contortoq; iuxta terram, crassiori; sura hominis, cortice leui adrachne simili. Alij uero, qui se uidisse affirmant, de magnitudine ferè consentiunt. Neutram earum arborum magnam referunt, & minorem myrrhæ humiliorumq;. Sed thuris folium laurinum, læueq;: myrrhæ aculeatum, non læue, ulneo simile: crispum tamen, extremò spina horridulum, iligni modo. Idem ea nauigatione, qua ex sinu heroum uehementer egressos sese aquam in monte quæsisse dixere, atq; ita uidisse has arbores, & lectionem notasse hoc modo ambarum: & caudices, & ramos incisos quidem, sed alios ueluti securi percussos uideri, alios tenuiores incisuras habere: & lacrymam aliam decidere, aliam arbori inherere: nonnusquam etiam subiectas tegetes ex palmis contextas, alibi solum tantummodo circumpaumentatum. Montem autem uniuersum Sabæis diuisum dixere: hos enim loci illius dominos esse, insititque nutua degere, quamobrem nullum suas arbores custodire: unde & thus, myrrhamq; sese large ad naues solitudine deportasse narrant. Illud quoq; se audiuisse dixere, myrrhæ, thusq; collectum undiq; ad solis delubrum conuehi: quod Sabæorum esse sanctissimū inter omnia regionis illius, custodesq; Arabes armatos habere, quibus singulos suum thus

Myrrha adulterata opocalpaso.

Brasauoli opinio improbata.

Myrrhæ historia ex Plinio.

Myrrhæ historia ex Theophrasto.



aceruatum, & myrrham eodem modo relinquere, posita super aceruum tabella, literis significante numerum mensurarum, & pretium, quod pro singulis mensuris ponendum sit. mercatores uero, qui uenerint, tabellas aduertere, eiusque quod placuerit, acta mensura pretium in eodem ponere loco, unde merces acceperint: sacerdotem deinde uenire, pariterque tertia pretij Deo accepta, reliquum ibidem relinquere: idque seruari tutissime dominis, donec acceptum uenerint.

Alij myrrhæ arborem terebintho similem reddidere, sed scabriorem, spinosioyemque: folium paulo rotundius, gustatu proximum terebintho: earum quoque ueteres præstantiores haberi. Nasci uero hanc, & thus in eodem loco terra subargilia, & sabulosa. & aquas fonte fluentes raras admodum comperiri. Hæc ergo illis repugnant, uidelicet niggi, & imbris perlui, & annibus locum illum exhilarari. Sed hi quidem altera quoque longe maiore ignorantia laborarunt: thus enim, & myrrham nasci ex eadem arbore putauerunt. Quamobrem uerisimilius ipsi narrarunt, quos ex heroum oppido profectos nani retulimus. Myrrhæ aliud stillatitium, aliud fœtitiū constat. Probatum melior gustu, eiusque norma concolorem accipiunt. hæc Theophrastus. Myrrhæ mentio Galenus lib. viii. simpliciū medic. ubi ita scriptum reliquit. Myrrha secundi ordinis est tum excalfacientium, tum desiccantium. Itaque capitū uulneribus illita glutinare ea potest. Inest & amaritas non pauca, per quam foetum, & lumbricos tum enecat, tum eiicit: adest hinc ei & abstergendi potentia. Sic igitur ocularibus miscetur facultatibus, utique quæ ad ulcera, & crassas cicatrices præparantur. Eadem de causa inditur & medicamentis, quæ ad tussim ueterem, & asthma, sine anhelationem exhibentur: non tamen arteriam exasperat, sicut abstergentium nonnulla. Verum adeo moderatam obtinet absterfionem, ut nonnulli eam arteriacis quæ uocant medicamentis commisceant, tanquam sufficienter excalfaciens, & desiccans medicamen: scilicet absterfionem proficiscentem ab amaritudine nihil uerentes. hæc Galenus. Porro ubi myrrha desit, Galenus in succidaneis (si tamen liber is Galeni est, nobis enim spurius censetur) odoratum calamitū supplet: Constantinus uero amaras amygdalis eodem pondere. Sed equidem hic myropolus admonitos uelim, ut nullo pacto eorum sequantur doctrinam, qui iubent, Auicennæ auctoritate male intellecta, myrrhæ loco piper nigrum supponere. Namque Auicenna hanc sententiam omnino refellit, cum utatur his uerbis. Pro myrrha substituendum piperis nigri dimidium aliqui perhibent: sed hoc falsum est. Postremo illud etiam notandum est, quod (ut Galenus inquit lib. ii. de comp. medic. per genera) myrrha semper medicamentis est commiscenda, cum ab igne tolluntur: quippe per quæ coqui minime patiatur, ueluti etiam thus, & aloë. De Bæotica autem myrrha, quid dicam non habeo, quod ætate nostra sit (ut arbitror) omnibus incognita. Συμπρα sic Græcis dicta, Myrrha Latinis appellatur: Ler, Mur, seu Mor, Arabibus: Mirrha, Italis: Mirrhen, Germanis: Mira, Hispanis: Myrrhe, Gallis.

† Exemplaria Græca typis expressa habent, *στυραξιόμην* πρὸς τὸν μυστήριον, id est, illita alæ nariū. Quæ uerba inunctionem ad partem nasi referre uidentur, non autem ad instrumentum, quo debeat fieri inunctio. Siquidem teste etiam Galeno lib. xi. de usu partium, *μυστήριον* seu *μυστήριον* pars quedam nasi uocatur.

Myrrhæ uires ex Gal.

Myrrhæ succidanea.

Bæotica myrrha.  
Nomina.

## Styrax.

## Cap. LXVIII.



STYRAX lacryma est arboris malo cotoneæ similis. Præfertur pinguis, flauus, resinofus, albicantibus grummis, quam plurimum in sua odoris gratia permanens, quidum mollitur, melleum liquorem reddit: qualis è Catalbalis, Pissidia, & Cilicia deuchitur. Deterior niger, furosus, friabilis, canoq; situ obductus. Cæterum lacryma inuenitur gummiū similitudine, perlucida, & myrrhæ æmula: uerum perpauca manat. Adulteratur ligni scobe, quam uermiculi erodentes excusserunt, melle, & iridem sedimento, & quibusdam alijs. Alij ceram, aut adipem odoribus imbutum, flagrantissimis solibus cum styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua ueluti uermiculos exprimunt, uanundantque. Styracem hunc, quoniam in uermiculorum speciem contrahatur, scoléciten cognominant, quem tanquam sincerum imperiti approbant, non animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam: siquidem acer admodum est, qui adulterationis uitio caret. Styrax calfacit, emollit, & concoquit: medetur tussi, destillationibus, raucedini, grauedini, & interceptæ uoci: uulnæ præclusæ, duritiæ laboranti conuenit: cit menses potu, appositūque; aluum leuiter mollit, si exiguum cum resina terebinthina catapotii modo deuoretur. Miscetur utiliter discutientibus malagmatis, acopisque. Adoletur autem, & igni torretur, ut fiat ex eo, ueluti ex thure, fuligo: ad eadem conueniens, ad quæ thuris fuligo. Ex eo etiam in Syria styracinum oleum componitur, quod calefacit uehementer, & emollit: uerum caput dolore afficit, aggrauatque, & soporem adfert.

STYRAX



**STYRAX** passim in Italia *Storax* calamita officinis appellatur, quod cognomen ex Galeno libro primo de antidotis acceptum crediderim. Nam; ipse de simplicibus medicamentis agens, quæ ad theriacæ compositionem faciunt, optimum iudicauit styracem, qui in calanis è Pamphylia ferebatur: unde calamitæ cognomen sibi facile uendicauit. Itaque cum non alius babeatur styrax, qui sit hoc genere præstantior, in usu medentium est, ut dum pharmacopolis imperant fieri medicamenta, quæ styracem excipiunt, calamitæ cognomen adijciant, quo indicent, se primum dotibus intelligere. Nec illud quidem ab re: quandoquidem Galenus eodem loco memoria prodiderit, hoc styracis genus tantum præstare cæteris, quantum uinum salernum illud bonitate excellit, quod à cauponibus uenditur. Quo argumento fretus Manardus Ferrariensis existimauit, ubi in Dioscoridis codice legitur τοιοῦτος ἐστὶν ὁ καταβαλίτης, hoc est, talis est Catabalites, potius legendum esse, talis est calamites. Neque probat lectionem mutandam esse in Gabaliten, quæ admodum fecit Marcellus. Sed profecto hac in re (cuius Manardus fuerit uir summa doctrina præditus) mihi magis Marcelli sententia probanda uidetur. Quippe quæ Plinij testimonio comprobatur lib. XII. cap. XXV. ubi sic inquit Styracem Syria Iudææ proxima supra Phœnicem gignit circa Gabala, & Marathunta, & Cæsium Seleuciæ montem. Atque etiā ei ad stipulatur Oribasij codex manu scriptus, in quo lib. XII. legitur γαβαλίτης, & non καταβαλίτης.

Porro Fuchsius medicus nostræ ætatis clarissimus, in libro, quem de compositione medicamentorum secundo condidit, styracem calamiten liquidum fuisse censet, non alia (quantum equidem uideo) ratione fretus, quàm quod in calamis aduheretur. Verum in hoc Fuchsius (pace eius dixerim) à ueritate desciscit. quandoquidem Dioscoridi styrax lacryma est arboris malo cotoneæ similis: cuius ille præstat cæteris, qui flauus est, resinosus, grumos habet albican-tes, & dum mollitur, melleum liquorem reddit. Ex quibus facile constare arbitror, styracem non fuisse liquidum, sed in grumos concretum. Neque certè mihi rationi consonum uidetur, ex eo quod Galeni tempore styrax in calanis uehebatur, inferre ipsum fuisse liquidum. Nam (ut mea fert opinio) non alia de causa qui styracis lacrymam colligebant, eam statim in calanis includebant, quàm ut suauis eius odor conseruaretur. Id quod etiam cum dictamno faciebant, ij (ut memoriæ prodidit Theophrastus lib. IX. cap. XVI. de historia plantarum) qui ipsum in Creta legebant. siquidem ij dictamni manipulos in ferula, aut arundine intercludebant, ne uis eius expiraret. Præterea cum apud ueteres Græcos nulli (quod legerim) extet liquidi styracis mentio, haudquaquam possum huic Fuchsi sententiæ adherere: quinimo cogor eam prorsus resellere, quod rectius sentire uidear cum Arabibus, & recentioribus, qui per liquidum styracem non aliud intelligunt, quàm staten myrrhæ. Cæterum Plinio loco citato laudatur styrax post supradicta ex Persidia, Sidone, Cypro: è Creta uerò minime. Reddidit Plinius causam, quare est, quod Styrax plerumque poluerulentus existat, dicens, quod in eum circa canis ortum aduolant pennati uermiculi erodentes, ob idque ipsum in scobe sordescere. Adulteratur etiam styrax (ut idem scribit) cedri lacryma, uel gummi, melle, aut amaris amygdalis. quocirca retinendæ sunt notæ, quibus Dioscoridis auctoritatè præstantissimus cognosci potest. Styracis arbor uiuet Venetijs pluribus in locis, præsertimque in uiridario clarissimi medici Maffei à Maffeo. Huius meminit Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum, sic inquitens. Styrax excalfacit, emollit, concoquit: quamobrem tussibus, catarrhis, pituitæ destillationibus, raucedinibusque, quas ῥοιζήσας, & ῥοιζήσας uocant, prodest. Tum menses seu potum, seu admotum prolicit. Combusti eius fuligo, thuris fuligini quodammodo est similis. Στράξ ut Græci, ita etiam Latine Styrax nuncupatur: Arabicè uerò Miha, Meha, Mehaha, seu Astarach: Italicè, Stirace: officinis, Storax calamita: Hispanicè, Estoraque.

† quoniam in uermiculorum speciem contrahatur. Hæc uerba non leguntur in Græcis codicibus. Sed ea (ut arbitror) à Ruellio interprete adiecta sunt ob maiorem rei declarationem. Quæ hanc ob causam, lectore tamen admonito, nobis quoque relinquere placuit.

Styracis consideratio.

Manardi lectio non probata.

Fuchsi opinio reprobat.

Styracis uires ex Gal.

Nomina.

## Bdellium.

## Cap. LXIX.

**BDELLIUM** alij bolchon appellant, alij madelcon: lacryma est † Saracenicæ arboris. Probatur gustu amarum, translucentum, taurini glutinis in morem, intus pingue, liquefcens facile, ligni ac fordis expers, † suffitu odoratum, ungui simile. Est etiamnum bdellij genus sordidum, nigrum, uberioribus glebulis in offas conuolutum, aspalathi odore, ex India aduectum. Defertur etiam à Petra oppido siccum, resinosum, liuescens, sed facultate secundum. Adulteratur gummi, sed ita uitiatum non perinde gustui amaritudinem repræsentat, nec usqueadmodum suffitionibus odoratum. Calfacit, & emollit: duritias, & turgentia guttura, humiditasque hernias discutit cum ieiuna salua dilutum: uul- uæ spiracula laxat appositu, & suffitu: & partus, humiditatesque omnes extrahit: calculos potu com- minuit, urinam mouet, tussientibus, & à serpente percussis utilissimè datur, ualet ad rupta, uulsa, la- terum dolores, & discursantes spiritus. Malagmatis inseritur, quæ contra duritias, & neruorum no- dos prosunt. Contusum resoluitur affuso uino, aut aqua calida.

**PRÆSTANTISSIMUM** Bdellium Dioscoridi translucentum est, taurini glutinis in morem, amarum, tactu liquefcens facile, & quod incensum odorem emittat ungui odorato similem. Quod si modò nostro tempore in Italiam importatur, adeo rarum est, ut (quemadmodum de myrrha diximus) ad ostentationem tantum afferretur, uel ad adulterini, & reprobati dignoscendi normam. Credidere quidam, hoc uulgare Bdellium, cuius passim in officinis est usus, constare partim ex nigro, quod India mittit, partim uerò ex eo Arabici genere, quod siccum, resinosum, li- uensque ex Petra defertur, utrisque à mercatoribus simul mistis. Quod si ita res se haberet, non esset planè molestè fe- rendum, quod saltem mediocrè impertiretur, postquam nobis optimo interdictum est. Verum etsi hoc fieri possit, eum tamen

Bdellii consi- deratio.



Bdellij uulgaris genera.

Bdellij hosti ex Plinio.

Bdellij uires ex Galeno.

Bdellij alteri Serapioni palmæ genus

Cesilionis consideratio.

Nomina.

tamen in eo parum, uel nihil amaroris sentiatur, cumq; cæteris ferè omnibus tum notis, tum qualitatibus sit expers, quas ei Dioscorides tribuit; est potius opinandum factitium id, et adulterinum esse, quàm legitimum. Hinc factum est, ut quidam recentiores simplicium indagatores, cum nobis persuadere uellent, Bdellium in officinis reperiri, licet non ad uetum ex Saraca felicis Arabiæ ciuitate, unde aduehi consueuerat, somniauerint, cõmunem myrrham legitimam esse bdellium, ut eorum sententiam refellentes, in præcedenti commentario scripsimus. Huius, quo passim utimur, plus quidem habentur genera. Siquidem aliquod quandoque uidi uigrum, resinosum, odore foetido laseri quadantenus proximo: aliud traslucidum, utpote taurinum glutinum, sed siccum, amaroris expers, nulloq; odore præditum: quoddam uerò adeò uulgari myrrhæ persimile, ut ab ea uix dignosci posset. Quæ omnia genera tametsi illegitima censeantur; officinis tamen tanquam legitima, et præstantissima in medicamentis passim tenerè usurpantur. Bdellium scriptis tradidit Plinius lib. xii. cap. ix. his uerbis. Vicina est Bactriana, in qua bdellium nominatissimum. Arbor nigra est, magnitudine oleæ, folio roboris, fructu caprisici natura. Gummi alij brochon appellant, alij malaschran, alij maldacon. Nigrum uerò, et in offas conuolutum badrobolon. Esse autem debet traslucidum, simile cere, odoratum, et cum fricatur pingue, gustu amarum citra acorem. In sacris uino persusum odoratius. Nasceitur in Arabia, Indiâq; et Mediâ ac Babylone. Aliqui peraticum uocant ex Media aduectum: facilius hoc, et crustosius, amariuscq;. At Iudicum humidius, et gummosum. Adulteratur amygdala nuce. hec Plinius. Bdellij facultates prodidit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Bdellium quod Scythicum nominant, quod sane et atrius est, et resinosum magis, emollientis admodum, et efficacis uirtutis est. At alterum, nempe Arabicum, quod dilucidius est, magis desiccatur, quàm emolliat. Igitur recens, et humidum est, et contusum faciliè mollescit, ad omnia, ad quæ Scythicum idoneum. At quod antiquius est, et admodum gustu amarum, et acre, et siccum, ab eorum, quæ indurata molliunt, mediocritate excidit. Utuntur autem quiddam illis, et potissimum Arabico, et ad guttibus præterea laterum dolores, et rupturas persanare. hætenus Galenus. Cæterum inuenio Serapionem duobus capitibus Bdellij meminisse: quorum alterum appellauit Iudaicum, quod uimirum est ipsum Dioscoridis bdellium: alterum uerò cuiusdam plantæ palmæ similis fructum esse tradidit. Hoc Neapoli frequentissimum uidimus, ijsq; in officinis accipimus, ubi sacchari arundines è Sicilia petitas uenundantur. Nam cum illic essem cum Bernardo Clesio Cardine li, et Principe Tridentino, qui apud Cæsarem Carolum v. inuictissimum Imperatorem agebat, multarum uidentiarum rerum, quæ ad medicam materiam spectant, fuit mihi facultas. Hoc igitur palmæ genus (ut ab incolis accepi) ex Sicilia cum folijs palmeis, ac radice defertur cubitali, uel paulò ampliori longitudine. Vocantur hæ plantæ Neapoli uulgò CEFAGLIONI. quarum quoddam duntaxat germiculum comedunt, tenerrimum, sapidum, et ori gratissimum. Includitur hoc mille quibusdam inuolueris, tanquam totius plantæ corculum. Hoc quidem tuberibus, et carduis, carduorumq; echinatis capitibus (carcioffi, et archichiochi Itali uulgò uocant) præferunt. quâdoquidem id fecundis mensis pro bellarijs cum pipere, et sale solenniter assumunt, tum quod gustui is cibus admodum arrideat, tum etiam quod uenerem conciliet. Porro illa uulgaris Cefaglioni appellatio (quantum conijcere possumus) à Mauritanis accepta est: siquidem Serapio sic inquit. Cesilio est cor istius palmæ, et natura eius est, sicut natura palmerij. Galenus insuper lib. vii. simplicium medic. de palma differens, eius medullam encephalos appellari tradidit. Ex quo adducor, ut suspicer, inde Arabes Græca uoce corrupta suum Cesilionis nomen accepisse. Quod Βδελλιον Græci, Bdellium similiter Latini uocant: Mauritani, Molochil, Molochal, Mochol, aut Mochel: Itali, Bdellio: Hispani, Bedellio.

† Licet Saracenica arboris lectio admitti possit, quod Saraca, unde Saraceni dicti sunt, urbs sit in Arabia; non tamen improbanda uidetur lectio Arabice arboris. Quod non solum Plinius scribat bdellium in Arabia nasci, et Galenus alterum bdellij genus Arabicum faciat; sed etiam quod Oribasius lib. xi. legat δάκρυον ἐστὶ δένδρον ἀραβικόν. hoc est: lacryma est arboris Arabice.

† Hoc loco in uulgatis Græcis codicibus sic legitur ἐν δένδρῳ ἐν τῇ δυνάμει, τοῖς δὲ ὄνυξι. hoc est, si uerbum uerbo reddamus: odoratum in suffitu, simile ungui. Eadem uerba ex Dioscoride referunt inter Græcos Actius et Oribasius. Cæterum in ijs uerbis illud dubium sententiam facit, quod non faciliè colligi possit, quid per ὄνυξι intelligat Dioscorides. nam cum hæc uox homonyma sit, et plura significet, cui potissimum rei conueniat, auctor non explicauit. ut hinc uel aliquid deesse suspicandum sit, uel hac uoce diuinandum de nota illa bdellij optimi magis sit, quàm aliquid certi statuendū. Auget difficultatem, quod interpretes omnes, uiri doctissimi, uerba illa in diuersum sensum trahant. Alij enim probatū bdellium uolunt bene odoratum esse semper, sed incensum fieri ungui simile, ut Manardus libro suarum epist. octauo: alij dum incenditur, odore malunt ungui assimilari, ut Hermolaus, quorum tamen utrumq; constat de odorato ungue intellexisse. His adstipulari uidetur Serapio inter Arabas, qui bdellij descriptionē Dioscoridi acceptam ferens, uerba illa interpretatur in hunc sensum: cum incenditur, bonū spirat odorem, odori unguis odorati simile. Sunt porro qui bdellium suffitu odoratum faciunt, ungui simile, ut Ruellius. qui certè ea simplici uerborū illorū uersione non minus ambiguum reliquit illius notæ sensum, quàm in Græco reperitur. Marcellus autem diuersam ab antedictis sententiā protulit, nam ita uertit illa uerba: cum incenditur, odoratum, et humano ungui colore simile. Hæc utiq; Marcelli interpretatio plura habet, quàm in Græcis codicib. legatur, ea fortasse ratione ab eo addita, ut nulla reliqua esset ambiguitas: quanquam in hoc à Manardo redarguitur. Mihi quidē hætenus placuit Serapionis interpretationi subscribere, ut patet in principio huius commentationis. Nunc uerò quid mihi sentiendum sit, ferè incertus sum. Videtur enim uerba illa Dioscoridis ita distincta esse, ut duas bdellij optimi notas faciant: quarum altera est, ut odoratum sit, etiam suffitur: altera, ut sit ungui simile: sed relinquatur dubitatio, an unguis odoratus, aut humanus sit intelligendus.



10 dus. Eò tamen inclinât animus, ut putem humanum unguem intelligi, quòd Plinius lib. XII. cap. IX. de bdellio dis-  
 20 screns, Baetiano unguis reddat candidos, cum inquit. Baetiano nidor siccus, multiq; candidi unguis. Ex his nimi-  
 rum uerbis liquet, bdelliũ illud albis maculis ungui humano similibus refertum esse. Id quod etiam uidetur bdellio as-  
 signasse Damocrates in suis carminibus, quibus cypheos compositionem cecinit, & quæ à Galeno referuntur lib. II.  
 de antidotis, dum ita scribit. *Σχίνου ἰσ' . καὶ ὑπὸ ὑμῶν, Βδελλίου Οὐρχας δραχμας γ' . ἑσπλάσθου 6' s.* Hæc  
 duo carmina soluta oratione ad uerbum sic uertemus. Iunci odorati duodecim, & croci unum, Bdellij unguis drach-  
 mas tres, aspalathi duas semis. Sanè quòd Damocrates bdellij unguis in cypheos compositionem addat, me magis mo-  
 uet, ut credam bdellium notam peculiarem habere, qua unguium effigiem repræsentat: aut quòd illud bdelliũ sit præ-  
 stantius, cui sint maculæ humanis unguibus similes. Sed hæc fortasse fustus, quàm deceat, ut quid alij, & quid ego sen-  
 30 tiam in illis Dioscoridis uerbis, exponerem, ita tamen, ut malim eruditiorum quoq; iudiciũ esse.

## Thus.

## Cap. LXX.

THUS in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primatum tenet in eo genere mascu-  
 lum, stagonias appellatum, suapte natura rotundum: tale autem ÷ indiuiduum est, candidum, cum fran-  
 gitur, intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicum uerò fuluescit, & colore liuet, sed rotundum  
 industria facit: nam in quadrangulares formas dissectum fictilibus uersant, donec rotunditatem  
 contrahat: uerum huiusmodi thus tempore flauescit, quod atomum, aut syagrum appellant. Secun-  
 dum locum habet ÷ Arabicum, & in Smilo nascens, quod aliqui copiscum uocant, minus multò, &  
 fuluius. Est & genus aliud, cui amomite cognomen est, alioqui candidum: quod dum molli-  
 20 stiches more digitis cedit. Adulteratur omne thus ÷ in itinere pini resina, & gummi. quod facilè de-  
 prehendi potest: siquidem suffitum gummi flammam non eiacular, & resina in fumum euane-  
 scit, thus uerò statim ardet: idem maleficium odor prodit. Ad calfaciendum, & astringendum pol-  
 let: oculorum caliginem discutit, caua ulcera complet, & ad cicatricem perducit: cruenta uulnera  
 glutinat, infrænatque cunctas sanguinis eruptiones, etiamsi cerebri membranis effluat: ulcera, quæ ca-  
 coethe uocantur, & sedis, & reliquarum partium permulcet tritum cum eo & lacte linamentum: for-  
 micantes uerrucas inter initia, impetiginesque ex aceto, & pice illitum tollit: ambusta igni, pernio-  
 nesque cum suillo adipe, aut anserino, & ulcera in capite manantia cum nitro, si infricetur, sanat: pa-  
 30 ronychijs cum melle, auribus fractis cum pice, medetur: ad reliquos aurium dolores cum dulci ui-  
 no infunditur: inflammata à partu mammæ cum cimolia, & rosaceo magna utilitate perunguntur:  
 additur ad arteriæ, uiscerumque medicamenta: prodest sanguinis excreationi potum. Sed in secun-  
 da ualitudine haustum insaniam mouet, & largius cum uino potum interficit. In fictili mundo thus  
 crematur, flagrante glebula succensum à lucerna, donec exuratur: post perfectam uestionem operire  
 oportet, usquedum restinguatur: sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam æneo uase cauo  
 circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, ut in eius mentione mox ostendemus.  
 Alii crudo fictili luto oblito, & in fornacem indito, cremant. Fictili etiam nouo uiuacibus prunis  
 torretur, dum non amplius bullet, aut pinguitudinem, uaporẽmve emitat: facilè enim comminuitur,  
 quod perustum non est.

## Cortex thuris.

## Cap. LXXI.

40 PRAEFERTVR thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, læuis, minimè scaber, sine mē-  
 branis. Adulteratur admisto pini, aut nucis eius cortice. sed horum index ignis est: siquidem reliqui  
 cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum eructant: thuris uerò cortex ardet, &  
 cum odoris fragrantia uaporem eiacular. Thuris modo uritur: & uis eadem, quæ thuri, sed ualidior,  
 adstringentiorque. Quare potu cruentis excreationibus, uuluis fluxione laborantibus in pecto cōfert:  
 ad cicatrices oculorum, & caua, sordesque efficax est. tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

## Manna thuris.

## Cap. LXXII.

50 MANNA thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem, quam  
 & thus, sed inualidiusculam. Sunt qui cribrata pini resina, ac polline, aut cortice thuris contusi adul-  
 terant. Sed hæc igne deprehenduntur: neque enim æquè suffitu aerium uaporem, sed fuliginosum, &  
 impurum expuit, & permistum sua uolentia halitus uirus habet.

## Fuligo thuris.

## Cap. LXXIII.

60 FULIGINEM thuris sic facito. Forcipicula lucernis accensas singulatim thuris glebas in no-  
 uam fictilem ollam concauam imposito: & æreo uase in medio perforato, deterfa diligenter sorde,  
 obtegito: alteram admoueto, ex altera eius parte, aut utraque subiectis quaternum digitorum altitu-  
 dine lapillis, quòd facilius perspicui queat, si urantur: & quæ locus capax fuerit, glebularum alias sopponi-  
 to, & antequam prorsus prior gleba restinguatur, aliam imposito, donec sufficientem fuliginem ui-  
 70 dearis cogisse. Continuo tamen externæ æramenti partes spongia, aqua frigida madefacta, abster-  
 gantur: ita enim temperato æris feruore, fuligo omnis inhærebit, quæ alioqui per leuitatem decidua  
 thuris



thuris cineribus admiscetur. Derasa itaque fuligine, cinis cremati thuris seorsum substrahendus est. Idem opus, quoad satisfactum tibi videbitur, obeundum. Oculorum inflammationes mitigat, fluxiones suspendit, vlcera purgat, cana explet, carcinomata fistit. Simili modo è myrrha, resina, styrace, reliquisque lacrymis fuligo excipitur, ad eadem conueniens.

Thuris histo-  
ria ex Theo-  
phrast. & Plin.

CVM THVS, Thuris cortex, manna, & fuligo ab una tantum arbore proueniant, non alienum duxi de his omnibus unico commentario differere. Sed primum à thure exordiens, cum Dioscorides in eius scribenda historia, non late se diffundat, ut eos uoti compotes faciam, qui eam audire desiderant, hic refram, quæ ex Theophrasto lib. IX. cap. IIII. quæq; ex Plinio libro XII. cap. XIII. diligenter excerpti. Gignitur itaque thus (ut illi prodiderunt) præter Arabiam nullis, ac ne Arabia quidem uniuersæ, sed priuatim euidam loco in medio fere regionis post Atramitis pago Sabæorum, qui caput regni est. Tractus is spectat ad orientem undiq; rupibus inuius, & à dextra maris scopulis inac-  
cessus. Sylvarum, quæ thus proferunt, longitudo est centum millia passuum, latitudo autem dimidium eius: quas & Minæi attingunt alium pagum colentes, per quos thus euehitur uno tramite angusto, à quibus etiam thus Minæi olim dictum est. Siquidem hi primi fuere thuris repertores, eiusq; commercium primi ficere, maximeq; exercent. Cæteris interdictum est, his exceptis, uidere thuris arbores; ac ne Minæorum quidem omnes (ut perhibent) ipsas arbores uide-  
dere possunt. Ius enim in thus ipsumq; legendi potestas, tricentum tantummodo esse familiarum dicunt, quæ per suc-  
cessionem id sibi uendicant; quæ etiamnum ob id à propinquis populis sacræ uocantur, quod cum uulnerant arborem, quò liquor defluat, aut cum metunt, nec fœminarum, nec funerum congressu polluuntur: atq; ita religione merces au-  
gentur. Quidam promiscuum ius Minæis omnibus esse tradunt, & unoquoq; anno inter ipsos diuidi. Cæterum quæ-  
quam præsci Romani in Arabia bella gessere; thuris tamen arboris facies à nullo (quod equidem legerim) Latinorum tradita est: neq; Græcis etiamnum auctoribus (et si plures de ea conscripserint) de eius effigie satis inter se conuenit,  
licet dixerit Theophrastus, quod arbor thuris, quæ super Sardes apud delubrum quoddam surrexit, fronde lauri con-  
stet. Thus duntaxat meti solebat inciso arboris cortice, canis ortu, flagrantissimis æstibus, quod tunc esset humoribus  
maximè prægnans, quod postea legebatur sequenti autumnio. Verum dulcedo quæstus aliam uiam attulit, qua etiam  
prius uere ipsum legeretur, incisis per hyemem arboribus. Excipitur quod ex arbore profluit, atque distillat pala-  
mea tegete, ubi loci natura poscit, aliubi arca circumpauita. Purius, & perlucidius illo modo, sed hoc ponderosius,  
minus pellucet, minusq; uiribus pollet. Vindemia uerna thus rusum emittit, nec comparandum priori: uires enim im-  
becilliores sibi sortitur. Creditur nouellæ arboris candidius esse, quàm ueteris. Quod hæst in arbore, ferro depe-  
ditur, ideoq; corticosum. Tradidit Dioscorides præter Arabicum inueniri & Indicum, id tamen flauescere, quod in-  
dicat, thus & in alijs regionibus nasci præter illud, quod ex Arabia deuehitur. Quod cum Theophrastus, & Plinius  
satis compertum haberent, quauis prius scripsissent, thus præter Arabiam nullis gigni; dixere tamen postea, quod  
ex relatu acceperant, id etiam nasci in quibusdam insulis. Thus (ut scribit Galenus lib. VII. simpl. medicamentorum)  
excalciscit ordine secundo, desiccatur uero primo, paululumq; adstringit. Sed candido uinum adstrictio manifesta.  
Cortex eius euidenter adstringit: proinde sanè strenuè quoq; desiccatur, adeo ut ex secundo sit ordine completo desic-  
cantium. Est autem crassiorum partium, quàm ipsum Thus, & in minimè particeps acrimoniæ. Ob has igitur tum fa-  
cultates, tum qualitates nullus est eius usus apud medicos in hæmoptoicis, stomachicis, coeliacis, & dysentericis, non  
tantum ijs, quæ extrinsecus applicantur, ipsum admiscentes; sed & ijs, quæ intro in corpus sumuntur. Ramus eius  
(lego fuligo eius, & infra rationem reddam) tum siccioris, tum calidioris est facultatis, quàm ipsum thus, adeo ut ad  
tertium usq; excessum perueniat. Habet uero etiam absterforium quiddam: itaq; eo nomine expurgare, & implere,  
quæ in oculis consistunt ulcera, uidetur, uelut & myrrha, & styracis. hæc Galenus. Verum, ne quisquam fortasse  
se me perperam Galeni lectionem immutasse existimet, illud sciendum est, quod in Galeni loco citato non solum Ger-  
ardi Gaudani uersio reprehendenda (quod tamen interpreti uitio minime dandum est) sed etiam in Græcis tum ip-  
sius Galeni, tum Pauli Aeginetæ codicibus communis lectio deprauata uidetur. quippe ubi in thuris capite legitur  
apud Galenum, ὁ δὲ θαλλὸς αὐτῆς ἔμποτὸς ἐστὶ, καὶ θερμοτέρως ἢ κατὰ αὐτὸν τὸν λιθωντὸν δύναμιος, hoc est, ut  
uertit Gerardus, Ramus eius tum siccioris, tum calidioris est facultatis, quàm ipsum thus, rectius legendum putau-  
uerim, ἢ δὲ αἰθέριον αὐτῆς, hoc est, Fuligo eius &c. Quæ quidem lectio primò Dioscoridis testimonio comprobatur:  
qui præter quàm quod ramorum non meminit, ipsi thuris fuligini, non ramis, tum expurgandi, tum implendi, quæ in  
oculis consistunt ulcera, facultatem inesse testatur. Deinde id manifestè innuisse uidetur Galenus in prædicti capitis  
calce illa comparatione, cum inquit, uelut ex myrrha, & styrace. Nam libro VII. simpl. medic. de styrace a-  
gens: styracis combusti fuligo, inquit, thuris fuligini quodammodo est similis. Et libro VII. de fuligine scribens:  
Primum enim, ait, thuris fuligine utuntur, in ocularias medicinas mistas, eas uidelicet, quæ ad oculos etiamnum phleg-  
mone tentatos accommodantur, atq; etiam fluxione tentantur, & ulcera habent: nam & illa expurgat, & carnes re-  
plet. Ad hæc usurpant quoq; eam ad facultates, quas uocant calliblepharas. Præterea terebinthine, myrrhaeq; fuligo  
molestia caret, non aliter, quàm thuris: sed styracis his quodammodo ualentior est. His igitur rationibus asserere  
non dubitauerim, hoc in loco uulgatos Græcos codices fortasse librariorum incuria uocum similitudine deceptorum  
deprauatos esse: quodq; loco huius uocis αἰθέριον, quæ Latine fuliginem reddit, successerit θαλλὸς, quæ ramum gene-  
menue significat. Quod etiam apertissimè confirmat Serapio: qui cum hunc Galeni locum suo tempore legitimè, &  
incorruptum haberet, quæ hoc Galeni loco nostra ætate de thuris ramo leguntur, ea ipse Galeno accepta referens, de  
thuris fumo, seu fuligine legit. Quod item apud Aetium uidere licet: tametsi Paulus hac menda non uacet, uel si ip-  
sus fortasse, uel potius librariorum culpa. Nam aliàs non possem non admirari, quod in Galeno lectionem hanc de-  
prauatam esse non animaduertisset, quemadmodum hac in re nostræ ætatis interpretes mihi quidem admiratione di-  
gni

Thuris facul-  
tates ex Gal.

Galeni locus  
restitutus.



gni uidentur. Ceterum ibus (ut Galenus scribit lib. IIII. de comp. medicament. per genera) concoquit, & pus mo-  
 net in temperatis corporibus, nam in humidis sarcoticum est. Præterea cum dixerit Dioscorides, ibus in secunda  
 ualitudine haustum, insaniam facere, & largius cum uino sumptum interficere, hinc Auicennam errasse crediderim,  
 qui & deprauatis sensibus, & abolitæ memoriæ ibus opem præstare tradit. Porro credere nonnulli thuris Man-  
 nam apud Græcos esse, quam nostra ætate è cælo collapsam super arborum frondes colligimus, quamq; tanquam om-  
 ni ex parte innocuum medicamentum, & utero gerentibus mulieribus, & pueris, & delicatis deiciendæ alui gratia  
 propinamus. Verum res quidem aliter se habet: namq; Plinius, & alij complures produnt, Mannam thuris esse mi-  
 cas eius concussu elisas, quod dum conuehitur, euenit. Quod etiam testatus est Galenus lib. IIII. de compositione me-  
 dic. secundum locos. Sed quoniam thuris Manna mihi redegit in mentem Mannam hanc purgatoriam cælitus demis-  
 sam, ut plenius legentibus satisfiat, cum huius nusquam ueniret Dioscorides, de ea tradam, quæ ex Arabum monu-  
 mentis deprompsi, quæq; ipse etiam in Calabria uidi, ubi laudatissima colligitur. Est igitur MANNA quidam ros,  
 siue liquor suauis qui ex aëre ueniens sub lucanis temporibus, arborum ramis, & frondibus, herbis, lapidibus, & solo  
 interdum inuenitur herere: qui breui temporis curriculo coalescens, grumofus in gummi morem efficitur. Huius duo  
 tantum genera ipse in Italia uidi, quorum alterum ab orientali plaga, alterum uerò à Calabria desertur. Eius, quod  
 ex oriente petitur, duplex habetur species; præstantissima altera, quam Mastichinam appellant, nomine à granorum  
 mastiches similitudinem sumpto: infirma uerò, & uilis altera, quæ Bōbycina nuncupatur, quippe quæ nil aliud est, quā  
 aut euanida, & senio exhausta Mastichina, aut saccaro, alijsq; imposturis adulterata. Calabriensis plurimi penditur,  
 quæ stirpium frondibus insidens colligitur, proinde foliorum Manna cognominata, minutis granulis constans, translu-  
 cida, grauis, mastiches granulis similis, candida, gustu dulcis atq; suauis. Secundas partes sibi adsciscit, quæ ramis  
 insidet: tertias uerò, quæ lapidibus, & solo inhaeret: nimirum hæ granulis constant crassioribus, & colore longè mi-  
 nus syncero. Ex ea, quæ nocte peracta è cælo ceciderat, Cossentia, quæ est Calabria ciuitas, mihi facta fuit copia su-  
 per fraxineis frondibus, quæ iulapij perfectè cocti guttas prorsus reserebat. Accepi inibi ab incolis, quod hæc mane  
 legitur, priusquam sol exortus admodum exalfaciat: namq; postea sole liquefacta, absortaq; faciliè euanescit. Quæ  
 propter pleriq; ubi in magna deciderit copia, summo mane arborum ramos præscindunt, & in opacis collocant, ubi  
 concretam maiori commodo legunt. Hinc uerò fit, ut nesciuerim ego, qua ratione ductus Fuchsius uir eruditissi-  
 mus scripserit libro de componendis medicamentis, quem nuper auctum edidit, Mannam (ut suis uerbis utar) Cala-  
 brinam grano constare grandiori, floccorum lanæ & bombycis referente effigiem, candidiori, & ob id alio nomine  
 Bombycinam uocari: quin & hanc uiliori pretio uendi. Atqui cum is à nobis planè dissentiat in Mannæ, quæ ex Ca-  
 labria aduehitur, historia, ratus gnarusq; hanc, quam paulò antè reddidi, ueram esse, non plura adijciam: sed relin-  
 quam in hoc fore iudicium eorum (sint uel medici, uel pharmacopoei, uel mercatores) qui Mannæ illius naturam re-  
 ctius norunt, atq; eam satis exploratam habent. Duo Mannæ genera etiānum à Mauritanis diuersis capitibus pro-  
 dita reperio: quorum alterum Mannam, alterum uerò Tereniabin appellant. Tamen non aliam inter ea specierum  
 differentiam esse constat, quā quod alia liquefcens, melli similis, alia in grumos concreta uidetur: quæ profectò  
 illa est, quæ ad uos aduehitur. Quam uerò ij Tereniabin uocant, Serapionis testimonio & ipsam esse Mannam mani-  
 feste ostenditur. Namque Abicis auctoritate, Tereniabin, inquit, febrium ardentium inflammationes mulcet, sitim  
 extinguit, aluum mediocriter emollit, pectori, & tussi open præstat, nec aliud est, quā Mannæ. Testatur Brasau-  
 uolus Ferrariensis, Nicolaum quendam Ferrariæ (ut arbitror) pharmacopolam emisse à quodam Mauritano uas ple-  
 num cuiusdam Mannæ melli similis, quæ in medicamentis non satis laudari potuit. Hanc equidem ex eo genere fuisse  
 existimauerim, quod Mauritanii Tereniabin nominant: etsi Brasauolus ipse contrarium senserit, cum uelit, Terenia-  
 bin Mauritanorum eam esse Mannā, qua communiter utimur: eorundem uerò Mannam esse huiusce liquidæ speciei.  
 Quæ tamen sententia Arabum scriptis prorsus refragatur. quandoquidem ipse inuenerim apud Serapionem, quod  
 Tereniabin quidam ros est è cælo cadens melli grumoso similis, & quod aliter mel roscidum appellatur. Auicenna ue-  
 rò de Manna agens, inquit, eam gummi modo concrescere: à quo Mesuem nihil dissentire comperio. Credidit Auera-  
 roes, & post eum alij quā plurimi, Mannam ueteribus, præsertim Galeno, incognitam fuisse. Quibus illud recla-  
 mat, quod ipse Galenus scriptis tradidit libro III. de alimentorum facultatibus, capite de melle, sic dicens. Memini  
 aliquando cum æstate super arborum, ac fruticum, herbarumq; folia mel quā plurimum fuisset repertum, agrico-  
 las uel ludentes cecinisse, Iupiter melle pluit. Præcesserat autem nox, ut per æstatem, satis frigida (nam tum  
 tempus anni æstiuum erat) pridieq; calida, & sicca fuerat aëris temperies. At qui peritis naturæ interpretibus,  
 halitus è terra, & aquis prodeuntes, solis calore exactè attenuati ac cocti, à frigore secuta noctis in uuum  
 coacti, ac densati fuisse uidebatur: sed apud nos rarò id accidit: in monte autem Libano quotannis persæpe. Itæ-  
 que coria super terram extendentes, & arbores excutientes, quod ab eis desluit, excipiunt, & ollas, ac fictilia  
 melle implent, uocantq; id roscidum mel, & aërium. Hæc Galenus de Manna memoriæ prodidit. Ex quibus eo-  
 rum error deprehenditur, qui putant hanc ei fuisse incognitam. Existimandum igitur est, quod hinc Arabes suum  
 deduxerint Tereniabin; præsertimq; cum scribat Serapio, hoc ab eis mel aërium appellari. Huius etiam meminit  
 Plinius libro undecimo capite duodecimo his uerbis. Venit mel hoc ex aere, & maximè siderum exortu, præci-  
 pueque ipso sirio exsplendente sit, nec omnino prius uergiliarum exortu sub lucanis temporibus. Itaque cum pri-  
 ma anrota, folia arborum melle roscida inueniuntur. At si qui matutino sub dio fuere, unctas liquore uestes, ca-  
 pillumque concretum sentiunt. Siue ille est cæli sudor, siue quædam siderum salua, siue purgantis se aeris suc-  
 cus, utinam esset & purus, ac liquidus, & suæ naturæ, qualis desluit pruno. hætenus Plinius. Sed tam antiqua  
 Manna res est, ut ante Galenum, & Plinium, eius etiam meminerit Theophrastus Hesiodi auctoritate, libro  
 III, capite nono de plantarum historia, his uerbis. Sin autem auctore Hesiodo, mella, apesq; quercus ferat, magis  
 quoque

Auicē. lapsus.

Māna thuris.

Mannæ cæle-  
stis historia,  
& genera.

Fuchsi opinio.

Mannæ Ara-  
bum.Brasauoli la-  
pus.Mannæ histo-  
ria ex Galen.  
Pli. & Theo.



Manna in co-  
mitatu Gori-  
ienfi, & Foro  
Iulij.

Monacoru  
opinio explo-  
sa.

Manna secto  
arborum cor-  
tice manans.

Petri Crini-  
ti error.

Serap. lapsus.

Mannæ tem-  
peramentu  
& uires.

Fuchsi  
opinio reproba-  
ta.

quoq; illud confirmatur. Ergo nascitur uel hic melleus humor è cælo cadens, in hac maximè insidens. Manna u-  
triusq; consistentiæ è cælo demissam uidimus in Comitatu Goritienfi, uniuersq; Foroiulienfi agro, ac circumuicinis  
locis, Anno à CHRISTO nato M. D. XLVI maio, & iunio mensibus: fuitq; mihi ambarum colligendarum an-  
plissima facultas. Siquidem ea, quæ fici, fraxini, & orneoglossi frondibus inhæserat, gummi modo concreuerat, co-  
lore candida. At quæ super amygdale, persicæ, ac quercus folia deciderat, mellis modo liquefces ab arbore deflue-  
bat, flauo colore. Quo factum est, ut facili crediderim, quod non sui ipsius facultate gummi modo Manna concre-  
scat; sed foliorum, in quibus delapsa recumbit. Quare ab Arabibus diligentissimè perspecta, utriusq; Mannæ histo-  
riam diuersis per se capitibus suis monumentis prodidere. Sed profectò non admittenda, quin potius explodenda  
uideatur sententia Monachorum, qui in Mesuem commentarios scripsere, cum pro certo asserant, sirio ardente Man-  
nam non solum roris modo super arborum, & herbarum folia reperiri aeris, & cæli clementia; sed etiam ab arbori-  
bus, fraxino scilicet, & orneoglossi absq; aliquo cæli rore, gummi modo inciso earum cortice in lacrymas concre-  
scere. Quod tamen ut à rei natura, ita etiam à ratione, & à ueritate abhorreere putauerim. Siquidem ea Manna  
quæ inciso harum arborum cortice in Apulia, & Calabriensi agro hac ætate canicularibus diebus collacrymare coe-  
pit, nullus quidem plantæ liquor est, sed ipsa eadem Manna, quæ diebus superioribus easdem in arbores ab aere deci-  
derat. Nam cum illis regionibus usu ueniat, quod præ cæteris prædictæ arbores eo mellifluo rore affatim, abunde  
madescant, sitq; cortex solis ardore nimio sitiens, ac rimosus magnam, liquoris quantitatem intra se absorbet. Quo  
cum leues, fungosiq; sint ob arboris succi missionem, infelicitè operantur, nec alterius Mannæ uiribus correspon-  
dent. Quod autem id tantum fraxino, orneoglossiq; eueniat, cum melleus ille ros in uniuersum omnes occupet plan-  
tas, in causa est harum arborum nobis occulta potestas, ut magnetis ad ferrum, & succini ad paleas. quippe omnibus  
clarum est, apud Calabros, & Apulos solam fraxinum, eiq; congenerem orneoglossum Mannam in se contrahere, re-  
tinere, densare, ac cohibere: ex alijs uero arboribus eandem statim defluere, & in subiectas herbas, petras, solumq;  
diffundi. Quare ab his duntaxat arboribus inciso cortice non sanè primo, & secundum naturam, sed ex accidenti de-  
fluit Manna. Verum optimi illi patres contenti (ni fallor) cortice, internas illarum arborum partes penetrare negli-  
xerunt. At incolæ, qui ex maiori huius liquoris prouentu, plus auri referunt, rei naturam diligentius inuestigauerunt.  
Ceterum ex his, qui thuris Mannam cælestem hanc esse crediderunt, unum Crinitum Florentinum fuisse comperio.  
In cuius censuram Manardus Ferrariensis libro primo suarum epistolarum peculiarem epistolam conscripsit. Verum  
tamen uenia illi danda est, cum & Serapio, qui Mauritanis omnibus in simpliciū medicamentorum historia præstitit  
thuris Mannam cum cælesti ineptè confundat. Meminit Mannæ inter alios Græcos etiam Aëtius libro de medica-  
mentorum compositione, ibiq; de eius uiribus ac facultatibus differuit. Manna tam Auicennæ, quam Mesuis testis  
monio, æquali ferè temperamento consistit, licet ad calidum paululum inclinet: at Auerro calidam, humidamq; habetur  
Aluum deuorata, aut hausta ciet, per se tamen imbecilliter. Ideoq; tum scemini utero gereutibus, tum pueris ipsi-  
bus tutò semper exhiberi potest. Alijs medicamentis addita uires eorum auget. Bilem facili educit: sitim, extinguit, ape-  
rit, emollit, leuigatq; gula, pectorisq; partes. Quæ ex Alexandria Aegypti adfertur Mastichina uocata, uno dun-  
taxat anno in suis uiribus persistit: sed quæ in Italia prouenit, præsertimq; Calabriensi agro, pluribus annis incor-  
rupta perdurat. Enimuero Fuchsius medicus nostra ætate & doctrina, & rerum cognitione clarus, in libro de  
compositione medicamentorum, quem secundò auctum excudit, Mannam à medicorum usu explodere conatur his  
uerbis. Manna leuem certè, ut ferè nullam soluendi, aluumq; subducendi uim habet. Quod ijs compertum est, qui  
iuxta Libanum fuerunt. Nam referunt, indigenas eius montis, cum abunde ea satientur, nihil tamen lædi, aut de-  
uium sibi quoquo pacto subduci sentire, sed ea tanquam obsonio nutrir. Quapropter cum melli quodammodo simili  
facultatem habere constet, facili ea carere liceret, modò peregrinorum admiratione non ita duceremur: neq; stulti-  
ti, contemptis nostratibus, è longinquis regionibus allatis uti potius, quam ijs, quæ nostris in hortis proueniunt,  
malleus. sed stultitiæ nostræ, temere sumptus immodicos facientes, cōdignas damus penas. hæc Fuchsius. Quibus  
nimium uerbis liquet cum uelle usum Mannæ prorsus adimi, atque ipsum ad medicamenta deferri, quæ nostris in re-  
gionibus proueniunt. utinam æquè commodè & tutò fieri posset ista commutatio, ut saltem, quod ipse uehementer  
cupit, immodicis sumptibus parceremus. Sed quoniam rationes, quas affert, non sunt eæ, quibus id persuaderi possi-  
mus, idcirco cogor in hoc eius sententiæ refragari. Nam quod Manna aluum subducit, & eam quidem innocuè, non  
solum conuenit inter auctores, qui hætenus de illa scripserunt, sed id etiam quotidiana experientia docet. Siquidem  
duarum & semis unciarum pondere data aluum perbellè deijcit, & priuatim bilem educit. Quod autem Libani mō-  
tis indigenæ Manna non ut medicamento quod purget, sed ut obsonio, quod nutriet, utantur, quis tam facili ut Fuch-  
sius, referentibus credet? cum nos quotidie contrarium experiamur: aut si credat, non aliquam facti illius ratio-  
nem adinueniet, quæ, ut decet, experimentum tueatur. certè nullus, si rectè iudico. Ut autem medicamenta peres-  
grina nolescant, quæ mitissimam soluendi uim habent, inter quæ iandudum Manna principem ferè locum obtinet,  
utemur nostratibus, & fortasse lathyri, pityusæ, lithymalis, bryonia, & alijs huiusmodi, quæ passim nascuntur in hor-  
tis & campestribus, atque uim lethiferam ac perniciosam sortita sunt absit, meo quidem iudicio. Malim ergo in hoc  
sequi exemplum Dioscoridis, Galeni, & aliorum tum Græcorum, tum Arabum probatissimorum auctori, quam  
alterius quicūq; sit. illi enim non contenti simplicibus medicamentis, quæ suis in locis nascebantur, peregrinis etiam  
uti uoluerunt. quos tamen tantum abest, ut stultos dicamus, ut etiam sapientes iudicemus. Quare non potui satis mi-  
rari Fuchsum ita malè de Manna sensisse, quam omnibus, eo excepto, perspicuum est sine molestia uentrem purga-  
re. Equidem optarem, ut ijs, qui alicui medicamento usum abrogare student, uel id æquius & modestius agerent, aut  
è nostratibus ea proferrent, quæ eandem uim prestare possent. neq; enim ego is sum, qui peregrina nostratibus præ-  
ferre



ferre uelim, modò hæc cum illis uiribus certare ualeant. *Λιβανος καὶ λιβανωτὸς* id Græcis dicitur, quod Latine Nomina. *Thus*: Arabibus, *Ronder*, *Conder*, aut *Kateth*: Italis, *Incenso*: Germanis, *Vueirauch*: Hispanis, *Encienso*, Gallicis, *Encens*.

† *ἄτομος*. Hæc dicto hic, & paulò post legitur in uulgaribus Græcis codicibus: qua in primo loco *thus* natura rotundum insignitur, in secundo uerò arte factum cognominatur. Sed quia absurdum uidebatur Marcello, Dioscoridem usum fuisse homonymia, ideo mutauit lectionem, alterum scilicet *ἄτομον* in *ἐντομον*, ad rem nomen accommodans. Quam tamē lectionis mutationem minime probat Manardus: qui præterea dubitat quo modo *atomos* Latinis sit reddendus. Hæc difficultates mihi quidem uidentur ab Oribasio sublata lib. XII. ubi primò non *ἄτομος*, sed *ἄτακτος* legitur, quæ uox sine controuersia illa sum, atq; nou scissum *thus* facit: secundo uerò nihil legitur, quod argumento est, atomum secundum accreuisse Dioscoridi. Legitur autem *σύνζυγος*, quæ uox ut est illius factiij *thuris* cognomen, Oribasio teste, legitimum, ita non mutanda uidetur.

† Hic uulgaris lectio habet, *ὁ ἀραβίας*, καὶ ὁ ἐν σμίλῳ, ὃν ἔνιοι κοπίσκον καλοῦσι, id est: Arabias, & in Smilo nascentis, quod aliqui copiscum uocant. Marcellus non *ἀραβίας*, sed *ὁρόβιας* legit. Cui lectioni adstipulatur Oribasius libro XII. ubi *ὁ ὁρόβιος* tantum, reliqua uerò ut addititia non leguntur.

† Exemplaria Græca uulgata hoc in loco legunt *μεθοδεύόμενος*: quæ uox, in itinere, à Ruellio, & artificiosè conformatum, uertitur à Marcello. Sed equidem eam aduentitiam putauim, quòd non legatur ab Oribasio.

## PINVS.

## PICEA.



Pinus, &amp; Picea.

Cap. LXXIIII.

PINVS, ET PICEA generi eidem ascribuntur, sed quandam flagitant specierum distinctionem. arbores vulgò cognitæ. Quarum cortex altringit: prodest tritus, & illitus intertrigini, vlcerebus sumum corpus occupantibus, ambustisque cum spuma argenti, & manna: vlcera delicatulum acrimoniam recusantium cerato myrtino exceptus ad cicatricem perducit: tritus cum sutorio atramento serpentina cohibet: suffitu partus, & secundas eijcit: potus aluum sistit, vrinam mouet. Folia eorum trita, & illita inflammationes leniunt, vulnera ab inflammatione uindictant: trita autem, & decocta in aceto feruenti collutione dentium dolores mulcent: hepaticis utilia sunt drachmæ pondere in aqua, aut mulsæ pota. Piceæ nucis cortex, & folia potu idem præstant. Teda earum particularim secta, si in aceto coquatur, & decocto dens colluatur, dolores leuat. Ex his etiam fit spatha acoporum, pessorumque compositionibus idonea. Quinetiam earum crematarum fuligo ad librarij atramenti confectiorem excipitur: ea circumlitionibus efficacissimè imponitur, quibus palpebras ornant, coloremque mentiuntur, calliblephara Græci vocant: arrosis oculorum angulis, callosis, glabrisque



genis, & collacrymationibus opitulatur. Pityides appellantur pinorum, piceæque fructus, qui in conis inueniuntur. Vim astringentiam habent, & aliquantulum exsiccantem: tussi, & pectoris vitij auxiliantur, per se, aut ex melle sumpti. Noces pineæ cum repurgatæ manduntur, aut cum passo, aut cucumeris semine bibuntur, urinam cient: acrimonia in renibus, & vesica hebetant: stomachi rofiones leniunt. datæ cum portulacæ succo: uirium infirmitatem roborant, corruptorum quoque humorum labem obtundunt. Pineæ noces integræ recenter arboribus decerpæ in passo franguntur, & decoctæ, uetustæ tussi, ac tabitudini conferunt, si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur.

Pini historia,  
eiusque gene-  
ra.

Petri Bello-  
nij opinio ex  
plofa.

NOSTRÆ nimirum negligentia adscribendum foret, cum nos assidue habeant pinorum, abietum, picearum, & laricum syluæ, nisi harum omnium amplissimam, ueramque historiam traderemus: eoque magis ad hoc teneri uideor, cum animaduertim Plinium, recentiorumque nonnullos cum secutos, in huiusmodi plantarum historia, quæ resins fundunt, longè ab eo dissentire, quod in Tridentinis montibus nostris oculis perspectum, apud alios etiam testatum reliquere possumus. Rem itaque à Pinu exordiens, inuenio Theophrastum libro III. cap. x. de plantarum historia, duas Pini species adnotasse; domesticam alteram, alteram uero syluestrem: huiusque in maritimam, & montanam distinctionem fecisse, hisce uerbis. Pinorum aliam urbanam, aliam syluestrem assignant. Sylvestris binum statuit genus, quorum alterum Idæam, alterum maritimam uocant. Harum rectior, celsior, materieque crassior Idæa: folio imbecilliori, tenuiori; maritima: & cortice leuiori, utili; ad coria. quod alteri minus. Nux maritimæ rotunda, breuique; dehiscens: Idææ oblongior, uiridis, minusque; hiscens, tanquam syluestrior. haftenus Theophrastus. Verum non desunt, qui contendant Theophrastum hæc de picea scripsisse, non autem de pinu: ea nimirum ratione freti, quod πένυλ, de qua hic differit Theophrastus, Græcis piceam, non pinum significet. Quamobrem Petrus Bellonius Cenomanius communè Græcorum sententiā secutus libro, quæ arboribus coniferis dicant, id totum picea arbori reddidit contra Theodori interpretationē, quod Theophr. περὶ πένυλ Græcè scriptum reliquit. Sed equidem hæc in re Bellonium (pace uiri boni dixerim) hallucinatū arbitror, non quod propterea cum Græci sermonis imperitum indicem, sed quod mihi uideatur non diu uersatus in Theophrasti & Galeni lectione, aut de plantis ijs scripsisse, quarum non certam habuit cognitionem. nam plura sunt, quæ eius opinioni refragantur. In primis mihi quidem non dubium est, quin ueteres Græci πένυλ pro pinu, & πίτυς pro picea usurpauerint. Neque, certè uerisimile est, Theodorum Theophrasti interpretem natione Græcum, & linguæ tum Græcæ, tum Latine peritissimum, ignorasse quid per illa tam usitata & trita uocabula intelligerent Græci scriptores. Deinde Theophrastus ipse τὰς πένυλ, nucem ἐπίβιον uocat. ex quo palam fit, eū nomine πένυλ de pinu, non autem de picea scripsisse. Quandoquidē ἐπίβιον

PINVS SYLVESTRIS. I.



PINVS MARITIMA.






PINVS MARITIMA ALTERA.

PINVS SYLV. MVGO.



PINVS SYLV. CEMBRO.



non aliud designat, quàm nucem pineam, ut aperte declarat Galenus lib. II. de alimentorum facultatibus his uerbis. Nux pinea boni ac crassi est succi, multumq; nutrit, non tamen facile coquitur. Appellant autem nunc Græci ipsam non *κόνιν*, sed *σπίλον*. Idem libro de cibis boni et mali succi, ita scribit. His ipsis plus crassi, non autem mali, succi habet nucleus pineus, qui *κόνος* uocatur. ipsum uerò etiam *σπίλον* ueteres appellant. Item lib. VII. de simplicium medicam. facultatibus, sic inquit. Coni fructus, quem quidem et coccalon nominant, et strobilon etc. Ad hæc commentario quarto de uictus ratione in morbis acutis apud eundem hæc scripta leguntur. Nempe *κόκκαλος* ab Hippocrate dictus, non ita, sed *κόνος* magis ab antiquis Græcis appellatur, ueluti à recentiori bus medicis propemodum omnibus *σπίλον*. Galeno deniq; ad stipulatur Symeon Sethi, utpote qui nucleos pineos *κωνάκια τῶν σπιδόν* etiam nominet. Ex quibus utiq; constare puto contra Bellonij opinionem, Theophrastum sub *πέπλος* uocabulo pinum descripsisse, non piceam. Nam si Theophrasto peuce strobilum profert, quem Galenus inter cibus connumerat, non uideo, quo modo is piceæ fructus esse possit, cuius nucleï nō sunt edendo, Bellonij etiam testimonio. Quod in super hoc loco per *πέπλος* pinum intelligat Theophrastus, illud maximo esse potest argumento, quod nusquam picea uisa sit urbana, nisi forte è syluestrium semine ad spectaculum in hortis sata. Cuius tamen contrarium deprehenditur in pinu, quæ domestica atq; urbana frequentissima conspicitur. Hinc porro factum est, ut Bellonius sua ductus opinione, ex hoc in alium quoque errorem, inciderit. Quippe illud falsum est, quod ex teda picea fiat pix, ut Bellonius asserit, perperam, meo iudicio, Theophr. hoc loco interpretatus. Si quidem rara admodum est picea, quæ tedam habeat:



Pinorum syl-  
uestrium spe-  
cies.

atq; pix omnis, cuius est usus, ex pinea tantum teda conficitur in Italia, quemadmodum & in Bohemia, ubi ingentissima ac frequentissima sunt pinorum sylve. Ceterum his, quæ de sylvestrium pinorum generibus scribit Theophrastus, in nostro climate refragatur, quæ sensibus clarissime patet experientia. siquidem agrestes, quæ plurima in maritimis nostris Senensibus proveniunt, fructum ferunt spithama oblongum, pyramidalem, firmum, ac solidum, nec per se facile debiscentem. Quæ uero numerosæ uirescunt in Ananijis, reliquisq; Tridentinis montibus fructu consistunt paruo, breui, qui quam primum aruerit, affatim dehiscit, & ex arbore decidit. Sed id evenire existimamus, climatum, & regionum uarietate, uel etiam quod maritimæ plura sint genera. quandoquidem in maritimis Pisarum oris sylvestres proveniunt pini, qui breues nuces edunt, cupressi modo, non tamen rotundas, sed acuminatas, ut pictura, quam hic exhibemus, ostendit. Quinetiam in eodem Tridentino agro iisdem Ananijis, & uallis Flemarum montibus aliæ duæ sylvestrium uisuntur species à prædictis longè figura dissidentes: quarum unam uulgo Mughi incolæ uocant. quæ sine stipite medio, ramos circumquaq; à radice fundentes, humi repunt spatio cubitorum decem, quindecimq;: quales etiam apud Ananios Rouena monte, & in alijs plerisq; harum uallium locis aperte conspici possunt. Proferunt hæc fructus paulo minores cæteris sylvestribus, sed qui magis resinam fundant. Harum ramis utuntur incolæ ad uasa uenaria cingenda: sunt enim tenaces admodum, & flexiles. Alterius uero speciei sunt, quas Cembri, & Cirmoli uulgo uocant, quarum numerosissimas plantas ipse sæpe ac sæpius uidi, tum in Gavia Phœbeæ uallis, tum in Flemenfibus, Vulturenæ, & Rheinorum montibus. Hæ quidem speciosa proveniunt præcitate, ita ut ad tabulas parandas materiam non modò pulcherrimam præbeant, sed etiam suauiter odoratam: attamen non tanta assurgunt altitudine, quanta cæteræ sylvestres. Ramos è caudice promunt, ceu & piceæ, qui pini frondibus uirent. Caudicis cortex non ut pinus subrubet, sed abietis modo subalbet. Fructus tam longitudine, quam crassitudine piceo æque similis est, breuior tamen, resinofus, colore in nigrum purpurascete: inter cuius nucamenta uices recluduntur domesticis similes, minores tamen, triangulares, breues, fractu faciles, ut quæ dentibus facile cedant: sapore quadantenus domesticas reserunt, nisi quod gustui quandam penè insensibilem relinquunt asperitatem: quod omnium sylvestrium proprium est. Ex quo facile adducor, ut credam hoc nucum pinearum genus illud esse, quod Plinius libro xv. cap. x. Tarentinum uocat, digitis fragili putamine, auiumq; expositum furto in arbore. Etenim illæ ita fragiles sunt, ut non difficile ter ab aubus rostro frangantur. Ab iisdem pinis resina tum albâ, tum odorata, ueluti ab alijs sui generis manat. Tabulæ ex his paratæ ad extruenda ædificia Germanis plurimè sunt, non modò quod pulchra uenarum serie placeant, sed quod etiam odoris fragrantia præstent: id enim ad eorum hypocausta paranda, quibus maxime ob frigidissimam regionis temperiem & indigent, & utuntur, plurimum affert ornamentum.

Bellonij alia  
opinio explora-  
ta.

Bellonius, cuius paulò antè meminimus, libro de arboribus resiniferis hoc pini genus ( quantum ex eius uerbis colligere potui ) pinastrium esse censet. Sed non rectè, mea quidem sententia. namque pinaster, Plinio lib. xvi. cap. x. auctore, nihil aliud est, quàm pinus sylvestris, mira altitudine, gigiturq; non modò in montibus, sed etiam in planis. Bellonio uerò contrà, pinaster pino humilior est: & plana, & montium supercilia prorsus respuat, nec alibi provenit, præterquàm in excelsissimis montium iugis. Huic profecto ut quis adstipularetur, fortasse ex eo adduci possit, quod peregrinationi, quam ille in Asiam, Græciam, Syriam, Aegyptum, aliasq; regiones se fecisse fatetur, plura tribuere uellet, quàm probatissimorum authorum scriptis, quibus sæpe Bellonius perperam refragatur, ita ut suam putet auctoritatem illis præferendam esse. Sed ego miror, quod mihi relatum sit uirum hunc esse uulgaris peritiæ, neq; tot loca peragrassè, quot eius scripta perhibent. Quod autem ad rem nostram attinet, Bellonius ubi pinastri historiam exorditur, hæc pinastri uocem ex uersione Latina frequenter legisse ait apud Theophrastum, sed non propterea Theophrastum eam agnouisse plantam, quod non nascatur in Græciâ, aut Asiæ montibus: atque ideo nullam esse ex Græcis authoribus, qui de pinastro, aut pinu sylvestri meminerit. Sed quanta sit huius boni uiri arrogantia, & in Græcorum authorum lectione negligentia, antea explicauimus, ubi ex Theophrasto scripsimus duo esse pini genera, unum urbanum, alterum sylvestre. Veruntamen si is mordicus suam tenuerit opinionem, quod scilicet Theophrasto πῶλον piceam significet, non pinum, & quod ex consequenti idem hic de picea sylvestri sit locutus, demus illi ita esse, quid respondebit ad illa Theophrasti loca, in quibus αἰτὺς ὄψια. legitur: mehercule nihil, quantum reor. Subijciamus ergo quæ Theophrastus lib. iii. cap. iiii. de plantarum historia in censu arborum quæ in montibus nascuntur, contra Bellonij sententiam posteritatis memoriæ prodidit, ijs uerbis. ἰδία δὲ τὰ τοιαῦτα τῶν ὄψων, ἃ ἐν τοῖς πεδίοις οὐ φέται. περὶ τῆς Μακεδονίας, ἐλατν, πῶλον, αἰτὺς ὄψια. hoc est. Montibus autem propria sunt illa, quæ in planis non proveniunt. Macedoniæ, abies, picea, pinaster. Addamus præterea quæ eodem capite, ubi plantarum meminit, quæ perpetuò uirent, idem sic habet. αἰετὺς μὲν οὖν τῶν ὄψων, ἃ καὶ ἀπὸ τοῦ ἔλατν, πῶλον, αἰτὺς ὄψια. id est. Ergo inter sylvestria perpetuò uirent, quæ primo uolumine retulimus, abies, picea, pinaster. Ex his itaque manifestum fieri arbitror, Bellonium multa in Theophrasto oscitanter legisse, plura etiam temere & falsò scriptis tradidisse: ut hinc ipsum inanis gloriæ, uel alicuius dignitatis cupidum potius, quàm ueritatis studiosum fuisse facile iudicem. Ceterum non potui non admirari dixisse Plinium, sedulus è pino ad contegendas domos, ex omnibus, quæ resinam fundunt, arboribus aptissimas esse, cum latiuscem non ignoraret materiei præstantia, duritie, & firmitate, nulli equiparandam esse. Præterea scribit Theophrastus ( nos id quotidie uidemus ) quod pini interitus est, ut teda fiat. Cuius uerba sunt hæc loco supra citato. Morbum pinis accidere talem Idæi incolæ narrant, cum non solum cor, sed etiam pars externa caudicis in tedam transuerit, tunc strangulari quodammodo, quod sponte accidit ubertate arboris largissima, quæ ad quæ coniectare possit: teda enim totum efficitur. Ergo hæc pini propria affectio est. Quare autem pinus teda fiat, scribit idem Theophrastus libro vi. cap. xv. de causis plantarum, sic inquit. Pinus enim radicem agit teda totam refertam, ut antè dictum est. Ratio eadem, quæ in animalibus est, quod pars alimenti, quæ ferbuerit, excoditq;

Plinij lapsus.

Teda confideratio.



fit, quoniam purgatissima est, asidet: & collecta, densataq; pinguedinem reddit. Reliquum uero sursum transmissum, partes, quæ supra terram eminent, nutrit: non per illam pinguedinem subiens, sed per alios quosdam meatus. Nam quæ in teda omni ex parte mutatae sint, obefitate moriuntur, ut dictum est: cum enim nullum transitum habeant, spiritus strangulantur, sicut animalibus accidit, quæ ultra modum pinguerint. hæc ille. Cæterum quod teda opus sit ad picem conficiendam, non defuit sanè ratio, quæ etiam arte fieri possit, ita ut pinus non sua utiq; sponte, sed artificio teda fiat. Id enim idè docuit Theophrastus libro 1x. cap. 11. de historia plantarum, his uerbis. Idæi ubi arboris candidæ cortice dissipariunt, quod parte solari, binis, aut ternis à terra cubitis facere consueuerunt, confluxum istuc fieri non sine teda uno cum plurimum anno affirmant. Idq; cum securi detraxerint, secundo iterum anno teda locum expleti: & tertio pari modo. Posthac ob eam paulatim incisuram arborem extenuatam, putrefactamq; humi facile à statu prosterni, tum eius cor extrahit (hoc enim teda maxime præfert) necnon & radicem effodi. hæc etiam ille: Quibus palam est contabescere pino, tunc sponte, quam arte fieri oririq; teda. Quamobrem putauerim hæc in re non parum cæcutisse Plinium: quippe qui lib. xvi. cap. x. ubi resiniferas enumerat arbores, teda propriam, & per se esse arborem censet, cum inquit. Sextum genus est teda proprie dicta, abundantior succo, quam reliqua: parciore, licet quidiorq; quam picea: flammis, ac lumini sacrorum etiam grata. Et lib. eodem cap. xviii. Nunc, ait, celeberrimis arborum dictis quædã in uniuersum de cunctis indicanda sunt. Montes amant cedrus, larix, teda, & cætera, quæ quibus resina gignitur. hæc Plinius. Verum si quis Plinij defensor diceret, per teda ipsum hoc in loco nõ aliud intelligere, quam pinum, itaq; cum tueri uellet, hanc tutelam illud (ut puto) uanam esse ostendit, quod cum eo capite Plinius resiniferas arbores omnes per genera describat, & primũ omnium genus pinum faciat, nullo pacto pinũ pro teda accepisse uidetur, cum sexto resinarum generi teda postea adscripserit. Hinc fortasse & Marcelli error defluxit, qui in hoc Dioscoridis capite, pinum teda interpretatur. In hoc etiam uersatur errore Adamus Lonicerus Ruellium secutus in suo de plantarum historia uolumine, ubi fictam potius, quam ueram arborem pro teda pinxisse uidetur. Sed aduertendum est, non è pinũ tantum fieri teda, sed ex alijs etiam plantis resinam fundentibus, nempe larice, & picea: à quibus nos in Ananienfibus syluis pinguisimam excisimus. Quapropter dicebat Theophrastus lib. 1111. cap. vi. de historia plantarum, quod in Ponto ex syluestribus desint pinaster, abies, atq; picea, & omnino quæ teda in se gerunt. Quibus clarè patet, alias præter pinum arbores esse, quæ in teda contabescunt. Sed quod id morbi magis se gerunt. Quibus clarè patet, propria pini affectio esse creditur. Quo fit, ut & in hoc Plinium errasse crediderim, pino cueniat, quam cæteris, propria pini affectio esse creditur. Quo fit, ut & in hoc Plinium errasse crediderim, qui non pini, sed laricis morbum esse ait, ut teda fiat: ac eidem omnes attribuit tum uires, tum notas, tum qualitates, quas Theophrastus pino reddidit. Quare cum Ruellius eum sibi familiarissimum ab huiusmodi lapsu uindicare uellet, non mirum, inquit, quod in hoc Plinius æquiuocatione sit usus, quando & perpetua fronde perinde ac pinus, sit larix, & situs idem in montibus, eademq; facies, minime animaduertens, quam magno ipse quoq; fuerit errore implicatus: quemadmodum & recentiorum alij. Quandoquidem pro certo attestari possum, laricem me uidisse nunquam (et si centenas laricum syluas uiderim) cui per hyemem folia non deciderent, & quæ tantam contraheret cum pino cognationem, quantam Ruellius tradidit. Itaq; ut uera eius quoq; promulgetur historia, hic ea de larice differemus, quæ & uidimus, & experientia comprobauimus. LARIX igitur arbor est eximie proceritatis, cortice perquam crasso (non autem leuiori, quæ in picea, ut Adamus Lonicerus scribit) in rimas undique debili, intusq; rubente: ramos gradatim circa stipitem totum emittens, adnatis compluribus salicis more lentis, colore luteo, odore non iniucundo: folijs circum ramulos prodeuntibus, densis, oblongis, mollibus, comosis, pineis angustioribus, minime aculeatis, quæ aduentante hyeme dædida effecta ad caudicis radices decidunt, ibiq; marcescunt: ita ut sola larix inter cæteras resinam fundentes arbores, sprete omni algoris immanitate, nuda per hyemem uitam transigat. Nouella cupressum prorsum emulatur, non autem piceam, ut Ruellio placet. Eius coni (quanquam credidit Plinius laricem sterilem esse) cupressinis admodum similes sunt, neq; ingratum efflant odorem. Veruntamen flores longè odoratiore sunt, qui uere emergentes è ramusculorum cacuminibus arborem uniuersam mirum in modum condecorant. quippe cum in purpura ardentè rubescant, comantibusq; foliolis, miro quodam nature artificio annectantur, non parum uiatorum oculos remouantur. Liqui materies durissima, præsertimq; rubescens, & in caudicis medullis sita: eaq; propter in ædificijs omnibus extruendis, cæteras longè præcellit. Vanum profecto est credere (ut Plinius, Vitruuius, & recentiorum pleriq; perhibent) quod nec flagret. Larix, uel in carbonem uertatur, sed ueluti calcarium saxum in fornace exuratur. Quandoquidem haud rectè cum fornacibus ageretur, in quibus fit ferrum in Tridentinis montibus, & in ea præsertim ualle

Plinij error,  
& quorundã

Plinij & Ruellij error.

Laricis historia.

Plinij, & Vitruuij error.

## LARIX.





Agaricu • la  
rici nascens.

Refina lari-  
gna.

Pannū in la-  
rice nascens.

Piceæ, & A-  
bietis histor.

Abietis lacry-  
ma.



Ananijs contermina, quam Solis uincunt, ac alijs multis Canonica, & Eliotropiæ uallis fornacibus, in Brixiensi agro, si larigno carbone carerent, cuius inibi maxima conflatur copia. Namque (ut referunt in hac arte periti) nullo alio carbone in fornacem indito, rude ferri metallum tam celeriter colliquescit, quam lariceo. quin & lignum eius siccum, cum abunde sit rasiuosum, impetu flagrat perquam uehementi. Quamobrem in Tridentinis montibus laricis nistantum lignis furnos incendunt, tam eos, quibus panis coquitur, quam quibus hypocausta calefiunt. Ceterum selectissimum Agaricum in larice prouenit. namque ipse quidem sæpius in Ananiensibus montibus præstantissimum agaricum parua quadam securi à laricibus compluribus deieci, emig; sæpius ab his, qui resinas colligunt. Nascitur etiam agaricum (ut prodit Plinius) in Gallia, non in larice duntaxat, sed in alijs arboribus, præsertim glandiferis. Dioscorides, sicuti & Galenus, non satis compertum habet, an Agaricum fungus sit, aut radix, licet asserat in cedro gigni. Brasauolus agaricum Comachij in ilicibus inuenisse fatetur, necnon per Galliam equitans, id uidisse ait quercui caudicibus inherere. Enimvero ipse in tota Hetruria, in alijsq; quam plurimis Italiæ locis, deuiq; in multis Germaniæ, Carniolæ, Dalmatiæq; prouincijs, ubi syluæ quercubus, cerris, ilicibus, suberibusq; refertæ conspiciuntur, non solum nunquam uidi, sed ne quidem audiui in his agaricum prouenire: tamen si illis inherere uiderim fungos alios plurimos lignea materie concretos, duos, ac nigros: quibus ubiq; passim somites fiunt ad suscipiendum ignem, cum è siliçe calybe excutitur: quinetiam ijs ignitis ad machinulis exonerandas uenatores frequentissimè utuntur. Ad hæc quamuis in Tridentinis montibus, præsertimq; Ananiensibus præter abietes, pinos, larices, & piceas, innumerabiles adsint quercus; in nulla tamè agaricum, præterquam in larice, nascitur. Porro ex larice etiamnum præstantissima illa resina manat, quæ falsò officinis terebinthina uocatur, cum terebinthina ex terebintho proueniat. Verum cum mercatores præterito iam æuo terebinthinam ad nos minime afferrent, ob idq; larigna eius loco uterentur tum medici, tum myropole, facillè factum est, ut larigna ex usu sibi terebinthinæ nomen uendicauerit. Et quòd larigna terebinthinæ nomen & locum antea passim occupauerit, ut etiam hodie in officinis eiusdem, si desit, uicem suppleat, omnibus notissimum arbitror. Attamen Euchsus uir aliqui doctissimus, in libro, quem secundò edidit de compositione medicamentorum, scribit pharmacopœos legitime terebinthinæ uice abietinam supponere. Quæ in re apertè fallitur, quòd omnes (ut dixi) pro terebinthina larignam usurpent. Atqui Galeui tempore liquida picea terebinthinæ loco uendebatur, ut ipse libro tertio de comp. medic. per genera memoriæ prodidit, sic inquit. Ex harum genere est & larigna uocata, prædictis planè humidior: substantia uerò similis liquidæ piceæ, quam loco terebinthinæ institores uendunt ignorantibus eas discernere. est autem talis resina odore gustu, & facultate, quam terebinthina acrior. Cum hæc igitur, & terebinthina, larigna uocata persimilem potentiam obtinet, sed tenuiori substantia, maioreq; discentiendi uirtute prædita est. Hanc Tridentini, ac etiam qui ijs contermini sunt, uernaculo sermone Largà appellant, deflexa à larice, à qua emanat, appellatione. Hæc tamen sponte sua non defluit: sed qui ipsam colligunt, magno, & longo tem-

### ABIES.

bre laricis caudicem ad medullam usque per æstatem perforant, & inde manantē resinam uasculis quibusdam è piceo cortice paratis excipiunt. Splendidiorē mittunt iuuenile arbores, sicuti de thure diximus: turbidiore uerò annosa. Reperitur præterea in annosis laricum caudicibus prope medullam ipsam pannum quoddam albicans quādoq; cubiti amplitudine, corio, ex quo chirotheca conficiuntur, adeò persimile, ut uix alterum ab altero discerni possit. Utuntur hoc incolæ ad uulnera glutinanda, & ad sanguinis fluores compescēdos. Ceterum admodum inter se similes ex ijs, quæ resinam fundunt, arbores sunt PICEA, & ABIES, ita ut sepe etiam lignarios fabros fallant. Siquidē eadem utriq; proceritas: ambe iisdem sunt folijs oblongis, duris, ac densis: utriusq; ramusculi produntur crucis in morem, à duorum duntaxat ramorum lateribus exeuntes: quod & folijs euenit. Verum tamen hoc tantum discriminis inter se habent, quòd piceæ folia colore sint abiegnis longè nigriora, quin & paululū latiora, molliora, leuiora, minusq; pungentia. Præterea piceæ cortex nigrescit, teuax est, lentus, & lori modo flexilis: abieti uerò albicat, et si flectatur, facillè perfringitur. Piceæ rami plerumq; ad terram stant: quod in abiegnis non uisitur. Ligni deniq; materies piceæ multò speciosior, ac etiam utilior: habet enim uenas rectiores, minusq; nodosas. In picearum genere sola scemina fructus adfert, sed in Ananiensibus, cæterisq; Tridentinis montibus abies omnis infructifera est, etsi Plinius abietem fructiferam fecerit. Picea fert resinam inter corticem, & lignum gummi modo concretam, licet nonnunquam ex ea defluat liquida, larigne similis. Abies uerò inter corticem & corticem præstantissimum liquorem illum concludit, quem uulgò LAGRIMO, quasi abietis lacrymam, appellant: de quo ueteres nihil (quod & quidem sciam) posteritatis memoria prodidere. Nisi quispian dixerit, per abietis lacrymam intellexisse Galenum lib. III. de compositione medicamentorum per genera



genera paulo ante citato, piceam illam liquidam resinam, quam pro terebinthina iustiores uendebant. Cuius rei illud indicium esse uidetur, quod scribat ipse, hanc et gustu, et odore terebinthinae esse persimile, quod in abiegnâ lacryma maxime notatur: et quod insuper sit quadamtenus terebinthina acrior. uanque huiusmodi qualitates in liquida picea resina minime reperiuntur. Quo fit, ut suspicandum putauerim, in his Galeni uerbis librariorum fortasse culpa medium aliquod fuisse; licet constet antiquos scriptores in arborum resinas ferentium historia in quam plurimis inter se differre, et alteram saepe pro altera (ut supra diximus) substituere. Anxit mihi suspicionem haec Galenus: quippe qui scripserit deinde eodem libro in Euphorbij medicamento, inter resinas ceteris odoratiores haberi terebinthinam, et abiegnam, hancque illam calidiorem esse. Falluntur autem, qui putant abiegnam lacrymam, clarissimam esse larignam: quandoquidem illa inter abietis cortices uomicae modo coacernatur, et secto corio (ut in abscessibus sanis uexatis fieri solet) elicatur: haec uero manat ex laricis caudice ad medullam usque perforato, ut ego experientia doctus facile attestari possum. Nam, ut rem omnem hac in historia exactius exploratam haberem, et à larice larignam, et ab abiete abiegnam per meum elicere libuit. Sunt qui huic illam admisceant, ut hac impostura magis lucrentur, eo quod omnes abiegnam pluri faciunt, quam larignam. Nec desunt qui percolatam larignam, et ad ultimam claritatem redactam pro abiegnâ uendunt, cum rarissimi reperiuntur myropole, qui rectius alteram ab altera dignoscant. Sed si ausu cognosci potest, quod abietis lacryma substantia minus consistat, odore praestantissimo fragret, et gustui larigna sit amarior, ad animumque asseruata quadamtenus stauescat. Ea uulneribus recentibus maximum affert praesidium, quod non solum glutinet, sed et mundet, et sarcotica habeatur. Pota renum calculos eiecit, arthriticos dolores mulcet, coxendiciumque cruciatus lenit. Capitis uulnera mirifice sanat, adeo ut hac sola nonnulli utantur. Additur et in antidotis balsami uice. Affirmat Ruellius abieti croceum florem innasci: uerum in Tridentinis montibus, ubi undique ea montes syluescunt, Abies omnis est et floribus, et fructibus infecunda. Sed ut ad piceam nostra redeat oratio, non satis compertum habeo, quam arborem pro Picea intelligat Petrus Bellonius: quanquam ex imagine, quam exhibuit, atque etiam ex notis, quas suae piceae assignauit, aliquod pinastri genus intelligere uidetur. Ceterum arbor, quam idem sua tantum auctoritate, ne dicam temeritate, ductus perperam Sapinum uocat, ac abieti similem facit, non est (quantum ego conijcere potui) nisi legitima picea. Quippe haec abieti adeo similis est, ut saepe syluanos homines, et lignarios fabros falsat, ut supra dictum est. Idcirco Plinius lib. XVI. cap. XXXIII. eadem filia reddidit piceae et abieti, sic inquires. Infecta pectinatum modo (intellige, folia sunt) piceae, abieti. Iis etiam idem Taxum similem fecit eodem lib. cap. X. quem admodum et Dioscorides lib. I. Taxum autem (ut obseruauimus) maxime folijs emulatur picea, quam magno et pudendo errore Bellonius Sapinum appellat. nam Sapinus, teste Plinio, pars tantum est in abiete, ut eius uerba declarant lib. XVI. cap. XXXIX. ubi ita scribit. Abietis quae pars à terra fuit, enodis est. Haec, quae diximus, ratione fluuata decorticatur, atque ita Sapinus uocatur, superior pars nodosa duriorque substerua. Quibus utique Plinij uerbis palam est Sapinum non esse per se arborem, sed tantum abietis partem, sicuti etiam Vitruuius testatur. Verum Bellonius, quod audiuerit tam piceam, quam abietem indifferenter du Sapin suis Gallis nominari, hanc forte uulgarem et confusam nomenclationem secutus, ut eam ueraciter putauit, ita etiam Piceam Sapinum appellauit. Sed is mihi quidem non uidetur in Plinio recte considerasse resiniferarum plantarum historiam, neque in Theophrasto cognouisse quod *πύκνυς* et *πίτυς* significarent, neque etiam animaduertisse, quod haec duae uoces saepe à Graecis una pro altera usurpantur. Sed hic suffus, quam deceat, aliquot Bellonij errata persecuti sumus. Alius enim locus erit, nisi quid mihi humanitus accidat, ubi alia plura in hoc genere consulto tractabimus. Arbor, quae plerisque Graecis *πίτυς* Latine Pinus appellatur: Arabibus, Sonobar: Italis, Pino: Germanis, Hartzbaum, et Kynholtz: Hispanis, Pino: Gallis, Pin. Quae autem Graecis *πέυκνυς*, Latine Picea nominatur: Arabicis, Arz: Italicis, Pezzo: Germanicis, Rot dammenbaum: Hispanice, Pino negro: Gallicis, Vn abre du genre du pin. Quae deinde de Graeco nomine *λάριξ*, Latino item Larix, Italico Larice, et Germanico Lerchenbaum uocatur. Quae denique Graecis, *ελάνη*, Latinis Abies dicitur: Italis, Abete: Germanis, Thamen, siue Thannenbaum.

Error quorundam.

Abiegnae lacrymae uires.

Bellonij opinio falsa.

De arboribus.

Nomina.

## LENTISCVS.



## Lentiscus. Cap. LXXV.

LENTISCVS nota arbor est. Cui toti uis inest, at stringendi: semini enim, folio, ramo, cortici, radicibusque cognatae insunt vires. Liquamentum autem ita fieri solet. Folia, cortex, & radix in aqua coquantur, & ubi abunde cocta, refrigerataque sunt, folia abijciuntur: aqua denuo coquitur, donec mellis habeat crassitudinem.

Lentiscus sua astringendi dote, valet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu: item contra eruptionem sanguinis ex vulua, & eiusdem, aut sedis



dis procidentia. In totum acaciæ, & hypocistidis uicem repræsentat. Idem facit succus è tritis folijs. Decoctum fotu caua explet, & fracta ossa ferruminat, vuluæ fluxiones sistit, nomas arcet, vrinam pel- lit, motus dentium collutione stabilit. Virentes surculi calamulorum vice dentibus repurgandis af- fricantur. Fit è semine oleum astrictoriam vim habens: quod prodest, cum quid astringi opus est. Lentiscus resinam gignit, quæ lentiscina cognominatur, & ab aliquibus mastiche. Pota utilis est san- guinem reiicientibus, & tussi veteri: stomacho auxiliatur, sed ructum mouet. additur in dentifri- cia, & illitiones faciei, ad nitorem cuti conciliandum: palpebras oculis incommodas replicat: man- ducata halitum oris commendat, gingiuas contrahit. Optima, & copiosissima in insula Chio proue- nit. Præfertur, nitedulæ modo, resplendescens, & candore Tyrrenicæ ceræ similis, adulta, retorri- da, friabilis, odorata, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris, resinæque pi- næ nuci mistura.

Lentisci con- sideratio.

Ruell. & Her- molai lapsus.

Mastiches cō sideratio.

Lentisci uires ex Galeno.

Mastiches ui res ex Gal.

Caphuræ hi- storia, & ge- nera.

**LENTISCUS** in Italia frequentissima nascitur, præsertimq; in Hetruria maritimis nostris Senensibus. Gignitur in collapsis Romanorum edificijs, ac ruderibus. Quinetiam in tractu Tyrreni ubiq; copiosa oritur, in Cam- pania maxime. Ceterum Lentisci nonnullæ sunt plantæ, quæ in arborem mediæ proceritatis assurgunt: nonnullæ uerò humiles, quæ nullo grãdiore candice à radicibus sublato, sed uirgultis, stolonibusq; innumeris corylorum sylue- strium modo disiliunt. ueruntamen Lentiscus tum ramis, tum folijs densior constat, magisq; uirgultorum cacaminibus ad terram desectitur. Folijs utraq; est pistacij græneolentibus, pinguibus, friabilibus, & in obscurum uirentibus, in ambitu tamen rubent, sicuti & quibusdam uenulis. Perpetua fronte uiret. Cortice est subroso, læto, tenaci, flexi- xibiliq;. Profert terebinthi modo, præter racemosos fructus, folliculos corniculi modo intortos, in quibus ineludis- tur liquor limpidus: qui tandem ueterascens uertitur in bestiolas ijs persimiles, quæ ex ulmi, & terebinthi folliculis euolant. Tota planta grauiter olet: quapropter nonnulli, quod olfactu caput aggrauet, ipsam deuitant. Sed Len- tiscum, quæ roboris magnitudine proueniat, folio sorbi, acinis syluestris puniceæ rubentibus, ut Ruellius scribit, hactenus non uidi, nec id unquam me legisse memini apud probatos auctores. Idcirco Ruellium hac in re hallucinatum crediderim. quemadmodum & Hermolaum, qui ea esse lentisci folia existimat, quibus coriarij Venetijs pelles confici- unt, uulgo propriè appellata folia. Siquidem planta, à qua hæc folia decerpuntur, maxime à lentisco differt, esse cum terebintho aliquam habeat similitudinem. Fert etiam Lentiscus Italica mastichen, ut ipse attestari possum: quauquam non ea copia, qua in Chio, & Creta Aegæi insulis. Itaq; immerito à nonnullis notatur Auicenna, quod mastichen Italicam memoriæ prodiderit. Quippe quod ij, qui maiori in errore uersantur, existinauerint non alio- bi fortasse, quam in Chio nasci. Indicam mastichen è spinosa quadam planta manare, non solum Theophrastus, sed et- tiam alij tradidere, quemadmodum & Plinius. qui lib. XII. cap. XVII. non modo Chia mastiches meminit, sed et- liarum quoq; quæ in Arabia, Asia, Græcia, Pontoq; proueniunt. Lentisci meminit Galenus lib. VIII. de simp- medicam. facultatibus, sic inquit. Lentiscus facultate ex aquea essentia leuiter calida, & terrena frigida nō pau- ca compositus est, ob quam & moderatè adstringit. Desiccatur igitur secundo ordine completo, aut tertio incipienti in caliditatis, & frigiditatis differentia quodammodo est medius, & symmetrus. Similem omnibus sui partibus ad- strictionem obtinet in radicibus, ramis, extremis turionibus, germinibus, ac folijs, præterea fructu, & cortice: ut si succum ex folijs eius uiridibus exprimas, similis hic ordinis est, moderatè adstringens. Itaq; bibitur & per se, & cum alijs medicamentis, quæ dysenterias, & alui affectus sanant: quin & ad sanguinis expuitiones, sanguinisq; ex- utero eruptiones, tum sedis, uuluaq; procidentias idoneus est, utpote ad hypocistida nouitib propè accedens.

Meminit idem & mastiches libro VII. simpl. medic. his uerbis. Mastiche candida quidem, & Chia consuetio mor- re cognominata, quodammodo ex contrarijs composita facultatibus est, adstringente uidelicet, & emolliente. Pro- inde stomachi, uentris, intestinorum, iecorisq; inflammationibus competit, utputa secundo ordine excalfaciens, & desiccans. Nigra uerò, quæ Aegyptia cognominatur, tum magis desiccatur, tum minus adstrictoria facultatis est para- ticeps: quamobrem aptior est ad ea, quæ ualidiorem digestionem per balitum exposcunt. hac igitur ratione & sua- runculis bonum est remedium. Porro oleum, unguentumq; mastichinum ex Chia conficitur, non admodum sanè ex Ae- gyptia. ceterum similis est & ipsum mastichæ facultatis. Hæc de lentisco, & mastiche Galenus posteritatis memo- rie prodidit. Sed cum mastiche mihi Caphuram in memoriam redegerit, quod certò sciam, eam mastiche, arden- ti aqua, zedoariq; ab impostoribus adulterari, cumq; Dioscorides, Galenus, & ceteri illius seculi scriptores ipsam non solum non aduocauerint, sed ne nouerint quidem, silentio minime dissimulandum fore putauimus, quò magis le- gentibus satisfiat, quantum tum à Serapione, tum etiam ab ijs, qui meridionalem plagam, & Indiæ ora hoc æuo na- uigationibus perlustrarunt, memoriæ proditum est. **CAPHURA** igitur est gummi arboris cuiusdam in India nascentis tanta magnitudine, ac proceritate, ut sub eius umbra hominum centuriæ recondi possint. Nascitur hæc ar- bor in montibus mari propinquis, materie leui, ferulacea, qua prodit Caphura. Huius largioris prouentus angustius est, cum frequentibus celum fulgetris corruscat, aut crebro tonitru constrepsit, uel cum terra motu concutitur. Huius multa traduntur genera. Vna in interuenijs ligni, lanellarum modo impacta figitur. Alia foras emergit cortice abrupto, ueluti resina, illisq; gummi modo inhaeret, maculis inter initia rubentibus, postmodum uel calore solis extor- sta, uel ignium ui candescit. hanc sumpto à rege quodam Riach illius loci nomine, indigenæ Riachinam appellant: quandoquidem is primus dealbandæ Caphuræ rationem adinuenit. Hæc ceteris & bonitate, & tenuitate præstat, longiorq; perdurat tempore. Alia crassior, nec pellucens, atro colore: proinde bonitate cedens. Tertia uilior res- peritur, fusco colore. Succedit huic impuriore alia, quæ arboris scobe, ramentis, & assulis implicita, gummi more aggregata lentescit, tuberculo amaræ nuci, aut fabæ, aut ciceris. Hanc pontificum, & sacerdotum suffumens sicut



sicut thus, & myrrham, costumq; in templis dicant. Sed hæ omnes in duo tantum fastigia rediguntur, in rudem, & elaboratam. siquidem rudis est Caphura omnis ignem non experta: elaborata uero, quæ solis, uel ignis ardore excocta, atq; purgata albumi contraxit colorem, utpote & cera. Fuchsius lib. primo de componendis medicamentis, putat Caphuram esse bituminis Indici genus, quod scripserit Serapio auctoritate Almazodi, largioris Caphuræ prouentus augurium esse, cum cælum crebris fulgetris corruscat, aut plurimis strepit tonitruis, uel cum regio, in qua prouenit, terræmotu concutitur: argumento, quod similiter ex terræ concussu magna tum sulphuris, tum bituminis copia profundi solcat. Sed dissentit ab eo opinio nostra: quandoquidem nec Serapionis, nec aliorum quoruncumq; hanc fuisse sententiam existimem: cum tam ipse, quam ceteri, qui de Caphura scripsere, arboris cuiusdam uastissimæ proceritatis gummi, uel resinæ Caphuram esse scribant. Nimirum oscitanter de hac scripsisse uidetur Platearius Salernitanus: quippe qui Caphuram gummi arboris esse inficiatur, Dioscoridis, & complurium testimonio, ex succo cuiusdam herbe fieri tradens. Quod profecto falsum est, cum nullibi Caphuræ meminerit Dioscorides. Eam autem esse gummi non solum Auicennæ, & Serapionis testimonio probatur, sed & Lusitanorum, qui nostro æuo per meridiem ad Calicut orientalis Indiæ emporium nauigant. Credidere Serapio, & Auicenna, Caphuram tertio abscesu & siccare, & refrigerare: quæ tamen cum uehementer etiam in aquam proiecta conflagret, sit perquam odorata, & adeo tenuium partium, ut sæpe per se in auram cuanescat, illis reclamare uidetur. Quo fit, ut quis suspicari possit, aut legitimam Caphuram ad nos non aduehi, aut hoc loco Arabum monumenta (ut in alijs quàm plurimis) esse uitia. Capitis dolores (si tamen in hac parte credendum est Mauritanis) ex calore prouenientes Caphura illita mulcet, incandescens inflammationes restinguit, præsertimq; iocineris. Renes, & seminaria uasa refrigerat, sanguinemq; cogit. Circumlitionibus imponitur ad cutis nitorem conciliandum, & ad arcendas tam uulnere, quàm ulcerum inflammationes. Erysipelas extinguit, & aduersus gonorrhœam, & albas uulue fluxiones efficax est cum succo cino, & aqua nymphæe hausta. Idem præstat pubi, seu imo uentri, testibus, renibusq; illita: quæ tamen antea psyllij seminis spissamento, aut omphacio, aut solani succo probè sit macerata. Sanguinem c naribus profluentem sistit, aut cum urtica semine inuissa, aut ex maioris sedi, & plantaginis succo fronti circumlita. Collyrijs ad calidas oculorum lippitudines utiliter imponitur. Renibus, ac testibus illita uenerem extinguit. Corpora à putredine præseruat: proinde eodemodò antidotis admiscetur, quæ contra uenena, uenenosorum animalium ictum, & pestilentes affectus consueiuntur. In uniuersum uiribus innumeri pollet, quas breuitati consulentes prætermittimus. Legitimæ probatio talis est. In calido pane è furno recentissimè sublato, bipartitoq; manibus scisso, Caphura ponatur. quod si humore madeat, sincera est argumentum: sin contra perareseat, spuria ac factitiæ signum. Ceterum nisi diligenter asseruetur, ex operculatis etiam capsulis nonnunquam euanesceat: itaq; sæpe deluduntur seplasiarij. Asseruatur tamen secure uase marmoreo, aut alabastrino, lini & psyllij semine sepulta. Nec desunt, qui eam pipere feliciter asseruari putent. quod nec planè comprobandum uidetur. Venetias Caphuram omnem rudem important, ibiq; igne, & arte uitreis organis elaboratur, sic ut candescat, atq; pelluceat. *Σκῆνος* Græcis, Nomina. *Lentiscus* Latinis appellatur: *Daru*, Arabibus: *Lentisco*, Italis: *Mata*, aut *Arueira*, Hispanis: *Lentisque*, Gallis. Huius resina *μασίχη* Græcè uocatur: Latine, *Mastiche*, aut *Resina lentiscina*: Arabicè, *Masthec*, *Masteché*, siue *Mastoché*: Italicè, *Mastice*: Germanicè ac Gallicè, *Mastic*: Hispanicè, *Almástiga*. Quod Arabibus *Kaphor*, seu *Chasur*, recentioribus Græcis *καμφορά*, ut etiam Latinis Caphura nominatur: Italis, *Camphora*: Germanis, *Campher*: Gallis, *Camphre*.

## TEREBINTHVS.

## Terebinthus. Cap. LXXVI.

TEREBINTHVS cognita arbor est. Cuius folia, & semen, & cortex astringunt, & ad eadem, ad quæ lentiscus, conueniunt, simili parata modo, sumptaque. Fructus eius aptus est, sed stomacho aduersatur: excoctus urinam mouet, uenerem excitat: contra phalangiorum morsus conuenienter in uino bibitur. Resina eius ex Arabia petra defertur. Prouenit etiam in Iudæa, Syria, Cypro, Aphrica, & Cycladibus insulis. Sed præualeat candida, perlucida, vitreo colore, & in cæruleum vergente, terebinthum olens. Terebinthina resinas omnes antecedit: proxima lentiscina, & è pinu, & abiete: has sequitur è picea, & pineis nucibus resina. Natura omnibus calfacere, mollire, discutere, expurgare. Tussi, ac tabi conueniunt per se, aut in eclegmate ex melle: vitia pectoris expurgant, urinam cient, cruda concoquunt, ventrem emolliunt, palpebras commodissimè replicant: lepras tollunt, cum æruginè, ac futorio atramento, nitroque; auribus;





auribus saniem emanantibus cum melle & oleo, item in pruritu genitalium utiles. malagmatibus, acopisq; admiscuntur. Laterum doloribus per se, illitu & appositu auxilio sunt.

## Resinæ aliæ.

## Cap. LXXVII.

**L I Q U I D A** resina è pinu, & picea, à Gallia, & Hetruria conuehi solet, atque olim à Colophone petebatur: hinc Colophonix sibi cognomentum vendicauit. A Gallia quoque subalpina: quam vernaculo nomine larica, hoc est, larignam, appellant incolæ. Ea in linctu, & per se magnopere prodest tussi veteri. Colore inter se distant: siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, vt larigna. Cupressus etiam liquidam fundit resinam, quæ ad eadem pollet. Quæ vcrò aridarum generi ascribuntur, quædam ex pineis nucibus, aliæ abiete, aliæ picca, & pinu exierunt. Eligi debet longè omnium odoratissima, translucens, non retorrida, neque diluta, quandam cere faciem præbens, & friabilis. E' picca, & abiete resinæ cæteras antecedunt: odoratæ enim sunt, atque thus odore imitantur. Præstantiores à Pityusa insula deferuntur, quæ secundum Hispaniam sita est. Sed quæ è picea, nucibus pincis, & cupresso manarunt, nihil ad illas, nec tantis uiribus potiuntur. veruntamen eorundem gratia, quorum & illæ, sumi solent. Lentiscina terebinthinæ respondet. Vritur resina omnis liquida in vase quadruplæ capacitatis ad humorem, qui infunditur. itaque resinæ congruus in duobus aquæ pluuiæ coquitur, subiectis leuibus prunis, resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis, & retorrida reddatur, ac digitis cedat. Cæterum vbi refriguit, infictile non picatum, quod aconitum vocant, id est, non illitum, reconditur. Fiet etiam eximij candoris, si resina omnis cliquata præcoletur, quò sæculenta sordes excernatur. Vritur quoque sine aqua, primum lento igne, & vbi coire cœperunt, maior carbonum strues supponitur, & triduo citra intermissionem discoquuntur, vsque dum antedictas naturæ suæ notas exuerint: mox, vt dictum est, reponuntur. Aridas vnus diei spatio decoxisse satis est. Vltæ odoratis malagmatibus, & acopis, & vnguentorum colorationibus magnopere utiles sunt. E' resina perinde atque thure, fuligo excipitur, ad circumlitiones idonea: quibus palpebras fucant, & colorem mentiuntur. prodest glabris genis, collacrymationibus, erosissq; oculorum angulis. Ex ea fit atramentum scriptorum.

Terebinthi  
histor. ex  
Theoph.

**T E R E B I N T H O R V M** (ut Theophrastus memoriæ prodidit lib. III. capite xv. de historia plantarum) alia mascula, alia foemina. Mascula sterilis est, ob idq; sexui maris adoptatur. Foeminarum alia fructum protinus rufum pronit, magnitudine lentis, qui concoqui nequit: alia uiridè editum, rufum postmodum tingit, & cum uua maturescentem, nigrum nouissimè facit, magnitudine fabæ, resinofum, & sulphurosom. Circa Idam, & Macedoniam breuis, fruticosa, contortaq; nascitur: at apud Damascum Syriæ magna, copiosa, decoraq;: montem enim inibi terebinthis refertum, ut nil aliud habeat, referunt. Materies ei lenta, radices ualidæ in profundo, atque in rotum incorrupta hæc arbor habetur. Flos oleæ, uerum colore rufo. Folia circa unum pediculum, pleraq; specie laurorum, coniugata, quentadmodum sorbo, quodq; parte postrema acuminet, impar exit: uerum minus angulatis, quam sorbo, ambituq; laurino similia, & pinguis cum uniuerso fructu. Fert & ad nucis similitudinem quædam concaua, ut ulmus: quibus bestiolæ tanquam culices innaſcuntur. Fit in his resinofum quid, lentumq;: sed resina tamen non hinc legitur, sed à ligno. Fructus resinæ copiam non mittit, sed manibus tantum adhæret: etsi uon lauatur, postquam collectus est, inter se cohærescit: cum uerò lauatur, candidus, probeq; uon maturus supernat, niger subsidit. Idem refert deinde lib. III. cap. v. historiæ plantarum, Indicam etiamnum Terebinthum haberi: cuius lia, & rami, & reliqua omnia terebintho similia: fructus autem diuersus, similis enim amygdalis. Nam & in Barictris terebinthum hanc esse, ferreq; nuces amygdalarum magnitudine: quoniam non magnas, sed uisu similes, & suauitate amygdalis præstantiores: & ideo loci illius incolæ his potius uti. hæc Theophrastus. Terebinthi uidi ego primum in colle uulgo cognomine Castel Trento, non procul à ciuitate Tridenti prope Athesim, à Theophrasti historia haud quaquam dissimilem, facta huius uidendi mihi copia à clarissimo medico Iulio Alexandrino Tridentino: reperiq; ipsam deinde in alijs compluribus Hetruriæ locis, uidelicet in collapsis Romanorum ædificijs, ac rudibus: sed frequentem admodum in Iapidæ collibus prope Pucinum castrum, Adriatico sinu non longè à Tergesto. Ab hac sæpe, dum illac iter haberem, & fructus, & folliculos caprarum cornibus non ab similes, quibusdam intus bestiolis culicis figuram præ se ferentibus, & resinam decerpſi: quæ etsi omnium præstantissima sit; non tamen diu est, quòd Venetias deferretur ex Cipro. Antea costam afferebant, uel quòd esset aduectum aptior, uel quòd impostoribus ad adulterationem aditus hoc modo facilius fieret. Verum liquida ut per se ex arbore manat, iam frequens facta est. Cæterum quia terebinthina iandiu in Italiam nō aduehebatur (ut suprâ in laricis mentione diximus) larigna non modo terebinthinæ locum sibi uendicauerat, sed etiam cognomentum. At cum eodem loco à nobis de pinea, picea, larigna, abiegnatq; resina, & earum à quibus colliguntur arboribus, abunde scriptum sit, operæ pretium quidem non est, ut hic iterum ea repetamus. Scire tamen conuenit, rarissimas esse abietes in montibus Tridentinis, quæ præter fluentem lacrymam, aridam fundant resinam: sed si quædam inueniuntur, hæc est (ut Plinius inquit) arboris morbus. Cuius rei manifestum argumentum est, quòd omnis abies, quæ resinam fundit, tabida sit, putris, & cariosa. Brasanolus de resinis differens, Plinium in earum historia à Dioscoride dissentire autumat, quòd scilicet Plinius libro XXI. capite vi. tradiderit summas resinæ species duas, siccam & liquidam: siccam in pinu, & picea fieri: liquidam è terebintho, larice, lentisco, cupresso. Dioscorides uerò ex pinu, & picea, & liquidam præter siccam haberi

Resina tere-  
binthina.

Braf. opinio  
reprobata.



haberi scriptum reliquerit. Quos tamen melius erat sic conciliasse, quod quauis asserat Plinius, siccas resinas ē pinu, & picea colligi; non propterea obstat, quominus ferat pariter huiusmodi arbores & liquidas, & siccas resinas. Quandoquidem in Tridentino tractu pluribus uarijsq; locis, ē pinu, piceaq; antea longo tempore caesis, solisq; ardore astuantibus liquidas resinas exudare comperimus larignae non absimiles. Quod etiam saepe evenit in asseribus ex hisce arboribus paratis, & in tignis, uel trabibus, quae aedificijs coaptantur. Verum enimvero malim dicere Plinium errasse, quod liquidarum generi lentiscinam adscribat, quae est nostra mastiche, ceteris profecto durior. Ad haec scire etiam conuenit, quod quae in officinis Colophonia, Hispanica, Graecaq; dicitur, illius species est, quā Colophoniarum ex quibus conficitur, uarietate. quippe (ut Dioscorides ait) alia candida est, alia olei, alia mellis colore, quae est larigna. Quae uero à Colophone Ioniae urbe sibi cognomentum comparauit, est (ut refert Plinius lib. xiiii. cap. xx.) praeter ceteras fulua: neq; alia de causa uocatur & Hispanica, & Graeca, nisi quod ex iisdem etiam resinibus aduehatur. Attamen animaduertendum est aliam ab hac, quae neq; fricta, neq; excocta est, haberi Colophoniam: siquidem scribit Dioscorides quod picea, piceaq; liquida, ac pinguis resina ex Colophone asserebatur: ob idq; Colophonia per excellentiam uocabatur. Quod item testatur Galenus lib. vii. de compos. med. per genera, cum inquit. Quoniam uero piceam resinam & frictam, & colophoniam appellare consueuerunt, sciendum uenit, aliam quam esse colophoniam Chiae mastiche per similem, molliens aliquid habens, quemadmodum illa, & thus. Et libro ii. eiusdem. Est, inquit, inter liquidas etiam colophonia thuris redolens, quae nonnullis sola uocatur colophonia, odoratu suauitatem quandam referens, ut abietina, & calore sicut illa mediocri praedita. nascitur admodum modica, atq; ob id pretiosa est. Porro si quispiam diceret, non cognouisse Plinium, neque Dioscoridem, liquidam abiegnam, quam aliqui lacrymam, nonnulli uero abietis oleum muncupant, cum ne tantillum quidem à ueritate desiscere putauerim: siquidem hi de liquida abiegna (quod legerim) nihil memoriae prodiderunt. Terebinthi, & resinarum meminit Galenus lib. vii. de simplic. medicam. facultate, ubi ita scriptum reliquit. Terebinthi tum cortex, tum folia, tum fructus adstrictorium quiddam obtinent: sed & secundo ordine excalescunt. Itaq; quod etiam desiccant, manifestum est: recentes quidem etiamnum, humidiq; modice; sicci uero, ordine secundo. Ceterum fructus aridus propinquus est etiam tertio ordini desiccantium: est enim adeo calidus, ut mendentibus protinus eius caliditas percipiatur. Itaq; etiam urinam prouocat, & lienibus prodest. Paulo superius de resinis differens, sic inquit. Resinae omnes desiccant, & excalescunt, Ceterum inter se discrepant, quod plus, ac minus habeant in gustu quidem acrimoniae, in facultate uero caliditatis: tum quod aliae plus, aliae minus sortita sunt partium tenuitatis: praeterea quod nonnullae adstrictionis sunt participes, aliae nequaquam. Primas meruit omnium non iniuria lentiscina: eam uocant mastichen. Nam praeterquam quod paucula ei adest adstrictio, adeo ut stomachi uentrisq; & iecoris imbecillitatibus, & phlegmonis conueniat, insuper illi inest mordacitate uacans desiccatio: minimum enim acris est, & maxime tenuium partium. Inter alias praefertur terebinthina, manifestam quidem, non tamen similiter atq; mastiche, adstrictionem possidens. Ceterum adiunctam habet amaritudinem quandam, per quam magis etiam, quam mastiche digerit. Ob eandem qualitatem inest & absterio, tanta quidem, ut & psoras sanet. quinetiam quae in profundo resident, ceteris resinis magis attrahit, nimirum cum illis maiorem habeat partium tenuitatem. Attamen picea, & hac etiam magis strobilina acriores quidem ea sunt, sed non magis tamen digerunt, neq; attrahunt. Mediae inter has sunt picea, & abietina, acriores quidem quam terebinthina, minus tamen, quam aut picea, aut strobilina. Habet porro etiam emolliens quiddam terebinthina: secundum locum habet in emolliendo lentiscina, sicut & cyparissina acrimoniae. Et lib. iiii. de compositione medicamentorum per genera inquit. Etenim cera ad liquiditatem multo pingui indiget: at resine, quae quidem aridae prorsus sunt, modico: liquidae & siccae quandam substantiam ad emplastri crassitudinem assumere possulant. In ceris igitur non magna humiditatis, ac siccitatis differentia est: in resinis, sicut etiam in picis genere contra, aridae ab humidis permultum differunt. Omnium ergo resinarum siccissima est, quam nonnulli frictam, alij colophoniam appellant. Huic succedit, quae ex fistilibus impura, nec frixa sumitur, quam si purges, in frictam mutabitur. His ambabus siccior est, quae dicitur pitynon physema, ac si dicas picea germinatio. Hanc sanè, seu squallidam in praesentis emplastri compositionem non esse idoneam ratus, abieci; usus autem sum fricta, & liquidis. Iam uero ex his quoq; nonnullae diutius liquidae permanent, quemadmodum terebinthina, aliae citò inarescunt, sicut strobilina: media utriusq; est abietina. Quinetiam facultate calidior est quidem strobilina, mox uero abietina. deinde terebinthina: cupressi resinam miscere non ausus sum, ut quae nonnihil adstringeret. Putabit forsitan aliquis nobiscum dissentire Dioscoridem Anazarbeum in sermone de resinis haec uerba scribentem, primo de medica materia commentario. Ex omnibus resinis principatum terebinthina datur, post eam lentiscinae, tum ei, quae de pinu raditur, & abiete, post quas picea, strobilinaq; numeratur. In his enim Dioscorides tanquam de infima strobilina, optima uero terebinthina sentire uidetur. Verum ego ex his tribus resinis strobilina, abietina, terebinthina, principem certè strobilina calore, secundam abietinam, postremam terebinthinam esse dixi. haecenus de resinis Galenus. Sed hac in re animaduertendum est, quod hoc in loco ceteris strobilinanam non aliter praefert Galenus, nisi quod omnes caliditate tantum antecellat: siquidem in uniuersum in medicamentis componendis à Dioscoride nequaquam dissentit, uidelicet quod inter omnes terebinthina primas occupet sedes, ut paulò post declarauit, dicens. Inter resinas optimam, tantum medicamentum in multiplicis usus accommodatum, merito terebinthinam affirmaueris, non tamen caliditate primas obtinere. Arbor, quae Graece τέρευνθος, Latine Terebinthus appellatur: Arabice, Baton, Boton, Botin, siue Albotin: Italice, Terebintho. Resina uero ita Latinis uocata, Graecis πίντιν nuncupatur: Arabibus, Ratin, siue Natig: Italis, Ragia: Germanis, Hartz.

Colophoniarum  
consideratio.Terebinthi  
uires ex Gal.Resinarum vires  
ex Gal.

Nomina.



## Pix liquida

## Cap. LXXVIII.

Pix liquida, quam alij conum uocant, è pinguisimis pini, piceæque lignis congregatur. Optima est splens, syncera, læuis. Contra uenena, phthisim, purulentam excretionem, tusses, suspiria, & pectoris humores, qui difficilè extussuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato: tonsillarum & uux inflammationes, anginaeque utiliter perunguntur: purulentis auribus infunditur cum rosaceo, & illinitur cum trito sale serpentium moribus: adiecta uerò pari cera, scabros ungues extricat, impetiginesque emendat: vuluæ duritias, ac sedis tubercula discutit: cum farina; hordeacea, & pueri impubis urina decocta, strumas rumpit: cohibet ulcera, quæ serpunt, cum pineo cortice, aut sulphure, aut furfuribus illita. Cæterum cum thuris manna, & cerato profundos ulcerum sinus conglutinat: rimis sedis, & pedum magno auxilio illinitur: ulcera replet, & cum melle purgat: quin & cum uua passa, & melle carbunculos, & putrida ulcera emarginat, disrumpitque. Erodentibus medicamentis, quas septas uocant, probè immiscetur.

## Picinum oleum.

## Cap. LXXIX.

E PICE fit quod pisselæon appellant, separato liquore aquoso, qui supernatat pici, sicut serum lacti. Nam expansa, quandiu pix coquitur, supra cortinam uellera pura madescunt, acceptoque halitus eius exprimuntur in uas, idque tandiu fiat, donec pix coquatur. Quas pix liquida, præbet utilitates: alopecias capillo replet cum farina hordeacea illitum: quibus & liquida pix medetur: iumentorum ulcera, scabiemque emendat.

## Fuligo liquidæ picis.

## Cap. LXXX.

FIT HOC MODO è liquida pice fuligo. In lucerna noua, quæ ellychnium habeat, nonnihil picis incendito, lucernamque fictili uase in clibani speciem conformato, superius in agustum fornicato, inferius perforato, ut clibani esse solent, operito, & adoleri finito: consumptoque liquore nouum infundito, quoad sufficientem usui fuliginem collegeris. Vis ei astringens, acrisque. Vtui est ad pigmenta, quibus palpebras linunt, & venustant, & ad circumlitiones. Item ubi glabris genis pilos restitui oportet, ad imbecilles, lacrymososque oculos, insuper ad eorundem ulcera non inutilis est.

## Pix arida.

## Cap. LXXXI.

LIQUIDA pix decocta in spissam coit, quam uocant aliqui palimpissam. quo in genere quædam uisci modo lentescit, boscas cognominata, altera sicca est. Probatur pura, pinguis, & odorata, subrufa, resinosa. Talis Brutia, & Lycia picis, resinæque simul naturam habentes. Calfactoriam uim habet: dura emollit. pus mouet, tubercula panosque discutit, ulcera replet: uulnerarijs medicamentis commodè permiscetur.

## Zopissa.

## Cap. LXXXII.

ZOPISSAM aliqui aiunt derafam nauibus resinam cum cera, quam alij apochyma appellant. Ea dissipandi naturam habet: quoniam marino sale macerata fit. Alij pineam resinam hoc nomine uocauerunt.

TAMETSI de pluribus Picis generibus, de oleo, earumque fuligine diuersis, ac proprijs capitibus disserat Dioscorides; cum tamen horum omnium historia notior sit, quam ut à nobis explicari debeat, operæpretium non est: ut de his pluribus agamus. Sed quoniam fortasse nonnullos delectabit audire, quoniam modo pix ipsa conficiatur, ut illis & mihi sit satisfactum, hic rem paucis aperiam, omniaque de ea referam, quæ Tridentino tractu in Flemarum montibus coram clarè perspexi. Sic ergo picem, quæ passim naualis dicitur, eo quod picandis nauigijs sit aptissima, artifices conficiunt. Veteres pinos, quæ prorsus teda confectæ sint, in particulas securibus concidunt, ut ex aliarum arborum truncis ad carbonis opus fieri solet. Deinde uerò aræ ex creta pauitur in medio paululum elata, extremitatibus equaliter dependentibus, ut liquor è teda resudans in canalem totam aream ambientem facilius defluere possit. Itaque concisam tedam in aræ struis congerie locant, uelut in carbonis artificio: mox hac primùm abietum, picearumque frondosis ramis undique circumdataque, tum denum terra septa, lutoque obstructa, ne quouis modo fumo ac flammis pateat exitus, per foramen in cacumine paratum ignem succedunt eadem quoque ratione, quæ carbonem coquuntur. Quare cum desit locus, per quem flamma erumpere possit, sentiatque ob id congesta moles maximum ignis ardorem, pix liquitur, & per aræ pauimentum confluens in canalem circumpositum defluit, qui per alios canales inibi artificiosè paratos picem fluentem corruat in scrobes ligneis asseribus circumdatas, ne terra defluxam picem contineat: unde postea & dolia, & cadi, & utres implentur. Operis perfecti signum, si rogos decumbat, subsidatque, et liquor defluere destinat. Sic enim picem fieri uidimus à syluicolis eam parantibus, qui quodammodo secuti uidentur Theophrastum lib. IX. cap. III. de historia plantarum, ubi eadem ferè ratione Macedones picem urere latius tradidit. Picis facultatem memoriæ prodidit Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Pix sicca

Picis confectio-  
nis ratio.

Picis facultates  
ex Gal.



ea quidem desiccant, & exalfacit secundo à mediocribus, siue symmetris excessu: ac plus desiccare potest, quam exalfacere. Humida uero contrà, plus uidelicet calfacit, quam desiccant: habetq; nonnullam partium tenuitatem, qua & asthmaticos, & purulentos adiuuat. satis est autem cyathi linxisse mensuram melli mistæ. Sed & abstergens di quendam uim habent, atq; concoquendi, digrendiq; ueluti & in gustu subamarum quid obtinent, & acre. Sic leprosos ungues eximunt mistæ cum cera, lichenasq; detergunt: concoquunt item duos, & crudos tumores omnes cataplasmatibus inditæ. Ad ea omnia humida ualentior est: arida uero pix tametsi ad hæc quidem deterior est, glutinatis tamen uulnibus magis congruit. Ex his itaq; clarum est, humidæ picis calidam humiditatem affatim esse admiscam. Meminit item Galenus picis fuliginis lib. VII. eorundem simp. ubi ita de omni fuligine scriptum reliquit. Fuligo omnis exicatoria est, ac proinde terrestris est essentia, habens quasdam etiam ignis, qui materiam combussit, reliquias: sed id pusillum est. Porro tota eius natura terrena est, tenuium partium. Sed quæ speciatim in ea differentie sunt, eæ pro uita materia eueniunt: ex acriore, & calidiore, tali etiam proveniente fuligine: ex dulciore simili quoq; & hinc fuligine proveniente. Primum enim thuris fuligine utuntur, in ocularias medicinas mistæ, eas uidelicet, quæ ad oculos etiamnum phlegmone tentatos accommodantur, atq; etiamnum fluxione uexantur, & ulcera habent: nam & illa expurgat, & carne implet. Ad hæc usurpant quoq; eam ad facultates, quas uocant calliblepharas. Præterea terebinthinæ, myrrhæq; fuligo molestia caret, non aliter quam thuris: sed styracis his quodammodo ualentior est: magis etiam picis liquidæ, qua etiam magis cedri. Porro acrioribus utuntur ad uitia palpebrarum uocata ptila, & erosos oculorum angulos, humidosq; citra phlegmonem. At mollioribus, mitioribusq; tum ad hæc, tum ad ea, ad quæ cōpetere paulo superius diximus thuris fuliginem. Πισσα ὕδατος Græcis dicitur: Latinis, Pix liquida: Arabibus, Eers, Cest, Zest, aut Kir: Italis, Pece liquida: Germanis pix omnis, Bech: sicut etiam Hispanis, Pex negra: Gal-  
lis, Poix fondue, liquida tantum. Πισσα ξηρὰ, καὶ παλαιοῖσα Græcè uocatur: Latine, Pix secca: Italicè, Pece secca: Gallis, Poix seche. Quod Græci πιστέλαιον, Latini Picinum oleum dicunt: Arabes, Kepsen, seu Kapse: Hispani, Azei de pez.

Fuliginum  
vires ex Ga-  
leno.

Nomina.

† Hoc loco non ὁσδὺς, id est, odorata, ut communis lectio habet, sed ἰσδὺς, hoc est, uiscosa legitur in Orbasij codice manu scripto, libro XII. simplicium. Harum lectionum quæ sit melior in probatione picis seccæ, aliorum sit iudicium.

## Bitumen.

## Cap. LXXXIII.

BITUMEN Iudaicum cæteris antepositur. Cuius probatio est, ut purpuræ modo splendeat, sitq; ponderosum, ac ualidum odorem uibret. nigrum autem & sordidum, uitiosum est. Adulteratur pice. Gignitur in Phœnice, Babilone, Zacyntho, & Sydone. Liquidum inuenitur in Atragantino Siciliae, fontibus innatans: quo utuntur ad lucernarum lumina, olei uice. Hallucinantur, qui id Sicilicum oleum nominant: nanque liquidi bituminis genus esse constat.

## Pissasphaltum.

## Cap. LXXXIII.

NASCITVR in Apolloniatarum agro circa Epidaurum, quæ pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunij montibus deuoluta impetu fluminis rapitur, æstuq; in litus expuitur, illic coacta in glebas, mistam bitumini picem redolet.

## Naphtha.

## Cap. LXXXV.

NAPHTHAM uocant Babylonij bituminis colamen, colore candidum: inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita ut ex spatio protinus in eam transiliant. Ad suffusiones oculorum, & albugines utilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuctur; uulnarum procidentia, strangulationesq; olfactu, suffitu, imposito, emendat, comitiales morbos suffitum deprehendit, gagatæ lapidis more, purgationes mulierum cum uino, & castorio potum elicit; tussim ueterem, & anhelitum adiuuat, serpentium moribus, coxendicum, laterumque doloribus auxiliatur, datur celiacis in catapotio deuorandum, cum aceto potum discutit sanguinem concretum, dysentericis cum pisana liquatum infunditur, destillationibus suffitione medetur, mitigat dentium dolores oblitum. Cæterum pilos incommodos siccum replicat, specillo impositum, concalfactum autem, & cum farina hordeacea, nitro, & cera illitum, podagris, articulorum doloribus, lethargicisq; prodest. Pissasphaltos eadem, quæ pix, & bitumen, si misceantur, potest.

LEGITIMVM quidem Iudaicum Bitumen hoc æuo (quod sciam) in Italiam non aduehitur: id nanq; quo officinae utuntur, impostura quædam est, pice, petroleo, & alijs nonnullis parata. Igitur mirari non licet, si id Dioscoridis historiae minime respondere uideatur. Optimum in Iudæa prouenit in quodam lacu, quæ Iordanis amnis insluit, qui ab urbe Hierico quindecim tantum millia passuum distat, si Brocardo fides habenda est, qui Palæstinæ topographiam edidit. Nil uero aliud bitumen est, quam pingue quoddam lacus illius aquis supernatans, quod undis uentoq; agitatam in litore concreuit, densatur, coit, tenacissimumq; redditur. Nullum in hoc lacu (ut Galenus testatur lib. III. cap. XX. simpl. medicamentorum) animal, nullaq; stirpis innascitur, neq; uisitur ob aque ingentem falsedinem. Imò cum duo ingentia flumina in eum confluant, in quibus pisces innumeri, præsertim in eo, quod prope Ierichontem fluit, quod Iordanem appellant, nullus omnino piscium fluminum ostia excedit. Quinimo, eodem auctore, de his, quæ in eum proijciuntur, nihil mergitur, sed instar nauis, super aquam fertur. Quippe hoc esse uerum probari facile

Bituminis cō-  
sideratio.



facile potest experimento, quod sensibus patet: nam unaquæq; nauis leuius admodum marinis, quam dulcibus fertur aquis. Proinde loco citato hæc scite prodidit Galenus. At aqua, quæ ex lacu Syriæ Palestinæ, quem alij quidem mare uocant mortuum, alij stagnum bituminosum, gustantibus non salsa modò, sed & amara est. Salem uero etiam habet ex se se natum, perinde subamarum, primoq; statim aspectu unà cum uniuerso mari tum candidior, tum crassior apparet, salsugini neræ similis: in quam si salem iniicias, ne liquari quidem etiam possit: plurimum enim eius in se habet: ac si quis in eam se mergat, continuo sale tenuissimo uelut conspersus, undiq; emergere conspicitur. Quapropter etiam aqua illa, quam cætera marina grauior est, idq; tanto pondere, quanto fluuiali marina. Itaq; si uolueris te ipsum deicere in profundum, ne sic quidem poteris deorsum ferri: ita attollit, eleuatq; aqua, non sanè quia natura leuis sit, quod quidam ueterum sophistarum prodidit, sed ut censuit Aristoteles, propter grauitatem instar luti, quæ leuiora sunt, gestans. Proinde si hominem ligatis manibus, pedibusq; in stagni illius aquam conieceris, deorsum haud feretur, quin uerò sicut naues in mari onera plura, quam in fluuijs citra submersionem portare ualent, eundem in modum in stagno mortuo multò plura, quam in mari. Tanto enim est, quæ in illo est aqua, marina grauior, quam ò marina lacustri, aut fluuiali. inest enim ei salis substantia, quæ terrea, grauisq; est. Ipsiq; tibi marinam, si lubet, efficere licet, sale in aqua fluuiali colliquato, cognoscereq; quanto grauior reddatur aqua eiusmodi, quam sit dulcis. Quin & modum iam inueniunt, moderatam ad salendum conficiendi salsuginem, si ouum in ea uideatur natum: nam ubi etiamnum sedit, ac non dum super salsuginis superficiem innatat, aquosa magis est, & dulcis: grauius uerò salsa est, ubi tanta est salis copia indita, ut amplius liquari, qui postea adijcitur, nequeat. quam aquam si pendere non grauaberis, omnium aquarum comperies grauiissimam. Itaq; ego quandoq; inanem esse diuitis cuiusdam ambitionem ostendi, qui tantà in Italia maris mortui aquam deuexit, quæ cisternam implere posset. Nam id ipsum ego expedite præstiti, sale plurimo in aquam portabilem coniecto. hæc Galenus. Lacus iste, quem aliqui mare mortuum uocant, ille quidem est, quem sacra testantur monumenta exortum esse, ubi Sodoma, Gomorrha, aliæq; finitimæ ciuitates cælesti igne abortæ, subuersæq; fuerunt. Quod etiam Galeni auctoritate comprobatur, qui eodem loco citato lacum hunc Sodomeum appellari scribit. Eructat continuè is (ut quidam Patriarcha Hierosolymitanus suis scriptis perhibet) nebulosos quosdam uapores sitotorem intolerabilem uiibrantes, qui postea uentorum flamine per conualles olim fertilissimas exagitati, perpetuam ferilitatem relinquunt, ita ut longo terrarum spatio nec herba, nec arbor, nec ullum deniq; germen proueniat, neq; uirasciat, nisi iuxta Hiericum, ubi ab Elisei fonte irrigantur horti. Tradit Plinius hunc lacum longitudine centum millia passuum excedere, latitudine maxima uiginti quinque millia passuum implere. Idem Pissasphaltum inter picis generum meminit libro XXI. capite VII. sic inquit. Est & Pissasphaltos mista bitumini pice naturaliter ex Apolloniæ Epiri, quam uulgo Valoniam nuncupant, Venetias pissasphaltum pro picandis nauigijs copiosum importatur: quippe quod pineæ picis commistum, ualentissimè id muneris præstet. Nuper ex Dalmatia afferri cepit, ubi prope Lestum non longè à Narenta seditur: cuius amicus quidam mihi copiam fecit. Foditur & in Pannonia, ubi id incolæ fossitiam ceram esse existimant. Scribit Fuchsius libro primo de componendis medicamentis, pissasphaltum nunc etiam tribus serè miliaribus ab Ispruch reperiri, uocariq; Germanico sermone Trischemblut, cuius portionem aliquam adhuc se habere fatetur, sibi à Georgio Collimitio transmissam, quæ succensa bitumen ac picem uerissimè resodolet. Sed equidem uereor, ne ipse quoque decipiatur, unà cum Georgio illo. Is enim lapidem gagatem, qui serè tribus ab ea ciuitate Germanicis miliaribus (ut Fuchsius inquit) in litore cuiusdam torrentis frequentissimus reperitur, pro pissasphalto ostendebat. Sed illius error, dum ego in Ispruch essem, à clarissimo Ioanne Petro Merendino medico Regio, & à me pariter deprehensus est: quod lapis Germanica lingua Trischemblut uocatus, est lapidis gagatæ modo conflagret, & bitumen redoleat accensus; nunquam tamen ut pix, & asphaltus igne liquefactus, sed ligni, uel tedæ modo comburitur. Præterea ultimum bituminis genus, quod Naphtham uocant, Plinius libro II. capite CVIII. in Austagenis Parthiæ inueniri prodidit, tantamq; esse huic ignium cognationem, ut transiliat protinus in ipsum undecunq; uisum. Quod etsi in Italiam aliunde (quod sciam) non inferatur; inibi tamen pluribus in locis id generis erumpit, quod eisdem cum igne præstat effectus: quale est, quod in agro Mutinensi scaturit, præteroleum, siue saxeum appellatum. Sed ut redeamus, unde digressi sumus, bitumen Sodomeum non uisi fictitium, uel impostorum malitia adulteratum aduebitur. Proinde Brasauolus in sinceri defectu Mumiam à Mauritanis uocatum substituit, quod certò crediderit, mumiam esse legitimum Palestinum asphaltum. Quandoquidem existimauit, siccatum Arabum, tum aliarum gentium corpora, quæ pro mumia ex Syria, & Aegypto Venetias deferuntur, cum sint ex infima illius regionis plebecula, uice aloes, myrrhæ, croci, & balsami ex more Iudaico, duntaxat asphaltum impleri: quod eorum pauperies aromatum sumptus non toleret. Hoc fundamentum hinc iecisse uidetur, quod Strabonem teris mandauerit bitumen Sodomei lacus in usu esse ad tutanda hominum cadauera. Sed quantum ipse ex Arabum scriptis deprompsi, apud eos MUMIA potius est pissasphaltum, quam asphaltum: siquidem scribit Auicenna, mumiam eadem præstare, quæ asphaltus pice commistus. Ex quo facile conijcere possumus, cadauera illa pissasphalto tantum impleri. Cui etiam subscribit Serapio, qui de Mumia differens, ex Dioscoridis auctoritate, eadem quæ Dioscorides de pissasphalto tradidit, ipse uerbótenus ad mumiam retulit, sic inquit. Mumia est in terris Apolloniæ: descendit namq; ex montibus, qui ducunt flumina cum aqua, & eijcit eam aqua fluminis in ripis, & est coagulata, & fit sicut cera, & habet odorem picis mistæ cum asphaltum cum aliquo fetore: & uirtus eius est, sicut picis, & asphalti mistorum. Vnde potius asserendum putauerim, nostram Mumiam esse pissasphaltum, quam asphaltum. Et quanuis dicat Strabo bituminis Iudaici usum fuisse ad conseruanda cadauera; non tamen negat, quin bitumini picem admisceant, fiatq; pissasphaltum factitium. Verum Serapio, & Auicenna has misturas optine nouerant, utpote quibus non modò Syri, sed & suæ gentis Mauritani uterentur. Quo fit, ut Brasauoli sententiam

Pissasphaltum  
consideratio.


Fuch. & quorundam  
lapis.

Naphthæ  
ratio.

Brasæ opinio  
improbata.

Mumie  
consideratio.





20 tentiam non probandam existinem, quod scilicet uulgaris Mumia bituminis loco in componendis medicamentis substituatur. Namque Mumia præterquam quod est (ut puto) syncerum pissasphaltum, uel asphaltum pice mistum, concepit defluentem humorem, qui continuo è cadaueribus in sepulcris liquatur. Ex quo credendum est, eam non parum suam immutasse naturam. Porro satius ducere Galeum, & Paulum consulere, qui in succidaneis, si desit asphaltus, picem liquidam subdunt. Caterum notare conuenit, Serapionem Mumiam Dioscoridis pissasphalto adieciisse, ut quæ aliquam inter se cognationem haberent, abinuicem non disungeret: non enim erat nescius, huiusmodi cadauera pissasphalto impleri, quemadmodum myrrha, croco, aloë, ac etiam balsamo simul admixtis implebantur: quæ ueram tractu temporis conficiebant mumiam, cuius meminit eiusdem capituli initio, his uerbis. Mumia sepulcrorum fit è myrrha, aloë, alijsq; rebus his additis, & humiditate, quam exudant humana corpora. Veruntamen hac nostra tempestate in Italiam haudquaquam aduehitur: quippe quod hac mistione nulla earum regionum cadauera præter nobilium, ac diuinitum condiantur: & hi quidem sepulcra habent sibi constituta, diligenterq; oclusa. Idcirco non ita facile istorum corpora surripi possunt à mercatoribus illuc profectis, ut minori tum difficultate, tum suspitione auferri possint pauperum, & ignobilium, asphaltum pice misto, uel ipso pissasphalto confarcta. Ideoq; apertissime falluntur, qui pro legitima Mumia arefactam istiusmodi cadauerum carnem assumunt, non autem eorum infarctum, ueluti seplastrorum quam plurimi, qui carnes & ossa contundunt, eaq; medicamentis admiscunt, quæ mumiam exposcunt. Necesse igitur esset legitimum nummum expetentibus, ut in hospitalibus nostris cadauera obuentium aloë, myrrha, & croco repleti curarent, eamq; deinde suo tempore exini. Hanc tamen nostram sententiã pluribus resellere contedit Petrus Bellonius Cenomanus, uir ex eo fortasse peritus iudicandus, quod profiteatur se Asiam, Græciam, Syriam, Aegyptum, & Arabiam peragrasse. Quippe qui putet, non aliam esse Mumiam apud Græcos, & Arabes, quam pissasphaltum. Sed quod eius argumenta non sint tanti momenti, ut oppositum nobis persuadere possint, et quod potius idem hallucinetur, in epistolis, quas conscribere institui, adiuuante Deo, latius ostendam. Vbi etiam plurima eius errata attememus, quæ in libellis, quos tum de medicamentis cadauera seruantibus, tum de resiniferis arboribus, tum etiam de piscibus condidit, legendo adnotauimus. Quandoquidem nostrum in primis institutum non est in his commentarijs nostras ad unguem tueri sententias, atq; ab erroribus, quibus notati erimus, nos uindicare; sed quantum possumus materiam medicam à mendis expurgare, eamq; illustriorem reddere, & in pistrinum candorem restituere conamur. Porro Mumia, de cuius uiribus iam nobis differendum est, (ut Arabes tradunt) quam plurimis pollet facultatibus: siquidem secundo ordine tum siccatur, tum excoact: capitis dolores frigiditate abortos absq; humorum præsentia mulcet. Medetur hemicranæ, paralysi, oris distractionibus, comitialibus, uertiginosisq; si ex amaraci aqua naribus immittatur. Leucoij oleo, siue hyoscyamino grani pōdere subacta, ad aurium dolores frigidos utiliter in eam concavitatem infunditur. Prodest quatuor granorum pondere ex thymbræ decocto resoluta, gulæ cruciatibus. Epota ex zizypharum, hordei, et myxorum decocto tribus diebus continuis, tuſsientibus opem non modicam præstat. Granorum item quatuor pondere sumpta ex aqua menthæ cordis affectus remouet: cum decocto uerò cumini, annui, & cari, tum uentriculi, tum intestinorum status discutit. Bibitur utiliter ab alto deuolutis ex siliquæ Aegyptiæ medulla, additis Lemnia sphaſragide, & rubiæ radice. Hausta trium, uel quatuor granorum pondere singultum inhibet, si tamen ex cumini, & apij decocto assumatur. Erinis inposita, additis moscho, castoreo, caphura, & oleo balanino, naribus commodè inditur ad diurnos capitis dolores; præsertimq; cum, adhibitis alijs, contumax morbus non soluitur. Garizatur cum oxymelite aduersus anginam: & ad lienis affectus ex cari decocto utiliter bibitur: & contra lethalia uenena ex decocto tribuli marini, et foetidi laserpitij gummi inuamento non modico sumitur. item ex mero contra scorpiionum ietus bibitur, iectisq; locis cum recenti bubulo butyro utilissimè imponitur. Adstringit mumia illita externa sanguinis profluvia, pota uerò interna: proinde perutilis ad cruentas excreationes. Ex caprillo lacte pota opitulatur exulcerata uesciæ, internis penis desquamationibus, & urinam ægrè continentibus. Non desunt qui credant, humanorum cadauerum ossa in puluerem redacta, & in potu exhibita uarijs corporis languoribus prodesse, os suum uni-

Bellonij opinio explosa.

Mumie uires.



Bituminis hi  
flor. & vires  
ex Galeno.

Nomina.

cuiq; membro tribuentes. Quod penitus resellendum non est: siquidem ipse pluries uidi in comitiali morbo cranium humanum in puluerem redactum maximè proficisse, sicuti etiam calculosi renibus, & eorum doloribus. Sed ad Bitumen redeamus, à quo nos penè distinxerat mumia, ne à nostro instituto recedamus. Huius meminit Galenus lib. xi. simpl. medic. sic inquit. Bitumen, unum & ipsum est ex ijs, quæ in aqua marina proueniunt, & in alia quapiam, quæ non est marina dissimilis, ut in Apollonio Epiri, & per alia id genus loca, multis aquis sponte nascentibus, cuius una quedam innatans hoc medicamen reperitur, & molle quidem est, dum innatat, postea uerò ressecatum pice sicca durius efficitur. Optimum uerò bitumen in mari, quod mortuum uocant, prouenit. Est autem id stagnum salsum in cœle, hoc est caua, Syria. Ceterum medicaminis ipsius uis est tum ressecatoria, tum excafactoria in secundo ordine. Merito itaq; eo utuntur & ad glutinationes uulnorum cruentorum, & ad alia omnia, quæ exiccari debent cum modica excafactione. Nomen eius Græcum est ἄσφαλτος: Latinum, Bitumen: Arabicum, Hafral iendi, siue Chefer alibeud: Italicum, Bitume, & Asphalt: Germanicum, Iuden leim. Πισσάφαλτος uerò sic Græcis dicitur, ut Latinis Pissasphaltum: Arabibus, Mumie, Mumiay, seu Mumia: Italis, Pissasphalt: Hispanis, Cera de minera.

## Cupressus.

## Cap. LXXXVI.



Cupressi hi-  
storia.

CUPRESSVS refrigerat, & astringit. Cuius folia ex passio, & exiguo myrrhæ pota, uelicæ rheumatismis & urinæ difficultati auxiliantur. Pilulæ autem ex uino tussæ in dysenteria, alui fluxione, tussi, & orthopnoea, aut si reijciatur sanguis, conuenientissimè bibuntur: earum decoctum eosdem præbet effectus: tussæ cum fico duritias emolliunt, nariumque polypo medentur: in aceto coctæ, & cum lupinis detritæ scabros ungues ejciunt: hernias intestinorum prolapsu erumpentes illitu reprimunt. Folia cadem præstant. Pilulæ cum arboris coma suffitæ, culices abigere existimantur. Folia trita, & imposita uulnera conglutinant, sanguinem supprimunt: trita ex aceto capillum tingunt: illinuntur perse, aut cum polenta ignibus sacris, ulceribus quæ serpunt, carbunculis, & oculorum inflammationibus: admota cum cerato stomachum corroborant.

TAMETSI Cupressus arbor notissima sit in Italia: quia etsi vulgaris sint notitiæ eius fructus, quos tam Græci, quam Latini conos appellant; attamen cum nihil de eius historia memoria prodiderit Dioscorides, ut lectoribus undequaq; sit satisfactum, hic nobis differendum est, quantum hac in historia à Plinio, alijsq; nonnullis edocti, cognoscere quiuimus. Aduena igitur quoniam tam fuit Italiæ Cupressus, & difficillimè nascentium, natuq; morosa, ut quæ in educatione plurimum diligentie expetat, & præsertim in locis, ubi suapte natura non prouenit. Tradiderunt ueteres cupressum Diti sacram: & ideo funebri signo eius ramos ante domos ponere solebant, ubi aliquis defunctus iaceret. Ex quo more creditur eius umbra infausta, nec quidem gratiosa. Duo

habentur Cupressi genera, mas scilicet, & foemina: hæc meta in fastigium conuoluta: ille uerò ramos in latus sparsus. Harum patria, ac proprium natale solum Creta insula est. namq; inibi quocunque loco terra moueatur, subactaq; sit, nisi serantur alia, hæc sua sponte gignitur, atque protinus emigrat. In Idæis etiam montibus, qui ad Troædem spectant, non appellato solo, Cupressus numerosa sponte profilit. Quod admiratione non uacat, alibi non nisi tempore, & perquam diligenti cultura proueniens, & cultorem magnopere fastidians. Odere Cupressi flumina, lacus, omnesq; aquosos tractus. quo fit, ut in eiusmodi locis satæ confestim inarescant. Quod si rectè sciuisset Adamus Lonicerus, non tam facile (ut puto) scripsisset, cupressum humidis gaudere locis. Aspernantur & finium, quo etiam, si circumfossura impleatur, non multo post tempore pereunt. Mira est Cupressi fecunditas: etenim trifera est. colliguntur eius coni mensibus Ianuario, Maio, & Septembri. Semen ijs innascitur, granis adeo pusillis, ac nimis, ut atomis comparari possit: ob id enim agrè perspicitur. Non omittendum naturæ miraculum, ex tam paruo semine gigni tam proceras arbores. Semen mire formicis expetitur, ampliatio etiam miraculo, tantuli animalis cibo absumi natalem tantarum arborum. quo fit, ut fructifera Cupressi nunquam formicis sint destituta. Cupressus perpetua coma uiuet, eiusq; materies nec cariem, nec uetustatem sentit, ut etiam cedri, ebeni, loti, taxi, buxi, & oleæ. Proinde ueteres non aliam ob causam ex cupressina materie simulacra sculpebant, nisi quod ad eternam diuturnitatem permanens putarent, ueluti Romæ illud Iouis in arce. Fert & Cupressus liquidam resinam larigne similem, sapore uerò acerrimam. Reliqua semina tradunt, folijs cupressi tussis si misceantur, à uermiculis quibuscunq; non tangi, neque erodi. Lignum autem (ut aiunt) nulla temporis diuturnitate sua uolentiam exiit. Sunt qui præ-

Adami Loni-  
ceri lapsus.



illam cupressum, nonnullis etiam Cipresso uulgò dictam, abrotonum fœminam uocent, à similitudine, quam hæc cum arbore in multis habet. Idcirco nec fortasse aberraret, qui certò crederet, Plinium lib. XXI. capite xv. de chani cyparisso herba differentem, de hac intellexisse: præsertim cum tradat, ipsam ex uino potam contra serpentium omnium uenena, scorpionumq; ictus pollere: siquidem & nostra hac ætate pleriq; abrotonum fœminam ad idem usurpant. Quod item ad alui tineas necandas bellarijs immiscet, ut arte pueros ad comedendum alliciant. Hetrusci hanc Santolina uulgò uocant, de qua cum libro tertio in abrotoni mentione nobis latius sit disserendum, hic plura dicere superuacaneum esset. Cupressi meminit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Cupressi folia, germina, pilulæ recentes, & molles magna uulnera conglutinant in duris corporibus: ex quo clarum est, quod resiccandi uim habeat absque insigni acrimonia, aut caliditate, sicut certè & gustus testificatur. Apparet enim in ea leuis quidem acrimonia, sed plurima amaritudo, multoq; etiam plus acerbatis in tota plantationem, aut caliditatem in corporibus efficiat. Proinde in alto latentes in flaccidis, putrescentibusq; affectibus humiditates innoxie, tutoq; depascitur, atque absunt: cum quæ excalfaciunt simul, desiccantq; eas quidem quæ continentur sunt, absument: cæterum acrimonia, & caliditate alias attrahant. Sic enterocelicos iuuat: siquidem exiccant, roburq; addit corporis partibus præ humiditate laxis, utpote cum adstrictio in altum subeat, deducente ipsa caliditate, quæ admista est, cum seruante modum, ut deducere quidem ualeat, non tamen mordicare queat. Quidam etiam utuntur ad carbunculos, & herpes polenta miscentes, tanquam absumat citra excalfactionem eos morbos facientem humiditatem. Sunt qui ad erysipelata utantur admista nimirum polenta cum aqua, aut oxycrato aquoso. *Kupressos* Græcè uocatur: Latine, Cupressus: Arabicè, Saro, aut Seru: Italicè, Cipresso. Germanicè, Cypressen: Hispanicè, Cipres: Gallicè, Cyprez.

Cupressus pa  
silla.Cupressi ui  
res ex Gal.


Nemina.

## Iuniperus.

## Cap. LXXXVII.

IUNIPERI genera duo: altera maior, altera minor. utraque acris est. Excalfacit, & urinam mouet: accensa serpentes fugat. Baccarum nonnullæ nucis iuglandis magnitudine nonnunquam grandescere, aliæ nucem Ponticam æquare inueniuntur, rotundæ, odoratæ, in mandendo dulces, subamaræ, quæ arceuthides etiam, id est, baccæ Iuniperi, nominantur. Modicè calfaciunt, & astringunt, stomacho utiles: contra pectoris uitia, tussim, inflationes, tormina, & serpentium ictus efficacissimè bibuntur: urinam cient, unde ruptis, conuulsis, & uulue strangulatui subueniunt. Folia acrimoniam habent: ideo tam ipsa, quàm eorum succum ex uino contra uiperarum morsus illini, aut bibi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus, lepras eximit.

REPERIUNTUR Græci Dioscoridis codices (ut etiam adnotatum reliquit Marcellus) in quibus Iuniperi caput prorsus deprauatum legitur, quibusdam additis, quæ Dioscoridis doctrinam minime sapiunt. Siquidem nec Galenum, nec item Paulum Aeginetani, minusq; Serapionem, qui tamen uerbotenus Dioscoridis scripta per capita singula refert, illud usquam posteritatis memorie prodidisse constat, quod scilicet ramenta ligni Iuniperi epota homines perdant; præsertim cum eius baccæ contra serpentium ictus efficacissimè deuorentur: bibatq; ac illinatur foliorum expressus succus ad uiperarum morsus. Adde etiam quod falso periculo id omnino falsum esse deprehendatur. Quare uò modo non credendum, sed ne cogitandum quidem, eiusmodi ineptias à Dioscoride scriptas: quin potius illi adscriptas esse existimandum. His ergo rationibus adductus, non temerè partem illam, ut

Iuniperi com  
sideratio.

pote additiam, ex hoc capite ressecandam duxi. Maior. & minor Iuniperi species in pluribus Italiae locis reperitur. Tuscia urbanas alit, quæ in proceram arborem assurgunt, uisunturq; hæc frequentes in agro nostro Senensi: quarum fructus syluestribus & crassior, & dulcior habetur. Iuniperi materies ad centenarios annos incorrupta perdurat: proinde iussit Hannibal (ut Plinius tradidit libro XVI. cap. XL.) templum Dianæ Ephesie Iuniperinis trabibus extrui, quod per multas ætates esset duraturum. Igitur mirari non licet, si chymistæ assueuerant, carbonem Iuniperinum accensum, & suo cinere obrutum ignem integro anno fuere. Profert ex se Iuniperus gummi mastichæ simile, quod & Sandaracham, & Vernicem appellant. Hoc primum cum metitur, candido splendescit colore: senescens uerò in rufum abit. Porro haud ignorandum est, hæc Arabum Sandaracham à Dioscoridis Sandaracha perquam longè disidere. Namq; Græcis Sandaracha est fossilis ad arsenici, siue auripigmenti genera referenda, erodens, & exitiale medicamentum, ut amplius in quintò libro, Deo duce, dicemus. Verùm hæc Sandarachæ nomenclatio in gummi

Gummi Iuni  
peri.



Gummi Iuniperi usus.

Sandaracha alia Plinii.

Iuniperi uires ex Gal. Nomina.

mi Iuniperi inuenta fuit à medicis, qui Mauritanos secuti sandarax Arabicum nomen (sic enim Arabes Iuniperi gummi uocant) in sandaracham conuerterunt. Quamobrem illud adnotandum esse uidetur, quod ubi Arabes, sandaracham medicamentis inferendam esse præcipiunt, gummi Iuniperi immiscendum intelligunt: ubi uero à Grecis de sandaracha fit mentio, fossilis illa rufa, & auripigmento similis, est intelligenda. Non desunt tamen qui uelint Mauritanorum Sandaracham non esse gummi Iuniperi, sed Oxycedri. Quorum equidem iudicio ausim facile subscribere. et enim pauci admodum sunt, qui non putent oxycedrum esse Iuniperum maiorem: adeo ut plerique uulgarium illam ab hac nesciant distinguere. Tradit Plinius lib. XIII. cap. XI. plura gummi genera, ubi gummi Iuniperinum ad nihil esse utile scribit. Cuius tamen frequens usus in medicamentis contrariū indicat. Quippe hoc syncero, & oleo ex lixi ni semine presso, fit uernix liquidus: cuius est usus ad illustrandas picturas, & ad nitorem ferri conciliandum: utilis etiā unum ad ambusta, & præcipuus ad dolores, & tumores hæmorrhoidum. Siccus uernix, hoc est gummi Iuniperi (ut author est Serapio) destillationes suspendit, mensum profluvia sistit, sinus exicat immixtus, haustus uero pituita tam, quæ uentriculo, & intestinis hæserit: tineas & cætera uentris animalia necat. Nervi resolutionibus, quas humores frigidi contraxerint, opitulatur. Capitis destillationes suffitu discutit. Idem exceptus sanguinis excretionibus suppressit, & hæmorrhoidas fluentes illitus. Addito tum rosaceo, tum myrtino sedis rimas coerces, & hiantibus frigore manuum, pedumque, scissuris illitu succurrit. In summa calcacit, & siccatur primo recessu. Est & Sandaracha ceraginosi mellis genus apud Plinium, qui de ea libro XI. cap. VII. ita scribit. Præter hæc conuehitur Eribithe, quam alij sandaracham, alij carinthum uocant. Hic erit apium, dum operantur, cibis, qui sæpe inuenitur in fauerum inanitatibus sepositus, & ipse amari saporis: gignitur rore uerno, hæterius Plinius. Ceterum oleum, quod ex Iuniperi materie (ut chymistæ dicunt) per descensorium duobus aduersis fistilibus, tum pariter uitreis instrumentis elicitur, calidum ore contentum dentium dolores mirifice mulcet, si tamen frigida defluxione afficiantur. Fit ex buccis hoc longè præstantius, odore perquam iucundo. Iuniperi meminit Gal. lib. VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Iuniperus, calida, & sicca utrinque, tertij ordinis. At fructus similiter quidem calidus est, sed non similiter siccus, uerum in hoc primi fuerit ordinis. Arbor Græca uoce ἀρνυβίς dicta, Latina Iuniperus appellatur: Mauritanica, Arconas, aut Archencas: Italica, Ginepro: Germanica, Vuerholter, & Krametbaum: Hispanica, Enebro: Gallica, Geneure. Eius autem gummi Græci uocant κόμμι ἀρνυβίς: Latini, Gummi iuniperi: Mauritanici, Sandarax: Itali, Gomma di ginepro: Germani, Verns: Hispani, Verniz: Galli, Vernix.

### Sabina.

### Cap. LXXXVIII.


SABINA duorum generum est. Vna folijs cupresso similis, spinis horridior, grauius olens, acris, & feruens. arbor est coactæ breuitatis, quæ sese magis in latitudinem fundit. huius folijs nonnulli pro suffitu utuntur. Altera tamarici folio similis est. Vtriusque folia nomas sistunt, collectiones illitu mitigant, quin & cum melle illita nigritias, sordesque repurgant, & carbunculos rumpunt, cum uino pota sanguinem per urinam eliciunt: partus apposita extrahunt, & suffitu idem præstant. Vnguentis calfacientibus immiscentur, & priuatim glucino.

SABINA planta est in Italia uulgaris notitiæ, illa scilicet, quæ à Dioscoride primo generi assignatur, folijs cupresso similis, spinosior. uerum eius folia non adeo plenè uirent, ut Cupressi, & in cacumine aculeata conspiciuntur. Quod tamen sepe imperiti negotium exhibet: siquidem aliquando uidi pro sabina assumi quandam herbam dodrantalem, quæ quibusdam in montibus plurima nascitur, folio tamaricis, licet nec odore, nec sapore sabinam referat. Hanc sæpius existimaui esse Selaginem à Plinio lib. XXI. cap. XI. commemoratam. Namque inibi selaginem esse affirmat, sabinam stultem. Olim selaginem contra omnem perniciem habendam prodidere Druidæ Gallorum, & contra omnia oculorum uitia sustinere prodesse. At tanta extitit tunc temporis superstitionum uirgorumque uanitas, ueluti & hoc æuo apud plerasque gentium turbas uisitur, ut ij nunquam ad selaginem legem accedere, nisi prius Dijs sacra fecissent. Quin & eam inualidam omnino censebant, nisi dextra manu, & nudis pedibus legeretur. Ceterum non desunt, qui plantam hanc, cuius hic imaginem damus, negent legitimam Sabinam esse, hoc, ni fallor, argumento, quod hæc baccas proferat, quarum in sua Dioscorides non meminit. Vnde factum est, ut quidam putauerint, eam maiorem iuniperum esse, alij uero thuiam, quam Theophrastus memoriæ prodidit lib. & cap. V. de historia plantarum. Verum utriusque meo iudicio, in errore uersantur: illi quidem, quod hæc planta nec folio, nec flore, neque fructu, non materie, non odore, neque sapore, non cæteris denique notis iuniperum referat: hi uero, quod thuiam, ut est auctor Theophrastus, nascatur apud Ammonis

Sabinæ consideratio.

Selago Plinii.

Opiniones quorundam reprobatae.



quarum in sua Dioscorides non meminit. Vnde factum est, ut quidam putauerint, eam maiorem iuniperum esse, alij uero thuiam, quam Theophrastus memoriæ prodidit lib. & cap. V. de historia plantarum. Verum utriusque meo iudicio, in errore uersantur: illi quidem, quod hæc planta nec folio, nec flore, neque fructu, non materie, non odore, neque sapore, non cæteris denique notis iuniperum referat: hi uero, quod thuiam, ut est auctor Theophrastus, nascatur apud Ammonis



monis delubrum, atq; in Cyrenensi agro, forma cupresso similis cum ramis, tum folijs, caudice, fructuq; , uel potius ceu cupressus syluestris . præterea quod , ut idem scribit , thuiæ materies omnino incorrupta perduret , nihil eius radice crispius sit , atq; simulacra ex ea antiqui sculpere sint soliti , quemadmodum ex cedro , cupresso , loto , & buxo . Hæc autem arbor conos seu galbnlos non fert cupressi modo, sed baccas : caudice non attollitur longo , sed eo breui contenta est : materie non constat incorrupta solidaq; , sed caduca & fungosa : non ut thuiæ peculiaribus locis gaudet , sed ubiq; ferè locorum nascitur . ut hinc maius atq; enidentius discrimen in ijs plantis appareat , quàm ut illorum error , qui eas unam faciunt thuiam, pluribus explodi mereatur . Sed certè relinquitur , ut miremur eos , qui stirpem hanc , quam depictam exhibemus, ueram Sabinam esse inficiantur, cum nullis careat notis ex ijs, quas illi Dioscorides reddidit . Ea enim arbor conspicitur coactæ breuitatis, quæ in latitudinem magis effunditur , folijs cupresso similis , spinosior tamen : quin & grauius olet, & acris feruensq; sentitur . Atqui illud nobis obijciunt, quod Dioscorides in describenda Sabina nullam baccarum mentionem fecerit . id nehercule , quod legatur, non fecit . Sed quid dicent ij, si in quàm plurimis plantis ex ijs etiam , quæ ab omnibus legitime habentur , plures notæ, & ex quidem præcipuæ , nonnunquam desiderentur, quas nimirum Dioscoridem omisisse credendum est , uel quod plantæ eæ esset alioqui uulgo cognita, uel quod omnes earum partes non satis exploratas haberet, uel alias ob causas , quas prosequi non est hic locus . quarum omnium aliqua facile potuit esse, cur Sabine baccas non adnotatas reliquerit . Addam & id fortasse ex eo euenisse, quod Sabina frequentior sterili occurrat, quàm fructifera . Nam (ut equidem fateri possum) inter iunueras Sabine plantas , quas uarijs in locis mihi uidere contigit, tres duntaxat memini me obseruasse, quæ baccas ferrent, & eas quidem rubentes ac iuniperinis maiores . Id quod me quandoq; adduxit , ut putauerim in hoc Sabine genere marem & fœminam reperiiri : atq; alteram raram esse in Italia , quemadmodum eam quoq; raro uidimus , quam Dioscorides secundo loco representauit, tamarici folijs similem, non autem aculeatam . Ex ijs igitur merito colligendum esse arbitror, hanc nostram Sabinam esse legitimam, ut quæ non solum notis Dioscoridis delineationi pulchre respondeat, sed etiam facultatibus . Porro Petrus Bellonius de arboribus coniferis differens, ijs ineptè satis , meo quidem iudicio, Sabinam admiscet : atq; in ea describenda, quam secundo loco ponit Dioscorides, mihi non parum hallucinatus deprehenditur, quod constanter affirmauerit se uidisse frequentissimum hoc Sabine genus in Amanico & Olympo Phrygiæ montibus, tota facie iuniperum maiorem refereus, magnitudine amygdalæ arboris maioris , folijs cupressæ per omnia similibus, baccis per maturitatem in cæruleo nigricantibus , & caudice resinam ferente . Etenim Dioscorides non tradit quæ sit huius plantæ facies, & quæ magnitudo , sed eam in folijs tantum à priori uariare scriptum reliquit . Quod non alia de causa auctorem hunc fecisse reor, quàm quod sciret nullum utriusq; esse in reliquis uotis discrimen . Quare quod alterum Sabine genus tota facie iuniperum maiorem referat , magnitudine amygdalum arborem æquet , cupressum folijs profus æmuletur , & ex caudice resinam fundat , ut Bellonius suum depingit , mihi quidem plane absurdum uidetur . Sed quod rem hanc turpiter cuiusdæ Bellonius, uel ex eo manifestum esse puto, quod quam plantam uincit Dioscoridis alteram Sabinam asserit, eandem paulò post arborem illam constituit , quam Plinius lib. xii. cap. xvii. Brutam appellat , quasi Plinius non meminerit utriusque Sabine lib. xxi. cap. xi. Tantum quidam suis peragrationibus tribuendum esse putant, ut eos non pudeat sepe absurda, & fabulosa , & quæ cum summis & probatissimis authoribus pugnent , uarrare ac scriptis tradere . Neq; certè id propterea dico , quod peregrina fiones damnum, quas semper, Galeni exemplo, utilissimas duxi ad legitima simplicia medicamenta cognoscenda . Sed optarem, ut ij, qui multas regiones peragrarunt , illa tantum in medium proferrent, quæ essent rationi & ueritati consona, & ueterum scriptorum auctoritate comprobata . Quod si à Bellonio , qui tot terras se peragrassè profitetur , factum esset, nimirum eas laudes iure sibi comparasset , quæ rei medicæ inquisitoribus maxime debentur . Atque hæc obiter dicta sint . Quod autem idem Bellonius primum Sabine genus eam arborem suspicetur , quam Theophrastus thuiam nominat, non miror . uam & alij idem sentiunt . Verum quandoquidem hanc opinionem superius abunde ( uel fallor) improbauimus, ideo hic non est ut plura addamus, atq; idem repetere superuacuum esset . Reliquum igitur est, ut Sabine suas uires reddamus : de quibus Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum disseruit ijs uerbis . Sabina ex numero est fortiter exiccantium, idq; secundum tres qualitates, quas in gustu præ se fert, similiter cupresso, nisi quod ea & acrior est, & ut sic dixerim, magis aromatica, seu odoratior . Igitur huius , quam modo dixi qualitatis est particeps, nempe acrimonia superat, tantò etiam potentius digerit . Itaq; glutinare nequit ob siccitatis, & caliditatis robur . uam utriusq; illi tantum inest, ut etiam tendat, & inflammationem afferat . At putredinibus similiter cupresso accommodari potest , maxime ubi rebelliores fuerint , & diuturniores . uam hæc citra noxam uim medicamenti perferunt . Quin & quæ atra sunt reddita , & admodum sordida , ea cum melle expurgat : carbunculos item soluit . Porro essentia tenuitate menses quoque prouocat , ut si quid aliud , & sanguinem per uenas mouet . Factum etiam uiuentem interficit , & mortuum eicit . Esto autem hoc medicamen tertij ordinis, tum ex calfacientium, tum desiccantium ex numero eorum, quæ uel maxime tenuium sunt partium . Et hoc utiq; nomine ugentis inditur , & maxime glucino , & in multas antidotos iniicitur . Quidam uerò etiam cinnamomi uice duplum eius subiiciunt . Est enim extenuandi , & digerendi facultatis , si epotum fuerit . Prædus Græcè, Sabina Latine uocatur : Arabicè, Abel, Abhel, seu Alharar : Italicè, Sabina : Germanicè, Seuenbaum : Hispanicè, Sabina : Gallicè, Sauiniera, aut Sauinier .

Petri Bellonij erratum.

Sabine uires ex Galeno.


Nomina.



## Cedrus.

## Cap. LXXXIX.

**CEDRVS** arbor magna est, ex qua picem colligunt, quæ cedria uocatur. Iuniperi modo bacca parit, baccarum myrti magnitudine, rotundas. Cedria optima est crassa, perlucida, grauis odoris: quæ dum effunditur, guttatim non dissipata coit. Cui ea uis inest, ut defuncta corpora conseruet, & uiuentia corrumpat: qua ex causa mortuorum uitam aliqui eam appellauere. Vestimenta quoque, & pelles eximia calfaciendi, & siccandi dote, corrumpit. magni ad ocularia medicamenta usus: quippe illita oculis claritatem affert, albugines cicatricesque detergit: instillata autem cum aceto, uermes aurium necat: cum hyssopi decocto infusa sonitus, sibilosque sedat: cauis dentium indita eos frangit, & dolores leuat: idem facit cum ex aceto colluitur: peruncto ante coitum genitali, concipiendi uim adimit: anginae ea perunguntur, tonsillarum inflammationibus auxilio est: lentes, pediculosque illitu enecat: cerastæ moribus cum sale imposita subuenit: contra hausta leporis marini uenena, in passo sumpta, auxiliatur: in elephantia aut linctu, aut perunctione proficit: pulmonum ulcera purgat, & si cyathus eius absorbeatur, persanat: uermes, & tineas subter indita necat, & partus extrahit. Fit & oleum à cedria separatum dum coquitur, uel leribus supra halitum eius expansis, ut in pice. Eiusdem ad omnia usus: priuatim uehementer perunctum, scabiem quadrupedum, canum, bouumque persanat: ijsque inherentes ricinos enecat, & ulcera, quæ ex tonsura acceperunt, ad cicatrices perducit. Cedrides cedri fructus uocantur. Calfactorem uim habent: stomacho aduersantur: auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, stranguriæ: menses ciunt ex polline piperis poti: contra haustum leporum marinum in uino sumuntur: serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino, aut medulla, corpore. In antidota adduntur. † Fuliginem, quomodo ex pice, congeri oportet: quæ eandem, quam picea fuligo, uim præbet.

**CEDRVS PHOENICIA.****CEDRVS LYCIA.**

Cedri arboris confid.

**CEDRI** arboris Theophrasto, Plinio, & Galeno duplex est genus, nempe maius & minus. Maius omnibus arbor est eximia magnitudinis, & proceritatis, atque à minori planè differens materie, cortice, folijs, & fructu. Plinius maioris cedri duo genera facit lib. XIII. cap. V. ubi ita scribit. Et maioris cedri duo genera. quæ floret, fructum non fert: fructifera non floret, & in ea antecede ntem fructum occupat nouus. Semen eius cupresso simile. Quædam cedrelaten uocant. Ex hac resina laudatissima. m aterie uerò ipsi. aternitas. itaq; & simulacra deorum ex ea factitauerunt. Et libro XXIII. cap. V. idem inquit. Cedrus magna, quam cedrelaten uocant, dat picem, quæ cedria



aria uocatur. haecenus Plinius. Qui fortasse non inepte magnam cedrum cedrelaten appellauit, quoniam cedri arbo-  
res, quae in monte Libano proueniunt (ut mihi retulerunt amici, qui uniuersam ferè Syriam peragrarunt) tota facie  
abietem referunt. Abies autem Graecis ἐλάτη dicitur. unde cedrelate poterit cedrabies Latine reddi. Arbor haec  
(ut idem mihi narrarunt) adeo magna & procera est, ut nusquam arborem se uidisse affirmant, quae cedrelaten ma-  
gnitudine excellat. Cortice uestitur laui & glabro, ea parte excepta, quae à terra ad primos usq; ramos attollitur:  
haec enim aspera cernitur. corticis color est cen loti arboris. Rami ab imo usq; ad cacumen ferè in rotæ modum per  
interualla caudicem cingunt, & spatiantur: qui tanto minores uisuntur, quanto superius erumpunt. hinc est, quod  
enimus conspecta arbor pyramidis faciem representat. Folia illi capillata assignant, ueluti larici, uel pino, breuiora  
tamen, & minime aculeata. id quod etiam testatur Plinius lib. xvi. cap. xxiiii. Conos profert piceis æmulos,  
uerùm longiores, duriores, & negetiores, pediculo pertinaciter inherentes. in quibus semen includitur cupressò  
simile, ut Plinius tradit. Caudex resinâ fundit albam, & liquidam: sed tractu temporis, solis feruore in grumos con-  
crescit. Sunt qui asserant, hanc cedrum duplicem resinam ferre: atque alteram intra corticem uomicae modo coacer-  
uari, ut abiegnam lacrymam in abiete oriri superius diximus: alteram uerò extra corticem emanare. utranq; ab ar-  
bore cedriam nominant. Hæc sunt, quæ de magna cedro à peregrinis accepi. In quibus utiq; admirari subit, quod  
Theophrastus, & hunc fortè secutus Dioscorides scripserint indifferenter cedri genus omne fructum edere iuniperi  
baccis similem, crassiorẽ. nam reuera Cedrus magna, de qua hic tantum scribit Dioscorides, conos parit piceis si-  
miles. Porro Cedrus cor habet durissimum, ac odoratum, colore perinde rubens atque larignum. Tota cedri mate-  
ries durissima. quam ob causam credidere maiores, eam neq; cariem, neque uetustatem sentire, sed æternam esse.  
Quæ etiamnum ratione ductus Salomon Hebreorum rex Dei optimi maximi templum Hierosolymis ex cedri materie  
extruendum curauit. Ex ea quoq; prius simulacra factitarunt, existimantes tantam illis inesse diuturnitatem, quan-  
tam marmoreis, aut metallicis. Cedri materies optima nauigijs non modò extruendis, sed & palatiorum, & arcium  
fabricis conueniens: quippe quoniam incorrupta quasi in perpetuum perdurat. Cedrus saxosis & frigidis locis gau-  
det, & montes amat præ cæteris tractibus. Perpetua coma uiret, qua si castretur, decacuminata demoritur, nec  
unquam inde regerminat, utpote & cupressus, pinus, larix, & aliarum plures. In Aegypto ac Syria (ut Theopha-  
stus & Plinius narrant) reges inopia abietis cedro ad classes feruntur usi. Maxima ea in Cypro traditur ad undecire-  
centum Demetrii succisa, centum triginta pedum longitudinis, crassitudinis uerò ad trium hominum complexum.  
Cæterum minoris cedri binæ item species sunt (ut prædicti auctores testantur) Lycia, & Phœnicia, iuniperi si-  
militudine. Differunt folio: nam Phœnicia folium habet iuniperi, durum, spinosum, acutum, & ob id oxycedros ap-  
pellatur. Lycia uerò folio constat minore, frequentiore, longè minus aculeato, ut ita iuniperum paruam quadante-  
nus referat: cortice obducitur subrubro, & ramos emittit lentos, utilium uisus. Vtraque omni tempore fructum  
gerit: uerùm in oxycedro maior & pulchrior spectatur. Phœnicia cedrus frequentissima nascitur in Istria, atque  
etiam in nonnullis Iapidie locis, iunipero admodum similis, nec nisi fructu differens, maiore, rubente, ac dulci: quo  
tamen eam incolæ à iunipero nesciunt secernere. At cum ipse oxycedri ramusculo essem donatus à Georgio Resina-  
gero primario prouinciæ Carniolæ medico, qui illum ex Pesino Istriæ oppido secum attulerat, rubentibus baccis un-  
dique refertum, eaq; in memoriâ haberem, quæ apud Theophrastum, Galenum, ac ueteres alios legeram, mihi qui-  
dem fructum inueniendi statim inclinuit animus, hanc plantam minorem esse cedrum. Etenim (ut memorant stirpium  
scriptores tum ueteres, tum recentiores) difficile admodum esset dignoscere oxycedrum à iunipero, nisi huic ceru-  
leus, pumilusq; illi uerò flauus rubensue, ac grandior fructus inesset. Eam igitur plantam, quam in Istria nasci di-  
ximus, & cuius hic effigiem damus, non maioris cedri genus ullum, sed minoris speciem esse censemus, nimirum  
Phœniciam, quæ & oxycedros uocatur. De Lycia autem cedro quid sentirem, uel quam plantam pro ea in me-  
dium proferrem, haecenus non habui, ut quæ mihi placere incomperta esset. Sed hoc anno, dum Pragæ Bobenorum  
ago, plantam mihi ostendit Adamus Leonorus spectatæ doctrine, & magnæ spei iuuenis, ex quibusdam Morauie  
montibus à quodam uulgarî herbario pro Sabina allatam. Vt autem ille hanc ueram cedrum Lyciam adinuenit, &  
pro ea mihi demonstrauit; ita mihi eius cognitionem illi acceptam referre iucundum est: atque ideo ipsam pictura,  
quam hic damus, exprimere curauimus. Huius plantæ folia si digitis atterantur, suauissimum spirant odorem, illi qua-  
damtenus similem, qui in pinorum strobilis percipitur. Ea baccas profert, longè tamen minores quàm altera, quæ in  
ramusculorum tantum cacuminibus prodeunt. Hæ non secus ac illæ primo exortu uirent, mox flauescunt, denique  
rubent ubi plenè maturuerint. Saporem habent subamarum, atque non obscure odoratæ sentiuntur. Manat ab ar-  
bore cedri (ut supra dictum est) etiam resina, quæ propriè Cedria dicitur, utilis ad multos in medicina usus. Sed  
hanc ad nos non adferunt Cyprij, neque mercatores, qui ex Syria mercimonia conueunt: tametsi regiones illæ plu-  
rimis (ut aiunt) cedris maioribus scatant. Petrus Bellonius lib. 111. de medicato funere, item libro de coniferis  
arboribus putat non modò cedrum Cedriam fundere, sed & piceam, tedam, laricem, cupressum, iuniperum & be-  
tulam. Quinetiam idem suis malè excogitatis cedrijs eas omnes facultates assignauit, quas Dioscorides, Galenus,  
& alij quædam plurimi auctores cedriæ duntaxat reddiderunt: adeo ut magno ac ridendo errore dixerit suas hæc ce-  
driæ defuncta corpora conseruare, quemadmodum ea conseruat legitima cedria. quasi idem quoque uelit, quod pi-  
cea, pinus, larix, cupressus, iuniperus, & betula nullis prorsus inter se facultatibus differant. Neque certè alia  
uidetur mihi auctoritate uel ratione ductus, ut in hanc iuerit sententiam, quàm hæc, quod scripserit Plinius lib. xvi.  
cap. xi. piceam in Syria cedrium uocari. Sed quod Bellonius maxime hallucinetur, utpote qui Plinium non rectè in-  
tellexerit, ex uerbis Plinij, quæ modo subiiciam, satis, ut puto, manifestum fiet. Pix, inquit, liquida in Europa  
è tecta coquitur naualibus muniendis, multosque ad alios usus. Lignum eius concisum furnis undique igni extra cir-  
cundato feruet. Primus sudor aquæ modo fluit in canali. Hoc in Syria cedrium uocatur. cui tanta uis inest, ut in  
Aegypto

Cedri mino-  
ris genera.Bellonii opi-  
nio falsa.



Aegyptio corpora hominum defunctorum ea perfusa seruentur. Ex ijs Plinij uerbis non aliud (neo quidem iudicio) intelligi potest, quam quod Syri liquorem illum cedrium uocauerint, quoniam olim ij ex cedro tantum picem suam conficiebant, ut ea in Europa et teda sit. Quod autem pix ex cedro paretur, authores esse possunt Dioscorides, Galenus, & Plinius; non tamen contra, quod cedria ab alijs resiniferis plantis defluat. Adde quod à ueteribus, nempe Theophrasto, Dioscoride, & Galeno, nusquam (quod equidem sciam) memoriae proditum est, resinæ aut picis genus ullum defuncta corpora conseruare, & uiuentia corrumpere, præter cedriam, de qua omnes illi id scriptis tradiderunt. Ex quo abunde constare arbitror, Plinium quidem loco citato de pice tantum cedri scripsisse, Bellonius uero in hoc similiter hallucinatum fuisse, atque in alijs pluribus rebus, ut aliquando, Deo inuante, latius ostendimus. Cæterum uariat in Dioscoridis codicibus de cedria lectio. Quippe uulgata βαρβία τῆς οἰκῆς habet, id est grauis odore, cum tamen antiquissimus codex manu scriptus habeat ἀρωγὸς τῆς οἰκῆς, id est uehemens odore. quod indicat cedriam esse uehementer odoratam, non autem grauiter olere. Quod etiam maximè testatur Virgilius libro

VII. Aeneidos his uersibus de Circe canens.

Proxima Circeæ raduntur litora terræ,  
Diues inaccessos, ubi solis filia lucos  
Assiduo resonat cantu, testisq; superbis  
Vrit odoratam nocturna in lumina cedrum,  
Arguto tenues percurrrens pectine telas.

Fuchsi op-  
nio.

Cedri & Ce-  
dreæ uires ex  
Galeno.

Gummi cedri meminit Fuchsius uir eruditissimus libro illo de componendis medicamentis, quem postremo locupletat-  
tum excudit, in compositione antidoti Mithridatis: proq; eo, quando non possit inueniri, lacrymā abietis substituen-  
dam præcepit, ratus utiq; eandem utriq; facultatem inesse. At ego quidem Galenum secutus malim ladanum substitui,  
tui, donec ab alijs aptiora proferantur, quorum meliori iudicio subscribendum sit. Neq; ineptè fortasse iuniperinum  
gummi illius uicem supplere poterit, quandoquidem constat omnibus rei herbariæ studiosis tantam inter cedrū & iuniperum  
esse similitudinem, ut altera ab altera uix discerni posset, nisi ea esset differentia, quæ in bacis utriusque  
manifesta deprehenditur. De Citris autem, quibus aurea totius ferè Italiæ uiridaria exornantur, tam in Tyrrheni  
quam Benaci litoribus, in sequentibus, capite de malis, ubi ipsorum mentionem facit Dioscorides, adiuuante Deo,  
plura dabuntur. siquidem arbor illa ab hac, de qua nunc agitur, plurimum differt. Cedri meminit Galenus libro  
VII. simplicium medicamentorum his uerbis. Cedrus specie duplex est, altera fruticosa iuniperis adsimilis, altera  
arbor non exigua. Vtraque est calida, siccaq; temperaturæ tertij quodammodo ordinis secundum utrunque. Cæte-  
rum Cedrea (uocatur ita cedri oleum) quartum etiam ordinem uidetur attingere, abunde calida simul, & tenuum  
partium. Molles itaq; carnes prompte citraq; dolorem putrefacit, sicut alia omnia, quæ cum eiusdem sint in calse  
ciendo ordinis, adiunctam etiam habent substantiæ tenuitatem. At in duris plusculo tempore, & uix operatur. Por-  
rò talia omnia medicamenta septica uocantur, & septa: sed inter sese maioris, minorisq; ratione disident. Est autem  
tem in hoc genere medicamentorum ex primo, & infirmissimo ordine cedrea: pleraque enim eorum admodum sunt  
efficacia. Talia itaque & mortuorum corporum carnes corrumpunt: at cedrea exiccat, simulq; à corruptione tuer-  
tur corpora demortua, utpote humiditates eorum superfluas depascens, cæterum solida corpora haud attingens. At  
in uiuentibus calor ipse, qui in corporibus est, cedreæ uires adaugens, causa efficitur, ut teneræ ab ea carnes deuran-  
tur. Nec mirum uideri debet, si cum tanta polleat potentia lendes, pediculos, & tineas, & in auribus natos uermes  
interficere ualeat, tum foetum apposita uiuentem quidem interimat, mortuum autem eiciat, sicut sanè etiam in cois-  
tu semen, pudendo circumlita. proinde conceptum impediens est medicamentum, si sic utaris, nulli secundum: alijs  
multa eiusmodi particulatim efficit. Itaque argumentum est, ipsum ualenter excalfacere, sicut ubi dentium forami-  
nibus instillatur: siquidem dolores eorum mitigat, sed & ipsos confringit. Extenuat quoq; oculorū cicatrices, &  
uisus hebetudini ab humorum crassitudine ortæ medetur. Porro quod eius est pinguisimum, & ad unguem oleosum,  
quod suspensus supra eam dum coquitur, lanis excipitur, ac colligitur, tota cedrea tenuius quidem est, sed minus ac-  
cre; quanquam non minus excalfaciens. Eandem quippe rationem habet ad id quod reliquum est cedreæ, crassius illud uidelicet,  
quàm oleum ad amurcam. Proinde illud utpote crassius, mordax est, & maiore aperiendi facultate  
præditum. Itaq; ulcera irritat, phlegmonenq; illis excitat. Porro oleosa illa cedrea adeo clementibus est uiribus, ut  
etiam plebeij experientia docti uulnera ouibus occasione tundendi à forfice facta, illa illita sanent, sicut etiam pice hu-  
mida. Utuntur autem ea & ad ouium scabiem, & ricinos, Græci κρότωνας uocant. Porro cedrides (nam ita fru-  
ctum cedri nuncupant) moderatiores uires obtinent, adeo ut comedi quoq; possint. Attamen si liberalius ijs utare,  
capiti dolorem inferent, ardoremq; ac morsum in uentre percipies. Quæ arbor Græcis κέδρος, Latinis item  
Dedrus nominatur; Arabibus, Serbin; Italis, Cedro. Eius autem liquor ut Græcè κέδρη, ita etiam Latine Ce-  
dria dicitur; Arabicè, Kitran, siue Albitran; Italicè, Cedria.

Nomina,

† Hic lectorem admonitum uolumus, illa de fuligine Cedri uerba non legi in Græcis tum uulgatis, tum etiam anti-  
quis quibusdam codicibus. Quare cum neq; à Marcello uertantur, qui plura exemplaria Græca habuisse fatetur, ea  
potius addititia, quàm legitima censenda uidentur.



## Laurus.

## Cap. XC.

**LAVRVS** quædam tenui folio constat, altera latiore. Vtraque excafactoriam naturam habet, & emollientem. Vnde decoctum earum in muliebres infessus additum, vuluæ, & vesicæ vitijs conuenit. Virentia folia sensim substringunt: illita quoque, ac trita uespærum apumque ictibus opitulatur: eadem cum polenta, & pane illita inflammationem omnem mitigant: sed pota stomachum effundunt, & vomitiones mouent. Lauri baccæ magis, quàm folia calfaciunt, ergo in eclegmate tritæ cum melle, vel passo prosunt tabi, orthopnæ, & omnibus thoracis rheumatismis: contra scorpionum ictus ex uino bibuntur: vitilignes emaculant. Succus baccarum vtilissimè aurium dolori, & grauitati instillatur cum uino uetere, & rosaceo. In medicamenta autem adiunguntur, quæ neruorum lassitudines reficiunt, acopa vocant: & ad vnguenta, quæ calfaciunt, & discutiunt. Cortex radicis calculos rumpit, partus necat, hepaticis prodest, tribus obolis in uino odorato potus.

**LAVRVS** tam tenui folia, quàm latifolia arbor odoratissima, & si antiquis credimus, Apollini lucidissimo sacra: quinetiam à Ioue colitur. Vna quoque laurus Romæ antiquitus imperatorum pontificumque domos exornare solebat. Quod similiter, atque alij complures gentilium mores, in hunc usque diem apud nos perdurat. Namque ubi dies festus aduenerit, laurus non modò templorum ualuas decorat, sed & ubi dies geniales adfuerint, ingentium palatiorum est ianitrix. Quo fit, ut magnis aduentantibus principibus, lauri frondibus & columnæ, & arcus in pacis signum extruantur: siquidem pacifera laurus est, non secus ac olea. Ideo antiquitus etiam, si eius rami prætendebantur inter arma:

Lauri historia.

hos hostes, firmum quietis erat indicium. Quæ obseruatione ductus Bernardus Clesius Cardinalis amplissimus Tridentinus, tum pacis, tum quietis sectator maximus, lauri, & palmæ floridæ ramum adnectebat, ut nitida marmora, præclara metalla, speciosa picturæ, aurea, & argentea uasa, ac reliqua admiranda demonstrant, quibus magna eius palatia fulgent. Romanis laurus ferebatur letitiæ uictoriarumque signo. Idcirco laurum in templis in Iouis gremio reponabant, quoties Romæ letitiam uictoria noua attulerat. Quinetiam grata Apollini dona uuoquoque anno mittere solebant in Parnaso monte, quod ibi laurus spectatissima cresceret. Ceterum quod laurus Romæ à Ioue à celo missa fuerit, ut ea imperatores coronarentur, facile perhiberi potest: namque Liuia Drusilla, quæ postea Augusta matris nomen accepit, cum pacta esset illa Cæsari, gallinam conspicui candoris sedenti in hortis aquila ex alto abiecit in gremium illæsam, intrepideque miranti accessit miraculum, quod teneret rostro laureum ramum suis baccis ornatum. Quod audientes conseruari alitè, & sobolem iussere aruspices, ramumque cum feri, ac ritè custodiri. Quod factum est in uilla Cæsaris fluuio Tyberi imposita, iuxta nonum lapidem flammia uia, quæ ob id uocatur ad gallinas. Porro tam creuit ranius laureus, tamque se propagauit (tametsi radicibus destitutus) ut breui tempore ibi mirè sylua prouenerit. Ex qua triumphans postea Cæsar laurum in manu tenuit, coronamque in capite gessit. Ac deinde imperatores Cæsares cuncti triumphantes lauro coronabantur, tenebantque in manu eiusdem ramos. Quos post triumphos traditus est mos ferendi in eminentioribus locis in celebratis Romæ collibus. Quo factum est, ut plures laurorum syluæ Romæ uirescerent, quæ ob id laureta uocabantur: qualis erat, quæ in monte Auentino multo ante alios tempore uiguit. Nimirum indicat laurum dijs gratissimam esse arborem, quæ sui habetur ab impetu fulminum ratio: siquidem nulla habita, cum à celo ruunt, nec diuinitatis, nec principum amplitudinis ratione, plerunque templorum turres icipiunt, superba mundi palatia dilacerant, ac sæpius homines immaniter interimunt. hæc tamen sola arbor fulmine non percutitur, nisi in futuræ calamitatis prodigium: ac ne quidem domus, in quibus adsint eius rami, de celo tangantur, pro certo creditur. Proinde Tyberius Cæsar fulminibus perterritus, tonante celo lauro coronabatur. Laurus ex sese uim habet ignem producendi: quippe si exiccata ramus ramo frequentius confricetur, super asperso sulphuris puluere, ignis statim exiliet. Eadem perpetua fronde uiuet, tantaque pollet ui, ut eius ramis in aruo defixis, rubigo, maxima segetum pestis, abigatur, transeatque in carum folia ex aruis. Poetæ perfectionis signo lauro coronantur, idque præmium est Apollineorum musas colentium. Coruus occisa chameleonte, fronde lauri deuorata infestum uirus exinguit. Quæ etiam palumbes, graculi, merulæ, & aliæ per plures aues annum fastidium purgant. Cæterum lapideas lauros oriri in mari rubro scribit Theophrastus lib. III. cap. VIII. de plantarum historia, sic inuens. In sinu autem Heroo cognominato, ad quem descendunt Aegyptij, laurus est, & olea, & thymum: uerum non uiridia, sed lapidis specie parte à mari eminente, similia tamen uiridibus tam folijs, quàm germinibus. Colos quoque i floribus

Lauri natura

Laurus lapidea.



Lauri uires  
ex Galeno.

Nomina.

floris in thyrso, tanquam nondum perfecte floruerit, liquido deprehenditur. Longitudo arbuscularum cubitorum ternorum est. hæc ille. Laurum scriptis commendauit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Lauri arboris & folia, & fructus desiccant, & calfaciunt uehementer, plusq; etiam fructus, quam folia. At radicis cortex minus quidem acris est, & calidus, plus tamen amarus, habetq; etiam adstrictionis nonnihil. Quamobrem & calculos confringit, & iecori prodest. Bibitur ex uino fragrante trium obolorum pondere. Arbor sæpe sic Græcis uocata, Latinis Laurus dicitur: Mauritanis, Gaur, seu Gar: Italis, Lauro: Germanis, Lorbeerbaum: Hispanis, Laurel, siue Loureiro: Gallis, Laurier. Huius fructus Græce δαφνίδες uocantur: Latine Lauri bacca: Italicè, Bacche di lauro: Germanicè, Lorbeer.

## Platanus.

## Cap. XCI.

Platani con-  
sideratio.



TENERRIMA Platani folia in uino decocta, mox illi-  
ta, oculorum fluxiones sistunt: tumores, & inflammatio-  
nes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore col-  
luit. Virides pilulae in uino potæ, serpentium moribus  
auxilantur: exceptæ autem adipe, igni ambusta sanant.  
Insidens foliorum, pilularumque lanugo, oculos, & au-  
res offendit.

PLATANVS Italie aduena, peregrinaq; est; quanquam  
regionem diluunt (ut Theophrastus est auctor) multi, magniq; flori-  
uij. Verum enim uero si ibi nonnullæ uirescunt Platani plantæ, ut  
quas ipse Neapoli, & Patauij uidi, sunt quidem ex longinquis re-  
gionibus allatæ, ut etiam antiquitus à Romanis per mare Ionium  
inuestæ fuere, eorū duntaxat umbra gratia Romæ expetita, ubi  
platanis tantum honoris increbuit, ut diu nutritæ sint mero radi-  
cibus infuso. Nanque hæc arbor plurimum uini irrigatione gaudi-  
det: tamen si maiorem in modum fontes, & fluuios amet. Platan-  
nus ad amplissimam ramorum amplitudinem adsurgit, adeo ut Li-  
cinius Mutianus ciuis Romanus, Plinio teste, hoc prodendū  
tiam posteris putarit: qui provincie Licie legatus affirmat, in ea  
fuisse platanum sociam gelidi fontis amicitia itineri appositam  
octoginta atq; unius pedum specu, numerofo uertice se uastis pro-  
tegentem ramis arborum instar, & agros longis obtinentem um-  
bris: ac ne quid desit speluncæ imagini, saxea intus crepidinis cor-  
rona, muscosos complexa pumices: intra quam se epulatum cum  
duodeuigesimo comite, large ipsa toros præbente fronde, ab om-  
ni afflatu securum, optantem imbrium per folia crepitus, leti-  
rem, quam marmorum nitore, picturæ uarietate, laquearum qua-  
ro, cubuisse in eadē. In Creta insula ad Cortyniam platanus flos-  
tisse fertur apud fontem quendam, quæ folia hyeme non amittit.

Platani uires  
ex Galeno.

Nomina.

vet, sub qua Ioui compressam Europam indigenæ fabulantur. Quæ in Italiam inuestæ fuerunt, climatis inclementia in magnam proceritatem non adolescunt: attamen sunt cortice crasso, fronde uitiginea, lata, longo rubroq; pediculo, flosculo paruo ac pallido, baccis rotundis, scabris, & lanuginosis: ex quibus oleum fieri prodidit Plinius libro xv. capite VII. Platani umbra usque eò delectatum Xerxem in terra Lydia scribit Aelianus, ut diem inter-  
grum sub ea cum maximo exercitu conspiceret, floccipendens tam breui uoluptate tot copias remorari. Platani aduersantur uespertilionibus. Earum pilulae addito melle, & illitæ, lentigines, ueteresq; nigritias emendant. De platano differuit Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Platanus humidioris, frigidiorisq; essentie est, non ita multo quam symmetra. Proinde folia uiridia trita, & illita, non obscure phlegmonas nascenti-  
tes adiuuant. Cortex autem, & pilulae magis desiccantem uim obtinent, ut ille quidem in aceto coctus ad dentium adhibeatur dolores: pilula uero cum adipe ad ulcera ambusta. Sunt autem qui cortice combusto medicamen-  
torum, & absterforium efficiunt, ut cum aqua lepras sanet, per sese autem illitum, ob humorem nimium, uetera, & sordida. Vitandus est puluis folijs arboris insidens: alioqui si spiritu attrahatur, arteriam offendit, ualenter desiccans, & exasperans, uocemq; ledit, sicut sanè etiam uisum, & auditum, si in oculos, aut aures inciderit.  
Πλάτανος ut Græcis, ita pariter Latinis Platanus appellatur: Arabibus, Dulb: Italis, Platano.



## Fraxinus.

## Cap. CXII.

FRAXINVS arbor nota est. Cuius foliorum succus, & ipsa ex vino pota, & illita viperarum ictibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ligni ramenta, scobemque potu perniciem afferre tradunt.

FRAXINVS arbor est notissima. Eius (ut Theophrastus memoriae prodidit lib. III. cap. XI.) duo reperiuntur genera: quorum alterum excelsum, procerumque est, lignum habens candidum, crassiuenum, nerutum, mollius, enodius, ac crispus: alterum humilius, minus austile, scabrius, durius, & flauius. Folia laurinis, lauri latifoliae similia, in acutius tamen coacta, & ambitu leuiter serrata. Ramulus totus, quem folium unum putaueris, quod simul cuncta folia ferat, singulari pediculo, & singulis folijs coniugatum, ueluti per genicula, pendentibus constat: amplo intervallo coniugationibus distinctis, perinde atque in sorbo. Fert fructum in siliquis minutum, nucosum, qualem amygdala, gustu subamarum. Tradidit Plinius fraxini folia iumentis mortifera, ceteris ruminantium innocua. Quae de taxo, non de fraxino Theophrastus prodidit, inquit. Si iumenta (ut ferunt) taxi folia comederint, emoriuntur: si ruminantia, nihil incommodi patiuntur. Sed nominum uicinitate Plinium deceptum esse crediderim: nam Graeci fraxinus uelut taxus uero quia, & uidos appellatur. Unde unum pro altero sumens Plinius, facile (ut diximus) in errorem incidit. Rei fides fuerit in hoc Plinium lapsum fuisse, clara in Italia experientia: siquidem taxi folijs, non fraxini iumenta non ruminantia necantur. Quinimo haec salutare praestant remedium lethalibus serpentium uenenis: quibus adeo inimica est fraxinus, ut ne matutinas quidem occidentesue umbras quam liber spatiosus serpens arboris huius attingat. Quapropter expertum proditur, si fronde ea gyro claudatur ignis & serpens, in ignem potius, quam in fraxinum fugere serpentem. Mira naturae benignitas, priusquam haec prodeant, florere fraxinum, nec ante conditas folia dimittere. Fraxini species sunt Ornus, itemque Orneoglossum dictum, quod ferat semen illud, quod auis linguam appellant, ut ipsum quoque fraxinus fert. De quo differens Plinius libro XXI. cap. VIII. mederi id iocineris, & lateris doloribus in uino tradidit: aquam, quae subit cutem, extrahere: corpus obesum leuare onere, & ipsum sensim ad maciem reducere. Id quoque in recentiorum medicorum usu est ad stimulantiam uenerem. Folia fraxineis similia fert stirps illa apprimere celebris, quam uulgo DICTAMVM ALBUM nuncupant, ob idque a recentiorum nonnullis pumila fraxinus cognominatur. Haec nullis tam Graecorum, quam Arabum auctoribus (quod equidem legerim) usquam descripta est. Quare non possum non admirari, quoniam pacto sibi dictami nomen uendicauerit. Ea est uisu pulcherima, speciosaque: floribus formosis, impense redolentibus, in purpura albicantibus, citrei arboris modo. Radix ei candida, odore hirci, amaro sapore: proinde mirum non est, si uentris tineas perimat. Tradunt etiam suapte ui pollere aduersus lethalia uenena, ac omnium uenenosorum animalium morsum, ictumque, nec minus aduersus pestilentiam. Prodest stomachicis, & suspiriosis. Elicitur e floribus aqua, quae naribus infusa capitis morbos frigiditate obortos mirifice propellit. Quae arbor Graece Mexia, Latine Fraxinus appellatur: Italice, Frassino: Germanice, Eschern, Eschebaum, Steyneschern: Hispanice, Fresno, & Frexo: Gallice, Fraisine.


Fraxini hist.  
ex Theophr.

Plinij lapsus.

Fraxini species ornus.

Dictami albi consideratio.

Nomina.



DICTAMVM ALBUM.





## POPVLVS ALBA

## POPVLVS NIGRA.



Populus alba, &amp; nigra.

Cap. XCIII.

POPVLVS albæ populi cortex vniuersi vniuersi pondere, ischiadicis, ac vrinæ stillicidio prodest. Sterilitatem inducere tradunt, si cum mulino rene bibatur. Folia quoque cum uino post purgationem pota idem præstare produntur. Tepens foliorum succus utiliter aurium dolori instillatur. Pilule, quæ primo foliorum partu exiliunt, tritæ & cum melle illitæ, oculorum hebetudini medentur. Memoriam prodiderunt, corticem albæ populi, & nigre particulatim casum, & sulcis stercoretis mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre. Populi nigre folia cum aceto illita, magna utilitate podagricis doloribus illinuntur. Resinam populus fundit, quæ in malagmata additur. Semen potum ex aceto comitialibus utile est. Lacrymam populorum commemorant, quæ in Padum amnem defluat, durari, ac coire in succinum, quod electrum uocant, alij chrisophorum. Id attritum iucundum odorem spirat, & aurum colore imitatur: tritum, potumque stomachi, uentrisque fluxiones sistit.

Populorum  
consideratio.

POPVLVS Theophrasto triplici recensetur genere lib. III. cap. XIII. de historiâ plantarum, ubi sic habet. Populus alba, nigraque uniformes habentur: ambæ natura erectæ, sed excelsior, leuiorque nigra: figura foliorum adsimilis, & ligni materies albedine similis uisitur: utraq; ne florem quidem habere existimant. Kerpis (quam quidam Alpinam, quidam Lybicam uertunt) populo albæ non absimilis, cum magnitudine, tum uero quod ramis albicantibus spargitur: folio hederæ, sed parte altera siue angulo, altera uero oblongo, inque angulum exeunte acutum: colore parte resupina, pronaque ferme simili: pediculo prolixo, tenuique, annexo. quamobrem non erecto, sed inflexo. Cortice asperiori, quam populus alba, scabriusque: ut pyrus syluestris. hæc Theophrastus. Priora omnibus passim nota sunt. Sed quænam arbor nobis sit repis, non satis compertum habeo. quamquam in Solia, quam Coritenses uulgò appellant il Panauizzo, arbor hæc, cuius hic imaginem damus, crescit betulae æmulo: quæ tamen in nigra non uisitur, ut Plinius existimat, cum indifferenter inquit. Populorum folijs grandissima lanugo. Sed et tertio idem errasse deprehenditur: quippe qui scripserit eodem libro capite XXVI. populum nec fructum, nec semen ferre, cum tamen utraque fructum ferat, uuarum speciem præ se ferentem, intus alba lanugine refertum: atque etiam scribat Dioscorides semen ex aceto potum comitialibus prodesse. Sed quid opus est pluribus.

Plinij plures  
lappus.



## POPVLVS LYBICA.



pluribus, si Plinius seipsum accusat: siquidem libro **XXIII** cap. **VIII**. populum et uuas, et semen ferre fatetur, illas utiq; unguentis, hoc uero comitialibus praefrens. Sed caueant myropola, ne ob id communis usus unguentum populneum uocatum, ex populi uuis conficiant, ut Ruellius credidit à Plinio deceptus, et quod ijs ad unguenta odorata uteretur antiquitas. Quandoquidem Nicolaus Myrepseus non uuas, sed germina, uere primo pro deuntia admiscet: odorata enim sunt, et ceraginosæ, cum tamen nullus prorsus uuis sit odor. Verum eniuuero an antiquitas populi uuas odoratis unguentis admiscuerit, dubitandum sane est. Nam Plinio libro **VII**. cap. ultimo, ubi de unguentorum materia egit, nil aliud est populi uua, quam bryon, Latinis muscus uocatus.

Ruellij erratum.

Quem etiam præter cedrinum, et quernum prætulere ad unguenta Dioscorides, et Galenus, et inter alia odorata recensuerunt. Quo fit, ut facile credi possit, Plinium errore ductum existimasse, muscum in populo nascentem nihil ab eiusdem uuis differre, cum inquit. Eodem et bryon pertinet uua populi albæ. Optima circa Gnidum, et Cariam, in sitientibus, aut siccis, asperisque locis.

Secunda in Lycia cedro. hæc ille. Sed cum cedrus nullas ferat uuas, sed muscum perquam odoratum, hinc Plinii error manifestè deprehenditur. Populus utraque frequentissima nascitur in agro Mantuano, ac Ferrariensi, non modò in Padi amplissimi fluminis litoribus, sed et per agros, et prata in fossarum aggeribus. Ideoque fabulatur poëta, isti Phaëtonis fulmine sorores fletu mutatas in populos arbores iuxta Eridanum amnem, quem Padum uocant, ex corticis meatibus instar auratae lacrymæ, electrum, siue succinum fundere, ut adhuc uiuentes lacrymas effundebant: quæ nostro tempore in orbiculos, quibus Deipara uirgini scemina salutaciones enumerant, effinguntur, et uulgaribus et infimis mulierculis monilium uice, collo gestantur decoris gratia. Quare Dioscorides, qui poëtarum fabellis adhibere fidem haud quaquam censebat, noluit pro comperto fabulosam succini historiam, asse-

Poëtarum fabula.

rere, sed dubiam, et suspensam tenere. Ideoque inquit. Lacrymam populorum commemorant, quæ in Padum amnem defluat, durari, ac coire in succinum, quod electrum uocant, alij chrysophorum. Ex quo facile percipi potest, quòd cum Dioscorides aliquid de succino suis monumentis mandare decreuisset, nullam eius certam tenens historiam. ipsum populi generi utrique adiunxit: ea tamen ratione id diiudicans, quòd non alio in huiusce operis loco aptius succinum accomodari posset. Quandoquidem in fabulis nactus esset poëtas cecinisse carminibus, succinum populos fundere: tametsi non ignoraret, succinum populorum gummi esse nequaquam. siquidem huic fabulae datus est locus ob succini innumeros globulos, qui olim filo traiectione ab Eridani accolis collo suspendebantur. Quippe cum plerique ipsum succinum aduersari. Quod fortasse non erat ab omni ratione alienum: namque cum facultatem habeat succinum sistendi fluxiones, collo etiam gestatum, facile inhibere poterat, ne capitis destillationes in guttur defluerent. Quo fit, ut non demirer, si etiamnum Germani in oculorum destillationibus magno successu succineos globulos occipio adnectant. Reperio in enarranda Succini historia, auctores complures, sed re uera admodum uarios: qui et si grauius (ut historicos decet) hac de re loquantur, tamen cum ipsi succini originem nusquam uiderint, et quicquid de eo scripserunt, alijs acceptum referant, his nulla, aut sanè pauca adhibetur fides. Philemon succinum fessile esse dixit, et in Scythia erui duobus in locis, uno candidum, altero uero croceum. Sudines, et Metrodorus succinum prodiderunt in Liguria arboribus effluere, quod Sotacus credidit in Britannia euenire. Pythias tradidit esse locum in Britannia prope Gutones, ubi à fluctibus maris non procul ab Abalo insula succinū aduehitur: quo incolæ ad ignem pro ligno utuntur, ipsumque Tentonis uendunt. Nicias historicus succinum solis radiorum succum esse uoluit: hic enim credit radios uehementius actos in terram pinguem sudorem in ea parte relinquere, deinde æstate siccare, et à fluctibus maris in Germanorum litora eijci. Idem et Aegypto nasci simili modo dixit. Item in India, gratiusque thure esse Indis. Non desuerunt etiamnum, qui succinum nasci tradiderint iuxta mare Atlanticum in lacu Cephyside dicto, qui sole exalset. Aus è limo fundat electrum. Non de sunt præter hos plures, qui de succino differentes in diuersas inierint sententias, quas nunc, utpote non probandas, silentio inuoluam. Vnde iure dici potest, succinum apud eos uel ceræum, uel figulino luto simile haberi, cum ipsum in tot uarias formas, ac imagines transmutauerint. Sed ut tandem referam, quod pro comperto habetur, gignitur succinum in insulis septentrionalis oceanus. Id olim à Germanis Glesium appellabatur: unde à nonnullis, qui erant cum Germanico Cæsare, ibi elasis rem gerente, una insularum ob succini copiam, Glesaria fuit appellata, quæ prius Austrauia à barbaris dicebatur. Hic nimirum (ut Plinius inquit) nascitur succinū arboribus pinei generi defluens in terram, ubi postea densatur. Cum uero intumescens æstus fertur in proximæ syluas, ex ijs in se rapiunt fluctus maris, et in Germanorum litora expuunt. Itaque Cornelius Tacitus rectè scri-

Succini uaria historia.



Brasauoli opi-  
nio reproba-  
ta.

Brasauoli la-  
psus.

Alni historia  
& uires.

ptum reliquit. Germanos huius maris accolae solos omnium succinum habere, & legere. Quod succinum sit arboris ex pinorum genere lacryma, olim Romanis testimonium perhibuit quidam eorum eques illic missus ad id comparandum à Iuliano curante gladiatorū munus Neronis principis, qui ea litora peragravit, ipsum uidit, ueram eius originem didicit, & secum ingeniem copiam Romam inuexit. Præterea succinum esse pineæ arboris gummi indicio est pineus in attritu odor, & quod accensum tedæ & resinarum modo deflagret. Liqueorem esse copiose stillantem, tenacem, ac lentum, argumento sunt quædam intus implicita, ut fornicæ, culices, ac etiam lacertæ, festuæ, ac palææ, quæ transparentia inspicuntur. Cum enim hæc animalia, & alia stramenta humoris lentore facile implicentur, duriscente deinde materia, ueluti carcere includuntur. Hæc partim ex Plinio, partim uero ex aliorum scriptis deincepsimus. Tamen si rationibus non spernendis probare nitatur Georgius Agricola, succinum non aliud esse, quam bituminis genus, quod à quibusdam scopulorum crepidinibus erumpens in mare defluit, ubi aquarum sal sedine durum scit. Nam succinum, quod nigerrimum est, ex quo etiamnum globuli ad angelicas numerandas salutationes conficiuntur, aliquid cognationis cum pissasphaltis habere uidetur. Adde etiam quod à pinu, neq; ab arboribus alijs resinam per se fundentibus tam pullo colore nulla defluit lacryma. Succinum incoctum adipe lactentis suis expolitur, & redditur translucidum, quemadmodum tradit Archelaus, qui rubrum corticibus arboris, ex qua defluit, inherens, se uidisse affirmat contra Agricola sententiam. Quo fit, ut de succini historia adhuc lis sub iudice pendeat. Ceterum conperitum est, quod sicuti magnes ferrum reseruit, si adsit adamas, uel si alio affricetur, ita nec succinum ad se palles alio cit, quæ sint oleo persuse. Verum eorum opinio uana est, qui succinum tradiderunt peculiari dote ocinum reserere: nam ipse sepe ac sæpius huius rei periculum feci, & semper succinum ad se ocinum trahere comperi. Offici-  
ne communi nomine succinum uocant Karabe Mauritanos secute. Licet Brasauolus Ferrariensis in suo de simplicium examine deceptus existimauerit, Arabum Karabe succinum esse nequaquam, sed uerum populi albei gummi, Scrapionis, & Auicennæ testimonio: est eorum neuter, sicut nec Dioscorides, quem illi sequuntur, id quidem pro comperto asseuerauerit. Namq; Serapio (ut in omnibus adsolet) quicquid de Karabe adnotauit, uerbis totum ex Dioscoride depromsit, sic inquit. Et dicitur, quod gummi Haur romi, quod nascitur iuxta flumini, qui dicitur Eridanus, quando distillat in flumine illo, coagulatur ibi, & est illud, quod dicitur Alipton, id est electrum, & sunt, qui nominant ipsum Arsopodon, & est Karabe. Eadem sententia elicitur ex Auicenna: quippe qui capite de Haur, itemq; capite de Karabe, non asserat eam esse populorum gummi, sed quod ita perhibetur. Nec alia ratione duobus capitibus de Karabe differuit, nisi ut ostenderet, Karabe per se à populorum gummi differre. Præterea comperat id esse Karabe apud Mauritanos, quod electrum apud Græcos, nominis significatum: quandoquidem Karabe lingua Persica, Auicenna auctore, non aliud designat, quam rapiens paleas. Quod sensu comprehenditur proprium esse succini, aut electri, non autem populorum gummi. Insuper astringentes pastillos, quos Galenus lib. vii. de compositione medicamentorum secundum locos, Paulus sui uoluminis etiam septimo, & Actuarius in suo de compositione medicamentorum, electri trochiscos uocant, Arabes de Karabe appellant, eosdem à Galeno, & Paulo assumentes. Quo fit, ut hac in re manifestè aberrasse Brasauolus deprehendatur. Itaque dicendum esse putauimus, electrum idem esse apud Græcos, quod succinum apud Latinos, & Karabe apud Arabes. Neq; etiam illud ideo populorum gummi esse crediderim, ut Brasauolus asseuerat, quod Paulus quoque dixerit: Electrum populi albei lacrymam dicunt, quæ iuxta Eridanum amnem distillat, & in spissitudinem coit, aureo colore. Nam his uerbis non probat electrum esse albei populi gummi, sed id tantum refert ex aliorum opinione, quemadmodum fecit Dioscorides, qui secutus est Paulus. Ex his igitur satis patere arbitror, falsum esse, quod idem sint electrum, gummi populi, & Karabe: quin potius clarum, succinum, & gummi populicium esse inter se diuersa. Credidit Demonstratus fieri succinum ex lyncis urina (quemadmodum credere pharmacopole, & uulgo medicorum ex eadem fieri lapillos, quos lyncis eis appellant) succinum asserens, quod flauescit, fieri ex orina maris, album uero ex orina femine. Quibus refutatur Plinius: quandoquidem ipse manifestè dicat, hoc esse falsum. Quod cum & Diocles, & Theophrastus credidissent (non autem Dioscorides, ut ei falso Brasauolus imponit de lapidibus lyncis agens) eos eiusdem crimini Plinius accusat. Quod autem Diocles, & non Dioscorides (ut Brasauolus putat) huius erroris accusetur, ostendit ipse Dioscorides libro secundo capite de urina, ubi in eandem Plinij sententiam ueniens, hæc uerba protulit: Lyncis urinam quam lyncurium appellant, simul ac excernitur, glaciari, coire uel in calculi duritiam, uulgo creditum est. quare quod de ea proditum est, uanum esse conuincitur. Est enim quod à nonnullis uocatur succinum pterygophoron, ideo dictum quod pennas ad se alliciat. At cum Brasauolus minus fortasse accurate Dioscoridis uerba legendo percurisset, dixit de Karabe agens, sensisse Dioscoridem electrum esse lapillum, in quem lyncis urina concreuit. Quod tamen falsum esse facile constat ex prædictis Dioscoridis uerbis. Ceterum cum non desint etiam poëta, qui Phaëthontidas non in populos, sed in alnos mutatas fabulatur, Alni quoq; historiam, & uires, præcedentibus adnectere non ab re fore existimauimus. Est itaque ALVUS (ut Theophrastus est auctor lib. iii. cap. xiiii. de plantarum historia) sterilis & unigena natura, caudice recto: ligno, medullaq; molli, adeo ut graciliores uirgæ totæ concauentur: folio pyri, sed ampliore, neruofloreq; cortice scabro, rufiq; intus, quæ de causa coria tingit: radice summa, nec maiore, quam laurus. nascitur in aquosis, alio nullo pacto. hæc Theophrastus. Qui tamen eodem lib. cap. xv. non utiq; pyri folio alnum uirescere tradidit, sed ponticæ nucis. Nec eadem prodidit esse sterilem libro eodem cap. vi. cum inquit. Teu rebinthum circa tritici messem, aut paulo serius semen reddit: fraxinus, atque acer æstate: alnus, uix iuglans, pyrus rumq; syluestrium genus quoddam autumnis. Quo fit, ut alterum omnino suspicandum uideatur, aut sibi ipsi Theophrastum repugnare, aut eius codicem his locis mendis scater. Alnus in Italia nascens, folio est coryli crassiore, neruofioreq; materie molli, rubente, in aquosis ferè semper proueniens. Hetrusci uulgo appellant onio: alij uero in Italia auno. Italica fructum fert uiridem, oblongum, moris forma similem, squamis quam plurimis in se compactis. Nature scit



Maturefcit autumnno, minuto intus semine, colore in nigrum fuluo. Præfertur lignum ad ædificiorum fundamenta, quæ in fluminibus, lacubus, paludibusq; sunt, quod in aqua nunquam putrescat. Ob id enim expetitur maxime Venetis ad iacienda palatiorum, ædiuq; fundamenta, quod crebro fixa non modo ad æternitatem permaneat immortalis, sed quod ingentes admodum ferat moles. Recentia folia tumores imposita dissolunt, & inflammationes restingunt. Eadem nudis pedum plantis supposita uiatoribus itinere defatigatis leuamentum præstant. Quin & rore matutino madentia cubiculis ad necandos pulices per æstatem utiliter sparguntur. Præstat cortex tingendis corijs atro colore. Sed nec BETULA omnimittenda uidetur: quæ cum

## BETULA.

Betulæ conderatio.

cortice albo sit albe populo adsimilis, nunc nobis sese offert describenda. Hæc Theophrasto folio est caryæ sic Græcis uocata, quid autem sit carya compertum hætenus non abeo præterquam quod paulo angustiori, cortice autem uersicolore, & materie leui, non nisi ad baculos utili. Plinio lib. XVI. cap. XVIII. Betula arbor est Gallica mirabili candore, atq; tenuitate: terribilis magistratum uirgis: eadem circulis flexilis: item corbium sportis. Bitumen ex ea Galliæ excoquunt. hætenus Plinius. Betula in Tridentino agro frequentissima prouenit, materie adeo tenaci, lentaq; ut ad uasa uinaria cingenda circuli ex ea parati omnium præstantissimi habeantur. Ananij è suis Betulis uo modo optimos conficiunt carbones, ad coquenda liquandaq; metalla, sed è delibrato, contortoq; cortice, facies ad nocturna lumina parant, quæ quod bituminosa pinguitudine redundant, tede modo conflant, & resinosum quoddam picis colore reddunt. Nec fort. assalia de causa Betula dicitur, nisi quod bitumine scateat. Hanc Tridentini corrupta uoce uulgò appellant Bedollo. Gaudet frigido tractu ac niuoso: folio est nigre populi, sed parte prona asperiori, uiridiori; per ambitum serrato, & minutissimis quibusdam punctis, ipsiq; albicantibus in uniuersum resperso. Sterilis hæc, uec fructum ferens. Huius caudex terebro perforatus ingentem aque copiam reddit, cui uim maximam inesse quidam asserunt ad comminendos tam renem, quam uesicæ calculos, si diutius bibatur. Eadem maculas in cute delet, nitoremq; conciliat: oris ulceras sanat collutione ex ea facta. Foliorum succus coagulo adnatus, caseos à carie, & uermibus uindicat. Sed iam ad Populos, & ad Succinum uostra reuertatur oratio, in quibus medicina nobis reddenda ratio est, ut in omnibus ferè facere consueuimus.

Betulæ uires

Primum igitur de uiribus Populi nigre disseruit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Populi nigre flores calidi facultate quidem sunt in primo recessu à temperatis: sed in differentia, quæ habetur in siccando & hume-

Populorū uires ex Gal.

stando, paulum à temperatis & medijs ad siccius deflexerunt: uerum & subtiliorum potius, quam crassiorum sunt partium. Et folia quidem ipsius quodammodo floribus similia sunt, nisi quod ad omnia inbecilliora, minusq; efficacia. Sed & resina eius floribus similem facultatem obtinet, atque etiam calidiorem. Porro semen tum resina, tum floribus & subtiliorum est partium, & exiccantius: non tamen est admodum calidum. Deinde libro VII. eorundem simplicium idem Galenus Populi albe uires descripsit his uerbis. Populus alba arbor mista quodammodo temperaturæ est, ex aquea tepida, & terrena extenuata essentia. quamobrem & abstergentis facultatis est particeps. hætenus Galenus de utriusq; Populi facultatibus. Cæterum non inuenio Galenum Succini meminisse in simplicium medicamentorum censu, qui tamen lib. VII. cap. IIII. de compositione medicamentorum secundum locos pastillum ex succino confectum ab Asclepiade transcripsit: quem quidem is hæmoptoicis, longo tempore tussientibus, & recenter phthisicis, purulenta è pectore difficilius eicientibus, suppuratis, cæliacis, dysentericis, & inflatis conferre tradidit. Atqui referunt Prutheni, in quorum litora fluctus maris succini plurimum expuunt, eius genus quoddam reperiri, quod planè crystallum representat. Huic uim mirabilem inesse testantur, quod scilicet fœmina deprehendatur an uirgo sit & incorrupta, necne. Nam si ex uiuo ieiunæ exhibetur, efficere aiunt, ut corrupta & uitiata protinus urinā reddere cogatur. id quod uirgini euenire negant. Arbor αλβη Græcis dicta, Latinis Populus alba uocatur: Arabibus, Haur: Italis, Popolo bianco: Germanis, Bellen, Poppelbaum, & Sarbaum: Hispanis, Alamo blanco: Gallicis, Peuplier. Quæ uerò Αἰγυπτίος Græco nomine, Latino Populus nigra uocatur: Mauritano, Haur romi: Italicis, Popolo uero: Germanico, Assen, aut Poppel uueiden: Hispanico, Alamo nigrilho: Gallico, Tremble, & Peuplier. Quod Græcè ἤλεκτρον καὶ χρυσοφόρον, Latine Electrum seu Succinum dicitur: Arabice, Karabe siue Kahabre: Italicè, Succino, & Ambra gialla: Germanicè, Agstein, aut Boerustein: Hispanicè, Esclarimiente, aut Ambar: Gallicè, Ambra.

Succini uires

Nomina.

## Macer.

## Cap. XCIII.

MACER ex Barbaria aduchitur, cortex flauescens, crassus, gustu perquam astringens. Qui contra ruentas excreationes, dysenterias, & alui fluxiones bibitur.



Maceris, &  
Macis descri-  
men.

Maceris facul-  
tates ex Gal.

Monachorū  
opinio falsa.

Nomina.

Vlmi histo-  
ria.

**N V N Q V I D** officinarum Macis, quo myristicæ nuces prætextus instar conteguntur, Dioscoridis sit Macer, non modo dubitandum est, sed etiam credendum (ut ego arbitror) magnam inter utrumque esse differentiam. Cum enim Dioscorides dicat: Macer, qui ex Barbaria aduehitur, est cortex crassus, flauescens, & gustu perquam astringens: manifestè declarat, Macerem non esse officinarum macim, quod hoc tenue sit, gustu seruens, acre, perquam odoratum, amariusculumque. Adde quod dixerit Plinius lib. XII. cap. VIII. Macir ex India aduehitur, cortex rubens, radicis magnæ, nomine arboris siue: qualis sit ea, incertum habeo. Hanc etiā unum differentiam non ignorauit Serapion: nam postquam tradidisset ex auctoritate Isach, Macim esse nucis odorata operimentum, dixit secus esse, de quo loquebatur Dioscorides: quippe quod scriptum reliquerit, Macerem esse ligni corticem, siue corium. Quod cum comperit haberet Auicenna, de utroque seorsum tractauit, & Macim odorata nucis inuolucrum ad caput 456. relegauit. Macerem uero radicis corticem capite 694. sub titulo Thalysar descripsit. Præterea maximo est argumentum, quod Macis & Macer utique inter se differant, quod Dioscorides, Galenus, & Paulus de odoratis nucibus, quorum Macis est tegumentum, nihil scriptis memoria reliquerint. Quippe si Macer, qui eis conuehebatur, Macis nobis uulgare extitisset, credendum sanè est, quod cum illo quoque, aduectæ essent myristicæ nuces: quarum illi historiam, & faccultatem, cum sint & in uiribus, & in odore admirabiles, nequaquam describere prætermisissent. De macere Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, hæc scriptis tradidit. Macer cortex est, qui ex India conuehitur, gustu multum acerbo, cum lenicula quadam acrimonia odorata, inuicundum sanè redolens, ut pleraque aromata, siue odorata, quæ ex India conuehantur. Videtur itaque & ipse ex mista constare essentia, pleraque terrena frigida, paucula uero calida, & tenuium partium. Quamobrem ualenter desiccatur, astringiturque: proinde coeliacis, & dysentericis miscetur facultatibus: in tertio exiccantium consistens ordine, in caloris, frigorisque differentia neutrum insigniter efficiens. hæc Galenus. Ex quibus haud obscure colligi potest, quod Macer longè differat à Maci. namque ipse gustu non reperio hoc esse adeo acerbum, nec tam leuiusculæ acrimoniæ: quin potius si degustetur, linguam, & fauces admodum uellicat: odorem inuicundum perfundit, & leuiusculum amarorem quadam cum siccitate relinquit. Quod facillè ostendit, quod Macis tantum calidi, quantum sicci conceperit, uel fortasse plus calidi: & quod pleraque ipsius essentia sit tenuium partium. Idcirco errare non crediderim, qui dixerint Macim odoratum exalfacere, & pariter siccare in fine secundi, uel in principio tertij. Quamobrem id Macer esse non potest, cum dicat Galenus constare macerem essentia pleraque frigida terrestri, paucula uero calida. Quibus facillè concludi potest, quod macer à Dioscoride, & Galeno descriptus hoc æuo ad nos non aduebatur: siquidem nullus in officinis reperitur cortex, qui possit maceris historiā explere. Et quāuis Monachi illi, qui in Mesuem commentarios scripsere, nullam inter macim, & macerem ponendam esse differentiam pro certo affirmant; nulla tamen auctoritate (quod equidem sciam) aut ratione nituntur. Caterum haud ignorandum est nec Galeno, nec Plinio, quod dixerint ex India aduehi macerem, Dioscoridem repugnare, cum ex Barbaria ipse afferri dixerit: quoniam (ut Ptolomeus est auctor) quædam in Indo fluuii insula, uel urbs sita est, quæ Barbaria dicitur, ex qua facillè comportabatur macer. Vel quod afferretur ex Arabia eo maris sinu, qui à Barbaria insula Barbaricus appellatur. Quædoquidem (ut inquit Strabo) omnia, quæ in India proueniunt, ea scilicet parte, quæ ad austrum uergit, similiter in Arabia nascuntur. Maxè ut Græcis, ita Latinis Macer, atque etiam Macchir appellatur: Arabibus, Thalysar: Italis, Macero. Quod Arabibus Bisbes, recentioribus Græcis Méris quemadmodum et Latinis, & Italis Macis nominatur: Germanis, Muscaten blumen: Hispanis, Macias, & Macas.

# V L M V S.



## Vlmus.

## Cap. XCV.

**V L M I** & folia, & cortex, & rami vim habent spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur: vulnera glutinant, sed multo magis corticis tilia, si fasciæ loco intorqueatur: nam in lori morè flecti potest. Crassior cortex in vino, aut aqua frigida unciatim potus, pituitas trahit. fracta ossa celerius solidescunt, si decocto foliorum, corticis, aut radicis foueantur. Humor in folliculis enascens prima germinis eruptione, cuti illitus nitorem inducit, faciemque splendidiorem præstat: quidam siccatur, in animalia abit, quæ culicum formam gerunt. Folia cum tenerescunt cocta, olerum more ad obsonia usurpantur.

**T A M E T S I** Vlmus notissima omnibus ferè sit arbor; non tamen ob hoc silentio inuoluenda putauimus, quæ de ea postertatis memoria prodidit antiquitas. Vlmus itaque (ut Theophrastus est auctor lib. III. cap. XIII. de plantarum historia) duobus distinguitur generibus: cuius altera motana, quam Græci operata



Alia uocant : altera campestris, ulmus proprie uocata : fruticosior hæc, illa uero auctior : folium indiuiduum, leuiter circumserratum, oblongius quam pyro, scabrum, non læue. Præstat hæc arbor & amplitudine, & celsitudine, non crebra circa Idam, sed rara, irriguis amica : materies flaua, robusta, neruosa, deformis, ut quæ tota cor sit. Vtuntur ea ad fœres lautiores : uiridis facili caditur, sicca difficile. Sterilis deniq; putatur : sed gummi in petiolis gignit, & animalia quædam culicea : cachryes peculiare gerit, autumnio multas, minutas, ingras : cæteris uero temporibus quid ferat, minus animaduersum est. hætenus Theophrastus. Plinius uero quatuor ulni genera statuit lib. x. vi. cap. xvii. ijs uerbis. Inter has atq; si uigilæras, materie uitiumq; amicitia accipitur ulmus. Græci duo eius genera nouere : montosam, quæ sit amplior : campestem, quæ fruticosa. Italia attineas uocat, excellissimas : & ex ijs siccanas illas præfert, quæ non sunt riguæ. alterum genus Gallicas. tertium nostrates, densiore folio, & ab eodem pediculo numero flore. quartum syluestre. Attineæ non ferunt samaram, ita uocatur ulmi semen : omnesq; e radicibus plantis proueniunt, reliquæ uero semine. hæc Plinius. Qui tamen und cum Theophrasto errasse deprehenditur, quod hic ulmum cuiusuis generis sterilem esse scripserit : ille autem, quod attineam sic Italis appellatam, semen nulli ferre prodiderit. Quandoquidem Theophrasto præter id, quod experientia nobis compertum est, repugnat Plinij authoritas : quippe qui ulmos omnes præter attineam semine prouenire scribit. Plinio deinde, qui attineam semine ferre negat, refutatur Columella lib. v. cap. vi. cum inquit. Ulmorum duo esse genera conuenit, Gallicum, & uernaculum : illud attinia, hoc nostras dicitur. Attiniam ulmum Tremellius Scrofa non ferre samaram (quod est semen eius arboris) falso est opinatus. Nam rariorem siue dubio creat, & ideo plerisq; & sterilis uidetur, seminibus inter si ondem, quam prima germinatione edit, latentibus. Itaq; uero iam serit ex samara, sed ex sobolibus. Est autem ulmus longe lætior, & procerior, quam nostras, frondemq; incundiorẽ bubus præbet. Sed ulmi facultates hæc sunt. Folia, & cortex, & rami uim habent spissandi, & aulnera contrahendi. Corticis utique interior tilia, lepras sedat, & folia ex aceto illita. Corticis denarij pondus potum in henuina aquæ frigide aluum purgat : pituitasq; & aquas priuatim trahit. Imponitur & collectionibus lacryma : & uulneribus, ambustisq; decocto fouere prodest. Humor in folliculis arboris huius nascens cutinæ torem inducit, faciemq; gratiorem præstat. Cauliculi foliorum primi uino decocti tumores sanant, extrahuntq; per fistulas. Idem præstant e tilia cortices. Multi corticem commanducatum uulneribus utilissimum putant. Folia trita, aqua aspersa, pedum tumori. Humor quoq; e medulla castrate arboris affluens capillum reddit capiti illitus, defluensq; coctinet. Hæc Plinij uerba de ulmi facultatibus lib. xxi. cap. viii. Ceterum humor in folliculis ulmi contentus (ut ego experientia compertum habeo) medetur puerorũ enterocelis, si splema siue linteola in eo madefacta sæpe inguini partis ruptæ super imponantur, atq; inibi subfemorali, quod Italis uulgò brachiere appellatur, subligentur, & constringantur. Quin & corticis radicem decoctum articulorum duritias emollit, & neruorum conuulsiones resoluit, si in forus, uel balnei modũ adhibeatur : itẽ tumores discutit, quos iugi attritus in collo boni excitauit. Ulmi meminit Galenus lib. vi. simpl. medic. sic inquit. Ulmi folijs quandoq; recẽs uulnus glutinuinus, confidentes adstringentem pariter & abstergetem inesse illis facultatem. Cortex amplius etiam subamarus est, & adstrictiorius : itaque cum aceto & lepram sanat. Porro uiridis etiamnum ac recens, si uulneribus uinculi uice circumligetur, ea glutinare potest. Radices eandem uim obtinent inani & decocto earum quidam perfundunt fracturas, quæ topbo, siue callo inducto opus habent. Huius arboris nomen Græcum est *πτελέα* : Latinum, Vlmus : Arabicum, Didar, Dirdar, seu Luzach : Italicum, Olmo; Germanicum, Ylmen, Ristholtz, Lindbast, Yffenboltz : Hispanicũ, Vlmo : Gallicum, Orme.

Theoph. &amp; Plinij error.

Vlmi facultates ex Plia.

Vlmi uires ex Galeno.

Nomina.

## Lignorum marcor :

## Cap. XCVI.

Ex caudicibus, lignisq; veteribus caries congeritur. quæ farina modo illita vlcera purgat, & ad cicatricem perducit : serpentina cohibet, si cum pari aniso & uino subacta, linteisq; imposita illinatur.

Non sanè prorsus negligenda est lignorum ueterum, & contabefactorum caries, cum tanta facultate polleat, ut ulcera expurget, solidetq; & eadem serpentina sistat. Quod eo præstat efficacius, si ex lignis arborum colligatur, quæ tum adstringendi, tum etiam abstergeri uim possident. Quo fit, ut ligni Guaiaci caries cæteris hac in re facile præstet : quippe quæ non modò ulcera, quæ continuacia non sunt, sanat; sed & quæ cacœthæ dicuntur, quæq; Gallica peste contracta sunt. Quare pudendorum exedentibus ulceribus inspersa mirificè medetur. Ceterum non modò lignorum marcor, siue caries in medicum usum uenit, sed & VERMES in cariosis lignorum caudicibus nascentes, si Plinio credimus, qui libro xxx. cap. xiii. de his sic scriptum reliquit. Cossi, qui in ligno nascuntur, sanant ulcera omnia : nomas uero combusti, cum pari pondere anisi, & ex oleo illiti. Delicatiores fuisse hos olim & in cibis idem posteritatis memoria tradidit lib. xvii. cap. xiiii. cum inquit. Vermiculantur magis, minusue quædam, omnes tamen ferè, idq; aues canis corticis sono experiuntur. Iam quidem & in hoc luxuria esse cœpit, prægrandesq; roborem delictiore sunt in cibo, cossos uocant : atq; etiam farina saginati, hi quoq; atiles sunt. Quapropter mirum non fuerit, si etiam antiquitas cicadas, quæ uondum alas deprompserint, in cibis denorauerit, Aristotelis testimonio, qui etiam addidit gustantibus esse suauissimas. Sed cur illud admirandum fuerit, si nostris etiam temporibus uermes, qui cariosis caseis innascentur, magna admodum cum uoluptate a compluribus deuorentur? Galenus cum & ipse ad arborem, ex qua caries decedit, particularem scopum habuisset lib. viii. simp. medic. sic de illa scripsit. Caries ignorum, & maxime, quæ particeps est adstrictionis simul, & absterfionis, uelut ulmus, expurgat, impletq; ulcera humida. *Σαρφώτης ἔλκων* ita Græcè dicitur, quod Latine Lignorum marcor, siue caries : Arabicè, Nucharer uocatur. Sab : Italicè, Tarlatura del legno : Germanicè, Vuurim meel : Hispanicè, Carcoma.

Cariei lignorum confid.

Vermium lignorum usus.

Cariei uires ex Galeno.

Nomina.



## Arundo.

## Cap. XCVII.

Arundinum  
confid.

IN Arundinum genere quædam nastos, id est farctior vocatur, ex qua sagittæ factitari solent. Alia scemina, quæ tiliarum ligulas efficiunt. Alia, quodd fistulis addita sit, syringias: cui multum inest carnis, crebris cincta geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia crassa, concaua, apud amnes nascens: quæ à quibusdam cypria, ab alijs donax appellatur. Alia phragmites, seu uallatoria, gracilis, candicans, vulgò cognita: cuius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula aculeosque corpore extrahit: luxata, lumborumque dolores cum aceto mulcet. Virentia folia tusa, & imposita ignibus facris medentur, & cæteris inflammationibus. Corticis cinere perunctæ cum aceto alopecie sanantur. Paniculæ lanugo, si aures intrauerit, exurdat. Eundem effectum implet arundo, quæ cypria dicitur.

ARVNDINVM quinque genera tantum, ueluti notiora hoc in loco à Dioscoride produntur: licet Plinius lib. xvi. cap. xxxvi. & lib. xxi. cap. xi. uiginti nouem arundinum species descripserit: inter quas (ut superius diximus) odoratam recte fuit, quæ Græcis κάλαμος ἀρωματικός appellatur, in India, Syriaque nascens, odoris incunditate unguentis accommodata. Quod aperte indicat calamum odoratum esse inter arundinum genera reponendum, non autem inter radices, ut uulgo medicorum, & Brasauolus Ferrariensis contendunt, acori radices pro legitima odorata arundine assumentes. Illa, quæ nastos dicitur, solida, farcta, quauis gracilis & leuis, in communem sagittarum usum à Syris accepta, non oritur, quod sciam, in Italia, nisi nascatur (ut tradidit Plinius) in Rheno Bononiensi amne. Illa etiam, quæ theophrasti

lys, hoc est, scemina appellatur, cuius tantum est usus ad tiliarum ligulas, hætenus nobis incognita est. Namque nostræ tempestate sunt eiusmodi ligulæ ex communibus arundinibus, ex ea scilicet specie, quam Dioscorides uallatoria nuncupat, quæ nostræ in uiridarijs, ac hortis in topiarijs extruendis utuntur, ac palos uiribus aptissimos efficiunt. Quod autem uallatoria sit hæc nostra communis, mihi aliquando dubitandi præbuit ansam Dioscorides: quippe qui dicat, eam esse gracilem, & candidam, cum tamen communis nostra sit crassior. Verum cum postea inuenerim Theophrastum scribentem lib. iiii. cap. xii. de plantarum historia, crassiorem, firmioremque illam arundinem esse, quæ uallatoria nominatur, facile sum ad credendum inductus, hunc Dioscoridis locum esse deprauatum: eoque magis, quod septis, palis, & topiarijs operibus crassæ sunt tenuibus aptiores. Illa uero, quæ ad scribendum usurpatur, cui auctoritatem penna derogarunt, plurimis reperitur in locis, estque omnibus notissima: ueluti & ea, quæ Cypria uocatur, in paludibus nascens, & apud amnes. Traditur à pluribus rei agrariæ auctoribus, tum etiam à Plinio, inter arundinem, & filicem herban inestinum esse odium: proinde arundinem uomeri illigatam filicem in agro destruere, ac enecare prodiderunt. At eò maior arundini cum asparagis intercedit amicitia: nam si serantur in arundinetis, inibi mirifice proueniunt. Quidam præterea prodiderunt, arundines in India ad tantam assurgere molem, ut singula internodia maiorum uicem præstent per fluuios, & lacus, ternos homines capiente alueo. At si plura de arundinum generibus quis audire cupiat, Theophrastum legat, qui longiori sermone earum historiam literis memoriaque mandauit. De arundine Galenus lib. vii. simpl. medic. hæc scripta reliquit. Calami phragmitis radicem cum bulbis aculeos, & stipites ex alto extrahere quidam scripsere, ceu trahendi quadam uis ei inesset. Nos tamen eius rei periculum non fecimus: uerum quantum gustu liceat conijcere, abstergentem facultatem possidet non paucam, minimeque acrem. Cæterum filia ipsa abstergentis sunt facultatis. Cortex uero eius combustus admodum tenuium partium, & digerentis facultatis efficitur, adiunctum habens absterforium quiddam, ut exciet, & excalescat tertio quodammodo ordine, plus tamen desiccet, quam excalescit. Vitandum autem est eius id, quod anthelen uocant: nam si in aures incidat, adeo tenaciter adlærens affigitur, ut auelli non possit, auditumque uitiat: quamobrem sepius incit exurdat. Arundo sic Latine uoce uocatur, ut Græca κάλαμος: Arabica, Casab: Italica, Canna: Germanica, Kor: Hispanica, Cannas: Gallica, Vng roseau.

Arundinis, &  
filicis odium.Arundinis ui  
res ex Gal.

Nomina.

## Papyrius.

## Cap. XCVIII.

PAPYRVS, qua chartæ sunt, nullis non cognita, præcipue in medicina utilitatis ad laxandas fistulas: madefacta lino inuoluitur, usque dum inaruerit: constrieta enim, atque immissa in hiatum humore completur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimenti radix: itaque Aegyptij eam mandant, succum tantum deuorantes, & mansam expuunt. Ipsi radicibus pro ligno utuntur.



tur. Crematæ papyri cinis depascentia vlcera cùm omnium partium, tum oris maximè, cohibet: verùm melius id combusta charta præstat.

**QUALIS** Papyrus sit, Italia nescit: siquidem (ut Theophrastus est auctor lib. III. cap. IX. de plantarum historia, & Plinius lib. XIII. cap. XI.) Papyrus in Italia non nascitur, sed in Aegypto quibusdam in locis tantum prope Nilum fluuium, quiescentibus Nili aquis, ubi hæ euagatæ stagnant, duo cubita non excedente altitudine gurgitum: brachiali oblique radice crassitudine, triangulis lateribus, decem non amplius cubitorum longitudine, in gracillitate fastigiatur, thyrsi modo cacumen includens: semine nullo, aut usu eius alio quàm floris ad deos coronandos. Radicibus incole pro ligno utuntur, nec ignis tantùm gratia, sed ad alia quoq; utensilia vasorum. Ex ipso quidem papyro nauigia texunt: & è libro uela, tegetesq; necnon & uestem, etiam stragulam, ac funem. Mandunt quoq; crudum, decoctumq; succum tantùm deuorantes. Nascitur & in Syria, circa quem odoratus ille calamus lacum. Nuper & in Euphrate nascens circa Babylonem. Papyrus intellectum est eundem usum habere, quem chartæ: & tamen adhuc malunt Parthi literas uestibus intexere. Preparantur ex eo chartæ diuise ac in prætenues, sed quàm latissimas phyluras. hæc Plinius. Qui deinde sequenti capite fusius docuit Papyri conficiendi rationem, his uerbis. Post hanc papyrus est, extremumq; eius scirpo simile, ac ne funibus quidem nisi in humore utile. Texunturq; omnes tabulæ madætes Nili aqua. Turbidus liquor nim glutini præbet, cùm primò supina tabula scheda adlinitur lōgitudine papyri, quæ potuit esse, reseminibus utring; amputatis. Transuersa postea crates peragitur: premitur deinde prelis, & siccantur sole plagula, atq; inter se iunguntur. proximarum semper bonitatis diminutione ad deterrimas. Nunquam plures se: po, quàm uicene, magna in latitudine earum differentia XIII. digitorū optimis. Hactenus de papyro Plinius. Videntur & Papyri quoddam esse genus, tenuia, lauiq; illa folia è iuncea quadam planta prodeuntia, quæ ab insulis diui Thomæ, Brasiliæ, & Mederæ, ad nos conuehuntur, sacchareis ut uocant panibus inde delatis circūuoluta. Quamdoquidem fragmentum rei inuenimus à clarissimo medico Luca Ghino Pisis ad nos missum, nigris rubrisq; Arabicis characteribus manu scriptum. Quod clarissimum præbet indicium, earum insularum incolis tenuissimis his folijs, pro papyro passim uti. Veruntamen hoc non esse papyrus, è quo antiquitas suas confecit chartas, certò scimus, quòd hoc arte (ut Plinius est auctor) fieret, illud uerò tale à natura producat, & proprium suæ stirpis sit folium. Antiqui itaq; ex Papyro chartam faciebant, quemadmodum nos ipsam ex contritis linteis. conficimus: unde hactenus antiqui res ænens nomen, etiamnum Papyrus apud plerosq; dicitur. Credidere nonnulli, ueram esse Papyrus arundines illas, quas Indicas uocant, quibus imbecilles principes, atq; hierarchæ, prelati uulgò dicti, ad ægram senectutem fulciendam pro scipione utuntur, materiem auro, uel argento succingentes. Quod tamen asserere non ausim, nec utiq; reprobare, cum huiusce rei certam cognitionem adhuc assequi non potuerim. Papyri meminit Galenus lib. VI. I. simp. medicam. sic inueniens. Papyrus ipsa quidem per se in usum medicinalem non uenit: at macerata, aut usta utilis efficitur. Igitur oxycrato, uinoue macerata, recentia ulcera glutinat, maximè in circulum circumposita. Verùm hîc quidem est, ceu materia, quæ medicamina sanantia accipiat: at ubi usta fuerit, medicamentum est exicatorium, uelut & chartæ combustæ cinis, nisi quatenus infirmior est, quàm papyri. hæc Galenus. Ceterum animaduertendum est, quòd nostri usus chartæ, quæ ex ueteribus conficitur linteis, ipsam non pollet facultatibus, quibus ea commendatur, quam ueteres ex papyro arbore parabant. Quo sit, ut dubium mihi sit, quonam modo parari possit illud Galeni medicamentum, quod de charta combusta dicitur, ulceribus sordidis, & sinuosis utilissimum: itemq; pastillus Faustini à Paulo lib. VII. traditus. Πάπυρος Græcis, Latinis pariter Papyrus appellatur: Arabibus, Burdi, seu Berdi: Italis, Papiro.

Papyri conficiendi ratio.

Papyri conficiendi ratio.

Indica arundo.

Papyri uires ex Galeno.

Nomina.

## MYRICA.



### Myrica.

### Cap. XCIX.

**MYRICA**, seu tamarix, arbor vulgo cognita est, cùm apud pigras, & stagnantes aquas enascatur, fructum quasi florem ferens, compage muscosum. Aegyptus, Syriaque alteram gignunt mitiorem, syluestri cætera similem. Fructum parit gallæ proximum, inæqualiter astringentem gustu: quo conuenienter utimur uice gallæ in medicaminibus oculorum, orisque. Datur cruenta excreationi in potu, & cæliacis, & contra proflusua sceminarum, regium morbum, & phalangiorum morbus: illius tumores inhibet. Cortex in eisdem usum adhibetur. Decoctum foliorum cum uino potum, lienem absument. ad dolorem dentium in collutionibus salutare, & mulieribus fluxione vuluæ opportunis in defectionibus: phthiriasi, lendibusque circumfusum prodest. Abundantiam sceminarum



foeminarum sistit impositus arboris cinis. Potorios calices è caudice lienosis moliuntur, quò datus in his potus proficiat.

Myricæ con-  
sideratio.

VRBANA Myrica, quòd sciam, non nascitur in Italia; quanquam in Aegypto, et Syria gignitur. Quæ uerò alicubi reperitur in hortis, et in quibusdam uiridarijs mitior credita, non alia est, quam sylvestris, in locos mitiores translata. Cuius rei certo sunt indicio fructus, et flores, quos omnino sylvestribus similes profert, non autem gallæ modo, ut domestica. Umbra arboris insigni proceritate sepe per æstatem Romæ me oblectatū fuisse recorder ad Tyberis ripas, in hortulo quodam hospitalis Sancti spiritus. quæ etsi domestica haberetur ab omnibus; florem tamen, et fructum ferebat sylvestri similem. Hæc in fluminum ripis frequentissima nascitur in Italia. Quare nō potui non ad mirari Dioscoridem: quippe qui dicat tantum nasci Myricam apud paludes, ac residues aquas, cum oppositum sanè enun-  
ciat in Italia. Quod me sepius adduxit, ut crediderim, aut Dioscoridis codicem hoc loco deprauatum esse, aut in Gra-

Myricæ medi-  
cinæ.

cia secus, quàm in Italia myricam proxime stagna, ac paludes oriri. E myricæ trunco alui excauantur (ut Colus-  
mella scribit) aquaq; replentur, ut subinde postea bibant sues: nam hoc potu splenis incremento sanantur, quo morbo æstate maxime torquentur, dum, quæ eorū est pabuli insatiabilis auaritia, arborum fructus confectantur, qui plurimū eo tempore propter ariditatem in terram decidunt. Porro myricæ cinerem omnia ulcera ignis exustione contracta, efficaciter exiccare author est Serapio. Folia simul cum tota planta siccata frigidas collectiones inibent, ac reprimunt. Elephantiasim ex lienis uitio obortam myricæ radicū decoctum, et cum passis uuis epotum sanare tradidit Alca-  
zizius Arabs: id quod se uidisse ait in duabus mulieribus, quæ hac labe laborarūt. Ex quo mihi persuasum est, id nō in-  
congruum in Gallica peste fore medicamentum, Guaiaco forsitan ligno nō ab simile. Myricæ radices pro odorata cau-  
sia uenditabant impostores. Sed postquàm fraus à peritis medicæ materiæ uiris deprehensa est, eius in officinis usus  
penitus exoleuit. Meminit myricæ Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Myrica abstergens  
gentis est, ac incidentis facultatis, absq; perspicua desiccatione: habet uerò etiam adstrictionem nonnullam. Has  
qualitates, facultatesq; admodum prodest lieui indurato decocta cum aceto, aut uino, siue radice, siue folijs, siue ex-  
tremis ramulis: sanat porro dentium dolores. Ceterum fructus, et cortex non paucam sortita sunt adstrictionem,  
adeo ut gallæ omphacitidi proxima sint, nisi quòd acerbitas euidentis est in galla, sed myricæ fructui temperatura me-  
inequalis: immista est enim naturæ eius multa partium tenuitas, atq; uis abstergendi: quod sanè gallæ non accidit. At  
tamen ubi galla fortè ad manum non erit, eo uti liceat ad omnia, ad quæ illa utitur: in eisdem et cortice. Porro my-  
ricæ combustæ cinis admodum desiccatoris facultatis est, plurimam habens abstergendi facultatem, pauxillum ad-  
stringendi. Myrica arbor ita Græcè uocata, Latine Myrica, et Tamarix nuncupatur: Arabicè, Tarfa, seu Cam-  
fa: Italicè, Tamarigio: Germanicè, Tamariscken, aut Porst: Hispanicè, Tamargueira, et Tamariz: Gallicè,  
Tamarisc.

Myricæ uires  
ex Galeno.

Nominaz.

## ERICA.

## ERICA ALIA.





## Erica

## Cap. C.

**ERICA** fruticosa arbor, myricæ similis, longè minor. cuius flore apes reprobum mel efficiunt. Tam flos, quam coma serpentium ietibus illitu medetur.

**ERICA** stirps fruticosa Aste, Græciæq; fruticibus ascribitur. Hæc (ut plantarum scriptores asserunt) bis anno floret. quo fit, ut prima, & ultima habeatur, quæ inter sylvestres stirpes floreat. Plinius lib. XXIIII. cap. IX. ericam describens inquit. Ericen Græci uocant fruticem non multum à myrice differentem, colore roris marini, & penè folio. Hanc aduersari serpentibus tradunt. hæc Plinij uerba. Verum non ob id facile fuerit affirmare, quenam planta nobis legitimam Ericam præ se ferat, cum tam paucis notis describatur ab omnibus: tametsi hæc, cuius hic figuram appinximus, nil aliud, quam cricam designare uideatur. Siquidem fruticosa est planta, semicubitalis, colore roris marini, folijs ferè myricæ, cui eam Dioscorides assimilat: uere primo & autumnio florescens, quod huius fruticis proprium est, si rei herbariæ scriptoribus est adhibenda fides. Adde, quod huiusce flores autumnio maxime depascantur apes, ea fortasse de causa, quod non modò Erica prima sit, & ultima sylvestrium, quæ floreat; sed quod etiam diutius floribus quam plurimis ornetur, nempe autumnio toto, & ad hyemem usque. Vnde mel, quod ex his apes faciunt, ericeum (ut Plinius est author) antiquis appellatur, quod conuehi tradidit post primos autumnii imbres, cum erica sola floret in syluis. Præterea cum lib. III. scribat Dioscorides, corim, hypericum aliquibus uocatum, fruticem esse folio ericæ, minore tamen, sitq; hæc cori folio admodum similis, magis adhuc inclinauit animus ad credendum, hanc esse Dioscoridis ericam. His ergo rationibus adductus non temerè factum putauimus, pro legitima erica huius effigiem expressam dare. Oritur hæc frequentissima in Goritiensi agro eo præsertim tractu, quæ à Diuo Andrea (ita appellatur uicus) ad Vipacum fluuium itur. incolæ uernaculo sermone eam nominant Grione. Sed in Hetruria longè magis adolefcit, fiuntq; ex ea scopæ aptissimæ ad mundandas ædes, & ob id uulgo hæc planta propriè uocatur Scopa. Marcellus, nescio qua ratione ductus, cricam magno errore genistæ speciem putat. Ericam aliam, cuius etiam hic imaginem exhibemus, ut quæ fortasse non minus, quam antedicta, ueram referat, misti ad me Gabriel Falloppius Mutinensis medicus singularis ingenij & eruditionis, dum Patavij honorificè humani corporis dissectionem & materiam medicam proficetur. Eam autem libenter depingi curauimus, atque in medium proferre libuit, ut rei herbariæ peritos in his, quemadmodum & in cæteris plantis, iudices constituamus: quorum sanè iudicio subscribent studiosi, quibus nos quidem, quantum labore atque industria consequi possumus, non grauamur prodesse. Ericam paucis perstrinxit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Erica digerendi per halitum facultatem obtinet. Flore eius potissimum, ac folijs utendum. hæc Galenus. Cæterum aqua, in qua Erica decocta sit, sumpta tepida tam mane quam uespere triginta dies quinque unciarum pondere tribus horis ante cibum, ualet ad uescicæ calculos comminuendos & expellendos. Verum post id tempus malè affecti in balneum decoctionis eiusdem plantæ ingredi, atque inibi dum morantur, super Ericam decoctam sedere debent: idq; pluries repetendum est. Equidem noui aliquos, qui seruata recta uictus ratione, hoc tantum potu uescicæ calculum in minutas partes comminutum eiecerunt. Planè hæc, quæ Græcis ἐρεῖνα, Latinis item Erica nominatur, pariter & Italis: Heyden, Germanis: Queiro, Hispanis: Bruyere, Gallis.

Ericæ cōsideratio.

Mel ericeum

Ericæ facultas ex Gal.

Nomina.

## Acacalis.

## Cap. CI.

**ACACALIS** fructus est nascentis in Aegypto fruticis, seminis myricæ quadantenus similis. Cuius aqua, in qua maduerit, ad collyria additur, quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt.


**ACACALIM** Aegyptiæ arbusculæ semen ad nos hac ætate conuehi non equidem arbitror. quippe quod inter semina, quæ peregrina nobis importantur, nullum adhuc repperim, quod Acacalim legitimè referat.



RHAMNVS PRIMVS.



RHAMNVS SECVNDVS.



RHAMNVS TERTIVS.

Rhamnorum  
consideratio.

Ruellij error

## Rhamnus. Cap. CII.

RHAMNVS fruticat in sepibus, ramos ferens re-  
ctos, & aculeos in acutæ spinæ modum: folijs parvis,  
oblongis, subpinguibus, teneris. Alterum ei genus can-  
didius. Tertium nigrioribus, latioribusque folijs con-  
stat, & quadantenus rubentibus: cuius rami quinim  
ferè cubitorum longitudinem implent, spinosiores qui-  
dem, sed infirmioribus, minusque rigentibus aculeis.

Fructum edit latum, candidum, tenuem, follicu-  
lari specie, verticillo similem. Omnium folia igni sacro  
& serpentibus ulceribus, efficaciter illinuntur. Fama  
est ramos huius valuis, fenestrisue impositos, ueneficia  
depellere.


RHAMNI tria genera facit Dioscorides. Primum, &  
tertium ubique in Hetruria fruticant. Illud priuatim in sepibus  
nascitur, quo nostrates mulieres utuntur ad insolandas fœcis:  
siquidem eas adhuc recentes longis huiusce fruticis aculeis per-  
forant, & ad solem appendunt. Fert aculeos in acutæ spinæ mo-  
dum: folia oblonga, mollia, subpinguia: corticem habet admo-  
dum album. Hoc, quod nigrius est (ut etiam Dioscorides inquit)  
quinim ferè cubitorum altitudine attollitur, infirmioribus acu-  
leis: fructu tenui, folliculari specie, rotundo, verticillo non ab-  
simili. Secundum uerò genus, quod ceteris candidius est, ad nos  
misit clarissimus medicus Lucas Ghinus, cuius etiam hic effigiem  
damus. Ceterum Ruellium deceptum esse crediderim. quippe  
qui Rhamni genus eam esse stirpem arbitretur, quam nos vulgari  
sermone



## SPINO MERLO ITALICE.



## HALIMVS VVLGARIS.



sermone SPINO merlo, Longobardi Venetiq; Spin ceruino, Foroiulienses uerò Spin guerzo appellant. Hæc enim folijs est latis, pyri quadantenus modo: fructu ligustri effigie, baccarum instar, cuius succo utuntur pictores, ubi colore uiridi inficere sit opus: alij uerò ad resoluendam aluum cum saccharo decoquunt: eijcit enim atram bilem, & pituitam. quæ sanè notæ Rhamnis minime correspondent. Aberrasse præterea Ruellius deprehenditur, quòd Theophrasti testimonio ea de Rhamni fructu tradiderit, quæ statim Theophrastus absoluta rhamni historia de paliuro diffinit. Sed in errore longè maiore uersantur Monachi, qui in Mesuem commentarios edidere, cum Rhamnum existinauerint rubum quendam, qui humi repens, incultisq; proueniens, mora cæruleo potius, quàm nigro colore profert. Rhamni meminit Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Rhamnus desiccata, & digerit excessu secundo, refrigerat in primo completo, aut secundo incipiente: proinde herpes sanat, & erysipelata non magnopere calida. Cæterum ad hæc teneris utendum est folijs. Huic plantæ nomen Græcum *πέλμος*: Latinum, Rhamnus: Mauritanum, Nausig, siue Nauségi: Italicum: Rhamno, & Marruca: Hispanicum, Scambrones.

Monachorū error.

Rhamni vires ex Gal.

Nomina.

## Halimus.

## Cap. CIII.

HALIMVS frutex est sepimentis idoneus, similis rhamno, sine spinis, folijs oleæ, sed latioribus. Nascitur in sepibus, & maritimis. Folia decoquuntur ciborum gratia. Radix conuulsa, rupta, torminaq; mitigat, drachmæ pondere in aqua mulsa pota: eadem lactis ubertatem facit.

EST profectò et Halimus planta, cuius uariæ sunt inter auctores sententiæ. Alij enim (ut Plinius auctor est lib. & cap. XXII.) halimum fruticem esse dicunt, Dioscoridem secuti. Alij maritimum olus, salso sapore. Tertium quoq; genus addidit Crateuas sub hedera tantum nasci, longioribus folijs, hirsutioribusq; odore cupressi. Quæ autem à Dioscoride hoc loco describitur, etsi alicubi fortassis proueniat; in Italia tanè qui illam mihi ostēderet, adhuc reperi neminem. Verian, si Ruellio credimus, frequens in Gallia nascitur in sepibus. Solinus plurimam in Creta nasci tradit, mirabili, si credamus, effectu, quòd ea tantum admorsa fames arceatur. unde si nomen adinuenisset, ea procul dubio sine aspiratione scribenda esset. Halimus Mauritanis molochia, & atriplex marinus appellatur. Cuius historiam refrens Serapio, narrat, quòd eam uenalem circumfrentes in manuales fasciculos componunt, & per Babyloniam clauitant, molochia. Quod manifestè indicat, Halimum apud Mauritanos herbam potius esse, quàm fruticem, uel arborem, eamq; fortasse, quam Plinius maritimam, ac salsam prodidit. Quo fit, ut salsam quandam herbam (incolæ Bidone uulgo appellant) quæ frequentissima in litoribus Venetis prouenit, banc esse putauerim: quippe quòd ea instar oleris in ciborum usum recipiatur. Hæc nimisrum (ut eius pictura, quam hic damus, apertè demonstrat) folia fert oliuæ similia, crassiora taneu, ac perinde ferè pinguià, ut portulacæ, subalbida, lauià, sapore salso. Caules emittit albi-  
cantes, tenues, & lentos, in quorum summitate semen profert minutum, racematim coherens. Nascitur frequens prope Terge-  
gesti moenia circa salinas, ubi etià separatim, nec minus copiosa uisitur atriplex marina, quæ syluestrem maximè æmuletur. quanquā apud Mauritanos atriplex marina idem esse uidetur cū halimo. Sed quòd inter se differant, manifestum fiet libro secundo in atriplex commentatione. Cæterum putat Adamus Lon-

Halimi cons-  
deratio.



Halimi vires  
ex Galeno.

Nomina.

cerus; Halimum eam esse plantam uuas ferentem, quam uulgò Ribem uocant. Sed cum huius folia non respondeant oleaginis, sed potius uitigineis, eum planè hallucinatum esse constat. Halimi meminit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Halimum, hæc planta frutex est plurimo in Cilicia præcipuè prouentu, ubi & genera eius recentia esitant, & reponunt quoq; in posterum futura usui. Semen pariter, & lac planta ipsa generat, estq; gustus salis, & subadstringentis. Ex quibus omnibus palàm est, ipsam esse dissimilem. Maior autem pars eius substantiæ calida est temperatè, cum humiditate inconfecta, & leuiter flatuosa. Quæ planta Græcè ἅλμος, Latine similiter Halimus dicitur: Arabicè, Molochia; Italicè, Halimo.

### Paliurus.

### Cap. CIIII.

PALIVRVS frutex cognoscitur, aculeatus, durus: cuius semen, pingue, & fuliginosum inuenitur. Quod potum tussi opitulatur, uesicæ calculos comminuit, serpentium ictibus aduersatur. Folia & radix atrictoriam uim habent: quorum decoctum potu alium sistit, urinam trahit, contra uenena, & serpentium morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoresque omnes discutit, trita, & imposita.

Paliuri consi-  
deratio.

ADEO inter se in quibusdam plantarum historijs discrepant scriptores, ut persæpe eorum mentes maximè perturbent, qui rerum ueritatem indagare student. Id autem discrimini nimirum euenit de Paliuro. Nam quæ huiusce stirpis à Dioscoride traditur historia, omnino differt ab ea, quam diuersis generibus protulit Theophrastus. Hec enim non conuenit cum ea, quam memoriæ prodidit Agathocles: neque huic illa correspondent, cuius Plutarchus est auctor: & hæc à prædictis omnibus prorsus dissentire uidetur. Paliurus Dioscoridis (ut ab eo primum exordiar) est frutex spinosus, durus, omnibus notus: cui semen pingue, & fuliginosum. Paucis eius historiam perstrinxit Dioscorides, nulla habita de folijs mentione, quòd superuacaneum existimauerit pluribus agere de Paliuro, utpote plantam apud suas regiones notissimam. quòd nobis est impedimento, quò minus ueram Paliurum, de qua ipse intellexit, cognoscere ualeamus. Theophrasto deinde lib. III. cap. XVII. de plantarum historia plura sunt Paliuri genera, quæ omnia in siliquis semina terna, aut quaterna proferunt, lentorem præ se ferentia, ut lini semen. Amat uasculis locis aridis, quemadmodum & rubus, nec minus quoque dilutis. Cæterum ab hac uon parum differre uidetur & illa, cuius idem meminit inferius libro, & capite quarto: siquidem hanc plurimam nasci testatur in Aphrica folijs ei, quæ in Græcia nascitur, non absimilem. Quæ quanuis folio Græcam æmuletur; fructu tamen diuerso prouenit, ut qui non latus, neq; folliculari specie; sed rotundus, ruberq; sit, cedri fructibus magnitudine similis: cui & nucleus inest acinorum punici modo, qui nō manditur. Fructus uerò per se iucundus habetur atq; si quis uinum infundat, tum ipsum suauiores, tum uinū suauius reddi aiunt. Ex quo aliquando mihi persuasi, eum non longè aberrare, qui dixerit, hæc illam esse stirpem, quam nos AGRIFOLIUM dicimus, quòd folijs sit undiq; aculeatis loto maioribus, fructu cedri, rotundo, rubro, nucleum intus habente, iucundo, & gustui non ingrato: non tamen, quòd pro certo hoc asserere uelim, quòd hæc propria sit Aphrica plantæ; sed quòd aliquando his notis persuasus putauerim, Paliurum hæc aut Agrifolium esse, aut omnino arborem sibi similem. Plinius & Theophrasto hanc ipsam literis mandauit lib. XIII. cap. XXVII. Sed cum de uiribus eius differeret lib. XXIII. eam recēsit, quæ & Dioscorides. Nullam ego arborem hactenus reperi, quæ Paliuro Aphricanæ similitudine respondeat, præter Agrifolium, ut dixi. Non dico Aquifolium: nam (ut Plinius refert lib. XXVII. cap. VIII.) Aquifolium ea est in Italia arbor, quam Theophrastus Crateogona uocat, omnibus ferè notis mespilo similis. Illa uerò, quam Agrifolium appellamus, constat folijs perpetuis, lauri, latioribus tamen, subpinguibus, et per ambitum aculeatis: cortice uiridi: ramis lentis, ac flexilibus. Fructus ei rotundus, lucidus, ruber, rufescens & cedrū baccis æmulans. Huius radicem cortice incole uiscum parant, quo etiam modo ex uiburno conficiunt. Hanc nō desunt, qui uelint eam esse stirpem, quam Theophrastus Agriam, siue Ariam appellat, sempiternæ frondis arborem, inter robur, et ilicem median. Verum ut ad nostrum institutum redeamus, Agathocles Paliurum omnino ab illis differetem tradit: quippe quoniam niam assurgat in Alexandria (ut ipse inquit) ad pinus, ubi q; proceritate, ramis frequentibus, & aculeatis: folio uiridi, rotundo, tenui. Hæc bifera est, nam tam uere, quam autumno fructum profert, oliuæ phauliæ uocata magnitudine. Crudus mādatur is ac uirens: ubi uerò exaruit, in farinam molitur, atq; ea ita estur multo liquore subacta. Aliud Paliuri genus in monte Coccygio nasci prodit Plutarchus ex Ctesiphontis autoritate libro arboribus discuto.

### AGRIFOLIUM.

Agrifolium.

Aquifolium.





eto, cui si auis, aut aliud animal uolucres fidat, uelut inuiscatum coheret, præter cuculum, cui soli parcit, si tamen his fides est adhibenda. Quare cum de Paliuro, et ac diuersæ ferantur sententiæ, et habeantur historia, facile crediderim, Paliurum esse nomen ad nationum placita uarijs, ac diuersis aculeatis stirpibus impositum. et si Iosephus Salandius medicus apprime doctus, et in stirpium historia non imperitus, dum Veneta classe in Græciam traieciisset, Dioscoridis Paliurum se uidisse mihi pro certo affirmauerit, semine fuliginoso, ac pingui: atq; inibi proprium adhuc nomen retinere. Sunt tamen e recentioribus, qui putent Paliurum Dioscoridis eam esse arborem, quam nos sequenti capite oxyacantham esse pluribus comprobabimus. Sed profecto non placet eorum opinio, quod planta, quam oxyacantham censemus, arbor sit, non frutex: quodq; fructum proferat myrti magnitudine, confertum, fragilem, rubrum, osiculos intus habentem, et in racemi modum coherentem. Paliurus uero non fructum, sed semen ferat fuliginosum, pingue, et ut Theoph. inquit lib. III. cap. XVII. de historia plantarum) in siliquis conclusum, lentum, pingueq; lili seminis instar. Verum ij fortasse Theodorū Theophrasti interpretem sequentes, hac in re decipiuntur. Siquidem is lib. primo cap. XVI. sic uertit: Quædam folia cum extremo, tum etiam lateribus sinuata concidunt, ut ilicis, roboris, similacis (glandifera scilicet, et ilici similis) rubi, paliuri, et aliorum. Vbi animaduertendum est, eum perperam uertisse *ῥοβυλῆος* sinuata, cum ea dictio Græca nil aliud Latine significet, quam spinis horridula. Error præterea ex eo manifestè deprehenditur, quod omnibus sensu pateat, ilicem, similacem, rubum folia non proferre aliqua parte sinuata, uti ea esse cernuntur, quæ plantæ illi exeunt, quam nos acutam spinam arbitramur; sed longa, et per ambitum ubiq; tenuissimis, ac crebris aculeis circumsepta, in eiusdem capituli progressu idem ostendit Theophrastus, cum inquit. Simili modo nonnulla ex his caulem primo mittem, post horridulum spinis gerunt, ut lactuca, et cuncta folia spinosa redduntur, atq; etiam magis in fruticum genere, ut rubus, paliurus. Quibus palam fit, plantam, quam nos uulgo uocamus Bagaia, alij uero Amperlo, non esse Paliurum, sed potius acutam spinam ijs tum rationibus, tum auctoritatibus, quæ sequenti capite à nobis adducentur. Galenus Paliuri à Dioscoride descripti meminit lib. VIII. simp. med. his uerbis. Paliuri folia, et radix adeo non obscuram habent adstringendi facultatem, ut et uentrem fluentem cohibeant: adeo digerunt, ut et phymata curent, quæ quidem non admodum phlegmonode sunt, et calida. Fructus porro tantam obtrinet incidendi uim, ut et calculos uesicæ comminuat: et pectoris, pulmonisq; excretionibus auxiliatur. *Παλιυρος* Græcis, Paliurus Latinis, Paliuro Italis pariter appellatur.

Recentiorū opinio reprobata.

Paliuri vires ex Galeno.

Nomina.

## Acuta Spina.

## Cap. CV.

ACUTA spina, quam pyrinam, aut pityanthem aliqui uocant, arbor est pyrastro similis, spinosa ualde, & minor: baccas profert myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum: radicem multifidam, altè descendentem. Huius baccæ potu, aut cibo, alui profluuium, & abundantiam fœminarum sistunt. Radix illita aculeos, & spicula extrahit: abortum fieri tradunt, si ter radice uenter aut sensim feriat, aut perungatur.

HABET pro comperto tota recentiorum medicorum familia, quod arbor Dioscoridi *ὀξύανθα*, id est, acuta spina, uocata, quam Mauritanii Berberim dixere, ea sit nimirum arbuscula spinis horrens, quam rura Tridantina, ubi in sepibus, soluis, et conuallibus frequentissima nascitur, Cresspino uulgo nominant: medicorum uero uulgus, ac officinæ Arabes secutæ Berberim appellant, ita esse certò credentes, ut opinione ducuntur. Veruntamen si rectè delineationes, notæq; perpendantur, quas oxyacanthæ reddidit Dioscorides, cresspini notis prorsus acuta spina reclamare constabit. Quæ potissimum ratione adductus, quò magis ueritas eluceat, errorisq; nebula tollatur, non dubitavi eorum opiniones refellere, qui inter recentiores medicos de stirpibus commentaria conscribentes, Cresspinum uocatum legitimam oxyacantham esse asseuerant. Neque me fugit, non parum suscepisse uegotij, ut eos à concepta iandiu opinione in sententiam nostram, quam ueram putamus, uenire compellam, cum magna admodum sit tum medicorum, tum seplasiariorum turba, quæ hac in historia longo usu aberrat. Verum cum compertum habeam, quod ueritas sit niue candidior, solèq; splendior, et eorum tum uera, tum fida comes, qui uirtutibus, ac probitate præstant, duxi meas rationes multorum auctoritate comprobatas, nullam horum doctissimorum uirorum auribus molestiam allaturas, qui nolentes aberrarunt: quinimo ijs, utpote ueri defensoribus, fore iucundissimas, atq; gratissimas. Nam qui, ut sibi placeant, malunt errare quam ueritati, et æquo cedentes, errores cognoscere, eosq; corrigere, non sunt in philosophorum, ac rationabilium hominum numero recipiendi. Sed ne apologeticis uerbis tempus conteratur,

Acutæ spinæ consideratio.



meas rationes multorum auctoritate comprobatas, nullam horum doctissimorum uirorum auribus molestiam allaturas, qui nolentes aberrarunt: quinimo ijs, utpote ueri defensoribus, fore iucundissimas, atq; gratissimas. Nam qui, ut sibi placeant, malunt errare quam ueritati, et æquo cedentes, errores cognoscere, eosq; corrigere, non sunt in philosophorum, ac rationabilium hominum numero recipiendi. Sed ne apologeticis uerbis tempus conteratur,



Acuta spina  
non est offic.  
Berberis, siue  
Crespinus.

ratur, rem institutam aggredior. Dioscorides acutam spinam arborem esse pyraastro similem scribit, minorem tamen, magisq; aculeatam, fructumq; gerere myrti similitudine, plenum, fragilem, rubentem, & intus nucleum, cui radices subsint multitudine, atq; descendentes. Ex quo palam est, ipsum non alias acutæ spinæ notas expressisse, quam proceritatis, crassitudinisq; stipitis, ramorum, radicum, ac fructuum, omissa foliorum, florum, & corticis histozia. Quæ omnia ipse accurate perpendens, in primis Crespinum omnibus notis pyraastro reclamantem comperio, cui tamen prorsus adstipulari acutam spinam Dioscorides est auctor. Siquidem Sylvestris pyrus, quemadmodum et oxyacantha, simplex è solo prosilit, atque unico duntaxat caudice attollitur, ac inde tam in longum latumq; crescit, ut ad communem arborum proceritatem assurgat. Crespinus uerò, cuius sanè innumera mihi præ oculis quotidie sese offerunt plantæ, nullum abradicibus mittit caudicem, sed pluribus, ac diuersis aculeatis stolonibus fruticat, qui uirgarum modo in altum se attollunt, nec unquam arborescunt, nisi rarò, & longo temporis tractu: quippe qui omnium maiores habentur, pollicarem crassitudinem rarissime excedunt, nisi ætate longa incrementum susceperint. quin & rara inueniuntur eius uirgulta, quæ hominis longitudinem æquent. Ad hæc pyraaster cortice constat aspero, squamoso, inæquali, crasso, colore in uigro rufescente. Crespinus uerò cortice uestitur albo, læui, & admodum tenui: quo fit ut non adeò leuiter ferro, uel lapide tangi possit, quin statim cortex frangatur, & crocea ligni materies detegatur. Præterea pyraaster prunorum modo aculeata conspicitur, aculeis singulis ex eodem loco erumpentibus, licet rami frequentissimis horreant spinis, ijsq; nigris, ualidis, candidi rhamni modo mucronatis. At crespinus tenuis per interualla armatur aculeis, simul ex uno, eodemq; puncto prodeuntibus, adeò ut trifurcato ordine prodeat, duobus scilicet utrinque se pandentibus, tertio uerò medium occupante, albis, planis, non quidem rotundis, fragilibus, & admodum pungentibus. Illud insuper discriminis addam, acutam spinam fructum asferre myrti magnitudinis. Crespinum uerò racematim in uirgum modum, cuius oblongi acini tritico paulò maiores, uiuidi, ac rubentes, eleganterq; racemis adnexi, puniceos acinos quadantenus representant: quanquam minores, oblongiores, acidiores, & colore etiam multò uiuaciores habeantur. Crespini deinde folia minime pyrastrum referunt, sed potius puniceum malum, quamuis latiora, nec adeò in mucronem desinentia, per ambitum spinis tenuissimis, frequentissimisq; horrida. Radices etiam, quæ profecto æquæ flauæ sunt, ac si croco essent infectæ, etsi plures sint, atque exiles; nihilominus altè non descendunt, ueluti acutæ spinæ, sed in latus summo cespite uagantur. Flos denique pyraastro admodum refragatur: namque melius ex racemo uirgæ simili erumpit, sui fruticis interno colore, à quo dum explicatur, atq; debescit, perquam suauem spirat odorem. Quibus euidentissime colligi potest, & oxyacantham Græcis, & berberim Arabibus non esse crespinum, cuius communis est usus apud medicos, & seplastarios. Sed præter hæc illud etiam certò credendum est, quòd si Dioscorides per acutam spinam crespinum intellexisset, nunquam silentio dissimulasset folia mirabili opere per ambitum aculeata: neque fructum, quem ramis pendulum gerit, acinis inter se racematim coherentibus, myrti baccis assimilasset: nec scriptum reliquisset, radices in profundum agi: nec denique flauum earum colorem unquam reticisset, quo insigniter natura infectæ sunt. Non prætermisisset etiam spinarum historiam, utpote quæ ternæ suis uirgis imascentur, à pede ad uerticem: non corticis caudorem, non tenuitatem: non item, quòd sepius sine caudice, uarijs ueluti stolonibus fruticet: non denique ipsam pyraastro prorsus similem reddidisset, à qua profecto non minus dissidet, quam quercus ab olea. Caterum si modo dicendum est, Oxyacantham nasci in Italia, eam equidem aculeatam arborem esse crediderim, stipite, cortice, ramis, floribus, proceritate, ac ligni materie planè pyrastrum referentem, quam in Hetruria rura nostra Senesia Bagaia uulgò nominant, Anagninenses, & ceteri Tridentinarum uallium incolæ quidam Amperlo, quidam uerò Pan d'orso uernaculis nominibus uocant, & Goritienses Barazzo bianco uulgari sermone appellant: quippe quæ omnibus notis, ac lineis acutam spinam referat. Primum enim hæc manifesto indicio esse possunt, arboris scilicet stipis, rami in qualibet parte acutissimi, firmisq; aculeis armati, ligni materies, subcaber squamosusq; cortex, ueluti pyraastro. Tum ita esse comprobant, radices in profundum descendentes, & fructus, quem fert myrti crassitudine, uisu iucundus, rubescens, plenus, fractu facilis, ori subausterus, in quo modò unus, modò plures concluduntur nuclei. Flos etiam, quem album edit, pyraastro admodum adstipulatur: quippe quòd sit illi haud quaquam absimilis. Porro folia duntaxat à pyraastro dissidere uidentur: nam dissecta sunt apij modo, paululumq; longiora. Verum mihi quidem illud non uidetur ob multas rationes aliqua ex parte nostræ repugnare sententiæ: convenientias enim pluribus ex partibus peti certum est, non autem ex paucioribus. Quali ergo acuta spina uireat fronde, hic non explicauit Dioscorides; sed tantum dixit, eam esse arborem pyraastro similem: quòd magis ad stipitis, ramorum, corticis, florum delineationem, & ligni materiem respiceret, quam ad folia, quæ nihilominus lucinata constant apij modo: tametsi hoc in loco id adnotare prætermiserit Dioscorides. Hoc autem probatur manifesto ipsius Dioscoridis, ac etiam Theophrasti testimonio. Nam Dioscorides, cum de mespilorum genera constituit, & relictæ in capitis calce uulgata, quæ frequens, & communis uisitur in Italia, illam in primis descripsit, quæ Neapoli nostra tempestate uulgò Azarolo uocatur, & ueteribus aronia dicta est, sic inquit. Μεσπλον τὸ δένδρον, ὃ παρ' ἐνίοις ἀρωνία καλεῖται, ἀκυνθὰ δὲ ἐστὶν ὁμοίον τοῖς φύλλοις ὀξυκάνθῃ. καρπὸν φέρων μικρὸν μῆλον ὁμοίον, ἡδύον. id est, uerbum ex uerbo. Mespilus arbor, quæ à nonnullis aronia uocatur, spinosa est, similis folijs oxyacanthæ: fructum ferens exiguo malo similem, suauem. Quibus autem folijs constet illa mespilus Azarola uocata, Theophrastus lib. III. cap. XII. demonstrauit his uerbis. Huius folia dissecta sunt, extremitatēq; apij similia. Ita fit, ut concludamus oporteat, si mespilus aronia folio oxyacanthæ prouenit, eòq; scisso (ut Theophrastus prodidit) apij instar, hanc spinosam arborem Bagaia uulgò dictam, esse procul dubio acutam spinam. quandoquidem eius folia in modum apij dissecta sunt, mespili aronia modo. Theophrastus lib. VI. cap. ultimo de historia plantarum scribit, oxyacanthæ fructū fuisse antiquis in coronarum usu. Quod etiam non paruo est argumento, illam legitimam esse oxyacantham, quam in medium attulimus. Quandoquidem


Legitima oxyacantha.



## CRESPINVS.



## VVA SPINA.



fructus eius, qui autumnno toto, et ad mediam hyemen usq; perdu-  
rat, adeo leuore quodam pellucet, ruboreq; decoratur, ut globu-  
los e prestantiori corallio paratos referat: id quod in coronis ma-  
ximè prestasse crediderim. Hæc est nostra de oxyacantha senten-  
tia, à nobis satis, ut arbitror, tum rationibus, tum auctoritatibus  
comprobata. Quam tamen quod infirmare uideatur Theophrasti  
auctoritas lib. I. cap. xv. & lib. III. cap. IIII. de historia plāta-  
rum, ubi oxyacantha connumeratur inter eas arbores, quæ perpe-  
tua fronde uircent, cum nostre folia decidunt, non est qui nō faci-  
le intelligat. Sed ego quidem non possum huic auctoritati aliqui  
grauissimè assentiri, qui potius adducor, ut suspicer codicem ijs  
in locis deprauatum esse. Suspicionem nobis facit illud, quod ibi ti-  
lia, myrica, quercus, & terebinthus sempiterna coma prodantur.  
quod ut falsum deprehendatur ab omnibus, qui hisce plantis folia  
decidua esse obseruabunt, ita quoq; oxyacanthæ contigisse cogno-  
scent, atq; in omnibus mendum codici subesse. Eandem suspiciōem  
auget nobis Plinius, qui lib. xvi. cap. xx. & xxi. dum arbores  
enumerat, quæ perpetuò uirent, nullam tilia, nec quercus, neque  
oxyacanthæ mentionem facit: attamen is reliqua Theophrasto ac-  
cepta referre potest. Reliquum igitur est, ut dicamus, Crespini  
aliud esse ab Oxyacantha, plantamq; ideo fuisse ueteribus incogni-  
tam, quod eorum nullus, qui de plantarum historia scripserunt, hu-  
ius aculeatæ stirpis (quod ego sciam) meminerit. Porro CRE-  
SPINVS frutex potius, quàm arbor est, & terra uirgultis pluri-  
mis assurgens, ueluti corylus: è quibus non desunt, quæ quandoq;  
longo temporis tractu, egrè tamen, arborecant. Hæc ab imo ad  
summum spinis quibusdā acutissimis horret longis, compressis, al-  
bicantibus, fractuq; minimè cōtunacibus, quæ (ut suprà dictū est)  
per interualla ternæ ex eodem prodeunt puncto. Cortex toti  
plantæ candidus, leuis, ac tenuis: cui subest ligni materies flaua,  
fragilis, atq; fungosa. Numerosis tota uirgultorum congeries ni-  
titur radicibus impensè flauis, quæ per summa terræ diuagantur:  
folijs ferè punice, tenuioribus tamen, latioribus, minusq; in mucro-  
nem extensis, per extremū ambitum minutissimis spinis circumse-  
ptis. Flores emittit ineunte maio luteos, racematim coherētes in-  
uicem ferè modum, odore non ingrato. Quibus postea succedit fru-  
ctus acinis oblongis, racemo pendulis, qui maturitate maximè ru-  
bent, punice mali acinis haud quaquam ab similes, quanquam figu-  
ra longiores, gustu acido, & subaustero, paruis recōditis intus nu-  
cleis. E fructu post uindemias incolæ uinū exprimūt, quod falsò  
de Berberi uocāt officinæ: cui austeritatis aciditatisq; longè plus  
inest, quàm mali punice succo. Quod si in acutis, perniciosissq; fe-  
bribus, uti causus, & quæ pestilens est, iulapo uiolaceo commistū,  
ac aqua ægrotantibus exhibeatur, non modò sitim restinguit, sed  
biliosas, pestilentesq; exhalationes supprimit. Datur utiliter cœ-  
liacis, cibum reiicientibus, & dysentericis, & ubi bilis à iocinere  
in uentriculum regurgitās cholericos excitauerit affectus. Non  
secus tam sumptum, quàm inditum mensium profluvia cohibet. Ti-  
neas uentris enecat, præsertim si bibatur ex aqua graminis, uel  
portulacæ, uel abrotoni, addito sacchari tātillo. Prodest cruentis  
excreationibus: firmat commotos dentes, si eo sæpius foueantur:  
quinetiā gingiuas roborat, & gargarizatu fauciu, uicq; inflam-  
mationes discutit, atq; destillationes eò confluētes reprimit. Vul-  
nera recentia in carnis superficie glutinat, & ulcera uetera desic-  
cat. Nihilominus nocet ijs, qui ex flatu, ac frigidityte laborat  
uentriculi doloribus, atq; etiā egrè spirantibus. Ceterum post-  
quam acuta spinæ historia eò me deduxit, ut de nonnullis alijs acu-  
leatis stirpibus disseruerim, non erit ab re, ut plantarum facultas  
augeatur, si illam addiderim plantam, quæ folio etiam apij cōstat,  
& undiq; spinis riget, ab aliquibus VVA SPINA, à nonnullis  
Vua marina, & à pluribus Vua crespina uocata. Planta hæc anti-

Crespini for-  
ma, & uires.Vua spinæ  
mentio.



quis fortasse incognita fuit, nunc autem omnibus notior est, quam ut à me pluribus describi debeat. Huius bacce in usu ciborum sunt uuae omphacis loco. Quae & febrientibus iusculis incocta non sine utilitate exhibentur. In summa mulieribus utero gerentibus magnopere expetuntur. Huic accedit & altera planta ueteribus, quantum reor, incognita & silentio inuoluta, quam aliqui falso Mauritanorum RIBEM esse contendunt. Ea fruticosa est, folio paruo, nitigineo, perinde ac alba populo. Ramuli sunt ei leni, ac flexibiles: è quibus fructus paruarum uuarum modo, ut in cressino, racematim dependent, rotundis, simulq; coherentibus acinis magnitudine piperis, qui maturitatem adepti, maxime rubent, sapore subacido, admisto etiã dulci. Vulgaris est planta, in hortisq; frequens: quippe quoniam ad sepiendos hortorum pulvinos eleganter fertur. Verum eos hallucinari abunde constat, qui putant, hanc arbusculam esse Arabum Ribem. Siquidem, ut posteritatis memoriae prodidit Serapio, Ribes est arbor proferens capreolos colore uiridi rubescente, & folia lata, magna, & rotunda. Quas sane notas huic non respondere satis notum est: neq; enim fert hæc capreolos, neq; eiusmodi folijs uiret. tametsi fructu Ribem admixtum referat, quod is gustui sit acidus simul & dulcis, qualem esse Ribis baccam auctor est Serapio. Quamobrem is ad ea, quæ ille in re poterit usurpari, utpote quod febribus acutis opituletur, & antè uentriculum refrigeret, sitim restinguat, nauseam & uomitiones sistat, cibi appetentiam incitet, coeliacos, & lientericos uiauet, & biliosis defluxionibus uexatos: sanguinis feruorem demulceat, bilis acrimoniam retundat, impetumq; domet. Quare non damnandi, quin potius laudandi uidentur seplasiarij, qui ex huius arbusculæ fructu uinum exprimunt, & per annum asserunt, ut illud Ribis loco medicamenti immisceant. Non desunt, qui id esse hanc plantam arbitrentur, quod Galenus lib. VII. de compositione medicament. secundum locos Vrsi uuam appellat. Quorum error satis ab ipsomet Galeno refellitur eodem loco: quandoquidem asserit huiusce uuae plantam menuecyli folio uirescere.

Ribis officin. confid.

### RIBES VULGARIS.



Error quorundam.

Bellonii opinio improbat.

Oxyacanthæ uires ex Gal.

Nomina.

ribusq;: è quorum medio racematim exeunt bacce rubentes, ut in hippoglossò, rusco, & lauro Alexandrina. At certe ego non audeo, nec possum Bellonij iudicio subscribere, quod planta illa non respondeat notis, quas Ribi tribuit Serapio. Ea enim folia non fert rotunda, sed oxylapathi, non habet capreolos, & baccas è medijs folijs exerit. Unde facile adducor, ut putem eius Ribem falsam & adulterinam esse potius, quam ueram & legitimam. Oxyacanthæ meminit Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Oxyacanthus, arbor ut pyro syluestri similem habet speciem, ita & uires non dissimiles. quin & ipsi fructus, pyri quidem syluestris absolutè acerbus est, cæterum & oxyacanthæ, & tenuium est partium, & paulum quiddam incisionum obtinet. Porro arboris huius fructus pyri syluestris fructui similis non est, uerum myrtis, scilicet rubens & rarus. Habet uerò & nucleos. Porro non esus tantum, sed & bibitus affectus omnes fluxionum, quos prædicti Græci uocant, cohibet. Hæc planta Græcis οξύακανθα nominatur: Latinis, Acuta spina: Arabibus, Amirberis, seu Amyrbaris: Italis, Bagaia, & Amperlo: Hispanis Pirlitero, & Piliriteros.

### Rubus canis.

### Cap. CVI.

FRUTEX est arboris instar, rubo longè maior. Folia fert multò latiora myrto, robustis circa ramos spinis, flore candido: fructu oblongo, nucleo oliuæ simili, qui per maturitatem fuluescit, & flocculos intus continet. Fructus exemptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit: feruefacti enim ij in uino, mox poti, arteriam infestant.

Rubicanis confid.

NON EQVIDEM putauerim esse Rubum canis illud rosarum syluestrium genus, quæ rosas edunt ijs quas dantenus similes, quas Moschette uulgò uocamus; quæq; rubentes baccas rosarum fructibus non absimiles, licet minores, proferunt: nec etiam quoduis aliud syluestre rosarum genus, quemadmodum nonnulli existimant. Nam si ita res se haberet, sat erat Dioscoridi dicere, quod canis Rubus rosæ similis esset, non autem quod arboris instar assurgeret, rubo longè maior, quodq; folia ferret myrto latiora, à quibus syluestris rosa profectò plurimum dissidere uidetur, fructumq; mittere non modò oliuarum nucleis, sed oliui ipsi multò crassiorum. In eam autem sententiam non modò me pluries deduxit, sed etiam confirmauit Plinius: quandoquidem ipse lib. VIII. cap. XLI. peculiari nomine rosam syluestrem cynorrhodon appellat, id est, caninam rosam, non cynosbaton, id est, caninum rubum, cuius radicem ad caninis rabidi morsum miris laudibus extulit. Quod iterum asseruit lib. XV. cap. II. ubi illud etiam addidit, quod apud ueteres



veteres nil aliud cynorrhodon erat, quàm spongiola illa, quæ medijs syluestrium rosarum ramis oboritur. Caterum de cynosbato, hoc est, canirubo idem differeret, eum à rosa syluestri longè diuersum fecit, ut uidere est libro XIII. cap. XIII. ubi ait, cynosbaton folio esse uestigio hominis similem. Huc illud etiam accedit, quod posteris scriptum reliquit Theophrastus lib. III. cap. XVII. de plantarum historia, ubi sic inquit. Canirubus fructum sub rubrum parit malo punico similem: est inter arborem & fruticem medius, & punica proximus, folio uiticis. Ex quibus palàm est, non parum inter se habere discriminis canirubum, & syluestrem rosam, de qua postea libro & cap. VI. particularem tradidit historiam. Vbi cum primùm satiuias rosas longa persecutus fuisset oratione, de syluestri ita paucis differuit. Syluestres rosæ domesticis asperiores tum uirgis, tum folijs constant, & florem minus odoratum, minusque coloratum, nec tanta magnitudine ferunt. Quare pro comperto habetur, aliud genus esse rosam syluestrem à canirubo, quorum alterum *κυνόρροδον*, alterum *κνύσβατος* à Græcis appellatur. Quocirca manifesto in errore Marcelli, & Monachorū lapsus.

fuisse deprehenditur Marcellus Dioscoridis interpres, & commentator: quippe qui idem esse crediderit cynosbaton, & cynorrhodon, non animaduertens, quàm illa inter se dissimilia fecerit Plinius sibi familiarissimus. Hunc forsitan secuti Monachi in Mesuem scribentes, ipsi quoque in eundem lapsum inciderunt, credentes syluestrem rosam legitimum esse canirubum. Quibus præterea animo exciderat, Dioscoridem scripsisse rubi canis fructum oliuarum nucleis esse similem: quandoquidè ipsi illum pyris compararunt. Ex quo aliquis faciliè iudicabit, hos nullam canis rubi cognitionem habuisse. Ad hæc non reperio, quòd dixerit Dioscorides, canis rubi fructum semen aliquod includere, quo tamen rosarum syluestrium fructus refertus inuenitur: sed lanosum quoddam continere dixit. Accedit his Serapionis auctoritas, qui de canino rubo inter alia rubi genera egit, non autem inter rosas: quòd omnino compertum haberet, hunc à rosis quàm plurimum differre. Illud insuper addiderim, quòd cum rosæ syluestres frer omnes non leuiter ex albo purpureascent, cynosbato uerò flos perpetuò sit candidus, non est legitime asserendum, syluestrem rosam esse cynosbaton. Ex ijs igitur omnibus satis (ut arbitror) liquet, canirubum à syluestri rosa longè abesse: tantoque magis, quòd memorie prodiderit Theoph. lib. & cap. IX. de plantarum historia, canina sentis fructum auerso flatu colligendum esse, alioqui periculum oculis imminere. Quod aperte demonstrat, super eo uel tenuem quandam lanuginem, uel quid puluerulenti insidere, quòd si à uento expellatur in colligentium oculos, facile ijs cæcitatem inducat. quòd tamen in syluestrium rosarum fructibus nunquàm uisitur. Meminit Rubi canis Galenus lib. VII. simpl. medic. sic inquit. Huius fruticis fructus, non segniter adstringit, folia uerò mediocriter. Itaque particularis eius usus haud ignotus est. Cauendum ab eo, quòd in fructu eius lanæ speciem habet, eeu arteriæ infestum. Frutex is Græcè *κυνόρροδον* uocatur: Latine, Rubus caninus: Arabicè, Sent: Italicè, Rauo canino.

Marcelli, & Monachorū lapsus.

Rubi canis uires ex Gal. Nomina.

## Ligustrum.

## Cap. CVII.

LIGVSTRVM. arbor est oleæ folijs circum ramos similibus, latioribus, mollioribus, & colore uiridioribus: flore candido, muscoso, odorato: semine sambuci, nigro. Optimum nascitur in Canope & Ascalone.

Folia astrictoriam uim habent: quare comanducata ulceribus oris medentur: illita feruidis inflammationibus, carbunculisque prosunt: decocto eorundem igni ambusta fouentur: capillum rufant trita folia, quæ in radicula succo maduerint. Flos ex aceto fronti illitus, capitis dolorem sedat. Cyprinum oleum, quòd ex eo fit, odoratum, excalfacit, emolliquetque neruos; si quæ feruenti natura prædita sint, assumat.

LIGVSTRVM in Hetruria Guistrico corrupta uoce uulgus nostrum appellare consuevit. Quòd inibi etiam aliqui Oliuetta, nonnulli Oliuella, quidam Chambrossene uulgò uocant. Mauritanis uerò Alcanna nominatur. Nascitur frequens in sepibus secus uias passim in Italia. Floret abeunte uere, & ineunte æstate, flore muscoso, uel (quandoquidè Oribasius legit *βερβοκώμης* in racemoso, candido, odore suauis, sed qui decerptus statim flaccescat. Oriuntur ex eo bacca in cacumine racematim coherentes pyramidis modo, hædera baccis minores, leuiiores, ac nigriores, quarum in medicamentis est usus. Sunt qui has baccas à Virgilio, uacinia uocari putent. Sed meo quidem iudicio non rectè planè sentiunt. Quemadmodum nec Fuchsius, qui rubi mora, quoniam Græcis *βέρβη*, uacinia esse putat: siquidem uacinium florem, non fructum esse pluribus constat. Caterum in nothis Dioscoridis stirpium nomenclaturis legitur, hyacinthum uacinium Romanis fuisse uocatum. Ex quo faciliè crediderim, uacinium

Ligustri consideratione.

uacinii uariæ opinionones.



Virgilio nil aliud designare, quàm hyacinthum. Neque mirum est, quòd Virgilius hyacinthum uacinij nomine nigrum appellauerit: nam hyacinthus faciliè cum uiolis colore purpureo certat, purpureus autem color à compluribus ni-



ger intelligitur. Hanc nostram sententiam comprobat Virgilius: quippe qui semper uacinia floribus admiscet, ipsa demq; cōparat, nō autē fructibus. Quod manifestē declarauit in Bucolicis, ubi de uacinio sic cecinit, primò Eclog. 11.

Alba ligustra cadunt, uacinia nigra leguntur.

Mollia luteola pingit uacinia caltha.

Et nigra uiolæ sunt, & uacinia nigra.

Deinde in eadem.

Item in ultima.

Marcelli opinio reprobat.

Nec placet præterea Marcelli opinio, qui pluribus comprobare nititur, uaciniū esse Irim. Siquidem præterquā quod nunquam legerim Irim in coronis uenisse, color non aequē promptē correspondet, quod uariis adeo sit, ut non aliunde sibi nomen comparauerit, quā à celestis arcus colorum uarietate. Adde etiam, quod cum Iridis flos omnium fragilissimus caducissimūq; sit, poeta nullo pacto hunc ligustro prætulisset. Quidam Ligustrum eam conuoluuli speciem esse autumant, quæ sepiibus, fruticibus, & arbutis se circumuoluit, ac etiam sepius uitium palis in uinetis, flore candido, lilij, seu calatbi effigie, quam ego læuem esse similem nunquam dubitauī. E quorum numero fuit

Seruii gramm. lapsus.

Seruius Grammaticus Virgilij commentator Ecloga secunda Bucolicorum. Nempe falsus (ut arbitror) quod neglexerit in hac historia Plinium consulere, Dioscoridem, & alios de stirpium natura differentes. Non defuerunt etiā qui existimauerint ligustrum esse Mauritanorum caprifolium quod sanē nil aliud est, quā Dioscoridis pyxantha,

Ligustri uires ex Gal.

seu lyciuni, non autem periclymenon, ut Ruellio placet. Se, isti quoque à ueritate desciscunt. Ligustri meminit Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Cypri seu ligustri folia, summaq; germina in usum ueniunt, & facultatis, & temperamenti maxime iusti: habent enim quiddam digerens cum aquea substantia modicē calida, habentq; etiam adstrictorium quiddam ex terrena substantia frigida. Itaque eorum decocto quidam amebusta fouent. Utuntur uerò etiam aduersus igneas phlegmonas, & carbunculos. Nam absq; molestia & morfu desiccant. Quinetiam spontē prouenientibus in ore ulceribus aphthodesi, & ipsis puerorum aphthis commansa accommodata sunt.

Nomina.

Κύπρος arbor ita Græcis, Latinis uerò Ligustrum appellatur: Mauritanis, Kenne, Henne, seu Hanne: officinis, Alcanna: Italis, Guistrico, Oliuella, Oliuetta, & Chambrossene: Germanis, Rheinuuiciden, Beyna hoeltzlin, & Mundholtz: Hispanis, Alfena, siue. Alhena: Gallis, Du troesne.

### Phillyrea.

### Cap. CVIII.

PHILLYREA arbor est ligustri magnitudine, folijs oleæ nigrioribus, & latioribus: fructu lentisci, nigro, subdulci, racematim coherente. asperis nascitur. Huius folia astringunt: ad eadem utilia, ad quæ oleaster, cum astringione est opus: maximè ad oris ulcera commanducata, aut si decocto colluantur: pota urinam, ac menses cient.

### PHILLYREA.

### TILIA.





RECENTIORES Dioscoridis interpretes, ut Hermolaus, Ruellius, & Marcellus Florentinus, Phyllyreā hic descriptam à Dioscoride, eam esse arborem certò credidere, quæ Tilia dicitur, nimirum falsi nominis similitudine. Quandoquidem tilia Græcis *φιλύρα*, non autem *ελλυρέα* dicatur. Quod cum nullus horum animaduertisset, alter alterum secuti concordēs phyllyream tiliam appellarunt, ita Græcum nomen malè, meo quidem iudicio, in Latinum uertentes. Quo factum est, ut multis sit persuasum, uel quòd Dioscorides tiliam unquam uiderit, uel quòd illi à uulgari tilia alia esset longè diuersa, utpote quæ omnibus notis tilie refragatur. Sed quòd Dioscorides tilia seorsum à phyllyrea cognouerit, uel saltem in ijs plantis discrimen posuerit, satis perspicuum fieri arbitror in huius libri præfatione circa finem, ubi hæc uerba leguntur. Flores, & omnia, quæ iucundum odorem efflant, reponantur ἐν κιβωτίῳ φιλυρίῳ. Quæ senē uoces Græcæ non solum quòd rectè uertantur ab interpretibus, in arculis tilia, sed quòd postrema quidem non à *φιλυρέα*, sed à *φιλύρα*, quæ Latinis tilia est, deduci possit, abunde declarant, has plantas diuersas esse in hoc ipso auctore. Porro hinc faciliè comprehendi potest, quòd illi non solum nomina, sed etiam rem confuderint: nam si tiliam cognouissent, nulli dubium est, quin phyllyream Dioscoridis proprio nomine separassent à phyllyra, hoc est tilia Theophrasti, qui eam libro III. cap. x. de plantarum historia his uerbis memorie prodidit. TILIA quædam mas est, quædam fœmina. Distant inter se tum uaterie, tum totius corporis forma, & quòd altera sit fructifera, altera uerò sterilis. Nam materies mari dura, flaua, uodiosior, spissiorq;: fœminæ candidior, & cortex mari crassior, detractusq; inflexibilis propter duritiā est: fœminæ candidior, flexibiliorq; ex quo citius faciunt, item fœminæ odoratior. & mas sterilis, uulgiq; flore est: fœmina & florem, & fructum gignit. Flos calycula intectus præter folij pediculum, amentumq; futurum, pediculo altero annexus, uiridis, dum in calycula est, detectus autem leuiter flauus: floret cum urbanis. Fructus oblongus, orbiculatus, magnitudine fabæ, similibus hederæ acino, quinque angulis, ueluti neruis eminentibus, inq; acutum, cum sese contrahentibus partitus, qui scilicet maiusculus est, minutiusculus autem confusior constat: cum ille maiusculus scabitur, paruula quædam, ac prætenua semina, quanta atriplicis emittit. Folium, & cortex dulcis, suauisq;: folium forma hederaceum, nisi quòd in angulum acutior rotundatur: & quamquam iuxta pediculum curuatius; tamen de medio in acutius coactum prætendit, seq; prolixius protrahit, crispum in orbem leuiter, atq; serratum. Medullam exiguum materies continet, uel multò reliquo molliorem corpore: nam & reliquum ligni molle est. Hæc de tilia Theophrastus. Quibus sanè notis aduertiuntur res spondet nostra tilia. Sed eas, mea quidem sententia, non inuenias in phyllyrea Dioscoridis: siquidem hæc folio constat oleæ, illa uerò hederæ: huic fructus lentisco similis, racematim coherens, rubens, granis, quæ uocat paradisi, non absimilis; illi uerò oblongus, orbiculatus, ad fabæ magnitudinem, quinque angulis, ueluti neruis, disiectus, cui iutus semen atriplicis instar. Quod aperte ostendit earum discrimen. Id etiam declarat tilie proceritas, amplitudoq; ac ramorum densitas: nam phyllyrea Dioscoridi arbor est pumila, ligustri magnitudine. Et quamquam tradat Plinius, tiliam arborem esse proceritate perquam modica; tamen cum sensibus, & experimento contrarium constet, credendum certè putauerim, Plinium quoq; deceptum propinquitate uocabuli & Theophrasti phyllyram, & Dioscoridis phyllyream simul confudisse: à quibus faciliè ea, quæ de tilia scripsit, accepit. In quam sententiam hæc quoq; ratio nec deducit, quòd Plinius uni tantum speciei, scilicet nostræ uulgari tilie, uires attribuit, quibus pollere phyllyream Dioscorides est auctor, præter alias plures, quæ ipsi tilie sunt propriæ, quemadmodum fecit & Ruellius illum secutus. Est itaq; Phyllyrea arbor longè diuersa à tilia, multis cognita, quoniam in Italia prouenit asperis tantum montibus, quibus maximè gaudet. Adamus Lonicerus in suo de stirpium historia libro constanter asserit, nulla tamen huc alata ratione, nec auctoritate, ligustrum, & phyllyream unam & eandem esse plantam: contenditq; caput hoc omnino Dioscoridis spurium esse. Verum is ideo hallucinatus uidetur, quòd primum phyllyreæ delineatio à ligustro, quod Græcis *λύγιστρος* dicitur, non parum differt: secundo quòd non solum codices Dioscoridis Græci, & ij quidem probatissimi, habeant phyllyream; sed etiam Oribasij codex manu scriptus, in quem ipse ex Dioscoride simplicia transtulit: quemadmodum eam etiam habent Paulus, & Serapio, qui Arabico sermone phyllyream Mahaleb appellauit. Tilia cortex communis, ac inde illitus uulneribus agglutinandis efficax est. Folia uerò trita, & aqua conspersa pedum tumores discutiunt. Humor è medulla castratæ arboris defluens capiti illitus capillos reddit, defluentesq; continet. Arbor, quæ Græcis *φιλύρα*, Latinis item Phyllyrea uocatur: Arabibus, Mahaleb: Italis, Phillirea. Quæ uerò Græcè *φιλύρα*, Latine Tilia, pariter & Italicè nominatur: Germanicè, Linden.

Phyllyreæ, &amp; Tilie confid.

Interpretum Diosco. lapsus.

Tilie historia.

Plinii lapsus.

Adami Loniceri error.

Tilie uires.

Nomina.

## Cistus.

## Cap. CIX.

CISTVS quem aliqui citharon, aut cissaron uocant, ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus: saxosis locis nascens: foliis rotundis, acerbis, hirsutis. flos t masculo ut mali puniceæ, fœminæ albet. Vis astringens: unde flores in uino austero bis in die poti, prosunt dysentericis, & nomas per se illiti cohibent: uetustati ulcerum, & igni ambustis cum cerato medentur. Hypocistis rhobethron, aut cytinus à nonnullis cognominata, iuxta cisti radices nascitur, floris punici similitudine. Quædam rufa, t altera herbacea, tertia candida. Liquatur acaciæ modo. Aliqui tamen exiccant, fractamque macerant, & incoquunt, reliquaue ut in lycio prosequuntur. Vires acaciæ habet, uerum aliquantò magis siccatur, & astringit. Prodest dysentericis, cœliacis, sanguinem excreantibus: fœminarum profluuiis & pota, & indita.

NASCITVR uterq; Cistus, è cuius radicibus Hypocistis prosilit, in pluribus asperis Hetruriae locis, & præsertim in Apenino monte. Quare probi quidem, ac diligentes seplastarij omni studio, atq; ope niti deberent, ut sibi utrunque


Cisti, &amp; hypocistidis cōsideratio.



CISTVS MAS.



CISTVS FOEMINA.



HYPOCISTIS.



Fuchsi error

Hypocistidis  
succidanea.

Plinii lapsus.

Cisti, & hy-  
pocistidis ui-  
res ex Gal.

utrunque genus cum hypocistide uel ex Apennino ipso, uel alio  
de comportaretur: quandoquidem sine legitima hypocistide legi-  
tima non possit fieri theriaca, nec praeterea alia quaedam, quae in  
medicinae usum ueniunt, antidota, ac medicamenta. Namq; hypoco-  
cistin, quae passim utuntur officinae, ex hirci barbae radicibus im-  
postores conficiunt, succum inde exprimentes, at ut concreseat,  
insolantes: Errandi tamen, ac simul imposturam faciendi causa  
sim dederunt Arabes, quod cistum hirci barbulam appellant.  
Quo factum est, ut ij omniuo aberrauerint, qui officinis hypoco-  
cistidem parant, sibi persuadentes hirci barbam, quam Graeci  
τραιονόζα uocant, illam esse stirpem, de qua Arabes in-  
telligunt. Quo errore ducti non modo seipsos decipiunt, sed etiam  
alios, qui passim adulterina hypocistide utuntur. Atqui Fuchs-  
sius in libro de componendis medicamentis, quem secundo edidit,  
ubi pastillos ex succino perpendit, non sine magno errore (pace  
uiri eruditi dixerim) putat hypocistin fungum esse. Quandoquid-  
em hypocistis non fungus est, sed ueluti germen, quod cisti ra-  
dicibus pullulat, effigie fere punicorum cytindros representans, ut  
optime sciunt ij, apud quos cisti plantae copiosae proueniunt.  
Hypocistidis locum supplere acaciam tradidit Dioscorides, ut  
etiam habetur in Galenicis succidaneis: quae illius uice uti possent  
officinae, si modo ea careret adulterio. Post etiamnum, si  
desit hypocistis, assumi eius loco floris agrestis puniceae succus:  
quippe qui eadem praestet, quae hypocistis, auctore Dioscoride.  
Plinius deceptus uocabulorum germanitate inepte satis, meo iu-  
dicio, commiscet cisti, et cisti historiam: quamobrem non imma-  
ritò eum damnauit doctissimus Leoniceus. Cisti meminit Ga-  
lenus lib. VII. simp. medic. sic inquit, Cistus, aut Cistarus frus-  
tanen folia, et parua germina trita adeo deficcant, adstringuntq;  
ut uulnera glutinare ualeant. At flores magis sunt efficaces, adeo  
ut cum



ut cum uino poti dysenterias, uentris imbecillitates, fluxusq; ac humiditates sanent: cataplasmatitis ritu illita ulcerum putredinosa iuuant. Est enim eorum facultas non instrenuè desiccans, fereq; secundi excessus à temperatis abso-  
luti. Adeo uero frutex hic frigidus est, ut tepidi caloris sit particeps. Porro Hypocistis, quam uocant, multo est  
magis adstrictoria, quam folia, admodum efficax remedium ad omnes fluxionum affectus, puta sanguinis reiectiones,  
profluita muliebria, coeliacos, dysentericosq; affectus. Quin si quam partem roborare consilium sit, quæ uidelicet  
plusculo humore exoluta fuerit, robur, ac firmitatem illi non imbecilliter addit. Sic sanè stomachicis epithematis,  
hepaticisq; commiscetur, & ex uiperis confecto antidoto inditur, nimirum quò corpora confirmet, ac roboret.

Frutex Kisos, κισσός, aut κισσαγός Græcis dictus, Latinis quoque Cistus appellatur: Arabibus, Kaniet, Nomina.  
Altheis, seu Lhaie althis: Italis, Cisto: Hispanis, Cerguacos. Hypocistis uero sic Latina uoce, quemadmodum  
10 urosus Græcè dicitur: Arabicè, Tarath: Italicè, Hipocisto: Hispanicè, Pultegras.

† Hec dictio nō legitur in Græcis codicibus. Sed eam huc ad clariorem (ut puto) sensum ex Plinio transtulit Ruel-  
lius: quòd uerbum illud à Dioscoride studio fortasse breuitatis omissum, satius addendum esse duxerit, quàm subintel-  
ligendum. quod etiam Hermolaus fecit.

† Nil mirum esse debet, quòd Plinio duo tantum hypocistidis genera prodantur, coloribus rufis, & candido distin-  
cta: quandoquidem ijs duntaxat Oribasius quoque contentus fuisse uidetur lib. XII. ubi genus κισσός, hoc est, her-  
bacum, ut uulgati codices habent, non legitur.

## Ladanum.

## Cap. CX.

## L E D V M.

EST ET alterum cisti genus, Ledon à nonnullis  
appellatum, frutex simili modo nascens, longioribus  
folijs, & nigrioribus: quæ uerno tempore quiddam cō-  
trahunt pingue. Foliorum uis astringens, ac eisdem,  
quos cistus, effectus præbens. Fit ex eo quod Lada-  
num dicitur. siquidem cum cisti frondes pascuntur ca-  
præ, hirciq; pinguitudinem conspicuè barba carpunt,  
& suo lentore uillosis cruribus adhærescentem repor-  
tant: quam depeſcentes incolæ, colantesque cogunt in  
offas, & ita recondunt. Alij uerò attractis funiculis, in-  
sidentem fruticibus lentorem abstergunt, conglome-  
rantq; in ladanum. Maximè probatur odoratum, subui-  
ride, faciliè mollescens, quod arenas nō collegit, nec squa-  
lore obſitum est, resinofum, quale in Cypro gignitur.  
Arabicum uerò, Libicumque uilius: Natura ei spissan-  
di, calfaciendi, molliendi: ora uenarum patefacit: ca-  
pillum fluentem continet, addito uino, myrrha, &  
myrteo oleo: cicatricibus decorem reddit, cum uino  
illitum: medetur aurium doloribus, cum hydromeli-  
te, aut rosaceo infusum: suffitu secundas eijcit: pēſis  
immistum uulnæ duritiem sanat. In medicamenta,  
quæ aurium dolorem, tussimque finiunt, & malagma-  
ta utiliter inferitur: aluum fistit cum uino uetere po-  
tum, & urinam ciet.



LADANVM, quòd uulgò alij appellant Laudano, alij  
uero Odano, tametsi plerunq; impostorum malitia adeo sabulo,  
& alijs adulterijs sit uitiatum, ut nihil ualoris præſtet; ego ta-  
men præstantissimum sæpius Venetijs enī ab unguentarijs, qui

Ladani confi-  
deratio.

odoramenta conficiunt. Verum apud pharmacopolas, qui medicamenta nobis parant, Ladanum, quod syncerum;  
purumq; sit, rarissimè reperitur: cum eorum plurimi potius curent, ut remi minoris emant, quàm ut seligant legitima  
ab adulterinis. quòd tamen iniquum est, inhumanum, ac detestabile crimen. Arbuscula, e qua Ladanum colligitur,  
Ledum appellatur, & inter cisti genera recensetur. Caterum Plinius uocabulorum uicinitate deceptus (ut etiam Plinij lapsus.  
in superiori commentatione dictum est) ex cisso, id est, hedera, non autem ex cisto ladanum colligi dixit. Ex quo item  
multis falso persuasum est, quòd non à cisto, sed ab hedera Ladanum legeretur. De Ladano plura memorie pro-  
didit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquiring. Cistus, aut Ladanum. In calidiōribus regionibus  
bus hic Cistus proueniens, tametsi haud alius sit genere, quàm qui apud nos nascitur; eximium tamen à regione, ac  
peculiarem, digerentemq; caliditatem nactus est: atq; utroq; à nostrate differt, tum quia frigiditatem deposuit, tum  
quia calorem assumpsit. Itaq; cetera quidem huius cisti, illis quæ in nostrate uisuntur, similia sunt. Verum Ladanū,  
quod uocant, ex eo prouenit, medicamentum primo excessu iam quodammodo completè calidum, ut uidelicet & se-  
cundum attingat, habens etiam adstrictionis paululum. Ad hæc substantia tenui, ac proinde emolliens, siue malacti-  
cum, pariterq; moderatè digerens, ac uidelicet etiam συμμετρίον, hoc est concoquens. Itaq; mirandum non est, si  
peculiariter ad uteri uitia conueniat: quandoquidem ad dicta paulum quiddam adstrictionis obtinet. Quocirca dis-  
1 fluentes



Nomina.

fluentes capillos retinet. Nam quicquid ad radices eorū prauī humoris federit, id omne absūmit: tum meatus, quibus infixi sunt, contrahit, & constringit adstrictione: Ceterum alopecias, & ophthalmias siue lippitudines, sanare non potest, utpote magis discussorias vires, quā quæ Ladano insunt, poscentes. quippe proueniunt hæ ex prauis succis, lentis, crassisq; quos secantia, ac digerentia medicamenta potissimum euocant, atque euacuant. Ceterum tenuium partium sint facultatis oportet, & minimè astringentis: non tamen usque adeo tenuium partium, & desiccatoria, ut nimio plus desiccet, unaq; cum collectis inibi succis præter naturam, naturalem quoq; humiditatem incrementa pilis suppeditantem absūmant. nam sic non tantum alopecia liberabunt, sed & caluiciem afferent. Sed hæc ad curandam rationem pertinent. Arbuscula, quæ Græcè λανδον, Latine similiter Ledum nominatur, Arabicè Chasus. Quod uerò λανδανον Græci, Latini item Ladanum uocant: Mauritanii, Ieden, siue Laden: Itali, Laudano, & Odano: Hispani, Xara.

## Ebenus.

## Cap. CXI.

**E B E N U S** optima habetur Ethiopica, & nigra, nullos habens uenarum discursus, factitij coloris læuore: cum frangitur, densa apparet, mordens gustu, atque astringens. Suffitur incundo odore supra carbones, sine fumi tadio. Recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinem accenditur, & trita ad cotem rufescit. Altera est Indica, internatis segmentis candicantibus, & modicè fuluis, item frequentibus maculis. ceterum prior bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna consimilia pro ebenu uæneunt. Quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas assulas resoluuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentiæ in suffitu præferentia. Caliginem oculorum absterget: ad ueteres destillationes, pustulasque mirum in modum pollet: si quispiam facta ex eo coticula collyrijs utatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes, ramentæ uino Chio die, noctuque macerata, in collyria digerantur. Nonnulli præterita ipsa excolant. reliquaque eundem in modum peragunt. Alij pro uino aqua utuntur. Virtus in fictili nouo, donec in carbones redigatur. Lauatur plumbi ulti modo, & ita siccis, scabrisque lippitudinibus conducit.

Ebeni consideratio.

**C R E D I D I T** Theophrastus in India tantum nasci Ebenum libro IIII. cap. v. de historia plantarum, ubi sic habet. Ebenus quoque eius regionis uernacula est. Huius duo genera constant: alterum materie laudatum, pulchrum, alterum uile, & uitiatum. Rarum, quod præstantius: reliquum pernultum habetur. Colorem commendatum, non recondita, sed statim sua natura capescit. hæc Theophrastus. Quod etiam sensisse uidetur Virgilius in Georgicis libro II. ita canens.

Sola India nigrum

Fert ebenum, solis est thurea uirga Sabæis.

Plinius etiam lib. XII. cap. III. Ebenum nusquam alibi, quā in India nasci scriptum reliquit: nec eam tamen Indiā uniuersam mittere, sed exigua sui parte gigni, præter quoddā fruticosi genus cytisi modo, in tota India dispersum. Herodotus uerò (eodem auctore) Ebenum Aethiopiam solam ferre intellexisse uidetur: quippe qui de Indica nullam fecerit mentionem. Veruntamen ex hoc Dioscoridis capite palam est, nasci Ebenum in ambabus his regionibus. Indi quidem non nisi ex ebenu Deorum simulacra fingunt, regesq; ex eo tantum sceptrum sumunt. Item pocula, craterasq; ex ebenu faciunt, quod sanè credant contra maleficia efficacissimum esse, & quicquid ueneficij fuerit, tactu eius auerti. Itaque nihil mirum, si quod peregrinum in Italiam importatur, summo sit in pretio, cum etiam ab ipsis, quibus prouenit, maximo honore habeatur. Ebenum ex India Romæ primum magnus Pompeius Mithridatico triumpho ostendit, cuius materies densissima omnium constat. Quo fit, ut quanuis multis annis exarescat, non fluitet in aquis, sed tota mergatur. Ebeni siccatos truncos maximè hac ætate nouit Italia: nanque innumeri uisuntur in eorum officinis, qui pectines consciunt ad explicandos, aptandosq; capillos: itemq; apud illos, qui globulos funiculo traferendos ad mulierum preces numerandas torno in orbiculos expoliunt. Ebeni vires scripsit Plinius lib. XXIII. cap. XI. his uerbis. Non omitam propter miraculum ebenum. Scobem eius oculis unice mederi dicunt: lignoq; ad cotem trito cum passo caliginem discutit, ex aqua uerò & radice albugines oculorum. Item tussim pari modo cum melle, ac dracunculi adiecta radice. Ebenum medici & inter erodentia assumunt. Ebeni meminit Galenus lib. VI. simplici med. sic inquit. Ebenus ex ijs lignis est, quæ trita cum aqua in succum soluuntur, ut lapidum nonnulli. Vis ei inest ex calfaciendi, extergendi, & tenuium partium. Quamobrè quæ pupillas offuscant, extergere creditur: miscetur alijs rebus medijs ocularibus, quæ ad ulcera uetera, fluxiones, & bullas, siue pustulas accommoda sunt. hæc Galenus. Sunt qui lignum ex Indijs petitum, quod quidam **G U A I A C U M**, nonnulli Guaiacum, pleriq; uerò Lignum sanctum appellant, cuius aduersus Gallicam luem præcipuus est usus, ebeni genus esse crediderint. Quod quidem nec asserere, nec negare ausim: quandoquidem usquam inueniri apud quenquam tum ueterum, tum recentiorum scriptorum, quas frondes, quos flores, quosq; fructus proferat ebenus. Illud tamen omnibus perspicuum est, Guaiacum nihil, nisi summa nigritia, ab ebenu dissidere, quæ in hoc summo splendore nigricat, in illo albescit: cæteris uerò qualitatibus id maximè cum ebenu certat. Tria ad nos Guaiaci genera afferuntur, ut in suis Epistolis doctissime annotauit Manardus Ferrariensis: quod & nobis iandiu planè compertum est, cum hæc omnia sæpius nobis præ manibus fuerint. Primum itaque genus crassiori, uetiori, mole constat, quo resecto materies apparet interiore parte nigra, exteriore uerò subpallida, & ueluti perplexis lincis quibusdam ad fuscum tendentibus per longum intersecta. Alterum caudice minori,

Ebeni vires ex Galeno.

Guaiaci consideratio.



niori, nec adeo uegetiori habetur, cuius extimæ partes maiore ambitu se diffundunt; intimæ uero, quæ pariter nigricant minore satis orbe concluduntur. Tertium, quod propriè sanctum appellant, caudice cæteris exiliore uisitur, intrinsecusq; & extrinsecus albicans, cuius materies lineis admodum exilibus in longum actis perplexè distinguitur: estq; hoc longè cæteris, & acrius, & odoratius. Cæterum credendum non est eiusmodi ligna, etsi colore, magnitudine, ac pondere inter se discrepent; idcirco diuersarum esse plantarum, diuersorumq; generum, ut quidam fortasse existimant. Nam quòd hoc tam intus, quàm extra candidet, illud uero interiore sui parte nigricet, non aliunde prouenit, quàm quòd hoc magis, illud uero minus adoleuerit, uel consenuerit. Quippe eò sanè nigrius cernitur lignum Guaiacum, quò ad maturiorem ætatem peruenerit arbor, à qua decisum fuerit: & per consequens tantò magis album apparet, quòtò minus adoleuerit illa, quemadmodum conspicitur in nostris nonnullis Italiæ arboribus, & præsertim in moro, nuce, & anagyri. Veruntamen illud cuique persuasum sit, ætatem uni plus, quàm alteri uirum addere, ac demere. Quæ de re uerba facturi, dicamus, cum illud, quod planè omni ex parte albicat, odoratius, ac acrius, & amarius habeatur, cùmq; eius decoctum crassius, & cæterorum decocto pinguius sit, & acrimonia, & amarore admodum refertum, ut ipsa me docuit experientia, nil mirum esse crediderim, si in eo, utpote iuniore, uis insti uegetandi præstantior, ac propterea plus in se succi contineat: quin & cæteris uiribus præstet. Eaq; propter putauerim ego, hoc illis in usu perpetuo fore, quibus ob Gallicam luem ulcera emerferint depascentia, contumaciq; ossa uero cariosa sint, ac putrilagine consumpta, & tumores in ossæam penè duritiem occalluerint: & quibus denique perpetuus articulorum cruciatus, diuturnusq; capitis dolor inbæserit, eoq; magis, quò patiens iunior existerit, fortior, & natura robustior. Huic illud succedere existimamus, quod medium obtinet locum: si quidem hoc & odoratius est, & acrius eo, quod nigrius, ac crassius inuenitur: neq; illud quidem ab re, quandoquidem id minus est ætate confectum, & maiore humoris copia redundat. Quocirca commodissimè hoc uti poterunt, qui natura delicatiores sunt, & temperamento imbecilliores, atque etiam ij, in quorum artus huiusce luis furor nondum grassari cœperit. Postremò illud minus cæteris præstat, uiribusque infirmius habetur, quod nigrius, crassius, & amosius reperitur. Namq; qualibet consenscens planta (quemadmodum etiam cunctis animalibus euenit) continuo exarescit, humidoq; priuatur. Cuius rei certissimum est argumentum, quòd in annosarum arborum truncis maior appareat nigredo, quàm in alijs uel iunioribus, uel ætate tenellis: nigredo enim siccitatis indicium est, quinetiam deperditi caloris innati, & humidi naturalis: id quod tam in plantis, quàm in animalibus locum habet. Nihil tamen secius illud diligenter animaduertendum est, quòd Guaiacum albicanti prorsus colore præditum, recens, incorruptumq; sit: quippe cùm cæteris exilibus sit, citius ac facilius exarescit, & ob humoris redundantiam uelocius cariem sentit, atq; fræcescit. Quam ob causam satius quandoq; foret uetustiore recenter cæso uti, quàm iuniore, quod multo ante tempore fuerit ab arbore decisum. Sunt quoq; recentiorum nonnulli, de quorū numero unus est Alphonsus Ferreus, qui de ligni guaiaci decocto elegans admodum opusculum edidit, qui tantum Guaiacum illud præferunt, quod è plantarum ramis ætatis mediæ desumptum fuerit. Quorum opinio non planè refellenda uidetur: nam quicumque rem naturalibus expenderit rationibus, ramos antiquioris à caudice mediocris ætatis parum differre cognoscet: item ramos huius à caudice iunioris. quippe plus humoris ad se trahit ramorum auctrix facultas, quàm caudicis. Idcirco non alia de causa plantæ reuiuescunt, cùm earum rami implantantur, seruntur, & propagantur, nisi quòd illud idem humidum innatum intra se continèt, & eodem uigent temperamēto, quo qui adolescunt: etenim surculi, atq; rami sunt caudici, perinde atq; filij, & propterea animalibus ætate tenellis non absimiles. Atqui mihi longè magis iunioris caudicis placeret usus: siquidem in hunc immediatè à terra humor, & alimentum deferretur, ac præterea quoniam is fortasse nullum adhuc fructum protulerit: quandoquidem foetus à plantis, ut etiam ab animalibus, multum uirum aufert. Præstantissimum itaq; lignum Guaiacum illud erit, quod ex iuniori caudice recenter casum fuerit, tam exterius, quàm interius albicans, rimis carens, densum, ponderosum, minimè cariosum, odoratum, gustui, & acre, & subanarum. Cæterum quoniam nostra ætate æquè cortices, atq; lignum in usum ueniunt, eandem in ijs rationē seruandam censo, ut quinam meliores, præstantioresq; sint, dignosci possint, quam nos in eligendo optimo ligno in medium attulimus, ut scilicet illi eligantur, & probatissimi habeantur, qui à præstantiori caudice detracti fuerint, Importatur Guaiacum tam ex occidentalibus, quàm orientalibus Indijs: nam & Hispani è suis regionibus noniter repetis, & Lusitani ex Calicut, Taprobana, & Iaua insulis, & Mauritani, Aegyptij, Arabes, ac Persæ à mari rubro per canelorum carouanas (ut aiunt) Guaiacum ad nos conuehant: quin & ex Aethiopia, ut quidam narrant. At cùm omnibus compertum sit, ea in medicamentorum genere longè magis cætera præcellere, quæ ex orientali plaga comportantur, ob id omnino censendum fuerit, Hispanicum uiribus esse imbecillius, quàm quod ex Lusitania, uel Alexandria in Italiam importatur. Guaiaci planta (ut ij referunt, qui eam in syluis se uidisse testantur) ad fraxini proceritatem, & ad hominis mediocris habitus crassitudinem plerumq; assurgit. Folia fert quadantenus plantaginis æmula, dura, ac breuia. Flores eius produntur lutei: fructus uero inglandis magnitudine, qui esu aluum subducit: cortex annosus niger, iuuenibus uero subrutilis. Porro si Guaiaci uires, ac qualitates rectè perpendantur, procul dubio liquidò constabit, ea præstare posse, quæ in arcenda Gallica lue requiruntur: nam cum id ex partibus admodum calidis, ac tenuibus consistat, itemq; siccis, habeatq; sibi resinæ plurimum admixtum, nimirum etiam potest suis uiribus ea efficaciter exiccare, attenuare, liquefacere, atq; expurgare, quæ humores infecerint: quin etiam sudorem ciere. Huc accedit etiam, quòd parte resinosa, quam possidet, contagioni, atq; putredini mirificè resistit: quæ quidem incommoda hanc pestem comitari solent. Cæterum eo tempore, quo primum in Italiam Guaiacum inferri cœpit, necnon etiam multis post annis, non sine summo timore dabatur potandum. Etenim ferebatur illi manifestum necis periculum imminere, qui rectam exquisiti uictus rationem per panis, & uuæ passæ modicum non seruasset, quiq; non perstitisset in curatione ad quadragesimum diem usque in tenebris inclusus, ita ut ne aëris qui-

Guaiacium lignum præstantius.

Guaiaci corticis electio.

Guaiaci plantæ.

Guaiaci facultates.



dem claritatem inspiceret, nedum pedem e cubiculo efferret: ijs insuper carniū esu, & uini potu interdictum erat non secus atque ueneno. Verum eninuero cum sepius euenisset, ut ante constitutum tempus quidam ob tenuissimum uictus rationem ita imbecilles, ac uiribus destituti conspicerentur, ut penē spiritus, & uita deficerent, ij ne in tam manifestō uite discrimine uersarentur, à consanguineis, & asidentibus persuasi, caporum, gallinarumq; iura, ac contusas carnes in cibum sumere, tantum inde percipiebant iuuamentum, ut uitam quasi deperditam recuperarent. Quo postea medici experimento edocti, uanam illorum doctrinam ridentes, qui tam grauem agris legem imponebant, patēdo pleniori uictu uti iusserunt, nempe iuuenum gallinaceorum carniibus, ac maiore panis portione. At nullus tamen adhuc ausus erat uinum exhibere. Qua re à me sepius animaduersa, ego primus (ni fallor) inter Italos medicos rationibus non obscuris adductus tentare uolui, posset ne uinum dari ex Guaiaci maceratione ijs maiori cum iuuamento, qui Gallica lue correpti essent. Quod cum mihi in frigidis morbis feliciter cecisset, quā ex aqua tantum lignum decoquere, id potissimum me adduxit, ut hanc uini potandi rationem ad commune omnium commodum literis posteritatisq; memoriæ mandarem. id quod feci pluribus iam annis elapsis, quo scilicet tempore Dialogus noster de morbo Gallico Bononiæ excusus prodijt in lucem, ubi eodem anno Carolus v. inuictissimus Imperator à Clemene VII. Pontifice maximo Imperiali diademate feliciter est coronatus. Ex quo postea factum esse audiui, ut plerique medici ex illis nostris lucubrationibus, breui temporis tractu plurimum laudis, ac gloriæ sibi comparauerint, utpote qui uinum Guaiaci ad suam praxim uertissent, prospero admodum successu. Licet fuerint, qui alijs persuadere conati sint, suum illud esse inuentum: qui ut rem facilius prætexerent, omnibus huiusmodi uini præparationem dissimulabant, & occultabant: uel id facerent, ut rem ita plurimi facientes, inde maiorem quæstum consequi possent.

Sed cauendum profectō est à quibusdam impostoribus, qui cum sint earum rerum ignari, quæ ad medicæ facultatis contemplationem spectant, dum lignum, uel eius cortices ex uino decoquunt, cyclaminum, bryoniam, pityusum, & locynthidem, & turpetum admiscunt, atque alios mille cacodæmones, qui eos de medio tollant. Quippe nulla habita temperamenti, & ritudinis, temporum anni, sexus, nec ætatis ratione, singulis diebus huiusce decocti tepidi cyathum omnibus indifferenter præbent potandum. Quo fit, ut si sorte quadam unum quandoque persanant, decem postea ingulcent, tanquam improbi carnifices. Verum ut quisq; horum manus euitare, atque effugere possit, operæpretium uisum est, uini Guaiaci conficiendi rationem subiungere, ac subinde hauriendi modum addere. Sumito igitur ligni Guaiaci præstantissimi lima in scobem tenuissimam attriti, aut tornatili instrumento minutim concisi libras quatuor: corticum eiusdem libras duas: cardui benedicti libram unam & semis: adianti, aspleni, florum utriusq; buglosi, casie usque libram: casie odoratæ drachmas sex: seminis anisi sesunciam; sacchari libras quinq;. Deinde conieciantur omnia in cado uinario mundo aptæ capacitatis, desuper affusis uini albi quā optimi, & feruentis, libris centum, & quinquaginta, mox diligenter uas operculetur, omniaq; sic macerari triduo dimittantur. Post triduum uerò linteo percolentur, asserueturq; huiusce macerationis uinum in alio uase ad ægotantium potum. Siquidem bibitur hoc tam in prandio, quā in cœna secundi Guaiaci decocti loco: non manet, neq; uesperti serapij uice, quoniam modum temerè multi facere consueuerunt. Hoc idem uinum longè etiam melius, & maiore quantitate uindictarum tempore confici potest, aduisti ligno, cortice, cæterisq; alijs, recentibus uinis albis in mustum compressis: ibiq; tandiu dimisis, quousq; mustum effervesce desinat, & pellucidum, clarumq; reddatur: ueruntamen multiplicanda sunt omnia, quæ conueniunt medicamenta, pro uuarum quantitate. Præter huius uini potum cibus associandus, bis in die mane scilicet, & uesperti tribus, aut quatuor horis, antea quā sumatur cibus, ægotantibus exhibeo decorum. Eti ligni ex aqua secundum communem medicorum usum senas uncias, aduisti uncias duabus liquoris hoc modo præparandi. Sumito primum adianti, lupi salictarij, fumariæ, aspleni, senæ, singulorum manipulos tres: radicum centaurij magni, glycyrrhizæ, filiculæ, utriusq; buglosi, singularium uncias quatuor: seminis anisi, melanthij, florum satyrii & erratici buglosi, omnium santalorum, casie, quam ciuannomum uocant, singulorum drachmas quinq;. Hæc ex aquæ libris uiginti quatuor decoquantur ad tertias, demum colentur. Sumito deinde præstantissimæ senæ libras duas conieci toq; in uas fictile oris angustij, demum percolatum decoctum feruens superimposito, ac inde obturato fictile ore puluinari anserinis plumis factō, igniq; prius calefactō fictile inuoluito, et loco calido collocato, itaq; per diem noctem reponito. Postridie uerò manibus sena premitur, mox dilutum percolatur: cui adijciuntur diluti rosarum, ficaciter aluum subducētis libra sex, sacchari libræ octo: effervescent deinde simul subiecto igne, quousq; tertia pars euanescat. quo factō additur electissimij Rhabbarbari minutim concisi uncia, ac ita iterum feruent omnia donec in lapij modo consistat liquor. Postremo percolatur linteolo, & uase uitreo reconditur. At si ægotantes multa pituita redundant, decocto præscripto optimi turpeti uncia uiliter addi potest. Superest uictus ratio, quæ ægro talis præferenda est, scilicet ut tam in prandio, quā in cœna edat panis ternas tantum uncias, sitq; is similaceus, ac probè in clibano coctus: item totidem carnis pullorum gallinaceorum, perdicum, attagenarum, turdorum, ac auicularum in sulsis, uineis, ac montibus uictitantium, assatæ potius, quā lixæ: quin & uix passæ modicum. Bibat autem oportet præscripti uini æquam cum cibo mensuram. Quod si quis purum id bibere non posset, diluatur aqua, quæ in phialis uitreis addita Guaiaci unceola breui temporis spatio efferverit. Tempus autem huic curationi aptissimum profectō uer est martio, aprili, & maio mensibus. quod si hoc tempore fieri non possit, fiat mense septembri in autumno: nam sicuti æstiuis ardoribus, & exurente iam sirio non modò diuturna pharmaca, sed ne quidem breuia tolerant homines; ita nec brumali tempore, dum ingenti frigore seuit hyems. Interea agris sine metu noxæ indulgere licet, modo cœli serenitas adsit, ut quandoq; in proximis hortis, ac uiridarijs solatij causa læto gradu deambulent: quippe quoniam eiusmodi hortorum amenitate animus plurimum leuari solet. In hac etiam curandi ratione quosdā magis, alios minus perseuerare oportet, pro morbi necessitate, & salutis mensura. Hac ergo ratione uinum Guaiaci exhibitum non modò medetur cuiq; acerrimo Gallicæ pestis incommodo; sed etiam diuturnis articularū, capitis, neruorum, uentriculi,

Vini Guaiaci  
conficiendi, &  
exhibendi ra  
tio.



tricoli, iocineris lienisq; morbis pituita genitis nitrificè succurrit. Nec minus etiam podagra laborantibus opem fert, modo diuturna admodum non fuerit agritudo. Porro in hoc illud etiam obseruandum est, quòd ego Guaiaci uinum ijs tantum potandum exhibeo, quibus pituita redundet: uel saltem non exuperet bilis. Siquidem biliosis secundum, ac tertium ligni ex aqua decoctum, uini loco semper cum cibis præbendum censui, ut communiter ab alijs fieri solet. Non desunt præterea hoc tempore, qui radicem illam, quam alijs CINAM, alijs Chinam uocant, Guaiaco præferant, etsi Vessalius admirabilis humani corporis fabricæ proffessor oppositum senserit. Huius radiceis iandudum apud Hispanos inualuit usus contra podagras, maximeq; apud inuictissimum Imperatorem Carolum V. cui meritò præclarum laudem acceptam referre potest. Aduerbitur hæc (ut audio) tam à Lusitanis, quam ab Hispanis ex regionibus æquinoctiali proxinis, legiturq; in litoribus maris è terra euulsa. nam in paludibus exorta, ac inde maris fluctibus raptâ, in litus reiecitur. Radix est fungosa, perinde ac arundinacea, leuis, colore rufescente, Rhodiæ radiceis admodum æmula. Præfertur recens, firma, & quæ neque teredinem, neque cariem senserit, & quæ magis rubescat. Damnat eam acriter Vesalius, ut dixi. Sed quibus ualidis rationibus id faciat, compertum satis non habeo, præsertim cum illud certò sciam Cæsarem inuictissimum nunquam ea toties usum fuisse, nisi ex ea plurimum adiumenti percepisset. Sunt & qui radici illi, quam nuper aliqui SALSAM, aliqui Spartam parillam nuncupare ceperunt, tum guaiaci, tum etiam ipsius chinæ uires, & facultates tribuant. Hæc ebulli tam ad unguem æmulatur radices, ut quandoque crediderim Spartam parillam, & ebullum esse idem: tamen id asserere non ausim, cum hætenus eius folia non uiderim. Sed iam ad Ebenum redeamus, atque de nominibus agamus. Eius nomen Græcum est ἔβεος, ueluti & Latinum ebenus: Arabicum, Abanus, seu Abenus: Italicum, Ebano. Quod uerò Latini Lignum Guaiacum, Lignum sanctum, aut Lignum Indum uocant, Italis, Legno santo, Guaiaco, & Guaiacane appellatur: Germanis, Frantzosem holtz: Hispanis, Legno santo, & Legno dellas antillas: Gallis, Linsaint.

Chinæ radiceis consideratio.

Salsæ parillæ consideratio.

Nomina.

## Rosa.

## Cap. CXII.



ROSA refrigerat, & astringit, sed sicca magis astringit. Succus recentibus folijs exprimitur, defectis forficè unguibus (sic appellantur candidæ foliorum partes) reliquum in pila premi, & teri debet in umbra, donec cogatur, & ita ad oculorum circumlitiones recondi. Siccantur etiamnum folia rosarum, continuo uersata, ne muccant, neue sitis in ijs insideat. Aridis rosis, & in uino decoctis expressus liquor, facit ad dolores capitis, aurium, oculorum, gingiuarum, sedis, recti intestini, ac uulvæ penna illitus, aut infusus. Eadem sine expressione tusa, præcordiorum inflammationibus, humidis stomachi uitijs, igni sacro illini prodest: siccis, ac tritis femina asperguntur. Misceri solent uulnerarijs antidotis, atque compositionibus, quas antheras uocant. Folia uruntur in calliblephara. Flos, qui in medijs rosis inuenitur, siccatus, gingiuarum fluxionibus efficaciter inspergitur. Capita pota citam aluum, & cruentas reiectiones sistunt.

## Rosei Pastilli.

## Cap. CXIII.

PASTILLI, quos rhodides uocant, hac ratione conficiuntur. Rosarum uiridium, quæ nullo antea humore madefactæ extabuerint, drachmæ quadraginta, Indicæ nardi drachmæ decem, myrrhæ drachmæ sex, tritæ digeruntur in pastillos, qui trium obolorum pondus æquent: siccatiq; in umbra in fictili non picato, atque obturato reconduntur. Alij adijciunt costi drachmas duas, iridis Illiricæ totidem, & uinum Chium cum melle miscent. Illiricæ totidem, & uinum Chium cum melle miscent. Tritis etiam utuntur ad illitiones, & diapsmata, quæ fiunt ad sudores coercendos, ita ut à balneis inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

MULTA quidem sunt Rosarum genera, quæ in usum medicum ueniunt. At uulgatissimæ in Italia sunt, albæ cantes, puniceæ, & quæ ex albo rufescunt, quas uulgò appellant incarnate. Præstantissimæ, quæ puniceo colore rubent: proxima laus ijs, quæ in rufum candicant: uilissimæ albicantes, in quarum tamen genere eæ odoratissimæ excipiuntur, quæ Hetruscis Damascenæ, & alijs Moschettæ uulgò dicuntur. Siquidem non modò cæteras excellunt, quòd odore admodum suauis fragrent, sed quòd etiam magis aluum subducant, id quod indicat earum iucundissimus odor.

Rosarum cōsideratio.



Rosarum succus, & dilutū.

Rosarum genera ex Plin.

Partes in rosa, earumque uires.

Quorundam lapsus.

Rosæ diuersis partibus constant. quo fit, ut pro diuersis tam internis, quàm externis particulis, diuersum quoq; temperamentum sibi asciscant. Primum itaq; terrestribus, & aqueis partibus, quæ tamen in ipsis mediocriter se habent, substantiam, & adstrictoriam facultatem acceptas referunt. Ab æreis uerò & subdulcem, & odoratum saporem assumunt. Ex his denum, quæ ignis naturam sequuntur, amarorem concipiunt, ac etiam coloris rubedinem, quæ scilicet rubicundæ spectantur. quo fit, ut plus insit caloris puuicis, quàm subrubentis. In recentibus adstrictioni præstat amaritudo, in siccis uerò minimè: eaq; propter compertum est, earum deiciendæ alui facultatem, quam priores Græci non animaduenerunt, tantum ex amaritudine provenire, cum recentes aluum subducant, siccæ uerò nequaquam. Succus medicamentis componendis expetitus, præstantior è puuicis elicitur, item ex subrutilis, uerum huic infirmior facultas. Dilutum Græcis ἀποσπρυγμα, è quo rhodopharmacum aluum innoxie deiciens conficiunt, plerumque ex subrubescientium maceratis aqua folijs paratur: etsi hac in re ijs Damascenæ Hetruscis uocatæ longè præsent: quippe ex earum uicenis deuoratis folijs facili quidem, & citra noxam subducitur aluus. Rosarum succus reserat, discutit, abstergit, & deicit: quapropter & bilem trahit, & sanguinem biliosum expurgat. Idem felle suffusis, & uentriculi, iocinerisq; obstructionibus opem myrifice præstat. Cor item corroborat, eiusq; palpitationi salutare est remedium: nam illos deicit humores, qui cordi officiunt. Facit & ad biliosas febres, cuiusmodi sunt cuiusuis generis tertianæ. Ad hæc rosarum dilutum, ex quo conficitur rhodopharmacum, quod pharmacopole Syrupum rosatum solutiuum appellant, in eorum medicamentorum genere recentiores medici recensent, quæ quoniam absque aliqua noxa aluum subducant, suo more Benedicte nuncupant. Albicantes deinde rosæ (Damascenæ tamen exceptas uelim) non alium in medicina sibi uendicant usum, quàm ut ex se aquam stillent: siquidem iis deiectionaria uis, qua pollent puuicæ, ac subrutile, multò infirmior inest. Quamobrem uidetur Manardus Ferrariensis, uir alioqui doctissimus, immeritò id Mesui uitio uertisse. Nam albæ, quas Damascenas appellamus, etsi maiore deiciendi uicæ ceteris præsent, credendum tamen est, de his non intellexisse Mesuem, quòd eas illi facili incognitas fuisse existimem; uerum de iis albis tantum, quibus passim rosæta florent. Cuius rei illud maximo argumento esse potest, quòd Damascenæ Hetruscis uocatæ nuper in Italia florere cœperint, quòdq; eas ueteribus cognitæ fuisse (quod sciam) memoria prodiderit nemo: nì fortasse eas credamus esse, quæ Plinio spineolæ appellantur. Sanè rosæ nunc significandæ sunt, summoq; in pretio habendæ, non modò quòd uiridariis, & hortis sint ornamento, ac aspectu perquam iucundo; sed etiam quòd in præclarissimis medicamentis conueniant, quibus humane uitæ succurritur. Sicut alui ne tantillum quidem facultatis retinent. Idcirco Theophrastus libro, & cap. vi. de historia plantarum: Sicut uetres, inquit, rosæ domesticis asperiores tum uirgis, tum folijs constant: florent præterea ferunt, quo ab illis odore colore, atq; magnitudine superantur. hæc Theophrastus. Caterum quedam etiam rosæ nascuntur in Italia, quæ aureo colore fulgent, sed odore sunt admodum ingrato, atq; insuauis. Rosarum differentias longa historia prosequitur Plinius libro xx i. cap. iiii. ubi sic inquit. Contra rosæ genera uostri fecere celeberrima, Prænestinam, & Campanam. Addidere alii Milestam, cuius sit ardentissimus colos, non excedentis duodena folia. Proximam ei Trachiniam, minus rubentem. Mox Alabandicam uiliorem, albicantibus folijs. Vtilissimam uerò plurimis, sed minutissimis spineolam. Differunt enim multitudine foliorum, asperitate, leuore, colore, odore. Paucissima quina folia, ac deinde numerosiora. Cui sit genus eius, quam centifoliam uocant, quæ est in Campauia Italiæ, Græciæ uerò circa Philippios, sed ibi nouæ terræ prouentu. Pangæus namq; mons in uicino fert, numerosis folijs, ac paruis: inde accolæ erigentes conferunt, ipsaq; plantatione proficiunt, non autem talis odoratissima est, nec cui latissimum, maximumq; scilicet: breuiterq; indicium est odoris scabritia corticis. Cyrenis odoratissima est: ideoq; ibi unguentum pulcherrimum. Carthagine Hispaniæ hyeme tota præcox. Refert & celi temperies: quibusdam enim annis minus odorata præcox nit. Præterea locis siccis, quàm humidis, ouis est odoratio. Seri nec pinguibus nult, nec argillosis locis, nec riguis, contenta raris, proprièq; ruderatum agrum amat. Præcox Campana, fera Milestia, uouissimè tamen desinit Prænestina. Rosa ex spina nascitur. Germinat primo inclusa gransoso cortice, quo mox intumescente, & in uiridis alabastris fastigiato, paulatim rubescens dehiscit, ac sese pandit, in calycis medio sui stantis complexa luteos apices. hæc Plinius. Partes in Rosa sex antiqui adnotarunt, quæ omnes sunt & scitu dignæ, & in medicina utiles: etsi pauci habeantur seplastarii, qui separatim eas reponant. Primum quidem duæ partes inueniuntur in folijs: quarum altera est, ubi calyci folia inseruntur, unguinum modo albicans, ob idq; rosarum ungues hæc extremitates appellantur: altera uerò foliorum reliquum. His aliæ duæ succedunt, in iis flosculis, qui ueluti minuta semina tenuissimis capillis annexi flauescunt in rosarum umbilico: horum enim partem faciunt granula, partem uerò capilli. Postremo quæ reliquæ sunt, in ipso Rosarum alabaistro continentur, una scilicet in cacumine, altera in fundo. Folia cor, uentriculolum, iecur, & retentricum insuper facultatem corroborant: dolores ex caliditate provenientes leniunt, & inflammationes auferunt. Ungues etsi propriam à scriptoribus non receperint dotem; inseruntur tamen utiliter lotionibus, & clysteribus ad inhibendas fluxiones. Flosculi medii cum suis capillis gingiuarum defluxiones cobibent, quinetiam auctore Plinio, alba sceminarum profluvia mirifice inhibent. Calyx deniq; quem caput etiam aliqui dicunt, cum reliqua parte basis, alui fluores, & cruentas excreationes sistit. Caterum præter has, quæ in florentibus rosis consistunt, tres etiam in fructu comperiuntur partes, ubi rubescit is, & maturitatem sensit, uidelicet, substantia carnis, scamen, & lanugo conclusa: quibus non obscura inest adstringendi uis. Idcirco & ipse remedio sunt contra alui fluxiones, & sceminarum abundantiam qualencunque item contra gonorrhæam, in qua præcipue pollent. Sunt, qui flosculos capillis appensos, qui uerò alabastris, antheram esse existiment. Sed re uera hac in re planè hallucinantur: etenim anthera Celso, Galeno, & Paulo nusquam simplex est medicamentum, sed quedam ex pluribus rebus compositio, cuius frequens erat usus apud antiquos ad oris ulcera: item ad pedum rimas, digitorumq; pterygia. Cuius etiam parandi



parandi rationem adnotatam reliquit Galenus lib. VI. de compositione medicamentorum secundum locos, de oris ulceribus differens. Ex Rosis ui ignis sit aqua pluribus, ac diuersis instrumentis: ueruntamen ea ceteris præstantior, ac odore fragrantior habetur, quæ per balneum calentis aquæ uitreis organis elicatur, cuiusmodi & aliæ sunt, quæ eodem modo ad uniuersum medicinæ usum confici solent. Quandoquidem inter has, & illas, quæ plumbeis instrumentis lignorum, uel carbonum igne extrahuntur, tanta deprehenditur differentia, quanta inter plumbum, & aurum deprehendi potest. Quippe quæ fiunt in balneo calentis aquæ uitreis rostratis organis, ab herbis, & floribus, à quibus manant, nec sapore, nec odore dissentiunt, adeo ut non solum proprias plantarum qualitates secum referant, sed ne etiam tantillum quidem tum fumi, tum rei adustæ respiciant. Quod quidem in ijs non inuenias, quæ uulgo plumbeis, & æreis instrumentis eliciuntur: has enim nunquam, uel rarissime gustaueris, quin tibi fumidum uirus, uidoremque reddant. Quæ res non modo ægris ingentem molestiam afferunt, & nauseam plerumque mouent, sed & plurimum noxæ pectori, uentriculo, iocineri, uisceribusque omnibus inferunt: quod à metallicis organis, à quibus distillant, malam eorum qualitatem sibi uendicent, ut libro tertio in absinthij commentatione, auuente Deo, latius explicabimus. Quare hac ætate perspecta, doctissimi, ac peritissimi medici ueteres secuti, decoctis, ac dilutis tantum uti coeperunt. Quæ tametsi uiribus aquas qualescunque sublimatas (ita enim stillatitias uocant) præcellant; ea tamen, quæ calentis aquæ feruore (ut supra diximus) fiunt, cum proprios tum odores, tum sapores herbarum, ac florum, à quibus extrahuntur, secum trahant, iure quidem decoctis non modo ipsas æquipollere, sed etiam præstare crediderim: non tamen, quod uiribus præcellere dixerim, sed quod gustui suauiores, & uisui iucundiores habeantur: quod non parum solati ægotantibus affert. Nos quidem alijs aquis non utimur, quam his, ad quas eliciendas nobis organum affabre parari fecimus, cuius ope hæc stillatitias, ac præstantissimas aquas suo tempore conficimus. Quærum aliæ sapore constant amaro, aliæ uero acri, aliæ austero, aliæ acido, aliæ denique insipido pro uarijs simplicium medicamentorum qualitibus, à quibus eliciuntur. Quapropter seplastarii, & medici, quos magis decet humanam charitatem colore, quam aurum & argentum, dent operam, ut iam plumbea, & ærea organa aboleantur, & balnea, de quibus diximus, in eorum locum succedant. quippe in hoc etiam (quanuis plus laboris, minus uero emolumenti sumant) & Deo, & hominibus simul rem gratam facere poterunt. Ceterum Fuchsius medicus nostræ ætatis clarissimus in libro de compositione medicamentorum, quem nuper edidit, uicè cauendum præcipit in succis stillatitijs eliciendis, ne eius uasculi fundum, in quo stirpes continentur, aquam in cacabo bullientem attingat, sed solo uapore ab ea eleuato incalescat. Quæ in re secutus potius uidetur fuisse Manardum uirum de arte medica præclare meritum, qui ita scriptum reliquit in suis epistolis, quam rei experimentum. Verum ipse non possum omnino eorū sententiæ subscribere, ut qui iudicem non esse semper ea exquisita ratione procedendum in herbis distillandis, quod certo sciam nihil referre, quando etiam uasculum herbas recipiens in aquam in maiore uase bullientem immergatur. Nam etsi aquæ quas illi uolunt ex herbis uapore tantum ab aqua bulliente eleuato extrahi, ceteris præstantiores habeantur; tamen quæ ex herbis eliciuntur uasculo impositis, quod aqua bulliens circumluat, parum certè, aut ferè nihil illis bonitate cedunt. quod mihi compertum est in ijs aquis, quas sepiissime libuit utroque modo elicere & experiri. Attamen aliis quis illud discrimen esse dicet, quod illo modo aquæ ex herbis extrahantur, quæ tenuiores partes retinent, quod uaporis illius caliditas imbecillior sit, quam ut possit totam herbæ substantiam conficere: hoc autem modo aquæ eliciantur, quæ omnes herbarum partes secum referunt. Hæc sanè differentia, quæ facile concedi potest, non est, meo iudicio, tanti momenti, ut illa regula perpetuò sit obseruanda, hæc uero euitanda: quin potius facit, ut hæc mihi uideatur probanda, illa uero reiicienda tanquam cautio nimis religiosa. Rosarum uires collegit Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Rosarum uis, atque ficitas superioribus libris pluribus uerbis exposita est, nempe quod ex aquæ substantia calida mista duabus alijs qualitibus, adstringenti uidelicet, & amara, composita sit. Quinetiam cuius sit nature utraque, amara scilicet, & adstringens, in horum commentariorum quarto declarauimus. Flos earum magis etiam ipsis rosis adstringit, ac proinde sanè etiam exiccatorius est. Rosa, quam ita Latini uocant, Græcis ῥόδον dicitur: Arabibus, Nard, Naron, seu Yard: Italis, Rosa: Germanis, Rosen: Hispanis, Rosas: Gallis, Vnc rose.

Aqua rosarū præstantior.

Fuchsi opinio non probata.

Rosarum ficitas ex gal.

Nomina.


## Lycium.

## Cap. CXIII.

LYCIUM quod aliqui pyxacantham uocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut longioribus: foliis buxi, densis: fructu piperis, nigro, læui, amaro, densoque: cortice pallido, non dissimili lycio madefacto: radicibus multis, obliquis, lignosis. Nascitur plurimum in Cappadocia, Lycia, & plerisque alijs locis. aspera loca amat. Succus extrahendi ratio hæc est. Rami cum radiculis tusi, & antè per multos dies macerati coquantur, tum abiectis lignis, itidem liquor coquitur, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id lycium, adiecta decoctioni amurca, aut absinthij succo, aut felle bubulo. Innatans spuma inter coquendum exempta, oculorum medicamentis additur: reliquo ad alia utuntur. Simili modo fit lycium semine expresso, & insolato. Optimum, quod uri potest, relictumque rubentem spumam ostendit, glebis intrinsecus nigris, intus, cum frigeris, rufis, odore minimè uiroso, cum amaritudine alstringens, crocino colore: cuiusmodi Indicum est, ceteris præstans, & efficacius. Lycium adstringit, caliginem oculorum discutit: genarum scabiem, pruritus, ueteresque fluxiones sanat: facit ad purulentas aures, exulceratas gingiuas, tonsillas, labiorum fissuras, sedis rimas, attritusque illitum: cœliacis, dysentericis, potum, inditumque conuenit: datur sanguinem excreantibus, & tussi ex aqua: contra rabiosi canis morsus in catapotio deuoratur, aut in aqua bibitur: flauos facit pilos: redunius, ulceribus, quæ serpunt, aut putrent, medetur: sceminarum profluuium



## LYCIVM.

Lycii consi-  
deratio.Lyciū in Ita-  
lia nascens.Lycii vires  
ex Galeno.Buxi consi-  
deratio.Quorundam  
opinio repro-  
bata.

fluvia appositum sistit: rabiosorum ictibus ex melle pos-  
tum, aut uice catapotii deuoratum, auxiliatur. Tradunt  
Indicum fieri Lycium, ex frutice lonchitide appellato.  
Ea spinarum generi ascribitur, ramos rectos habens, ter-  
num cubitorum longitudine, maiorisue, rubo crassio-  
res, à radice numerosos: fractus cortex rubescit: folia o-  
læe similia. Herba in aceto decocta proditur licnis infla-  
mationibus, & regio morbo mederi, & fœminarum pur-  
gationes elicere. Assuerant etiam crudam in potu, eos-  
dem effectus præstare: semen cyatho dimidio potum, pi-  
tuitam expurgare, uenenis quoque auxilio esse.

LYCIVM medicamentum, quo hodie officinæ passim utun-  
tur, nimirum notis illi plurimum reclamat, quod nobis hic reddi-  
dit Dioscorides. Siquidem illud officinarum igni admodum non ac-  
cenditur, nec intus rufescit, nec ullam gustantibus affert amaritudi-  
nem. quæ omnia certo sunt indicio, id omnino imposturis, & ad-  
dulerijs non uacare. Tradidere, quidam hoc ab impostoribus fieri  
è ligustri fructu, alij id tribuunt periclymeni baccis, alij sangui-  
nea uirgæ corymbis, alij porro ex his omnibus simul confusis ely-  
ci produnt, ac inde insolari. At legitimum, & quod sincerum sit,  
quoquomodo se res illa habeat, compertum est, hoc a quo ex Lycia  
unde illi nomen, ad nos non importari. Veruntamen & in Italia  
Lycij arbor nascitur: quandoquidem (ut Brasauolus testatur) in  
Liguria alpibus frequens illa uisitur. Eadem & in Dalmatia pro-  
uenit, unde nuper eius ramuli suis baccis onusti mihi allati fuerunt,  
quippe (ut mihi retulerunt) uia, qua ex Zara itur Nouam, ubi  
uirescit. Sed, quæ maxima tum seplasiariorum, tum etiam medico-  
rum incuria, ac negligentia est in ijs exquirendis, quæ ad artem  
medicam spectant plerumque, sit, ut ne illud quidem, quod nobis præ-  
te natura tribuit, cognoscatur, nedum recipiatur in usum. Lycij


uices Dioscoridi explet amurca in cupreo uase decocta, aut etiam rhus decoctus, quousque eius liquamentum mellis cras-  
situdinem acquirat. Lycij meminit Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum sic inquit. Lycion, siue pyx-  
canthon, arbor spinosa, ex qua lycium, quod uocant, conficitur: id uidelicet medicamentum liquidum, quo ad sugi-  
lata utuntur, & sedis, orisq; phlegmonas, ulcerationesq; tum herpetas, putredines, & ulcera contumacia, & an-  
res pure fluentes, & intertrigines, ac paronychias. Est autem facultatis exiccatoria, compositum ex diuersi gene-  
ris substantijs, quas è τρεπόμενις Græci uocant: altera quidem tenuium partium digerente, atq; calida: altera terrea  
stri, & frigida, ex qua adstrictionem obtinet. Porro hæc qualitas pusilla medicamento inest, digerit uero, & desicca-  
cat non parum, nempe in secundo recessu, in calore autem medijs, & symmetris proximum est. Proinde ad diuersos  
affectus hoc utuntur medicamine, ut abstergente quidem ad ea, quæ pupillas obtenebrant: ut contrahente uero, cæ-  
liacis, dysentericis, ac muliebri profluuiio adhibentes. Lycium hoc in Lycia, & Cappadocia plurimum prouenit: al-  
terum uero Indicum ad omnia ualentius est. Et primo de antidotis, non facile adulterinum lycium à legitimo digno-  
sci idem memoria prodidit. hæc Galenus. Ceterum quoniam Pyxacantha, quo nomine lycium ab aliquibus appella-  
latur, mihi Buxum, quæ Græcis βύξον dicitur, in memoriam redegit, non omitteendum duximus, quin de ea etiam alio-  
quid dicamus. BUXVS itaq; nobis notissima est planta, quod plurima in Italia proueniat, folio myrti minore, cras-  
siore, uiridioris; ac subrotundioris: uiret perpetua coma, eaq; propter topiario operi accommodatissima: flore herba-  
ceo: semine rufescente, omnibus animantibus inuiso. Crassissima in Corsica, flore non ferendo: quæ causa amaritudi-  
nis mellis. Frigidis gaudet, & apricis. Materies buxo honorata, raro crispanti, nec nisi radice: cætero lenis quies-  
centis materia, silentio quodam, & duritie, ac pallore commendabilis. Eadem spississima, & densissima, atq; ponderosissima  
ma, adeo ut in aquis non fluitet, nec cariem sentiat. Hæc etsi nullius sit in medicina usus, ut ueteres prodiderunt:  
desunt tamen è recentioribus, qui uelint non aliud esse Italici buxi, quam Indici lignum, quod guaiacum appellant:  
ea tantum ratione ducti, quod pluries experimento compertum sit, eius decocto etiam feliciter eos sanatos esse, qui Gal-  
lica lue affecti erant. Quod etsi experientia concedi possit, illud buxi lignum præstare, attamen quod buxi in Ita-  
lia nascens, & guaiacum ab Indis petatum una, & eadem sint planta (ut in secunda centuria Amatus Lusitanus asse-  
rere uidetur) nunquam profecto crediderim. Siquidem guaiacum pingue, resinosumq; uisitur: materie intus nigra  
ebeni ferè modo: quin & sapor huic amarior, & acris. quibus omnibus notis siccam buxi materiem carere constat.  
Quinetiam guaiaco (ut narrant ij, qui ab Indis ad nos redeunt) folia insunt plantaginis, breuiora, crassiora, duriora-  
raq;: lutei flores, & fructus iuglandis magnitudine. Buxus uero folia fert myrti, breuiora: flores herbaceos, & fru-  
ctum myrto nusquam grandiorum. Quo fit, ut omnino existinem eos hallucinari, qui putant buxi quæ in Italia na-  
scitur, idem esse cum Indico guaiaco, ut nuper sensisse uidetur Lusitanus loco antedicto. Sed quam ab eo ieiune, ne  
dicam imprudenter actum sit de simplicium medicamentorum cognitione, eorum facile iudicium futurum spero. qui non



non medioeriter in re herbaria uersati fuerint, & huius scripta legent, atq; etiam legere non grauabuntur apologiā, quam nos aduersus illum scripsimus, cui plurima errata attexuimus, quæ in eiusdem in Dioscoridem enarrationes adnotauimus. Lycium Latini similiter atq; Græci λυσιον nominant: Arabes, Hadbadh, Hadad, Kilulem, siue Felz. Nomina. Zakarag: Itali, Licio. Quæ uerò planta Græcis πυξος, Latinis Buxus appellatur: Italis, Bosso.

## Acacia.

## Cap. CXV.



ACACIA in Aegypto nascitur, spina instar arboris, fruticosa, non se in rectum attollens. Florem habet candidum, & semen lupino simile in folliculis: ex quo succus expressus siccatur in umbra, niger ex maturo semine, subrufus ex uiridi. Eligatur modicè rufus, & odoratus, ut in hac arbore esse potest. Aliqui exprimunt ex foliis, & semine succum. Manat & gummi ex caspina. Vis ei ad spissandum, refrigerandumque efficax. Succus oculorum medicamentis utilis: ualet ad ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, perniones, pterygia, & oris ulcera: procidentes oculos reprimat: mensium abundantiam sistit, prociduam uuluum cohibet: citam aluum supprimit, aut potus, aut subter inditus: capillos denigrat. Lauatur oculorum medicamentis, trito in aqua: mox effuso, quod concreuerat, donec pura extet aqua: & ita cogitur in pastillos. Vritur etiam in cruda fidelia, donec fictile fornacibus percoquatur: torreturq; in carbonum halitu perfusa. Spinæ decoctum solutos artus fotu committit. Præfertur eius spinæ gummi, quod in uermiculorum speciem contrahatur, & utri modo perluceat, ligni expers, proximum est candidum: sordidum uerò, ac resinofum inutile. Cutis meatus obstruit, & medicamentorum, quibus admiscetur, acrimoniam hebetat: ambustis ex uno illitum, pustulas non patitur erumpere. Alterum Acaciæ genus in Cappadocia, Pontoque prouenit, Aegyptiæ spinæ similitudine, longè minus, tenerius, humile: aculeorum uallo munitur, folia habens rutæ: semen lenticula minus fert autumno, in loculis connexis, ternum, quaternumue capacibus. Succus eius aditringit, uiribus inferior, & ocularibus medicamentis inutilis.

ARBOR, quæ Dioscoridi Acaciæ uocatur, Theophrasto Spina simpliciter dicitur lib. III. cap. III. de plantarum historia, ubi de ea ita scriptum reliquit. Spina ex eo nomen accepit, quod tota arbor aculeis horret, excepto caudice: nam & super germina, foliaq; aculeos gerit. Magnitudine excellit, materies quippe duodenorum cubitorum, testis idonea ceditur. Eius duo genera sunt: quædam enim candida, quædam nigra: & altera imbecillis, facileq; putrescens: nigra autem robustior, atq; incorrupta, ob id in nauium fabrica ad costas, nentrisq; compagine ea utuntur. Erecta non ualde assurgit. Fructum fert in siliqua, leguminum modo, quo incolæ coria perficiunt uice gal læ. Flos & pulcher aspectu, ut coronas ex eo facerent: & medicamentis perutilis, quæ de causa colligi à medicis solet. Fit & gummi ex ea: manat hæc tum arbore percussa, tum sponte sine ulla plaga: cum autem cæsa fuerit, anno tertio protinus resurgit. Copia huius arboris largè habetur, & solua ingens circa agrum Thebanum est, ubi & robur, & perseæ, & olea quoq; eo loco emigrat, non aquis fluuij riguo (distat enim plus, quàm trecentis stadiis) sed suis fontibus, qui circa eum tractum permulti exiliunt. Materies arboris dura, & cæsa colorem celtis utiq; repræsentat. hæcenus Theophrastus. A quo Plinius non dissentiens, ipse quoq; eius historiæ memoriæ prodidit lib. XXIII. cap. XII. cuius sic uerba sonant. Est & acaciæ spina. Fit in Aegypto alba, nigraq; arbore, item uiridi, sed longè melior è prioribus. Fit & in Galatia tenerrima, spinosiore arbore. Semen omnium lenticulæ simile; minore est tamen & grano, & folliculo. Colligitur autumno, quoniam antè collectum nimio ualidius. Spissatur succus ex folliculis aqua celesti persusis, mox in pila tulsis: exprimitur organis, tum densatur in sole mortarijs in pastillos acacia dicta, arboris uidelicet suæ nomine. Fit & ex folijs per se minus efficax. Ad coria perficienda semine pro galla utuntur. Folijs succus, & Galaticæ acaciæ nigerrimus improbatur: item qui ualde rufus est. hæc Plinius. Succus è recentibus semine expressus, ac postea longa insolatione concretus Græcis nomine suæ arboris Acacia nuncupatur. In cuius defectu supponunt tum officinæ, tum medicorum uulgus succum è syluestribus prunis expressum in tenues quasdã plantulas in sole densatum: siquidem legitima acacia ad nos non affertur. Vbi acacia defecerit, licet (si Dioscoridi credimus) eius uice tum rhois arbuscula folia, tum lentisci foliorum succum, tum etiam hypocistidem medicamentis immiscere. Quamobrem his potius seplasiarj uti deberent, quàm suppositio syluestrium prunorum succo. Scire etiamnum conuenit, gummi, quod ab arbore acaciæ manat, ideo Serapioni Arabicum nuncupari, quod ab Arabia regione

Acaciæ hist. ex Theophr.

Ex Plinio.

Acacia officinarum.

Gummi Arabicum.



gione Aegyptio contermina suo tempore importaretur. Sed animaduertere oportet, quod Arabicum uulgaris usus gummi longe quidem ab illo differt, quod ab acacia colligitur: nam; illud non contractis uermiculis simile, sed in grummis uersicoloribus conspicitur, quorum alij succinum, alij topatium, alij chrysopatium, alij beryllum colore, & nitore referunt. Quod autem nobis gummi Acaciae desit, illud argumento esse potest, quod ipsa quoque legitima acacia haec tenus, quod sciam, non defertur. Nam si hoc, quo utimur, syncerum, legitimumque acaciae esset gummi, procul dubio ipsa quoque acacia ad nos conueheretur, cum longe magis in paranda theriaca, alijsque componendis medicamentis exoptetur, quam gummi. Hinc itaque facile quisque coniecere potest, gummi ex Aegyptia spina defluens ab eo sane plurimum differre, quod Arabici gummi nomine officinarum uulgo habet. Hoc igitur uulgare gummi illud equidem esse existimauerim, quod Graecis gummi simpliciter uocatur. In quam sententiam me adduxit Galenus, siquidem libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Gummi lacryma est congelata, concretaque in truncis arborum ipsam fundentium, uelut resina quoque in multis uisitur plantis, quae resinam fundere possunt. Ceterum quod exicatoria, emplasticaque sit facultatis, constat. haec Galenus. Ex cuius uerbis palam est, gummi sic in uniuersum Graecis appellatum, nostrum gummi esse uulgo Arabicum dictum. Quod quidem quantum sensuum iudicio consequi possumus, tum pluribus arborum gummi miscellaneum est. Cuius rei manifestum indicio sunt cum grunorum formae diuersitas, tum colorum uarietas. Huc etiam accedit, quod Galenus unica nomenclatione omnia earum arborum gummi comprehendit, quae resinam non proferunt. Quamobrem omnino explodenda uidetur eorum sententia, qui ubi Graeci gummi absolute scriptum reliquerunt, illud gummi intelligendum esse contendunt, quod est spina Aegyptia manat. Non desunt praeterea, qui gummi spinae Aegyptiae illud esse opinentur, quod gummi Dragaganti, hoc est, tragacathae officinis appellatur, propterea quod effigie contractos uermiculos reserat, quo nihil certe melius illi competere posset. Sed tamen hoc etiam illud non est, ut suo loco dicemus. Galenus lib. VII. de compositione medicamentorum per genera, Acaciae gummi *κακιδν βαζινόν* uocat: hoc fortasse argumento, quod scripserit Theophrastus (ut supra dictum est) ingentem huiusce spinae solum esse in agro Thebano. Sed cum ad nos non perferatur acacia (ut paulo ante scripsimus) nec etiam eius gummi importari credendum est. Gummi Acaciae meminuit Iacobus Syluius uir sane etatis non strae ingenio & doctrina celebris, suo de natura simplicium medicamentorum libello, his uerbis. Gummi acaciae non meminuit Galenus in Acacia libro sexto simplicium, uti nec acaciae mentionem facit paulo post in Acantha Aegyptia seu Arabica, quo nomine solo Dioscoridi uocatur. Vnde colligas licet, acaciae, & acantham Aegyptiam, seu Arabicam, diuersas esse in Aegypto spinas arbores. haec ille. Sed mea quidem sententia, Syluius manifeste aberrasse apprehenditur: quandoquidem Galeno acantha Aegyptia arbor utique non est, sed herba est carduorum genere, quae admodum & Dioscoridi libro tertio, *κακιδν λευκή*, hoc est, spinae albae similis, quam Mauritanii suchaa appellant. Quocirca eo capite acaciae meminisse Galenum omnino fuisse absurdum. Ceterum alteram Acaciae, quam in Cappadocia, Pontoque provenire tradit Dioscorides folijs rutae, quamque hic depictam damus, accepimus hoc anno a quodam ex ijs, qui rei herbariae dant operam. Et quoniam ea Dioscoridis historiam perbelle representare uisa est, non potuit animus non inclinari ad credendum hanc secundam esse Acaciae. Est enim aculeis horrida, folio rutae, semine lenticula minore, in siliquis ternum quaternumue capacibus, quod autumnio profert, gustu etiam adstringente: color siliquis aureo quodam fulgore respersus, adeo ut in sole auri modo pelluceat. Acaciae uires adnotatas reliquit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Acaciae & planta ipsa acerba est, & fructus, & succus, qui lotus quidem & imbecillior, & minus mordax redditur, utpote acrimoniam quandam per lotionem deponens. Porro si parti alicui sane illinatur, protinus eam & sicciorem, & contractam efficiet, nullum quidem caloris sensum inuehens, sed nec frigoris admodum ualentem. Vnde constat medicamen id esse frigidum, & terrosissimum, immista quaedam etiam essentia aquea. Et sane coniectura est, non esse simile, uerum quasdam in sese dispersas habere partes ternas, & calidas, quae in ipsa ablutione segregentur. Estoque & hoc tertij ordinis exiccantium, & secundi refrigerantium, ubi quidem elotum fuerit, illotum uero primi. Nomen, quod *ακασία* habet apud Graecos, idem, quod est Acacia, retinet apud Latinos & Italos. Ea autem Arabicè Achachie appellatur.

Quorundam  
lapius.

Iacobi Syluii  
opinio repro-  
bata.

Acaciae alce-  
rum genus.

Acaciae uires  
ex Galeno.

Nomina.

## Vitex.

## Cap. CXVI.

VITEX siue lygos, frutex est in arborem assurgens. Nascitur in fluminum ripis, asperisque locis, ac torrentium alueis: ramos gerit longos, fractu peruicaces: folia oliuae, sed molliora. Duo genera eius: una harum album florem mittit cum purpureo: altera tantum purpureum, & semen, ut piper. Excalfactorias uires habet, & astringentias. Semen eius potum uenenatis ictibus, aquae quae cutem subiit, lienosisque auxiliatur: lac euocat: menses ciet, drachmae pondere in uino potum: generationem exoluit: caput tentat, & soporem affert. Decoctum herbae, & seminis in defensione, mulieribus uuluae malo opportunis opitulatur: item inflammationibus. Purgationes mouet semen cum pulegio potum, etiam suffitu, uel appositu: capitis dolorem dissoluit illitum: instillatur cum aceto, & oleo capiti in lethargo, & phrenitide. Folia suffitu, aut substratu fugant uenenata, illita quoque serpentium moribus auxiliantur: testium duritias, cum butyro, & folijs uitium emolliunt. Rimas sedis semen cum aqua illitum mitigat: & cum folijs medetur luxatis, uulneribusque. Virgam qui manu teneat, dum iter facit, negatur intertriginem sentire. Agnum, quasi dicas castum, uocant Graeci, quoniam matronae in Thesmophorijs Atheniensem castitatem custodientes, folijs huius cubitus sibi sternunt. & lygon, quasi uimen, propter inuictam ferè ramorum flexilitatem.



## VITEX.



VITEX siue Salix Amerina, quam uulgo herbariorum

Viticis consi-  
deratio.

Agnum castum appellat, arbuscula est in Italia uulgaris notitie. Duo eius genera recenset Plinius lib. XXIII. cap. IX. Maior in arborem salicis modo assurgit: minor ramosa, folijs candidioribus, lanuginosis. Prima album florem mittit cū purpureo, quæ & candida uocatur: nigra, quæ tantum purpureum. Nascuntur in palustribus campis. Non multum à salice utilium usu distat vitex: foliorum quoque aspectu, nisi odore gravior esset. Græci lygon uocant, alij agnon, quoniam matronæ in Thesmophorijs Atheniensium castitatem custodientes ijs folijs cubitus sibi sterunt. Vitex, ut scriptum reliquit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum, caliditatis, & siccitatis classẽ tertiam sortita est, uerum ea est multum tenuis substantiæ, tum gustu acris simul & adstringens: ipsas tamẽ uitices ad medicinam habet inutiles: ceterum folia, semenque calida, siccaque facultate sunt, substantia uerò tenui. Nam & utentibus ita apparet, & gustantibus acris simul & subadstringens percipitur tum folium, tum flos, tum semen. Edendo tamen etiam semen est, uerum tan perspicuo calfacit, ut capiti hoc nomine dolorem pariat. At si frigatur (nam & sic editur cum bellarijs) minus caput tentat. Porro flatus uentris discutit & cum non frictum, & multo magis cum frictum fuerit. Cohibet præterea semen impetum in uenerem tum frictionis expers, tum etiam ipsam expertum. Folia item, floresque ipsius fruticis id ipsum præstare possunt. Itaque non tantum esca, potaque ad castitatem conferre creduntur, uerum etiam substrata. Hinc est, quod Athenis in Thesmophorijs, hoc est, sacris Cereris, mulieres totum sibi fruticem substernunt: hinc illi quoque nomen inditum agni, hoc est, casti. Ex quibus omnibus manifestum est, si quidem memoria teneamus, quæ superioribus commentarijs sunt dicta, agnum calfacere, simulque exiccare, tum onuium maxime flatus discutere. Porro quod exacte tenuium sit partium, facultas eius iudicio est. Nam quod caput tentat, non magis à multitudine uaporum ab eo prognatorum, quam à caliditate eius, ac subtilitate partim fieri rationabile est. Nam si statuosum spiritum procreare possit, sanè & uentrem inflaret, & uenerem stimuleret, perinde ut eruca. Verum cum non tantum non excitare, imò etiam reprimere queat, fuerit profecto secundum rutæ maxime facultatem tum in excalfaciendo, tum in resiccando: non tamen illi par est, nam utroque paulo est inferior: siquidem ruta tum magis est excalfactoria, tum magis desiccatoria. Differt etiam qualitatis simul, ac facultatis mixture. Nam agni semen, ac germina modicam ferunt adstrictionem: at ruta ubi aruerit, exacte amara est, & acris: ubi uerò humida, subamara. Non tamen austeritas, aut acerbitas illi inest: aut si cui uideatur inesse, ea utique omnino obscura, scio, uidebitur, nec par ei, quæ est in agno. Quocirca & ad iecur, & lienem indurata, & obstructa agni semen potis, quam rutæ competit. Sed hæc ad curandi iam methodum pertinent, quam ut omnino non attingam de medicamentorum pronuncians facultatibus, fieri non potest: uerum celeriter ad rem propositam reflectere, uiri est utique temperati. Magisque etiam id ipsum in sequentibus medicamentis efficere conabor, hoc est, ubi ex quibusdam paucis euidentijs generalem facultatem collegero, particulares postea actiones omittam. Nam in præsens id solum nouisse sufficit, quod agnus calidus est & siccus facultate, idque non mediocriter, sed tertio excessu, tum admodum tenuium partium. Hæc qui norit, ac postea methodum curandi didicerit, ipsemet inueniet, quo pacto menses hinc cieat, quo pacto partes induratas digerat, quo pacto lassitudinem soluens, seu acopum, & ex calfacitorum ex eo unguentum præparetur. hætenus Galenus.

Viticis uires  
ex Gal.

Huius plantæ nomen Græcum est ἄγνος ἄγνος: Nomina. Latinum, Agnus, Vitex, & Salix amerina: Arabicum, Famauchest, Samauchest, seu Bengiechest: Italicum, Vitice, & uulgate, Agno casto: Germanicum, Schaffs mulle, & Keuschlamp: Hispanicum, Gattillo casto.

## Salix.

## Cap. CXVII.

SALIX uulgo nota est. Cuius semen, folia, cortex, & succus spissandi uim habent. Trita folia cum exiguo pipere, & uino pota, ileosis subueniunt: sumpta per se, & cum aqua præstant mulieribus, ne concipiant. Salignum semen in poru sanguinem expuentibus prodest. Cortex eisdem præbet effectus. corticis cinis admisto aceto maceratus, illitu clauos, & callos tollit. Ex folijs, & cortice succus cum rosaceo in calyce punici calfactus, aurium doloribus auxiliatur. Decocto eorum podagras foueri utilissimum: furfures purgat in corpore. Excipitur succus, qui manat ex ea, cum floribus suis, exciso cortice: in plaga enim concretus humor inuenitur, qui ad purganda, quæ obstant oculis, suam uim præbet.



Salicis conf-  
deratio.

## S A L I X.



Salicis uires  
ex Galeno.

Nomina.

Arbitur. Porro arboris cortex similem facultatem obtinet tum floribus, tum folijs, nisi quod temperatura sit sic-  
cioris, uelut omnes cortices. Sed hunc quidam comburunt, eiusq; cinere utuntur ad omnia, quæ ualenter desicca-  
re oportet. Nam clauos quos uocant, callos Græcis τύκους, myrmeciasq; tollunt, aceto acri ipsum macerant  
tes. Nonnulli autem dum floret salix, corticem eius incidunt, & succum quandam colligunt, utunturq; ad ea, quæ  
pupillas offuscant, extergente uidelicet, simulq; tenuium partium medicamine. Vti uero illo ad multa alia quis pos-  
set, siquidem talis fuerit, Salix ita Latinis dicta, Græcis ἱρέα: Arabibus, Bulef, Bhulles, Saffaf, aut Chul-  
lis nominatur: Italis, Salice, & Salcio: Germanis, Vueden, & Felbinger: Hispanis, Salce, aut Salgueiro: Gal-  
lis, Saulx.

QV ANVIS de Salice, ut una tantum agat Dioscorides;  
eius tamen plura traduntur genera tum à Theophrasto lib. III.  
cap. XIII. de plantarum historia, tum etiam à Plinio lib. XVI.  
cap. XXVII. Nam quedam in tantam proceritatem assurgunt,  
ut ex eis in Liguria fiant & pertica, & pali maximi usus ad ni-  
tium pedamenta. Aliæ non tam proceræ crescunt, colore rufesce-  
tes, sequacis lentitiæ, quæ ligandis cadorum uinariorum circulis  
commodè finduntur. Rursus aliæ firmiores corbibus, & rusti-  
canæ suppellectili admodum expetitæ. Aliæ denique sunt minu-  
sculæ, ac spectabili tenuitate, texendis canistris, cistellis, ac ca-  
latis aptissimæ. Salycis lacrymam trium generum esse prodidit  
Plinius libro XXIIII. cap. IX. tametsi unius tantum generis  
meminerit Dioscorides. Vnam arbor ipsa sponte exudat: altera  
manat in plaga, cum floret, exciso cortice trium digitorum ma-  
gnitudine: tertia est detruncatione ramorum autumnii tempore  
à falce distillans. Caterum qui Salicis albicantem spumam adno-  
tatam reliquerit, inuenio neminem: quæ delapsis statim floribus  
è ramusculis uix modo dependet, donec uentis arrepta huc, &  
illuc plumæ modo impellitur. Salix citò senescit, ac breui uite  
spatio perdurat. Eius materies ideo scutis faciendis apta, quod  
lenta admodum sit, tenax, & leuis. Salicis uires memorie  
prodidit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum his uerbis.  
Salicis folijs ad cruenti uulneris glutinationem quis uti posset. Ve-  
rum floribus eius maximè propè omnes utuntur medici ad exicca-  
tis emplastri preparationem: est enim uis eorum ita desiccato-  
ria, ut morsu absteineat: habet uero etiam quandam astrictionem.  
Sunt uero etiam, qui succum ex ea expressum, medicamen sen-  
uent mordacitatis expers, & exiccatorium, ad multas res ui-  
le. Haud enim inuenias quid ad plures res utilius medicamento  
citra mordacitatem exiccante, quod paulum etiam adstringat:  
sicut in opere de medicamentorum compositione exactius demo-  
stratur.

## Syluestris olea.



## Cap. CXXIII.

SYLVESTRIS olea, quam aliqui cotinon, id est, oleastrum appellant, alij Aethiopicam oli-  
uam, folia astringunt: trita autem & imposita ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, epinyctidas, car-  
bunculos, reduuias, nomasque cohibent: crustas emarginant cum melle illita: quinetiam sordida  
ulcera repurgant: inflammationes, panosque cum melle imposita discutiunt: cutem à capite uulsi  
conglutinant: oris ulceribus, & priuatim infantium commanducata medentur. Succus, & deco-  
ctum eosdem habent effectus: sanguinis eruptiones, ac muliebri profluuium, admotus succus inhi-  
bet: uux oculorum, pustulisque prodest: ulcera, & ueteres defluxiones sistit: quapropter in colly-  
ria additur, ad palpebrarum erosiones perquam utilis. Exprimitur succus tuis folijs, affuso uino,  
aut aqua, siccatusque sole in pastillos digeritur: sed longè ualidior ad recondendum succus habetur,  
qui cum uino, quàm cum aqua expressus est. auribus subuenit, siue ulcerentur, siue pus effluat. Fo-  
lia conuenienter cœliacis cum farina hordeacea illinuntur. Vruntur cum floribus folia, ut spodio ui-  
cem cinis præstet, in cruda olla, oblito ore luto, usque dum figlinum percoquatur: restinctaque ui-  
no, & rursus subacta, eodem modo uruntur: postremò ceruæ modo elota coguntur in pastillos.  
Huiusmodi cinerem in medicamentis oculorum, constat spodio non cedere, sed eisdem uiribus  
præditum esse putandum est. Foliorum satiuæ olea eadem uis intelligitur, sed aliquantò inferior:  
unde ocularibus medicamentis ob suam mitiorem uim conuenientior est. Sudor ligni uiuenti accen-  
so manans, illitu sanat lichenas, furfures, & scabiem. Oleaginum semen illitum medetur furfuri-  
bus, & ulceribus, quæ depascunt, uorantque: quod autem intra nucleum est, ex adipe, & farina sca-  
bros ungues excutit. Colymbades trita, & ambustis illita, pustulas gigni prohibent: sordida ulce-  
ra



OLEA SYLVESTRIS.

OLEA SATIVA.



ra purgant. Muræ succus collutas gingivas contrahit, & motus dentium firmat. Oliua flaua, & recens stomacho vtilior est, ventri difficilis: nigra autem, & matura corruptioni opportuna est, stomacho aduersatur, oculis non conuenit, capitis dolorem mouet: arefacta illitu depascentia vlcera fistit, & carbunculos emarginat. Oleum syluestris oliuæ gingiuis putri uligine laborantibus coluitur, & dentium mobilitates stabiliz: calfacti fots gingiuis fluxione laborantibus vtilis est: lanam enim specillo circumligatam oleo madefacere oportet, & gingiuis admouere, donec albæ spectentur.

### Lacryma æthiopica oleæ.

### Cap. CXIX.

LACRYMA, quam Aethiopica olea stillat, scammonio similis quadantenus est, fulua, stillis exilibus constans, mordax. Quæ autem ammoniaci, aut gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates oleæ, oleastrique similem lacrymam sudant, quæ comode ad oculorum hebetudines illinitur: cicatrices, albuginesque illitu emendat: urinam, & menses ciet: cauis dentium impressa ad dolores efficax est. Inter uenena scribitur, partus pellit: lepras, & impetigines sanat. Appellatur autem Aethiopica, & agrestis olea.

### Amurca.

### Cap. CXX.

AMURCA expressæ oliuæ recrementum est. Decocta in cupreo uase ad crassitudinem mellis, adstringit, ceteros præbens lycij effectus. Insuper dentium dolori, & vulneribus cum aceto, vino, aut mulso commode illinitur: additur in medicamenta ocularia, & meatus inductu suo obstruentia. Vetustate meliorem fieri constat. Vtiliter infunditur sedis, genitalium, ac vuluæ exulcerationi. Si uerò cum omphacino recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit: iumentorum scabiem cum decocto lupini, & chamæleonte illitu sanat. Cruda, & recenti amurca podagras, articulariosque dolores foueri, vtilissimum: peruncta in uillosa pelle, & hydropicis imposita, tumoris molem reprimat.



Oleæ syluestris confideratio.

Oliuarum genera plura.

Oleæ, & quercus odium.

Aethiopicæ oleæ lacryma.

Gummi elemi.

Amurca olei.

Oliæ vires ex Galeno.

Nomina.

C v m *oliua, oleum, olea Aethiopica lacryma, & amurca ex uua tantum arbore proueniant; non ab re duximus de his omnibus simul pertractare, & ita singulis partibus unica commentatione, quantum opus erit, satisfacere, & quicquid ad eas spectat, simul perstringere. Nascuntur syluestres olea copiose in agro nostro Senensi, alijsq; Hettruriae locis: nascuntur & in Dalmatie tractu, & in quam plurimis Adriatici insulis. uerum domesticis longe maiores, folijs breuioribus, aculeatisq; ramis. Earum bacca etsi numerosa fecunditate uincant; magnitudine tamen tenuius cedunt: quin & ori sapidiores existunt. Cuius rei certo sunt testimonio turdi, merulae, ac sturni: quippe quoniam syluestres cliuas libentius deuorant, quam satiuas. Incolae, qui aucupijs delectantur, agrestes oleas summo studio ac industria ab auibus tuentur, nempe quod confecta satiuarum uindemia, amiculæ ad has aduolant, ubi mense decembri, & ianuario uisco innumera capiuntur, praesertimq; turdi. Pauci admodum sunt in Hettruria, qui oleastri baccas legant, ut oleum inde exprimant: nam ea demum magna satiuarum copia est, quæ facit, ut inibi omnino paruipenduntur syluestres. Oliuarum genera decem in antiquorum notitiam peruenisse reperio, paucissimas uidelicet, algianas, licinianas, sergias, neuias, culminias, orchites, regias, circites, murteas: etsi Virgilius trium generum tantum meminerit, quemadmodum etiam plura non nouit hac nostra ætate Hettruria, praesertimq; noster Senensis ager. Primum harum generis eas nostri faciunt, quæ licet à minoribus olearum plantis proferantur; sunt tamen spectata forma, & magnitudine Bononiensibus non quidem inferiores. His tantum muria asseruatis utuntur in cibis: quandoquidem oleo minus aptæ sunt, quod multo plus amurcæ, quam olei fundat. Proximæ tamen colore, tum magnitudine præstites, quibus prædictis longè minores sint; sunt tamen omnium aptissimæ ad olei conficiendi usum. quippe quod oleum ex eis expressum, sit non modò flauum, dulce, pellucidum, ac cæteris præstans; sed etiam copiosum. Gignuntur hæc à præceteris oleis, prægrandibus, iuglandium nucum instar, ramos in altum, latumq; amplissimè fundentibus. eas rursus nostra Oliuastre uulgò uocant. Tertij uerò, ac postremi generis ea deniq; sunt, quæ passim in uniuersa Italia nascuntur, & omnium uulgarissimæ habentur. Laudatissimæ olea Bononiensibus, & nostratibus crassiores muria seruata Romam, Venetias, & ad alias complures Italiae clarissimas urbes, ubi magnificæ, opiparæq; parantur mensæ, ex Hispania importantur. Cæterum olea, & quercus tam pertinaci odio inter se disident (si rei agrariae scriptoribus fides est adhibenda) ut altera prope alteram depacta breui tempore pereat. Olea item si primo germinant à capra depascantur, adeò sterilescent, ut nullo remedio in posterum prolificæ fiant. At si alia de causa raras adueniunt, uel nullas proferant baccas, nudatas earum radices à circumstante terra hybernis algoribus opponere, certissimum est remedium. Syluestris, seu Aethiopicæ oleæ lacryma, licet multis polleat uiribus; eius tamè in Italicis finibus nullus est usus: neq; quod ea ad nos afferatur, adhuc compertum habeo. Sunt, qui hanc putent illud esse gummi, quod medici recitiores, & officinae gummi elemi appellant. Verum illud certo argumento est, olea Aethiopicæ lacrymam gummi elemi non esse, quod gustatu mordax non sit, neq; linguam uellicet: tum etiam, quod omne gummi perspicuum sit, eam lacrymam (etsi improprie gummi appelletur) non in gummi quidem; sed uerius in resino genere esse recipiendam: cum igni exposita statim colliquefeat, & diffundatur, quemadmodum & resina, quæ è pinu, picea, & alijs resinam fundentibus plantis colliguntur: licet nobis prorsus ignota sit planta, à qua in oriente defluit. Siquidem nullum gummi genus, (quod ego sciam) igne colliquefeit, nisi addito aceto, uel uino: quin potius statim comburitur. Est & alia olea maris rubri lacryma, ex qua (ut Theophrastus inquit lib. III. cap. VII.) medici sistendo sanguini medicamentum componunt. Cæterum quauis ætate nostra obscura admodum sit gummi Elemi origo; eius tamen uires clarissimæ apud chirurgicos, & uulnerarios medicos reperiuntur: nam in caluariae fracturis, ac uulneribus mirifice unguentis, & emplastris additur, adeò ut præstantissimum sit in his sanandis medicamentum. De Amurca olei postremo nil aliud dicendum est, nisi quod sit admodum utilis (ut memorie prodidit Cæto) apothecarum, & officinarum fabricis, ubi lanei, uel sericei panni reconduntur. Nam si calci admisceatur, & ex ea inde parietes incrustentur, obliuanturq; item laquearia, & pauimenta non modò parietes contractos, uel aduenientios humores nunquam collacrymant, & situm minimè contrahunt; sed nec blatte, nec aranei, nec cuiusvis generis uermiculi ibidem gigni possunt. Oliæ vires prodidit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Oliæ rami quantum habent adstrictionis, tantæ & frigiditatis participes sunt. Fructus uerò, si quidem ad unguem maturuit, moderatè calidus est: sin immaturus est, magis tum adstringit, tum refrigerat. Olea scilicet Latinè, ut ἐλαία ἡμερος Græcè uocatur: Arabicè, Zaiton, seu Caiton: Italicè, Oliuo domestico: Germanicè, Oelbaum; Hispanicè, Olino, & Azeytuno: Gallicè, Oliuer. Syluestris autem Græcis Ἀγριαία, ἡ νοστήνη appellatur: Latinis, Oleaster, & Olea syluestris: Italis, Oliuo saluatico: Germanis, Vuilder oelbaum: Hispanicè, Azebuche: Gallis, Oliuier sauuage.*

Quercus, glans, fagus, ilex.

Cap. CXXI.

QUERCUS omnis adstrictoriam uim habet, praesertim liber, qui cortici, & ligno intercedit: quinetiam tunica putamini glandis subiecta. Decoctum ex ijs datur dysentericis, coeliacis, sanguinem excreantibus. Trita in pello foeminis fluxione vulgè laborantibus subijcitur. Glan- des eisdem effectus exhibent: urinam ciunt: capitis dolorem, & flatus in cibum sumptæ pariant, resistunt esitæ uenenatorum ictibus. Decoctum earum, & corticis cum lacte uaccino potum, prodest contra toxica. Intritæ crudæ inflammationes illitu leniunt: ad duritias, quas cacothecæ uocant, & malefica ulcera cum salsa axungia conueniunt. Ilignæ glandes uiribus quernas antecellunt. Fagus, & Ilex quercus generi assignantur, & consimile munus obeunt. Ilignæ radices cortex cum aqua



## QUERCVS.



## FAGVS.



## ILEX.



aqua coctus, dum mollitus intabescat, & tota nocte illitus, denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos. Folia omnium tusa, & trita tumoribus prosunt, & imbecillas membrorum partes corroborant.

SVNT & alia glandiferi generis arbores, præter Quercum, Ilicem, & Fagum: inter quas numerantur Cerrus, Suber, Aesculus, & alie nonnullæ, quæ suo more rura nostra appellant, quarum omnium exacte rationem reddere potest uniuersa Hetruria. Quippe quod & in maritimis nostris Senensibus, & Faliscorum agro, ac etiam Romano tractu, omnia hæc glandiferarum genera adeo numerosa in uastissimis syluis proueniant, ut glandibus innumerabiles porcorum greges incolæ ibi quotannis saginent. Verum ne aliquis existimet, harum non meminisse Dioscoridem, quod fortasse eas non cognouerit, sciendum est, eum, meo quidem indicio, deus nomine comprehendisse in uniuersum omnes glandiferas arbores, non solum quod sciret, una uoce omnia illa genera contineri posse, sed etiam ut breuitati consuleret: deus enim apud Græcos non modo quercum particulatim significat; sed uniuersam quancunque glandiferam arborem. Quo fit, ut dixerit ipse: Δένδρον τῶν ἀντικλινῶν ἔχει δένδρον, id est, Quercus omnis adstrictoriam uim habet, ac si dixisset, arbor omnis glandifera adstringit. Porro mirum est (ut Theophrastus est auctor lib. III. cap. VIII. & IX. de plant. historia) quod alia plurima præter fructum ferat quercus. Nam gallam gignit paruulam, atque alteram resinofam, & nigram: quin & aliud specie ueluti morum, sed durum, & fractu admodum difficile: id tamen rarum. Ad hæc aliud effigie colis representans. Cum uero perficitur, durum quid parte emicante, & perforatum, & tauri caput quodammodo emulans

Glandiferarum arborum consideratio.

Quercus quæ proferat.

m a profert.




profert, quod praeputum nuclei oleae speciem intus ostendit. Fert et quod quidam pilum appellant. Id pilula est mam gerens lanaceam, mollem, nucleo durior, qua in lucernarum luminibus utuntur. Flagrat etenim probe, ut g. nigra. Fert et alteram comigeram pilulam, ceterum quidem inutilem, ueruo autem tempore succo melligeno infusum tum tactu, tum gustatu. Inq; ramorum alis pilulam aliam gignit sine pediculo, concavoq; sessilem; peculiariterq; uersicoloremq;. Nam eminentes quosdam umbilicos candicantes, uel passim uariantes nigris maculis habent partem mediam grani tinctura infectam, splendendamq; ostendit, aperta, nigra, et putricans cernitur. Lapillam quoque puniceum magna ex parte gignit, quanquam raro. Item aliam eo rariorem pilulam e folijs conuolutam, capillatam, atque oblongam. Super folijs uero tergo adhaerentem pilulam fert candidam, aquosam, dum tenera est, etiam interdum muscas intus continet, ueniensq; ad incrementum iustum in modum laevis paruula gallae indurget. Fungos omitto, qui e radicibus, et iuxta radices erumpunt: communes enim eos cum ceteris habet arboribus. etiam uiscum tacco, quippe cum in alijs quoq; proveniat. Sed nihilominus (ut dictum est) ferax haec arbor habet plurimarum. haecenus Theophrastus. Ceterum non dubitandum est, quin omnes ij partus suos habeant usus, ut polleant uiribus. Stillatitia aqua, quae in balnei calentis aquae uitreo organo a tenellis quercus folijs primo ipsam exortu decerptis elicitur, iocumeris defluxiones sistit, renum calculos cominuit, et mulierum alba profluua colob. Ad haec eius echinatae pilula sicca, ac trita uin apprimere adstrictoriam possident: eaq; propter efficacissimo sunt medio contra omnes alui fluxiones. In summa praestant, ubi suppressere sit opus. Fagus quoq; glandiferis arboribus adnumeratur, tametsi fructus effigies glandibus prorsus reclinet. Hic enim extrema parte calyculo includitur, tundo, quod antenus echinato, hispido, ac scabro: interius uero triangulari forma nuclei sunt, qui tenui, et leui castaneorum modo, in atrum rubescence obteguntur. Horum sapor dulcis, et subadstringens. Glires hoc pabulo maxime delectantur, ac pinguescunt. Quamobrem cum eius aduenit maturitas, innumeri capiuntur glires in Carniolae, et Carinthiae syluis: quippe ijs in locis incolas mane inspexeris, qui saccos gliribus plenos ferant una tantum esse captis. Delectantur fagi fructu etiam mures: siquidem e longinquis regionibus natura ducti gregatim syluam grediuntur. Item et sciurus gratissimus est cibus, ac etiam turdis, merulis, alijsq; compluribus uolatilibus. Quos obfessos hostibus homines in oppido Chio ea tantum glande uictitasse, Cornelius Alexander est auctor, donec se uinditione liberaissent. Fagi folia esitata labiorum, gingiuarumq; uitijs mirifice opiulantur: tusa, illitaq; torpentia morbra corroborant. Glandis fagineae cuius renum calculis utiliter illinitur. Ilex insuper arbor est in Italia notissima spectataq; proceritatis, cortice in rufum nigricante. Materies eius densa admodum est, ac robusta, in atrum rubescens. Folijs laurinis, ac perpetuis uiret: sed quae externae candicent, scabraeque sint; internae uero uirescant, leues cernantur: quin et in toto ambitu adeo serrata sunt, ut spinarum speciem praeseferant. Glandes profert querni nomen, quae et in reliquis minus praestant. Iligneus carbo Hetruscis in pretio est, non modo quod ignem diu sine carbonibus etiam quod (ut aiunt) uapore caput minime tentet. Haec profert

## SVBER.

Smilacis consideratio.

Cornarij lapsus.

Suberis consideratio.



glandes, pilulas quasdam rubentes gignit, quae trita cum aceto uolatilibus recetibus, et cruentis oculis utiliter imponuntur. Ilici genere (ut memoriae prodidit Theophr. lib. III. cap. XVII. de plant. historia) est arbor illa, quam Arcades Smilacem uocant, ilici similis (ea autem non est taxus, quae etiam smilax dicitur, ut niam de taxo capite X. eiusdem libri differuit Theophrastus) tamen non aculeata, sed molliori, profundiori, differentiori, quibus distinguendum: nec materies, ut illa, solida, spissa; sed folijs mollis, in opere. Meminit huius Gal. lib. VI. ca. III. de compositione secundum locos in columellae remedijs, sic inquit. Huius sunt myrti, ac baccarum eius decoctum, et ex acerbis cotoneis mullis, et uirgultorum tenerorum ilicis, arbuti, smilacis, ac fagi. Super quo loco dubitat Cornarius, quomodo fieri potest, quod smilacis xum, uel eius specie intelligit quae ab omnibus uenenosa deservitur, ponatur a Gal. inter gurgulionis remedia. In dubij uerelutione nil aliud determinat, nisi quod, cum non ubique (sic ipse statat) taxus sit uenenofo, ex eo genere sumi debeat, quae letali creat noxa. Sed si Cornarius Theophr. sibi aliquin familiare exsuluisset, qui smilacem quandam (ut paulo ante ostendimus) in arbore ilici similem refert, rectius, meo quidem iudicio, et paucioribus re hanc explicasset. SVBER denique arbor est fructus, et folijs cis, perpetua similiter coma uirens, quanquam id negat Theophrastus, sed crassissimo cortice uestitur, atq; ilici magnitudine cedat, ut ij quidem attestari possunt, qui Baccano Romae profecti sunt: enim in itinere innumerae Suberum plantae uisuntur. Haec cortice exuta minime arefcit, quod admodum reliquae arbores: quandoquidem natura haud ignara, quod sepius cortice expolianda esset, materiei duplici cortice munivit. Inter plures, ac uarios corticis suberei usus, qui in rebus domesticis celebrantur, ille praecipuus est, et uulgaris, quod sutoribus maxime sit expetita ad crepidas componi-



ciendas. Quin & globis ex ea factis utuntur piscatores, quod ea nunquam aquis mergatur, sed supernatet sicut in edis  
retibus, plumbeis glandibus in altum ductis. Ideoq; Plinius lib. XVI. cap. VIII. scriptum sic reliquit. Suberi minima  
arbor, glans pessima, raraq; : cortex tantum præcrassus, ac renascens, atq; etiam in denos pedes undiq; explanatus.  
Vnus eius anchoralibus maxime nauium, piscantiumq; tragulis, & cadorum obturamentis : præterea in hiberno scemi-  
narum calceatu. quoniam obrem non infacet Græci mulieres cortices arborum appellant. Sunt qui Suberem sceminam  
ilicem noceat, atq; ubi non nascitur ilex, pro ea subere utuntur, in carpentarijs præcipue fabricis, ut circa Elin, &  
Lacedæmonem. Nec in Italia tota nascitur, nec in Gallia omnino. Et eodē libro, cap. XL. inquit. Eius materies tar-  
disime uetustatem sentit, sicut robur, larix, castanea, iuglans. hæc Plinius. Est & alia arbor glandifera, quam,  
quod folia ferat suberis, corticem uero, & ligni materiem cerro non ab similem, Hetruria uulgo appellat Cerrosu-  
guaro, quasi Cerrisubere dicas. Id quod etiam fecisse uidetur antiquitas : quandoquidem Theophrasto loco supe-  
rius citato ea Phellodrys dicitur. Suberis cortex tritus ex aqua calida potus sanguinem fluentem ex utralibet par-  
te sistit. Eiusdem cinis ex uino calido sanguinem excreantibus magnopere laudatur. Galeno tam quercus, quam  
quarundam aliarum glandiferarum arborum medicinae commemorantur libro VI. simplicium medicamentorum, his  
uerbis. Quercus partes omnes adstringentis qualitatibus participes sunt. Sed plus tamen habet, quæ in trunci corti-  
ce membrana subest, tum quæ sub glandis ipsius calyculo, ea uidelicet, quæ fructus carnem conuulsiuit. Quamobrem  
ad profluuium muliebrem, & sanguinis exspuitiones, tum dysenterias, & diuturnos uentris fluxus commodam esse  
credunt. Maxime uero ea utuntur decocta. Valerius tamen adstringunt, fagus, & ilex, seu quis eas species esse  
roboris uelit, seu toto genere diuersas. Quin & folia harum plantarum tenella illita non instrenue desiccare ualent,  
minus autem quæ sunt alterius roboris, nimirum quanto minus sortita sunt adstrictionis. Siquidem ego quandoque  
glutinasse me uulnus memini falce inflictum, cum uellum adesset ad manum medicamen præter ipsius quercus folia :  
trini ea in leui petra, & uulnus, omnemq; uicinum locum contexi. Eandem uim folijs habet & fructus roboris,  
eoq; medici nonnulli ad incipientes, & crescentes utuntur phlegmonas. nam quæ iam uehementes sunt, adstrin-  
gentia respuunt. Sed talia ad curandi potius rationem, quam præsentem tractatum attinent. Ceterum in præ-  
sentia nouisse, quod eatenus adstringentem, quatenus dictum est, facultatem quercus obtineat, sufficit : ac proin-  
de desiccandi, atq; adstringendi : excalfaciendi autem paulo infra media, in genere scilicet eorum, quæ (ut sic dicam)  
tepida sunt. Arbor, quæ apud Græcos, Quercus Latinis appellatur : Chulot, Hullet, aut Beluth, Arabibus : Nomina.  
Quercia, Italica : Eychbaum, Germanis : Robre, Hispanis : Chesne, Gallis. Quæ uero quercus Græcæ, Fagus La-  
tine dicitur : Arabicæ, Chinas, aut Chiachas : Italicæ, Faggio : Germanicæ, Buochbaum : Hispanicæ, Haia : Gallicæ,  
Faus. Quæ deniq; Græca uoce πῖρος, Latina Ilex nominatur : Arabica, Barbes, siue Carmas : Italica, Elice :  
Hispanica, Anzina, & Anzinheira.

Phellodrys.

Glandiferarum  
arborum ui-  
res ex Gal.

## Castaneæ.

## Cap. CXXII.

SARDIANAE glandes, quas aliqui Castaneas, aut  
lopima, aut glandes Iouis appellant, adstringunt & ip-  
sæ, similesque effectus præbent : præsertim tunica, quæ  
carnem, & corticē media intercursat. Caro his, qui eph-  
merum biberunt, conueniens est.

CASTANEAE nucs sunt in tota Italia uulgo notissima :  
item & earum arbores haud quaquam incognita. Antiqui casta-  
nearum complura fecerunt genera, nominibus plerumque inditis  
à locis, unde importabantur. Sed duo tantum in Hetruria habentur  
genera, satiuum scilicet, & sylvestre. Mitiores facile pur-  
gantur, harumq; illæ principem locum tenent, quas uulgo Mar-  
roni appellat : quippe quod ceteris sint maiores, sapidiores, spe-  
ciosioresq;. In montanis, ubi quotannis aliarum frugum annona  
deficit, incolæ castaneis per hyemem uisitant. Namq; eas in cra-  
tibus fumo prius exiccatas ab utroque cortice repurgant, moluntq;  
in farinam, ac deinde cogunt in panem. Materies arboris ædifi-  
ciji, atque alijs domesticis utensilibus admodum apta est : siquidem  
non modo ex ea fiunt trabes, tigna, asseres, & pedamenta ; sed  
& cadorum costæ, & eorum cinctus : uerum ignarijs inepta.  
Montibus, & opacis gaudet magis, quam campestribus, & a-  
prieis. Castaneæ uehementer sistunt tumalui, tum uentriculi  
fluxiones, idq; maxime sicca : quin & sanguinem excreantibus  
prosumt. Trita cum sale, melleq; subacta raborum canium  
morsibus utiliter imponuntur : & cum hordeacea polenta, & æ-  
ceto illita mammarum duritias discutit. Venerem excitant,  
eo quod flatum gignant. Largius in cibis sumptæ capiti dolorem  
inferunt, inflant, aluum adstringunt, ac ægrè concoquuntur.  
Attamen quæ cineribus obruta torreniunt, uulnerato prius in la-

Castanearum  
consideratio.Castanearum  
uires.



Castanearum  
uires ex Gal.

tere cortice, crudis, & elixis innocentiores redduntur, praesertim si cum pipere, & sale, uel saccharo edantur. De castaneis differens Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus, sic inquit. Castaneae omnium glaudium sunt praestantissime. Sunt qui hos fructus *καπύριος* appellant: hi nanq; & soli inter fructus agrestes alimentum memorabile corpori praebent. haecenus Galenus. Illud porro in his uerbis animaduertendum, quod Castaneae quauis eas Galenus plurimum nutrire prodiderit; non tamen in cibis commendantur, si comedantur frequenter. Nanque, ut idem auctor est libro de tenui uictus ratione, sint illae in aqua coctae, sint tostae, sint etiam frictae, per esitantes noxam inferunt, multoq; magis, si crude edantur. Quod etiam libro de cibis boni, & mali succorum moriae mandauit. Castaneae ita Latinis uocatae, Graecis *κασάνα*, *σαρδάνοι βάλανοι*, ἢ *δῖος βάλανοι*, ἢ *ἀσπίς* dicuntur: Arabibus, Sadianalach, Castal, & Stebulot: Italis, Castagne: Germanis, Kesten: Hispanis, Marroños Gallis, Castaignes.

Nomina.

## Galla.

## Cap. CXXIII.



Gallarum co-  
sideratio.

Cornarij opi-  
no reprobata.

GALLA fructus est quercus. Aliqua omphacitis appellatur, parua quidem, sed articulorum manus modo rugosa, solida, nullo foramine peruia. Altera planuleius, perforata. Eligi debet omphacitis, quae efficacior est. Vtriusque uis uehementer adstringere. tritae ex crescentia in carne, fluxiones gingiuarum & uul- oris ulcerationem cohibent. Nucleus dentium car- nis inditus, dolorem sedat. Crematae carbonibus dom- igne flagrant, & uino, aut aceto, aut acida muria ex- ctae, sanguinem supprimunt. Decoctum quibus infidet- expedit, efficax est, & contra vulvas procidentes, fluxio- nesque. Capillos denigrant, aceto, aut aqua maceratae- dysentericis, coeliacisque cum uino, aut aqua tritae con- uenienter illinuntur, aut bibuntur: obsonijs addi debet, aut integre in aqua praecoqui, in qua nonnihil excoquen- dum est, quod his affectibus conferat. In summa his uten- dum ad adstringenda, aut sistenda, aut siccanda, quae & opus sunt.

GALLAE uulgo notissime sunt, easq; ferunt arbores- nnes (ut Plinius auctor est) quae & glandem. Nascuntur sole de geminis exeunte: & si aestu nimio excipiuntur, arescunt prom- us, nec amplius adolescunt. Quercus in Italia praeter glan- des duo Gallarum genera ferunt. Minores quae rugosa cute p- ctantur, fullonibus, & coriarijs expetite, quae Graecis omphaci- tides dicuntur. Maiores uero, quae lauiore habentur. Ce- terum neque in hoc Cornario adstipulandum esse iudico, quod suis in Galenorum commentarijs tam primo, quam sexto libro de compositione medicamentorum secundum locos, acriter com- tendat, nil aliud omphacitidem gallam esse Dioscoridi, & Ga- leno; quam calycem illum, quo glandes in arboribus continen- tur. Hoc tantum argumento ductus, quod Paulus capite de dysenteria in quodam clysteri scribat, *ομφακίς* καυμένης. ἐστὶ δὲ τὸ καὶλον, ἐξ ἧς ἐκπέφυκεν ἡ τῆς δρυὸς βάλανος, ἡ περὶ οἱ βυρσῆς χεῖνται. id est: omphacidis uste- est autem cauum illud, ex quo glans quercina enascitur, quo coriarij utuntur. Vbi ipse non omphacidos, sed omphacitidos putat legendum, uulgatam lectionem immutans. Ex qua postea non aliud omphacitidem gallam (ut diximus) esse existimat, quam cauum illud, in quo glandes inseriuntur, quod recentiores cupulam uocant. statuitq; nunquam a sua opinione recedere, nisi quis plane corruptum apud Paulum locum docuerit, aut *ομφακίς* ab eo substantiue pro eo, quod calycem Plinius dixit, & uulgo cupula glandis uocatur, dictum ostendat. Sed equidem non possum non admirari, quod is, quem alioquin suorum scriptorum testimonio, acutissimi ingenij, sanissimiq; iudicij uirum semper existimaui, in re tam, meo iudicio, clara, tam facile aberrauerit. Nam si Paulus non putasset, quod *ομφακίς* Graecum uocabulum ob sui raritatem permultis fuisset obscurum, quemadmodum & Cornario fuisse uidetur, ei certe non fuisset opus per circumlocutionem illud declarare, ut fecit, cum inquit. Est autem *ομφακίς* cauum illud, ex quo glans quercina enascitur, quo coriarij utuntur. Quod praeterea Paulus pro omphacitide galla glandium calycem non acceperit, illud manifesto argumento esse potest, quod ipse libro septimo de gallis, non autem de glandibus differat, duoq; gallarum genera constituat, quarum alteram omphacitidem ap- pellat; alteram uero magnam, flauo colore, uiribusq; inferiorem esse scribit. Quod etiam antea Dioscorides, & Galenus fecere. qui omphacitidem gallam glandium calycem esse nusquam, quod sciam, tradidere: quod non ignorau- uerint (ut Cornarius ignorasse uidetur) & genere, & specie a gallis differre glandes. Adde, quod Galenus, Diosco- rides



rides, & Paulus nusquam, quod equidem legerim, usi sunt hoc uocabulo *εμπαξίτις* pro galla, nisi adiectiue, & cum suo substantiuo *κνίς*. Quare concludendo putauerim, in Paulo legendum esse, *εμπαξίτος*, non *εμπαξίτιδος*, ut contendit Cornarius: quin etiam crediderim Græcis glandium calycem *εμπαξίδα* proprie appellari. Tametsi Cornarius, & Andernacus, qui in Paulo uocem illam acerbam uiani interpretatur, Græcæ linguæ peritissimi, hæc non cognouisse, neq; animaduertisse deprehendantur. Illud peculiare sibi maiores gallæ uendicare, ut quotannis aut annonæ fertilitatem, aut sterilitatem, aut pestilentem auram prænuuncient: nam si rumpantur integræ, & quæ perforatæ non sunt, aut muscam, aut araneum, aut uermiculum exponunt. Si musca uolat, futuri belli; si repit uermiculus, annonæ penuriæ; si currit araneus, pestilentium morborum præsagium est. Neque cuiquam mirum uideatur, quod ex omnibus gallis ista exoriantur animalcula: etenim ego huius rei sepius periculum feci, nullamq; unquam sum consecutus, prius non perforatam, quæ ex tribus animalibus unum intra se non contineret: nam foramine conspecto facile indicium summi potest, iam animal exiisse. Dicamus igitur licet, quercum & fructum, & animal gignere. Cuius rei haud ignari ueteres illi patres, non sine causa quercum dixerunt Ioui summo esse dicatam. Gallarum uires me morie prodidit Galenus lib. v. 11. simpl. medicamentorum, sic inquiring. Galla, quæ omphacitis nuncupatur, admodum acerbum est medicamen, pleraq; sui parte essentiae terrena, & frigida: per quam desiccatur, & repercutit fluxiones: ad hæc constringit, contrahitq; partes laxas, ac languidas: omnibusq; fluxionum affectibus strenue resistit. Est uero tertij in desiccando, secundi autem in refrigerando ordinis. Altera autem galla, flaua illa, & magna, laxaq; ipsa desiccatur quidem, sed tanto minus, quanto minus acerbæ qualitatibus est particeps. Cocta itaq; ipsa per se, ac deinde trita, cataplasma est non instrenuum sedis phlegmatarum, ac procidentiarum. Porro coquenda est, si modica opus sit adstrictione, in aqua: sin uehementiore, in uino. Ac si augere insuper adstrictionem sit opus, uino utare austeriore. Hanc rustici nostrates *εμπαξίδα*, quasi uini gallam dicas, nominant. Deniq; gallæ combustæ sanguinis reprimendi facultatem acquirunt, ac nimirum etiam calorem, & acrimoniam ex uestione assumunt: suntq; ijs, quæ ignem expertæ non fuerint, tum subtiliorum partium, tum maiore desiccandi potestate. Caterum cum ad sanguinis suppressionem præparare eas uoles, carbonibus impositas, dum undequaq; candeant, aceto, aut uino extinguere oportebit. Quercus fructus *κνίς* Græcè dicitur: Galla, Latine, pariter & Italicè: *Hafs*, aut *Hafus*, Arabicè: *Galla*, Nomin. *Loepffel*, & *Eycho epffel*, Germanicè: *Galha*, & *Bugalba*, Hispanicè: *Noix de galle*, Gallicè. Hoc loco Græci codices habent *κνίς* uocabulum. Quæ uoce constat, iudicio meo, Dioscoridem gallæ omphacitidis figuram designasse, cum prius magnitudinem expressisset. Attamen ex interpretibus Marcellus manifestè eam etiam ad magnitudinem retulit. Ruellius autem, cum eam tuberosam interpretetur, ipse quoq; magnitudinem innuisse uideatur. Quocirca nobis satius uisum est, omphacitim rugosæ parti articulorum in digitis, cum extenduntur, similem reddere: quod non solum id innuat Græcum uocabulum; sed multo etiam magis omphacitides ipse apertissime demostrent.

P H V S.

## Rhus. Cap. CXXIII.

R H V S, quæ obsonijs aspergitur, ab aliquibus erythros appellata, semen est coriarij fruticis, sic uocati, quoniam coriorum insectores eo utuntur ad inspissandas pelles. Arbuscula est in petris nascentis binum ferè cubitorum altitudine: folijs oblongis, subrubentibus in ambitu serratis, ilicis modo: acino uuarum gracilium, denso, magnitudine terebinthi, quadantenus lato: cuius corticosa tunica perquam utilis est. Folia uim habent adstringendi, & acaciæ effectus præbent. Decoctum capillos denigrat: dysentericis infunditur, & in potus eorum, infususque adiecitur: instillatur auribus purulentis, gangrænas, & pterygia cohibent folia ex aceto, aut melle illita. Liquamentum fit ex aridis folijs, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad eadem, ut lycium, conueniens. Semen eosdem effectus exhibet: coeliacorum, dysentericorumque obsonijs inspergitur: fracta, desquamata, liuidaque illitum ex aqua, ab inflammatione vindicat: linguæ asperitates cum melle abstergit: candida foeminarum profluvia sistit: hæmorrhoidas sanat, cum querno carbone intrito admotum. Aqua, in qua semen maduit, decocta cogitur, coitque, efficacior quodammodo ipso semine. Gummi defert, quod dentium cauis imprimitur, ad dolores finiendos.

R H V S Græcorum, cui (ut scribit Plinius libro XXIII. cap. XI.) Latinis non est inditum nomen, Sumach officinis uulgo uocatur, uocabulo nimirum à Mauritanis accepto, ut in alijs

Rhois consideratio.


m 4 quam





quàm plurimis ab illis fieri solet. Hac in condimentis pro sale utebantur antiqui : idcirco Dioscoridi in ipsius capitulis fronte, Rhus dicitur, quæ obsonijs aspergitur. Cuius usus, ut audio, & apud Syros, & apud Aegyptios in hunc usque diem perdurat, ubi rhus provenit præstantior. Nascitur & in Italia Apennino monte pluribus in locis, ijs omnibus planè notis, quæ illi à Dioscoride tribuuntur. Huius aridis folijs hircorum, caprarumque pelles illæ spissantur, crispantur, concinnanturque, quas vulgò Somachi nuncupant. Cæterum illud non videtur præterundum, quòd est Galeenus tum alibi, tum præcipuè lib. VI. de compositione medicamentorum secundum locos, plura Rhois nomina, & genera explicasse videatur, ut qui id modò Syriacum appellet, modò Ponticum, modò obsoniorum, modò coriariarum, modò rubrum; non tamen propterea censendum est, Rhois arbores inter se genere, uel specie differre. Quandoquidem nobis constat, unum tantum genus Dioscoridi hoc loco descriptum esse, quemadmodum & Galeno libro VIII. simpl. med. Atqui hac in re scire convenit, quòd Rhus obsoniorum nil aliud est, quàm semen : coriariarum uerò nil aliud, quàm folia, & fruticis ramusculi. Nostræ enim sententiæ subscribit Dioscorides, qui scriptum reliquit. Rhus semen est exiguae plantæ, quæ coriarij ad inspissandas pelles utuntur. Quod etiam Galenus confirmat loco citato. Rhus uerò rubens nil aliud esse comperitur, quàm eius semen immaturum, cui maior adstringendi uis inest, quàm maturo, cuius acini quadantenus nigricant. Syriaca præterea, atque Pontica rhus, etsi in alijs nascatur regionibus, à quibus nomen inuenit; nihil tamen genere distat ab Italica, atque Iberica, nisi illa magis, hæc uerò minus uiribus præstet. Idcirco Monachos illos, qui in Mesuem commentarios edidere, longè hallucinari crediderim : nempe qui sibi persuaserint, Rhoem Ponticam alterius esse generis ab ea, cuius extitit usus apud antiquos in obsonijs. Quæ in re & Plinius deceptus esse uidetur, cum de coriario particulariter scripserit, ipsumque diuiserit ab eo, quo in ciborum condimentis antea quitus utebatur. Fuchsius uerò medicus singularis eruditionis, non contentus duobus Rhois generibus Plinij imitatione, tertium adinuenit. Etenim is in libro de componendis medicamentis, quem secundo loco edidit, Rhoem Syriacum non solum differre scribit ab eo, qui tum culinis, tum coriarijs expetitur; sed peculiarem quidem Syriacæ arbusculæ succum esse censet, quòd Galenus lib. VI. de compositione medicamentorum secundum locos succum rhois Syriaci in quoddam medicamentum addat. Sed errat Fuchsius in hoc, mea quidem sententia. quandoquidem non uideo, quomodo ex mentione succirhois Syriaci à Galeno facta, colligi possit, rhoem Syriacum esse genus separatum. Nam ego potius adducor, ut credam, ita eum cognominatum fuisse à Galeno, quòd apud Syros cæli & soli illius temperie proveniat cæteris præstantior. Et quanuis Theophrasto lib. III. cap. XVIIII. Rhus duplex reddatur, duas scilicet, & fœmina, quòd alia sterilis, alia fructifera sit; non tamen ob hoc posteritatis memoriæ prodidit, quòd altera cibus, altera corijs nasceretur, sed ambas ad coria inficienda destinavit: quòd coriarij folia, & ramusculos tantum accipit, non autem semen. Rhoem, quæ in Cornelio Celso ros Syriacus depravatè legitur, Mannâ, quæ ex Syria nobis aduehitur, esse putauit Petrus Crinitus Florentinus capite septimo libri ultimi de honesta disciplina, falsus uocè similitudine, quòd ros, quæ dictio rhus Græcè legenda est in Celso, & ris rorem significare crediderit: etenim manna ros quidam est. Veruntamen eius sententiam acriter expulit Manardus Ferrariensis libro epistolarum suarum primo. Theodorus in Theophrasto, Rhois uocabulum fluidam interpretatur, quod nomen Græci etymum secutus sibi Latine finxit: quippe (ut Plinius est auditor) rhus Latinum nomen non habet. Id quod mihi errandi præbuit occasum, cum iamdudum pro certo existimauerim, fluidam Theophrasto eam arbusculam esse, quæ uulgo Lantana uocatur, & cuius radicibus uiscum quidam conficiunt. Verum cum accuratius Græci Theophrasti codicem perlegissem, Theodoriq; nouum uocabulum non sine bile examinarem, erroris mei causam facillè deprehendi. Quo factum est, ut iam fateri libeat, fluidam Theodori nil aliud Theophrasto designare, quàm Rhoem, & ob id Lantanam sic à uulgaribus uocatam, ut prius credideram, non esse. Quæ tamè (ut mea fert opinio) potius VIBURNUM imitatur, quòd maxime lenta, obsequiosa, flexuq; inuicta sit. Tale enim esse uiburnum Virgilius in Bucolicis cecinit hoc carmine.

## VIBURNUM.



Monachorum  
error.

Fuchsi opin.  
damnata.

Petri Criniti  
lapsus.

Viburnum.

Rhois uires  
ex Galeno.

Quantum lenta solent inter uiburna cupressi.  
Exit hæc ramulis digitali crassitudine, bicubitalibus, folijs ulmeis incanis, & pilosioribus, quæ paribus internodijs aduersis pediculis coniugatim adherent, per ambitum tenuissimè serrata. Florem edit album, umbellæ modo coherentem : à quo acini prodeunt lentum modo, pressi, qui primo statim exortu uirides, deinde rubri, denum uerò nigri spectantur: radice per summa cespitem uagante. Hanc Ruellius rhoem existimat, cum tamen alia Dioscoridi & Galeno rhus sit planta, Hetruscis notissima, quòd plurima oritur eo Apennini tractu, qui Hetruriam respicit. De Rhoè hæc quæ sequuntur, nobis scripta reliquit Galenus lib. VIII. simpl. cum medicamentorum, sic inquit. Rhus fruticosa planta adstringit, desiccatur. Nam & coriarij ad desiccandum, & adstringendum



gendum pelles planta utuntur: ac proinde *Supro de Ficus*, hoc est, excoiaria appellata est. Porro medicis in usu sunt in primis fructus eius, & succū multum austere qualitatis. Consentaneus est usus particularis ipsi gustus sensui. Fucus itaq; & hoc medicamen ex tertio ordine exiccantium, ex secundo uerò refrigerantium. Pōs ut Græcis, ita etiam Latinis *Rhus* nominatur: *Sumach*, *Adurion*. Rosbar salsiticos, seu *Rhosaidicos*, Arabibus: *Rhu*, & *Somacho*, Italis: *Sumach*, & *Sumagre*, Hispanis.

Nonina.

† In vulgatis Græcis codicibus hic legitur *πρωος δός*, hoc est, ilicis modo. Hæc dictio qua ratione ab interpretibus Ruellio, & Marcello omissa fuerit, certè nescio. Sed mihi quidem uisa est non omittenda, quòd non modò eam quoque Oribasius legat, sed quòd etiam *Rhus* folijs pulchrè *Ilicem* æmuletur.

## Palma.

## Cap. CXXV.



PALMA in Aegypto gignitur. Ea medio maturitatis uigore, autumnò decerpi solet, Arabici myrobalani similis, pomatis cognomine, colore viridi, & odore mali cotonci: quòd si ad maturitatem peruenire sinatur, phœnicobalanus fiet. Palma acerba est, & adstringens: contra alui, sceminarumque profluvia, in uino austero oibitur: hæmorrhoidas sistit: vulnera glutinat illitu. Phœnicobalani recentes plus siccis adstringunt: capitis dolorem afferunt: copiosiores in cibo inebriant. Sicciores sanguinem exercantibus, stomachicis, & dysentericis utiles in cibo: illinuntur cum cotoneo, & cerato cœnanthino uesticæ uitij. Caryotæ, præsertim esu, faucium asperitati medentur. Thebaicarum decoctum potu æstuationem sedat: vires recreat cum hydromelite ueteri sumptum: cibo idem faciunt. Fit ex eis vinum ad eadem conueniens. Decoctum per se potu, & gargarizatione magnopere adstringit; & cohibet. Nuclei palmarum, cœterorum more, cremati in crudo fœtilli, & uinò restincti, cinere loto, spodij uicem efficiunt, miscenturque in calliblephara. quòd si non iustam uisionem acceperint, denuo cremandi. Vim adstringendi habent, & spiracula cutis obductu suo claudunt: contra oculurum uiam, & pustulas, palpebrarum destituta, cum nardo effectum præbent: corporis excrescentia cum uino reprimunt: ulcera ad cicatricem perdunt. Sed inter primas utiles ex palmis humilibus Aegyptiæ.

## Palma Elate.

## Cap. CXXVI.

PALMA, quam aliqui elaten, aut spathan appellant, fructus palmarum adhuc florentium inuolucrum est, calyxque: quo in spissamenta unguentarij utuntur. Optima habetur odorata, adstringens, ponderosa, præclusa, intus pinguis. Vis ei adstrictoria: sistit ulcera, quæ depascunt: laxatos artus committit: trita miscetur cataplasmatibus, & malagmatis: prodest præcordijs, imbecilli stomacho, & iocineri affecto, mista conferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum subinde detersum, capillos denigrat: datur bibendum congruè renum, uesticæ, & uiscerum uitij: uulux, ac uentris fluxiones sistit: scabiem cum resina, & cera sanat, si uiginti diebus recens apponatur. Inuolutusque in elate fructus, quem suo amplexu fouet, elate etiam uocari solet, & ab aliquibus borassus. Adstringit, & spathæ effectus præstat, non sic unguentis expetitus. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta, eadem facit, quæ borassus.

TAMETSÌ in compluribus Italiæ ciuitatibus, nempe in hortis, uiridarijs, & monachorum claustris dictis, reperiuntur Palmæ insigni magnitudine, ac speciosa proceritate; cùm tamen climatis nostri temperies earum naturis inclementior sit, fructum nobis non proferunt, sed steriles consenscunt. In Hispania tamen maritimis quibusdam locis fructu edunt, uerum immitem, et qui nunquam maturescat. Quæ in Cræta proueniunt, fructum sane percoquant, sed magis admodum Cypriæ. Principem locum tenent, & palmulas omnium præstantissimas ferunt, quæ in Indea proueniunt, & inter hæc maxime (ut inquit Galenus) quæ in Hiericunte nascuntur. Venetias palmarum fructus, qui nonnullis palmule, aliquibus caryotæ, quibusdam uerò dactyli dicuntur, ex Syria, & Alexandria Aegypti aduehantur, ac etiam ex Neapoli illic prius ex Numidia importati. Ex recentibus ab arbore statim decerptis, quibus Italia caret, uinum fieri auctor est Plin. lib. xliii. cap. xvi. quo Parthi, & Indi utuntur, ac ceteri, qui orientalem plagam incolunt. Et ut idem refert lib. xliii. cap. llii. Palmæ scemine fructum non proferunt, nisi prope

Palmæ confirmatio.



marem conferantur : quo exciso, aut exiccato, uiduæ postea sterilescunt . Nec tamen ob id putandum, quod mares fructum non ferant . Quandoquidem scribit Theophrastus lib. II. cap. VIII. de historia plantarum, quod ex fructu feris ( plures enim sunt, quæ si uctum non ferunt ) tam mares, quam foeminae fructus edunt . Quorum plures sunt disferentia, quoniam alij sine osse, alij duro osse, alij molli proueniunt . Colore quoq; inter se discrepant : elij enim candidi, alij nigri, alij flauj : ad summum non pauciores, quam ficorum colores, neq; absolute pauciora genera statuunt . Ad hæc differre magnitudine, figurâq; uolunt : quosdam enim rotundos esse in modum malorum : magnitudineq; tantos, ut quatuor tantum in sicco teneantur, alios minutos cicerum magnitudine . Saporibus item plurimum differre inquit, sed optimum tam inter nigros, quam inter candidos, genus, quod regium uocant, cum magnitudine, tu uirtute, sed rarum id esse . Quædam non fructu modo, uerum & arbore ipsa, longitudine, formâq; reliqua distant : non enim magnæ, excelsæq; sed breues fecundiores, quam cæteræ, trimæ protinus fructificantes . Tales etiam in Cypro, in Syria quoq; Aegyptôq; palmæ proueniunt, quæ quadrimæ, aut ut plurimum quinquennes fructificant, hominis altitudine assurgentes . Genus aliud est in Cypro, quod & folium amplius habet, & fructum multo ampliorem, discerimineq; peculiari discretum, magnitudine mali punici, figura oblongum : nõ tamen sapidum, tanquam cæteræ ; sed radicibus similem, ut non deuoretur, sed succo tantum expresso expuatur . hæc de palmis historia ex Theophrasto .

Musæ plantæ  
historia, &  
uires.

Sunt præterea, qui palmarum generi adscribant plantam in Aegypto, Cyproq; nascentem, quam Veneti inde redeuntes MVSAM appellant, & Musas similiter fructus . Adolefcit hæc ( ut referunt ) ad quinum, senumue cubitorum proceritatem è stolonibus alterius sata : folio est arundineo, quod tamen perquam longo, latoq; ambitu se diffundit, adeo ut in longum trium cubitorum mensuram quandoq; excedat : in latum uero sesquicubitum spatietur, lata, crassa q; per medium excurrente costa . Torrescunt folia æstate sui natura, uel etiam fortasse solis ardore, adeo ut mense septembri eorum costæ prorsus nudæ cernantur, decedente foliorum materia, quod anodum sit tenuis . Caulis squaroso foliorum cortice uestitur, palmæ, uel arundinis modo . Ramos habet nullos, sed caudice tantum consistit . E uertice germen emergit materie molli, longitudine ferè cubitali, à quo alia ab origine, ad summum prodeunt germina ternum, quaternumue digitorum inuicem distantia : è quibus circummement fructus, parui cucumeris magnitudine, qui per maturitatem quadantenus flauescunt, cortice fici, qui eodem modo digitis detrahitur . Substantia pulpæ consistit melopeponum modo, nullo intus osse, neq; semine . Primum gustantibus fructus insipiditatem quandam præ se ferre uidentur, adeo ut primo statim gustu non placeant, uerum qui esui assuescunt, ijs indies magis delectantur : quippe quæ quadam occulta saporis suauitate allecti, quæ nisi tractu temporis cum palato init gratiam, nunquam saturi uideantur . Ita Musam mihi describere qui ex Aegypto, & Cypro ad nos reuertuntur . Sed quænam antiquis Musa fuerit plantæ, quid referam non habeo . Inclinat tamen animus eam esse, quæ Theophrasto in palmarum genere recensetur : quæ idem in Cypro nasci tradidit, folio cæteris ampliore, & fructu longè maiore, magnitudine mali punici, & figura oblongo . Musæ ex Arabibus Serapionem inuenio mentionem fecisse inter simplicia, ubi de eius uiribus in hunc sensum differuit . Musæ excalfacit in medio primi abscessus humectat autem in eius fine, paucum præbet alimentum . Priuatim prodest thoracis, pulmonis, ac uesticæ ardoribus . aluum emollit . Verum liberalior eius usus stomacho aduersatur, ac iecur obstruit . Quamobrem si quis, cum frigidi sit temperamenti, ea copiosius uestatur, subinde aquam mulsam, oxymel, aut gingiber conditum sumat necesse est . Fœtum in utero alit, renibus opitulatur, urinam ciet, & uenerem stimulat . hactenus Serapio . Palmas plurimas gignunt maritima nostra in uallis Almæ cæpestribus, sed puniolas, & quæ cubitalem mensuram nunquam excedant . Paulò his maiores & illæ habentur, quæ ex Sicilia Neapolim inuehuntur, quas uulgò, uocabulo ab Arabicis accepto, Cefaglioni appellant, de quibus supra in Bdellij commentario abunde diximus . Palmæ genus India profert ( ut Iosephi Indi navigationes perhibent ) è cuius truncis, excisis consultò ramis mense augusto, distillat liquor, quem incolæ uasis excipiunt, ebibuntq; suauiter uini uice : ueruntamen nisi excoquatur, post triduum in acetum acerrimum desciscit . Ea q; propter illum decoquunt, ut nos desitum, siq; hoc modo, uelut mel suauissimum, quod postmodum ex aqua resoluunt, & diebus uiginti artificio quodam percolant, donec optimè sit defecatum, atque pellucidum : quo artificio iucundissimus redditur potus, diuq; pereunat . Parro Palmulæ, quas Dioscorides Thebaicas uocat, quantum ex pluribus auctoribus comperi, adeo tractu temporis insolatæ siccescunt, ut molitæ cogantur in panem . Est & aliud ab his palmularum genus, quod officinæ Mauritanos secuta TAMARINDOS appellant, Græci uero à saporis acrimonia oxyphænica : siquidem Mauritani per Tamar dactylos significant : quare Tamarindorum uocabulo idem intelligunt, quod nostri palmulas Indicas . Indici igitur dactyli producuntur ( ut inquit Serapio ) à quibusdam plantis, quæ folijs longis, acuminatisq; salignis similibus uirent : licet à nonnullis existimentur Tamarindi fructus agrestium palmarum . Sed equidem malim adstipulari Serapioni, quam illis : præsertim cum non constet è ueteribus, qui de Tamarindis quicquam memoriæ prodiderit . Ex ijs, qui ad nos importantur, nulli, uel pauci admodum integri reperiuntur . Nam plerunq; contriti, & in massam quandam compacti deferuntur, quam si disceris, flauos nucleos inuenies, uarias formas referentes . Præstant, qui in obscuro rubescunt, molles, recentesq; & qui neruosis quibusdam uillis facti inueniuntur . Adulterantur ab impostoribus priuatis, sed deprehenditur fraus tum colore, tum etiam gustu : quippe nec admodum sunt acidi, nec tam saturato colore nigricant . Refrigerant, ac desiccant ( ut scribit Mesues ) ordine secundo, tametsi Auerroï tertio adscribantur . Aluum crient, quapropter poti bilem facile soluunt : item & præassatos humores leniunt, & insaniam, & furorem mulcent . Dantur obstructis, aqua intercute affectis, arquat, & lienosis utiliter . Faciunt & ad scabiem, lepras, uiriliginem, & lichenas : quin & contra omnes cutaneas exulcerationes, quæ à sanguine præassato emersere . Officiunt tamen frigidum uentericulum habentibus : sed noxa tollitur, admistis maci, mastiche, cassia, aut Indica nardo . Aegrè munus obeunt suum, sed roborantur, si admisto caprino sero, aut fumaria, aut lupi salictarij succo bibantur . In summa palmarum uaria, ac diuersa sunt genera . Quare curiosum remitteamus ad Theophrastum loco superius citato .

Tamarindorum  
conf.

Tamarindorum  
uires.



tato, & ad Plinium libro XII. cap. III. ubi de his latissime scripsit. Ceterum quid in palma illud sit, quod alii qui elaten, aliqui spathan uocant, manifeste declarat Dioscorides, cum inquit. Palus, quam aliqui elaten, aliqui spathan appellat, fructum palmarum adhuc florentium inuolucrum est. Cui adstipulatur Theophrastus loco iam citato, ubi ita scribit. Fructiferarum alie muscula, alie foemina. Interest autem, quod mas primum super spathan floret: foemina fructum oblongum illico praestat. Sed elate, siue spathae Galeno duo uidentur esse genera lib. VIII. simplicium medicamentorum, alterum quod tenerum sit palmae germen, alterum quod eius sit tegumentum. Primum uero genus fortasse illud erit, quod in interiore parte inuolucris gignitur, antequam flores prodeant. id, Dioscoridis testimonio, ab aliquibus Borassus appellatur: atque etiam Elate dici solet. Verum hac in re maxime caecutisse Plinium illud aperitiissime ostendit, quod ipse libro XII. cap. ultimo scriptum reliquit, sic inquit. Est praeterea arbor ad eadem unguenta pertimens, quam alij elaten uocant, quod nos abietem, alij palmam, alij spathan. Quibus palam est, Plinium Palmae adhuc florentis fructus inuolucrum cum abiete arbore confudisse, uocabulorum propinquitate deceptum: Graecis enim ἐλάτην Latinis abietem significat. Quinetiam eundem putasse elaten palmam arborem esse, cum tamen uel germen palmae tantum, uel florum sit inuolucrum. Nec minus inter recentiores hallucinari deprehenditur Adamus Lonicerus Germanus, qui spatham in palua nil aliud esse censet, quam folia, quod ensiformia uideatur.

Palma elate.

Plinij, &amp; Loniceri lapsus.

De Palmarum uiribus petraetans Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum ita scriptum reliquit. Phoenix arbor adstrictoriae facultatis omnibus sui partibus est particeps. Igitur ramorum succus austerus est, ex aqua substantia tepida, & terra frigida constans. Similis naturae est encephalos, quem uocant, hoc est cerebrum, siue medulla, eius aptus. At fructus eius, & maxime dulcis, non paucam obtinet caliditatem. Ceterum cum edendo sit, multo est usui, non tamen foris inpositus, ubi quid roborare, & desiccare, contrahere, stipare, densareque consilium est; sed & tanquam cibus sumptus & simul cum alijs, & per se. Porro quod elaten uocant, nempe tenerum illud palmae germen, eandem cum cerebro eius facultatem possidet. Quod uero uelut tegumentum eius est, adstringentem & ipsam qualitatem habet: uerum plus quam dicta omnia exccat, utpote quod & essentiae consistentia illis stecius est, & minime particeps est humiditatis. Itaque iure utuntur illo ad ulcerum putrescentia, miscentque medicamentis articulos plus iusto laxatos contrahentibus: ad haec facultatibus hepaticis, & stomachicis, seu intro sumantur, seu foris admoveantur. Sed & radix plantae desiccatoriae citra morsum facultatis est, adiunctum habens & ipsa adstrictionis quippiam. Et de Palmarum fructu differens libro secundo de alimentorum facultatibus, sic inquit. Est autem non parua in Palmulis differentia: aliae namque siccae sunt, & adstringentes, ut Aegyptiae: aliae molles, & humidae, & dulces, ut quae caryotae appellantur. Haec autem praestantissimae in Syria Palaestina nascuntur in Hierichunte: reliquae omnes palmulae inter dicta duo genera mediae censetur. Verum concoctu difficiles sunt, capiti que dolorem inferunt: quarum aliae quidem magis, aliae minus sunt humidae ac dulces, siccae atque adstringentes. Sed constitutis extremis, iam omne quod in medio est, facillime deprehendes. Nulla ergo ex ipsis est, quae non dulcedinem quandam, & adstrictionem habeat. Siquidem caryotae leuiusculum adstringunt, & Thebaicis obscura quaedam inest dulcedo. At succum quidem dulcem nutrire, austerum autem gratum esse stomacho, & aluum sistere ostendimus. Omnes autem palmulae, si largius sumantur, concoctu sunt difficiles, & capiti dolorem adferunt. Quaedam etiam morsus cuiusdam sensum ori uentriculi, quod medici stomachum uocant, inducunt. Succus autem ex ijs in corpus distributus, crassus quidem omnino est, cum quodam etiam lentore, ubi pingues fuerint palmulae, ut caryotae. Cum autem huic succo dulcedo etiam mista fuerit, celerrime quidem hepar ab eo obstruitur: laeditur autem maxime ab ipsorum esu, quod & inflammatur, & scirrhus obideatur. Post hepar autem & lien obstruitur: ac laeditur. At multo sunt maxime uirides palmulae ad omnia sunt noxiae, si paulo largius sumantur. Perspicuum porro est, dulces quidem calidiores; adstringentes uero frigidiore succo praeditas esse. Virides praeterea palmulae inflationes pariunt, ueluti & ficus: eadem namque palmularum uiridum ad alias est proportio, quae ficuum ad caricas. Ceterum in regionibus non admodum calidis, palmulae non perfecte maturescunt, adeo ut reponi queant. Quo fit, ut homines ipsis uiridibus uesci coacti, crudis succis impleantur, rigoribusque, qui agere calefiant, & hepatis obstructionibus prebendantur. Arbor, quae ποινίς Graecis, Latinis Palma uocatur: Arabibus Machla, aut Nachal: Italis, Palma: Germanis, Datthelbaum: Hispanis, Palmera: Gallis, Arbre de dattes. Huius autem arboris fructus, qui δάτυλοι καὶ ποίνες Graecis, Latinis Palmulae & Dactyli dicuntur: Arabibus, Tamar: Italis, Dattoli: Germanis, Dattilen: Hispanis, Tamaras, & Datiles: Gallis, Dattes.

Palmarum uires ex Gal.

Palmarum facultas ex eodem.

Nomina.

## Malum Punicum.

## Cap. CXXVII.

MALVM PVNICVM omne boni succi est, stomacho utile, perexiguum sufficiens alimentum. Dulcia stomacho utiliora habentur, sed aliquantulum in eo calorem gignunt, inflationes pariunt, unde in febris abdicantur. Acida adstringunt, aestuanti stomacho auxiliantur, & multo magis contrahunt, ac urinam cient: ora, gingiuasque laedunt. Vinosa uero mediam sortiuntur naturam. Nuclei acinorum acidi punici in sole siccati, & obsonijs insparsi, concoctiue, fluentem aluum, stomachumque sistunt: coelesti aqua madescunt, bibunturque commodè sanguinem excreantibus: ad defessus dysentericorum, foeminarumque fluxione uuluae laborantium utiles sunt. Expressus nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris, uirililaris, & sedis ulcera, nomas, reduuias, & ea, quae in corpore extuberant, aurium dolores, & narium uitia; praesertim acidorum. Huius flores cytini uocantur: qui adstringunt, siccant, cohibent: sanguinolenta glutinant: quas punicum, praestant utilitates. humida gingiuarum uitia, mobilesque dentes decocto colluuntur: herniam prolapsu intestini erumpentem, cataplasinate reppellunt. Memoriae tradunt, qui tres quam minimos cytinos deuorauerit



## MALVM PUNICVM

Punici mali  
confid.

uorauerit, nullam eo anno lippitudinem passurum. Eligatur hypocistidis exemplo. Malicorium asperum est mali punici putamen, quod aliqui sidion appellant. Id spissandi vim habet, & quos cytini, præbet vltus. Decoctum radices, potu latas ventris tineas pellit, & eadem euocat. Balaustium syluestris punicæ flos est, cytino similis. Cuius complura genera reperiuntur, candidum, fuluum, colore rosaceo. Succus ex eo exprimitur, hypocistidis modo: cui adstrictoria vis inest, eadem facies, quæ hypocistis, & cytinus.

**PUNICA** mala in pluribus Italiæ locis vulgò, sicut etiam Latine Granata dicuntur, à multis intus conclusis granis: quàmquam non desunt, qui ita appellari uelint à Granata Hispania regno, quòd inibi numerosa proueniant. Sed quomodocumque res habeat, nusquam non cognita sunt in Italia: siquidem inibi & in hortis, & in uinetis, & in uiridarijs, eorum frequentissime uisuntur arbores. Triplici (ut etiam scribit Dioscorides) distinguuntur specie. quippe quòd alia dulcia sint, alia acida, alia uinosa. Vinosa lenta ea sunt, quæ vulgò Vaiani uocat Hetruria, quæq; alibi Shiaui, & alibi di mezo sapore Italico sermone appellantur. At Plinio lib. XIII. cap. XVII. quinq; enumerantur species, dulcia scilicet, acida, mista, acida, & uinosa. Verum hæc omnia Dioscorides in tria redegit fastigia: utpote qui uni dulcia; alteri acida, & acida; tertio uero generi mista, & uinosa adscripserit. Hæc omnia Italia habet, & celebrat: sed & fructus, & acinorum magnitudine, tum liquoris copia excellunt dulcia, et uinolenta. Acida mitescere, & dulcia fieri tradunt, si suillo, aut humano stercore foueantur arboris radices, & uetere urina sæpius irrigentur. Cæterum ne fructus in arbore dehiscat, remedio sunt lapides tres, cum seritur arbor, ad radices collocati: quin et si iam confusa sit,

& fructum ferat, eadem ratione emendatur. Sed & hoc item præstabitur, si scilla secundum radices conseratur. Si florem arbor non continet, urinam ueterem cum pari aquæ mensura temperare, & ter per annum radicibus infundere, efficacissimum est remedium. Eundem præstabis effectum, si arboris florentis truncum plumbeo concluderis circulo, uel anguis corio inuolueris. Seruantur punica mala incorrupta anno toto, si cum ferè matura fuerint, petiolis, quibus pendent, intorqueantur in arbore: uel si postquam decerpta fuerint, argilla ex aqua resoluta undiq; obli nantur, ac deinde pluribus diebus insolentur. Sunt & qui, ut diu integra perennent, ea in feruentem aquam immergant, statimq; eximant, & sole siccanda exponant, octo dierum spatio. Vini ex omnibus consiciendi ratio hæc est. Acini maturi diligenter à corijs, & membranis purgati prælo committuntur, ac exprimuntur: mox uinum saccis ad id accommodatis percolatur, & in uasculis reponitur, quousque sæx residat: deæcaturq; deinde, & clarum reponitur, affuso de super oleo, ne corrumpatur, uel ace scat. Sunt & qui sine oleo illud in cadis asseruent, sed id per æstatem facile ace scit. De flosculi nomine inter se discrepant auctorum sententiæ. Dioscorides florem satiuæ punicæ cytinum appellat, balaustium uero syluestris. Plinio lib. XXIII. cap. VI. primus tam satiuæ, quàm syluestris partus florere in ci pientis cytinus uocatur; balaustium uero flos utriusq; in ipso erumpens cytino. Laudatissimi satiuarum flores colore perquam rubro ex Creta, & Cypro hoc æuo Venetias importantur, aspectu quidem specioso, & uiribus cæteris præstantiores. Sed & mangonio fiunt in Italia peregrinis non dissimiles, non tamen usque adeo præstantes. Immatu rus punici cortex ideo Malicorium antiquis dicebatur, quòd eo, ut Rhu ad perficienda coria uteretur. Dulcia punica, quæ apyrena alio nomine uocantur, uentriculo inuilia haberi, dentes gingiuasq; lacerare, auctor est Plinius; est rectius fortè id Dioscorides acidis attribuat. Puluis mali punici in olla noua operculo indito in furno tosti, potus suauis, tum aluum efficaciter sistit. Syluestris uero acinorum osculi utiliter bibuntur triti ad aquam, quæ cutem subierit, siccandam. Cortice punici ex uino decocto, & imposito perniones sanantur. Punica, & myrtus, (si rei agrarie auctoribus credimus) in uia consuetudine uiuum in modum oblectantur, ita ut etiam reddantur fertiliores, si altera in alteram inseratur. Malorum punicorum uires prodidit Galenus lib. VIII. simp. med. sic inquit. Malum granatum omne adstringentem qualitatem obinet, non tamen in omnibus ea exuperat. Sunt enim inter ea quædam acida, quædam plus dulcia, quàm austera: & sanè quæ ab unoquoq; eorum procedit utilitas, secundum uincem eueniat qualitatem necesse est. Dictum autem in quarto horum commentariorum est super dulci sapore, austero, & acido. Itaq; ex illis de malorum punicorum differentia liceat colligere. Porro acini magis, quàm succus tum adstringunt, tum exiccant, his etiam magis putamina: uocantur autem sidia. Ad similem illis uim habent cytini. Malum, quod Græcis πορὰ, Latinis Malum punicum appellatur: Arabibus, Kuman, Ruman, seu Roman: Italis, Melagrano, & Pomo granato: Germanis, Granatoepffel: Hispanis, Granadas, & Romanas: Gallis, Pomme de granade, et Myr grenes.

Cytinus, &  
balaustium.

Malicorium.


Mali punici  
uires ex Gal.

Nomina.



## Myrtus.

## Cap. CXXVIII.



MYRTVS fatiua nigra vtilior est medicinæ, quàm candida, & in hoc genere multò magis montana: semen tamen imbecillius parit. Vis & myrti, & seminis adstringit. Semen viride, aut aridum in cibo datur sanguinem excreantibus, & vesicæ erosionibus. Succus uirentibus baccis expressus, eisdem effectus exhibet: stomacho utilis, urinam cit: prodest contra phalangij morsum, & scorpionis ictus in mero. Seminis decoctum capillum tingit. Ius decocti in uino ulcera in extremis membris nata sanat: oculorum inflammationes illitum cum pol-line polentæ lenit: contra ægilopas illinitur: crapulam arcet præsumptum uinum, quod seruesfacto aliquantùm eius semine exprimatur. alias enim acorem contraheret. Præstat idem seminis effectus: utile procidentia vuluarum in defectionibus, sedis uitij, & foeminis fluxione uulua laborantibus: purgat furfures, ulcera capitis manantia, atque eruptiones papularum: fluentes capillos continet. Additur quoque in medicamenta, quas liparas uocant, uti oleum, quod ex folijs eius factum est. Decoctum foliorum ad defectiones balnearum conuenit, & contra laxatos artus, & malè solidescences: co- fracta ferruminationi repugnantia utilissimè fouentur: uiriliginem emendat, purulentis auribus infunditur, & capillos denigrat. Succus eorum eadem efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis ulceribus, & partibus omnibus fluxione laborantibus, cœliaciisque prosunt: & admisto omphacino oleo, aut exiguo rosaceo cum uino, ad ulcera serpentia, ignem sacrum, testium inflammationes, epinyctidas, & condylomata. Arentium foliorum farina utiliter inspargitur paronychijs, pterygijs, & contra alarum, feminumque perfusiones: cardiacorum sudores cohibet. Folia cruda, sen- cremata cum cerato, ambustis, paronychijs, pterygijsque medentur. Exprimitur folijs succus, ad- fuso uetere uino, aut aqua caelesti, cuius recentis usus est: nam exiccatus planè cariem sentit, & uires amittit. Myrtidanum dicitur, adnatum inæquabile, uerrucosum, intumescensque, & concolor: quod perinde quasi manus, myrti caudicem amplectitur. Magis quàm myrtus adstringit. Tustum addito austero uino reponitur, coactumque in pastillos ficcatur in umbra: multò efficacius & folio, & semine, cerato, pelsis, infesionibus, cataplasimatis admittum; ubi astringendum aliquid est.

MYRTVS arbor frequens in Italia nascitur. Cuius duo produntur genera: satium, quod in candidum, & Myrti confi-  
nigrum diuiditur: & sylvestre, quo uniuersa serè Tyrrheni litora uirescunt, ac redolet. Siquidem in agro nostro  
Senensi in maritimis, ac in uniuerso Liguriæ tractu, Romano, atque Neapolitano ubique Myrti sponte proueniunt.  
Satiuæ in arboribus facillè adolescunt, ramis flexilibus, ac lentis: rubro cortice: folijs longiusculis, perpetuoq; uirē-  
tibus, punicea æmulis; quanquam in uigris nigriora, in candidis candidiora spectantur. Flores omnibus insident can-  
didi, odorati: ideoq; aqua ex ijs confecta odoris suauitate unguentarijs plurimùm expetitur. At cum nostras æque  
sit odorata, atque olfactu iucunda; eam tamen odoratissimam existimauerim, quæ ex Aegyptia myrto elicitor: sta-  
tutum utrumque genus baccas fert oblongas, agrestes oleas quadantenus referentes, multò sanè sylvestribus maiores:  
est contrarium asseueret Marcellus. Quippe experientia compertum est, quòd ubique satia Myrtus colitur, Marcelli lap-  
grandiores, uegetioresq; baccas edit, quàm sylvestris: cultura enim Myrti mansuescunt, & longè magis humore  
repletur, utpote & aliæ satiæ stirpes omnes: quod quidem indomita tellus sylvestribus denegat. Caterùm, ne  
quis decipiatur, hic lectorem admonendum esse duxi, cum de sylvestri Myrto loquor, non me de rusco intelligere;  
quod Dioscoridi, & Plinio sylvestris, & acuta myrtus appellatur; sed de uera sylvestri myrto, quæ sua sponte in  
litoribus sine cultu oritur: quæ item in mediterraneis, in collibus, syluis, ac campestribus prouenit. Hæc tancist  
& sylvestrem eiusdem generis myrtum tacite dari fatetur. Porro inter sylvestres alba quoque, & nigra reperitur,  
quemadmodum & inter urbanas. quandoquidem ipse quàm plurimas sylvestres myrti plantas uidi in mille locis, qui-  
bus maturæ inerant bacca; non sanè nigra, sed in purpuram albicantes. Myrti montes non amant, quin & frigidos  
odere tractus: tamen cum in mediterraneis, nempe in hortis, uiridarijs, uinctis, & campis maxime proueniunt; tum  
n in




Myrtidanum  
Myrti alia ge-  
nera,

in maritimis præcipue, atq; amcenis stagnorum, & lacuum ripis à natura nullo studio editæ, mirifice proficiunt, ut tamq; lætam agunt. Quod Dioscoridi Myrtidanum nominatur, uulgò notissimum est, ubi scilicet myrtus frequenter nascitur. Sunt & alia ueteribus Myrti genera, nobis quoq; non ignota, nempe Tarentinum, & exoticum: quorum Plinius meminit lib. xv. cap. xxix. his uerbis. Satiuarum genera topiarii faciunt. Tarentinam folio minuto,

## MYRTVS TARENTINA.

## MYRTVS EXOTICA.



Myrti usus.

nostratem patulo, exoticam densissimo, senis foliorum uersibus. Hæc non est in usu: ramosa utraque alia. Myrti nostratis in Hetruria coria ubique perficiuntur: quippe quod ea pelles densentur, crispentur, atque crassescant. Myrti baccis ultimam maturitatem adeptis, nostrates mulieres utuntur ad ciborum intinctus, qui cum assatis carnibus esitati maximam cum palato ineunt gratiam. Ideoq; Plinius loco supra citato ita scriptum reliquit. Succorum natura præcipuam admirationem in myrto habet, quando ex una omnium olei, uiniq; bina genera fiunt. Item myrtidanum; ut diximus. Et alius usus bacce fuit apud antiquos, antequam piper reperiretur, illius ob tinens uicem. Quodam etiam generosi obsonii nomine inde tracto, quod etiamnum myrtatum uocatur. Eademq; originem aprorum sapor commendatur, plerunque ad intinctus additis myrtis. hæc Plinius. Myrteum condimentum languidos uentri- culos roborat: idcirco & cæliacis, & dysentericis utile: quin & foeminarum fluxiones, qualescunque sint, uel- lenter inhibet. Myrti frondes, itemq; baccarum sementritum contra fungorum strangulationes mirifice præ- stant. Myrtus (ut memorie prodidit Galenus libro septimo simplicium medicamentorum) ex contrariis substantiis planta constat: uincit tamen in ea frigidum terrenum. Habet uero etiam tenue quiddam calidum: unde uel- lenter desiccatur. Porro tum folia, tum germina, tum fructus, tum succus, non parum inter se in adstrictione dissident. Ceterum quod ramis, & trunco adnascitur tuberosum, quam quidam myrtada nuncupant, quanto dictis siccior est, tanto & desiccatur, & adstringit uehementius. Quidam id tudentes reponunt, postea uino subigentes in pastillo- los formant. Folia item arida uiridibus plus desiccant: miscetur enim uirentibus humiditas quedam. Porro succus non tantum ex uirentibus folijs exprimitur, sed & fructu. Restrangendi uim hæc omnia habent tum foris tum- posta, tum intro sumpta in corpus, quod scilicet nondum ullam deleteriam, aut purgatoriam substantiam habent admixtam. Planta, quæ *μυρτιν* Græcis, Latinis Myrtus nominatur: Arabibus, Aes, Alas, siue As: Italis, Myrto: Germanis, Vuelsch heydelbeer: Hispanis, Murta, aut Raia: Gallis, Meurte.

Myrti uires  
ex Galeno.

Nomina.

## Cerasia.

## Cap. CXXIX.

CERASIA alio uilia sunt, si uiridia sumantur: eadem siccata illam sistunt. Gummi, quod cera- si resudarunt, cum uino diluto, tussi uerustæ medetur: colorem commendat, uisum exacuit, appe- tentiam inuitat: idem ex uino potum calculosis auxilio est.

NULLA



## CERASIA.



NULLA hodie arbor est in Italia, quæ uulgo notior sit Cerasis. Has scribit Plinius libro xv. cap. xxv. nouas, & peregrinas, nec antea uisâs è Ponto secum primum aduexisse in Italiam Lucullum, postquam debellato Mithridate is uictoria positus Romam uenit. Sed postea tanta agro Italo amœnissimo cum hac arbore intercessit affinitas, & consortium, ut non solum ager is satiuarum plantas seruauerit, propagauerit, & aduexerit; sed & ueluti ex eius humore ( quæ summa fuit inter se societas) grauida terra facta, sine aliquo semine in campis, in montibus, & syluis numerosissimas plantas procreauerit, & ediderit. Satiuarum speciosissimi fructus, qui Cerasa, & Cerasia Latinis etiam appellantur, diuersorum sunt generum: quo fit, ut diuersa quoque sortiantur nomina. Inter hæc illa principem sibi locum uendicant, quæ Hetruscis uulgo Marchiane, & duracine uocantur: tametsi horum alia maiora, alia minora, alia saturato colore rubeant, alia uerò potius albicent. Quæ autem Plinio Iuliana, nobis uerò uulgo Acquaiuole, hoc est, aquea dicuntur, in nullo sane habentur pretio: quandoquidem adeo sunt tenera, & fragilia, ut nisi sub arbore sua comedantur, facile gestatu colliduntur, & marcescant: quin et ob aqueæ partis redundantiam insipida sunt, oriq; ingrata. Quæ autem, quod admodum nigricent, Corbine nos uulgo uocamus, Plinius uerò ætia, & cæciliana, cum sint duriscula, & dulcia, gustatu habentur non iniucunda: uerum tamen quod manus, dentes, ac labra atro colore inficiant, discubentesq; deturpent, mensis raro apponuntur. In cerasiorum genere numerantur & illa, quæ Romæ Viscirole, Senis Amarine, & in alijs compluribus Italiæ locis Marasche uulgo nuncupantur, à sapore ( ut puto ) dicta, quod non iniucundi amaroris tantillum respiciant. Horum porro uaria notantur genera, quæ etsi omnia sibi acidum asciscant saporem; hæc tamen eius plus, illa uerò minus habent. Rura Tridantina ea Marasche uulgo nominant,

Cerasorum consideratio.

Cerasorum genera.

quæ minus acida gustu deprehenduntur, quorum genus quoddam est, quod ori admodum gratum habetur: quippe quod in his acido dulce sit admistum, ob idq; illa palato maxime placeant. Quædam præterea inibi Marine, & Marinelle cognominantur, quæ minora, & rotundiora sunt, & breuiori pediculo appensa, gustu nihil ferè prædictis reclinante. Est & horum tertium genus, quæ uulgo illud Verule nominat, longiore pediculo, bacca etiamnum cæteris crassiore, gustu acerbo, & admodum acido, colore perpetuo rufescente, nec unquam in atrum uergente. etsi cætera, ubi plenè maturuerint, in atrum rubescant. Omnia hæc cerasiorum ( ut ita dicam ) Amarinorum genera aptissima sunt, ut insolentur, & ut saccharo condiantur. Quinetiam sapore commendantur ad intinctus conficiendos, quibus non modo sanis edulia iucundissime condiuntur; sed etiam ægrotantibus, præsertimq; biliosis febribus uexatis. Siquidem illis non modo sitim extinguunt, sed oris insuauitatem emendant, & cibi appetentiam conciliant. Syluestre horum genus nulla adhibita cultura Ananienfibus in Tridentino agro sponte prouenit, nihil prorsus tum colore, tum etiam sapore ab illis dissidens, quæ inibi, ut diximus, Verule uulgo uocantur. Hæc breui pediculo pendens in arboribus admodum pumilis, tantæq; breuitatis, ut rare, uel potius nullæ dodrantalem æquent mensuram. Quo factum est, ut crediderim ( etsi id pro comperto asserere non ausim ) hæc eadem esse, quæ Plinio Macedonica dicuntur. Syluestria, quibus, plerumq; uescuntur aues, raro in cibus admittuntur, præterquam à rusticis, tum quod plus ossis, quam carnis habeant, tum etiam quod cum quadam acerbitate amara sentiantur. Degenerant cerasi quocumq; fimo radicibus admoto, id usque adeo oderunt, & horrent. Contrà proficiunt, si sui ipsius putamina falce concisa circum radicibus circumponitur: uel quibus marcescant. Præcoces ille fructus ferunt, quibus ante florum exortum calx uiua radicibus circumponitur: uel quibus aqua calida sæpius pedes irrigantur, etsi postea paruo temporis tractu inarescant. Galenus habita Cerasiorum omnis generis ratione lib. vii. simp. med. ea hisce paucis perstrinxit. Cerasus arbor fructum fert non paris adstrictionis in omnibus particulatim plantis participem. Nam & in horum, sicut etiam malorum granatorum, & malorum, quibusdam austera qualitas, in quibusdam uerò dulcis, in nonnullis autem acida exuperat. Quinetiam ipsorum dulcium ea, quæ nondum cocta sunt, ac matura, quædam admodum acerbæ sunt, quædam similiter moris acida. Sed in moris immaturis acida qualitas acerbam exuperat, in cerasijs non semper. Ergo quæ dulciora sunt, magis quæ in intestinis sunt, subducunt, sed minus utilia stomacho sunt: contrà austera. Quæcumq; uerò acida sunt, ea pituitosis, excrementosisq; stomachis conueniunt: siquidem austeris magis desiccant, & nonnihil etiam incidunt. Porro ipsius arboris gummi communem omnibus uiscosis, & mordacitate carentibus medicamentis facultatem obtinet, quæ & ad arterias exasperatas accommodata est. Proprie autem ( si quidem uerum est quod quidam scribunt ) calculis uexatos cum uino potum adiuuat. Nam sic illi tenuium partium quædam facultas inest. Cerasorum fructus, qui Græcis Κεράσια, Latinis item

Syluestria cerasia.

Cerasiorum uires ex Galen.

Nomina.

Cerasia, & Cerasa dicuntur: Arabibus, Sarasse: Italis, Ciregie: Germanis, Kirsen: Hispanis, Cerezas: Gallis, Cerise.



## Siliquæ.

## Cap. CXXX.

Siliquarū cō  
sideratio.Siliquarū uir-  
res ex Gal.

Nomina.

SILIQUÆ recentes stomacho aduersantur, al-  
uum soluunt: eadem siccata sistunt, stomachoque uri-  
liores fiunt: urinam ciunt, sed præcipue, quæ uinacis  
condiuntur.

SILIQUÆ, quæ Græcis *κεράτριά* dicuntur, in Italia  
officinis uulgò Carobe, & Carobole appellantur. Nascuntur  
arbores, quæ Siliquas ferunt, in regno Neapolitano, præsertim  
in Apulia, ac etiam in Campania, ut optime sciunt ij, qui Fara-  
do Itrum, & hinc Molam iter faciunt: siquidem in illa ob leui-  
gatos lapides inibi stratos laboriosa admodum uia, quam Appiam  
uocant, frequentissimè conspiciuntur. Incole has plantas Sales  
qua uulgò nominant, uocabulo nimirum à Siliqua detorto. Ara-  
bores in spectatam satis proceritatem attolluntur, ramis in lati-  
tudinem potius, quam in longitudinem protensis: cortice ciu-  
ritio ad caruleum incliuante, loti arboris instar. Folio uir-  
fraxineo, latiore tamen, duriore, rariore, ac magis circin-  
to. Florent discedente hyeme, aut uere iam appetente: fructi-  
cant uerò æstate, & autumno. Siliquæ recenter ab arbore de-  
cerptæ ingrato displicent sapore, sed tractu temporis in cratibus  
expansæ, & siccata, adco mitescunt, ut & dulces euadant ad-  
modum, & gustui suaves fiant. Aliud siliquarum genus, quod  
ficum Aegyptiam cognominant, scriptis tradiderunt Theophras-  
tus, & Plinius: de quibus mihi differendum non proposui, tum  
quod Italici nusquam (quantum equidem sciam) nascentur, neque  
cognoscantur; tum etiam quod nullum habeant usum in medica-  
na. Siliquas in cibis denuit Galenus lib. II. de alimentorum  
facultatibus, his uerbis. Ceratia, quorum tertia syllaba per se  
literam & scribitur, & pronuntiatur, nihil cum cerasijs per se  
literam & scribitur, & pronuntiatur, nihil cum cerasijs per se

scriptis habent similitudinis. Est autem prauis succi edulium, ac lignosum: unde necessario sequitur, ut conce-  
difficile: nihil enim quod lignosum est, facile coquitur. Præterea incommodum illud ipsis inest non paruum, quod  
non celeriter deiiciantur. Proinde satius esset, ea ad nos non importari à regionibus orientalibus, in quibus nascentur.  
tur. Sed de uiribus, quas & arbor, & ipse habent in medicina, idem Galenus differens lib. VII. de simplicium  
medicamentorum facultate, sic inquit. Ceratonia exiccantis est, & adstringentis facultatis, sicut & fructus eius  
quæ ceratia uocant, nonnihil etiam dulcedinis continent. Accidit autem istis quiddam simile cerasiis. Nam si lunis  
da sumas, magis uentrem subducunt: sicca uerò magis sistunt: utpote cum humiditatem expirent, & quod essentia  
est crassioris, tantum reliquum habeant. *Κεράτριά* Græcè, Latine Siliquæ uocantur: Arabicè, Chanub: Ita-  
licè, Carobe & Carobole; Germanicè, S. Iohanes brot: Hispanicè, Alfarobas: Gallicè, Carouge.

## Mala.

## Cap. CXXXI.

FOLIA, flores, & germina cum omnis mali, tum maxime cotoneæ adstringunt. Pomis acer-  
bis adstringendi uis inest, maturis uerò longè secus. Ex ijs uerna bilem gignunt, nervos omnes le-  
dunt, inflationes pariunt. Cotonea stomacho utilia, urinam ciunt: uerum costa mitiora habentur.  
Profunt cœliacis, dysentericis, purulenta extussientibus, colericis, præsertim cruda. Macerato-  
rum liquor commodè in stomachi, aut uentris fluxionibus, potui datur. Succus crudorum asium-  
ptus orthopnoicis salutaris est. Decocto fouentur uulnæ, & sedes, si procident. Cotonea, quæ mel-  
le condiuntur, urinam mouent: mel autem sibi constringentem illorum uim, & inspissantem adse-  
scit. Quæ cum melle coquuntur, stomacho, atque ori gratiora sunt, sed minus inspissant. Cruda  
cataplasmatibus adijciuntur, ad cohibendum aluum, aut si stomachus æstuet, aut in uomitiones effun-  
datur, ad mammarum inflammationes, præduros lienes, & condylomata. Fit uinum ex ipsis uilis  
expressisque: sed quò perduret, quindecim sextarijs succi unus mellis adiungitur, alioquin in aco-  
rem degenerat. Prodest ad omnia, quæ dicta sunt. Fit & oleum ex ijs, quod melinum uocauimus:  
quo utimur, quoties adstringenti oleo est opus. Eligi oportet uera, quæ sanè sunt rotunda, parua,  
& odorata: quæ uerò struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus utilia. Flos & uiridis, & sic-  
cus cataplasmatibus imponitur: ijs conueniens, quæ adstrictionem desiderant, inflammationibus oculo-  
rum, reiectionibusq; sanguinis: contra citam aluum, & mensium impetus, in uino bibitur. Melime-  
la uentrem molliunt, & ab eo animalia expellunt: stomacho negotium exhibent: æstuationem fa-  
ciunt: ea multis dulcia uocantur. Epirotica mala, quæ Latine orbiculata dicuntur, stomacho uti  
lia: sistunt aluum, urinas euocant: malis tamen cotoneis inualidiora. Syluestria mala similia sunt  
uernis,



MALVS.



COTONEA MALVS.



PERSICA MALVS.



ARMENIACA MALVS.





## MEDICA MALVS.

## AVRANTIA MALA.



## LIMONIA MALA.



Malorum cō-  
sideratio.

uernis, & adstringunt. Sanè in hunc usum immatura omnia opus sunt. Persica poma matura tam stomacho, quam uentri utilia sunt, acerba aluum cohibent, sed sicca uehementius. Decoctum è siccis alui, stomachique fluxiones sistit. Armeniaca, quæ à Latinis præcocia dicuntur, minora sunt supradictis, & stomacho utiliora. Medica mala, persicæ, aut cedromela, quæ Latini citria uocant, nemini non cognita. Arbor ipsa omnibus anni temporibus pomifera, alijs deciduis, alijs subnascentibus. Malum oblongum est, rugosum, colore aurum imitans, cum grauitate odoratum. Semen habet pyri. Id in uino potum uenenis resistit, aluum mouet: oris suauitatem commendat, decocto eius coluto, aut succo: æstur in malacia mulieribus. Vesciturijs impositum ab erosionis uitio uestes uindicare existimatur.

IN MALORVM quoque genere Dioscoridi recensentur Persicæ, Præcocia, Cotonea, & Citria: quippe quod eandem effigiem, & formam representare uideantur. Sed nos primùm de uulgaribus malis agemus, reliqua subinde sigillatim prosequemur. Eorum itaque (ut Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus posteritatis memorie prodidit) uarij, ac multiplices sunt saporès, quos etiam uaria sequuntur functiones. Aliæ nanque austerum, alia acidum, dulcem uero saporem gerunt. Sunt etiam quæ ex ijs mistum habeant, ita ut appareant & dulcissima & austerissima. Quædam præterea cum dulcedine manifestè acida sentiuntur: ad hæc alia cum acore acerba. Inuenias autem nonnunquam & quæ tres simul saporès planè referant, scilicet,



scilicet, & acidum, acerbūq; nonnihil. Ceterum mala quidem, quæ adstringunt, succum habent frigidum, ac terrecū. Quæ uerò acida apparent, frigidum quidem succum habent, uerum tenuium est partium. Mediæ autem temperaturæ sunt dulcia, quæ ad calidius uergunt. Quemadmodum quæ omnis qualitatis sunt expertia, insipidiæ, ac ueluti aquosa, ad frigidius inclinant. Malis igitur uteris pro uincetiū saporum facultatibus: austeris quidem, cum uenterculus uel propter calidam intemperiem, uel ob multam humiditatem fuerit imbecillus: acerbis autem, cum hæc aucta admodum fuerint: acidis, cum crassum succum, qui non magnopere frigidus sit, suspicaberis in ipso esse collectum. Siquidem succus frigidus non acida, sed acria postulat. Vtraq; certè & acida & acria succos crassos incidunt: in eo tamè differunt, quòd hæc quidem cum refrigeratione; illa autem cum calfactione id præstent. Porro dulcis malorum succus, cum sine acrimonia, & crassitie, hoc est, cum solus exquisitè fuerit, celerius, quantum in ipso est, distribuitur. Quòd si acrimonia, aut crassitiem habuerit, citius subducitur. Ceterum optima etiam genere mala uitanda sunt, antequam in arboribus maturuerint: quippe quoniam concoctu sunt difficilia, & frigida, tardeq; permeant, & praua sunt succi: ad hæc succum habent frigidum, & leuiter crassum. Quæ uerò belle matura in hyemem, & uer proximiū asseruant, ea morbis sæpenumero perquam utilia sunt, aut farina aqua subacta circumlita, aut calidis cineribus medio criter assata, aut pulchrè in aquæ bullientis uaporibus percocta. Dare autem ipsa conueniet statim post cibū, aliquando etiam cum pane, ad uentrem, & stomachum roborandum, ijs qui cibum fastidiunt, tardeq; concoquunt, quicq; uocant, diarrhœa, ac dysenteria infistantur. In hunc quoq; usum apta sunt acerbæ: nam paratæ, ut modò dixi, medio erem retinent adstrictionem. In Hetruria principatum obtinent, quæ Appiæ, & Mele rose uulgò uocantur: quandoquidem hæc duo genera, cum suauiter oleant, gustuq; arrideant, cum naribus, et palato maximam ineunt gratiam. Eaq; propter non longè eum aberrare putauerim, qui dixerit Appiæ esse Dioscoridi melimela: Rosea uerò, quæ eidem epitrota, & Latinis orbiculata dicuntur. Quæ uerò adeò rubent, ut cruore persusa uideantur, & acido gustu sunt prædita, non alia de causa ita rubescunt (si rei agrariæ auctoribus credimus) nisi quòd ex mali, & mori nigre insitio ne suam traxerint originem. Cornarius sua tantum, ni fallor, opinione ductus, putat in suis commentarijs in Galea libros de compositione medicamentorum secundum locos, Cestiana poma esse arantia, siue aurantia mala, quæ in Citri mali genere ab omnibus recensentur. Nec eum potuit à sua sententia reuocare Plinius, qui libro x v. capite x i i i i. apertissimè scribit à Cestio cestiana, à Matio matiana, à Manlio manliana, à Claudio claudiana, & ab Appio appiana mala per inuentorum nomina, à quibus habuerūt originem, Romanis fuisse cognominata. Quocirca eo loco scriptum reliquit Galenus ex auctoritate Apollonij, quòd in capitis dolore ex ebrietate cestiana mala sic in urbe Romana appellata, in cibis cocta conferunt, quòd austera sint facultate: non ut somniasse uidetur Cornarius, aurantia, quæ præterquam quòd Apollonio, & Galeno incognita fuisse censentur, nusquam gentium, quòd equidem sciam, constat exhibentur. Quo fit, pace omnium dixerim, ut qui suæ ceruicis duritiam consulunt, suas sæpius reprobare sententias audiant. Malos, quæ fructus suos tanquam steriles, dare recusant, sæcundas effeceris, si plumbeo circulo earum caudicem altitudine pedis à terra strictim cõcluseris ante florum aduentum, & cum mala ceperint adolescere, soluto uinculo eas libertate donaueris. Mala Cotonea primum in Italiam aduecta fuerūt è Cydone Cretæ oppido, unde de Grecis cydonia dicta sunt. Horum tria in Italia inueniuntur genera. Palua illis, quæ peculiariter Mala cotonea cognominantur, pressa, incisuris intersecta, colore ad aurum inclinato, lauginoza, & longè ceteris odoratiora. Proximū locum sortiuntur, quæ maiore admodum corporis mole proueniunt. Dioscoridi, & Galeno struthia uocata. Hetrusci hæc pyra cotonea uocant: quippe quòd forma magis pyra, quam mala referant. Pulpa, ac succo ceteris præualent, colore tamen, sua uolentia, acquiribus cedunt. Postremò Plinio miluiana sunt, quæ nonnullis notia dicuntur, quòd tantum proueniant ex cotoneis malis, quæ struthis insite fuerint, uel ex struthis, quæ cotonearum surculis receperint. Hæc malis grandiora, pyris uerò, siue struthis minora uisuntur: forma uerò, ac facultate inter utrunque media. Ceterum sanè hæc omnia, præcipuè mala, maxime officinis expetuntur in medicinæ usum, & congelati liquores: quæ omnia non agris modò apta sunt, sed etiam sanis utilia æquè & grata. Galeni auctore (ut ipse testatur in libris, quos de alimentorum facultatibus conscripsit) Cydonitè placenta, quam officinæ Diacydonium nunc cupant, ex Iberia, & Syria Romam conuehebatur, ex melle tantum, & cotoneorum carne confecta, tam ad cibū, quam medicamenti commodum. Quæ saccharo, uel melle condita reponuntur, perfectè matura legi debent, aliàs indurescunt lignorum instar, ita ut dentibus confici nequeant. Quæ cruda per hyemem asseruantur, seorsum à penilibus uuis reponenda sunt, quòd uuas suo acerrimo sapore adeò utiunt, ut eæ statim marcore conficiantur. Perscorum quoque plurimæ reperiuntur species. uam quædam rubent, alia aureo colore fulgent, alia uirescunt, alia candida sunt, alia sanguinea, alia duracina, alia cotonea uocantur. Ad hæc quædam habentur dulcia, quædam acida, quædam uinosa, quædam auariuacula, & quædam etiam austera. Prima laus in cibis duracinis, sic ex re dictis, quòd caro tam pertinaciter hæreat osi, ut uullo pacto ab eo auelli queat. Præcipua autem in hoc genere illis laus, quæ ab aurei coloris nitore, odoreq; perquam iucundo Cotonea cognominant. Secundas sibi uendicant parates, quæ cortice detracto sanguineum succum fundunt, non propterea modò quòd sint gustu reliquis suauiora; sed etiam quia magnitudine, & colore sunt speciosa. Proxima sunt, nec prædicto generi fortasse cedunt, quæ à nucis similitudine Nucipersica cognominantur: hæc enim cum colore, & sapore non refragentur persicis cotoneis, tum etiam non ingrata dentibus duritie, gustum mira afficiunt uoluptate. Est & genus aliud Perscorum in Hetruria, ac in alijs Italia locis agricolarum mangonio factum, quæ ideo Persica amygdala appellant, quoniam perscorum osium uice dulces amygdalarum nucleos includunt. Ceterum sanè multis contendit Cornarius, in suis commentarijs in secundum Galeni librum de compositione medicamentorum secundum locos, ubique corruptum esse Plinij codicem, ijs in locis, in quibus de duracinis persicis tractat: quin & Pauli, & Palladij, &

Cornarij opinio reprobat.

Malorum cotoneorum cõsideratio.

Perscorum confid.

Cornarij opinio reprobat.



Constantini Caesaris libros corruptos esse, ubi in ijs de duracinis persicis aliquid scriptum reperitur. Quando quidem is, ubi in horum monumentis de duracinis persicis factam fuisse mentionem legitur, ibi de rhodacenis, non autem de duracinis legendum esse censet. Verim cum inibi nulla uel ratione, uel auctoritate nitatur, quibus id comprobet, sua tantum ductus opinione uidetur: atque ob id facile pronunciaffe, horum omnium codicibus (quod tamen absurdum esset credere) mendum subesse. Quamobrem in hoc potius Cornarium hallucinatum, quam libros deprauatos esse crediderim. Quinimo uirum alioquin doctissimum admiror, quod rem per se claram obcuram redere conatus sit, quoddamque non intellexerit, quid Plinio, & Palladio duracina, quid Paulo *δοράκια*, quidne Aetio, & Constantino, ac alijs quibusdam Græcis *ῥοδάκινα* extiterint. Nam si animaduertisset, hæc inter se & nominibus, & re ipsa differre, facilius, meo quidem iudicio, rem dubiam explicasset, nec omnes in uniuersum auctorum codices deprauatos pronunciaffet: cum, ut equidem arbitror, eorum nullus his in locis sit uitiat. Paulo enim *δοράκια*, ut uulgata habet lectio, non *ῥοδάκινα* Cornarij modo, legendum semper existimaui, quod ipse eo loco de præcocius, & armeniacis tantum ualis disserat, non autem simpliciter de persicis. Siquidem, ut Cornarius ipse fatetur, Rhodacene non est alia, quam malus persica, quemadmodum Rhodacena nil aliud sunt, quam mala ipsa Latinis persica uocata, id quod & nos sine ulla controuersia probamus. Sed Paulo *δοράκια* (ut diximus) genus est præcocius, siue armeniaci mali, ut ipse declarat his uerbis. *τὰ δὲ ῥοδάκια τε καὶ δοράκια, καὶ ἀρμένια κέρει τὸν περσικόν. οὗτε γὰρ ὁρῶνται, οὗτε ὡσαύτως διαφθεύονται.* id est. Præcocia, doracia, & armenia persicis præstant: neque enim acescunt, neque siuuliter corrumpuntur. Quibus palam est in Paulo potius *δοράκια*, quam *ῥοδάκινα* esse legendum, quod tantum persica malus Græcis *ῥοδάκινα* uocetur, non autem armenica, doracia, & præcox: quarum fructus, tametsi à quibusdam inter persica numerentur, quod forma tantum ijs similes uidentur; non tamen uera sunt simpliciter persica, quæ proprie Græcis nonnullis *ῥοδάκινα* *μῦρα* in uniuersum uocantur, ut ipse etiam Cornarius testatur. Quippe nungaretur ineptè Paulus, si uellet, quod rhodacena persicis præstaret, cum nil aliud sint rhodacena, quam persica. His itaque rationibus liceat nobis dicere, *δοράκια* Paulo nec *ῥοδάκινα*, nec duracina designare, sed præcocius, siue armeniaci mali genus sibi peculiare. Sed iam ad Plinium uenio, cui duracina persica persicorum species sunt, quibus palma inter omnes, non autem genus, quemadmodum & duracina cerasa, & uuae etiam duracinae inter uarias cerasorum, & uuarum species eodem Plinio, & Palladio describuntur. Quod maxime arguit, aliud eisdem designare duracina, aliud uerò Græcis *ῥοδάκινα*, quod uerum huiusmodi hoc uniuersaliter de omni persico prædicetur, non autem de aliqua particulari specie. Neque, ut ait Cornarius, uocat nostra ætas quedam persica mala duracina, quod offe ceteris duriora sint, sed antiquos secuta, quod pulpa consistentia gustui gratiora sese offerant, & longiori tempore perdurent. Quod quidem palam facit Plinius lib. XIII. cap. III. cum ait. Duracina uua sine ullis uasis in uite seruabilis est: tanta est contra frigora, ætus, tempestatesque firmitas. Hanc & Columella prætulit in cibus. Postremo quod rhodacene arbor, persicam arborem in uniuersum significet, cum Cornarius ipse id firmiter asserat, opus sanè non esset, hoc pluribus comprobare. Sed ne fortassis putaret sibi ipsi non esse adhibendam fidem, Aetium consulat, Constantinum Casarem, & Symeonem Sebii inter recentiores Græcos. Siquidem ij pluribus in locis manifestè demonstrant, nil aliud per Rhodacenam se intellexisse, quam ueram, legitimamque persici plantam. Persicorum omne genus damnauit Galenus libro II. de alimentorum facultatibus, ut prauis succi, & quæ facile corrumpantur, ac noxam uentriculo inferant: quapropter Persica primis mensis semper edenda præcipit. Quare ego certè nescio, ex quorum scriptis deprompserit Plinius, quod inuocua expetantur agris. Nisi fortasse & ipse pro persico perseum deceptus acceperit, quemadmodum fecere recentiorum nonnulli. Persici flores esu aluum deiciunt, itemque uomitiones cient, sed non absque labore, ac detrimento. Nondum defuerunt, ut Marcellus Florentinus, & Simphorianus Campegius in historialibus Galeni campis, qui existimauerint eandem plantam esse persicam, & perseum, de qua agit Dioscorides in huiusce primi uoluminis calce. Quæ (ut tradunt) ea profecto est, quæ in Perside exitiosa nascitur, etsi translata in Aegyptum coeli illius clementia mortiferam in salutarem uerterit naturam, adeo ut in cibis recepta, tam sanis, quam morbois prorsus habeatur innocua. Huius historiae latius prosequitur Theophrastus lib. III. de plantarum historia (ut infra suo loco dicemus) quæ si quis perlegerit, hanc à nostris persicis plurimum dissidere comperiet. Manifesto etiamnum argumento sunt Dioscorides, & Galenus, quod hæc plantæ inter se differant: quandoquidè ij de his ut forma, & genere differentibus scorsum suis scriptis tradiderunt. Armeniaca præterea, quæ Latini, ut in Dioscoride legitur, præcocia nomenclant, & Græci bericocia pronunciant, nos in Hetruria Græcos imitati uulgò Bacoche, & Moniache corruptis uocabulis appellamus: ac si diceremus Bericocia, & Armeniaca. Plura eorum uidentur genera magnitudinis potius, quam genere differentia. Quod euenit non modò celi clementia, & terræ admodum frugiferae dotibus; sed & cultorum mangonio; namque multiplicata in sitione maxime proficiunt. Porro omnia, ubi maturitatem senserint, aureo colore splendent. Idcirco Romanis uulgò Grisomele, quasi chrysomela dicuntur, eaque præcipue, quæ eo tractu cum persicis magnitudine cernant. Maturescunt incipiente æstate mense iunio ante alios fugaces fructus, unde merito Præcocia dicta. Ea parò genere, & natura dotibus à persicis dissidere, testis est Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus: sed non ite in uentriculo, ut illa, tam citò corrumpi, quanquam recentiores medici ea longè magis, quam persica, corruptioni obnoxia experientia contendunt. Iusuper Medica mala, ut ex nomine cognosci potest, ex Media primum aduecta sunt. hæc Latinis Citria, uel Citromala uocantur. Eorum arbor aurantiorum, ac limoniorum plantas magnitudinem æquat. Folia, quæ perpetuò ei uirescunt, aurantijs parum, uel nihil refragatur, foraminibus uisum fere effugientibus ubique punctum traiecta. Quamobrem nesciuerim ego, qua ratione Theophrastus (ut Theodorus interpretatur) ei folia assignauerit portulacæ, quæ illi nullis notis consentiunt. Quo fit, ut admirari non liceat, si recentiorum plerique existimauerint Theophrasti codicem hoc in loco scatere mendis, & quod ubi legitur *ἀρράκινα* id est, portulacæ, legi

Plinij lapsus.

Marcelli, &amp; Simphoriani error.

Armeniaco - rum confederatio.

Medicorum malorum consideratio.



legi potius debeat ἀράχνης, id est, araneorum tele. Quandoquidem ijs fortasse uidebatur, quòd, cum mali Medicæ folia sint ubique minutis admodum punctis perforata, ita ut linteoli hifioris modo sint transparentia, facillè relis araneis comparari possent. In quorum sententia ego quoque perstiti, quousque Plinius inde me reuocauit. Quippe cum accuratius Plinium perlegissem, comperi Theodorum, alioquin uirum & Græcum natione, & Latine lingue peritissimum, malè Theophrastum hoc in loco fuisse interpretatum, & uocabuli significatum minus rectè accepisse. siquidem, ut apertissimè declarat Plinius lib. xiii. cap. xxii. Adrachne arbor est arbuti admodum similis. Inquit enim, Adrachnem omnes ferè Græci portulacæ nomine interpretantur, cum illa sit herba, & andrachne uocetur, unius literæ diuersitate. Ceterum adrachne est sylvestris arbor, neq; in planis nascens, similis unedoni, folio tantum minore, & nunquam decidente. Hinc ergo facillè colligi potest, huic plantæ, quæ arbuti frondibus perpetuò uiuerecit laurinis similibus, Medicæ mali folia comparasse Theophrastum. Citrea arbor omnibus horis pomifera est: alia namq; matura cadunt, alia maturescunt, alia uerò subnascuntur. Hæ Plinij æuo non erant in Italia, ut ipse testatur lib. xii. cap. iiii. ubi inquit, sæpius tentasse gentes, plantas à Media transferre ad se, quæ tamen ibi diu uiuere nequinerunt, licet magna cultorum solertia fuerint enutrite. Nunc uerò contrà translatione factæ sunt, atq; cum Italosolo tantum iniere gratiam, ut non modò in maritimis, sed in mediterraneis quidem tum hortis, tum uiridarijs, tum etiam nobilium lacuum ripis frequentissimè feliciter germinant. Postquàm cultu, & diligentia Palladij (is enim prouiditur primus artem adinuenisse) factum est, ut ex Media in Italiam translata profuissent, ac propagauerint. Theophrasti ætate Citria mala nondum in ciborum usum uenerant, eorum testimonio, quæ ipse lib. iiii. de plantarum historia memorie prodidit, sed tantum odoris gratia uestibus inferebantur. Quin & eorum usus erat antidoti loco contra uenena, ad quæ demolienda senu præcipuè efficacissimum habent. Refert Athenæus, quòd cum princeps quidam Aegyptius maleficos quosdam damnaisset nebulones, quò suorum facinororum lucrent pœnas, assidibus secundum Aegyptias leges in prædam exponendos, ij Citrium in itinere, dum ad bestiarum pabulum ducerentur, comederunt, quod caupona quædam uicem eorum dolens, atq; miseriam, illis dederat. Mox cum in theatrum descendissent, & ab inimicis, ferocissimisq; feris demorsi essent, nihil sanè molestiæ senserunt. Quæ de re præfectus non paruam cepit admirationem, & à militibus diligenter inquirens, an antidotum aliquod præsumpserint, certior factus est, citriū tantum ex integra simplicitate donatum, eos comedis. Postridie uerò iussit uni præberi, alteri denegari, & denno in theatrum trudi ad supplicium. Quo facto, qui comederat, demorsus nihil incommodi passus est: alter uerò à fera ictus rum uolumine, Clearchum Heracleotam Ponti tyrannum multos ueneno necasse: sed ille, inquit, plures adhuc interfecisset, si populum præstantissima citrij uis latuisset. Seruantur Citria mala diutius incorrupta, si hordei, uel milij acernis obruantur. Sed habita medicinæ ratione, iam de eorum uiribus plenius differendum est. Citria itaq; uenenis aduersantur, eorumq; maximè semen. Citrij decoctum collutione, horis halitum commendat, suauitatemq; accersit. Ipsa autem integra uestiarijs condita, uestes non modò gratissimò odore perfundunt; sed eas etiam à teneis, & blattis uindicant. Si cruda tamen manduntur, non facillè coctioni obediunt: quin & crassum generant succū: ob hoc uesti ijs melle, aut saccharo conditis fuitus est, quòd uentriculum commodè calefaciant, ac roorent: quannus hæc nostra ætas gula nimium indulgens in cibis citria cruda præferat cum assatis carnibus esitata. Citria aduersus atram bilem, & morbos mætos, quos illa excitat, opitulantur. Semen priuatum scorpionum ictibus & potum, & appositum mirificè medetur. Acidus eorum succus fluxum reprimat bilem, arceatq; pestis contagia. Proinde recentiores medicina ad febres pestilentes serapijs ex eo confectis feliciter utuntur. Ea principem in cibis obtinet locum, quæ in lacus Bæniaci ripis proueniunt; quæ etsi parum mala Limonia dicta magnitudine superent; maiorem tamen cæteris ab ore incunt gratiam. Quæ uerò ex Liguria uiridarijs, & Adriatici, & Aegæi pelagi insulis, alijsq; locis afferuntur, etsi melopeponum modo crassescant, speciosaq; magnitudine excellent; cum tamen insipido gustu non multum placeant, in cibis non equè ac illa, præstant: uerum quòd pulpa copiosiore constent, officinis expetuntur saccharo, uel melle asseruanda. Citrii mali meminit Galenus lib. vii. simplicium medic. sic inquit. Mali medicæ fructus non amplius malum medicum, sed ab omnibus Citrium nuncupari adsolet. In semine quidem uiuentem habet qualitatem acidam, & siccam; ut ipsum tertii sit ordinis resiccantium, refrigerantiumq;. In cortice uerò itidem desiccantem temperiem est sortitus, non parum tamen habentem acrimoniæ: proinde desiccet hic secundo excessu, non tamen frigidus est, sed aut temperatus, aut paulò infra. Porro caro eius pariter crassi succi est, & pituitosa, frigidaq; nam & ipsa editur, sicut & cortex. Semen omne edi ineptum est, tum humidum illud, & acidum, de quo primum differui: tum nucleus, qui in illo inuenitur, id quod re uera semen est. Hic amarus est, & digerendi uidelicet, siccaudiq; facultatem obtinens, secundo quodammodo ordine à temperatis recedens. Folia uerò deniq; exiccandi, ac digerendi uim obtinet. hætenus Galenus. Vbi animaduertendum est, quòd cum initio capitis inquit, In semine quidem uiuentem habet qualitatem acidam, & siccam; ut ipsum tertii sit ordinis resiccantium, ac refrigerantium, Galenus non de nucleis intellexit, neq; de uero eorum semine; sed tantum de acido Citrii succo, in cuius medio ubiq; includitur semē. Eam autem fuisse in hoc Galeni sententiam, eius uerba in calce ferè capitis ostendunt, quæ ita sonant. Semen omne sui ineptum est, tum humidum illud, & acidum, de quo primum differui: tum nucleus, qui in illo inuenitur, id quod re uera semen est. Hic amarus est, & discutit, hoc est calefacit, & exicat secundo recessu. Quam rem malè, meo quidem iudicio, assensus Auicenna, utpote qui non rectè distinxerit, neque hæc in re planè Galeni sententiam accersit, libro suorum canonum secundo semini Citrii secundam calidiorum, & siccorum sedem assignauit: tractatu uerò, quem cordis uiribus dicauit, eidem tertium frigidorum, & siccorum classem adscripsit, nullum quidem uerbū faciens de acido Citrii succo, quem à Galeno sub seminis nomine comprehensum fuisse demonstrauimus. Nū longè natūra, & uiribus à citrijs distant mala LIMONIA, & AVRANTIA dicta, & illa, quæ ADAMI poma uulgo

Theodori la  
pius.Citriorū mi-  
ra facultas.Citriorum ui-  
res.Citrii mali  
uires ex Gal.Auicenna no-  
tatur.Limonia, Au-  
rantia, & A-  
dami poma.

uocantur.



uocantur, nos uerò Lomie dicimus: tametsi Limonia, cum sint gustu omnibus ijs speciebus acidiora, ob id succo & frigidiora, & sicciora esse, argumento duci possit. Quin & Aurantia cortice calidiora censend. sunt, quandoquidem is reliquis acrior, atq; amarior gustatu deprehenditur. Aurantiorum (quemadmodum etiam de pumice superius diximus) in Italia tria obseruantur genera, dulcia, acida, & uinolenta, siue mista. Dulcia in omnibus partibus exa-  
 calfaciunt. Aliorum uerò succus refrigerat, prout maiore, seu minore referta sunt aciditate. Quocirca febricitantibus ad restinguendam sitim, acida quidem, & uinosa, non autem dulcia sunt exhibenda. Fit è Limoniorum succo, sicut & citriorum, serapium ad restinguendum bilis feruorem non inutile. Item & ad pestilentes febres, & eas, quæ contagione non uacant. Aqua, quæ è Limoniorum succo calentis aquæ balneo, & uitreis organis extrahitur, præterquam quòd mulieribus expetitur pro succo ac faciem expoliendam, utiligines ubicumq; sint, & totius corporis maculas emendat, uaros delet, & acaros interimit. Serapijs admista febribus acutis, et contagiosis mirè succurrit. Epos-  
 ta uentris tineas enecat: id quod etiam præstat succus recenter expressus, uncie pondere potus. Ceterum non pa-  
 rum laboris impendisse uidetur Brasauolus in præfatione sui de simplicium examine libri, ut doceret, unde emanau-  
 rit Arantiorum uocabulum. Sed licet ibi plura de eius origine referat; ea tamen meo quidem iudicio, nò multum no-  
 mini quadrant. Quandoquidem ego potius existimauerim, uulgò Arantia, quasi Aurantia, altera expuncta litera, di-  
 cta fuisse. Nam cum hæc poma auri colore reluceant, ab auro merito nomen accepisse uidentur: unde, quantum  
 dem reor, Aurantia, hoc est, aurea mala dicta fuere. Reliquum est, ut singulis malis sua reddamus nomina. Mala  
 ita Latinis dicta, Græcis μήλα uocantur: Arabibus, Tuffa, seu Tufaba: Italis, Mele: Germanis, Oepffel: Hispani-  
 nis, Mansanas: Gallis, pomes. Ea uerò, quæ Græcè χρυσία μήλα, Latine Cotonea, & Cydonia mala dicuntur:  
 Arabicè Saffargel: Italicè, Mele cotogne: Germanicè, Quitten, aut Kuttien: Hispanicè, Membrillos, & Marmelo-  
 los: Gallicè, Conting. Quæ autem Græcum nomen habent μελίμυρα, ἢ γλυκύμυρα, eorum Latinum est Mellis-  
 ta, uel Dulcia mala: Arabicum, Melomella, & Galopomella: Italicum, Mele dolci. Mala, quæ περισπῆστα μήλα,  
 καὶ ποδάρινα Græco nomine, Latino Persica mala appellantur: Arabico, Sauch, seu Chauch: Italicè, Pesche:  
 Germanico, Pfersch: Hispanico, Pexegos: Gallico, Pesches. Μήλα ἀρμενιανὰ, παρὰ κόκκινια, καὶ βερβοκίττα  
 quæ Græci, Latini Armeniaca mala, & Præcocia nominant: Mauritani, Mermex seu Mirmix, Mex, Mesmes, siue  
 Mismis: Itali, Armeniache, Bacoche, Moniache, & Grisomele: Germani, S. Iohans pfersch: Hispani, Albrico-  
 ques, Albarchigas, & Aluaricoques: Galli, Abricot. Mala deniq; Μυδικὰ μήλα, ἢ κεδρόμυρα à Græcis uocata,  
 Latinis similiter Medica mala, aut Citromala, & Citra dicuntur: Italis, Cedri, & Citroni: Germanis, Citrin oepf-  
 fel, Iuden oepffel, & Citronaten: Hispanis, Cidras: Gallis, ung Citron.

Nomina.

## Pyra.

## Cap. CXXXII.

Pyrorum cō-  
sideratio.

Pyrorum multa genera. Quæ tamen omnia ad-  
 stringunt: proinde adduntur conuenienter in repellen-  
 tia cataplasmata. Decoctum è siccis, & cruda ipsa aluum  
 sistunt: ieiunos esitata lædunt. Achras pyrastri genus  
 est, quod tardissimè maturescit. Vim pyro adstringen-  
 tiorem habet, & ad eadem conuenit. stringunt etiam e-  
 ius folia. Ligni pyrorum cinis efficaciter his auxiliatur,  
 quos fungi strangulant. Aiunt fungos, si syluestria pyra  
 cum eis coquantur, innoxios fieri.

QVONIAM Pyra uulgatissima sunt non modò in Italia,  
 sed ubiq; in tota Europa; ideo superuacaneum duxi eorum arbo-  
 res per historiam explicare. Multa, ac uaria apud nos Pyrorum  
 numerantur genera, quemadmodum & apud antiquos. Qui, ut  
 Plinius refert libro, & capite xv. celebrauere superba, salerni-  
 decumiana, dolobelliana, pompeiana, liceriana, seueriana, tyran-  
 niana, fauoniana, lateriana, anitiana, tiberiana, signina, purpu-  
 rea, sementina, laurea, amphorina, coriolana, cucurbitana, &  
 alia, quorum enumeratio longa foret. Quas sanè uarias appella-  
 tiones mutuata sunt, uel ab hominibus, qui primum ea in ciborum  
 usum reuocarunt; uel à locis, unde uenerant; aut à notis, quas ali-  
 quibus fructibus acceptas referebant; aut à colore proprio; aut  
 à tempore, in quo ab arboribus decerpebantur. In hoc itaq; nos  
 stri quoq; Hetrusci antiquorum consuetudinem secuti, uarijs no-  
 minibus à diuersis inditis causis sua Pyra uulgò appellat: moscha-  
 telle, giugnole, ciampoline, roggie, ghiacciuole, spinose, quadra-  
 ne, carouelle, papali, san Nicolo, durelle, zuccaie, campane, uera-  
 nareccie, gentili, porcine, sementine, & plura alia habent alijs  
 nomenclaturis appellata. Ceterum si quis uellet in nostratibus ue-  
 niri

Pyrorum fa-  
cultas.

torum Pyra collatione assequi, operæpretium esset, ut unumquodq; eorum genus peculiarem, perspicuamq; habuisset  
 descriptionem: quandoquidem fieri non potest, ut ex sola nomenclatura innotescant. Porro in uniuersum de eorū



uiribus differentes, dicamus, sicuti etiam de malis diximus, quod pyrorum facultates, ex saporibus gustu dignoscuntur: cum dulcia natura distent ab acerbis, acidis, austeris, & ab his, quæ unum, uel plures præ se ferunt saporis: & contrà, hæc deinceps ab illis sint diuersa. Pyra (ut scriptum reliquit Galenus lib. v. simplicium medic.) esu stomachico grata sunt, quin & uim habent exiccandi. Atqui syluestribus magis adstringendi facultas inest: ob id etiam magis præstant contra fluxiones. Et libro II. de alimentorum facultatibus ita scribit. Quæ de malis diximus, si omnia ad pyra, & punica transferantur, nihil nouo alio super his sermone opus erit. Nam in ijs quoque alia austera tantum, uel acerbiora apparent: ueluti quedam acida, quedam dulcia, quedam denique ex horum mixture composita: sunt quæ nullam penitus huiusmodi qualitatem exuperantem habent: quo fit, ut cum aquea sint, ac hebetiora, nulla roborandi ui polleant. Talis igitur omnino pyrorum usus, qualis malorum. At pyris, præsertimque grandibus, quæ apud nos mesate uocantur, aliqua alendi facultas donata est. Proinde ea secta in tenues orbiculos, siccataque reponunt. Quibus coctis per hyemem, & uer, cum fames est, ciborum parum nutrientium uice uestuntur. Pyri fructus, qui ἄπια Græcis, Latinis Pyra dicuntur: Arabibus, Humechte, Cirmetre, seu Kemetri: Italis, Pere: Germanis, Byren: Hispanis, Peras: Gallis, Poires.

Pyrorum uires ex Gal.

Nomina.

MESPIVS PRIMA.



Mespilus.

MESPIVS ALTERA.



Cap. CXXXIII.

MESPIVS, quæ à nonnullis aronia uocatur, spinosa arbor est, folio t pyracanthæ, siue oxyacanthæ. Fert pomum suaue, exiguo malo non dissimile, tribus intus ossiculis: qua ex causa id nonnulli tricoccon appellauere. Tardè maturefcit, esu adstringit, stomacho gratum est, aluumque supprimit. Alterum mespili genus in Italia nascitur, quod aliqui setanium, alij epimelida uocant. Arbor folijs, mali, sed minoribus. Pomum fert rotundum, esui aptum, umbilico latiore: quod adstringit, seroque maturefcit.

MESPILORVM hic à Dioscoride duo recensentur genera: quorum illa, quæ folijs est pyracanthæ, siue oxyacanthæ nostratibus hæc quaquam adstipulari uidetur. Quippe (ut sensu patet) nostrates Mespili folijs oblongis, laurinis ferè similibus uirent, non autem apii modo per ambitum incisis, ueluti oxyacanthæ. Fructum ferant non quidem gustatu suaue, sed potius iniucundum, quod acerbior sit, & austerior. Quin & is quina includit ossicula, non sanè terna, ut primo Mespilorum generi assignat Dioscorides. Ceterum si fructum profert Italia, qui priori Mespilo legitime adscribi possit, eius nimirum arboris erit, quæ Neapoli, ubi copiosa feritur in hortis, uiridartii, ac uiridartii, Azarolo uulgo nominatur. Huius plures plantas uidi ego primum Neapoli in amplissimo uiridario Pompei Cardinalis

Mespilorum confid.



Azaroli de-  
scriptio.

dinalis à Columna uia, qua itur ad poëta Maronis sepulcrum, uel ut uulgò dicunt à Pedigrotta. Arbor est mediocris, proceritatis, cortice, ac materia pruno haud abstinilis: spinis borrida, non tamen admodum acutis: folijs laciniatis, apij æmulis. Ex quo perspicitur potest, eos Dioscoridis codices hoc loco scaterere mendis, in quibus deprauatè legitur, hanc arborem folijs esse pyxacanthæ, non autem, ut legitimè legi debet, oxyacanthæ. Nam (ut superius suo loco explicauimus) oxyacanthæ folijs germinat dissectis; pyxacanthæ uerò buxi modo oblongis. Cuius rei illud manifestum est iudicio, quod de hoc Mespilorum genere posteritatis memoria prodidit Theophrastus lib. III. cap. XII. cum inquit. Magnitudine arbor ista excellit, gyroq; comatur. Folium magna ex parte infissum, quod uel apium parte postrema imitatur, ampliore figura, quodq; promissum, neruosum, apio tenuius, oblongius, totumq; circumtusum est, & pediculo tenui, ac longo dependet: antequàm decidat, uehementer rubet. Radice numerosa, altaq; arbor coheret: ob id diuturna, & inextirpabilis est. hætenus Theophrastus. Quæ sanè uerba certo sunt argumento, eam Dioscoridis lectionem planè deprauatam esse, quæ huic Mespilorum generi pyxacanthæ frondes reddit. Quinetiam folium explicant oxyacanthæ à Dioscoride eius in historia silentio dissimulatum, quod scilicet apij modo per ambitum sit dissectum. Sed illud etiam non ignorandum, tantam oxyacanthæ cum hac Mespilo intercessisse cognationem, ut si Mespilus hæc oxyacanthæ inferatur, omnium speciosissima proueniat, & longè magis fructifera euadat. Sed ut redeamus eò, unde codicis menda, quæ librariorum incuria est, nos diduxerant, dicimus, quod Azaroli uocata fructus nullis prorsus notis reclamant Mespilis, quæ primo loco à Dioscoride descripta sunt. Siquidem ij exigui sunt, terna includunt oscicula alijs Mespilis duriora; quanquam magnitudine, & forma dissimili, seram sentiunt maturitatem, origrati habentur, stomacho non iniucundi, & reliquis deniq; notis, ac qualitatibus illorum speciem adeò repræsentant, ut non aliud hac in re asserendum putauerim, quàm quod idem sint Azarola, & Dioscoridis Mespila à quibusdam Aronia dicta. Quæ porro Mespili aliquibus Sætania, & Epimelides appellantur, uulgaribus nostratibus colata, nihil inter se dissentire comperiuntur. Quapropter nil mirum scriptis mandasse, Dioscoridem, alterum hoc Mespili genus copiosum in Italia nasci. Veruntamen Galenum Epimelidis appellatione aliam arborem à nostratibus Mespilis diuersam fuisse, liquidò constat. Quandoquidem libro VI. simplicium medicamentorum scribit, eius fructum acerbum esse, & uentriculo noxium. Epimelida autem à rusticis Italia unedonem nominari. Hoc insuper illud

Mespilus al-  
tera.

Serap. lapsus.

Mespilorum  
uires et Gal.

confirmat, quod Galenus de utroque Mespilorum genere, seorsum diuersis capitibus tradiderit. In Mespilorum historia Serapio apertè hallucinari deprehenditur: quippe qui sorbi titulo omnia referat, quæ de utroque Mespilorum genere scripsit Dioscorides. Verum etsi hæc in re is quidem aberrat; declarat tamen primum Mespili genus nobis Italici Mauritani fecutis Azarolum esse: nãque is Arabico idiomate Mespila Zaror appellat. Mespilorum uires recensuit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Mespili fructum, alij tricoccum nominant, quod tria intus in uniuersum gerat grana, quorum unumquodq; arboris est semen, ceu ea, quæ in malis inueniuntur, ipsius mali; & acini, ipsius uitis; & ficus, minuta illa grana, quas cenchramidas Græci uocant. Arboris huius fructus admodum acerbis est, uixq; edi potest, uentrem strenuè coercens. Quin & in germinibus, & folijs acerbæ hæc qualitas non pauca reperitur. Et libro II. de alimentorum facultatibus sic inquit. Horum eadem quæ prædictis est ratio. Ambo enim adstringunt, sed multò fortius Mespila, quàm sorba. Quamobrem alio fluenti in cibo accommodatissimè exhibentur: sorba tamen ipsis sunt suauiora. Prorsus nãque nihil acerbis, uti Mespila obstruunt, sed succus eorum citra acerbitem austerus est. Illud porro neminem puto latere; hæc omnia parè, non affertim, ut ficus, uuasq; esse comedenda: nequaquam enim eis, ut cibus, sed ut medicamentis potius indigemus. Hæc nouisse longè tibi fuerit utilius, quàm si primam huius dictionis ὄνον syllabam ab antiquis Atheniensibus per, o, solam prolatam, scriptamq; fuisse cognoscas. Arbor μέσπιλον, ἢ μεσπίλην Græcis, Latini item Mespilus, & Mespila nominatur: Arabibus, Zaror, seu Zarur, & Alzarur: Italis, Nespolo: Germanis, Nespel: Hispanis, Nespelras: Gallis, Nespier.

Nomina.

† Ne uideamur hic temerè communem lectionem immutasse, quæ est pyxacanthæ, lecti orem admonere non alienum duximus, uariam esse huius loci scripturam in Græcis tum impressis, tum uetustis exemplaribus. Verum ea nobis magis probanda uisa sunt, quæ habent pyrachantham, uel oxyacantham (idem enim esse putamus) innixi rationibus, quas in commentario adduximus.

## Lotus Arbor.

## Cap. CXXX.III.

LOTUS arbor est vastæ magnitudinis, ferens baccam pipere maiorem, dulcem, cibus gratam, stomacho facilem. Aluum sistit baccis. Ramentorum ligni decoctum siue potu, siue infusione dysentericis, ac scæminis fluxione vuluæ laborantibus, auxilio est: rufat capillos: citam, aluum cohibet.

Loti arboris  
historia.

LOTUS arbor Latinis Celtis uocatur. Differentiæ generum plures (ut libro & capite IIII. de plantarum historia prodidit Theophrastus) eaq; maxime fructum uarietate inter se discreta produntur. Sed Loti proprium genus consurgit pyri magnitudine, aut paulò minore: folijs per ambitum serratis, alioqui illeicis uiderentur. Fructum profert magnitudine fabæ, qui uuarum modo maturefcit, uariè colores immutans, gustatu prædulcis, suauis, atq; etià stomacho salubris. Gignitur alter absq; interiore nucleo, qui non modò cæteris præfertur, quod uentriculo suauior sit; sed etiam quod uinum reddat. Numerosa hæc arbor in Pharide insula, ideo Lotophagia uocata, quod inibi Loti fructu uictitent incolæ. Cæterum non minor Lotorū copia in continenti, sed longè largior: plurima enim hæc in Africa, ubi tanta fructus & arboris copia narratur, ut diebus pluribus exercitum Ophelli cartaginem petentis in cœu meatuum defectu, hoc tantum fructu uictitasse, ex historijs habeatur. Scribit Plinius lib. XII. cap. XVI. Loti arboris etate



## LOTVS.



etate sua exitisse Italiae familiarem, ac uulgo cognitam, licet mutato solo, cœliq; climate, unde nobis allata est, à grata illa fructuum dulcedine degenerauerit. Dioscorides non alijs notis reddidit Lotum, quam quod arbor esset uaste proceritatis. Cui subscribens Plinius lib. xvi. cap. xxx. sic inquit. Lotus præcipue domibus expetitur, ramorum petulantia, latissima expantantium umbra, & in uicinas domos sæpe transilientium. Item eodem loco ita scribit. Loti fructus sylvestris quidem est, sed cerasorum penè natura, nulli breuior opacitas, nec aufert solem hyeme decidentibus folijs. Nulli cortex iucundior, aut oculos excipiens blandius. Nulli rami longiores, ualidioresq; aut plures, ut dixisse totidem arbores liceat. Cortice pelles tingunt, radice lanas. Quamobrem putauerim ego, si modo hodie Loti nascuntur in Italia, eum non aberrare, qui ueram lotum, præsertim Dioscoridi, & Plinio, eam esse arborem dixerit, quæ in Tridentino, & Goritienfi agro uulgo Bagolaro uocatur: in Veronensi uero, & in alijs quibusdam Italiae locis Perlaro. Siquidem licet harum arborum multæ pyri magnitudinem æquent; plæræque tamen conspiciuntur, quæ longè pyrum proceritate uincunt. Hæ itaq; præterquam quod caudice constant crassissimo, ramis latissimis in altitudinem se extollentibus; cortice spectantur læui, colore in cæruleum nigrescente. Quo fit, ut is grato coloris aspectu respicientium oculos mirum in modum ad se alluciat, ut tradidit Plinius. Folijs uirenti ilici proximis, per ambitum ferratis, asperisq; quæ medio autumnio flaccescunt. Fructus eis cerasorum similitudine, qui ut illa, longiore pediculo pendet. Is primo uiret, mox in candidum flauescit, deinde per maturitatem rubescit: denique, postquam maturuerit, nigricat, gustu suauis, non ingrato. Quæ omnes huiusce arboris delineationes, ac notæ Theophrasti, Dioscoridis, & Plinii loto planè respondere uidentur. Quare non equidem diffitebor, Lotum quoq; hoc

Lotus Italica

Ruellij error

Loti uires ex Galeno.

quo Italiae esse copiosam. Ceterum nescierim ego, quorum testimonio, & auctoritate fretus Ruellius lotum existimauerit plantam exiguam illam, quam Hetrusci uulgo Agrifolio dicunt: è cuius cortice (ut superius de paliuro disserentes diximus) uti ex uiburno nostro, uulgo uero lantana, quidam uiscum conficiunt, quo anes capiuntur. Quæ sane opinio tantum abest ab historia loti, quam ex Theophrasto, Plinioq; retulimus, ut etiam ei prorsus aduerseur. Quippe quoniam Agrifolium arbor est, perpetua uirens coma, folijs admodum per ambitum aculeatis, exigua proceritate, & cortice uiridi: quæ notæ penitus loti descriptioni repugnant. Lotum scriptis tradidit Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, his uerbis. Lotus arbor non ita multæ adstrictoriæ qualitatis est particeps, sed tenuium partium est, & exiccatoria. Itaque lignorum ipsorum ramenta muliebri accommodantur profluvio, & dysenterijs, & cœliaci affectibus. Decoquantur uero interim in aqua, interim in uino, nimirum prout usus poposcerit, nec infunduntur tantum, sed & bibuntur. Quinctiam quod pilos defluentes cohibeat, non paruum signum est ipsum adstringentis esse cuiusdam, similiter mediocriter desiccantis facultatis. Dictum quippe est & in sermone de ladano, eiusmodi esse facultatis oportere, quod fluentes capillos esset cohibiturum. Planta, quæ Græcis λωτός dicitur, Latinis Lotus arbor, & Celtis appellatur: Arabibus, Sadar, Sedar, seu Alsadar: Italis, Loto albero: Hispanis, Almez.

## Cornus.

## Cap. CXXXV.

CORNVS dura arbor est, baccas ferens oliuæ modo oblongas, quæ primùm uirent, dein per maturitatem rubescunt, aut ceræ colorem repræsentant. In cibo adstringunt: profluvio alui, atque dysentericiæ salutare, siue in edulio, siue in defruto exhibeantur. Muria, ut oliuæ, condiuntur. Sanies, quam uirentia folia torrendo resudarunt, impetigini conuenienter illinitur.

CORNVS est uulgaris notitiæ. Ceterum (ut lib. iii. de plantarum historia, cap. xii. memoriæ prodidit Theophrastus) sexus in ea duplex inuenitur. Namq; consurgit mas duodecim cubitorum altitudine: folio amygdalæ, nisi quod pinguius, crassiusq;: cortice neruoso, & tenui: caudice non minus crasso. Fœmina uirgas paruas, sicut salix amerina, suo latere proferri, & fruticosior est. Nodos ambæ, perinde ac uitex, tum geminatos, tum inuicem congruos habent. Materies maris excors, totaq; solida, cornibus densitate, firmitateq; similis, unde illi nomen. Fœminæ uero medullam continet, & mollior est, atque cauatur: ob id ad uenabulorum usum inutilis. Qui Idam Troianam incolunt, marem sterilem dicunt; fœminam autem fructuosam. Nucleum fructus oliuæ similem habet, gustu dulcis, odoratuq; gratus. Flos oleæ, & floret, fructificatq; eodem modo, ut singulari pediculo plura proferat. In Macedonia uero (ueluti etiam in Italia) ambæ fructiferae sunt: sed mas per æstatem, fœmina uero per autumnum

Corni consideratio.

baccas



## CORNVS.

Theophrasti  
locus suspen-  
sus.

Cornorum  
usus in cibis.

Corni uires  
ex Galeno.

Nomina.



## SORBVS.

Sorborum con-  
sideratio.

Sorborum ui-  
res ex Gal.

Nomina.



baccas maturat, huius tamen bacca tantum mascula bonitate ce-  
dunt, ut manduix possint. Porro cauendum est, ne Corni arbo-  
res prope aluearia conferantur, uel à natura productæ ibidem  
permittantur: quandoquidem apes flore eius degustato aluo citius  
ta commoriantur. At certe mirandum est, quod scriptis man-  
dauit Theophrastus, Cornum arboræ amygdalæ folio uirescere,  
cum longè diuerso prorumpat. Eaq; propter dixerim ego, aut in  
Theophrasti exemplaribus hoc loco mendum subesse, aut in Ida  
monte prope Troiam tum soli, tum etiam cæli magis æstuantem na-  
tura, corno folia adeo restringi, ut amygdalæ quadantenus amu-  
la uideantur: etsi, meo quidem iudicio, potius putandum sit, Theo-  
phrasti lectionem hoc in loco deprauatam esse. Fit ex baccas-  
rum pulpa quoddam obsonij genus cydonite non dissimile. Quin-  
 & ex eorum decocto, & saccharo liquor ignis opere, & coctus  
ra concreuit, coagulaturq; qui præterquam quod gratissimo  
placeat gustu, datur utiliter dysentericis, ac foeminis mensium  
profluuiio laborantibus. Corni uires memoriæ prodidit Gale-  
nus libro VII. de simplicium medicamentorum facultate, sic ut  
quies. Corni arboris fructus admodum accrus est, esui aptus.  
Itaque mirum uideri non debet, ipsum ualenter uentrem restrin-  
gere, sicut & mespila. Folia quoque, & germina gustu acerb-  
sunt, ualenterq; desiccant. Itaque maxima uulnera glutinare  
possunt, potissimum durorum corporum: at paruis uulneribus,  
& mollioribus corporibus magis contraria sunt. Nam nimium  
ea contendunt, ac plus satis desiccant. Arbor, quæ Græcis  
κρημύδα, Latinis Cornus uocatur: Italis, Corniolo, ueluti sine-  
lus eius Cornole: Germanis arbor, Cornelbaum, Kurbeerbaum,  
et Dierlem: fructus uero Vuelsch Kirsen: Hispanis, Cornizolo,  
Gallis, Cornier.

## Sorba. Cap. CXXXVI.

SORBA colorem luteum referentia, priusquam  
maturefcat, dissecta, & sole siccata manduntur, ut al-  
uum sistant. Eadem est functio molitorum farinae, si  
polentæ loco sumatur. Quod & decoctum eorum in po-  
tu præstat.

SORBA fructus sunt in Italia uulgatissimi, nullisq; non co-  
gniti. Veruntamen illud non duxi prætereundum (ut hic nonnulli  
la perstringam ex his, quæ de Sorbis latius tradit Theophra-  
stus libro III. cap. XII. de stirpium historia) quod in sorbo  
etiam maris, ac scæminæ differentia dignoscitur, certo quidem  
argumento, quod una sterilis sit; altera uero fructifera. Quia  
etiam in pomis discrimen, quod alia sint orbiculata, & succo  
doratiore, dulcioreq; placeant: alia uero onata, ut quæ etiam  
pyri effigiem representent, gustui acidiora, & asperiora præ-  
dictis, minusq; olentia. Sunt & syluatica Sorba, quæ maturi-  
tatem adepta ori non insuauia habentur. Hæc adstrictoria ui do-  
mesticis longè excellunt; si tamen immatura insolentur.

Sorba, testimonio Galeni tum libro VIII. simplicium me-  
dicamentorum, tum libro II. de alimentorum facultatibus, ean-  
dem adstringendi naturam præstant, quam mespila, sed imbecil-  
liore effectu. Væque tamen in medico usu magis, quam in ci-  
bis expetuntur, probanturq;. Sorbi fructus Græci Οἰα, La-  
tini Sorba: Itali, Sorbe: Germani, Speierling, Sporepffel,  
Sperbieren: Hispanis, Sorbas: Galli, Corniera nominant.



## Prunus.

## Cap. CXXXVII.

PRVNVS arbor est nota. Cuius pomum estur, sed stomachum malè habet, aluum molliat. Syriaca pruna, & præcipuè quæ Damasci gignuntur, exiccata stomacho utilia sunt: aluum adstringunt. Folia pruni in uino decocta collutione, & gargarizatu, uiam, gingiuas, & tonsillas fluxione laborantes reprimunt. Præstant idem syluestrium Prunorum baccæ, post maturitatem exiccata: cum sapa uerò decoctæ stomacho utiliores redduntur, aluumque magis adstringunt. Gummi prunorum agglutinat potum in uino calculos comminuit: ex aceto quoque illitum, lichenas infantium sanat.

PRVNORVM differentie inexplicabiles ferè sunt. Nam Prunorù cõsideratio. alia reperiuntur herbaceo colore perfusa, alia rubeo, alia eburneo, alia luteo, alia purpureo: quædam deinde magna, quædam uerò parua, quædam mediocria: dulcia nonnulla, alia acida, alia uinosa, alia dura, alia mollia: alia denique rotunda, alia oblonga, alia ouata conspiciuntur. Cæterum licet Dioscorides pruna Damascena sicca aluum sistere prodiderit: Galenus tamen aliter sensisse uidetur septimo simplicium censu, ubi sic inquit. Pruni fructus uentrem subducit; recens quidem plus, aridus uerò minus. Sed haud scio, cur Dioscorides pruna Damascena siccata uentrem sistere dicat, cum et ipsa perspicuo soluant, minus tamen ijs, quæ importantur ex Iberia. hætenus Galenus. Atqui in hoc Brasauolus Ferrariensis medicus nostræ ætatis clarissimus, apertè refragatur Galeno in simplicium medicamentorum omnium peritissimo æquè atque doctissimo, suo de simplicium examine, ubi Galenum scribit hac in re, non Dioscoridem fuisse deceptum. Quippe quod Galenus non animaduernerit, Dioscoridem de siccis prunis Damascenis loqui: quæ præterquam quod sicca sunt, gustu etiam acida sentiuntur, et adstringentia. Quæ quidem in re Brasauolus potius (pace sua dixerim) planè hallucinatus, et à recto ueritatis tramite lapsus deprehenditur. Quandoquidem non meminerit, quod non solum pruna Damascena sicca; sed etiam alia quam plurima simplicia medicamenta deiectionem simul et adstringentem uim obtinent, ut manifesto testimonio sunt tamarindi, et myrobalana omne genus: item rhabarbarum, et alia pleraque, quæ præter id quod primum aluum deiciant, postea illam adstrictam relinquunt. Quam sanè prunorum facultatem et si Brasauolus non perpenderit; Galenus tamen optimè nouit, et expertus est. Idcirco cum loco citato pruna Damascena sicca aluum ciere tradiderit, eadem etiam adstrictoria ui pollere, lib. 11. de aliment. facultatibus his uerbis attestatur. Prunis æquè ac ficibus concessum est, ut uel exiccata utilia permaneant. Damascenis à Damasco Syriæ monte, in quo nascuntur, appellatis, prima laus bonitatis magna hominum opinione deferretur. Proxima ijs, quæ in Iberia, et Hispania proueniunt. Verum hæc quidem nihil adstrictionis præ se ferunt: nonnulla uerò Damascenorum uel plurimum. Probatissima in his sunt, quæ cum mediocri adstrictione, magna, laxa quoque sunt. At parua, dura, acerbæque et in cibo praua sunt, et uentri subducendo minus idonea. hæc Galenus. Ex cuius uerbis satis constare arbitror, nulla ferè ratione, nec nisi inualidis admodum argumentis Brasauolum adductum fuisse, ut hac in re Galenum ipsum accusaret, quasi Galenus omnino ignorauerit, quam sapores, quam odores, quam cetera denique non fructuum modò; sed et omnium ferè simplicium medicamentorum qualitates naturam, et facultatem sortitæ essent. De quibus omnibus adeo doctè, et copiosè disputauit, ut parem unquam repererit neminem, ut omnibus perspicuum est ex suis primis quinque libris, quos de simplicium medicamentorum facultatibus accuratissimè conscripsit. Huic sententiæ æquè et rationibus accedit quoque communis medicorum experientia: nempe quod compertum sit, pruna Damascena laudatissima, ijs similia, quæ Galeno præferuntur, esu uentrem soluere non inefficaciter, adstricta aluo postmodum relictæ, tamarindorum, et myrobalanorum modo. Sic igitur Galenum à Brasauoli reprehensione seruasse uolumus. Sed si Dioscoridem quoque tueri uelimus, nil aliud dicendum putauerim, quam quod pruna Damascena siccata aluum adstringere tradiderit, ut referuntur ad alia, quæ minus adstringunt: non tamen, quod uoluerit, ea esse deiectionis facultatis expertia. Porro pruna bilem deiciunt: proinde ea utiliter usurpant medici ad febres, aliosque biliosos affectus. Quin et seplasiarii expetuntur: quippe qui ex ijs quotannis electaria, intinctus, liquoresque uarios parare consueuerint, quibus non modò sani gustu non ingrato delectantur; sed etiam qui languent, resocillantur. Habetur et in Aegypto prunus (ut Theophrastus est auctor lib. 1111. cap. 111. de plantarum historia) insignis magnitudinis, fructum ferens natura, et magnitudine mespilis proximum; nisi quod rotundum nuculeum habet. Florere incipit mense Iulio, fructum circa brumam perficit, nec folia dimittit. Qui circa agrum Thebanum habitant, propter arboris copiam fructum siccant, et osse exempto tundunt, offasque faciunt. Non dissimulandum.

Galeni tute-  
la contra Bra-  
sauolum.

Prunorum  
usus.



tiam acida sentiuntur, et adstringentia. Quæ quidem in re Brasauolus potius (pace sua dixerim) planè hallucinatus, et à recto ueritatis tramite lapsus deprehenditur. Quandoquidem non meminerit, quod non solum pruna Damascena sicca; sed etiam alia quam plurima simplicia medicamenta deiectionem simul et adstringentem uim obtinent, ut manifesto testimonio sunt tamarindi, et myrobalana omne genus: item rhabarbarum, et alia pleraque, quæ præter id quod primum aluum deiciant, postea illam adstrictam relinquunt. Quam sanè prunorum facultatem et si Brasauolus non perpenderit; Galenus tamen optimè nouit, et expertus est. Idcirco cum loco citato pruna Damascena sicca aluum ciere tradiderit, eadem etiam adstrictoria ui pollere, lib. 11. de aliment. facultatibus his uerbis attestatur. Prunis æquè ac ficibus concessum est, ut uel exiccata utilia permaneant. Damascenis à Damasco Syriæ monte, in quo nascuntur, appellatis, prima laus bonitatis magna hominum opinione deferretur. Proxima ijs, quæ in Iberia, et Hispania proueniunt. Verum hæc quidem nihil adstrictionis præ se ferunt: nonnulla uerò Damascenorum uel plurimum. Probatissima in his sunt, quæ cum mediocri adstrictione, magna, laxa quoque sunt. At parua, dura, acerbæque et in cibo praua sunt, et uentri subducendo minus idonea. hæc Galenus. Ex cuius uerbis satis constare arbitror, nulla ferè ratione, nec nisi inualidis admodum argumentis Brasauolum adductum fuisse, ut hac in re Galenum ipsum accusaret, quasi Galenus omnino ignorauerit, quam sapores, quam odores, quam cetera denique non fructuum modò; sed et omnium ferè simplicium medicamentorum qualitates naturam, et facultatem sortitæ essent. De quibus omnibus adeo doctè, et copiosè disputauit, ut parem unquam repererit neminem, ut omnibus perspicuum est ex suis primis quinque libris, quos de simplicium medicamentorum facultatibus accuratissimè conscripsit. Huic sententiæ æquè et rationibus accedit quoque communis medicorum experientia: nempe quod compertum sit, pruna Damascena laudatissima, ijs similia, quæ Galeno præferuntur, esu uentrem soluere non inefficaciter, adstricta aluo postmodum relictæ, tamarindorum, et myrobalanorum modo. Sic igitur Galenum à Brasauoli reprehensione seruasse uolumus. Sed si Dioscoridem quoque tueri uelimus, nil aliud dicendum putauerim, quam quod pruna Damascena siccata aluum adstringere tradiderit, ut referuntur ad alia, quæ minus adstringunt: non tamen, quod uoluerit, ea esse deiectionis facultatis expertia. Porro pruna bilem deiciunt: proinde ea utiliter usurpant medici ad febres, aliosque biliosos affectus. Quin et seplasiarii expetuntur: quippe qui ex ijs quotannis electaria, intinctus, liquoresque uarios parare consueuerint, quibus non modò sani gustu non ingrato delectantur; sed etiam qui languent, resocillantur. Habetur et in Aegypto prunus (ut Theophrastus est auctor lib. 1111. cap. 111. de plantarum historia) insignis magnitudinis, fructum ferens natura, et magnitudine mespilis proximum; nisi quod rotundum nuculeum habet. Florere incipit mense Iulio, fructum circa brumam perficit, nec folia dimittit. Qui circa agrum Thebanum habitant, propter arboris copiam fructum siccant, et osse exempto tundunt, offasque faciunt. Non dissimulandum.



Sebesten cō-  
sideratio.

Fuchsi op-  
inio reproba-  
ta.

dent effigie à prunis, nec dissimili admodum sunt facultate fructus ij, quos officina Arabes secute SEBESTEN nominant, quiq; Græcis Myxa, & Myxaria uocantur. Quòd etsi Dioscorides, & Galenus horum suis monumentis non meminerint; de ijs tamen à posterioribus Græcis, nempe Paulo, Actio, Psello, & Actuário frequens facta fuit mentio. Arbores feri in Italia cœperunt Plinij ætate: nunc uerò non ubique familiares, sed raris admodum horis, & uiridarijs uiuent. Arbor est pruno ualde similis, ei tamen magnitudine cedens. Cortex caudici candidat, raris uerò uiuet. Folijs comatur rotundis, ac firmis. Fructus adolefcunt exigui pruni magnitudine, nucleo intrinsecus angulari forma, qui satis baccae proportionem respondet. Fructus maturitatem adepti, in atrum uirescunt, gustu sunt prædulci, ac lentæ, tenaciq; pulpa. Ex qua Syri, & Aegyptij uiscum conficiunt, quod Venetijs Alexandrinum appellant, aucupijs commodissimum. Argumento sunt nuclei, qui in eo reperiuntur, color, & dulcedo, quæ gustatè deprehenditur. Pollent autem deiectionaria facultate, non secus atque pruna, tam Græcorum, quam Arabum testimo-  
nio: id quod etiam comprobatur quotidiana medicorum experientia. Tametsi contrarium senserit Fuchsius me-  
dicus hac nostra ætate celeberrimus: quippe qui suis in paradoxis cap. XXVII. ut fortasse in Arabes inueheretur, quos ubique ferè odisse uidetur, nullam Sebestenis deiectionariam esse facultatem contendit, quin potius ea adstrictoria ui pollere. Sed longè dissentit ab eo opinio nostra, & uulgata, comprobataq; continua medicorum experientia. Quandoquidem quòd Sebestena assumpta in medicamentis aluum cieant, testis in primis est Paulus Aegineta, qui li-  
bro VII. de ijs uerba faciens, sic inquit. Myxa arboris fructus est, minor quidem prunis, facultate uerò constan-  
tis. Ex quibus Pauli uerbis elicitur, quòd ita uentrem molliant Sebestena, quemadmodum pruna. de quibus idem dis-  
serens eodem libro Galenum secutus: Pruni fructus, inquit, uentrem subducit, recens quidem magis, aridus uerò mi-  
nus. Neq; huius rei nescius Actuarius hæc pluribus commiscet medicamentis, quæ bilem eiciunt, ut uidere est suo  
de compositione medicamentorum compendio. Eorum insuper deiciendæ alui facultatem maxime comprobant uul-  
garis experientia, clarissimum omnium lumen. Siquidem (ut iam millies expertus sum) eorum pulpa drachmarum  
decem pondere deuorata, aut ad summum duodecim, eosdem ferè prebet effectus, quos Aegyptia siliqua casia uocati.  
His ergo rationibus, & auctoritatibus adducor, ut illam quoq; Fuchsi opinionem minus probem, quæ est, quòd ec-  
tuarium de Sebesten officinis dictum uentrem deiciat, non Sebestenorum facultate, sed aliorum simplicium medica-  
mentorum deiectionaria ui prædicatorum, quæ ijs adduntur. Nam si id per se præstant, ut ostendimus, idem etiam alijs  
admista præstabit. Quare, ut ingenuè dicam quod sentio, non Fuchsius tantum, quem alioquin semper admiratus  
sum, ut uirum doctissimum, & de medicina amplissimè meritum; sed plerique alij, nunquam adeò Græcis addicti es-  
se deberent, ut prorsus à Mauritanâ familiâ desciscientes, nonnunquam & rationes, & experimenta, firma nostra  
artis, & ueritatis præsidia, cogantur deferere. Sed ut eò nostra reuertatur oratio, unde diuerterat, dicimus suæ pro-  
ritatibus, & experientia freti, Sebestena deiectionariam uim habere. Quocirca utiliter dantur ex bile febricitantibus,

### ZIZYPHA.

Zizyphorum  
consideratio.

Auicennæ de  
fensio contra  
Fuchsum.



atque (ut auctores sunt Paulus, Aetius, Psellus, & Actuarius) linguae asperitatem mirificè leniunt: quin & pectori, atque tussi opitulantur: uentris tinea pellunt: urinae ardoribus à bile, uel à sa pituita prouenientibus maximam opem præstant. Ceterum quoniam Sebestena nobis ZIZYPHA, quæ officinis Lucina dicuntur, in mentem reuocarunt, cum eorum Dioscorides nusquam quod extet, meminerit, duximus non fore quidem ab re, hic id eorum uiribus differere, quod à Galeno, qui ea Serica nominat, tamen Serica esse Galeno iuiubas asserere liceat) libro II. de ali-  
mentorum facultatibus proditur, ubi sic ait. Ne his quidem, quæ ad tuendam sanitatem, morbosue profligandos ualeant, testis esse possum. Nam ab insolentibus, ac effrenatis pueris, & mulieribus cibo duntaxat expetuntur. Exiguum præbent alimentum, difficile concoquuntur: ideo stomacho non sunt utilia. Eandem sententiam ex ipso Galeno sumptam reddidit Auicenna, cui tantum illud addi-  
dit, quòd ea ad pectoris, atque pulmonis uitia conferant, & quòd quidam (ut ferunt) cum maxime renum, tum etiam uesicæ affec-  
tus prodesse censeant. Verum quoniam (ut diximus) scribit Ga-  
lenus, nullam se adinuenisse in Sericis facultatem ad corporum af-  
fectus curandos, hinc capta occasione Fuchsius iterum digladiatur, honesto quidem studio, non modò cum Auicenna; sed etiam cum cæteris Arabicae familie auctoribus, asserens id omne, quod de zizyphi Arabes suis monumentis commendauerunt, omnino falsum esse, & à ueritate alienum. In quo tamen si uitium aliquod Ma-  
ritanis adscribendum est, illud quoque Græcis posterioribus ad-  
scribendum erit. Quandoquidem constat, Actuarium & Græcæ & medicum peritissimum suo de compositione medicamentorum lumine, zizypha ad pectoris uitia compositis medicamentis com-  
pluribus admiscere, ubi scilicet ex calidiorum humorum redundantia morbus emerferit: item eadem in his usurpare, quæ bilem deici-  
ciunt. Quod et Nicolaum Alexandrinum in suis compositis medicamentis,



canētis, perſepe feciſſe comperio. Ideoq; nil mirum, ſi ad hæc omnia præſtare zizypha tradiderit Auicenna: nanq; ſuo lentore, ac ſua, qua ægrè permeant, craſſitie (ut rei ueritas adſtruit) ſanguinem craſſum reddunt, qui flauæ bilis redundantia tenuior, quàm par ſit, redditur. Cum itaque tradat Auicenna, zizypha & pectori, & pulmōi prodeſſe, non temerè quidem eum locutum eſſe crediderim (ut fortàſſe aliqui putant) ſed illud ea ratione ſcripſiſſe, ut in morbis tantum calidis, & acutis intelligendum eſſet, in quibus medici utiliter zizyphis uti poſſiūt & debeant. Id quod eius uerba apertè indicant, cum dicat, quòd ſanguinem increaſſant. Neque enim erat Auicenna adeò ignarus, ut datis iam præmiſſis neſciret ſubinde concluſionem inferre. Sed certè pulebrum, atque tutum eſſe iudico, quòd quandoque cum mortuis luſtenur. Et quoniam (ut ſepe antea polliciti ſumus) nulli medicorum ſectæ, nec huic magis, quàm illi noſter animus erit addiſtus, ſed ueritati propagandæ, addam ex prædictis rationibus cum Auicenna, eos, meo quidem iudicio, labi, ac falli, qui zizyphi ſanguinem expurgari, ac abſtergi contendunt, quicq; ea ijs commiſcent medicamentis, quæ pectoris affectibus frigidityte obortis parari ſolent, ut recentiorum nonnulli: qui zizyphis nulla eorum habita ratione ad quòdvis pectoris uitium indifferenter utuntur, & plerumque cum maximo ægrotaantium discrimine. Cæterum an Galeno Serica zizypha ſint, dubitandum ſanè fuerit, cum aliud Plinio fuiſſe reperiantur lib. xv. cap. xiiii. ubi ſic habet. Aequè peregrina ſunt zizypha & tuberes, quæ & ipſa non prius uenere in Italiam. Hæc ex Africa, illa ex Syria Sextus Papinius, quem conſulem uidimus, primus utique attulit, diui Auguſti nouiſſimis temporibus in caſtrorum aggeribus ſata, baccis ſimiliora, quàm malis: ſed aggeribus præcipuè decora, quoniam & teſta iam ſyluæ ſcandunt. Tuberum duo genera, candidum à colore Sericum dictum. Et libro xvi. cap. xxv. Ab amygdala, inquit, proximè ſtorent armeniaca, dein tuberes, & præcoces: illæ peregrinæ, hæc coactæ. Item libro xvii. cap. x. Et zizyphæ ait, grano ſeruntur menſe Aprili. Tuberes melius inferuntur in pruno ſylueſtri, & malo cotoneo, & in calabrice, ea eſt ſpina ſylueſtris. hæc Plinius. Columella tamen tuberum nuſquam, quod legerim, meminit, ſed zizyphorum libro ix. cap. iiii. duo tradidit genera, quòd harum floribus maxime delectantur apes, nempe rutilum, & album. Quo ſit, ut ſuſpicandum ſit, Plinii codicem hoc in loco deprauatum eſſe. Illud ſuſpicionem auxit, quòd inter Arabes Auicenna, & inter Græcos recentiores Syriæon Sethi, duas zizyphi ſpecies ſcriptis mandauerint, & quòd tamen in Plinio una tantum legatur zizyphus. Verum cum Actuarius, Nicolao Myreſſico, & Symeoni Sethi ζιζυφα, ζιζυφα, καὶ ζιτζυφα (tot enim modis ſcripta inueniuntur) ea eſſe uideantur, quæ Galeno Serica, eademq; Auicenna, Serapioni, alijsq; pluribus Mauritanis, mihi quidem ſtatuendum uidetur, Galeno Serica non aliud designare, quàm zizypha. Ex his præterea omnibus maximum eſſe argumentum crediderim, in Plinio hic ſubefſe mendam, & illi de zizyphis id adſcribendum eſſe, quòd de tuberibus deprauatè fortàſſe legitur. Fructus pruni, qui κοκκύμυα Græcis, Pruna Latinis appellantur: Arabibus, Anas, Auas, ſeu Agias: Italis, Prune, & Succine: Germanis, Praumen, Pflaumen, & Kriechen: Hiſpanis, Prunas, Andrinas, & Amexcas: Gallis, Prune. Fructus uerò, qui Græcis recentioribus, μυζα, μυζα, καὶ μυζάρια, Latinis ſimiliter Myxa, & Myxaria, atque etiam Sebeſtena Mauritanorum imitatione dicuntur: Arabibus, Sebeſten, Motheica, Mukeita, & Mokaita. Vulgo & officinis, Sebeſten: Gallis, Sebeſte. Fructus præterea, qui item recentioribus Græcis ζιζυφα καὶ ζιτζυφα, & Galeno σαρπικα, Latinis Zizypha uocantur: Arabibus, Hunen, Zufalzef, ſeu Hanab: Officinis, Iuiubæ: Italis, Giuggiole: Germanis, Rotburſtbeerle: Hiſpanis, Azufecifa, Gallis, Iuiubes.

Nomina.

## A R B U T V S.



## Arbutus. Cap. CXXXVIII.

ARBUTVS, ſiue vnedo, arbor eſt cotoneæ malo non diſſimilis, tenui folio: cuius fructus pruni magnitudinem implet, nullo intus nucleo, huic memæcyclo cognomen eſt. Maturus aut flauet, aut rubefcit: in eſu acroſus, ſtomacho aduerſatur, capitisque dolorem mouet.

ARBUTVS in Hetruria frequentiffima prouenit, ubi uel per hyemem perpetuis uiſcit frondibus. Hæc etſi Dioſcoridi reddatur malo cotoneæ adſimilis, magis tamen putauerim, ab eo arboris proceritatem repræſentari cotoneæ, quàm folia, & candidiſ corticin. Vel deprauatus fortàſſe (ut magis ſuſpicio) eſt hoc in loco Dioſcoridis codex: quandoquidem Serapio, Dioſcoridis ipſius teſtimonio, Arbutum non deſcribit in uniuerſum cotoneæ malo ſimilem, ſed eam tantum proferre folia malo cotoneæ minora. nec ſcribit tenuia habere folia, ut nulgata habet Dioſcoridis lectio. Siquidem, ut palàm eſt, Arbuti folia in-

Arbuti confideratio.



sunt laurinis, & iligneis crassiora. Meminit Arbuti Theophrastus libro III. cap. XVI. de plantarum historia, sic inquit. Arbutus, quæ pomum cibo idoneum ferat, magnitudine non uimium præstat: corticem tenuem, tanaria ci similem habet, folium inter ilicem, & laurum: floret mense Iulio. Flores singulari appendice parte postrema racematim coherent, specie quisque myrto oblongo similis, & magnitudine tantus: non foliatus, concavus, tanquam ouum exalptum, ore aperto, cum autem defloruerit, retinaculum perforatur: quodq; defloruerit, tenue, sicut uerticillus circa fufum. Fructus anno integro maturefcit, ut simul hunc haberi, atq; alterum flore sponderi contingat. hæc Theophrastus. Quæ in Hetruria nascitur, folia profert laurinis, iligneisue similia, breuiora tamen paulo, crassioraq; colore potius pallido, quàm uiridi, in ambitu ubique serrata, rubra per medium excurrente costata. Caudex cortice uestitur subrubro, aspero, squamosoq; à quo rami prodeunt rubentiores, ac leuiiores. Floret mensibus Iulio, & Augusto, floribus candidis, paruis, lilij conuallij uocati figura, racematim dependentibus. E quibus fructus gignuntur rotundi, sorborum ferè magnitudine: qui primo ex ortu uirent, deinde flauescunt, maturi uerò rubent, aspero tactu, nullo intus osiculo, fragorum modo, quorum etiam effigiem referunt. Sapor his insipidus, simul & austerus: quinetiam dum eduntur, linguam, & palatum stimulant acerosa quadam substantia, quæ exterius conteguntur, ita ut planè acerosi uideantur. His maxime delectantur turdi, & merule. Quo fit, ut hæc me, quo tempore ipsa poma maturitatem sentiunt, eiusmodi aues inibi laqueis, retibus, alijsq; aucupij generibus facile capiantur. Arboris folia coriarijs expetuntur. Sunt qui credant, arbutum maximam opem præstare aduersus pestem. Quamobrem aquam, quæ ex folijs extracta sit, admisto offe in cerui corde reperto, ubi statim morbus inuasit, magno (ut ipsi aiunt) iuuamento agrotantibus exhibent. Arbuti meminit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, ubi paucis inquit. Arbutus arbor ipsa qualitate acerbam unà cum fructu est. eum memencylum nuncupant. Est autem hic, & insensus stomacho, & capiti dolorem infrens. Huius arboris nomen Græcum est ἀρβυτος: Latinum, Arbutus: Arabicum, Hatiladib: Italicum, Albatro: Hispanis, Madronho, aut Madromeiro: Gallis, Arbouces.

Arbuti usus,  
& vires.

Nomina.

## Amygdalæ.

## Cap. CXXXIX.



Amygdalorū  
consideratio.

AMYGDALAE amaræ radicum tritarum decoctum uitia cutis in facie corrigit. Illitæ nuces idem munus præstant: menses admotæ ciunt: capitis dolori auxiliantur, illitæ fronti, aut temporibus cum aceto, uel rosaceo: epinyctidas sanant ex uino: item putrescentia, ulcera, & quæ serpunt, & morsus canum cum melle. Earum autem esu dolores finiuntur, alium emolliunt, somnum faciunt, urinam cient: contra sanguinis reiectiones cum amylo, † & mentha assumuntur: renum uitij, & pulmonum inflammationibus ex aqua in potu, aut eclegmate cum resina terebinthina dantur: calculosis, difficilique urinæ in passo auxiliantur: & illinendo cum melle, & lacte hepaticis, tussi, & inflationibus coli, nucis auellanae magnitudine. quinis, septenis præsumptis, ebrietatem non sentiunt potores. Vultus si cum quadam esca eas uorauerint, emoriuntur. Gummi eius calfacit, & adstringit: reiectionibus sanguinem, potum auxilio est: impetigines, quæ summum corpus occuparunt, illitum cum aceto tollit: tussi uetustæ cum diluto uino potum medetur: calculosis cum passo bibere prodest. E nucibus Græcis dulces cibo idoneæ, sed multò minus ualent in remedijs, quàm amaræ: attamen extenuant, urinam ciunt. Recentium seu cum suo putamine, humida stomachi uitia emendantur.

Amygdalorū  
vires ex Gal.

AMYGDALAE tam dulces, quàm amaræ fructus sunt ubiq; uulgò notissimi. Differunt tamen inter se: nam amaræ maxime exalfaciendi, exiccandi q; facultate præditæ sunt, quàm dulces. quo fit, ut etiam dulcibus longè præferantur ad crassos, pituitososq; humores expectorandos. Galenus dulces paucis perstringens libro II. de alimentorum facultatibus, sic inquit. Amygdalæ nihil prorsus adstrictorie facultatis sortitæ sunt: sola enim extenuandi, atque abstergendi ui pollent: qua tum uiscera purgant, tum humorum e pulmone, ac thorace excreatus molliuntur, ac promouent. Et de utroque Amygdalarum genere differens libro VI. simplicium medicamentorum, primò amaras, deinde dulces prosequitur his uerbis. Amygdala, quæ quidam palam amaræ sunt, omnino extenuandi uini possident: quod & qualitas ipsa indicat, & experientia comprobatur. Ac de amara quidem qualitate in quarto horum commentariorum proditum est. Caterum duo experientie exempla proponi



proponi satis est, unde uini eorum possis discere. Siquidem ephelin expurgant, & excreationibus pectore, pulmoneq; crassorum, lentorumq; humorum impendio conferunt. Porro hæc ostensa sunt genere quidem incidentis, specie uero extergentis esse facultatis. Quin & quod per accidens facultatem item habeant ab obstructione liberandi, & ipsum supra demonstratum est, sed & experientia monstrat: nam in iecore crassorum, uiscosorumq; humorum in extremis uasis impactorum obstructiones abunde expurgant, expediuntq;. Quin & laterum dolores ab huiusmodi causa natos, & lienis, & coli, & renum sanant. Porro & ipsa arbor uniuersa similem sortita uim est. Nam huius radices coctæ, atque illitæ ephelis purgant. Quotquot uero sunt amygdala dulcia, & ipsa leuiculam amaritudinem possident, quæ tamen dulcedine superante occultatur: cæterum id temporis spatio clarum fit. Demonstratum autem retrò est, qualitatem dulcem moderatè esse calidam. hætenus Galenus. Amygdala: ut Theophrastus, & Plinius prodidere, ex amaris dulces fiunt, si circumfisso stipite, & ab una parte circumforato, defluens undique humor abstergetur. Et contrà, dulces amarescunt, si primo germinatu t, nella arbores à pecore decacuminentur. Amygdale (ut etiam tradidit Galenus) non multum suppeditant alimentum; quanquam eis plerique utuntur & ad roborem uenerem, & ad rescindendas uires. Hæ ut Græcis ἀμυγδαλα, ita etiam Latinis Amygdala uocantur: Arabibus, Iauz, Kauz, seu Lauzi: Italis, Mandorle: Germanis, Mandelkern: Hispanis, Almendras, Gallis, Amandes.

Nomina.

† In uulgatis Græcis exemplaribus hic non legitur καὶ ἡ μέντα, id est, & mentha. Verùm dictionem hanc uertit Marcellus ex antiquis codicibus, quos habuisse testatur. eam quoq; & Oribasius, & Serapio ex Dioscoride transcribunt. Quæ ut ueræ Dioscoridis lectioni adstipulantur, ita hoc loco mentham addendam esse putauimus.

## Pistacia.

## Cap. CXL.

PISTACIA, quæ constat in Syria gigni, pineis nucibus similia sunt, & stomacho amica. Trita cum uino contra serpentium ictus prosunt, siue edantur, siue bibantur.

## PISTACIA.

## STAPHYLODENDRON.



PISTACIA, quorum est communis in officinis usus, ex Syria Venetias importari solent. Quæ & Syria (ut Plinius auctor est) Lucius Vitellius censor in Italiam primus intulit, cum legatus in ea prouincia fuisset, nouissimis Tiberij Caesaris temporibus. Horum arbores Venetijs, Caietæ, Neapoli, & in alijs Italiae locis uidimus, folijs lentisq; maioribus, colore ex uiridi in luteum inclinante, ac eodem ordine extremis ramusculis emergentibus, & qui bus racematim suis quæq; pediculis pendent pistacia. Hæc (ut libro I. de alimentorum facultatibus scriptum reliquit Galenus) parum præbent alimenti; tametsi infarctas humore iocineri uias expediant, & à uitijs liberent. Porro an stomacho noxia sint, an utilia, an auium molliant, an adstringat, nullum huius rei certum habere testimonium scribit

Pistaciorum confid.

Pistaciorum uires ex Gal.



scribit Galenus. Cuius sententiæ refragatur Auicenna, qui cum palam, & nominatim Galenum refellere uellet, libro secundo hac dicendi ratione utitur, his ferè uerbis. Inquit quidam, non inuenio, quod Pistacia stomacho prosint, aut saue officiant. Ego autem dico, quod nauseam discutiunt, & uentriculi os roborant. Argumento est subamara, subausteraq; qualitas, quæ gustu in ijs deprehenditur. Hac igitur ratione freti medicorum nonnulli, non modo ad iocineris infarctus Galenum secuti pistacia exhibent; sed ad iecur ipsum, uentriculumq; roborandum, ea tam citis, quam medicamenti immiscunt. quin & ad conciliandam uenerem, & ad pinguedinem inducendam macie, & marasmo affectis commendant. Quibusdam in locis pistaciorum syluestrium nomine appellantur cuiusdam arboris fructus, quam Plinius libro, & capite XVI. STAPHYLODENDRON nominat, est à pistacijs effigie, & sapore plurimum dissideant. Planta hæc humilis est, folio sambuci, materie admodum imbecilli, floribus albicantibus, racematim dependentibus, quemadmodum & fructus: qui folliculis prouenit, rufo colore, cicercis effigie, maior tamen: in quo subuirens nucleus includitur, sapore dulcis, sed nauseam commouens. Sapore pistacijs similes sunt Pinei nuclei, qui in strobilis includuntur. Hi enim (ut loco citato tradidit Galenus) corpus alunt, bonum procreant succum, sed crassum; tamen si egrè concoquantur. Verum, si Auicennæ etiam credimus, digerunt, leniunt, resoluunt, ac impinguant. Prosuunt præterea pulmonum uitij, purulenta excreantibus, & tussi molestis: sed priusquam edantur, aqua calida macerare eos oportet, alioquin uentriculum ledunt. Semen augent, & uenerem excitant. Renes, & uesticam non modo expurgant; sed etiam roborant, eorumq; ulcera prohibent. Urinæ stillicidio opem mirifice præstant. Quam ob causam strobiliini nuclei apud recentiores medicos in frequentissimo habentur usu ad huiusmodi affeetus. Quæ nuxes Græcè Πισάκια, Latine quoque Pistacia, & Pistacea appellantur: Arabicè, Pusleeb, aut Fesstuch: officinis & Barbaris, Pistici: Italis, Pistacchi: Germanis, Vuelsch Bimpernuszlin: Hispanis, Albocigo: Gallis, Pistaches.

Staphylo-  
dendron.

Nuclei pinei  
uires.

Nomina.

### Nux iuglans.

### Cap. CXLI.



Nucum Iu-  
glandium cō-  
seratio.

NUCES Iuglandes, quas nonnulli Perficæ vocant, sunt difficiles concoctu, stomacho inutiles, biliosæ, capitis dolorem inferentes, tussientibus inimicæ: uomituris tamen ieiunis in cibo aptæ. Cum ruta verò, & caricis præsumptæ, & à summo cibo, uenenis resistunt, nec minus si à ueneni haustu comedantur: largius esitæ, teneas latas pellunt: illinuntur mammarum inflammationi, abscessibus, luxatisque, cum mellis exiguo, & ruta: cum cepa autem, sale, & melle, canis, hominisque morbi proficiunt: tormina, cum calyce suo perusta, & uerbilico admota, sedant. Putamen combustum, tritumque in oleo, & uino, infantium capite peruncto, nutrit capillum, alopecias replet. Sistunt menses nuclei usti, si triti ex uino admoueantur: idem è ueteribus illi carbunculis, gangrenis, & agilopijs medentur: alopecijs commanducati, & impositi præsentis sunt remedio.

Nucibus tuis oleum exprimitur. Recentes stomacho innocentiores sunt, utpote suauiores: itaque alio melle eximunt acrimoniam. liuores in corpore illitu tollunt.

NUCES Iuglandes, quæ in communi sunt usu, itemq; arbores à quibus eduntur, omnibus vulgò in Italia notiores sunt, quam ut à nobis representari debeant, cum nulla arbor Nucis ubique frequentius occurrat. Hæc Latine Iuglandes, quasi Iouis glandes interlitis literis appellantur. Quo nomine primo mundi æuo eas appellatas esse, plures tradidere auctores. Quippe cum homines primum glandibus tantum diu uictitassent, inuenta tandem arbore, quæ nuxes ferebat, degustato nucleorū sapore, borumq; dulcedine mirum in modum allecti, nuxes Iouis glandes ob excel-

Iuglandiū ui-  
res ex Gal.

lentiam appellauere. De ijs differens Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, ita scriptum reliquit. Nucis arbor tum in folijs, tum in germinibus adstrictionem quandam possidet: ceterum euidens, multanq; in nucis putamine recenti pariter & sicco. proinde eo tinctores quoque uti solent. At nos eius expressi succo similiter, ut mororum, & ruborum in melle decocto, nucis stomatici medicaminis utimur, & ad omnia reliqua adhibemus, ad quæ modo dicti succi conuenire censentur. Porro nucis ipsius id, quod edendo est, oleosum est, & tenue: itaq; ob id etiam facile exprimitur, & quò diutius reconditum fuerit, magis tale efficitur. Quamobrem oleum ex eo inueterato exprimere liceat. Tunc sanè admodum fit per halitum euaporatorium. Itaque quidam eo gangrenas, & carbunculos, & agilopas sanant, ac nonnulli ad uulnèrora, hoc est, neruorum uulnera utuntur. Et libro II. de alimentorum facultatibus sic inquit. Habet Iuglans & adstringentis qualitatē non exiguum, quæ temporis processu marcescit, dea generante tota eius substantia in pinguem succum, adeo ut cibo prorsus fiat idonea, quòd ueteri oleo, sua pinguitie



dine ad similes appareat. Viridis autem, atque etiã inuicem humida, neque adstringentis qualitatis, neque oleose conspicue est particeps; sed magis est quodammodo *ἀραια*, id est, qualitatis expers: quod saporis genus aqueum (ut dixi) uocare consueuimus. Ingulans facilius, quã auellana concoquitur, stomachoq; utilior est, & multo magis, si unã cum caricis edatur. Proditum autem est à plerisq; medicis, si ambo hæc cum ruta ante alios cibos sumantur, hominem non magnopere à lethalibus pharmacis ledi posse. Constat præterea humiditas deiectioni magis, aridas uerò minus conuenire. Non pauci quoque cum giro ingulandes præsumunt, uentris subducendi gratia. Ad hoc autem uirides aptiores sunt, utpote quæ adstringentis qualitatis uinũ participes sunt. Quin & aridarum quoq; ubi prius in aqua fuerint macerate (ut nonnulli faciunt) similis, ac uiridina facultas habetur. hæc Galenus. Ceterum Ingulandes uirides de cerpte mense maio, uel iunio appetente, antequam earum putamina obdurerint, saccharo, uel melle asseruata stomacho utiles euadunt, & ori non ingrata. Sed quoniam sermo nobis est de nucibus, cum Dioscorides, Galenus, ac ceteri posteriores Græci de Indicis, Myristicis, Metellis, ac Vomiceis nihil, quod constet, memoriæ prodiderint, hic ea non dissimulanda putauimus, neque alienum duxi recensere, quæ de ijs ex Mauritanorum monumentis, & recentiorum quorundam historijs sumi consecutus. Sed primò de Indicis dicamus. Noces igitur INDICAE nyropolijs omnibus uulgatissimæ, fructus sunt arboris cuiusdam (ut Mauritani auctores sunt) palmæ effigie, prægrandes, magnorum melonum instar, ab arbore dependentes: uicq; magna inuolucrorum mole obteguntur. Cortex ijs extimus colore cõstat in atrum rufescente, subdurus, tenax, callosusq;: intus uerò uillosa materie compactus, quæ manibus extrita in capillamenta fatiscit. Subtus est putamen triquetrum, uillosum, barbatumq;: cornu instar prædurum, eiusdem ferè coloris nucleum continens, oui auferini magnitudine, intus concauum: substantia illi pinguis, crassitudine semidigitali, duriscula, tenax, callosaq;: albicans, sapore dulci, butyrum referens, tenui sed aspero oblecta cortice, putaminis colore. Probantur recentes, eæq; præsertim, in cuius concauitate liquor quidam dulcis includitur: siquidem hoc argumento recentiores faciliè cognoscuntur. Excalfaciunt secundo abscessu, humectant uerò primò. In cibis sumptæ, et si oleum, quod è nucibus Indicis exprimitur, utiliter hæmorrhoidibus inungitur, oleo præsertim admisso, quod è persicorum nucleis elicitur: per se illitum lunæ dolorum, & genium dolores mulcet, & uentris animalia pellit. Quod uerò recentes nuces pressæ stillauerunt oleum, densum est, candidum, & pingue: in summa substantia, qualitate, sapore, ac deniq; facultatibus butyro non dissimile, sed longè melius subministrat alimentum. Nux Indica letiore sagina corpora reficit. Idcirco strigosas mulieres mirum in modum impinguat, & ad crassitiem reducit. hæcenus de Indicis.

Ingulandes cõdita.

Nucis Indicæ confid.

Oleum ex nucibus Indicis

Nucis Myristicæ confid.

## NUX MYRISTICA.

His succedunt MYRISTICAE, quæ uulgò officinis ob odoris præstantiam Muscata, quasi moschatæ dicuntur. Hæ (ut reserunt ijs, qui Indica litora perlustrariunt) proueniunt copiosissimæ in insula quadam nomine Badan: ibiq; eas proferunt arbores quædam nostratibus persicis haud absimiles, angustioribus tamen folijs, ac breuioribus. Hæ post foliorum germinationem, florem statim emittunt, quem Macin Arabes uocant. Panditur is syluestrium rosarum modò: è cuius medio nux erumpit, & processu temporis perficitur, & ubi maturitatem senserit, macis rosarum instar, expansus eam circumplectitur: quam postea suo tempore cultores legunt certatim, & quàm quisque potest uberius, quoniã sunt ibi omnia communia. Arbores absq; cultu, suppeditante tantum natura, suos fructus edunt. Myristicæ nuces suo uacui, tanquã rete comprehense, Venetijs in officinis quàm plurimis usuntur, duro putamine conclusæ, auellanae modo, colore subnigro: quo fracto compactis subest globulus, nuclei nice, & is est nux Myristica, quam usurpare solemus. Præferuntur recentes, quæ nullam præsenferint cariæ: item ponderosæ, factæ, præpingues, humore redundantes, ita ut adacta acu confestim è uulnisculo exeat humor. Siccant (ut Mauritani scribunt) & excalfaciunt ordine secundo completo. Adstringunt, oris suauitatem commendant, & foetentis animæ uirus cammansæ abolent: lentigines in facie emendant, uisum acuant, uentriculum & iecur roborant: lienem absorbunt, urinam ciunt, fluentem aluum sistunt, flatu discutiunt, & frigidis uteri affectibus mirificè prosunt: & ut in uni uersum dicam, facultas eis eadem, quæ & caryophyllis. E recentibus prius confusis, & in cacabo calefactis prælo exprimitur liquor, qui refrigeratus cere nouæ instar concrefcit, fragrantissimum spirans odorem, neruorum & articularum diuturnis doloribus à frigore excitatis utilissimus: quin & ueneris inunctionibus maxime expetitur. Myristicas nuces ueteribus Græcis ignotas fuisse illud fidem facit, quod Theophrastus, Dioscorides, & Galenus earum, quod in suis monumentis legerim, nusquam meminerint. Quare & hic quoque asserere non dubitauerim, macerem (ut in eius mentione diximus) Dioscoridi, & Galeno myristicæ nucis florem esse nequaquam. Nam si ad eos floris cognitio peruenisset, ueri quidem st-

Myristicarũ uires.



tas fuisse illud fidem facit, quod Theophrastus, Dioscorides, & Galenus earum, quod in suis monumentis legerim, nusquam meminerint. Quare & hic quoque asserere non dubitauerim, macerem (ut in eius mentione diximus) Dioscoridi, & Galeno myristicæ nucis florem esse nequaquam. Nam si ad eos floris cognitio peruenisset, ueri quidem st-

millimum



Nuces uomi  
cæ, & metellæ

Multorum er  
ror.

Fuch. lapsus.

Anacardii mē  
tio, & uires.

Nomina.

millimum est, quod etiam fructus notitiam habuissent: quos, certo scio, ob suas admirabiles facultates, & naturæ doctes nunquam scriptis dissimulassent. Præter odoratas, eas etiam nuces memorant Mauritani, quas **VOMICAS**, & **METELLAS** uocant. Sed tam officinæ, quam medicorum uulgus has magno errore confundunt, quod plerumque legitimas uomicas metellarum loco usurpent, & contra metellas nonnunquam uomicarum uice. Nam Vomicas quidem eas appellant errore ducti, quæ lupinorum instar compressæ sunt, & tenui quadam lanugine contextæ, quarum esu canes necantur. Metellas uero, quæ nonnihil extuberantes, quibusdam nodis, ueluti paruis oculis, per ambitum sunt refertæ. At eorum lapsus facile deprehendi potest Serapionis testimonio, qui Abrahami auctoritate reddidit nucem Vomicam colore inter glaucum, & album, auellana paulo maiorem, nodosamque. Quibus notis eas esse præditas constat, quas seplastiarum uulgus metellas appellat, quæ nullo modo respondent legitimis metellis à Serapione descriptis, his uerbis. Nucis metellæ arbor, uomicæ arbori non dissimilis, fructum gerit mandragoræ, oleosum, hirsuto cortice, sapore non iniucundo. Quæ notæ perspicuo adstipulantur ijs, quas Vomicas nuncupant: eæ siquidem corticem habent hirsutum, oleosæ sunt, & gustui non ingrata. quin & facultatibus, uon autem notis (ut quidam falso existimant Serapionem intellexisse) mandragoræ fructus referunt, cum auctore Serapione, quarto refrigerent excessu, ita ut drachmarum duarum pondere estitate interimant, minore uero mensura temulentiam faciant. Quos quidem effectus præstare uidemus non modo in canibus, sed etiam in hominibus, quibus hæc data fuerint, quas uomicas esse contendunt. siquidem Serapio de Vomicarum facultatibus differens, nullam lethalem uim eis adscribit, sed quod tantum duarum drachmarum pondere cum anethi decocto, uel sale haustæ, mirifice uomitum eliciant. Quamobrem dixerim ego, illas, quibus callosa tubera supereminent, nodique uisuntur, oculorum ferè instar, legitimas esse uomicas: metellas uero, quæ præsse, & hirsutæ canibus necandis aptissimæ habentur. Cæterum nesciuerim ego, qua ratione ductus Leonartus Fuchsius ultimo libello, ubi tantum stirpium imagines in exigua formam contraxit, dixerit nuces metellas hirsutas esse fructus peregrinæ illius plantæ, quam antea magno uolumine Stramoniam uocauerat. Quod prorsus reclamare uidetur Mauritanorum sententiæ, à quibus harum historias accepimus. Sed quoniam scribenti mihi de Nucibus omnibus **ANACARDIA** sese obtulere Græcis ueteribus ignota, cum & ipsa in officinarum usu expetantur, de eis quoque uerba facere ex Arabum testimonio, non quidem ab re fore duximus. Sunt igitur Anacardia (ut testis est Serapio) fructus cuiusdam arboris auicularum corculis non dissimiles, unde & nomen, colore etiamnum cordis modo rubescente, cion scilicet ab arbore decerpuntur. Inest ijs liquor mellis crassitie sub cortice residens, sanguinis modo rubicundus, sub quo est & nucleus parue amygdalæ effigie. Nascuntur in Siciliæ montibus, qui continue igneas eructant flammæ. Excalfaciunt, & exiccant tertio excessu. Præstat in medicina liquor; etsi myropolæ communi errore & cortice, & nucleo utantur. Anacardia (ut aiunt) labantes reuocant sensus, memoriæ iacturam resarciunt, & neruorum, & cerebri affectibus, quos frigida causa attulerit, auxiliantur: nihilominus sanguinem exurunt, & cutim ulcerant. Quare Anacardia iuuenibus noxia sunt, cum & adurant, & deleteria secultate non uacant: cui tamen remedium est lac affatim potum, & oleum ex eorum nucleis expressum.

#### NUCES AVELLANÆ.



Hactenus de uarijs nucibus, nunc earum nomina sunt nobis reddenda. Nuces communis usus Græci uocant *καρύα λευκή*: Latini, nuces Iuglandes: Arabes, *Ieuz*, *Leuz*, aut *Giauzi*: Itali, *Noci*: Germani, *Nussen*, & *Vuelch* misz: Hispani, *Nuezes*: Gallici, *Noix*. Nux uero, quæ ex India deferitur, recentioribus Græcis *καρύν ινδιν* appellatur: Latinis, *Nux Indica*: Arabibus, *Neregil*, *Dabig*, seu *Giauzi alhend*: Italis, *Noce d'India*: Germanis, *Indianisch nusz*. Hispanis, *Nuez de las Indias*: Gallicis, *Noix d'Indie*. Nux deinde, quæ *μοσχονάριον*, *μοσχονάριον*, *καρύον μυρισίνδιν*, & *καρύον ἀρωματίζον* Græci, *Nux myristica*, aut *Nux moschata* Latine dicitur: *Ieuzbaue*, *Ieuzbaue*, seu *Giauzi ban*, Arabicè: *Noce moscada*, Italicè: *Muscheb nusz*, Germanicè: *Nuez de especie*, Hispanicè: *Nois muscade*, Gallicè. Nux præterea, quæ Arabibus *Leuz alkei*, seu *alkei*, officinis ac Barbaris *Nux uomica*, & Italis *Noce uomica* nominatur. Nux denique Arabica uoce *Leuz alrachaba dicta*, Latina *Nux metella*, Barbara, *Nux metbel*: Italica, *Noce metella* nuncupatur. Quod autem *ἐνανάριον* Græci, Latini item *Anacardium* dicunt: Arabes, *Baladar*, seu *Beladur*, Hispani: *Anacardo*.

#### Nuces auellanae. Cap. CXLII.

Nuces auellanae, quas & *leptocarya* uocant, stomacho infestæ sunt: ipsæ tamen trita, & in aqua mulsa potæ, tulsu ueteri medentur: trita, & cum exiguo piperis potæ, distillationem concoquunt. Crematarum cinis cum axungia, aut adipe ursi perunctus, alopecurici capillum reddit. Aiunt nonnulli usta earum putamina,



tamina, & in cineris speciem redacta, cum oleo, cæsiorem oculorum pupillas infantibus denigrare, perfuso sincipite.

**AUELLANAE** nuces ideo Græcis Ponticæ dictæ sunt, quod in Græciam (ut Plinius inquit) e Ponto primum allatæ fuerunt. In Italia tamen & in urbanarum, & in sylvestrium genere numerose reperiuntur. Caterum ex domesticis aliæ oblongæ, aliæ rotundæ sunt: ueruntamen oblongas & præstantiores, & gustui gratiores esse constat; & ille præsertim, quæ putamine uehementer rubent, & fractu minime sunt contumaces, quales sunt Vicentine. Oblongæ serius maturitatem sentiunt, celerius uerò rotundæ. quapropter illæ uetigiori sunt nucleo, diuq; perdurant. Sylvestribus coryletis ferè innumeris scatent Tridentini montes, quæ oblongas pariter, & rotundas largiuntur nuces, tanta ubertate, ut eas rura saccis legant, ubi maturitatem senserint. Auellana (ut memoria prodidit Galenus tum libro VII. simplicium med. tum secundo de alimentorum facultatibus) plus habent essentia terrestres, ac frigida, quam Iuglandes. quin & plus præbent alimenti: siquidem densiores sunt, & minus pingues. Diocles auctor est, Auellanas nuces minus amygdalis alere, cibus in uentriculo supernatare, largius esitatas caput tentare; innocentiores tamen esse uirides, quam aride. Nuces, quæ κάρυα ποττινά, καὶ λεπτοκάρυα Græcis, Latinis Nuces Ponticæ, nuces Prænestinæ, & nuces Auellanae dicuntur: Arabibus, Agileux, seu Bunduch: Italis, Nocciuole, Auellane, & Nocelle: Germanis, Haselnusz: Hispanis, Auellanas: Gallis, Noisettes, & Melline.

Auellanarum confid.

Auellanarum uires ex Gal.

Nomina.

## Morus.

## Cap. CXLIII.

**MORVS** arbor nota est. Cuius fructus aluum soluit, stomacho inutilis est, & facili corruptionem sentit. Hoc idem præstat mori succus: decoctus autem æreo uase, atque insolatus, adstringentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas, & tonsillarum inflammationes, addito mellis exiguo. Sed inolefcit uis eius adiecto scissili alumine, galla, croco, & myrrha: item myricæ semine, iri, & thure. Immatura mori poma siccantur, tussique acinorum rhois uice, obsonijs miscantur, ut cæliacos iuuent. Radicis cortex decoctus in aqua, & potus aluum resoluit: latas uentris tineas excutit: his quoque auxiliatur, qui acconitum hauserunt. Folia trita ex aceto illita, ambugtis igni medentur: tinguntque capillum, uitium, & fici nigra frondibus simul coctis in aqua cælesti. Succus foliorum cyathi mensura potus, contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruefacti corticis, & foliorum iure, dentes aptissimè in dolore coluuntur. Radix circiter messem incisa, facto in ambitu serobe, succum emittit, qui postridie concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est: tubercula dissentit, & aluum purgat.

**EST ET** Mori utrumque genus album, & nigrum passim uulgaris notitia in Italia; præcipue his in locis, ubi bombyces sericifici aluntur. Constat alba mororum poma adstringentem facultatem longè minorem, quam nigra esse adepta (est Dioscorides, & Galeus alborum non meminerint) ex multa & perspicua, sed paululum instipida dulcedine, quæ gustatu deprehenditur: siquidem in maturis nulla adstringendi uis planè percipi potest.

Mori confid. ratio.

Mori uires ex Gal.

test. Morus nouissima urbanarum germinat, foliaq; emittit: eaq; propter ueteribus dicta fuit arborum sapientissima. Mora (ut prodidit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, item secundo de alimentorum facultatibus) matura quidem uentrem subducunt, immatura uerò ubi aruerint, admodum restringunt. Itaq; ad dysenterias accommodata sunt, item ad cæliacas, & quasunque alias fluentes affectiones. Porro quod maturorum succus ad oris medicamenta sit utilis, propter eam uidelicet, quæ inest illi, adstrictionem, neminem latet. Præterea ad alia complura par & aciditatem, & tota adeo arbor in omnibus suis partibus mistam aliquam uim obtinere uidetur, ex restringente, & purgante compositam. Attamen in radicis cortice purgatoria cum quadam amaritudine exuperat, adeo ut & latas interaneorum tineas perimat. In alijs autem partibus restringens uincit; in folijs tamen, & germinibus quodammodo media utrisque temperies est. Mora ubi primum mansa fuerint, ingesta citissime transeunt, & alijs cibus suo ueluti ductu uiam struunt. Verum secundo loco sumpta, celerime alijs unà cum cibus corrumpuntur: id quod etiam faciunt, si cum eduntur, prauo in uentriculo humori occurrant. Quod si corruptionem non sentiant, corpus quidem bene faciant, sed non planè refrigerant, nisi actu frigida assumantur. Paucissimum ministrant alimentum similiter atq; pepones;





Serici metio  
& uires.

Nomina.

pepones: haud tamen uomitum cient, nec stomacho, ut illi aduersantur. De Moris autē, quæ rubi ferunt, lib. III. in Ruborum commentatione, Deo fauente, latius differemus. Sed quoniam mori folijs & uescuntur, & aluntur uermiculi, qui admirabili naturæ spectaculo nobis SERICVM uellus conficiunt, quo recentiores medici in his, quæ cordi conueniunt, medicamentorum compositionibus utuntur, ut, quantum per me fieri potest, omnibus rei medicæ studiosis fiat satis, ea de Serici uiribus hic perstringam (quandoquidem non inuenio e ueteribus Grecis, qui de hoc quicquam prodiderit) quæ Auicenna posteritatis memoriæ commendauit tractatu, quem de uiribus cordis inseri pſit. Sericum itaq; (eodem auctore) mirificè exhilarat. quæ in re crudum eo longè præstat, quod ignem fuerit expertum; tametsi coctum quandoque in usum ueniat, uerion antequam in insectorum cortiuis immersum inficiatur. Excalfacit sericum, resiccatq; ordine primo: exiecat, & attenuat ea naturæ dote, ut cor recreet, letumq; efficiat. Quapropter laxat, firmat, purificat, & illustrat spiritus. neque eius facultas uiui tantum assignatur spirituum generi in una tantum dispositione; sed ei proprium est, omnibus æquè spiritibus opem ferre, ita ut spiritus tam uitales, & animales, quam naturales reficere ualeat. Caterò quanuis uegauerit Auicenna decoctum sericum, & fullonum coloribus imbutum in medicos uenire usus; Mesues tamen in eo serapio, quod de ponis inscribitur, id sericum admittit, quod cocco legitime sit infectum. Idq; similiter inserit in ea medicamenti compositione, quam Alchermes, ipse nuncupauit. Abor, quæ μορέα, ἢ συκαμύρος Græcè, Latine Morus appellatur: Italicè Moro. Eius fructus Græcis συκαμύρον, Latinis Morum dicitur: Italis, More. Arabes utrunque Tut, seu Thut nominant: Germani, Maulbaum, & Maulber: Hispani, Moras del moral: Galli, Meurier & Meure.

## Sycomorus.

## Cap. CXLIH.



Sycomori histor. ex Theophrasto.

Sycomori metio ex Gal.

SYCOMORVS, aliqui etiam sycaminū, id est, morum, uocant, cuius fructus sycomorum etiam, propter inefficacem gustum, appellatur. Arbor est magna, fico similis, frondosa, multo lacte abundans: folijs mori: pomum ter, aut quater anno fert, non ramis, ut fico, sed caudice ipso, caprisico non dissimile, dulcius grossis, sine granis interioribus: quod non maturefcit, nisi ungues, aut ferro scalpatur. Nascitur plurimum in Caria, Rhodo, locisque non multi tritici feracibus: ubi prouentu fecundo, restibiliq; iuuamentum adfert, cum annonæ caritas premit. Pomum aluo utile est, sed perquam exilem præbet alimoniam: stomacho aduersatur. Succus primo uere tenera arbore antequam fructum ferat, eximitur, lapidis ictu summo cortice desquamato: si enim altiore plaga uioletur cortex, nihil effluet. Spongia, aut uellere lacryma excipitur, quæ siccata, & in pastillos coacta, sciculi uase reponitur. Vis succi emollit uulnera conglutinat, discutit collectiones coctioni repugnantes: bibicor etiam, aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lienes, stomachi dolores, & perfrictiones. celerrimè redinem sentit. Gignitur & in Cypro arbor genere distans, quæ cum sit ulmus, prædita tamen est folijs sycomorij, fructu pruni magnitudine, multò dulciore, supradictis cætera similis.

SYCOMORVS (ut Theophrastus est auctor libro III. capite II. de plantarum historia) arbor est moro uostrati similis, quippe folio, magnitudine, aspectuq; proxima. Fructum præter cæteras peculiariter gignit: uou enim germinibus, non ramis

extremis, sed caudice pomum parit magnitudine ficus, & uisu proximum, succo atq; sapore caprificis sanè simile, nec rariù longè dulcius, grauiusq; internis omnino carens, multitudine numerosius maturefcere nequit, nisi scalpatur. Sculpitur autem uinguibus ferreis: & cum scalpata poma sunt, ad quartum diem maturefcunt: hisce ablatis, alia, & alia ex eodem loco subuascuntur, terno ita, & quaterno partu copiosa. Lactuosa arbor admodum est, & materies sit solida, robusta, & nigra ad multa commoda existit. Hæc inter cæteras arbores id sibi propriū uedicauit, quod ea sa continuò uiuet, neq; siccatur unquam, nisi aqua obruatur. Ea q; propter & lacubus, & stagnis demergitur madefa- Etia q; in profundo siccatur, cumq; sicca omnino fuerit, superfluiat, atq; innatat. hæc tamen Theophrastus. De Sycomorij moro disseruit Galenus libro II. de alimentorum facultatis, ubi ita scriptum reliquit. In Alexandria Sycomorij plantam uidi unā cum fructu, paræ, candidæq; ficui adsimilem. Is fructus nullam habet acrimoniam, exiguæ dulcedinis est particeps, estq; facultate humidior quodammodo, ac frigidior, ueluti mora. Quinimo inter mora, ac ficus medium iure quis ipsum collocarit, atque hiuc nomen ipsi inditum esse mihi uidetur. Ridiculi naug; sunt, qui fructum hunc ob id aiunt sycomora fuisse nominatum, quod paruis ficibus asimiletur. Ipse autem nascendi ratio ab alijs arborum fructibus



fructibus quodammodo est diuersa: haud enim ex primoribus ramulis, ac germinibus, sed ex prægrandibus ramis caudicēq; enascitur. hæc Galenus. Sycomoro similis est (ut loco citato memoriæ prodidit Theophrastus) quæ in Creta uocatur Cypria ficus: nam & ipsa fructum edit, caudice, ramisq; crassissimis. Differt tamen à priore, quod germen quoddam emittit sine ullis folijs, radicula simile, cui fructus præpilatur. Caudex arboris magnus, & populo albæ proximus, eiusq; folia ulmum representant. Quater anno fructum fundit, sed nullum ad maturitatem perducit, nisi pomum ipso immaturo inciso, emissioq; lacte. Dulcedo ficubus non absimilis, & interna grossis planè conueniunt. magnitudo autem pruni est. hæc Theophrasti uerba. Quæ sanè maximo sunt argumento, hæc quoque plantam in Sycomori genere annumerandam esse. Ceterum aperte hallucinantur ij, qui putant arborem Sycomorum esse, quæ plerunque uisitur in monachorum claustris uulgò uocatis, & templorum plateis, ubi mortuorum cadauera humantur, è cuius baccis monachi uerticillos faciunt, quibus mulieres suas numerant præces. Hanc (ut Bellunensis castigauit) Azadaracht appellat Auicenna, quam deleteriæ facultatis participem esse prodit Fen sexta quarti, ut latius libro sexto dicemus. Arbor, quæ Συκόμωρος, Græcis, Latinis Sycomorus, & ficus Aegyptia nominatur: Arabibus, Mumeiz, Iumeiz, Aliumeiz, seu Giumeizi: Italis, Sicomoro, & Fico d'Egitto.


Ficus Cypria.

Vulgaris error.

Nomina.

## Fici.

## Cap. CXLV.



FICI maturæ recentes stomachum lædunt, aluum soluunt, sed faciliè contracta ab eis fluxio sistitur: sudorem euocant papulasque, sitim sedant, calorem restringunt. Siccis natura exalfaciendi, uires alunt, sed sitim magis stimulant, aluo utiles: rheumatismis uentris, & stomachi contraria: gutturi autem, arteriæ, renibus, uescicæ, & ijs, quos longa uoletudo decolorauit, anhelatoribus, hydropicis, comitialibus aptissimæ. feruefactæ cum hyssopo, & potæ, thoracem purgant: tussi ueteri, diuturnisque pulmonum uitijs conueniunt. aluum molliunt tussæ cum nitro, & cnico, dein manducata. Decoctum arteriæ, & tonsillarum inflammationibus gargarizatu prodest. cum hordeacea farina cataplasmatismis miscentur, & in muliebres fatus cum fænogræco, & ptisana. Ceterum cum ruta coctæ, torminibus infunduntur: coctæ, illitæque duritias discutiunt: parotidas, & furunculos emolliunt: panos ad maturationem perducunt, maximè nitro, iri, aut calce addita. Crudæ, si cum antedictis tundantur eadem efficiunt: cum malicorio, pterygia purgant: cum atramento futuro, deploratis ferè tibiæ fluxionibus, & cacoethicis ulceribus medentur: quin & cum uino dectotæ addito absinthio, & hordeacea farina, utilissimè hydropicis illinuntur. Crematæ cum cerato sanant perniones: pruriginēs, sonitusque, si crudæ terantur, & sinapi, liquorēque aliquo, exceptæ auribus instillantur. Tam syluestris, quàm fatiæ fici lacteus succus coaguli modo lac contrahit, concretumque dissoluit, ut acetum: exulcerat corpora meatus aperit. soluit aluum, uulnam recludit cum de-

trita, puce Græca potus: menstrua ciet cum luteo oui appositus, aut Tyrrhenica cera: podagricorum cataplasmatismis cum farina fænigræci, & aceto utilis: lepras, lichenas, uutiligines, uitia cutis in facie, pforas, ulcera in capite manantia, cum polenta expurgat: instillatus plagæ, percussis à scorpione, uenenatorum ictibus, & rabiosi canis morsibus auxiliatur: prodest dentium dolori lana exceptus, & caui eorum additus: uerrucarum informicationes tollit cum adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idem præstat succus è teneris ramis syluestris fici, qui lacte prægnantes, silente adhuc oculo, tussi exprimuntur, & siccat in umbra reponitur. Et lac, & succus imponuntur exulceratorijs medicamentis. Decocti cum bubulis carnibus ramuli ficulni, faciem afferunt decoctionem. Lac efficiunt, quod magis soluat, si inter coquendum ficulneo surculo, spathe loco, moueatur. Grossi, quæ erinei nonnullis uocantur, coctæ illitæ, strumas, nodosque omnes emolliunt. Crudæ formicas, uerrucas, & thymos, nitro, farinaque additis, tollunt. Folia eadem possunt. Illita cum sale, & aceto ulcera in capite manantia, epiphyctidas, & furfures sanant: ijs ficosæ extuberationes, & palpebrarum scabritie perscrantur. Nigræ ficus, folijs, cauliculisque, candidæ uutiligines perunguntur: faciunt ad canum morsus, & ulcera, quæ ceria, id est, fauos, uocant. Grossi cum syluestris papaueris folijs ostextrahunt: furunculos, cum cera discutiunt: contra muris aranci morsus, & scolopendræ uenena,



cum eruo, & uino illitæ, auxiliantur. Fit ex cinere ficus tam syluestris, quàm satiuæ lixiuium, crematis ramorum cauliculis, quod subinde macerari opus est, & inueterascere: siquidem inter caustica intelligitur. Gangranis prodest: nanque expurgat, & consumit, quæ excrecunt, coquæ sic utendum est: spongia assidue hoc lixiuium imbuta superponitur. Interdum dysentericis, & in fluxiones uetustas, & sinus cuniculatim exedentes, magnosque, instillari conueniet. Etenim purgat, conglutinat, carne replet, & oras committit, non secus atque emplastra, quæ cruentis vulneribus iniiciuntur, enema uocant. Bibitur ad discutiendum sanguinem concretum, & contra præcipitationes, rupta, conuulsa, cum cyatho aquæ recenter colatum, addito olei exiguo: celiacis, dysentericis, per se cyathus datus prodest: neruorum uitijis, conuulsionibus, commodè illinitur ex oleo, utpote sudores moueat: aduersus gypsi potum, & phalangiorum morsus bibitur. Hæc eadem præstant reliqua lixiuia, præsertim quernum: omnia tamen adstringunt.

Ficorum consideratio.

Ficorum facultates ex Gal.

**FICI** fructus sunt in Italia uulgò notissimi. Quarum etsi plura notentur genera in candicantiis, & nigrescentium discrimine; sunt tamen omnibus notiores ob frequentissimum in autumno earum in cibis usum, quàm ut nobis præstantiores representare, ac describere sit opus. Siquidem omnes satis gustus edocuit, eas esse laudatissimas, quæ planè maturæ pinguedine, & sapore ceteras antecellunt. Sed ut præter id quod à Dioscoride proditum est earum omnibus facultas innotescat, & temperamentum: quin & ut omnes cognoscant, quod præbeant alimentum, quàmque utilitatem, ac noxam inferre possint, ea paucis edisseram, quæ ex Galeno deprompsi, qui in primis lib. 11. de alimentorum facultatibus sic scriptum reliquit. Ficus tanetsi minus prauis succi gignant, quàm ceteri omnes non modò fugaces, sed etiam autumnales fructus, non tamen id uitium prorsus effugere potuerunt. Ceterum hæc ipsi insunt bona, nempe quòd commedibiles sint, & facile in totum corpus peruadant, penetrentque. Nam & abstergenti diu pollent haud obscura: cuius gratia post ipsarum esum nephritici multas arenulas excernunt. Cum porro omnes autumnales fructus exiguum corpori alimentum præbeant, minimè omnium ficibus id usuiuenit. Carnem tamen non compactam, neque firmam generant, ceu panis, & suilla caro, sed turgidulam, & subinamem, ueluti fabæ. Quin uentrem flatibus implent & ipsæ, & non mediocrem hinc profectò molestiam intulissent, ni etiam celerem defecum essent adeptæ, cuius beneficio, cum celeriter peruadant, status quem excitant, non diu manet, atque ob id minus ceteris autumnis fructibus ledere consueuerunt. Ceterum natura ficis immaturas non medio critere antecellunt, quod & in alijs quidem omnibus cernitur fructibus: quanquam non tantum in illis discrimen existit. Siquidem ad plenum maturæ ficis paulò minus omni prorsus noxa uacant. Et sequenti capite, ubi uarum facultates recenset, sic inquit. Ficus, & uuae quemadmodum inter fructus autumnales principatum obtinent; ita fugacibus omnibus magis nutriunt, minimèque prauis succi habent, præsertim cum exactam maturitatem fuerint adeptæ. Porro quòd ipsæ non triant, maximo argumento sunt ij, qui uinearum si uictum custodiunt: siquidem hi cum duos menses solis uis, ac pinguis, quorum custodia præsumunt, uescantur (nisi fortè panis quidpiam cum illis addant) obesi tamen, ac pingues fiunt. At caro, quæ ex ipsis gignitur, haud quaquam est firma, ac densa, quemadmodum ea, quæ ex carnisibus nascitur, sed laxa est, ac præhumida: ob id celeriter etiam, cum uesci ipsis desierint, contrahitur, ac confidet. Idem etiam de Ficibus siccis disserens loco prius citato ita scribit. Caricæ multiplicem quidem habent utilitatem; si quis tamen largius estauerit, ab eis offendetur: non admodum enim probum sanguinem gignunt, quapropter pediculorum quoque agmen eas comitatur. Incidendi, extenuandique uim habent, quæ & uentrem ad excretionem irritant, & renes expurgant. Iecori autem, lienique inflammatione obseßis sunt noxiæ, quemadmodum & ficus, non peculiari quodam eximia facultate, sed communi ratione dulcium omnium ciborum, ac potuum. Obstructis autem illis, aut scirrhis tentatis, ipsæ ex sese nihil prosunt, nec obsunt: sed medicamentis incidentibus, ac extenuantibus, & abstergentibus mistæ, non mediocriter auxiliantur. Ideoque nonnulli medicorum in dictis lienis, ac hepatis affectibus exhibent ipsa longè ante cibum cum thymo, aut pipere, aut zingibere, aut pulegio, aut satureia, aut calamintha, aut origano, aut hyssopo. Ad eundem etiam modum, si caricæ cum alio quopiam eorum, quæ facultatem habent acrimie, aut omniuo incidendi, ac extenuandi assumantur, non solum sic affectis; sed sanis quoque utiles erunt. Siquidem iecoris meatus, per quos fertur alimentum, apertos esse non egrotantibus modò; sed benè ualentibus etiam tutissimum est. Proinde hoc pacto ficus cum sale extenuante, aceto, & garo præparatas uulgò comedunt, quòd id utile esse experientia didicerunt. Verisimile autem est, ipsorum nonnullos medici cuiusdam consilio adductos, ficis hoc modò primum comedisse; deinde eam notitiam ad uulgus dimanasse. Qui uerò cum cibo aliquo ingrassante ficis, & caricæ edunt, non mediocriter offenduntur. Item libro VIII. de simplicium medicamentorum facultate incipit Galenus ita scribit. Ficus aridæ uim habent excalfaciendi ordine primo etiam completo, aut secundo incipientem: habent uerò etiam partium tenuitatē quandam. Ex istis duobus idoneæ sunt, quæ tumores duros concoquant: partium uerò etiam ea discutunt. Atque ipsæ per se illitæ eiusmodi uim obtinent. Sed & decoctum earum eiusmodi utique natura est. Verum ubi magis concoquere consilium est, miscenda est farina triticea: ubi uerò plus discutere, hordeacea. panis horum in medio est. Sed hæc magis sunt propria tractatus de medicamentorum compositione, & rationis curandi. uerum in præsentia hæc de caricis nouisse sufficiat. Porro scire oportet, quòd quæ pinguioribus sunt, magis possunt concoquere, quæ uerò gustu acriores, magis tum extergere, tum discutere. Ceterum quod ex ijs plurimum in aqua coctis efficitur, simile est melli, non solum consistentia, sed & facultate. Porro ficus uirides comese, propter admixtam humiditatem, facultatis sunt imbecillioris. subducunt tamen aliam utraque tum humide, tum sicce. Ficus arbor calidæ, tenuiumque partium temperaturæ est, ceu indicant tum de quor eius, tum foliorum succus: ualenter enim eorum uterque calidus est. Itaque non mordicat tantum, aut absterget.



sterget uehementer; sed & ulcerat, & ora uisorum reserat, & fornicas, quas myrmecias uocant, eijcit: quinetiam purgare potest. Porro ficus agrestis, quam erineum Græcè ( Latine caprificum ) uocant, tum liquor, tum succus ad omnia quàm satius ualentior est. Sed & crassæ, hoc est, rami earum adeo sunt calidæ, tenuiùq; partium temperamento, ut carnes bubulas duras, si coquendis adijciantur, friabiles, ac teneras efficiant. hæc de ficibus Galenus. Democritus præcoces ficos fieri pollicetur, si oleo, & columbaceo simo arbor illinatur. Et contrà, serotinas; si primæ grossi, cum fabæ magnitudinem excessere, detrahantur. Ficum arborem item atque laurum, è celo fulminibus non ici compertum est. Fici fructus οἰκα Græcis, Latiniis Ficci, & Ficus appellantur: Arabibus, Sin, Fin, seu Tin; Italis, Fichi; Germanis, Feighen; Hispanis, Higos; Galis, Figuier,

Fici præcoces.

Nomina.

## Persea.

## Cap. CXLVI.



PERSEA arbor est in Aegypto, fructum ferens cibo idoneum, stomacho utilem. in quo phalangia cranocolapta nomine inueniuntur; præsertim in Thebaide. Arida folia in farinam redacta, illitu sanguinis eruptiones sistunt. Arborem hanc prodiderunt aliqui in Perside exitiosam esse, translataque in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

QUEMADMODVM superius in malorum commentatione prodidimus, Persea arbor Aegyptia non est (ut putat Marcellus Virgilius Florentinus) nostras Italica malus persica, sed planta plurimum disidens ab ea, ut & Dioscoridis, & Galeni testimonio facile probari potest; quandoquidem ij utranque, sed ut alteram ab altera diuersam, diuersis capitibus tradiderunt. Hæc (ut libro IIII. de plantarum historia cap. II. scribit Theophrastus) arbor est Aegypti, aspectu magna, formosaq; folio, flore, ramo totaq; figura potissimum pyro uicina; nisi quod altera folio perpetuo, altera deciduo est. Fructum abunde parit, omniq; tempore perficit: quippe nouus anniculum semper occupat. Maturitas anniuersariorum afflatu conficitur: reliquum crudiores auferunt atque recondunt. Est magnitudine pyri, figura oblongus, amygdalæ modo, colore herbidus. Nucem intus habet, ut prunum; uerum longè minorem, mollioremq;. Caro eius suavis, ac prædulcis manditur, concoctiq; facilis, & innocua, etiam largiore cibo sumpta. Radice arbor exuperat, tum longitudine, tum etiam crassitudine, multitudineq;. Materie constat robusta, dura, uisq; decora, ueluti lotus. Quapropter ex ea & simulacra, & lectulos, & mensas, & reliqua similia faciunt. Ex his igitur Theophrasti uer-

Perseæ arboris consideratio.

Perseæ mentio ex Gal.

Columellæ lapsus.

bis, si Persea nota, ac delineationes cum nostra Persica malo diligenter conferantur, liquido patere arbitror, has plantas inter se diuersas esse. De Persea uerba faciens Galenus lib. II. de alimentorum facultatibus, hæc memoria commendauit. Hanc etiam plantam uidi in Alexandria, quæ & ipsa magnis arboribus est annumeranda. Tradunt autem fructus huius apud Persas adeo noxium esse, ut edentes interimat: in Aegyptum uerò translatus, in esculentum mitescere, & pyrorum, malorumq; modo, cum quibus & magnitudine conuenit, existari. Eadem recensuit Galenus libro II. de compositione medicamentorum secundum locos, ubi de cephalæ curatione agens, sic inquit. In sola Alexandria perseæ arborem uidi, at non in alia Romanis subdita gente. Quidam persion ipsam appellant, autemq; in Persis lethalem eius arboris fructum esse, eum tamen is in Aegyptiorum regione innocuus existat. hæc tamen Galenus. Ex cuius etiam uerbis palam esse crediderim, perseam à persica malo prorsus disidere, cum in tota frè Europa persica malus frequentissima proueniat. Quin & ex ijs facile dixerim, Columellam errasse, quod existimauerit, persica ea esse poma, quæ à Persis ad Aegyptios allata perseæ dicuntur, ut libro cultui hortorum dicto his uerbis testatur.

Tunc præcox bifera descendit ab arbore ficus, Armenijsq; & cereolis, prunisq; Damasci stipantur calathi, & pomis quæ Barbara Persis miserat (ut fama est) patrijs armata uenenis. At nunc expositi paruo discrimine lethi Ambrosios præbent succos, oblita nocendi.

Arbor, quæ περσέα Græcis, Latiniis similiter Persea nominatur: Italis, Perseo Græcè uocis imitatione dicitur. Nomina.



## Iberis.

## Cap. CXLVII.

Iberidis conf-  
deratio .



Iberis, & le-  
pidium idem.

† **IBERIS**, siue cardamantica, folia habet nasturtij, uere uirentiora: caulem cubitalem, aut minorem, in incultis nascitur. Aestate lacteum florem promit, quo tempore efficacior est. Radices duas nasturtio similes habet, calfacientes, & adurentes. Ipsæ enim ischiadicis cum salsa axungia emplastri modo utiles, quaternis horis alligatæ, ut dein in balneas descendatur, & postea oleo cum lana locus perungatur.

¶ **VIDIMVS** primum Iberidem, quam nobis indicauerat Iulius Alexandrinus medicus Tridentinus, qui nunc ob præclarum sui ingenij, & doctrinæ dotes, apud Sereniss. Ferdinandum Regem Roman. artium medicarum exercet, extra ciuitatem Tridenti, ubi uulgò dicitur alle Laste, effigie nimirum, qua describitur a Dioscoride, ac alijs pluribus Græcis auctoribus. Huius Gal. in simp. censu nusquam separatim meminit, sed hanc, & Lepidium non nisi nomine differre prodidit. Quod etiam idem testatus est libro x. de compositione medicamentorum secundum locos circa finem de coxendicium curatione agens, ubi ex Damocrate sic inquit. Damocratis extat libellus, qui Clinicus inscribitur, in quo uersibus iambicis, quentadmodum solet, de tribus differit medicamentis. Ac primo quidem de eo disserit, quod ex herba conficitur, quam ipse Iberidem appellat, quod ad coxendicium dolores comendauit. In Iberide medicum quendam amicum suum curatum fuisse ait herba, quam (ut dixi) ipse Damocrates Iberidem uocat, ut qui tantum uisu herbam cognouerit, nomen autem eius nullum audierit, cum etiam id ipsum ignorauerit is, à quo eius usum didicerat. Porro ex notis, quibus eam representat, uidetur Iberidem appellare, quæ à Græcis lepidium nominatur, appellatione damocrate.

Et à regione, in qua amicus eius curatus fuit. Describit autem ipsius formam ijs carminibus.

Herba hæc ubiq; multaq; frequens nascitur,  
Momentum iuxta antiqua, muros, & ueteres.  
Tritasq; quondam publicè pedibus uias.  
Quas iuxta aratrum duxit haud quis agricola.  
Semper uirescens, folijs nasturtii  
Florentibus uere, attamen maioribus.  
Caulem cubitalis longitudinis gerit  
Paulò minorem, aut rursus ampliorem: ab hoc  
Aestate pendent folia, donec multa hyems  
Sarmentitiam deducat hæc ad inaginem, &  
Deiecta, & exiccata depereant gelu.  
Adnata radici tamen cernes alia.  
Aestate florem fert colore lacteo,  
Multum tenuem, uariumq; ualde, cauliculus.  
Ad quem sequitur semen penitus sic exiguum,  
Visum ferè ut fallens, oculos quoque effugiat.  
Odorem habet radix at inde acerrimum,  
Verò similem quam maximè nasturtio.

Iberidis ca-  
put additiu.

Huc illud etiam accedit, quod Galenus item loco citato, Hygieni Hipparchi auctoritate, Iberidem, & Lepidium idè esse testatur his uerbis. Si coxendicium dolores leuare est animus, herba Iberidem, quam aliqui lepidium uocant, aut nasturtium syluestre colligito. Ex cuius certè sententia asserere non dubitauerim, Iberidem apud Græcos eandem esse cum Lepidio. Vnde perspicuum est, hoc Iberidis caput huiusce primi uoluminis calci acceruisse nimirum librariorum, uel medicorum curiositate. In quam sententiam cum antedictis causis, ea ratio me potissimum deducit, quod constet, huius primi uoluminis calcem, non esse legitimum locum, in quo Iberidis historia fuerit collocanda: quandoquidem eiusmodi herbas Dioscorides lib. II. ordinatè disposuit, ac de eis disseruit, ubi priuatim lepidium quod Damocrati Iberidè existimamus, propriam assignauit sedem. Idcirco rectè Paulus Aegineta Lepidium Iberida quod appellari scribit, & ex tertio ex calfacientium ordine esse, ac nasturtio uiribus proximum. Et lib. III. in ischiadicis curatione: In totum, inquit, ischiadicis restituit sanitati iberidis herbae usus, quam lepidium quoque appellant.



Quare aperte hallucinariprehenduntur monachi illi uenerandi, qui in Mesuem commentarios scripsere, cum ex-  
 preſſe contra Galeni, & Pauli auctoritatem, & contra rationes, quas superius adduximus, aliud à lepidio iberidem  
 esse contendant. Quos tamen excusatos habeo, utpote qui fortasse maius studium rebus diuinis impendcrint, quam  
 ut certam simplicium medicamentorum cognitionem assequi potuerint. Ceterum non ignorandum est, Paulum  
 preter Iberidem, de qua nunc agimus, alterius etiam meminisse ab illa longè diuersæ, eiusq; item usum ad ischiadas  
 commendasse. Quod eius uerba demonstrant, quæ eodem loco ita sonant. Quæ uerò apud nos Iberis fruticosa na-  
 scitur similibus lauri folijs, & multò amplioribus, respondere multa experimenta testantur, non solum in coxarum,  
 sed in alijs quoque diuturnis affectibus. Huic planè adstipulatur Lepidium, quod Plinio lib. XIX. cap. VIII. his  
 paucis describitur. Exit lepidium in cubitalem altitudinem, folijs laurinis. Quibus sanè notis satis apparet, hoc se-  
 cundum Iberidis genus, uel lepidij dicamus, quod lauri folia mittit, eam esse stirpem, quæ hodie passim in hortis fre-  
 quens nascitur, à quibusdam Piperitis ob uehementem eius acrimoniã dicta. Itaque manifestè aberrarunt uiri alio-  
 qui clarissimi Barbarus, & Ruellius, cum lepidium illud esse putauerint, quod vulgus herbariorum Raphanum ru-  
 sticanum appellant. Veruntamen folia, quæ huic raphano insunt, uerbasco maiora, & helenio æqualia, manifestè  
 declarant, his legitimum non inuotuisse lepidium, nisi forsàn lepidium Raphani nomine acciperint. Plantæ, quæ  
 ἰβερὶς, καὶ ἀμυγδαλὶνὴ, καὶ ἀγριοκάρδαμον Græcis dicitur, nomen Latinum est Iberis, & Lepidium: Arabicum,  
 Seitaragi, Asceitaragi, seu Sitharegi, & Hausab: Italicum, Iberide, & Lepidio: Germanicum, Vuilder kresz:  
 Hispanicum, Nasturtio montefino: Gallicum, Chasse rage, Passeraige, & Nasitort sauage.  
 † Quod caput hoc de Iberide accreuerit in Dioscoride, eiq; adscriptum sit, illud maxime corroborat rationes in  
 commentario allatas, quod reperti sunt uetustissimi Græci codices, in quibus hoc caput non legebatur.

I Monachorū  
apſus.Iberis altera  
Paulo.Barbari, &  
Ruel. lapsus.  
Nomina.


## LIBRI PRIMI FINIS.



# PETRI ANDREAE MATTHIOLI MEDICI

Senensis Commentarii,

IN LIB. SECVNDVM PEDACII DIOSCORIDIS  
ANAZARBEI, DE MEDICA MATERIA.




**N** PRIMO, charissime Aree, libro, quem de medicinali materia condidimus, de aromatis, oleis, vnguentis, arboribus, & nascentibus ex eis succis, lacrymis, seminibus: quae differuimus. In hoc autem secundo de animantibus, melle, lacte, adipe, frugibus, atque oleribus explicabimus, subnexis herbaceis, quae acri praedita sunt facultate, utpote quae cum ipsis cognatione iuncta sint: qualia allium, cepa, sinapi intelliguntur. Idque ideo, ne cognatorum vires disiunxisse videamur.

Echinus marinus.

Cap. I.

**M**ARINVS Echinus stomacho, ventrique utilis est: urinam cit. Huius testa cruda inassata commode medicamentis admisceatur, quae psoras abstergunt. Crematae uero cinis sordida ulcera expurgat, luxuriantem carnem reprimat.



Echini marini confid.

Iouij error.

**E**CHINVS marinus notissimus est, ijs praesertim, qui in Italia tam Tyrrheni, quam Adriatici litora accingunt. Ingentem Echinorum numerum uidimus nos, dum placidis mare ageretur undis, in alueo magni portus Ciuitatis uetere in Romano litore, nigris horrentibus spinis. Alios uero uidi ex Pirano Istriae opdido allatos, his longe maiores, purpureo colore suffusos, quos Echinometras appellauerim, quod scripserit Aristoteles libro IIII. de historia animalium capite quinto, hos ceteros magnitudine excedere. Habentur circa Toronem Echini marini candidi testa, spina, & ouo: augeri forma productiore, quam ceteri, soliti: spinis paruis, non rigidis, sed mollioribus. Graeca (ut idem inquit) Echinorum plurima sunt. Primum, quod cibo idoneum est, in quo, quae oua appellantur, magna, esculentaque consistunt, pariter in maiore corpore, & minore, nam nouelli adhuc, paruique pleniusculi illis consistant. Secundum, ac tertium spatagi, ac brissi, quae genera pelagia sunt, raraque inuentu. Ad haec, quae Echinometra appellatur (quasi matrem, aut matricem dixeris echinorum) quae quidem omnes magnitudine excedit. Genus item aliud est minutum, spinis longis, praedurisque, gigni in alto gurgite solitum, quo nonnulli ad destillationes urinae medicamento utuntur. Quo fit, ut Paulum Iouium plane aberrasse crediderim: quippe qui suo de Romanis piscibus libello, Echinometram Aristoteli destillationibus urinae opitulari, non autem huiusce minuti genus, memorie prodiderit. Corpus Echinis clibani forma uisitur, priore, atque nouissima parte spissum, & continens: cetera uero non continuum, sed simile laterne, cui non obducta membrana est. Omnium maxime a natura muniti sunt, utpote qui testata undique spinis circumuallata celentur, quibus utuntur perinde ac pedibus: ijs enim nitibundi mouentur, sedemque permutant. cuius rei argumentum est, quod semper algam spinis implexam gerant. Euenit autem, ut quod caput appellant, & os, echinis uersum in terram sit: quod uero ad excrementi exitum deputatum est, id supra habeatur, quod



quod idem omnibus turbinatis, patellisq; euenit: pastus enim de imis petatur necesse est. Vnde fit, ut os inuersum ad partem sit, excrementum uero superius parte prona testæ contineatur. Dentes quini Echini omnibus sunt, caui iutrinsecus: inter quos caruncula quædam interiacens linguæ officio fungitur, mox iungitur gula, deinde uenter in partes quinque distinctus, perinde ac si plures numero uentres hoc animal habeat: sunt enim omnes distincti, pleniq; uacantis materiæ, & ex uno stomacho dependent, in unumq; ostium excrementi finiunt. Caro echini circa uentrem nulla, sicuti in uniuerso corpore. Sed quæ oua appellantur, numerosiora testæ adherent, membranulis singula oboluta, & paribus distincta interuallis: nigra etiam quædam circum ab ore fusim sparguntur, nomine adhuc nullo appellata. Sed cum non unum, sed plura genera Echinatorum sint, omnium partes quidem eas omnes sortiuntur: sed oua appellata, nec omnes cibo idonea, & parua admodum continent, exceptis ijs, qui uada incolunt. Tradunt scintiam maris Echinos præfagire, correptisq; operiri lapillis, mobilitatem pondere stabilientes. Quod ubi uidere nautici, statim pluribus anchoris nauigia infrenant. hæc ex Aristotele. Meminit utriusq; Echini Galenus, marini, scilicet, & terrestris unico tantum capite libro x. simplicium medicamentorum, sic inquit. Erinacei utriusq; tum marini, tum terrestris corpus totumustum cinerem efficit fucultatis tum extergentis, tum digerentis, tum detrahentis. Itaque eo quidam & ad excrescentia, & ad sordida usq; sunt ulcera. Animal, quod ἐχίνος Dadaorios Græcis, Latinis Echinus marinus appellatur: Hispanis, Erizo de la mar: Italis, Riccio marino.

Echinorū uires ex Galen.

## HYSTRIX.

## ECHINVS TERRESTRIS.



Echinus Terrestris.

Cap. II.

TERRESTRIS Erinacei corium combustum alopecij cum pice liquida aptissimè illinitur. Aspicatum corpus, & cum aceto mulso potum renum uitijis auxilio est: item aquæ, quæ cutem subijit, conuulsionibus, elephantia, & malè habitis, quos cacheectos uocant: uiscerum fluxiones exiccat. Eiusdem iecur sicili solibus excocto arefactum, ad eisdem usus utilissimè reconciditur.

TERRESTRIS Erinaceus uulgaris notitiæ animal in Italia est. Duplici constat genere, canino scilicet, ac suillo, quem admodum & iassus. Differentia dignoscitur ex eorum rostro. Id namque alij suillum, alij uero caninum habent. Raro ex cauernis exeunt, nisi noctu. quo fit, ut nocturno tempore à uenatoribus plerumque capiatur. Maturescentibus uinis per æstatem, & autunnum uineas petunt, ubi ad uuas, quæ solum attingunt, accedentes, acinos pedibus diducunt. His constrictis in terra, in orbem se conglomerant, & super eos se uolunt, itaq; spinas affixas portant in specum. Eodemq; actu syluestrium arborum poma à uentis decussa, aut maturitate decidua, in cauas arbores gerunt. Inter quadrupedes solus Erinaceus uolatilium more testes renibus hærentes habet: eaq; propter uelocissimè coit, non quidem aliorum quadrupedum more superueniens, sed erectus coniungitur propter spinas. Vbi præsensit uenantem, statim in globum se contrahit, ne quid comprehendere possit præter aculeos: itaque oblatrantes deludit canes. Affusa conglomerato aqua, illico soluitur is, & ingreditur. Frigidi temperamenti animal Echinus est, excrementis compluribus redundans, quibus aculei nutriuntur. Idcirco eius carnes in medicamentorum potius, quàm in ciborum usu sunt expetendæ: terrestres enim cum sint, agrè concoquantur, & minimum sanè præbent alimentum. Vires longè plures ijs Echino reddidit Rasis libro de sexaginta animalibus. Veruntamen quoniam illa, quæ ibi leguntur, potius apocrypha, quàm fide digna semper existimauimus; ideo hic ea adnotanda non duxi. Cæterum qui sunt harum rerum cupidi, eos se conferre poterunt, ubi diffusius tractantur. Erinaceorum longioribus aculeis, firmis tenuissimè mucronatis undequaque riget: in specubus moratur, & noctu magis, quàm inter diu ad pascua exit. Latet hoc animal hyeme in cauernis, ut ursus, totidemq; diebus fert utero foetum. Irata hystrix intendit cutem, & tunc suos iaculatur aculeos. Quo fit, ut non modo canes, sed quandoque uenatores se-

Echini terrestris consideratio.

Echini terrestris facult.

Hystricis mētio.




riat. Combusti cinis potus (ut Plinius est auctor) partus conceptos continet. Animal, quod ἐχῖνος χερσαῖος Græco sermone, Echinus terrestris Latino vocatur: Arabico, Ceusud, siue Caused: Italico, Riccio terrestris: Germanico, Hechel, aut Ygel: Hispanico, Erizo: Gallico, Herisson.

## Hippocampus.


## Cap. III.

HIPOCAMPVS marinum animal est exiguum. Cuius cremati cinis exceptus cum liquida pice, aut axungia, seu amaracino vnguento illitus, alopecias replet.

## HIPPOCAMPVS, LOCUSTAE GENVS.



HIPPOCAMPVS, EQVVLVS MARINVS.



Hippocampi  
consideratio,  
& opiniones.

Prima opin.

QUANQVAM non desunt scriptores, tam inter ueteres, quàm recentiores, qui in locustarum genere Hippocampus recenscant, quiq; ad multos in medicinis usus eum commendent; eorum tamen haecenus reperi neminem, qui peculiaribus notis eius historiâ tradiderit, effigiemq; exprompserit. Ceterum sunt, qui credant, Hippocampus id nominis sibi ascriuisse ab erucis, quæ in hortis olera; in campis uerò herbas uniuersas, & arborum frondes depascuntur, quasq; propriè Græci χερσαῖος uocant. quippe quòd illis fortasse forma, ac facie sit persimilis. Ad hæc non desunt, qui Dioscoridem mirentur, quòd scripserit, Hippocampus exiguum animal esse, cum tamen nomen plerumque magnitudinem innuat: ἰσσο enim Græcis grande significat, ut hipposelinum, hippolapatium, hippomarathrum clariorissime demonstrant. Veruntamen non ob id Dioscoridem impugnandum existimant, nec pariter alios, qui de eo idem scripserunt. Quoniam licet comparatum hoc animal marinis beluis, alijsq; in aquatiliu genere grandioribus, parum uideatur; si tamen eo erucarum generi comparatur, quarum imaginem, formamq; reddit, & à quibus nomen accepit, grande sanè fuerit. Vnde inclinauit quandoq; animus, eum esse Hippocampus, qui piscatoribus Aquile nomen accepit, & uocatur Faloppa. Corpus huic inest locustæ modo in longitudinem protensum: capite, & cervice oblongis: chelis minime bifidis, sed acutissimis solidisq; aculeis rigentibus: pedibus sexdenis, quorum decem, qui circum os habentur, scorpionum caudæ extremitatibus referunt; ceteri uerò ut in locustis spectantur. Cornua capite gerit sex, quorum postrema in latum funduntur. Dorsum est flexuoso erucarum modo, adeò ut in sicco earum ferè modo perambulet. Caudam gerit latam, alis pluribus se pandentem, rigentibus undiq; aculeis, maculis duabus purpureis nature artificio insignitam: adeò ut his notis quasdam uillosas erucas referat in nigro rufescentes, quæ pari forma sub terra degunt in hortis.



bortis, & agris, olerum, & segetum radices erodentes. Has Tridentina rura uocant uulgò Cagne; Ananieuses uero, quòd uillose sint, Orsolane. Qua appellatione planè uidetur nulgus illud secutum Coluuellan, qui has erucas hirsutas nominat. Proueniunt hæ in Tridentino agro frequentissima, exeuntq; è terra plerumque inbrii tempore: nam quæ prope herbari radices in caernulis se condunt, facile aquarum ingressu suffocantur. Quapropter olitores ijs ueniantur aduenientibus pluuijs, irrigantq; bortos, ut postea exeuntibus mortem inferant. Quo fit, ut, si uera referant, qui dicunt, Hippocampum è locustarum genere esse (id enim uidetur inter antiquos fateri Plinius lib. xxxi. cap. x. i. & inter recentiores Marcellus Dioscoridis interpres) nullum aliud marinum animal sese offerat, quod illud magis referre ualeat, quàm id, de quo diximus. Sunt & alij, qui pro certo uelint, Hippocampum esse pisciculum illum, uel potius marinum monstrum, qui quibusdam Dracunculus, alijs uerò Equiculus marinus uocatur, cuius nullus in cibis usus, flexuosum equum Hippocampum uertentes. Visitur plerumq; hic in piscarijs foris inter minutiores pisciculos, semidodrantali longitudine: capite potius draconis, quàm equi: rostro anteriori parte prominente, pectore arcuato, gibboso dorso, dupli utrinq; aculeorum processu, rectis lineis à capite ad caudam usq;. Gerit & in capite spinas adeò sursum porrectas, ut cristæ speciem præbeant, nec disparibus aculeis torquis in modum collum præcingitur: è quibus alia oritur aculeorum series medium interfecans pectus, duorum media, quæ utrinq; latera transcurret. Cauda illi tenuis, & unci modo reflexa. Horum opinionem, sicut & aliorum, cum rationibus, aut auctoritatibus comprobem, cur item contrà reprobem, sanè non habeo, cum hæcenus nusquam in probatissimorum auctorum monumentis legerim, qui per notas ipsum delineauerit. Nam etsi Plinius libro xxxvi. cap. v. dum Praxitelis, & eius filij Cephisodori admiranda percurrit marmora, uideri asserat in maxima dignatione Cn. Domitij delubro in circo Flammio Neptunum, Thetis, atq; Achillem, Nereidasq; supra delphinos, & hippocampos; cum tamen hæc portia ea fabulosaq; sint, nullam certè ijs adhibendam esse fidem existimauerim. Multa enim & pictorum, & sculptorū ad huc extant signemeta, ubi locis innumeris marini uisuntur equi piscium in morem natantes, quibus tantum equina sit facies, reliquum uerò corporis partim numerosis squamis contextum, alisq; perquam amplis ad natandum munitum piscium modo, partim uerò serpentis instar prælongum ac sinuosum, magna quidem, non parua corporis mole. Quòd si, fabulosa sequamur, hos facile Plinio Hippocampos esse probabimus. Quare potius dixerim ea, quorū historia ignoratur, omnibus fuisse, & esse cognitu difficillima, cum alias coniecturis tantum agatur. Hippocampi uires recensit Galenus libro xi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Et Hippocampum animal illud marinum si totum uisseris, alopecij prodesse proditum quibusdam est, ipsumq; uidelicet desiccantis esse facultatis, & tenuium partium: aut certè eius cinerem: quem quidam unguento amaracino commiscunt, quidam pici liquida, alij ueteri adipi suillo. hæc Galenus. Cæterum longè alias Hippocampi uires retulit Aelianus lib. xi. cap. lxi. de historia animalium, cuius uerba hic subiiciam. Rei piscatoriæ ritè periti homines dicunt Hippocampi uentrem in uino decoctū si quis dederit cuiuspiam bibere, cum primò ex ea potione acerrimo singultu affici, deinde tussire, & sicca quidem tussi uehementer torqueri. At enim nihil excreare, sed & superiorem ei uentrem intumescere, & calidos uapores in caput sursum efferrì, ac inde per nares minutatim defluere, & pusculentum odorem reddere, simul & oculos eius sanguine suffundunt, uerum nihil emittere. Quòd si natura euicerit, hunc tamen, periculata prius morte, in obliuionem, & demeritiam incurrere. Si in uentrem inferiorem delapsus fuerit, ipsum omnibus iam membris captum è uita excedere. Ex morte porro qui euadunt, mente capti aquam summo studio persequuntur. hanc enim ipsam: idcirco expetunt aspicere, tum stillantem audire, quòd sanè eis agritudinis leuationem afferat, & somnum conciliet. Itaq; ad perennes fluuios, aut ad litora, aut iuges fontes, aut lacus conuersiones eis gratae sunt, & iucundæ: cum tamen non magnopere considerent bibere, sed & ipsum natare, & pedes aqua alluere eis plurimum incunditatis adfert. Sunt qui non hæc male dicant huius bestie uentrem creare, sed Hippocampum algam acerbissimam, ex qua ita afficitur, depasci. Veruntamen solertia ueterani piscatoris, & ad res maritimas bene prudentis, salutaris etiam repertus est Hippocampus. is & Cretensis erat, & filios admodum adolescentes piscatores etiam habebat. Accidit autem, ut hic piscator Hippocampus simul cum alijs piscibus caperet, & per adolescentes à rabida canicula morderentur. Cum eorum in Methymna Cretensi ad litus iacentium uice dolentes spectatores interficiendam caniculam censerent, & illius iecur medicamentum ad rabiem edendum iuuenibus dandum esse; alij consulerent à Diana salutem petendam esse; senex piscator eos de consilijs, quæ afferrent, laudatos dimisit, & Hippocamporum exenteratorum alios assos eis comedendum dedit, alios in acetum & uel contriuit, iisq; morsus uleera obligauit, atq; hominum adolescentium rabiem uicit, eosq; ad ineoluitatem tandem restituit. hæcenus Aelianus de Hippocampi uiribus. Hoc animal ut Græcis in ἵπποκαμπος, ita etiam Latinis Hippocampus appellatur: Italis pariter Hippocampo.

Opinio altera.

Hippocampi uires ex Gal.

Hippocampi uires ex Aeliano.


## Purpura, Buccina, Cionia.

## Cap. IIII.

PURPURA uista exiccat, dentes abstergit, excrecentias in carne cohibet, ulcera purgat, & ad cicatricem perducit. Eadem præstant concremata Buccina, sed uehementius vrunt. Siquis salis plena fonsili crudo adurat, dentifricio conueniunt: ambustis utiliter illinuntur, quibus solui medicamentum non oportet: nam posteaquàm vulnus cicatricem duxerit, ipsum in teste modum induratum, sponte sua deciderit. Fit etiam calx è buccinis, ut in eius mentione demonstrabimus. Cionia uocantur purpurarum, buccinarumq; mediæ partes, circa quas testæ uolumen clauiculatim intorquetur. Crema si mili modo, maiore purpuris, buccinisq; facultatem urendi consequuntur, quoniam apprimendi naturam obtinet. Buccinarum carnes ori gratæ sunt, & stomacho viles, sed aluum non molliunt.

Nomina.





Purpurarum  
confid.

Buccinum

SVNT & Purpura marini pisces, eius sanè generis, quæ testa integuntur. Hæ (ut auctor est Plinius lib. IX capite XXXVI.) illum magni pretij florem retinent, purpureum propriè dictum, tingendis regum uestibus expetitum. Hunc in medijs faucibus gerunt, candida quadam uena conclusum, colore nigricantis rosæ pellucidum. Vnas capere contendunt, quia cum uita sua succum illum euomunt. Latent circa canis ortum tricenis diebus. Congregantur uerno tempore, mutuoq; attritu lentorem cuiusdam ceræ saluant. Lingua Purpuræ digitali longitudine, quæ piscitur perforando reliqua conchylia; tanta duritia aculeo est. Capiuntur autem purpuræ paruulis, rarisq; extrinsecus ueluti nasis, in alto iactis. Inest ijs esca, clusiles, mordacesq; conchæ, quales mitulos uidemus. has semineces, sed redditas mari audito hiatu reuiuiscences, appetunt purpuræ, porrectisq; linguis insistant. At ille aculeo extimulatus claudunt sese, comprimuntq; mordentia: ita pendentis auditate sua purpuræ tolluntur. Aqua dulci necantur, & si cubi flumini immerguntur: alioqui captæ diebus quinquagenis uiuunt salua sua. Anno magnitudinem implent, ætate rimeq; crescunt, quemadmodum & conchylia omnia. Est in purpurarum genere & Buccinum ad similitudinem eius buccini, quo sonus editur: unde & causa nomini, & rotunditate oris in margine incisa. Sed maior est purpuræ cuniculatum procurrente rostro, & cuniculi latere introrsus tubulato, qua proferatur lingua. Cui circum orbem aculei leati, qui buccino non insunt, sed utrisq; orbis totidem, quot habent annos. Buccinum non nisi petris adheret, circaq; scopulos legitur. Purpuræ, buccinaq; simul, quemadmodum & reliqua conchylia genera longa sanè narratione scriptis celebrata sunt ab Athenæo. Ad eius igitur uolumina accedant ij, qui plura scire desiderant. Sed quoniam

### MARGARITARVM CONCHA.



Margaritarum,  
& earum con-  
chæ historia.

MARGARITAE, quæ non modò ad mulierum, hominumq; decorem, sed etiam ad medicamenta maximo luxu expetuntur, à marinis & ipse gignuntur conchis, hic inter pretiosa conchylia eas recensere non ab re fore duximus: præsertim quòd neg; Dioscorides, neque Galenus de his quicquam, quod legerim, posteritatis memoriæ prodiderunt. Nasci itaque animalia, quæ margaritas gignunt, in oceano Indico refert Plinius lib. IX. cap. XXXV. Fertilis admodum earum est Taprobane, & Torois, item Perimula promontorium Indię, circa Arabiam in Persico sinu maris rubri. Origo, atque genitura conchæ est haud multum ostrearum conchis differens, ut liquidò constat ex ijs, quas nostrum striuulgò Madriperle appellant, quæ ad nos deferuntur. Has ubi genitalis anni stimulauerit hora, pendentis sese quadam oscitatione impleri roscido conceptu tradunt, grauidas factas postea eniti, partumq; concharum esse Margaritas.



ritas pro qualitate roris accepti. Nam si purus influxerit, candorem conspici: si uero turbidus, & sœtum sordescere: eundem pallere celo minante conceptum: Et ex eo quippe constare, cœliq; eis maiorem societatem esse, quam maris. Inde nihilum trahi colorem, aut pro claritate matutina serenum: si tempestiue satientur, grandescere & paratus: si fulguret, comprimi conchas, & pro ieiunij modo minui. Si uero & tonuerit, pauidas, ac repente compressas, que uocant Phrysenata efficere speciem, uerum inani inflatam sine corpore. Catero in aqua molles sunt Margaritæ, et exemptæ protinus durescunt. Quidam tradunt, sicut apibus, ita concharum exanimumibus singulas magnitudine, & uetustate præcipuas esse, ueluti duces, miræ ad cauendum solertiæ. Quocirca has summo studio petunt urinantes piscatores: si quidem capto rege facilius cæteras palantes retibus includunt. Concha ipsa cum manum uidet captiosam, comprimit sese, operitq; opes suas gnara propter illas se peti, manuq; si præueniat, acie sua abscondit, nulla inuisione poena, & alijs munita supplicij. Captæ multo obruuntur sale in uasis fictilibus: namq; erosa carne, uniones, siue margaritæ puræ, & expurgatæ decidunt in ima uasis. Dos omnis in candore, magnitudine, orbe, leuore, pondere; Vniones præstantissimi.

tamet si raræ admodum sint Margaritæ, que his omnibus dotibus præsent. Tradit Iuba Arabicis concham esse similem pestini insecto, hirsutam echinorum modo, inesseq; illi Margaritam grandini similem. In conchis quaternos, aut ad summum quinos reperiri Plinius scriptum reliquit. Verum Americus Vesputus, qui nostro æuo liburnicis omnem ferè australem oceanum explorauit, talem ibi concham se quandoque habuisse testatur, in qua uniones ultra centum & triginta reperti sunt. Quod non modo confirmant ij, qui post ipsam ad occidentales Indias nauigarunt; sed etiam addunt numerosiores ibi uniones in una tantum concha nasci: præterea alia plura de Margaritarum historia referunt, que à Plinij sententia plurimum dissident. Porro certum est & nasci, & capi margaritas in oceano occidentali Scoto, & Anglico sinu, sed eas quidem paruas, nec adeo pellucidas, ut orientalibus comparari possint, & quibus contextum thoracem asserunt, quem Dianæ templo Iulius Cæsar dicauit. Ad hæc non in mari tantum, sed etiam in fluminibus aquæ dulcis conchæ proueniunt, quæ margaritas gestant. Huius autem rei ego quidem testimoniū perhibere possum, quod iam mihi in Bohæmia degenti compertum sit in Vuotauua flumine & reperiri & capi conchas, quæ pulcherrimos includunt uniones, magnitudine, forma, & candore præstantes. Atq; certè mihi subiit quandoque mirari, cum earum margaritarum copiam uidi tum apud Serens. Principem dominum meum, tum etiam apud primarios Bohæmiæ homines. Margaritæ in medicum etiam usum ueniunt: quandoquidem scribunt Serapio, & Auicenna, eas ad cordis affectus præcipuam opem ferre. Quinetiam collyrijs aduistas oculorum nubeculas detergere, & aquam eò defluentem absumere. Animal, quod *πορφυρα* Græcè, *Purpura* Latine nominatur: Arabicè, *Napora*, & *Porphyra*: Italicè, *Porpora*. Quæ uero Latinis *Buccina*, *κίπυες* Græcis dicuntur: Arabicis, *Barcora*, *Cobros*, seu *Cobron*: Italis, *Buccine*: Hispanis, *Bozios*: Gallis, *Bios* cornetos. Caterum quod Græci *μαργαρίτας*, Latini item *Margaritas* & *Vniones* uocant: Arabes, *Hageralbat*: Itali, *Perle*: Germani, *Perlin*: Hispani, *Perlas*.

Vniones præstantissimi.

Plinij error.

Vnionum uires.

Nomina.

## Mituli.

## Cap. V.

MITULI laudatissimi in Ponto. Cremati eundem buccinis effectum præbent. priuatim plumbi more eloti, oculorum medicamentis cum melle utiles habentur: palpebrarum crassitudines absumunt, albugines purgant, & cætera, quæ oculis caliginem offundunt. Carnes eorum ad canis morsus vtiliter imponuntur.

## Tellinæ.

## Cap. VI.

RECENTES Tellinæ aluo utiles, sed maximè ius earum. Salitæ uruntur, tritæque in cinerem, & cum cedria instillatæ, aulfos palpebrarum pilos renasci non patiuntur.



NON desunt, qui Mitulos, & Tellinas idem esse censeant. In quam sententiam potissimum uenisse comperio Paulum Iouium uirum apprime eruditum: quippe qui libello, quem de Romanis piscibus edidit, malit (etsi medicus esset) cum Athenæo errare, quàm cum Dioscoride rectè sentire. Ex cuius scriptis satis aperte constat, aliud esse mitulos, Iouij lapsus

Mitulorū, &amp; tellinarū consideratio.



tulos, aliud tellinas: nam præterquam quòd de his duobus diuersis capitibus ipse differuerit, differentes etiam utriusque reddidit dotes, haud nescius illis inesse differentiam. Idem similiter sensit Galenus lib. x. de simplicium medicamentorum facultatibus, ubi de uiperis differens, eodem capite mitulorum etiam meminit; tellinarum uero peculiari capite, singulis proprias, et diuersas reddens facultates. Non secus ac illi, sensit Paulus Aegineta, fidelis nempe utriusque sectator. Quamobrem dicendum putauerim, differentes nimirum esse mitulos, et tellinas. Notissima sunt in Italia Tellinae, praesertim Romae, ubi plurimae uenales circumsferuntur, quòd edendo sint, et ori admodum gratae, si tamen ab arena optime repurgentur. Ceterum quales Mituli sint in Italia, qui hac nostra tempestate explicauerit, haecenus inueni neminem, præter unum Massarium Venetum, qui eos mitulos putat, quos Adriaticae accolae uulgò appellant Muscioli, quasi musculos dixerint. Cuius opinio nobis maxime probatur: quippe quòd et forma, et nomine conchylia ita uocata legimus referant mitulos. Sunt enim tellinis paulò maiores, testa exterius lineis quibusdam scabra, intus uerò pellucida, et tota pondere leuis. *Μύακες* ita Graecis, Mituli Latinis appellantur, pariter et Italis: Arabibus uerò, Amarchas: Hispanis, Mixilhus. *Τελλίνα* ut Graecis, ita etiam Latine Tellinae, et Italice Telline dicuntur: Arabicè, Sedef, et Talsam: Hispanice, Brignigois.

Nomina.

Chamae.

Cap. VII.

CHAMARVM, aliarumque conchularum in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet. id cum uino assumitur.



Chamarum consideratio.

QUANQVAM Chamae inter cetera conchyliorum genera longa descriptione ab Athenaeo referuntur; nihilominus tamen tot huiusmodi testaceorum habentur species, ut non facile sit, eas inter se distinguere. Ceterum præter ceteras conchas, id sibi peculiare asciuerunt Chamae, quòd plerumque in litore hiantes inueniuntur. Idcirco eas rectè Chamas dici posse putauerim, quæ in marinis oris, pendentes sese laui testa contextæ reperiuntur. Harum quam plurimas ipse uidi in Adriatici litore. Verum quoniam nulla alia facultate sunt præditæ, præter eas, quibus et reliqua concharum genera commendantur; ideo non est, ut plura de his dicamus. Quæ Graecis *χάμαι*, Latinis Chamae, Arabibus Hame, et Italis Chame nominantur.

Nomina.

Vnguis Odoratus.

Cap. VIII.

VNGVIS, siue onyx conchylj tegumentum est, ei simile, quo purpura integitur: quod in India nardiferis paludibus inuenitur, suauem ideo spirans odorem, quòd conchylia inibi nardi pabulo uescantur. Colligitur posteaquam stagnantes aquæ æstiuis squaloribus inaruerunt. Laudatissimus qui à rubro mari deferitur, candicans, pinguis. Babylonicus nigrescit, atque minor conspicitur. Ambo odoris gratia suffiuntur, sed aliquatenus castoreum olent. Idem suffitu excitant fœminas uulnæ strangulatu oppressas, comitialesque: poti uentrem molliunt. Crematum conchylum eadem efficit, quæ purpura, & buccinum.

Vnguium odoratorum consideratio.

QUI diligenter caput hoc de unguibus odoratis legunt, et expendunt, non ab re fortasse mirantur Dioscoridem, quòd scripserit, onyches, id est ungues odoratos in India nardiferis paludibus inueniri. quando nusquam à ueteribus et recentioribus memorie proditum sit, nardum in paludibus nasci, sed in montibus, arido et sicco solo. Ad mirationem suam illud non ob stare putant, quòd memoret Dioscorides, Indici nardi genus esse, quod Gangitis uocatur, à fluuio Gange, apud quem enascitur, montem præterfluente. Neque enim uolunt eam nardum in fluuio illo, aut in paludibus pronenire, sed in monte, aut insinu eius parte, quam flumen ipsum alluit. Præterea cum scribat Dioscorides, conchylas odoratas in India paludibus inueniri, illis planè absurdum uidetur, quòd præ ceteris eas laudauerit, quæ à rubro mari deferuntur: quòd item Babylonici generis meminerit. Addunt insuper, quòd cum unguis is, quorum in officinis pharmacopœorum communis est usus, si uruntur, non suauem spirent odorem, sed potius castoreum oleat, qui nimirum odor ab omnibus et iniueundus, et ingratus habetur, fieri non potest, quòd odoris gratia præferunt.



## VNGVES ODORATI.



presertim quod ijdem suffitu (ut Dioscorides tradit) excitant foeminas uulue strangulatu oppressas, comitialesq;. Sciunt autem, quod qui huiusmodi morbis tentantur, ab odoratis leduntur, & à foetidis iuuantur. Verum quia nitimur quantum possumus pro uostra uirili parte Dioscoridem defendere, & ab erroris suspitione uindicare, quid mihi illa cogitanti occurrerit, nunc edisseram. In primis igitur non ita mihi mirum uidetur, quod à Dioscoride scriptum sit, ungues odoratos in nardiferis Indie paludibus inueniri. Nam si, eodem auctore, aliqui arbitrati sunt, malabathrum esse Indici nardi folium, falsi quadam odoris cognatione, facile fieri potuit, ut ijdem rei herbarie im- periti paludes, quae malabathrum gignunt, nardiferas uocauerint, simili ratione decepti. Quorum forte Dioscorides appellationem secutus, eas paludes Indie nardiferas nominauit, in quibus ungues odorati inueniuntur. Deinde illud quoque mirum non esse debet, quod ad nos adferantur conchulae Indicae ex mari rubro, ac Babylone. Etenim hoc non euenit, quod inibi nascantur, sed quod Dioscoridis tempore non secus ac nostro, mercimonia, quae ex India in Graeciam & Italiam conuehebantur, omnia prius per mare rubrum conueherentur in Aegyptum, nempe Memphis, aut Alexandriam. Sed quomodo sit, dicet aliquis, quod rarae admodum reperiantur conchulae Indicae, quae suauem spirent odorem, eoq; nardum imitentur, atque odoris gratia suffiantur? Certè non aliam ob causam fieri tant, ut Indicae nardo euenire libro superiori in eius mentione diximus: uel quod ea, quae ad nos adferuntur, in paludibus capiuntur, quae malabathro prorsus destituuntur. Nam quoniam multo iam tempore malabathrum ad nos non aduehitur, facile adducor, ut credam id in India cultorum negligentia periisse, perinde ac balsamum in Iudaea. Quippe ut malabathrum renascatur (id quod Dioscorides refert) necesse est, ut siccatis aestiuo seruore aquis, humus aridis fruticibus uratur. Quod cum ab Indis fortasse fuerit omissum & neglectum, facile postea factum est, ut uniuersum malabathri genus omnino deperditum sit. Atque adeo hinc est, ut ungues ij, qui hodie ad nos adferuntur, nullo nardi odore commendentur. Postremo illud mihi haudquaquam absurdum esse uidetur, quod conchulae Indicae suffitu pressas uteri suffocatione mulieres comitialesq; reuocent. Namque, quod fieri potuerit, nos non uergamus, onyches olim fuisse odoris grati atque iucundi, utpote qui malabathrum redolerent. Sed equidem existimo odorem illum partibus ita tenuibus inhesisse, ut igni imposita testa ille statim exhalaret. Testa uero eadem relicta & incensa, quid mirum si odorem foetidum emisserit, & castoreum oluerit? ex quo sane (ut experientia docet) mulieres uulue strangulatione laborantes suscitantur. Ceterum cum onyx unguem significet (unde conchula Indica unguis odorati nomen accepit, quod fortassis unguis alicuius effigiem referat) cur ipsum purpure tegumento similem fecerit Dioscorides, mihi haecenus incompertum est. At certè, ut dicam quod sentio, mihi non placet eorum opinio, qui non alia de causa hoc conchylij genus onychem appellari uolunt, quam quod eius tegumentum sit rugarum, concauitatis, asperitatisq; experts: leuore autem, ac candore praeditum, humanorum unguium modo. Siquidem purpure testa, cui onychem assimilat Dioscorides in uniuersum aculeata conspicitur: quin & inaequali, sinuosoq; cortice obducitur. Porro quod uideam ungues odoratos, qui in myropolijs passim habentur, brutorum quorundam ungues representare, atque si urantur castoreum olere, facit ut ferè non dubitem affirmare eas legitimas esse.

Fuchsius in suis in Nicolaum Myrepsicum doctissimiis annotationibus in compositione aureae Alexandrinae, ubi ipso uertente legitur, osis anterioris narium purpure, scribit id nil aliud Nicolao designare, quam quod Actuarius, & alijs posterioribus Blattium Byzantium, siue bysantis dicitur, quod in quibusdam interpretationibus in Nicolaum legitur *βλάτιον Ευζαντιον* ὅς ἐστι τῆς πύως τῆς πορφυρας. Quin & differre inter se ait Blattium byzantium, & Dioscoridis onychem, quod onyx conchylij sit tegumentum, blattium autem os anterius narium purpure. Quod etiam confirmauit libro primo de compositione medicamentorum, illud etiam addens, officinis hodie hoc os, quod in ore, aut narium purpure reperitur, Blattium bysantium uocari. Sed longè quidem ab eo dissidet opinio nostra. Primum quod Serapioni, & Auicennae, quorum uocabula medicamenta q; tam simplicia, quam composita (ut ipsemet fatetur Fuchsius) recentiores Graeci saepius usurpant, nil aliud designat Blattium byzantium, quam Dioscoridi onyx, Latini unguis odoratus dictus, ac pariter conchula Indica. Huic alia accedit ratio, quod cum haecenus non inuenerim, qui purpurarum os tam oris, quam narium (ut Fuchsio placet) siue testa earum tegumentum odore aliquo commendauerit, quiq; inter odoramenta recensuerit, atque antidotis inferuerit; sed qui tantum scripserint, earum crematarum cinerem exicare, dentes abstergere, excrescentias in carne cohibere, ulcera purgare, & ad cicatricem perdu-

Fuchsi opinio reprobata.



ecce: contra uero constet omnibus odoratos ungues à Mauritanis præferri, quod aroma quoddam respiciant, & tenuium, atque adstringentium sint partium, ad uentriculi, iocineris, cordis, uteriq; affectus, non modo Fuchsi, sed Nicolai quoque sententia (modò huius codex non sit deprauatus) inanis profectò, & planè refellenda uidetur. Quod autem ad hos affectus odoratos ungues prætulerint Arabes, quibus recentiores Græci longè plura accepta referunt, testis est Serapio auctoritate Meschæ, cum inquit. Conchula Indica excalfacit, & siccatur ordine tertio: quàm adstrictionis, & tenuium partium est particeps: uentriculo, cordisq; palpitatio, iocineri, uulnèq; odoris fragrantia confereus. Quo fit, ut etiam faciliè crediderim, Actuarius nil aliud Blattium, siue blattum bysantium repræsentare, quàm Indicam odoratam conchulam, non ut Fuchsius arbitratur, os in ore, uel naribus purpuræ inuentum. Miscetur itaque Indica conchula, uel eam noce odoratum unguem, non sine magna ratione, & auctoritate à posterioribus Græcis in aurea Alexandrina, quod ad cardiacos, & uiscerum morbos sit admodum utilis. Quin & in antidoto è margaritis, quod omnem uirium imbecillitatem firmet, animi defectum siue à corde, siue à uentriculo originem ducat, maxime inuenit: longò morbo deiectos, & imbecillitate languentes recreet, & uteri strangulatus in mulieribus auertat, ut Actuarius, & Nicolaus Myrepsius testantur. Quæ omnia odorata conchula per se ferè præstare potest, si primum eius qualitates, deum uero facultates perpenderimus, quarum nullæ (quod sciam) purpuræ assigantur. Quare non immerito Nicolaum damnauerim (si tamen error illi adscribendus est) qui narium purpurarum ossa excogitauerit his antidotis esse admiscenda, cum purpuræ in uniuersum præter testam, qua conteguntur, ossibus careant. Nisi fortè is in purpuri narium os appellauerit, quod in anteriori testæ parte proeminet, & rostri potius quàm narium speciem repræsentat. Illud præterea falsum esse deprehenditur, quod officinis hæc excogitata purpurarum ossa Blattæ byzantiæ uocentur, cum etiam quæ legitime in officinis habentur, propriè sint odorati ungues. Postremo quæque sint illæ in Nicolaum expositiones, quibus maxime nititur Fuchsius, eas nostris rationibus, & auctoritatibus adductis haudquaquam obstare posse putauerim, cum fortasse incerti sint auctoris, uel si certi, minime probandi, quod is rationis, ac ueritatis refragetur. Nisi quis dixerit, illum contra quàm Fuchsius intellexerit, Nicolai uerba interpretatum fuisse, & lectores admonuisse, nil aliud Nicolai designare ὄσιν τῆς πύως τῆς πορφύρας, quàm βλάττον βυζαντίων, id est, unguem odoratum. Siquidem cum Nicolai uerba secundum Fuchsi interpretationem adeo per se clara sint, ut nulla indigeant explanatione, non erat opus, ut ille interpret esca aliter exponeret; sed potius, ut declararet, animaduersa deprauata Nicolai lectione, pro eo purpurarum osse in Nicolai antidoto Blattum byzantium, id est, Indicam conchulam admisceri debere. quod faciliè sciret, fabulosum esse purpurarum ossa in aurea Alexandrina, & diamargarito sit interpretatus, sed byzantiæ blattam, quam odoratum unguem esse, hæctenus nos abunde demonstrasse existimauimus. Huius uomen Græcum est ὄνυξ: Latinum, Unguis odoratus, & conchula Indica: Arabicum, Athsar ateb, aut Adsar altaib: Italicum, Vngbia odorata.

Nomina.

## COCHLEAE.



Cochleæ:

Cap. IX.

TERRESTRES cochleæ stomacho utiles sunt, & non faciliè corrumpuntur. Optimæ Sardonicæ, Africane, Astypaleicæ, & quæ in Sicilia, ac Chio gignuntur, & quæ in Liguria alpibus, pomatiæ, id est, operculares, cognominatæ. Marina stomacho idonea, & faciliè aluo excernitur. Fluuiatilis uerus olet. Quæ uero uepribus, frutetisque glutinata coheret, quam uocant nonnulli sesilon, uenterem & stomachum turbat, uomitiones excitat. Crematæ omnium testæ excalfaciendi, & uendi naturam fortiuntur: purgant lepras, vitilignes, dentesq; emendant oculorum cicatrices, & uicis cutis in facie, albugines, ac uisus hebetudines, si cum carne sua uisæ, tritaq; ex melle illinantur. Cruda cum tegumentis imposita, aquæ inter cutem tumores exugunt: sed non antè soluantur, quàm omnis humor. podagricas inflammationes leniunt: impactos corpori aculeos illatæ euocant: mentes trita, & admotæ ciunt. Carnes earum cum thure, & myrrha illatæ, cum uulneca alia, tum maxime que



quæ nervi acceperunt, conglutinant: trita in aceto, sanguinem naribus erumpentem infrænant. Vi-  
uæ corpus, & præsertim Africana, cum aceto deuoratum, stomachi dolores mitigat. trita cum testa,  
uino, & myrrha, si exiguum inde bibatur, colicæ, uescicæq; cruciatus sanat. Terrestris pilos incommo-  
dos replicat, si quis abrafo acu lentore cius, pilum attingat.

**COCHLEAE** uulgo notissimæ sunt. Hæ licet albæ, nigræq; reperiuntur, tum magnæ, tum parvæ, tum medio-  
eres: omnes tamen eandem naturam in uniuersum obtinent. Si uero aliquo pacto inter se differunt, id natalis soli cau-  
se ascribitur: nam quæ in apricis admodum locis odoratis uicinant herbis, ijs sanè præstant, quæ in opacis degunt, ac  
in palustribus. Id enim gustu facile deprehenditur, quod hæc uel insipide habeantur, uel palustrem resipiant linum;  
ille uero sapidiore, esuiq; gratiores existant. Quandoquidem absinthium depastæ anaritudinem reddunt, sicuti quæ  
serpyllum, pulegium, calamintham, organum, aliasq; odoratas herbas assumunt, odoris gratia commendantur. In qua-  
rum numerum æquè referri possunt, quæ paulo lupinis maiores in agro Romano leguntur, ubi autumno quorundam  
carduorum caulibus acceruatim coherentes innumere uisuntur. Cochleas olim usque adeo cœnis expetitas memo-  
rat Plinius lib. IX. cap. LVI. ut ijs uiuaria à nonnullis fuerint instituta, distinctis quidem generibus earum, quò  
melius gula fieret satis: separatim ut essent albæ, quæ in Reatino agro nascuntur: separatim Illyricæ, quibus magni-  
tudo præcipua: Africana, quibus fœcunditas: Solitana, quibus nobilitas. Saginam quin etiam commentati sunt sapa-  
tis, & farre, alijsq; rebus. quæ eas alebant. Non me fugit, quas Dioscorides pomatias uocant, plurimas reperiri in mon-  
tibus Tridentinis, uicinisq; alijs locis, & eas quidè præstantissimas. Eruntur enim è terra hyeme in sepibus, et frute-  
tis, uincis quibusdam ferreis, prope fruticum radices terra circumfossa. Concluduntur hæc contra frigoris iniuriã, quo-  
dam albo operimento, duro, gypsi speciem referente, sicq; contextæ terra se condunt. Fit enim ob hoc, ut in cibis ijs lœ-  
gè suauiores, gratioresq; habeantur, quæ uere, & æstate imbribus excitatæ hinc inde uagantur. Quod autem sic  
hyeme recondantur, delitecantq; sub terra circum fruticum radices, Hetruria planè ignorat; cum tamen & ibi eo-  
dem modo ab his eruantur, qui alibi artem didicerunt. Cochlea sit tota cum testis urantur (ut Galenus memoriæ  
prodidit libro XI. simplicium medicamentorum) admista galla omphacitide, simulq; pipere albo, mirificè profunt dys-  
senterijs, in quibus ulcera nondum putredinosa sunt. Conuenit autem ut piperis sit pars una, gallæ uero duæ, quatuor  
cineris cochlearum. Hæc ubi ad unguem leuigaris, cibis inspergito, bibendumq; aut ex aqua, aut ex uino albo, & au-  
stero præbeto. Ceterum absq; gallæ mistione cinis cochlearum admodum resiccantis est facultatis, obtinens item nõ-  
nihil ex ustione calidum. Porro cochleæ, quæ ustionem non sunt expertæ, si trita unà cum testis imponantur, & to-  
tienti aqua inter cutem laborantium, & in arthriticis articularum tumoribus, ægrè quidem diuelli poterunt, cate-  
rum impensè desiccant. Et omnino inherere ipsas finire oportet, quoad sponte decidant. Idemq; faciendum in tumo-  
ribus ex ictu natis difficilè solubilibus, & ex contusione facta in auribus. Desiccant enim illos magnopere uniuersos,  
etiã si uiscosus, crassusq; in alto humor contineatur. Idem libro citato, cum de diuersis carinibus uerba faceret, sic  
de cochlearum quoq; carne differuit. At cochlearum caro prius in mortario contusa, ac postea ad leuorem redacta,  
omnium ualentissimè desiccet partes superfluo humore grauatas, adeo ut & hydericis conueniat. Ipsarum autem hu-  
mor solus per se citra carnem sumptus (uocatur autem is à multis *μύξα κοχλία*, hoc est, mucus limacis) thuri mi-  
stus, aut aloë, aut myrrhæ, aut horum quibusdam, aut omnibus, quoad habeat cerati crassitiem, medicamentum sit glu-  
tinatorium, desiccetq; pulchrè purulentos mucos aurium: sed & fronti impositum inhaeret, oculorum fluxiones re-  
siccans. Quidam etiam ad palos eximendos utuntur totis unà cum testis ad leuorem tritis: sed & quidam ad sisten-  
dos menses. Et quidem ego aliquando in agro carnes ipsas solas in uulnus cum nervi uulneratione, & contusione fa-  
ctum tritas imposui, ipsamq; uulnus pulchrè glutinatum est, & nervus phlegmonem baud perpeffus. Erat autem ho-  
mo durus, & agrestis: miscui tamen illis contritis pollinem farine acceptum à pariete molæ proximo. Scripsere au-  
tem maiores me nonnulli medici ad eiusmodi usum miscendum ipsi thuris, aut myrrham. Verum horum habebam tum neu-  
rum, ut qui tunc ab urbe abessem in uilla. Possis autem & resina fricta contrita admiscere, si adsit, quippiam. Por-  
ro ubi multi muci cochlearum accipere uoles seorsum; stylo carnem earum pungito. Sed non ante multos dies uena-  
tas esse expedit: alioqui enim tempore desiccantur. Nam recentes plurimum habent uiscosæ illius humiditatis, quam  
stylo compunctæ effundunt. Humiditas hæc pilorum in palpebris præter naturam gluten est. hæc Galenus. Cochleæ  
tum crudæ, tum coctæ cum testis suis, aut sine, contrite emplastris concoquentibus, & sanicem è uomicis fracta cute  
educantibus utiliter inmiscuntur. Marinæ in Italiæ mediterraneis perquam raro in cibis ueniunt: quanquam ijs,  
qui maris litora inhabitant, frequentiori sint usui. Sunt & in cochlearum genere, quæ tegumento, uel testa carent,  
quæ nobis speciatim Lumache uulgo appellantur, noctu potius, quam interdiu ad pascua excurrentes. Degunt hæc non  
modò in campis, & hortis; sed in cellis uinarijs, & alijs subterraneis uliginosisq; ædium locis. Gerunt in capite lapi-  
dem (non tamen omnes) quem febribus tertianis adalligatum uulgus prodesse existimat. At Plinius lib. XXX. cap.  
XV. auctor est, hunc lapidem adalligatum dentitionem facilem præstare. Expetuntur hæc mulieribus ad expoliendam  
leuorem mentitur. Quin & his Africæ abundare scriptum reliquit Plinius lib. XXX. cap. XVII. & eas combustas  
dysentericis utilissimas esse, dariq; ex eo cinere cochlearia bina in uino myrtite, aut quolibet austero. *Κοχλία*  
ut Græcis, ita Latinis Cochleæ nominantur: Arabibus, Balzum, & Halzum; Italis, Chiocciolæ: Germanis, Schnecken:  
Hispanis, Caramuyos, & Caracoles: Gallis, Escargots.

Cochlearum  
consideratio.Cochleæ po-  
matia.Cochlearum  
vires ex Gal.Cochleæ ma-  
rina.Cochleæ si-  
ne testa.

Nomina.



CANCRO RVM fluuiatilium exustorum cinis, qui duo cochlearia expleat, adiecto dimidio radicis gentianæ modo, triduo potus cum uino, magnopere prodest canis rabiosi moribus: rimas pedum sedisque, perniunculos, & carcinomata, cum decocto melle lenit. Triti crudi, potiùq; ex asinino lacte, auxiliantur contra serpentium phalangiorumque morsus, atque scorpionum ictus. Decocti autem: & cum iure esitati, ijs profunt, qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hauserunt. Necant scorpiones triti, & cum ocimo admoti. Possunt eadem marini, uerùm inefficacius omnia præstant.



Cancrorum  
consideratio.

Multorum  
error.

HALLUCINANTVR, qui credunt Cancros à Dioscoride, & Galeno descriptos illos esse, quos uulgus Italorum Gambari nominat. Καρκίνος enim Græcè (ut hoc loco scribit Dioscorides) non cum significat cancrum persperam uocatum, qui ἀσάνος appellatur à Græcis; sed qui rotundo corpore habetur, quem nos Hetrusci uulgari nomine diciunt Granchio. Is Venetijs, ubi marinorum numerus propè infinitus habetur, ubi crusta exuerit, à corporis mollitie uulgo uocatur Mollecca. E quorū genere sunt etiam que appellantur Macinette: nam & hæc suo tempore crustam exuunt. Hoc ita esse testatum reliquit Aristoteles libro IIII. cap. II. de historia animalium, ubi sic inquit. ὁ δὲ καρκίνος μόνος τῶν τοιούτων ἀνθρώπων, καὶ τὸ σῶμα τὸ μὲν τῶν καρκίνων, καὶ καρκίνων ἀσάνων, τὸ δὲ τῶν καρκίνων στρογγύλον. hoc est. Cancer solus ex crustaceis non regitur canda, & corpus cum quidem locustis, squillisq; longum sit, cancris uerò rotundum est. Porro astacos Oppiano speciatim dicitur gammarus magnus ille marinus, quæ Romani, & Tyrrheni litora incolentes Leonem appellant. Veneti autem, quasi adhuc Græcis nomen retineant, cum uulgo Astase nominare consueuerunt. Idem dictus est gammarus à Theodoro Aristotelis interprete: quippe quod uulgaris gammarum faciem representent. Veruntamen (ni fallor) Aristoteli ἀσάνος nil aliud esse crediderim, quàm quod Venetis astase, Romanis uerò leo nuncupatur: quandoquidem is paulò inferius postquam de marinis, quæ crusta integuntur, animalibus disserisset, uidetur sanè uulgares fluuiatiles gammaros describere, re statim post fluuiatiles cancos, cum inquit. ἐστὶ δὲ καὶ ἕτερον γένος μικρόν μὲν, ὡς οἱ καρκίνοι, τὸ δὲ αἶδος ὁμοίον τοῖς ἀσάνοις. hoc est. Genus item aliud est, quod quidè parvū est ueluti cancri, facie uerò astacis simile. Hæc, meo quidem iudicio, declarant, Græcis fluuiatilem gammarum proprio carere nomine, utpote & paruorum cancrorum aliqua genera, ut ipse eodem loco testatur Aristoteles, cum inquit. Ceteri minutiores, & nullis penè nominibus annotati. Quo fit, ut putauerim ego gammaros Galeno appellari γαμμαρίδες, mutato, cum Romanum uenisset, à Latinis uocabulo, quod eo carerent Græci. Namq; lib. III. de alimentorum facultatibus: Ἀσάνοι (inquit) καὶ πάγυροι: καὶ καρκίνοι τε καὶ κάραι, καὶ καρίδες, καὶ γαμμαρίδες, ὅτα τὰλλα λεγόντων ἔχει τὸ περὶ ἁπλοῦς ὅσπρον. hoc est. Astaci, paguri, cancri, locustæ, carides, gammarides, & id genus alia tenui testa concluduntur. Magisq; hoc affirmare non dubitauerim, quod nomen hoc à Galeno Græcum factum, uel apud Aristotelem, nec apud quenquā repererim unquam. Quibus etiam ex uerbis palàm certè est, inter gammaros, & cancos manifestam esse differentiam. Quamobrem eos medicos hallucinari censenus, qui pro Cancris ad canum rabidorum morsus, itemq; ad tabidos, & marasmo laborantes Gammaris utuntur: quandoquidem cum Dioscoridem, tum Galenum non de gammaris quidem, sed de cancris intellexisse nobis compertum sit. De Cancris Galenus libro XI. de simplicium medicamentorum, hæc susius scripta reliquit. At fluuiatilium cancrorum cinis, quanquam similiter prædictis exiccatorius est; substantiæ tamen proprietate mirificè contra rabiosorum morsum efficax est, isq; tum solus, tum cum gentiana, & thure multò præstantior. Thuris sanè partem uuam esse oportet, quinque autem gentianæ, porro cancrorum decem. Et rarò equidem aliter illis uestis nos sumus usi: ceterum ad eum modum plerunq; quo Aescrion empiricus ille utebatur, medicamentorum peritissimus senex, conciuisset, ac præceptor meus. Patella erat aris rubri, in quam impositos cancos uiuentes, hæctenus urebat, dum faciliè ad leuorem redigi possent. Hic Aescrion paratum promptum semper in ædibus hoc habebat medicamen, urens cancos tempore æstiuo post ortum canis, quando Sol in Leonem transisset, luna decima octaua. Porro bibendum hoc medicamen ijs, qui à cane rabido fuissent morfi, præbebat quotidie.




quotidie usq; ad diem quadragesimum, mensura cochlearij satis magni aquæ inspersum. At si non protinus ab initio, uerim aliquot post dies curam cœpisset demorssi, tunc quotidie duo cochlearia aquæ inspergebat. Ad ipsum uero unum emplasticum applicabat medicamentum, quod ex pice brutia, & opopanax, acetoq; conficitur, habens picis librâ unam, unum aceti accerrini sextariū Italicum, opopanax uero uncias tres. Hæc tametsi à præsentī instituto essent aliena, scribenda tamen censui, quia magnopere medicamento huic ipse considerem: nimirum cum nullus unquam eorum, qui illo, ut dictum est, fuerunt usi, sit mortuus. Caterum seorsum alterum librum conscribam aliquando de ijs, quæ proprietate substantiæ totius quid agunt, & quorum numero sunt id genus omnia. Ignoscendum itaque tum hoc in loco scribendi importunitati, cum sicubi præterea id mihi hoc in opere contigit: nempe quia ex dictis summa proueniret utilitas, quam sanè posteris impertire uolebam, si forsitan me prius, quam quæ his deinceps sunt opera, perficere uolens, non abs re inquit. Cancer cùm animal sit aquaticum, prodest à cane rabido morsis, quibus uidelicet merinos conuenire cancos dictabat, scilicet quod animalia marina ob admistionem salis natura sicciissimi haud æquè exactam tuerentur eam, quæ est aduersus rabiem, contrarietatem. Ac cùm quidam subiecisset, cur non omnia, quæ in potabili aqua degunt animalia, perinde ut cancri, iuuare assolent: quia, inquit, similem cancris præparationem non admittunt. Nam horum uistorum cinerem, exiccaturius cùm sit, canum mordentium uenenum absumere, simulq; digerere professus est. Hæc igitur Pelops dicebat ambitione magna iactitans, omnium se talium nouisse causas. At ego nisi planè me scire quippiam prius persuasum habeam, alijs persuadere non tento. Itaq; nec Pelopis rationem, ut ueram accepi, ut quæ crebras habeat contradiçiones: uerim cancos opinor ex proprietate totius substantiæ prodesse. Quoniam autem nullum eorum mortuum sciueram, qui fuerant illis usi, totis utiq; corporibus, hoc aperiendum, recensendumq; à me existimaui, tametsi non esset huius instituti proprium: nam id non erat propositum. haftenus Galenus. Caterum gammarorum faciem referunt locustæ, & squillæ; quanquam hæ chelis careant. Gerunt gammarum eo tantum tempore, quo crustani exuunt, duos in capite lapillos albos, rotundosq; quibus utuntur medici utiliter ad expellendos renum calculos: conterunt enim hos in puluerem, & ex uino potandos exhibent. Rotundis autem cancris marinis similibus, quos Adriatici accolæ, maris & foemine discrimine uulgò Granci, & Macinette nuncupant, abundat maxime ubiq; suis in fluminibus, ac riuiis Hetruria. nam quemadmodum Insulæ, Transalpinarumq; regionum fluuij, ac lacus gammaros alunt; Ita Hetruria cancos, utpote & Græcia, ubi ab Aeschrio ne, & Galeno à cane rabido demorssi ex eorum cinere saluberrima parabatur antidotus. Sed & illi non minori in errore uersantur, qui putant marinos minutiores (ut ita dicam) gammarulos, quas uulgò Gambarelli, & Gambaru soli appellamus, eos esse, quos tum Aristoteles, tum Galenus, tum Aelianus, tum Plinius cancellos nominant. quippe quod hi gammaruli Aristoteli propriè squillæ paræ dicantur. Siquidem ijs, qui in hoc genere nunquam rufescunt, uenetis, alijsq; quam plurimis populis proprium adhuc Squillæ retinent nomen: uulgò enim Schille dicuntur; quanquā in Hispania, præsertimq; in Cantabria omnes hi gammaruli Squillæ nulla differentia uocitentur. His, ut diximus, adstipulatur Aristoteles lib. IIII. de partibus animalium cap. VIIII. cùm inquit. Squillæ à cancrario genere differunt, eo quod caudam habeant: à locustario uero, quod forcipe careant. Quibus sanè claret, cancris nullam inesse caudam. Quapropter omne crustatorum genus, cui cauda desit, in cancrario genere fuerit recensendum. Cuiusmodi sunt maiora. uulgò Granceuole, paguri uulgò Granciporri, marini ac fluuiatiles cancri uulgò Granchi appellati, & id genus plura. Nec aliam ob causam diximus gammarulos paruas dici squillas, nisi ut omnibus notum sit, eas etiam haberi his longè maiores, ut memoriæ prodidit Aristoteles lib. IIII. cap. II. de historia animalium, sic inquit. Squillarum enim genere continentur gibbæ, crangones, & parua, quæ maiores nunquam effici possunt. Quibus liquido constat, uulgares gammarulos Aristoteli paruas facile esse Squillas, cùm ijs maiores nunquam euadant, quam qui semper parui in piscarijs habentur uenales. Quinetiam id ipsum affirmare non dubitauimus, quod ijs cauda sit locustarum, & gammarorum modo, chelæ uero, seu forcipes deficiant. Qui autem, qualésue CANCELLI sint, nomine

Gammarorū  
lapilli.

Cancris fluuiatiles.

Quorundam  
error.Squillarū cō  
sideratio.Cancellorū  
confid.

## MAIA, VVLGO GRANCEVOLA.









## Scorpio Terrestris.

## Cap. XI.

TERRESTRIS Scorpio tritus crudus, & impositus, suæ plagæ remedium est. Quin estur asatus, ad eadem.



TERRESTRES Scorpiones animalia sunt vulgò nota, quòd in quacunque domo, non modò in cubiculis, & cellis umarijs; sed ubiq; passim reperiantur: adeò est hominum uita periculis obnoxia. Licet autem sint in Italia minus uenenosus, minusq; nocui, quàm alijs in regionibus, quæ sub meridie sitæ sunt; ipse tamen complures uidi in Hetruria à Scorpionibus ictos, qui seuissimas perpesti sunt exacerbationes, & quasi ad mortem redacti. Contrà in regionibus frigidis minus nocui sunt. In agro Tridentino à scorpionibus isti nihil noxæ percipiunt. Quod tamen euenire asfirmant gratia peculiari sibi à Deo impertita precibus diui Vigilijs episcopi, quem & patronum præcipuum habent, & aduocatum apud Deum. Hoc idem asserit Aristoteles lib. VIII. cap. XXIX. de animalium historia, ubi sic inquit. Morfus beluarum ex locorum diuersitate plurimum differunt, ut in Pharo, locisq; alijs, scorpiones non lædunt. At in alijs locis, & præcipue in Scythia, multi & magni nocui sunt, & uel hominem, uel quàmuis bestiam percusserint, interimunt: nec sues euadere possunt, quanquam cæteros uirulentos ictus minime sentiunt. Plinius, Auicenna, Albertus, Aelianus, & aliorum plerique nouem Scorpionibus genera assignant, diuersis duntaxat coloribus distincta, nimirum quòd alijs sint flauis, alijs rufis, alijs cinerei, alijs ferruginei, uirides alijs, alijs lutei subatraq; cauda, alijs uinofi, alijs albi, alijs deniq; fuliginis colore. Præter nigros, & ferrugineos, uirides quàm plurimos me uidisse, legisseq; recordor, in comitatu Arci non longè à Sarca flumine, quadam in syluula nouellis quercubus consita apud sacellum diui Pauli, ubi paruo admodum tempore, serio ardente, ego, & eremita quidam, de his qui sub saxis latebant, plus quàm mille, & quingentos collegimus, crassos, & plurimum factos. Plures inter eos fœminas inuenimus, quæ suos nuper editos fœtus sibus, pediculi magnitudine, sub uentre secum ubique gerebant, singuli singulis cruribus adherentes. Quapropter non ab re prodidit Aristoteles lib. V. cap. XXVI. de historia animalium, quòd terrestres Scorpiones uermiculos ouorum specie pariant complures, & incubent: mox ut prolem perfecerunt, pellantur ab ea ipsa, & interimantur à suis liberis magno numero: sæpius enim undenos pariunt. Plinius auctor est, Scorpionum ictum multò magis fœminis perniciosum esse, quàm uiris; præsertim uirginibus, quibus semper lethalem esse ait. Quibus septeni in cauda intermodij numerantur, longè seuiores habentur, quàm ij, quibus tantum semini insunt. Nonnulli præterea literis mandarunt, quibus subscribit Strabo lib. XV. suæ Geographiæ, Scorpiones quosdam habere alas, quibus per aera uolitant: quòd una in aliam regionem deferuntur. Hoc enim credere non uidetur absurdum, cum idem formicis similiter eueniat: quandoquidem & hæc iisdem ferè coloribus distinguuntur. Tantòq; magis credendum est, quòd in Castella Hispanie regione sæpius agricola aliquos terræ cespites aratro seindant, ubi formicarum more innumeri scorpiones gregatim hyeme delitescunt. Citra Cynamoluos Acthiopas latè deserta regio est, à scorpionibus gente sublata, si Plinio credimus. Qui præterea tradit, quòd si decem cancri cum ocimi manipulo adalligentur, omnes, qui ibi sunt scorpiones, ad eum locum coibunt. Quod tamen Dioscoridi manifestè refragari uidetur. nam superius in cancribus ita scriptum reliquit Dioscorides. Cancris scorpiones necant, si triti cum ocimo admoueantur. Ferunt à uestispis, apibus, & crabronibus eos non ici, qui prius à scorpionibus percussi fuerint. Quinetiam narrat Plinius lib. XXV. cap. X. Scorpiones mortuos reuiuiscere, admoto albo ucratro. Quidam medici utuntur Scorpionum cinere, qui uiui sint exusti, ad urinam citandum, ijs præcipue, qui renuni, aut uescicæ calculo obstruuntur. Quo fit, ut in hunc usum commendauerit Aesculapius oleum ex ijs paratum, quod officina habent, renibus & pubi illitum. Hoc idem commendauit Auicenna ad aurium doctores. Ego tamen illud usu exploratum habeo, quòd oleum per me factum, in quod sanè magnus scorpionum ingreditur numerus, cordi duntaxat, & pulsantibus temporum, manuum, & pedum arterijs illitum, ab omnibus liberat uenenis, dummodo erodenti facultate uacent. Quin & eos sanat, qui tam à uiperis, quàm cæteris uenenosis animalibus uel icti, uel demorsi fuerint. Quæ de re ij (absit tamen uerbis iactantia) testimonium perhibere possunt, qui prius oleo sancto à sacerdotibus illiti, nostro postmodum peruncti euasere incolumes. Præstat item maxime hoc oleum, cum in homines

Scorpionum confid.

Scorpionum genera.

Scorpiones aligeri.

Scorpionum facultates.

Olei ex scorpionibus uires




mines pestilentia scuit : quippe quòd non modò peste infectos iuuat, sed & sanos præseruet . Præstat deniq; ad omnes interaneorum uermes, omnesq; dolores mulcet ex flatu, uel ex frigore genitos, præsertim uentriculi, coli, ac uteri . Eius parandi rationem trademus ( Deo concedente ) libro sexto, ubi de uenueuorum remedijs, siue antidotis latius disseremus . Σκορπίος χερσαίος Græcis, Latinis Scorpio, & Scorpius uocatur : Arabibus, Harrab, seu Hacherab : Italis, Scorpione terrestre : Hispanis, Alacran .

Nomina,

## Scorpio marinus .

## Cap. XII.

MARINI Scorpionis fel conuenit ad suffusiones oculorum, albugines, & habetudines .

Scorp. mari-  
ni, & scorpe-  
nae confid.


CREDIDERE quidam marinum Scorpionem, & Scorpenam uocatam, nihil inter se differre . Veruntamen quòd scorpena sit marinus scorpio, nemo non ibit inficias, qui & Aristotelis, & Athenæi auctoritate nitatur : uterque enim ad inuicem distinxit illos . Porro Scorpena in dorso spinam gerit uenenatam, qua imprudentes piscatores sepius icit : neq; iam defuerunt, qui eius ictus interempti . Proinde existimarunt nonnulli, ictuum similitudine falsi, inter scorpenam, & marinum scorpionem nullum prorsus interesse discrimen . Ceterum Scorpio, & Scorpena (ut equidem arbitror) eiusdem ferè generis sunt, sed in specie & forma, inter se pluribus differunt . Siquidem Scorpium pelagijs piscibus est, scorpena longè maior ; adeò ut octonas, nouenasq; quandoq; ponderet libras . Scorpena uero piscis, est litoralis, scorpione multò minor . Scorpium item uniuerso corpore rubet : cornua bina in capite gerit, sed mollia : & acutos in ore dentes, minutulos tamen : pinnis constat aculeatis, tam his, quæ per medium excurrunt dorsum ; quàm ijs, quas anteriore, & posteriore parte gerit, sed ijs tantum aculeis icit, qui dorso annectuntur : quorum tamen uis ijs, qui scorpenæ insunt, inbecillior est . Hunc sunt, qui uulgò uocent Pesce cappone, sed in Hetruriæ maribus ritimis quibusdam locis uocatur Cerna . Scorpena autem, quæ suum apud omnes retinet nomen, nec cornua habet, nec dentes adeò acutos gerit tamen in dorso aculeos scorpii modo, sed eminentiores, ac duriores, nec usque adeò pinnatos : inter ceteris uero pinnis ijs omnino caret, præterquàm circa branchias, ubi duos prælongos habet aculeos, & nonnullos circa caput : corpore est in nigro uirescente . Sunt tamen, qui indifferenter scorpium scorpenam uocent quòd quadantenus sibi inuicem corresponsdeant non modò figura, sed & carnis bonitate . Σκορπίος θαλάσσιος Græcè, Scorpio marinus Latine, Scorpione marino Italicè dicitur .

Nomina,

## Draco marinus .


## Cap. XIII.

DRACO marinus dissectus, & apertus, impositusque ictus spinæ suæ, qua ferit, medela est .



VARIAT



Draconis ma-  
rinus confid.

VARIAT auctorum sententia in marini Draconis historia. Quandoquidem Alberto marinus draco ingens est bestia, serpentis faciem referens, alis non amplioribus, quam quæ ad natandum sufficiant, sed ob uirum præstantiam omnium aquatilium uelocissimus censetur. quapropter breui admodum tempore ingentia metitur maria. Quin et uenenosum est illi animal, adeo ut quoscunque pisces, uel alia quæcunque animalia dente uulnerauerit, interimat. Piscatorum præterea artificio captus, statim ut in arenam sese protrahi cernit, mira celeritate scrobem in litore fodit, qua se condere possit. hæc Albertus. Qui etsi ex Aristotele, & Plinio (ut opinor) transcribat; plura tamen addere uidetur, quibus an multa sit adhibenda fides, quid statui non habeo. Siquidem hoc animal Aristoteli tanta admiratione non præstat, nec draco appellatur, sed serpens, ut is posteritatis memoriæ commendauit libro IX. cap. XXXVII. de historia animalium his uerbis. Serpens marina colore, & corpore congruo proxima est, sed obscurior; atq; acrior. Hæc si capta dimittatur foris, in arenam rostro quam primum adacto terebrat, subitq; tota. Est ore acuatior hæc, quam terrestres. Et lib. II. cap. XIII. Sunt etiam (inquit) maris indigenæ serpentes terrestribus similes; nisi quod caput habeant congrui. Et quidem genera earum plura sunt, colore numeroque uarietatis, Nasci eas non in altissimis gurgitibus certum est. Plinius hoc animal non serpentem, sed draconem marinum pariter cum Alberto uocat lib. IX. cap. XXVII. sic inquit. Rursus draco marinus captus, atq; immissus in arenam, cauernam sibi rostro mira celeritate excauat. At hic, mea quidem sententia, draco marinus haud quaquam fuerit, de quo scribit Dioscorides, sed per se maris serpens. Quandoquidem Aristoteli lib. VIII. cap. XIII. draco marinus piscis est litoralis, quemadmodum dentex, scarabeus, ceruina, aurata, mugilis, nullus, turdus, pulcher, gobius, atq; alij complures; & omne saxatile genus. Proinde dicebat Plinius lib. XXXII. cap. XIII. Extra has sunt rotunde in oleario usu conchile, cucumis, cynopus, cammarus, cynosdextra, draco. quidam uolunt esse dracunculum. Est autem graculo sinuatis aculeos in branchiis habet ad caudam spectantes. Huic sane non parum correspondere uidetur is, quem Veneti piscatores, itemq; Aquileienses, & Tergestini Arancum uocant, & uulgò Pesce ragno. Quippe qui inter litorales aculeos circum branchias habeat, caudam uersus spectantes, & alios in dorso adeo uenenatos, ut ab eo icti, nisi curam admiscerint, faciliè interimantur. Itaq; & is uidetur Plinio fuisse draco, uel dracunculus, quem libro IX. cap. XLVIII. ipse araneum quoq; uocauit, cum inquit. Aequè pestiferum animal araneus, spinæ in dorso aculeo noxiæ. Præsertim cum lib. XXXII. capite ultimo inter litorales, & maris magis peculiare pisces non aliter araneum recensere uideatur, quam draconem Aristoteles. *Δράκων θαλάσσιος* Græcis ita dicitur, ut Latinis Draco marinus, & Italis Drago marino.

Piscis araneus.

Nomina.

## Scolopendra.

## Cap. XIII.

SCOLOPENDRA marina in oleo decocta si illinatur, auellit capillos: sed contactu pruritus facit.

SCOLOPENDRA marina animal est exiguum: atque, ut prodidit Plinius libro IX. capite XLIII. ea est terrestri non dissimilis, quam etiam Hetruria centipedam appellat. Dicunt hanc (si tamen his auctoribus est adhibenda fides) statim, deuorato hano, omnia interanea inuocue euomere, ac deinde, eo ab intestinis explicato, sua eadem resorbere uiscera. Quocirca mecum sæpius cogitau, non iniucundum fore, eius uiscerum speculati anatomen. Sed nec ipsam hætenus mihi uidere licuit. Ea Græcè *σκολοπενδρα θαλάσσια* appellatur: Latine, Scolopendra marina, pariter & Italice.

Scolopendre confid.

Nomina.

## Torpedo.

## Cap. XV.

MARINA Torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus uehementiam mulcet. eadem appositæ euersam sedem, prociduiamque coercet.

TORPEDO in chartilagineorum, planorumq; piscium genere ab auctoribus recensetur, periinde ac raia, lairaia, rhombus, solea, psarion, & alia id genus plura. Hæc dorso rubescit, maculis quinque; nigris (quod in adultis tantum

Torpedinis confid.



## TORPEDO.



**Torpedinis  
mira facultas**

tantum uisitur) interiectis, oculis similibus: supina uerò parte albicat. Tanta huic uis peculiaris inest, ut retibus capta, antequam manu attingatur, & manus, & lacertos piscatoris stupore non modico afficiat: id quod etiam si capiatur hamò. Talis nanque huius facultas per setas, & hastam insensibili quodam modo permeans, ad manum piscatoris tandem transuecta, celeriter torporem inducit. Idcirco Galenus libro VI. de locis affectis: Ea (inquit) potentia torpedo prædita est, ut si fuscina attingatur à piscatore, transmissa qualitate per hastam ad manum, eam repente obstupefacit. Idem postea retulit Plinius libro XXXII. cap. I. sic inquit. Torpedo etiam procul, & è longinquo uel si hasta, uirgæue attingatur, quàmuis præualidos lacertos torpescere facit, & pedes quam libet ad cursus uel loces alligat, & retinet. Et lib. IX. cap. XLII. ita scribit. Nouit torpedo uim suam: ipsa enim non torpens, morsuq; in limo se occultat, pisces, qui securi adnatantes obtorpuere, corripiens. Quod ante ipsum prodiderat Aristoteles lib. IX. cap. XXXVII. de historia animalium. Caterum proprietas hæc uiuis duntaxat inest: nam si eadem in exanimatis persisteret, comestæ (ueniunt enim frequenter in cibis) uniuersum corpus stupidum redderent.

**Torpedinis  
uires ex Gal.**

obrem Galenus libro X I. simplicium medic. de ea ita scriptum reliquit. Sed & Torpedinem totam (dico autem animal mari num) capitis dolores sanare capiti admotam, sedemq; euersam coercere, à quibusdam est proditum. Verum ego cum utruq; esse expertus, neutrum facere comperi. Eam igitur cum cogitaſsem, adhuc uiuam esse applicandam, cui caput doleret (posse enim fieri, ut hoc medicamentum anodynum sit, hoc est, dolore liberet, similiter alijs, quæ sensum obstupefaciunt) ita habere comperi. Putoq; eum, qui primus est usus, tali quapiam motum ratione uti progressum. hæc Galenus. Venetijs piscis hic ab effectu, uulgo Tremulo appellatur: siquidem membro stupefacto, subito inde tremorem incutit. Romani uerò (me quidem latet, unde id nomen traxere) eundem uulgari nomine Batti postea, & Fotterigia dicere consueuerunt. Quæ uerò Græcis, Torpedo Latinis nominatur: Arabibus, Tead: Italijs, Torpedine: Hispanis, Hugia: Gallis, Turpilles.

**Nomina.**

## VIPERA.



Vipera.

Cap. XVI.

VIPERINAE carnes si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt: neruorum uitijs auxiliantur: increscentes strumas reprimunt. Detracta autem cute, caput caudaque, quoniam carne uacant, amputari



amputari debent. quippe commentitium est quod præcipitur, certam utrinque mensuram præcidi oportere. Reliquum uerò corpus exemptis interaneis clotum, dissectumque discoquitur cum oleo, uino, salis exiguo, & anetho. Aiunt ijs qui uiperas esitent, pediculos procreari: quod planè à ueritate abhorret. Adiciant aliqui longam senectutem agere, qui eo cibo uescuntur. Sal ex eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. Vina autem uipera in fictile nouum demittitur: adiciuntur salis, caricarumque tritarum, singulatim quinque sextarij, mellis cyathi sex, mox fictilis operculum luto oblinatur, & fornacibus inassatur, donec sal in carbones redigatur, qui postea tritus in pulueris faciem, reconditur. Plerumque, ut ori gratior fiat, immiscetur spica, aut folium nardi, aut malabathri momentum.

Viperarum confid.

Plinii lapsus.

I AMPRIDEM ceptum est ueras Viperas nancisci in Italia. Earum enim partus eas indicauit: quandoquidem recentiorum medicorum quidam Viperas summo studio indagantes, ut Galeni more, hoc etiam uero legitimam possent parare theriacam, inuito consilio cum his circumsoraneis, qui serpentibus alendis questum facit, Viperas ipsas prægnantes sunt consecuti, quæ in capsulis conclusæ catulos peperere, quod proprium Viperarum sit animal edere, non quidem oua, cæterorum serpentium more. Nec tamen propterea illud uerum esse compertum est, quod nascentes Viperæ uiscera abrodant, occisa parente, ut libro de theriaca ad Pisonem prodidit Galenus (si tamen is liber legitimus est) ex Nicandri auctoritate, & Plinius libro x. cap. lxxii. Qui Aristotelis uerba perperam interpretari deprehenditur, à quo Viperæ historiam ipsam accepisse liquidò constat. Cuius sententiam non tantum explodit, quod experimento compertum est; sed & Aristoteles ipse: quandoquidem nusquam dixerit, uiperinos fœtus parentis uiscera, aut uterum abrodere, sed quòd qui tardius eduntur catuli (tardius enim ideo illi excluduntur, quòd Viperæ singulos singulis diebus parit) abrodunt membranam quandam, qua in matris utero obuoluuntur, ut citius prodeant in lucem. Quæ in re, ut hoc omnibus palam sit, sic lib. v. de historia animalium capite ultimo, sonant Aristotelis uerba. τῶν δὲ ὄφρων ὁ μὲν ἔχει ἕω ζῶον, ἐν αὐτῷ πρῶτον ἀποκρίσας. τὸ δὲ ὄν, ὡς περ τῶν ἰχθύων, μονό-ζων ἐστὶ, καὶ μαλακὸν δερμὸν. ὁ δὲ νεοτὸς ἀνῶθεν περιγίνεται, καὶ ἐπερίχει φλοῖος ὀσπράκωδης, ἡσθύναν διαφράσσας αὐτὰ ἐξέρχεται. τίττει δ' ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ καὶ ἓν. τίττει δὲ πλείω ἢ εἰκοσιν. id est. Viperæ serpentibus animal edit, cum intra se primum oua pepererit. Onum hoc unius coloris, & molli cuta contextum, ut piscium est. Fœtus superne gignitur, nec duro cortice continetur, sicut nec piscium quidem. Parit paruas uiperulas membranæ obuolutas, quæ tertia die rumpuntur. Euenit interdum, ut qui in utero sunt, abrosis membranæ prorumpant. Singulos diebus singulis parit, pluresq; parit, quàm uiginti. hæc Aristoteles. Cuius sententiam (ut dictum est) peruerteris Plinius, ubi ei dicendum fuerat, quòd ultimæ uiperulæ adhuc in matris utero degentes, sua abrodunt inuolucra, antequàm prorumpant, dixit cæteras tarditatis impatientes, perumpere latera, occisa parente. Porro huic explosæ sententiæ etiam Philostratus refragatur. nam in uita Apollonijs Tyanei narrat, Apollonium ipsum uiam, ac incolumen uidisse Viperam, quæ suos catulos nouissimè exclusos lungebat. Marssi præterea, qui serpentium domitores se prædicant, quicq; falsò ex diui Pauli profapia se originem duxisse gloriantur, Viperam Marasso uulgò appellant, utq; maiorem cum spectatoribus incant gratiam, sæpissimè uiperinos dentes, longos, acuminatos, atq; mortiferos ostentant, conditos (ut Plinius inquit libro xi. cap. xxxvi.) gingiuis, atque membranula quadam circumdatos, lethali ueneno referta. Quin & uiperarum nuper editos fœtus ostendunt, quos Viperæ suis alunt in capsulis, quibus eas defrunt: nec tamen illi matris uiscera scidunt. Cæterum quòd Viperæ primum intra se oua pariant, mox animalia gignant, Theophrastus quoque auctor est libro vii. cap. xiiii. contra eos, qui secus sentiunt. Viperæ (ut scribit Auicenna libro quarto, ubi de uenenis agit) caput habent pressum, latumq; ubi ceruici amectitur, quæ peculiariter illis tenuis est: nec corpore admodum sunt longo, utpote nec cauda. Ad hæc Galenus, cum scriptis tradere uellet, quibus notis mares Viperæ à fœminis distent, eo libro, qui de theriaca ad Pisonem inscribitur, sic inquit: Viperæ fœminæ subruse sunt, & perquam agiles, ceruice elata: oculis subrubentibus, inuerecundis, atque intuitus feri: ijs caput latius, quàm mari, quem etiam excedunt uniuersa corporis mole, earumq; excernens meatus suum proprius caudam obtinet situm. Mari duo tantum insunt canini dentes; fœminæ uerò plures. Proinde igitur Nicander cecinit his uersibus.

Viperarum facies, & sexus discernim.

Τὸν μὲν ὑπερκυνόσαντε δύο χροὶ τακμαίρονται, ἴον ἐφ' ὧν ὁ μὲν, πλείους δὲ τοὶ αἰὲν ἐχιδνῆς. Hoc est soluta oratione. Masculi quidem supra canini dentes duo colore notantur, uenenum eructantes: at plures semper fœminæ insunt. Illud insuper addiderim, Aristotelem memoriæ mandasse lib. viii. cap. xv. de historia animalium, quòd licet hyeme cæteri serpentes cauernas subeant terræ; uiperæ tamen sub saxis condantur. Ex quo palam est, Plinium hoc etiam loco non rectè intellexisse Aristotelem: quippe quòd tradiderit lib. viii. cap. xxxix. Viperam solam terra condere uellet, quibus notis mares Viperæ à fœminis distent, eo libro, qui de theriaca ad Pisonem inscribitur, sic inquit: Viperæ fœminæ subruse sunt, & perquam agiles, ceruice elata: oculis subrubentibus, inuerecundis, atque intuitus feri: ijs caput latius, quàm mari, quem etiam excedunt uniuersa corporis mole, earumq; excernens meatus suum proprius caudam obtinet situm. Mari duo tantum insunt canini dentes; fœminæ uerò plures. Proinde igitur Nicander cecinit his uersibus. Τοῦ μὲν ὑπερκυνόσαντε δύο χροὶ τακμαίρονται, ἴον ἐφ' ὧν ὁ μὲν, πλείους δὲ τοὶ αἰὲν ἐχιδνῆς. Hoc est soluta oratione. Masculi quidem supra canini dentes duo colore notantur, uenenum eructantes: at plures semper fœminæ insunt. Illud insuper addiderim, Aristotelem memoriæ mandasse lib. viii. cap. xv. de historia animalium, quòd licet hyeme cæteri serpentes cauernas subeant terræ; uiperæ tamen sub saxis condantur. Ex quo palam est, Plinium hoc etiam loco non rectè intellexisse Aristotelem: quippe quòd tradiderit lib. viii. cap. xxxix. Viperam solam terra condere uellet, quibus notis mares Viperæ à fœminis distent, eo libro, qui de theriaca ad Pisonem inscribitur, sic inquit: Viperæ fœminæ subruse sunt, & perquam agiles, ceruice elata: oculis subrubentibus, inuerecundis, atque intuitus feri: ijs caput latius, quàm mari, quem etiam excedunt uniuersa corporis mole, earumq; excernens meatus suum proprius caudam obtinet situm. Mari duo tantum insunt canini dentes; fœminæ uerò plures. Proinde igitur Nicander cecinit his uersibus.

Plinii lapsus

Viperinæ carnis uires ex Galeno.



deformis. Constructo igitur illi tugurio proxime uicum in iugo collis propter fontem. illic hominem collocant, tatum illi quotidie ciborum ferentes, quantum uictui suppeteret. Caterum ad canis exortum, cum forte messoribus haud procul inde metentibus uinum esset allatum in fictili sauc quam fragrans, is quidem, qui attulerat, deposito illo prope messores, abiit. Verum ubi eius bibendi aduenisset tempus, sublato fictili adolescens, ut pro more impleto crateri, competente aqua uinum temperaret, in cratera uinum effudit, et una excidit uipera mortua. Qua re attoniti messores, ueriti ne quod, si ebibissent, inde sibi malum eueniret, suam quidem sitim aquae potione sedare maluerunt. Caterum cum illinc discederent, quasi prae humanitate ac misericordia, homini illi elephantino obnoxio uinum largitur, rati expedire illi potius mori, quam uiuere in ea miseria. At ille, ubi ex hoc bibisset, admirabili quodam modo sanitate restitutus est. Nam tuberosum illud omne cutis totius non aliter, quam animalium à testis mollitie nuncupatorum malacostracum, tegmen decidit. Quantum autem reliquum erat, molle admodum apparuit, instar cutis cancrorum, et locustarum (carabos Graeci uocant) ubi extrema testa exciderit. Alterum quoque eiusmodi uon dissimili casu in Mysia Asiae, non procul ab urbe nostra accidit. Vir quidam elephantum laborans profectus est ad aquarum calidarum sponte nascentium usum, sperans inde nonnihil se commodi adepturum. Erat illi scortum ancilla, inuenientia sauc formosa, compluribus amatoribus ambita. Profectis igitur illis, cum aquis uteretur, in aedibus, quibus uicinus erat locus squalidus, et uiperarum plenus, forte fortuna ex illis una in urceum uini incidit uegligentiùs positum: extincta est. Ac scortum quidem in lucro id reputans quod fors euenisset, hero id uini propinat. Caterum ille, ubi ebibisset, ad eum modum, quo ille, qui debebat in tugurio, persanatus est. haec Galenus. Qui etsi alia è uiperis experimenta ibidem scripserit, unde similiter alij incolumes euasere, ut eius firmior redderetur ratio, quod scilicet uiperarum esu elephantiaci sanentur; attamen breuitati consulentes, ea hoc loco silentio inuoluenda duximus. Verum enim uero nil mirum alicui fuerit, Viperas ambas, quarum meminit Galenus, se tam facile immeruisse uiuo: siquidem illis natura comparatum est, ut uiuo summo opere delectentur. Quamobrem narrat Aristoteles lib. VIII. cap. III. de historia animalium, quod ideo uiperas aliqui uiuo cum fictilibus ad sepes disposito uenantur, quia uini incontinentes sunt: ebriae enim capiuntur. Id quod etiam dixit Dioscorides in sexti libri praefatione de uenenis, uenenatisque gens. Quinetiam uiperæ (ut ad Pisonem scribit Galenus) bupestres, et cantharides deuorant. Item Aristotelis testimonio lib. VIII. cap. XXI. de historia animalium, scorpionum deuorari à uiperis certum est: ob idque (ut idem auctor) eorum uenenatorum morsus grauiores sunt, quæ alijs animalibus uenenatis uesciuntur: quod profecto faciunt uiperæ. Haec theriacen ingrediuntur: at non omnes, nec omni tempore captae probantur. Proinde Galenus libro primo de antidotis rem hanc scite et aperte declarauit, sic inquit. Viperas non ut aliqui faciunt; aestate mea, neque statim, ubi cauernas egressæ fuerint, uenari conuenit: aestate siquidem earum caro sitim excitat, statimque ab egressu frigida est, sicca, et extenuata. Optimum itaque tempus est, quod ijs medium intercedit, quod et Andromachus ipse significauit, quo tempore et qui Baccho sacra faciunt, uiperas dilacerare solent, uere quidem finiente, nondum tamen aestate inchoata. Vel si uer ad magnam sui partem hyemale fuerit, circa principium aestatis, non multo tempore post pleiadum ortum. Viperas autem, quæ prægnantes sunt, reijcere oportet: aliarum uero caput, et caudam abscindere, nam præterquam quod hæc particule uirulentiores esse uideantur, etiam duræ, et parum carnis habent. Sufficit autem in magnis uiperis, id, quod utrinque amputatur, quatuor digitos æquare. Totum uero reliquum corpus, intestinis exemptis, pelleque detracta, aquis primo abluendum, atque in uas fictile conijciendum est: deinde aqua pura superinfusa, uiridique auetho (tunc enim uiget) olla prunas, ut coquatur subijcere conuenit; uel arida ligna, quæ, quod fumum non emittant, *ἀραρυα* uocant; uel quod melius adhuc est, uitium sarmenta. Salis autem, si quidem suo tempore uiperas ceperis, tantillum immittere oportet: sin aestate iam incipiente, nihil. Porro obseruandum est, ne illæ capiantur, quæ in maritimis locis, quæue in aliqua salsa aquarum lacuna degunt: antidotus enim quæ ex huiusmodi uiperis confecta fuerit, sitim excitabit. Cum igitur Viperæ probè coctæ fuerint, ac si quis conedere re uellet, eas ex aqua eximere oportet, deinde carnes ita à spinis auellere, ut nihil ex spina simul auferatur: atque his exquisitè contritis, panis ex purissima farina optimeque confecti, qui præcipue et benè fermentatus sit, et in furno, non sub clibano coctus, modicum quiddam admiscere. Nonnulli tamen in commiscendo panem Viperis hanc mensuram seruandam præcipiunt, ut panis pondus uiperinarum carnum dimidio minus sit: alij ne tertiam partem excedat malunt. Ego uero quandoque quartam, quandoque quintam panis inposui. Caterum nisi probè coctus fuerit, periculum est, ne aliquid aciditatis medicamentum contrahat. At satius est, panem hunc ita coctum per aliquot dies loco aliquo sicciore prius exicasse. Verum cum uiperas, et panem coniunxeris, diligenterque adeo subegeris, ut nulla uiperinae carnis particula non contusa remanserit, pastillos ex ea massa conficito, qui tenues sint: nam crassi cum difficulter siccari soleant, et carnem putrescere, et panem accrescere sinunt. Quamobrem panem quoque autem siccatum terere melius est, et non, quemadmodum ante nos qui Casari theriacam faciebant, uiperarum iure maceratum: id quod ipse quoque diu feci, sed mihi postea melius esse uisum est, panem antea contritum uiperarum carnibus exactè iam subactis admiscere: citius namque pastilli siccantur, qui siccum panem, non madidum acceperint. Sit autem cella, in qua pastillos siccabis, in superiori domus parte, ad meridiem conuersa, uel saltem ad septentrionem non respiciat, ut solis radios tota penè die admittat. tali enim in loco commodè siccabunt. Statim ubi fuerint conformati, ea parte collocentur, quæ solares radij peruenire non possunt. Frequenter autem ipsos conuerrere opus erit, ut equaliter utraque ex parte siccabunt. quod facere si quis omiserit, superior quidem pars celeriter arefcet; inferior autem humida diutius permanebit, periculumque erit ne marcescant. Postea uero quam exiccati fuerint, mancant adhuc aliquot diebus eadem in cella longius, quam prius à solis radijs, sæpeque denuo conuertantur. Sufficiunt autem ad hæc omnia quindecim dies ad summum: post quod tempus donec theriacam conficere uolueris, recondi debent in uase stanneo, aut uitreo, aut etiam aureo. Vitrum siquidem, et aurum nullam fraudem admittit: stannum autem plumbi mislura adulteratur. quod uita

Viperæ uiuo  
delectantur.

Viperarum ue-  
natio, & earum  
pastilli.



esse conueniet, non solum in hac; sed & in quibuscunque alijs antidotis: quemadmodum & argentum, si purum non fuerit: uasa namque ex eo fabricata celerrimè rubiginem contrahunt, purum autem argentum, Romani candidum uocant. Ceterum longè melius est, haud multò post, quàm pastillos confeceris, ipsis uti. quauquam non multum detrimenti capiunt, etiamsi peracto anno, atque etiam multo post eis utaris. Rectè namque à principio siccati, ad tertium, quartumq; annum integri perseuerant, dummodo tamen aptè reponantur, & subinde puluisculus quidam, qui ipsis obnasci consuevit, mundis linteis interdum abstergatur. Is namque si diutius inhereat, pastillos perforabit. Perficuum est autem eos inutiles euadere, qui perforati fuerint. quemadmodum antequàm hoc ipsis accadat, etiamsi multum tempus intercesserit, utiles permanent. Hæc Galenus de conficiendi pastillos Vipereos ratione, quò optimi & præstantissimi habeantur. Ceterum illud Dioscoridi ridiculum uidetur, quòd qui uiperas essent, pediculos procreant. Cui tamen reclinat Galenus libro XI. simplicium medicamentorum, ubi id certò ijs euenire essent, qui uiperarum plurimum mali succi in corpore exuperat. Narrat Plinius libro XXX. cap. XIII. quòd Antonius Musa Cæsaris Augusti medicus cum incidisset insanabilia ulcera, uiperas edendas dabat, miraq; celeritate persanabat. In Aegyptijs uiperæ cibis.

de alimentorum facultatibus. Quibus item eos uesci traditum est, qui occidentales, nouiterq; repertas Indias incolunt, perinde ac ijs, qui orientales inhabitant, ut libro VII. auctor est Plinius. Vipera ita Latinis dicta Græcis Nomina.

Ἰχθὺς uocatur: Arabibus, Labane alshahay: Italis, Vipera, Germanis, Arant schlagen: Hispanis, Biuora, & Bieha: Gallis, Viperes.

## Senecta anguim.

## Cap. XVII.

SENECTVS anguim in uino decocta dolori aurium, infusu: & dentium, collutione auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed præcipuè uiperinam.



NVLIS non cognita anguim Senecta: quippe quæ sepe in campestri bus inter saxa, & stirpes inueniatur. De hac cum differeret Aristoteles lib. VIII. de historia animal. cap. XVII. sic inquit. Serpentes senectam exuunt tum uere, cum egrediuntur, tum etiam autumnò. Vipera etiam exuit tam uere, quàm autumnò. Cum serpens exuere incipit, ab oculis primum detrahi aiunt, ita ut obocari uideatur ijs, qui rem non intelligunt. Tum caput exuitur: glabrum enim hoc omnium antequàm reliquum corpus, apparet: atq; una serè nocte, & die senectus tota exuitur à capite orsa ad caudam: & cute altera intus subnascante, ipsa remouetur. Ut enim fœtus in uolucro secundarum, quò contentus prodierit, exuitur; sic ista senectute detrahta renouantur. Porro de ea nil aliud memoria prodidit Galenus libro XI. de simplicium medicamentorum facultatibus, quàm quòd in aceto decocta dentium dolori medetur. Nomina.

Ἰχθὺς ὀφεις Græcè, Senecta anguim Latinè uocatur: Alchalha, & Selach alhaie, Arabicè: Spoglia delle Serpi, Italicè: Schlangen balck, Germanicè: Pelle de la culebra, Hispanicè.

## Lepus mar. &amp; ter.

## Cap. XVIII.

LEPVS marinus loligini parua similis est: qui per sese tritus, aut cum urtica marina illius capillos euellit. Terrestris leporis inassatum cerebrum manditur, iuuandis tremoribus, qui ualitudine contracti sunt: affricu, aut cibo facilem infantibus dentionem præstat: exustum caput, & cum adipe ursino, aut aceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. Leporinum coagulum post triduum à concubitu potum, conceptum adimere, partusque spem interciperi proditur: unluæ, & alui fluorem sistit: comitiales iuuat: contra uenena ex aceto bibitur, præsertim aduersus concretum lac, & uiperarum morsus. Sanguis eius, si calidus illinatur, uitia cutis in facie, uutiligiam, lentigenesque sanat.



## LEPVS TERRESTRIS.



Leporis ma-  
rini consid.

Leporis terre-  
stris consid.

Vana opinio.

Leporis fa-  
cultates.

**MARINVS** Lepus (ut nonnulli memoriae prodidere) sic primum appellari capit, quod terrestris leporis faciem referat. Quapropter haec de eo à Plinio produntur libro IX. cap. XLVIII. Lepus, inquit, qui Indico mari nascitur, etiam tactu pestilens, vomitum, dissolutionemque stomachi protinus creat. In nostro ossa informis, colore tantum lepori similis: in Indis et magnitudine, et pilo duriore tantum. nec uiuus ibi capitur. haec Plinius. Ex quibus facile conijci potest, Dioscoridem potius de nostratium marium Lepore intellexisse, quam de ijs, qui in Indico innatant pelago, argumento quod parua loligini similem marinum leporem reddiderit. Albertus auctor est, tertium Leporis marini genus reperiri, communi piscium magnitudine, sed capite lepori non absterili, dorso rufescente, esculentum: tamen à nonnullis explodatur, utpote et quod et concoctu contumax sit, et elephantissimum gnat. Ceterum terrestris Lepus notissimum animal est, et cursu uelocissimum. Solum hoc inter cetera terrae animalia, quae utrinque dentata sunt (ut scriptum reliquit Aristoteles lib. III. de partibus animalium, cap. XII. et quae unicum tantum continent uentrem, coagulum habet. Sunt et lepores albi, quales etiam Plinius lib. VII. cap. LV. refert in Alpibus inueniri. Hi hyberno tempore admodum albicantes in summis uallibus Ananie montibus frequentes reperiuntur; eo praesertim tempore, quo ij niuibz altissimis uestiuntur; qui tamen adeo magni non sunt, nec ita in cibum parati cum palato incunt gratiam, ut qui in campestribus capiuntur. Ceterum candidi hyeme tantum conspiciuntur: nam liquefcente niue subrubescunt, quemadmodum et ceteri. Cuius rei indicio sunt illi, qui cum non perfecte priores pilos exuerint, partim candidi, partim subrutili uisuntur. Lepores apertis oculis dormiunt, nec (quae sua maxima timiditas est) alio quam fuga se tutari sciunt. Huic soli pilos in bucca intus, et sub pedibus esse adnotauit Aristoteles libro III. de historia animalium, cap. XII. Archelaus auctor est, etiam leporis sententiae plerique subscribunt, Leporibus utrunque sexum, et utranque gignendi uim inesse, et omnes lepores aequè gignere, ac si essent hermaphroditi. Quod ita facile posse pati naturam, nullo pacto crediderim, sed potius ridiculam hanc opinionem in hominum mentibus instam putauerim, quod uiderint, Lepores, quamquam plurimi quotidie capiuntur, etiam quodammodo fecundius procreare. Veruntamen id non euenit, quoniam mares ipsi pariant; sed quia (teste Aristotele libro VI. de historia animalium, cap. XXXIII.) superfoetant, dum adhuc utero gerunt, similiterque statim à partu concipiunt, ita quod singulis mensibus generant. Sed factus edunt non uniuersos: interpositis enim diebus, quot res tulerit, peragunt partionem. Vnde tam innumera fecunditas: nam et si foemina lac nuper natis praebeat; nil tamen prohibet, quin eadem repetat coitum, et lactans, gerensque, iterum denuo concipiat foetum. Mares (ut loco citato idem prodidit Aristoteles) auersi coeunt cum foeminis: retro enim ijs genitale membrum à natura datum est, ut apparet, dum urinam reddunt. Ex quo etiam multis persuasum est, mares foetum concipere: siquidem cognitu perquam difficile est, an mares, an foeminae sint, ut etiam cuniculis contingit: qui cum fecundius etiam prolificent, quam lepores; non ob id tamen mares unquam parere uisi sunt, quamuis quolibet mense foeminae pariant. Tradit Plinius libro XI. cap. XXXVII. bina iecinora Leporibus inesse, quae Briletum, et Thernem, et in Cherroneso ad Propontidem: at translatis aliò alterum statim absumi. Id quod ante ipsum memoriae prodiderat Aristoteles libro II. de historia animalium, capite XVII. Item libro III. de partibus animalium, cap. VII. ubi hoc leporum genus pluribus in locis reperiri testatur, speciatim uero in Syacio agro, circiter Bolbam lacum. In Ithaca insula (ut idem tradidit libro VIII. de historia animalium, cap. XXVII.) Lepores si aliunde illati dimittantur, uiuere nequeunt; sed eodem reuersi, unde maris introierint insulam, moriuntur. Leporinae carnes in cibis estate praeter id quod aegre concoquuntur, crassum, atrabiliosumque generant, sicut et cum. Veruntamen (ut inquit Rasis libro de LX. animalibus) dysentericis conferunt, si assata sumantur. Iecur uero arefactum, iecinorosius utiliter exhibetur potandum. Integer cum pelle Lepus, operculato fictili impostus, in ebanoque igne succenso tandiu dimissus, ut penitus exuratur, urinae uitijs mirifice opitulatur, adeo ut calculos effluat, tam in renibus, quam in uescica genitos. Leporinum fel saccharo exceptum, oculorum argemas, nubeculasque delet. Leporinum stercus (ut aiunt) mulieribus gestatum, conceptum impedit. Sed illud experientia compertum est, quod nullus




uuluis earum immissum, & mensum defluxiones cohibet, & humentem exiccat uterum. Animal λαγώς θαλάσσιος Græcis, Lepus marinus Latinis nominatur: Italis, Lepre marina. Quod uerò λαγώς χερσαίος Græcè, Lepus terrestris Latine dicitur: Arabicè, Arneberri: Italicè, Lepre terrestre: Germanicè, Hase: Hispanicè, Lieure: Gallicè item Lieure.

## Pastinaca Marina.

## Cap. XIX.

MARINAE Pastinacæ radius, qui eius cauda enatus aduersis squamis reflectitur, dentium dolorem mitigat: nam eos frangit, & euocat.



PASTINACA marina similiter atque raia, & alia id genus, in piscium planorum, & chartilagineorum genere collocatur. Hanc quidam uulgò uocant Pesce colombo. Gerit hæc in cauda supernè radios duos præduros, acutos, & utrinque minutissimè dentatos, quorum uenenato ictu piscatores grauiter afficiuntur. Quam ob causam menoriae prodidit Aetius lib. III. quòd qui à marina pastinaca percussi sunt, his uulneris locus manifestè apparet. Sequitur autem dolor pertinax, & totius corporis stupor: acutum enim, & firmum habet aculeum, quo uehementissima uirga in altum impulso nerui sauciantur. Quapropter in aliquibus mors derepentè totum conuellens corpus comitatur. Idcirco non absque forti ratione Plinius libro IX. cap. XLVIII. ita scriptum reliquit. Nullum usquam execrabilius uenenum, quam radius super caudam eminens trigonis, quam nostri Pastinacam appellant, quincunciali magnitudine, arbores infixus radici necat. Arma ut telum perforat & ferri, & ueneni malo. Latet piscis hic: & ut idem auctior est libro citato, cap. XLII. latrociniatur ex occulto, transeuntes radio figens. Marcellus Virgilius, nimirum cupias incundi rationem, qua pastinacæ radio uti posset, dentium doloribus sedandis, quippe quòd id silentio inuoluerit Dioscorides, fatetur, et si diligenter, ut consentaneum est, inquisierit; nunquam tamen apud antiquos scriptores eam se consecutū fuisse. Qua in re aperte declarat, sibi cum Plinio parum intercessisse consuetudinis: quadoquidem Plinius lib. XXII. cap. VII. nos abunde docuerit modum, quo eo radio in dentium doloribus uti ualeamus, sic inquiens. Pastinacæ quoque radio scarificare gingiuas, & in dentium dolore utilissimum. Conteritur is, & cum helleboro albo illitus, dentes sine uexatione extrahit. Quapropter mirari non licet, si quandoque in plateis circulatores, dentium extractores cernimus, qui dentes absque ferreis instrumentis, nullo illato dolore extrahant. Idem radius equos perfrangit, qui subcutaneis uermibus exeduntur, si eo ulcera scarificentur, punganturque. Pastinacæ iecur oleo incotum non modò hominum scabiem sanat; sed etiam brutiorum. Piscis tamen esculentus est, si abscessis in uniuersum cauda & capite, decoquatur. Τρυγών θαλάσσια ita Græcis, ut pastinaca marina Latinis, pariter & Italis nuncupatur.

Pastinacæ piscis confid.

Marcell. ignorantia.

Pastinacæ, & eius radij uires.

Nomina.

## Sepia.

## Cap. XX.

SEPIAE coctæ dum estur atramentum, ægrè concoquitur: aluum mollit. Collyrijs è testa factis conuenienter genarum scabritiæ perficantur. Vstum in sua testa, donec id, quod crustosum est, abscedat, postea tritum, expurgat utiligines, furfures, dentes, & uitia cutis in facie. elotum in medicamenta oculorum addi solet: contra albugines, oculis iumentorum efficaciter inspiratur: pterygia oculorum absument, cum sale tritum, & iniectum.

SEPIAE in omnibus Italiæ piscarijs, proprium retinent nomen, uenalesque habentur, in ijs inquam, in quibus marini ueniunt pisces. Hæ polypis similes sunt, præterquam quòd hi innumeris pedibus excellunt, illæ uerò maiore corporis mole. Est Sepijs in dorso os candidum, superiori parte durum, ac læue: inferiori autem fungosa quadam medulla repletum, quæ & leuiter aspera, & ligni modo frequentibus uenis distincta uisitur. Expetuntur Sepia

Sepiarum consideratio



## SEPIA.

Polypi mira  
magnitudo.Sepiarum fa-  
cultates.

pie ossa aurifabris : facile enim in partem illam fungosam anulorum, ceterarumque rerum formas inprimas, quæ metallis igne coloratis expleri solent. Sepiæ suo etiam astu non uacant : ubi enim piscantem sensere effuso atramento, quod pro sanguine his est, infuscata aqua absconduntur. Id quod etiam faciunt aduenientibus uoracioribus piscibus. Pariunt (ut prodidit Plinius lib. IX. cap. LI.) omnibus mensibus, plerumque autem in terreno inter arundines, aut sicubi enata fuerit alga : neque his bimatus longior est uita. Id quod de polypis retulit Aristoteles lib. IX. de historia animalium, cap. XXXVII. Quæ in re dixerim, quod si historia, quam tradit Plinius lib. IX. cap. XXX. de illo tam iugenti Polypo, cuius caput Lucullo ostensum fuisse narrat dolij magnitudine amphorarum quindecim capax ; atque praedes, quos uix utroque brachio complecti esset, longitudine pedum triginta, uera perhibetur, nullum sequetur absurdum, quin polypi et denis, et bis denis annis uiuere possint. Quod etiam tum sepijs, tum loliginibus euenire posse non dubitauerim ; praesertim cum eodem loco scripserit Plinius, sepias, loliginesque eiusdem polypi magnitudine in Hispanico litore undis expulsas esse repertas. Sepiæ atramento tantam uim esse Anaxilaus est auctor, ut eo in lucernis accensis addito, ceteris ablatis luminibus, homines circumstantes Aethiopes uideantur. Sepiæ, polypi, loligines, et cætera id genus mollia difficillimè concoquantur. quæ ob causam antea cædi uerberibus solent, quam excoquantur. Quamquam Athenæus Sepias aqua elixas uentriculo utiles existimauerit, dixeritque eas sanguinem attenuare, atque hæmorrhoidas ciedere. Cæterum (ut Galeno placet lib. III. de alimentorum facultatibus) duræ sunt carnis, ægrè conficiuntur, et succi crudi plurimum gignunt. Attamen ijs, quibus probe concoquantur, non parum corpori præbent alimenti. Quin et eius testum exusta (ut libro XI. simplicium medicamentorum, idem scribitum reliquit) ad utiligines, lentes, et scabiem usum ualent.


præstat : mista præterea fossili sali, in oculis existentes ungues eliquat : et antequam uratur frictione dentibus solens dorem affert, et illitione ulcera desecat. Sepiæ oua in cibis sumpta urinam ciedere Plinius commemorat, reuulsi lentorem disijcere. Sepijs nucibus, et allio paratis quidam uescuntur, ut salaciores in uenerem prorumpant. Quæ nomina Græcis, Sepia item Latinis, et Itali s appellatur : Arabibus, Sarathan, et Sarthan ; Germanis, Blasfisch ; Hispanis, Siba ; Gallis, Seche.

Nomina.

## Mullus piscis.

## Cap. XXI.

MULLORVM assiduo cibo, aciem oculorum hebetari constat. Is marini draconis, aranei, ac scorpionis morfibz medetur : si crudus, atque dissectus admoueatur.



MULLVS



**MULLVS** piscis Latinis olim sic dictus, relicta nulli appellatione, hodie Græcorum more Latine etiam Tri-  
gla & Italice triglia nominatur. Huic magnitudo non ampla, color subrufus, ueluti purpureus. Antiquis is magno  
exerebatur pretio, precipue ganeonibus: cum, ex fide dignis constet monumentis, Mullos saepenumero à priuatis  
etiam hominibus argenti libra singulos uenisse: tanta cum eorum iecore, & capite gratia intercesserat gula. Quam-  
obrem Galenus lib. 111. de alimentorum facult. de eo hæc memorie prodidit. Mulli iecur à gulosis mirabilem ui-  
modum uoluptatis nomine commendatur. Quidam uero ipsum ne per se quidem solum edendum censent, sed gareleo,  
quod uocant, in uase preparato, cum paxillo uini uiscus in eo tantisper distent, dum ex uniuersa eius substantia,  
& preparato liquamine unus, ac similis succus, quantum sensu possis iudicare, factus esse uideatur, in quo intin-  
ta mulli carne uestiuntur. At mihi profecto nequaquam tantæ suauitatis uisum est, ut eum honorem mereatur, neq;  
tam insignem corpori utilitatem conferre, uti nec ipsum caput: quanquam hoc quoq; laudant ganeones, ac secundas  
post iecur ferre prædicant. Ceterum intelligere nequeo, cur permulti grandissimos mullus emptitent, cum nec adeo  
suauis sint carne, ut minores: nec concoctu facili, ut quæ dura admodum est. Itaque cum aliquando quendam ingenti  
pecunia prægrandes mullus ementem interrogarem, cuius rei gratia illos tantopere expeteret, respondit se primum  
propter hepar illos tantum emisse: tum autem & propter caput. Idem loco citato, circa capitis initium ita scribit. Mul-  
lus omnium ferè aliorum durissimam habet carnem, impediq; friabilem: quod perinde est, ac si dicas, nihil in eo esse  
lentoris, neq; pinguedinis. Eaq; ex parte cunctis alijs præstantius nutrit, dummodo probe concoquatur. hæcenus  
Galenus. Mulli, auctore Plinio, ter anno foetificant: tantaq; ijs ingluuies, ut etiam hominum cadaueribus uestian-  
tur. Ii ceteris in cibis præstant, qui inferiori labro, utrinq; barbati habentur. Romani Neapolitanis, & Venetis  
longè præstant. Vinum, inquit Athenæus, in quo mullus uiuus immergitur, haustum, uenerem uiris mirum in modum  
inhibet: foeminis uero conceptum. Mulli, quod barbati sint, Venetis uulgo dicuntur Barboni, non autem Spari, ut  
alijs diximus incertis, & infidis piscatorum nominibus falsi. Piscis τριγλα Græcis, Mullus Latinis uocatur: Ita  
Italica, Triglia, & Barbone: Hispanis, Salmoneta.

Mulli confi-  
deratio.Mulli facul-  
tas ex Gal.

Nomina.

## Hippopotamus.

## Cap. XXII.

**HIPPOPOTAMI** testes exiccati, ac triti, contra serpentium morsus bibuntur.

**HIPPOPOTAMVS** est (ut Plinius narrat lib. VIII. cap. XXV. et XXVI. belua, quæ in Nilo editur cro-  
codilo altitudine maior: ungulis bifidis, quales bubus: dorso equi, & iuba, & hinc: rostro resimo, cauda torta, &  
dentibus aprorum aduncis, sed minus noxijs: tergoris adscuta, galeasq; impenetrabilis, præterquam si humore ma-  
deat. At Aristoteles lib. 11. de historia animalium, cap. VII. huic beluæ dentes exertos reddidit, non apri: sed cau-  
dam quidem apri eam habere prodidit, magnitudinem asini, biunitum equi, & tergoris crassitudinem tantam, ut ex eo  
uenabula fiant: quin & interiora omnia equo, & asino similia. Segetes hoc animal astu magno depascitur destinatio-  
ne ante determinatas in diem: nempe ex agro ferentibus uestigijs, ne quæ reuertenti insidiæ comparentur. Primus  
eum uiuum, & quinq; crocodilos, Romæ adilitatis suæ ludis M. Scaurus temporario euripo ostendit. Hippopotamus  
in quadam medendi parte etiam magister existit. Assidua namq; satietate obesus exit in litus, recentes harundinū ce-  
suras perspexerat, atq; ubi acutissimum uidet stipitem, imprimens corpus uenam quandam in crure uulnerat: atq;  
ita profusio sanguinis morbidum alijs corpus exonerat, & plagam limo rursus obducit. Huius corij cinis cū aqua  
illitus panos sanat. Adeps frigidus febres: item sinus suffitu. Dentes è parte laua dolores dentium, scarificatis gin-  
guis. Pellis eius è sinistra parte frontis in inguina adalligata, uenerem inhibet. Eiusdem cinis alopecias explet. Te-  
sticuli drachma ex aqua contra serpentes bibitur. Belua, quæ ἵπποπόταμος Græcis, Hippopotamus item La-  
tinis, & fluuiatilis equus appellatur: Italica, Hippopotamo.

Hippopota-  
mi historia.Hippopota-  
mi uires.

Nomina.

## Fiber.

## Cap. XXIII.

**FIBER** ancipitis vitæ animal, plerumque cum piscibus, & cancris ex aqua uictum capessit.  
Huius testes serpentium uenenis aduersantur, sternutamenta mouent, & in uniuersum uarios obti-  
nent usus. Siquidem menses, ac partus ciunt, duabus drachmis cum pulegio poti: partus, secundas-  
que ciijunt: contra inflationes, tormina, singultus, uenena, ixiāque ex aceto bibuntur: lethargi-  
cos, & utcumque ueterno obdormiscentes excitant infusi: cum aceto autem, & rosaceo olfactu, & odo-  
ris suffitu, idem faciunt: poti & illiti prosunt tremulis, conuulsis, & omnibus neruorum uitijs. In sum-  
ma calfactoriam uim habent. Eligi hebet testes, qui ex uno ortu connexi sunt (fieri enim non po-  
test, ut gemini folliculi in una membrana coniuncti reperiantur) liquore intus ueluti ceroso, odore  
grani, & uirus redolente, gustu acri, mordente, ac friabili, naturalibus tunicis circumdato. Quem frau-  
de aliqui corrumpunt, coniicientes in follem gummi, aut ammoniacum cum sanguine, & castorio  
subactum, & ita exiecentes. Vanum est, quod traditur, testes ab ipsis euelli, & à sese abijci, cum uena-  
tu urgentur: siquidem tangi nequeunt, ita, ut in sue, substricti. Operæ autem pretium est, diuina pelle  
melleum liquorem cum euestiente tunica assumere, & siccatum potui dare.





Fibri confide-  
ratio.

Vana opinio.

Fibri testium  
adulteratio.

QUEM AD MODUM in superiore spectatur Germania, ubicunque Rhenus influit: quin & in Austria, atque Pannonia, ubi Danubius, in alijsq; finitinis provincijs, ubi Drauus, & Sauus discurrunt, Fiber sanè, quem Graeci *κασοπα* appellant, animal est (ut Dioscorides inquit) quod ex amphibio habetur genere: quippe quod & terris & aquis uitam ducat: ibi namq; uidetur modò in fluminibus natare, modò in litore uagari, modò in propinquis sylvis stari. Fiber lutra ferè faciem refert, maior tamen. Pedes huic sunt posteriores anserinis similes; anteriores uerò ut tassus habet. Cauda est illi glabra, lata, piscium ferè modò squamosa. Estur hæc, quòd gustatu piscium carnes plene sapiat, ijs etiam diebus, quibus nobis carne interdictum est à lege. In cæteris deniq; corporis partibus parum, aut ferè nihil à lutra disidet. Quo factum est, ut crediderint medicorum nonnulli easdem lutra testibus inesse uires, quæ fibrorum testiculis insunt. Dentes Fibris anteriores ferocissimi, atq; acutissimi sunt, quibus arborum ramos, ut ferro, cadit, quos postea miro coaptat artificio, sibiq; domum construit pluribus tabulatis in riparum cauis, ubi iuxta flumina degit. Animal est horrendi morsus: nam hominis parte comprehensa, non ante, quàm fracta concrepuerint ossa, mensa resoluit. Vanum profectò est (ut etiam scribit Dioscorides, itemq; Sestius medicinæ diligentissimus) credere fibris sibi testes dentibus amputare, cum uenatu urgentur, ob hoc se peti gnari. Quandoquidem id nunquam in his comprehensum sit, qui nostra ætate capiuntur. Plinius huius facti anceps id affirmavit lib. VIII. cap. XXX. quod tamen postea negauit lib. XXXII. cap. III. Cæterum diligenter animaduertere oportet, ne ab impostoribus adulterati Fibri testes emantur: namq; pauci admodum habentur ex ijs, qui uenales Venetias importantur, qui quidem adulterio careant. Cuius manifesto est indicio uim eorum magnitudo, cum legitimi parui admodum sint. Quinetiam præstant indicium præbet conclusus liquor in recentibus mellis instar, in diutius uerò asseruatis, ceræ modo concretus. Adulterantur contritis eiusdem animalis renibus, farctis inde testium folliculis. At mihi quidè sepius contingit & uidere, & habere ex Austria, Stiria, & carniola Fibri testes, qui omni prorsus adulterio uacant: quos magnitudine, colore, odore, gustu, atq; etiam uiribus longè ab ijs dissimiles esse comperimus, quibus officinarum utitur uulgo. Plinius libro XXXII. cap. III. eos Castoris testes efficacissimos putat, qui à Ponto afferuntur. Cui tamen refragatur Strabo lib. III. suæ Geographiæ his uerbis. Producit Capreas Hispania, equosq; syluestres affatim. Quibusdam in locis leuæ incrementa suscipiunt, Cygni, & eius generis aues plurimæ: similiter & otides aues. Fluij quidem ferunt Castoris, sed Castoreum non eam, quàm Ponticum, habet uim. Pontico enim proprium est, ut uenenosum sit, ut in alijs permultis hæc Strabo. Ex quibus facile constat plurima in Ponto uenenosa nasci. Id quod etiam in Bucolicis testatur Virgilius his uersibus.

Has herbas, atq; hæc Ponto inibi lecta uenena:

Ipse dedit Mæris: nascuntur plurima Ponto.

Castorei uires  
ex Gal.

Hinc uerò fit, ut nesciam ego, cur iusserit Damocrates castorium Ponticum addi in Mithridatis antidotum, cum tamen Andromacho in theriacis compositione eligantur testes illi, quos castor Istrius, hoc est, ad Danubium uiuens, protulit. Horum meminit Galenus libro XI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Testiculos castoris uires cupant Castorium, medicamentum & celebre, & multi usus, adeo ut Archigenes de Castorij usu totum conscripserit librum. Atque ille sanè particulares eius facultates exposuit, nos uerò uelut in alijs medicamentis fecimus, & in hoc quoque generalem modò facultatem dicemus: ad quam si quis respiciat, ipse per se particulares inuenire poterit. Itaque quòd exalfaciat, manifestum est. nam si uoles ipsum ad unguem leuigatum oleo maceratum parui cupiam illinire, & inspicare, euidenter illam incallescere percipies. Porro calfacientia omnia, ubi contacta & aqua stantia quippiam digerunt, continuo etiam illam desiccant; nisi si quid natura fuerit humidum, ceu oleum & aqua, atque aduentitiam qualitatem calidam, non facultatem assumpserit: sicut certe hæc ipsa igni, & soli aestiuo admodum. Itaque cum Castorij consistentia quoque sit sicca, & calfaciendi potentiam habeat adiunctam, merito desiccet. Atque hoc illi cum multis alijs medicamentis commune existit. Porro quoniam impense subtilium est partium; ob id plus



plus ualet, quàm alia, quæ similiter ut ipsum & calfaciunt, & desiccant. Nam quæ tenuium sunt partium medicamenta, ijs quæ sunt crassarum, plus sunt efficacia, etiamsi parem sortita fuerint facultatem, nimirum quia penetrant, & in altum subeant ad motorum corporum, potissimum si ea densa fuerint, uelut neruacea. Palam igitur talia ob causam positam magnificè iuuantur à castorio. Caterum falluntur medicorum plerique in usu Castorij, cum id modò considerant, partem quampiam aut tremere, aut conuelli, aut sensu motûne priuatam, aut ægrè sentire: haud scientes id genus symptomata ad dissimiles sequi corporis affectus. At tu ab Hippocrate doctus, ex plenitudine pariter, & inanitione conuulsionem fieri, ubi quidem quæ in nervis continentur præter naturam, euacuare consilium est, ibi & bibendum exhibe, & foris cuti castorium impone. Vbi uerò ex siccitate nimia obuenerit conuulsio, scito hoc medicamen illic esse aduersissimum. Ad eundem modum, ijs qui præ plenitudine tremunt, utilissimum: aduersissimū uerò ijs, quibus huiusmodi affectus accidit ab inanitione. Ad portionem uero dictorum affectuum, ubi singulatus euenerit stomachi, perscrutato prius, inuentoq; illius affectu, ac discreto, si quidē à plenitudine ipsum ægroti perpetiantur, ad castorij usum accedito. Sin autem à siccitate, & euacuatione, aut acrimie humorum morsu prouenerit, medicamen hoc fugito. Sanè si odori, gustuiq; aduertat animum, suspicaberis humano corpori aduersissimam habere substantiam: tamesi in uatura nihil efficere comperiatur eorum, quæ talia facere assolent. Siquidem alia stomachū nitiant, alia uentrem, alia caput, alia aliam quānuis partem ledunt. At hoc medicamen siue corpori huindo applies ressecationem poscenti, siue frigido ex calfactionem, siue humido simul frigidoq; ex calfactionem pariter & ressecationem requirenti, magnam utiq; ostendit utilitatem: nec ullam parti cuiquam noxam imprimit, potissimum si febris uacet, aut non admodum calidam perpetiatur homo febrem, sed ut sic dicam tepidam, qualis accidit in cataphoris maxime, & lethargis. Ac multis sanè Castorium exhibuimus unā cum pipere albo, utrunq; mensura cochlearij ex melicrato bibendum præbentes: nec quisquam ullam sensit noxam. Sed & mensibus retentis, ubi per uenam, quæ in talo est, modicè euacuassim, oblato castorio unā cum pulegiō, aut calamintha, semper medicamen hoc expertus sum purgationem ciere, absque ut foeminam læderet. Præterea locos inorantes eicit. eaq; omnia ex melicrato potum efficit. At quibus ita neuter flatu distenditur, ut ægrè curationem admittat, aut torminibus uexatur, atq; singultu, idq; ob frigidos, uiscososq; humores, aut crassos, flatulentosq; spiritus, eos ex oxycrato potum adiuuat. Quæ porro inuatur in corpus intro sumptum, ijs prodest quoq; cuti impositum cum scydnio; aut ueteri oleo. Quæ uerò ampliori caliditate indigent, ijs etiam per se infricari debet. Iuuat etiam, si quis suffitū eius in prunis impositi inspiratione hauriat, maxime humidos, & frigidos affectus in pulmone, aut cerebro consistentes. Attamen lethargicos, & cataphoricos affectus, qui quidem adiunctam habent febrem, præstat non dictorum oleorum quopiam macerantes curare; sed potius ex rosaceo capiti, colloq; imponere. hætenus de castoreo Galenus. Caterum, ut Plinius est auctor libro xxxii. cap. iiii. Castoreum sumptum comitialibus auxiliatur. Medetur & dentibus ex oleo in aurem infusum, à cuius parte doleant. Aurium doloribus melius, si cum meconio infundatur. Vrina quoq; Fibri resistit uenis, & ob id in antidota additur. Asseruatur autem optime in sua uestica, ut aliqui existimant. Animal, quod *καστωρ* Græcè, Fiber Latine dicitur: Arabicè, Inchiam alginde beduster, Giendedestar, seu Giendibidestar: Italicè, Castoreo: Germanicè, Byber: Hispanicè, Biuaro, & Biurio: Gallicè, Bieure.

† Cum in impressis hoc loco legatur *ποτιζεν*, id est, potui dare: tamen in codice manu scripto, in quem Oribasius (ut alias diximus) Dioscoridis uerba retulit, legitur *ἀποτιθεσθαι*, id est, reponere. Quæ lectio ideo, uerior esse uidetur, quòd castorium (teste Dioscoride) non solum potui detur; sed etiam infundatur, & suffiatur.

Castorei uires ex Plin.

Nomina.

## Mustela vulgaris:

## Cap. XXIIII.

MUSTELA, quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur, & inueterata sale, in umbra ficcatur. Ea binis drachmis cum uino pota, aduersus omnia serpentium uenena præsentaneo est remedio: toxico, simili sumpta modò, resistit. Eius ventriculus coriandro sarctus, inueteratusque, percussis à serpente, & comitialibus potu auxiliatur. Cremata in fictili podagricis confert, cinerè ex aceto illito. Sanguine perunctæ strumæ iuuantur: comitialibus etiam prodest.



MUSTELA vulgaris notitæ in Italia, animal est miræ sagacitatis, & quanquam corpore paruum; animo tamen inuictò constat atq; feroci. Mustelarum duo genera esse auctor est Plinius lib. xxi. cap. iiii. Alterum syluestre, quod in agris, & nepris uitan agit. Alterum domesticum, quod in domibus nostris oberrat. Vtræque adeo cupide catulos suos diligunt, ut eos hinc aliò transferant, uerentes ne sibi ijs surripiantur. Quo factum est, quemadmodum memoria prodidit Aristoteles lib. iiii. de generatione animalium, cap. vi. ut cum ui dissent quidam, Mustelas catulos

Mustelæ con sideratio.

Vana quorū dam opinio.



Encelij lap-  
sus.

Martes, & ea-  
rum histor.

Zobellæ hi-  
storia.

Viverra.

Mustelæ natu-  
ra, & uis

Nomina.

catulos suos, quos paruos admodum parit, ore susceptos transferre, falso opinati sunt, eas ore parere. Quorum opi-  
nionibus adstipulatur Ouidius: cui tamen uenia danda est, cum poetis qualibet audendi amplissima sit potestas. Non  
est similiter in eo audiendus Christophorus Euclius, uir aliqui eruditus, quod lib. III. cap. LIIII. de syliliu na-  
tura, uulgi fortasse sententiæ addictus magis, quam Aristotelis & aliorum probatissimorum auctorum, sepias, loligis  
nes, locustas, & squillas ore coire ac parere, ridenda historia scriptum reliquerit. qui præterea coruos & solustres  
gallinas ore concipere magno errore tradidit. Ceterum in mustelarum genere recensentur quæ MARTES ap-  
pellantur, quarum duæ in Italia habentur species. Vna namq; pilo uestitur fuluo nigricante, excepta gutturis parte,  
quæ albicat. hanc nos uulgo dicimus Faina. Hoc animal oderunt rura, quod sæpe domos illorum ingrediatur, ubi non  
modo gallinas, quas inuenit, iugulat, sanguine plerumq; exuât; sed etiam ova exhaurit & exorbet. quin & in turres  
ascendit, atq; inibi columbas (modo eas comprehendere possit) earumq; pullos enecat. Altera syluas incolit, raroq;  
illas deserit. hæc propriè Mars uocatur. Differt ab illa, quod corpore constet aliquantulum longiore, gutture sit  
luteo, & pilo contegatur clariore, tactuq; molliore. ut uel his nominibus eius generis pelles magnatibus expetantur  
ad hyemales uestes suffulciendas. Sunt qui putent, postremam hanc duorum esse generum: alterum quidem, quod in  
fageis, quernis, iligneisq; syluis uersatur: alterum uerò, quod in piceis & abiegnis tantum oberrat, pulchrius nima-  
rum aspectu. Mustelarum quoq; generi adscribitur quod Germani ZOBELLAM, nos uerò Zibellinum uoca-  
mus. Hæc corporis tum forma, tum magnitudine parum differt à marte, quamuis paulò minor sit. Totum corpus hæ-  
bet pilis fuluis uestitum, præterquam guttur, quod ex albo nigricat. Zobellis referta est Moscouia, & Lituania, at-  
que etiam ijs abundant finitimæ aliæ regiones, à quibus eorum pelles ad nos conuehuntur. Veneunt magno pretio in  
locis etiam, ubi capiuntur, quo fit, ut uenatores quandoq; ditissimi fiant. Porro & VIVERRA inter mustelas an-  
numeratur. Ea autem animal est sciuri magnitudine, pilo subluteo, audax admodum, & animantibus ferè cunctis mi-  
micum, præsertim euiculis, quos sæpe gregatim suis ex antris pellit. Oblectatur sanguine mirum in modum, adeo ut  
sanguine potius, quam carnibus uictitet. Inueniuntur præterea (ut audio) in Germania, Polonia, & uicinis locis aliæ  
Mustelarum genera: quæ quoniam hætenus ipse non uidi neque explorata sunt mihi, ideo quid de ijs scribam, non ha-  
beo. Verum quod nunc in Bohemia uitam agam, equidem futurum spero fauore atq; auxilio Sereniss. Ferdinandi Ar-  
chiducis Austriæ Principis, & domini mihi colendissimi, ut non solum mihi liceat tractu temporis hæc & alia anima-  
lia uidere & cognoscere, quæ in hac boreali plaga proueniunt; sed & multa rara consequi, quæ ad rem tuam herbe-  
riam, tum metallicam spectabunt. Mustelæ serpentes acriter persequuntur, dimicantq; deuorata prius ruta. Basi-  
lisco mustelæ uirus exitio esse auctor est Plinius libro VII. cap. XXI. adeo naturæ nihil placuit esse sine pari. Inij-  
ciunt enim eas cauernis facillè cognitiss, sola tabe. Necant illi simul odore, moriunturq; & naturæ pugnam conse-  
ciunt. Mustelæ etiam oculis punctu erutis aiunt uisum reuerti, eademq; quæ in lacertis, & annulis faciunt. Mustelæ  
cuiuslibet finis moschum nonnihil respicit. Is melle exceptus, addita lupinorum aut fœni græci farinæ, strumas, ces-  
terosq; pituitosos tumores discutit. Mustelarum felle cū succo fœniculi utuntur quidam ad oculorum argenas & mi-  
beculas. quinetiam idem lentigines, & alia huiusmodi cutis uitia emaculare perhibent, si cum melle, uitis albæ ra-  
dicis, aut ari farina illinatur. Nec desunt, qui putent Mustelarum pulmonem ad omnes pulmonis morbos efficacem  
esse. Mustelarum combustarum cinis aqua subactus illitu capitis dolores mulcet: oculis uerò iniectus suffusiones emen-  
dat. Hoc animal TANI Græcis dicitur: Latinis, Mustela: Italis, Donnola.

## Ranæ.

## Cap. XXV.

CONTRA omnium serpentium venena pro antidoto sunt Ranæ, si ex sale & oleo decoctæ edan-  
tur, iusque earum itidem sorbeatur: contra inueteratos tendinum rigores pollent. Illitus earum ci-  
nis, profluentis sanguinis impetus sistit: explendis alopeciarum inanitatibus ex liquida pice illinitur.  
Viridium ranarum cruor auulsos genis pilos renasci prohibet, in uestigia euulforum instillatus. de-  
coctæ in aceto, & aqua, dentium dolores collutione leniunt.



RANÆ




**RANAE** Italis, praesertimq; Insubriae populis frequentissima. Genere sane differunt, quemadmodum magnitudine, colore, ac natura. Aliae namq; ex putredine gignuntur aestiuis imbribus puluere madefacto, quibus sic ortis brevis est uita, nullusq; earum usus. Aliae uero rite, & secundum naturae ordinem, proueniunt in mari, fluuijs, paludibus, ac lacubus. Sunt & terrestres, quae in frutetis, & rubetis plerumque uiscitant, ob idq; Rubetae Latinis dicuntur. Nec desunt in hoc genere, quae etiam Calamitae dicantur, quod in arundinetis uitam agant. Verum utraque & uenenatae, & lethales habentur. Ceterum illae in fluuijs, paludibus, & lacubus uersantur, & degunt, quarum nobis in cibis inualuit usus, colore uiridi, aut subrutilo, cinereoque. tamen si & inibi quandoq; ex his cernuntur, quae non tu-  
to edi possunt: utpote quae a rubetis non multum perniciē distent. Pariunt Ranæ, ut Plinius tradit lib. IX. cap. LI. Ranarum par-  
tus. & experientia quotidie comprobari potest, mininas carnes, nigras, quas gyrinos uocant, oculis tantum, & cauda insignes, mox pedes figurantur, cauda findente se in posteriores. Mirumq; semestri uita resoluuntur in limum nullo cernente, & rursus uernis aquis renascuntur, quae fuere natae, perinde occulta ratione, cum omnibus annis id eue-  
niat. hec Plinius. Cui tamen sententiae prorsus refragatur experientia: quippe quod in paludibus maritimis, quae  
glaciem nunquam hyeme contrahunt, quocunque anni tempore ranas conspiciere liceat. Quapropter dicendum fue-  
rit, Plinium eas tantum quotannis in limum resolui existimasse, quae ex ipsius aquae, & terrae putredine gignuntur.  
Βάρφαροι, sic Graecae, Ranæ Latine uocantur: Arabice, Dīdaha, seu Dāsda: Italicæ, Rane: Germanice, Frosch: Nomina.  
Hispanice, Ranas: Gallicæ, Granoille, & Raine.

## Silurus.

## Cap. XXVI.

**SILVRVS** recens in cibo nutrit, & facilem praebet aluum: sale uero conditus, minimum suppe-  
ditat alimentum. arteriam expurgat, & uocem expedit. Illita saliti caro, aculeos, & infixam corpori spi-  
cula extrahit. Muria eius incipientibus dysenterijs prodest, si in defidentium fatus adijciatur: fluxio-  
nes siquidem ad summa cutis elicit. ischiadicis infusa medetur.



**EXISTIMAT** Paulus Iouius in libello de Romanis piscibus, Silurum cum esse piscem, quem uulgus Sturio-  
nem appellat. Veruntamen si Aristoteli, & Plinio est adhibenda fides, liquidò constabit, aliud piscis genus esse Silu-  
rum, aliud Sturionem. Namq; Aristoteles Siluro dentes assignat adeo firmos, atq; acutos, ut ijs hamos etiam ferreos  
frangere ualeat. Plinius item lib. IX. cap. xv. tradidit, Silurum ubicunq; sit, grassari, omneq; animal appetere: id-  
circo inmatantes equos saepe demergere, praecipue in Rheno Germaniae amne prope Lisboum, & in Danubio. At  
Sturiones etsi praegrandes sint, edentuli penitus habentur. Adhuc Silurus Aristoteli, & Plinio fluuiatilis semper de-  
scribitur piscis, cum tamen Sturio frequentius in mari, quam in fluminibus reperiatur. Quo factum est, ut facile de-  
ductus sim in sententiam clarissimi Manardi Ferrariensis: quippe quod pro certo crediderim, Silurum Italis baudqua-  
quam esse cognitum. Quandoquidem inibi in fluminibus, quanquam ingentibus, nunquam (quod sciam) Silurus fue-  
rit repertus. Pannoni Danubij accolae Silurum uulgari sermone uocant Acchia: Rheni uero litora inhabitantes Ger-  
manica lingua Bolich appellant: siquidem is maxime grassatur, morsuq; petit omne animal, quod sibi obuiam fit. Is  
effigie gobium refert capite magno, ore amplo, & dentibus ferocissimis. Hac in sententia me quoque Plinius confir-  
mat: is enim Silurum & in Rheno, & in Danubio nasci auctor est. Piscis, qui οὐλοσπος Graecis, Silurus Latinis  
appellatur: Arabibus, Harbe: Italis, Siluro: Germanis, Bolich, & Balich.

Pauli Iouij  
opinio im-  
probata.

Nomina.


## Smarides.

## Cap. XXVII.

**SMARIDIS** piscis saliti caput exustum, excrecentes ulcerum oras, puluillosque reprimi  
nomas cohibet: thymos, clauosque absumit. Caro non secus atque salsamentum prodest a scorpione  
perculsis, aut a cane demorsis.




## SMARIDES.



Mænæ.

Cap. XXVIII.

MAENARVM ex capitibus cinis, si illinatur, callosas sedis rimas abolet. Eius etiam garum oris putrilagines collutione sedat.

Smaridis con-  
sideratio.

Mænæ.

Nomina.

ET SI studij, ac diligentie plurimum impenderim, ut quina piscis sit Smaris, certior fierem; nunquam tamen apud Aristotelen, nec Plinium, nec deniq; veterum quenquam aliquid certi nactus sum, ita ut planè Smaridem cognoscere, ac describere possem. Illud tantum inueni, ijs Smaridem esse pisciculum, mænis facie similem. Ex quo faciliè adductus sum, ut eos non longè aberrare putauerim, qui Smarides eos pisciculos dixerit, quos vulgò Veneti appellant Giroli: nanque hi præter id quod corpore minores sunt, mænas notis omnibus representant. Ceterum cum Mænæ, quæ vulgò Menole dicuntur, sint vulgaris notitiæ, non est, cur plura de eis differam. Quæpidem ita Græcis ut etiam Latinis Smarides nominantur: Arabibus, Absamaris: Italis, giroli. Quæ uerò Græcè μαυρίδες, Latine Mænæ dicuntur: Italicè, Menole: Hispanicè, Pandelhas.

Gobius.

Cap. XXIX.


GOBIVS recens in suillum uentrem coniectus, si confuta rima in duodecim aquæ sextarijs, donec duo supersint, decoquatur, excolatus & sub diuo refrigeratus potui detur, alius sine molestia deijcitur. Illitus contra serpentium, canumque morsus auxilio est.



## GOBIVS.



GOBII ALIVD GENVS.



GOBII in Venetis ichthyopolijs frequentissimi conspicuntur, quod inibi in finitimis lacunis mirum in modum foetifcent, ac numerosi proueniunt. Quare non immerito prodidit Aristoteles in marinis litoribus, ubi in profundum non labatur aqua, summa cum uoluptate morari Gobios. Hos Veneti detractis posterioribus syllabis Go uulgò uocant. Capite sunt amplo, gustuq; persuaues, quod carnem habeant tum pinguem, tum etiam friabilem. Proinde de his differens Galenus libro III. de alimentorum facultatibus, sic inquit. Gobius litoralis est piscis, ex eorum numero, qui parui perpetuò manent. Præstantissimus autem ad uoluptatem, coctionem, simul ac distributionem, & succi bonitatem est is, qui in arenosis litoribus, aut saxosis promontorijs uiuit. At qui in fluminum ostijs, aut stagnis, aut stagnis marinis uersatur, non æquè suauis est, neq; probi succi, neque concoctu facilis. Ceterum sciendum est (ut etiam annotauit Galenus) Gobios non in mari tantum reperiri; uerum etiam in fluminibus, & lacubus, quemadmodum testantur ij, qui in Lario lacu, itemq; Verbano capiuntur, laudatissimi quidem, propterea quod eorum iecur maxime

Gobiorum  
consideratio.

Gobij facultates ex Gal.

Gobij fluuiales.

GOBIVS FLVVIATILIS.



ximam cum palato inerat gratiam. In fluuijs uniuersim minores existunt, quanquam ex ijs etiam nonnullos inuenias, qui duas aut tres uncias pendant. In agro Tridentino pauci admodum sunt fluuij, qui Gobios non alant: nanque & Athess & Nossus, & Lauisus, & Sarca ijs refertissimi sunt. Hos inibi quidam uulgò uocant Capitoni; quidam uerò Marsoni: at in Hetruria, ubi tamen rarissimi habentur, corrupto à Gobijs uocabulo, uulgò dicuntur Ghiozzi. Sunt hi pisciculi




Nomina.

hi pisciculi non modò concoctu facillimi; sed & ori suauissimi, atq; gratissimi, præsertim cum ouis turgent: hæc enim in his & pinguis, & copiosa sunt, gustui uerò suauissima. Quo fit, ut solertissimi piscatores horum secturas obseruant, non minus expiscandis ouis operam nauent, quàm piscibus ipsis. *Kaplos* Græcis, Latinis similiter *Gobius* appellatur: Arabibus, *Kanen*: Italis, *Gobio*: Germanis, *Goeb*: Hispanis, *Cadozes*: Gallis, *Gouiones*.

## Thunnus.

## Cap. XXX.

CONDITANEI thunni caro, quam *omotarichon* uocant, sumpta ijs axiliatur, quos uipera nomine præter momorderit: sed oportet vinum quàm plurimum subinde cogantur haurire, ita ut uomitione reddatur. Contra acrimonias esciatorum maximè ualet: canum moribus utilissimè illinitur.



Thunni consideratione.

Xiphia piscis

Thunnorum captura, &amp; nomina.

Thunnorum in cibis facultas.

Nomina.

THUNNI pisces inter cetaceorum genera recensentur. Ii multitudine sua omnibus litoribus sunt noti, præsertimq; Tyrrheni accolis magis, quàm ijs, qui Adriatici litora inhabitant. In Euripis maxima eorum est capta. Irrumpunt maio mense, ac iunio in mare nostrum mediterraneum per Herculis columnas ab Atlantico oceano, eorum gentibus xiphijs, hoc est, spathis piscibus, qui ense à rostris prominente instructi, eos toto mari persequuntur, eos enim xiphie immanes betæ. Nam (ut Plinius inquit libro xxxi. cap. ii.) mucronato rostro tam ualide naues perfradunt, ut in oceano mergantur, præsertim ad Mauritanie locum, qui Cotta uocatur, non procul à Lixio flumine. Thunni igitur cum piscium simplicissimi, timidissimiq; sint, non aliter in fugam à xiphijs gregatim aguntur, quàm ouium greges à lupis. Quam ob causam uel inanibus terriculamentis acti facillè uadis, atque litoribus intruduntur. Porro summa spectantium uoluptate maio, & iunio mensibus Thunni à Gaditanis non longè ab Herculeo fretu capiuntur, ad quam piscationem uniuersus concurrunt populos, maximo clamore, tympanorum sonitu, ac bellicis pulcres, & igne concrepitantibus terriculamentis. Hæc enim eorum capturam faciliorem reddunt: quandoquidem solliciti cum sint, uocibus, & strepitu territi, concitantur ad uada: quo in loco postea gregatim retibus capiuntur, maximoq; omnium plausu trahuntur in litus. Thunni diuersa sortiuntur nomina; namque primus thunnorum sætus ab ipso statim ouo Cordilla dicitur, qui mox in Limarias euadit: ex limarijs autem adolescentibus Pelamides sunt, sic dicto luto dicta: cum uerò hæc pedalem excessere mensuram, in Thunnos abeunt. Athenæus hos diu uiuere ait, & in præcipuis grandes euadere pisces. Sed huic opinioni uidetur aduersari Aristoteles, cum asseueret, eos biennio uitam finire. Animal est paruum (ut scribit Plinius) scorpionis effigie. Hoc ardente siccitate sub pinna affigit aculeo, tantoq; insufferabili dolore, ut in naues exiliat: quo tempore, ut maximè noxijs damnantur in cibis. Ceterum thunnorum uentres, quod in cibatu ori gratiores habentur, eò magis uentriculo nocent: contra eorum canes, quæ omni prorsus pinguedine carent, etsi non tantam cum palato ineant gratiam, minorem tamen uentriculo inferunt noxam. Quamquam huiusmodi modi pisces, qui in cetaceorum genere recensentur (ut Galenus est author lib. iii. de alimentorum facultatibus) de ra carue sunt præditi: quam ob causam & prauis sunt succi, & excrementitium præbent alimentum. Quapropter sæpe macerata plerumque eduntur, quòd inde alimonia tenuior facta ex ipsis in corpus distribuatur: ob idq; sit coctionis & sanguini faciendo accommodatior. Nam recens horum caro ni admodum probè concoquatur, magnam crudorum succorum copiam in uenis congerit. Piscis, qui Græcis *θύννος*, Latinis item Thunnus uocatur: Arabibus, *Kefam* & Aliena: Italis, Tonno: Hispanis, Atuni: Gallis, Thun.

## Garum.

## Cap. XXXI.

GARVM omne, quod expiscibus, carnibusque sale maceratis liquamen est, si ex eo fetus fiat, depascentia ulcera sistit. Morfus à cane medetur. dysentericis, atque ischiadicis infunditur: nonnullis, ut exulcerata adurat: alij autem ad laceffenda, quæ ulcera non senserunt.

## Ius Piscium.

## Cap. XXXII.

RECENTIUM piscium ius, modò per se, modò ex uino potum, aluum subducit. Priuatim ad hunc usum conficitur è phycidibus, & scorpionibus, & iulidem, è percis, & recentibus alijs saxatilibus, nec uirus respicientibus, simpliciter cum aqua, oleo, & anetho.

GARVM



**GARVM** dictum esse à ueteribus tradidit Plinius lib. xxxi. cap. vii. quòd olim conficeretur ex pisce, quem Græci garon uocabant, intestinis illius sale maceratis, ac eliquatis. Quod item postea è scombri extis confici coëptum est. Fuit olim Garum complurium ciborum condimentum, adeò ut nullus ferè liquor, qui ad gulæ luxum magis præstaret, ab antiquis fuerit excogitatus. Veruntamen de hoc non intellexit Dioscorides; sed generatim de omni piscium, & carnum muria, quæ hæc diutius asseruari solent. Cæterum de piscium iure non est cur pluribus agam, cum satis ab ipso auctore de eo proditum sit. Quod Græci γάρρον, Latini similiter Garum dicunt: Arabes, Muri, siue Almuri: Itali, Garo, & Salamuoià. Quod uerò Græcis ζουός ιχθύων, Latinis Ius piscium dicitur: Italis, Brodo de pesci.

Gari consideratio.

Nomina.

### Cimices lectularij.

### Cap. XXXIII.

**CIMICES**, qui in cubilibus enascuntur, cauis fabarum inclusi, si ante febrium significationes septeni deuorentur, quartanis auxilio sunt: & citra fabas sumpti, percussis ab aspidè prosunt: vuluarum exanimationes olfactu reuocant. Poti cum uino aut aceto, adhærentes sanguisugas abigunt: tritæ, & urinæ fistulæ impositi, urinæ angustias leuant.



**INTER** omnes nocturnos hostes, qui nobis dulcem somni quietem intercipiunt, nulli quidem nocentiores, infestioresque habentur, quàm Cimices: quippe qui non solum morsu dilacerent, quo & somnum inturbant, & sanæ guinem nobis adimunt; sed etiam foetorem adeò detestabilem, abominandumque nobis ex se relinquunt, ut eo longè magis sensus, spiritusque lædantur, quàm uniuersæ corporis partes, quæ ab ijs fuerint ictæ. Cæterum tametsi infestissima, foetidissimaque sint animalia; noluit tamen eos genuisse natura omnium rerum parens, quin suum haberent in medicina usum. Utuntur ijs recentiores quidam ad ciendam urinam, uiuis in penis organum immisis, non autem mortuis, & tritis, Dioscoridis modo. Quod mihi magis consentaneum esse uidetur: siquidem in meatum urinarium inditi, ingressu titillationem excitant, & urinæ uim expultricem proritant. Sunt & syluestres Cimices, qui ex herbis uictum, & locum habent, lectularijs maiores, colore uiridi, æquè ac illi foetidi. Sed hi nullum, quod sciam, obtinent in medicina usum. Cimices ita Latinis, κόπες Græcis appellantur: Italis, Cimici: Germanis, Vuantzen: Hispanis, Chismes, Chimesas, & Parauelhos: Gallis, Puneſes.

Cimicum consideratio.

Cimices syluestres.  
Nomina.

### Millepedæ.

### Cap. XXXIIII.

**MILLEPEDÆ**, quæ sub aquario uase stabulantur, animalia sunt multis edibus nitentia, quæ contacta manu contrahuntur in orbem. Hæ ex uino potæ difficili urinæ, & regio morbo auxiliantur. Millepedæ cum melle anginis utiliter illinuntur. tritæ, & in cortice mali punici calfactæ, doloribus aurium, addito rosaceo, conuenienter instillantur.



**MILLEPEDÆ**, quas uulgò appellamus Porceletti, animalia sunt exigua, & omnibus uulgaria. Proinde non operæpretium duxi, ut plura de eis in præsentia referam, quàm tradiderit Dioscorides. Cæterum animalculi

Millepedarum usus.



habec Galeno commendata sunt libro II. de compositione medicamentorum secundum locos ad diuturnos capitis dolores, ubi sic inquit. Maxime etiam prosunt sub aquario vase nascentes aselli, millepedæ appellati, si oleo incoquantur. Quamobrem nesciuerim, cur dixerit Plinius lib. XXIX. cap. ultimo, Millepedam animal esse e nemine terre pilosum, multis pedibus, arcuatim repens. Animalia, quæ Græcè ὄροι, Latine Millepedæ, Aselli, & Millepedæ uocantur: Arabicè, Harna: Italicè, Millepedi, & Porcelletti: Germanicè, Esel: Hispanicè, Gallimibæ Gallicè, Cloporte.

## Blatta.

## Cap. XXXV.

BLATTÆ eius, quæ in pistrinis inuenitur, interanea trita, aut cum oleo decocta, aurium dolores instillatu mitigant.

Blattarū cōsideratio.

BLATTARVM pluræ esse genera, auctor est Plinius lib. XXIX. cap. ultimo. Verùm hæ, quarum in Hætyria aliquibus locis ingens est multitudo, & quæ uulgò uocantur Piattole, noctu magis, quàm interdiu in cellis uinarijs apparentes circa latrinarum ora, in pistrinis, balneis, uiginosisq; ædium partibus, scedissima quidem, nescisq; sunt animalia. Gryllos hæ, qui noctibus æstate strident, quadantenus refrunt: planiores tamen, cruribus tiamnum tenuioribus araneorum modo: proinde fugæ citissima. Lux istis aduersissima, ita ut, si nocte lumen repente inferatur humentibus locis, in quibus degunt, celerrimo cursu refugiant. De his igitur, utpote quæ multum in pistrinis uersantur, intellexisse Dioscoridem credendum est: non autem de illis uermiculorum modo oblongis, quæ in apum aluearijs, & in cymibus diu sale illucteratis enascuntur: quanquam & hæ Blattæ nomen sibi pendicauerunt. Nobis hæ uocantur uulgò Barbezzie, alijs uerò Carpe. Blattarum uires, quas pluribus Plinius conscripsit, sicutio inuoluimus, rati gravioribus, salubrioribusq; remedijs morbos posse sanari, quàm ijs, qui à tam fetidis, atq; excrementis sumuntur animalibus. Quæ Græcis ὄροι, Latinijs, pariter & Italis Blatta nominatur: Germanis, Grölen, & Heynichen: Hispanis, Rapa coua.

Nomina.

## Pulmo marinus.

## Cap. XXXVI.

PODAGRAS, pernionesque emendat pulmo marinus recens, tritus, & illitus.

Pulmonis marini cōsid.

PULMONES marini animalium pulmonibus non absimiles habentur: His (ut Plinius est auctor libro IX. cap. XLVII.) eadem quæ frutici inest natura, perinde ac spongijs, urticis, stellis, & olothyris. Conscriptur marini pulmones plerunque undis supernatantes, futuram maris procellam præsentientes. Mirum, quod si uirgæ baculiq; perungantur, nocte facium accensarum modo lucem edunt. πνεύμων θαλάσσιος ita Græcis. Latinijs uerò Pulmo marinus appellatur: Italis, Polmone marino: Hispanis, Natura de uieya, & Capacha de uella.

Nomina.

## Pulmones.

## Cap. XXXVII.

SVILLVS, & agninus, ursinusque plumo impositu, attritus à calceamentis contractos, ab inflammatione tuetur. Vulpinus uerò si arefactus bibatur, suspiriosos adiuuat. Adeps quoque liquefactus, infususque aurium dolores finit.



Vana de ursæ partu opinio.

MULTA præterea sunt horum animalium membra, de pulmonibus quorum differit Dioscorides, quæ medicamentum uini possident, de quibus postea speciatim suis locis dicetur. Verùm cum hæc animalia nemini uon sint cognita, non opus esse existimo, ut de ijs plura dicamus. Quanquam illud silentio non dissimulandum, quod scilicet Ursarum partus non sit plurimis membris indiscretus, cruribus præsertim, & undique rudis, ac informis: nec quod partus linctu formam tandem recipiat ursinam, ut nonnulli scriptis commendarunt, & credit uulgus. Quandoquidem in ualle Anania supra Tridentum uidimus nos prægrandem Ursam prægnantem, ab ipsis uenatoribus exentratam, cuius catuli adhuc in utero existentes, omnibus suis membris distinctis, ac formatis reperti sunt, non autem in formam



formes, ut plerique existimant, magis fortasse Aristotelis, & Plinij auctoritatibus freti, qui ita esse memoriae prodiderunt, quam sensibus, & experientia. *αγεύμαρες* Græcè, Pulmones Latine dicuntur: Arabicè, Rich, & Riche: Italicè, Polmoni: Hispanicè, Leuianos: Gallicè: Polmon.

## Iocinera.

## Cap. XXXVIII.

**ASINI IECUR** inassatum esu comitialibus prodest: ueruntamen ieiunis edendum præcipitur. Capræ uerò inassati decidua sanie, inungi lusciosos prodest: & dum coquitur apertos oculi halitus eius uaporari. prodest in cibo tostum ad eadem. Tradunt hircini iocineris cibo comitiales deprehendi. Aprinum recens si arefactum teratur, ex uino potum, contra serpentium, & uolucrumque morsus auxilio est. Iecur canis, qui rabie exagitur, tostum, & in cibo ab emorte eo, qui caninus dicitur. hunc à cane, qui momordit, exemptum, & folliculo inditum, pro amuleto brachio adnectunt. Inueteratum autem sale mergi iecur, ex hydromelite binis ligulis potum secundas pellit.



**PRAETER** Asini, Capræ, Hirci, Apri, rabidi Canis, & Mergi iecur, est & Lupinum, quo utuntur medicorum nonnulli, qui primas tenent in uniuersa Italia. Siccant enim lupinum iecur, mox in puluerem conterunt, & tantum præcipuum medicamentum ijs exhibent, qui iocinerosis afficiuntur fluxionibus: ijsq; similiter, qui aqua intercutem laborant. Quinquam id probare non uideatur Galenus lib. xi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Iecur lupinum sepe numero in medicamentum indidi hepaticum, quod ex eupatorio conficitur; nec tamen quod memoria dignum sit, amplius præstare comperi, ad illud uidelicet comparans, quod sine ipso componitur. Secus autem Galenus de iecore lupino scripsit postea lib. & cap. viii. de compositione medicamentorum secundum locos, ubi iecinoris medicamenta recenset, cum sic inquit. Cochlearum terrestrium carnem ualde probe terito, & affusis uini nigri Cyathis tribus calfacito, ac bibendum dato. Videntur autem hæc iuxta totam substantiam efficacia esse. non secundum unam aut alteram qualitatem. Quale est & Lupinum hepar, cuius abunde experimentum habemus. Vfus autem ipsius consimilis cochleis est. teritur enim exacte hepar lupinum, & datur drachma una cum uino aliquo dulci, qualia sunt theaeum Creticum, & scybelites, ac dulce protropum. Benigna enim hæc sunt uisceri, ipsum nutrire potentia, & media iuxta calidi & frigidi oppositionem: & ob id talia pharmaca omnibus intemperaturis conueniunt, ut quæ ex substantiæ proprietate commoditatem de se exhibent, & neq; calidas, neq; frigidas intemperies ledant. hæcenus Galenus. Caterum idem in simplicium medicamentorum censu, libro paulo antè citato, Canis rabidi iecur non ijs præstare uiribus, quibus aliquorum fert opinio, scriptum reliquit his uerbis. Iecur rabientis canis, si assum edatur, remedium existere ijs, qui ab ipso fuerint demorsis quibusdam memoria est proditum. Ac ijs certe quosdam, qui ipsum sumpsere, mansisse superstites, uerum non illo solo. Siquidem alijs præterea remedijs usi sunt, quorum fecimus periculum in rabiosorum morsibus. Audiui uerò quosdam, cum illi soli fidem habuissent, postea mortuos. De iecore Mergi in aqua degentis, tamen Galenus nihil literis mandauerit; Paulus tamen id renum calculos eijcere tradidit. Dioscorides uerò secundas, non autem calculos pellere protulit. Quo fit, ut Pauli codicem depreuatum esse crediderim. At uentris quidem Mergi meminit Galenus citato loco, eorum opinionem ut uanam explodens, qui uentriculo roborando ipsum exhibent. Eosq; item deridet medicos, qui ad idem usurpant. internas uentriculorum gallinarum tunicas: siquidem ait, se utrunque expertum fuisse, nec inde quicquam confectum emolumentum. Quod tamen cum ignorent recentiorum quidam, cum scplasiarijs ad uentriculum roborandum aliquid præcipiunt, nihil frequentius habent in ore, quam illud, Recipe stomachi gallinarum, longe magis uulgum quam Galeni dogmata secuti: quanquam in hoc Galenus sua experientia fretus, aperte Dioscoridi refutetur. Quod Græci *μαζα*, Latini item hepar, & iecur uocant: Mauritani, Bedib: Itali, Fegato: Germani, Leber: Hispani, Fegado.

Iocineris lupi confid.

Canis rabidi.

Mergi iecur, & uenter.



† Sunt qui hoc loco non *ἀνὴρ*, quod est uolucrum, legant; sed *κτῆν*, id est, quadrupedum, priore tantum mutata litera. Certè facilis hic fuit librariorum lapsus: tamen quæ sit uera Dioscoridis scriptura, non facile intelligi potest, cum Plinio aues etiam dentatæ prodantur.

## Genitale cerui.

## Cap. XXXIX.

GENITALE cerui tritum, & in uino potum, à uipera demorsis auxiliatur.

Genitalis  
cerui uires.

RASIS auctor est, Genitale cerui, præter uim quam sibi natura comparauit contra uiperarum morsus, ut erit statim ablutionis bibatur aqua. Aiunt in puluerem tritum, & ijs medicamentis inditum, quæ uenerem exitant, ea magis lentiora efficere. Quin & dysentericis mederi magno successu à nonnullis expertum est. Quod αἰδοῖον dicitur Græcis, Genitale cerui Latini dicunt: Itali, Verga del ceruo.

Nomina.

## Vngulæ asini, &amp; capræ.

## Cap. XL.

VNGULARVM asini cinis per dies multos binis cochlearibus potus, proditur comitiales adiuuare, eadem oleo subactæ strumas discutunt: & illitæ pernionibus medentur. Caprinarum cinere perunctæ ex aceto alopecie fanantur.



Vngularum  
uires.

NON solum Asini, & Caprarum ungulæ in medicum ueniunt usum; sed & Vaccarum ex prioribus tantum pedibus exuta, ut auctor est Rasis libello de LX. animalibus. Siquidem harum combustarum cinerem potum, nutritiois lactis copiam præbere existimat, Mularum uerò mulieres infæcundas reddere. Quinetiam mures earum suffragari, ipsis carbonibus impositis, & accensis. Earum nomen Græcum ὄνυχες, Latinum Ungues, & Vngulæ: Arabicum, Châst, Stes, & Dalef: Italicum, Vnghie: Hispanicum, Vubas de animal: Gallicum, Ongle.

Nomina.

## Lichenes equorum.

## Cap. XLI.

LICHENES sunt in equorum genibus, & super ungulas indurati calli, qui triii, & in aceto potius comitialibus mederi traduntur.





DE CALLIS, qui equorum cruribus innascuntur, meminit Plinius libro x xviii. capite xi. xv. ijsq; tritis, & per aurem cum oleo infusis, dentium dolorem mulceri scribit, diebusq; quadraginta ex uino aut mulso potis calculos expelli. Ceterum Galenus, cui etiam subscribit Paulus, addidit hos quibusdam usurarum ubi sedata fuerit phlegmone, non iniuria inuuantur, nempe quia resiccantur. hæc Galenus. Ceterum ueteramenta prunis accensa fumo naribus accepto, efficacissimum constat esse remedium ad uulua stragulatus, ut mihi quoque experientia comprobatum est: quandoquidem hoc tantum remedio ego deploratas in eo affectu mulieres incolumes pluries reddidi. Iis similiter accensis serpentes efficaciter fugari compertum est, neque eos modò, qui in domibus nostris oberrant; sed eos etiam, qui in hominum corpora ingrediuntur, dum homines per æstatem alto somno oppressi, ore aperto in campestribus obdormiunt. Quod scriptis tradidit Marcus Gattinaria nostræ ætatis medicus non contemnendus, accidisse suo tempore cuidam homini, cui cum frustra adhibita esse innumera medicamenta, ipsaq; alioquin efficacissima; illud tamen magnificè præstitit ueteramentorum funus traiectorio in corpus haustus. Siquidem cum primum immanis fera (erat enim uipera non parua) fumi nidorem præsensit, uisa est à circumstantibus egredi per animum non sine magna omnium admiratione. Καθάρματα sic Græci, quæ Latini Coria ueteramentaria uocant: Arabes, Geldalatiche: Itali, Scarpe uecchie: Hispani, Zepatos uiegos.

Callorū equi uires.

Nomina.

## Coria ueteramentaria.

## Cap. XLII.

VETERIS corij cremati illitus cinjs ambusta igni, intertrigines, necnon calceamentorum attritus sanat.

Veteramētorum uires ex Galeno.

Vipera ex homine fugata.

Nomina.

## Gallinæ, &amp; galli.

## Cap. XLIII.

DISSECTAE gallinæ, & adhuc calentes appositæ, serpentium moribus auxiliantur: sed identidem alias sufficere oportet. Earum cerebellum in uino bibendum datur contra serpentium morsus: sanguinem à cerebri membrana profluentem sistit. Quæ interiore uentriculi galli sinu residet membrana, secti in laminas cornus specie similis (ea uerò inter coquendum abijci solet) sicatur, tritaque in uino conuenientissimè stomachicis datur in potu. † Ius è uetere gallinaceo aluum deijcit. Abiectis itaque interaneis saltem conijci oportet, & consuto uentre decoqui in uiginti sextarijs aquæ, donec ad tres heminas redigantur: totum id refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquant olus marinum, mercurialem, cnicum, aut filiculam. Crudos humores, crassosque, atram bilem, & strigmenta elicit: prodest longis febribus, suspirijs, articularijs morbis, & inflationibus stomachi.





Gallorum, &  
gallinarū vi-  
res ex Gal. &  
aljis.

**TAMETSI** Gallinarum ius simplex (ut Galeno proditum est libro XI. simplicium medicamentorum) retinendi uini habeat; gallorum tamen ueterum cum sale diutius decoctorum, subducendi facultatem obtinet. Aduersus serpentium morsus tam gallinis, quam gallinaceis utuntur medici, non tantum ipsis dissectis, & apposis (ut docet Dioscorides) sed uiuentibus adhuc plumas detrahunt ab ano, eumq; demorsis partibus apponunt: attrahunt enim hæc animalia cucurbitularum modo in se uenenum, quo mox interficiuntur. Quamobrem alios gallinaceos uiuos continuo apponere necesse est, donec iniectum uirus penitus absumatur. Utuntur præterea gallinarum adolescentium iure, ad æquandos corporis humores, post febrium discessum, cum saccharo, serapij modo. Ad hæc gallorum cum gallinis nouum coeuntium testes, deperditas in morbis uires mirifice restitunt: quam ob causam hecticis, & maximo laborantibus, morborumq; diuturnitate macrefactis utiliter exhibentur. Insuper gallinaceorum testes semen prolificum suppeditant, & uenereas roborant uires. Plinius cum de gallinis differeret lib. XXIX. cap. IIII. hæc inter cetera memoria prodidit. Non præteribo (inquit) miraculum, quanquam ad medicinam non pertineat: si aure liquefcenti gallinarum membra misceantur, consumunt illud in se. Ita hoc uenenum auri est. At gallinaceis ipsis circulo e sarmentis addito collo non canunt. In quibus illud quoq; sibi à natura datum, non est non summo opere admirandum, quod noctis horas distinguant suo cantu: quæ in re nunquam adeo somno capiuntur, quin statim horis cantent; etsi per anni circulum noctes modo breues, modo maxime fiant. Galline sic Latini, ἀλεκτορίδες Grecis uocantur: Arabibus, Degedi, siue Gaziudiuch: Italis, Galline: Germanis, Hæn, & Hennen: Hispanis, Gallinas: Gallis, Gallines, & Coque.

Nomina.

† Codices Græci typis expressi hoc in loco habent. ὁ δὲ ξωμός τῆ νοσίου μέλισσα διδοται ἐν πικρῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἐπὶ τῶν σωματικῶν πυρετῶν λιτῶς σκευασθεὶς. hoc est ad sensum. Ius galli iunioris maxime datum ad contemperandos humores uitiosos, & in ardoribus stomachi simpliciter paratum. Verba illa Ruellius, cuius interpretationem alioquin sequimur, uel neglexit, uel illegitima iudicauit. Nos uero hæc ea afferenda duximus, non solum quod in uulgatis codicibus, ac antiquissimo (teste Marcello) legamur; sed quia etiam à Serapione referuntur. Quibus etiam subscribere uidetur uerborum series, & communis rei usus.

## Ouum.

## Cap. XLIII.

**O V V M** molliculum plus alit forbili, & durum plus molli. Luteum oui contra oculorum dolores utile est: inasatum sedis inflammationibus prodest, cum croco, & rosaceo: & condylomatibus cum meliloto: cum uua autem fruticis eius, quem rhoa dicunt, aut galla in patinis frigitur, ut cibo aluos sistat: per se etiam offerri solet. Candidum oui crudum refrigerat: spiramenta cutis occludit: inflammationes oculorum infusum lenit: ambusta, si statim eo perungantur, pustulas non sentunt: faciem à solis adustione tuetur: fronti inpositum cum thure fluxiones arcet, auertitque: inflammationes oculorum lana exceptum, addito rosaceo, melle, & uino mitigat: utiliter contra hæmorrhoidis serpentis morsus crudum sorbetur: summè tepidum prodest uesciæ rosionibus, renum exulcerationibus, gutturis scabritiæ, reiectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis rheumatismis.



Quorum con-  
sideratio.

**DE GALLINARVM** tantum ouis hic locutum fuisse Dioscoridem, credendum est: quippe quæ sint ceteris præstantiora, eorumq; sit tum in cibis, cum in medicinis præcipuus usus. Nam quemadmodum testatur Galenus lib. III. de facultatibus alimentorum, & Isach Arabicus in suis dietis, gallinarum oua gratioris sunt saporis, ori uicundiora, plusq; afferunt alimenti, quam cetera. Alunt hæc, & breui reficiunt tempore, recreant, semen prolificum augent, & uires ad coitum suppeditant. Quæ omnia eo præstant efficacius, quò recentiora sunt, & à gallinis cum augent, & uires ad coitum suppeditant. Quæ omnia eo præstant efficacius, quò recentiora sunt, & à gallinis edita, quæ prius admissarios gallos susceperint: quandoquidem (ut Galenus inquit) recentia ueteribus plurimum præstant: quippe optima sunt recentissima, pessima autem uetustissima. Secundum locum sibi uendicant à perdicibus, & phasianis edita, quanquam gallinacea uiribus non excellant. Deteriora uero sunt anatum, anserum, grunum, & reliquarum aquatiliū: aggrauant enim uentriculum, succum crassum gignunt, & agrè concoquantur; tametsi plurimum præbeant alimenti, ubi à ualidis, robustisq; uentriculis optime conficiantur. Columbarum oua admodum calida sunt, potius in medicamentorum, quam ciborum usum expetenda. Pauonum autem, ac struthiocamelorum pessima sunt, saporis



saporis horrendi, concoctu contumacia, & humane temperatura inimica. In ouis luteum candido longè præstat: nempe quòd illud temperatum constat, ori non ingratum, boni succi, & concoctu minime contumax: hoc uero frigidum est, pituitam gignit, & græcè concoquitur. Oua uarijs, & diuersis modis decoquantur. quo fit, ut etiam diuersum afferant nutrimentum, & ob id diuersos in corpore pariant succos. Probantur, quæ cum putamine decoquantur, & horum præ cæteris, quæ tremula uocant, quòd lactis semicoagulati instar tremant. Sorbilia, quæ ut uelocius hauriantur, breuiorem cocturam experiuntur, minus sanè nutriunt. Quæ autem cum putamine longiore elixatione indurescunt, difficillimè concoquantur, crassos generant succos, obstruunt, in uentriculo marcescunt: arenulas, & calculos gignunt: & coli, & uentriculi excitant cruciatus. Porro ex ijs, quæ extra putamina coquantur, ea cæteris præstant, quæ integra in feruentem inmerguntur aquam. hæc à nostris, quòd quasi dispergantur, uulgo Sperdute nuncantur. Veruntamen curandum, ne hæc quoq; indurentur: siquidem ubi duritiem contraxerint, non secus atque alia diutius cocta, redduntur noxia. Quæ deinde ex oleo, aut butyro integra friguntur, uentriculum lædunt, ructus commouent, & græcè conficiuntur, consocium corrumpunt cibum, malum præbent alimentum, & putridas pariunt exhalationes. Quæ demum super prunis torrentur, aut ignitis figulinis tegulis inassantur, aluum cohibent, difficileq; concoquantur. Et hæc sufficiant ad ouorum in alimentis facultates. Cæterum quibus, quantisq; oia in medicamentis polleant uiribus, relulit Galenus libro XI. de simp. medicam. facultatibus, sic inquires. Ouorum album & tenue illud, quo item ad ophthalmias utimur, ex numero est medicamentorum minime mordicantium. Itaq; utendum est oui albumine non tantum ad oculos; uerum etiam ad alia omnia, quæcunque medicamenta requirunt maxime expertia mordacitatis, ut sunt omnia sedis, ac pudendorum ulcera maligna. Miscetur quoq; utiliter medicamentis profluum sanæ guinis ex cerebri membranis supprimentibus, quæ nimirum citra morsum illiuntur, atque adstringunt. Sed & ad ulcera rebellia miscetur ijs, quæ absq; morsu ea possunt desiccare: cuiusmodi est medicamen pompholyx elota, & metallicorum quædam elota, de quibus priuatim supra differimus. Porro & ipse uitellus adsimilis est naturæ, ac proinde miscetur ceratis morsus expertibus, cuius uidelicet aut lixis, aut assis. Verum id tamen manifestum est inter hæc leuicula existere differentiam, quòd paulo plus desiccant quæ sunt assa: ac quantum uius accipiant facultatis, tantum deperdant de mitigandi potentia. Miscetur, & cataplasmatibus phlegmonem arentibus, ut ijs quæ ex meliloto constant, sed applicandis. Crudo uero ouo toto utimur aduiso rosaceo ad palpebrarum, aurium, mammarumq; phlegmonas, quæ scilicet aut istis illis, aut alio quouis modo euenerint, aut extiterint in nervosis corporibus, puta cubito, & digitorum tendonibus, aut articulis, idq; in pedibus pariter, & manibus. Porro in aceto coctum ouum si edatur, fluxiones uentris desiccant. At si etiam quippiam eorum, quæ ad dysenteriam, aut celiacum affectum conueniunt, illi miscueris, atq; in igne modico, sumiq; experte (qualis est qui ex prunis constat) in sartagine frixeris, edendumq; ita præbeas, non minime sanè laborantes adiuueris. Aptissima talem ad missionem sunt omphacium, rhus, tum ipse qui eis bis aspersigitur erythros muncupatus, tum succus ipsius, galla, sidia, hoc est mali granati putamina, cinis coeblearum integrarum ustarum. Aptæ quoq; & uuarum acini, & myrtæ, & messila, & corna. Magis istis medicamentosa sunt balaustium, hypocistis, cytini, siue mali punice flores. Sed & ad ambustiones protinus crudum impositum est utile, siue quis scorpium albumen duntaxat ipsum molli lana excipiat, siue etiam cum uitello totum commiscens applicet. Etenim mediocriter refrigerat, & citra morsum desiccant. Nam medicamentis, quæ humiditates desiccant, aut lixum, aut assum, aut in sartagine frictum miscetur: ijs uero, quæ crassa in pectore, pulmoneq; incedunt, forbile quod uocant: id quod in aqua eo usque lixari debet, dum incaluerit. Eiusdem ipsius naturæ nomine & ad eos, quibus fauces aut ex uociferatione, aut ex humorum acrimonia exasperatæ sunt, assumitur: tum scilicet quòd affectis partibus illinitur, atque cataplasmatibus modo inhaeret: tum quòd substantiæ suæ lenitate eas mitigat, sanatq;. Eadem ratione stomachi, uentris, intestinorum, ac uesicæ medetur asperitatibus. hæc Galenus. Cæterum oleum, quod è uitellis diu in sartagine frixis elicitur, illitum asperitatibus cutaneis mirifice prodest: serpigines, & utiligines emendat: rimas labiorum, manum, sedisq; sanat. Quinetiam ulcerum dolores, & articularum cruciatus mulcet. Prodest & aurium doloribus, atq; ulceribus: item ambustis utiliter illinitur: cerebri contusas membranas putrilagine affectas mirum in modum à partibus sanis segregat, ut nos compluries magno cum honore periculum fecimus. Ex ouis præterea omnibus uolucris generatio euenit, quanquam & aquatilibus ferè omnibus, præterquam phocæ, delphino, & alijs nonnullis. Gignuntur item ex ijs & è terrestribus quædam, ut crocodili, lacertæ, testudines, stelliones, & alia: & è reptilibus omnia, uipera excepta. Verum, ut Hippocrates auctor est libro de natura pueri, seu foetus (nisi fortassis librariorum culpa eo in loco codex sit deprauatus) puilus ex uitello nascitur, infirmaturq;: ex albumine uero aliis sermone posteritatis memoriæ prodidit Aristoteles lib. VI. cap. III. de historia animalium. Illud insuper eam res fecit sententiam, quod experientia sæpe à mulierculis compertum est, quæ suis gallinis oia incubanda subiiciunt. Si quidem exempto quandoq; foetu, die uno, atque duobus ante tempus exclusionis, fractis pulli uisceribus magnam uitellam partem inuenerunt in corpus assumptam. Testudinum oia, quanquam diutius elixantur; nunquam tamen eorum album conerescit, quauis luteum admodum dure scat. Præterea experimento compertum habeo, testudines statim oia non edere cum testa obducuntur, quemadmodum uolucres, sed postquam omnia, quæ in corpore fuerint, testaceum contraxerint putamen: namq; mihi quandoque contingit dissecuisse testudinem, quæ utero septena gerebat oia, suo putamine obducta, quod & serpentibus euenire quidam existimant. Ouum quod Latini, ὄον, Græci uocant: Arabes, Naid, Beid, seu Baid: Itali, Vouo: Germani, Ein, & Ey: Hispanis, Hueuo, & ouo: Gallis, Oeuf.

Ouorum partes, & coctura uaria.

Ouorum uires ex Gal.

Oleum ex ouorum luteis

Animalia ex ouis orta.

Oua testudinum.

Nomina.



## Cicadæ.

## Cap. XLV.

CICADÆ, quæ inaffatæ manduntur, uesicæ doloribus profunt.




Cicadarû cõ  
sideratio.

Alberti lap-  
sus.

Cicada rû ui-  
res ex Gâl.

Nomina.

CICADÆ passim in Italia cognoscuntur, atq; adco inibi uulgaris notitiæ sunt, ut sæpe æstate assiduo canu-  
messores, agricolis, ac uiatores in campestribus obtundant. Ceterum, quemadmodum tradidit Aristoteles libro v.  
cap. xxx. de historia animalium, & Plinius lib. xi. cap. xxvi. qui certè ea omnia Aristoteli accepta referre pos-  
test, Cicadarum duo sunt genera: aliæ enim minores, quæ primæ prodeunt, & nouissimæ pereunt. Aliæ maiores, quæ  
canunt, eademq; nouissimæ prodeunt, & primæ intereunt. Sunt quæ canunt præcinctu diuiduæ, siue minores, siue  
maiores sunt: quæ autem non canunt, indiuiduæ sunt. Pariunt in aruis cessantibus, excauantes fœturæ locum asserio-  
tate præcuncta, quam parte habent posteriore, quemadmodum & bruci. Quinetiam in arundinibus, quo adminiculo  
uites eriguntur, nidum fœturæ excauant. Proueniunt largè copia inbrium. Crescit primò in terra uermiculus, deinde  
de sit ex eo, quæ tettigometra uocatur parentis nomine, quo tempore gustu suauissimæ sunt, antequàm cortex rumpi-  
patur. Postmodum circa solstitia noctu exeunt, statimq; rupto cortice prodeunt cicadæ ex matrice illa cicada, quam  
modò tettigometram dixi. Mares canunt in utroq; genere, fœminæ uerò silent. Vnum hoc animal ex ijs, quæ uiuant,  
siue ore est. Pro eo quiddam aculeatum linguis simile habent, & hoc in pectore, quo rorem lambunt. Pectus ipsius  
fistulosum, unde illis redditur cantus. Oleas maximè amant, ut minus umbrosas, quanquam & cæteras non asperna-  
tur arbores: proinde ubi arbores desint, nasci non possunt. Loca præterea frigidiora oderunt: quamobrem in um-  
brosis nemoribus esse nequeunt, nec in frigidis etiãnum regionibus. Quo factum est, ut crediderit Albertus cognos-  
mento magius, gryllos, qui noctu strident, cicadas esse: quippe quòd in Germania, qua fuit oriundus, frigidissima res-  
gione ad articum spectante, tametsi frequentes habeantur grylli estate in campestribus, hyeme uerò ad hypocaustorum  
fornaces plerumq; stabulantes; cicadæ tamen desunt. Parthi Cicadis uescuntur, quemadmodum & gentes ad orientem  
tem. Idcirco mirum non est, quòd dixerit Aristoteles, eas esse gustu suauissimas, antequàm tettigometræ rumpatur  
cortex. Cicadarum uires descripsit Galenus libro xi. simplicium medicamentorum, sic inueniens. Sed & cicadis  
siccis quidam utuntur ad colicos affectus, cum paribus numero piperis granis, dantq; aut tres, aut quinque, aut sex  
ptem, per intermissionem uidelicet, & ipsos etiam paroxysmos. Porro alij assas edendas offerunt, quibus afflicta ues-  
fica est. Τέτλγες Grecis, Cicadæ Latinis dicuntur: Italis, Cicale: Hispanis, Ciguattregas: Gallis, Sigale.





## Locustæ.

## Cap. XLVI.

LOCUSTÆ odoris suffitu vrinæ difficultates adiuuant, præsertim quæ scēminas malè habent. earum carnes nullo sunt in usu. Est & quoddam genus locustæ, quæ asiracos, aut onos dicitur, sine pennis, prælongis cruribus. Exiccata autem si ex uino bibatur, contra scorpionis morsus magnopere proderit. Hac abunde uescuntur Aphri, qui Leptin incolunt.

Locustarum  
confid.

LOCUSTÆ omnibus notæ, uaria pro morum, & locorum diuersitate sortiuntur nomina. Verùm herbis, & segetibus infestissime, quòd sæpius quibusdam in regionibus paucis admodum diebus uniuersa terræ germina absu-  
mant. Harum, quemadmodum tradidit Aristoteles libro V. cap. XXVII. de historia animalium, qui mares sunt, scē-  
minis magnitudine cedunt. Pariunt in terra fixo cauliculo, quo mares uacant: ac uniuersæ, & loco eodem scetum de-  
ponunt, ita ut quasi sauis esse uideatur. Hinc uermiculi speciem oui gerentes oriuntur, qui terra quadam præterui-  
tæ tanquam membranula ambiuntur: qua dissecta emergunt locustæ, ac euolant. Tam mollis scetura hæc est, ut ad ta-  
ctum leuissimum dilabatur, & pereat. Pariunt exitu ueris, & statim à partu moriuntur, uermiculis circa collum in-  
nascentibus tempore partus, qui eas strangulent. Mares quoq; eodem tempore oberunt. Locis montanis, aut tenuibus  
locustæ non sunt, sed planis, rimosisq; pariunt enim in rimis sua oua. Transeunt Locustæ immensa maria, immen-  
sosq; tractus permeant (ut Plinius inquit) diraq; mēsisbus contegunt nube, multa cōtactu adurentes, omnia uerò mora-  
su erodentes. Italiam ex Aphrica maxime coorte infestant, tanta sanè multitudine, ut solem obumbrent sollicitè su-  
spectantibus populis, ne sistentes suas operiant terras. quòd non modò uniuersas cū segetes, tum herbas deuorēt ad  
radicem usque; sed & radices ipsas regerminare prohibeant. Huius rei testimonio fuisse inaudita Locustarum ag-  
mina, quæ nostro tempore uolente anno domini M. D. XLII. ex paludibus Mæotidibus profectæ, nō solū uniuersa  
sam Pannoniam, maximamq; Germanie partem; sed totam etiam Italiam occuparunt, non sine magna omnium ē ter-  
ra nascentium perniciē: siquidem omnem segetem, omnemq; uiuentem herbam radicitus deuorarunt. Hæ Parthis  
in cibo grate. Quamobrem admirandum non est, si sacris literis mandatū sit, ut Leuitici XI. capite legitur, à Mose  
probas esse in cibis. Nec mirum etiam, diuinum Ioannem Baptistam ijs et syluestri uelle uictitasse in deserto: tametsi  
non desint interpretes, qui uelint pro locustis quasdam herbarum radices intelligi: alij uerò nonnullas arborū sum-  
mitates. At mehercule in horum sententiam deuenire nunquam potui: quin potius certò crediderim, ipsū nempe le-  
gis Moisaicæ sectatorem acerrimum, hisce Locustis animalibus uictitasse, quemadmodum etiam sentit diuus Augusti-  
nus, exponens diuī Pauli epist. ad Romanos. In Cyrenaica regione (ut Plinius est auctor) lex est ter anno debel-  
landi Locustas, primò oua obterendo, deinde scetum, postremò adultas, desertoris pœna in eum, qui cessauerit. Et in  
Lemno insula certa mensura præfinita est, quam singuli enecatarum ad magistratus referant. Necare & in Syria mi-  
litari imperio coguntur: tot orbis partibus uagatur id malum. In India ternū pedum longitudinis esse traduntur,  
adeò ut scēminarum crura serrarum usum præbeant, cū inaruerint. Earum uomen Græcum ἀρίδες: Latinum,  
Locustæ: Italicum item Locuste: Hispanicum, Lagostas de tierra, & Gafanhotes grandes: Gallicum, Locuste.

Locustæ in ci-  
bis.

Nomina.

## Osisfragus.

## Cap. XLVII.

VENTER eius auis, quam Latini osisfragum ap-  
pellant, particulatim potus, calculos cum lotio pelleret  
proditur.

VARIA admodum est inter scriptores Osisfragi historia. Siquidem Aristoteli uolucris est aquila maior, colore cinereo, al-  
bicante. Probè hæc scetificat, & uiuit. Pia, & benigna est: non  
enim suos tantum nutrit pullos; sed & aquilæ. Cū autē illæ  
suos ē nido eiecerit, anteaquam adolescāt, quòd inter se cibi auis-  
ditate dimicēt, hæc recipit eos, & educat. Parum Osisfragus ocu-  
lis ualet: nubecula enim oculos habet lesos. At Plinio lib. X.  
cap. III. Osisfragus in aquilarum genere annumeratur, isq; ab  
eodem proditur ex baliaeto, hoc est, aquila marina natus. Mari-  
nam hanc suum genus non habere, sed ex diuerso aquilarum coi-  
tu nasci, idem auctor est. Alberto præterea Osisfragus ea uide-  
tur auis, quam idem lib. XXIII. Arabica uoce appellat Kirij,  
cū sic inquit. Kirij auis est præda uictitans bone pullificationis,  
& diligenter pullos nutriendi non solū suos, sed et ab aquila ab-  
iectos tædio nutriendi. hæc ille. Qui uel clarius meminit Osisfra-  
gi inter aquilarum genera, ubi ita scribit. Quintum autem aquilæ  
genus est paruulum ualde, & à quibusdam uocatur frangens  
os, eo quòd quando carnes comedit, ossa in altum defert, & su-  
per lapidem cadere permittit, ut ex ijs confractis medullam su-  
gat. hæcenus Albertus. Verū ijs ab Aristotele dissentire ma-  
nifestè cognoscitur, quòd Aristoteli Osisfragus nō sit genus aquilæ  
minimum,

Osisfragi cō-  
sideratio.

Alberti, &  
Pli. lapsus.





la minimum, sed auis maior aquilis, dempta Germana. Quo fit, ut in hac historia Albertum hallucinatum esse credam, quemadmodum & Plinium in eadem deceptum puto. Nauq; marina illa clarissima aquila uocata (ut Aristoteles tradidit) oculorum acie maxime pollet, ac pullos adhuc implumes cogit aduersum intueri solem: tum cuius oculi prius lacrymarint, hunc occidit, reliquum educat. Id quod abunde ostendit hac in re Plinium errasse, atq; oscitanter fortasse Aristotelem legisse. quippe cum marinæ aquile pulli acerrimi omnino sint uisus, nullam ij cum Osifraga cognationem habere uidentur, quod hic potius quadantenus cecitate labore. Ceterum, quod nobis esset Alberti codex librorum culpa deprauatus, in quo osifraga pro osina legebatur, iamdudum credidimus osifragum apud Albertum eam auiem esse, quæ in maritimis nostris Senensibus circa Herculis portum, & Orbetelli stagnum frequens uisitur, cygna maior, rostro longo, inferiori parte sacculi instar ampli. Hæc autem incolis uulgo uocatur Agrotto. Sed cum postea animaduertissem Albertum in hac historia aperte Aristoteli refragari, atq; aliud Alberti exemplar naetus essem, in quo osina, non osifraga, ut uitiōse in alio, scriptum erat, cepi eos acriter accusare librariorum, quorum negligentia in causa fuit, ut in hoc mihi ipsi hæcenus imponerem, secutus deprauatam Alberti lectionem. Auis, quæ Græcis οἰσὶς, Latinis Osifragus nominatur.

Nomina.

## Galerita.

## Cap. XLVIII.

GALERITA auicula est parua, apicem in uertice, pauonis modo, gestans. Hæc assa, & in cibo sumpta, cœliacos adiuuat.



Alaudarum historia.

ALAUDARVM (ut memoria prodidit Aristotiles libro ix. cap. xxv. de historia animalium) duo sunt genera. Alterum terrenum, cristatum, Galerita à crista appellatum. Alterum gregale, nec singulare, more alterius, uerum colore simile: quanquam magnitudine minus, & galero carens. Campestres ambæ sunt aues, uermiculis uti stitantes, deciditibusq; feminibus. Mares suauiter canunt, primæq; sunt aues, quæ æstatem cantu pronunciant. Porro Alaudæ adeo ad aucupes aues expauescunt, ut sæpe, dum sentiunt se persequi, in hominum gremia confugiant, ne rapiantur. Mares in caueis diutius retenti, altero sæpius obsecantur oculo. Quæ auis Græcè κροτάλλος, Latine Galerita, & Alauda uocatur: Arabicè, Hanabroch, seu Kanabroch: Italicè, Lodola: Germanicè, Vundel, lerch: Hispanicè, Cucuyada: Gallicè, Alouette.

Nomina.



HIRVINDO



Hirundo.

Cap. XLIX.


Cap. XLIX.  
 DISSECTIS crescente luna pullis hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in uentre eorum lapillos offendes: è quibus duos, unum colore uarium, alterum purum eximes: ij priusquam terram attigerint, in iuuentæ corio, aut ceruina pelle brachio, aut collo adalligati, comitialibus proderunt, & sæpe prorsus eos recreabunt. Hirundines, uti ficedulæ, in cibo, aciei uisus medicamentum præbent. Tam pullorum, quàm matrum in fictili olla crematarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert: anginae eo commodè perunguntur: uulæ & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsæ, & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuant, qui anginae morbo conflictantur.

HIRUNDINUM tria habentur genera : unum nostra tellus subit : alterum uetustorum ædificiorum muros, Hirundinum  
cauernulas, & montium scopulos expetit : tertium uerò nidificat in altis fluminum ripis. Hæ quotannis (ut Plinius au- historia.  
tor est) ex Aphrica maria transeuntes, appetente uere ad nos aduolant, & martio plerunq; mense nostras ingre-  
diuntur ædes : ibiq; è luto, & quibusdam stramentis sibi construunt nidos, in quibus bis oua pariunt, & bis pullos ex-  
cludunt, tantum humane fidunt benignitati : atq; ubi ultimos educauerint partus, æquinoctij autumnalis tempore in  
suas remigrant regiones. Chelidonium herbam ab his iuuentam tradunt, unde illi nomen est inditum. Hanc suis ob- Chelidonia.  
cecatis pullis deferunt in nidum, hoc tantum medicamento ijs uisum reddentes. Quinetiam experientia compertum  
est, quòd si data opera pullorum hirundinum oculi acu perforentur, sanantur paucis diebus, allata à matre chelidonia-  
berba. Hinc igitur edocti medici ad oculorum claritatem chelidonium adhibent. Hirundinum uerò sterces oppositum  
prestat : excæcat enim, si calidum in oculos decingat. Quod etiam sacra testantur monumenta, in quibus, Tobiam hoc  
stercore excæcatum fuisse, legitur. Ceterum uires Hirundinum recensuit Galenus lib. xi. de simpl. medic. facul- Hirundinum  
tibus, sic inquires. Hirundinibus quoq; usq; sunt multi, comburentes uidelicet, & cineri mel admiscentes, ac deinde uires ex Gal.  
sonanchicos inungentes, & in totū omnes quicunque in faucibus atq; columella cum tumoribus consistunt affectus.  
Utuntur & ad acuendum uisum hoc cinere nonnulli. Alij uerò eas arefactas drachmæ pondere bibendas exhibent.  
Auis Χειρὸν Græcis, Hirundo Latinis appellatur : Arabibus, Thartaf, Chatas, aut Chataf : Italis, Rondine :  
Germanis, Schuualb : Hispanis, Golandrina, & Andorinha : Gallis, Arondelles. Nomina.

Ebur.

Cap. L.

EBORIS scobe illito, paronychia sanantur. Vim adstringendi ebur obtinet.



OMNIBVS sanè perspicuum est, nil aliud Ebur esse, quàm Elephantinorum dentium materies, multis apta operibus. Elephantorum meminit Plinius longa admodum història initio libri octavi pluribus capitibus: tametsi nò omnia, quæ scribit, probanda putauerim. Elephas fert Africa ultra Syrticas solitudines, item Mauritania, & Aethiopia: sed maximos India mittit. Ille quanquam magnitudine ceteris excedant quadrupeda, Aristotelis tamen testimonio adeò cinguntur, ut omnium ferarum mitissimi, & placidissimi euadant: quippe qui per multa officia & erudiantur, & intelligant. Corio Elephantum integuntur bubalino simili, ut is uerum præbuit exemplum, quem Romanus uidit Leonis decani Pont. Max. æuo, essi rarissimis horreat pilis. Caput eis magnum, colum breue, aures uerò antiquè duum palmorum amplitudine: nasum, quem peculiariter in Elephanto promuscidem appellat, longissimum habent, concauum, grandis tube instar: hic infra anteriores dentes ad terram ferme promittitur, quo pro inanibus utuntur. Os gerunt pectori proximum, ut quod cum snillo ineat similitudinem: è cuius superna parte dentes duo prominent præcipue magnitudinis (quales plurimi uenales conspiciuntur Venetiis in publico foro uulgò Marceria dicto, ac in

Elephātorum  
hittoria.



Error quorū-  
dam.

Plinij lapsus.

Fuchij er-  
ror.

Eborisuires.

Nomina.

ac in alijs Italiae emporijs) qui proni cuspide deorsum uergunt. Pedibus nituntur rotundis, disci instar, latitudine duum, triumue palmorum, quos callosa materia obducit: ungulis quinque circū, rotundis, mediocrium concharum magnitudine. Crura ijs magna, ac fortia, neque (ut quidam imperiti existimant) uno tantum osse constant indurata, sed genua flectunt, utpote & cetera quadrupeda. Quamobrem Elephanti (ut refert Aloisius Cadamustus, qui classe in Aethiopia, & ad Calicut nauigauit) ut eos, qui deferri uolunt, suscipiant, genua submitunt, seseq; erigunt deinde. Elephantis cauda bubali, trium palmorum circiter longitudine, rarissimis setis referta. Quocirca hanc facile se tueri possent à muscarum iniuria, nisi aliam illis in dustriam natura tribuisset, qua ab ijs se uindicerent: quare doquidem ferientibus muscis, cutim, quam cancellatam obtinent, contrahunt. Quo fit, ut arctatis in rugas repente cancellis, muscas comprehensas enecent. Hominihus non nisi lacesti nocent. Veruntamen irritati homines prouocant seide comprehensos, adeo in subline iaciunt, ut priusquam in terram decidunt, suffocentur, & pereant. Ad hæc mulus hominum tantæ pernicietatis inuenitur, quem mox Elephas non comprehendat, etiam non currens, sed gradatim incedens. Id efficit uasta animalis moles: quandoquidem sui gressus longitudine, humanam omnem pernicietatem exsuperat. Viditant arborum tam frondibus, quam fructibus: neq; ulla tam ingens est arbor, quam ijs prouocantem non prosternant, frangant, ac dilacerent. Adolescunt ad sexdecim palmorum altitudinem. quapropter qui eos conscendere non assueuerunt, non secus fastidio afficiuntur, ac illi, qui nauibus non assueti maria sulcant. Effrenes præterea adeo natura Elephantis sunt, ut nullis habenis cohiberi possint, quo fit, ut liberi incedere dimittantur: uerum cum maxime gubernantibus suarum regionum hominibus pareant, & eorum sermonem intelligant, idcirco uerbis facile reguntur. Adeo conspectum ignem expauescunt, ut eo territi à fuga reuocari non queant. Qua re ab ijs non cognita, qui eius Elephantis curam gerebant Romæ, in cuius dorso oppidulum construxerant, eo die, quo Iulianus Medices Pontificis Max. frater uxorem à Gallia duxit, in magno sane discrimine uersati sunt: nam ubi bellica tormenta ignem eructantia conspexisset, magnūq; ac terrificum sonum sensisset, tantæ se fugæ dedit, ut nunquā cohiberi uoluerit, donec uicini cum conclusis in oppidulo hominibus in Tyberim sese commiserit. Elephantis nō coeant, neque gignunt, nisi annum uigessimū agant, ut auctor est Aristoteles lib. VI. cap. XXVII. de historia animalium. Quia in re Plinij error manifestus deprehenditur: quippe qui marem quinquennem, fœminam decennem generare memorie prodiderit. Elephantis nulla nouere adulteria: nam uir tantum fœminæ coitu utuntur, eamq; cum uterum gerentem uiderint, non amplius tangunt. Quantum uero temporis unaqueq; fœmina utero gerat, haudquaquam sciri potest: quod Elephanti pudore nunquam nisi in abdito coeant. Idcirco alijs eis annum & sex menses statuunt, alij biennium, alij denique triennium. Pariunt fœminæ cum dolore, quemadmodum & mulieres. Pullum editum ore lambunt, qui statim cum nutritus est, cernit, & ambulat. Viuere Elephantos (ut inquit Aristoteles) tradunt quidam annos ducentos: sed flores ætate circa sexagesimum, uel septuagesimum narrant. Idem hyemis, ac frigoris impatientes sunt. Gaudent amari maximè, circaq; fluuios uagantur, quos intrant libenter bubalorum more. Ceterum Elephantis ingenio, & intellectu hominibus proximi sunt: siquidem patrios sermones intelligunt, summam præstant obedientiam, prudentiā seruauant, & religionem præ se ferunt: solem namq; ac lunam uenerantur. Cuius rei auctores sunt Mauritanii, in quorum regionibus Elephantis innumeri conspiciuntur: qui gregatim noua nitescente luna ad amnes descendunt, ibiq; lauantur: mox purificati genibus flexis salutant fidus, & in syluas reuertuntur. Sunt, qui tradant tanta intellectus sagacitate Elephantos pollere, ut maria transitori ad alias regiones, non antea naues conscendere uoluerint, quam ijs qui eos ducebant, iureiurando de reditu promiserint. In syluas ituri gregatim ferè semper ingrediuntur, quorum agmen ducit natu maximus: cogit uero ætate illi proximus. Produunt Elephantos à uenatoribus circumuentos, cum seiant prædam solum in dentibus suis ab illis expeti, dentibus uehementer impingentes arboribus eos sibi euellere, prædāq; redimere. Quod facile crediderim uanum, ac fabulosum esse: quemadmodum esse falsum superius ostendimus, quod si fiber uiso uenatore, sibi ipsi testes amputet. Elephantis omnes natura indomiti, syluestresq; sunt: mitescunt autem arte, ut pleraque alia fera animalia. Item si parui, & ætate tenelli educantur: quanquam Plinius scribit, natu grandes domari fame, & uerberibus: præsertim si alijs domitis, qui tumultuantem coerceant, admoueantur. Porro non deest in Elephantium genere, qui naturæ feritate nunquam domari possint, quales in Senega (ut in suis navigationibus scriptum reliquit Aloisius Cadamustus) Aethiopiæ regno reperiuntur. Elephantium dentes admirabilis magnitudinis uenales spectari possunt in compluribus Italiae urbibus, ueluti Romæ, Venetijs, Mediolani, & Neapoli: è quibus non solum innumeri pectines parantur ad explicandos capillos, sed etiam alia plura instrumenta, quæ ad humanum usum accommodantur. Hinc itaque fit, ut nesciam ego, qua ratione ductus Fuchsius, uir aliqui rerum peritissimus, scripserit in libro de compositione medicamentorum, quem nuper auctum edidit, Ebur nullibi penè uerum reperiri: atque illud, quod uulgò eius uice in officinis prostat, marinorum piscium dentes esse. quod in hoc erret euidentius est, quam ut à nobis ostendatur. Præstat Ebur ad albas mulierum fluxiones, si tamen in tenuissimum puluerem, lapide porphyreo redigatur, propineturq; ex lactuca seminis cremore, aqua, in qua chalybs extinctus fuerit, prius macerato semine. Quod Græcis ἐλέφανς, Latinis Ebur nominatur: Italis, Auorio: Germanis, Helfsantheyn: Hispanis, Diente de elefante, aut Marfil: Gallis, l'Yuoire.

## Suillus Talus.

## Cap. LI.

S u i l l u s talus comburitur, dum è nigro albescat: qui tritus, & potus inflationibus coli, longisque torminibus medetur.





**TALVS** in animalibus os illud ultimum pedis est, quod tibiæ cruris annectitur. Id Græcis ἀσπύγας, nulla  
 gō autem os clauiculae appellatur, de quo non operæpretium est, ut plura dicamus. Nomina subijciam. Græcum  
 est ἀσπύγας ὄσς, Latinum Talus Suillus: Italicum, Talone del porco: Hispanicum, Tornizuelo de pie de puer-  
 co: Gallicum, Talon de porceau. Nomina.

## Cervinum cornu.

## Cap. LII.

**CERVINI** cornu cinis elotus, binis ligulis epotus, prodest dysentericis, excreantibus sangui-  
 nem, celiacis, regio morbo, & vesicæ doloribus cum tragacantha: foeminis fluxione uulvæ laboran-  
 tibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerui cornu contusum, crudo fistili, luto circumlito, &  
 in furnum indito, uritur donec albescat. Id cadmiæ modo elotum, ulceribus oculorum, & defluxio-  
 nibus salutare est, infriktum dentes expurgat. Crudi cornu suffiti nidore serpentes fugantur, seruefa-  
 ctum in aceto, si eo gingivæ colluantur, maxillarum à dentitione dolorem adimit.



**CERVI** animalia sunt notissima. Sed quoniam eorum natura non omnibus cognita est, ut candido cuiq; lectori  
 fiat satis, ea de Ceruis hic referam, quæ Aristoteles tum VI. & IX. de historia animalium libris, tum IIII. de parti-  
 bus eorundem posteritatis memoriæ prodidit. Cervi itaque sylvestrium animalium genere constant, magnitudine  
 asinorum, cursu uelocissimi, & ingentibus armati cornibus. Ii cum turgente iam uenere coitum appetunt, adeo ra-  
 bie libidinis scuiunt, ut insaniant, & maximo cum strepitu, & clamore uagentur in syluis. quo fit, ut conuales, &  
 montium cauitates, eorum boatu resonent. Tanto impetu, tantaq; rabie mares feruntur in coitum, ut sæpe inter coe-  
 undum formicas declinent, atque prosternant in terram. Cum autem maris genitale utpote durum, sustinere non pos-  
 sint, foeminae euntes, & currentes coeunt, & concipiunt. Mares non in eadem inuorantur, sed mutant, & hinc  
 eorum modo, breui interposito tempore aliam, atq; aliam supergrediuntur. Si forte fortuna in unam tantum foeminam  
 concurrant plures, imis cornuum adminiculis statim supra frõtem enatis, acriter inter se pugnant ad mortem usque.  
 Cum mares impleuerint foeminas, separantur per se ipsi, & propter libidinis graueolentiam quisque solitarius sero-  
 bes

Cervorum hi-  
 storia.



bes fedit. Fæteut ut hirci : facies quoq; eorum nigrescit aspergine, ut hircorum . Degunt ita quousq; imber accedat tum pascua repetunt . Hæc ideo ceruo accidunt , quia salax animal suapte natura est , atque etiam quia pingui abundat : pinguescunt enim æstate supra modum . Quamobrem nec currere quidem possunt : sed secundo aut tertio cursu capiuntur ab ijs, qui pedibus insectantur . Quo fit , ut ubi se præpingues sensere , latebras quærant , facutes incommo- dum pondus . Coitus est ab arcturo, uenise augusto, & septembri . Implentur ceruæ paucis diebus, & ab eodem multæ . Vtero ferunt octo menses. Pariunt magna ex parte unum : sed nonnullis etiam geminos ceruam peperisse per- spectum est . Ferarum quadrupedum Cerua maximè prudentia præstare uidetur , tum quia circa semitas pariat , quod scilicet beluæ rapaces propter homines minus accedunt : tum etiam quia cum peperit , inuolucrum primum exedit , quod ad multa ( ut nonnulli asserunt ) in medicamentis expetatur . Redeunt mox ad prole, deuorata à partu seseli herba . Anni culis maribus nondum cornua nascuntur, nisi quoad indicij gratia sit initium quoddam præuberans , quod breue, birtumq; est . Bimis cornua primum oriuntur simplicia, & recta ad subularum similitudinem : quamobrem Subulones per id temporis eos uocant . Trimis bifida exeunt . Quadrimis trifida, atque deinceps ad hunc modum ( ut Aristoteles inquit ) procedit numerus usq; ad annum sextum . Ab hoc similia semper prodeunt , ita ne sit dignoscere ætatem ramorum inuero . Verum in Italia ( sit tamen cum Aristotelis uenia dictum ) usque ad undenarium numerum ramificant . quod & Albertus testatur se uidisse in Germania , quemadmodum & nos uidisse fatemur . Addam præ- terea, quod certò scimus, Gulielmum Bauariæ ducem inter res suas pretiosas habuisse bina cerui cornua, quorum singulus unum & uiginti ramos fundebat . Hæc admiranda cornua postea dono , utpote raro ac singulari, data sunt runt Sereuissimæ Pannoniorum Regine Mariæ, Caroli v. Imperatoris, & Ferdinandi Romanorum Regis forori .

Vanum est credere Ceruorum ætatis annos dignosci posse ramorum numero, quod singulis annis unum superaddunt : quippe cum longeuū admodum sint, si quotannis ramorum numerus augetur, profecto ijs, qui ultra cētum annos ui- xisse narrant auctores, cornua quercubus, & pinis maiora fuissent . Ceterum ( ut Aristoteles scribit ) duplici indicio senes cognoscimus, tum quod dentes aut nullos, aut paucos habeant : tum quod adminiculis careant, qui imis cornu- bus prominent ante frontem . Nam ijs in pugna utuntur iuniores, sed in senibus non renascuntur, cum prælijs omni- no cesserint . Cerui ( ut etiam Theophrastus inquit libro, & capite primo de historia plantarum ) quotannis cornua amittunt : ideo sub ipsa die quam maximè inuia petunt . Latent amissis uelut inermes, sed & ipsi bono suo inuidentes . Fit hoc mense aprili, statuto tempore . Idq; opacis faciunt locis, ut muscarum tædio uacuet . Pascuntur per id tem- pus noctu quasi uerecundantes, donec recipiant cornua . Decidua amittunt difficilibus, & inaccessis locis, & que inueniri nequeant , unde illud prouerbium ortum . Qua cerui amittunt cornua . Quasi enim sua amiserint arma, cer- uent ne inermes reperiantur . Cornu sinistrum compertum esse ( inquit Aristoteles ) à nemine adhuc fertur : occidunt enim id tanquam quodam medicamento præditum : etsi Plinius, & Albertus oculi dextrum memoriæ prodiderunt . sed a phalangio demorsū, uel à quouis generis eiusdem, caneros edunt : quod idem homini etiam prodesse putatur : sed uel carent fastidio . Cerui sibilo, & cantu uenantium, pastorumq; fistulis capiuntur : nilcentur enim alliciunturque es- uoluptate, ita ut alter uenantium cantet palam, aut sibilet, alter clam feriat à tergo, ubi socius iam tempus esse si- gnificarit . Nanque animal simplex ceruus est, & omnium rerum miraculo stupens, intantum ut equo, aut bucula accedente proprius hominem iuxta uenantem non cernat, aut si cernat, arcum ipsum sagittasq; miretur . Si ceruus erectas auriculas teneat, acerrime sentit, nec latere insidiæ possunt, sin demissas, facile interimitur . Maris ceruus gregatim natantes porrecto ordine, & capita imponentes præcedentium clunibus, uicibusq; ad terga redeuntibus . Hoc maximè notatur à Cilicia Cyprum traicientibus . Nec uident terras, sed in odore earum uatant . Ceruorum fer- minæ cornua non habent : nec maribus nascuntur, si cum per ætatem nondum cornua gerunt, castrantur : sed si cer- uigeris testes exciduntur, non decidunt cornua, & magnitudine eadem seruantur . Ceruas tamen cornigeras, non sine naturæ miraculo, quandoq; inuentas esse compertum habeo . Huius autem miraculi fidem facere possunt illa cer- uua ceruæ, quæ sunt Augustæ Vindelicorum apud Antonium Fuggerum nobilissimum diuitem, in quorum singulis cer- uami conspiciuntur . Atq; id ipsum confirmari potest non dissimilibus ceruæ cornibus, quæ argento laborato orna- ta conseruat Dux ille Banariæ, de quo à nobis paulò antè facta est mentio . Vita Cerui ( ut Plinius memoriæ pro- dit lib. viii. cap. xxxii. ) in confesso longa : quandoquidem post cētum annos quidam capti sint cum torquibus aureis, quos Alexander magnus addiderat, ad optatis iam cute in magna obesitate . Ceterum quod uita tam longa sit cerui, quanta eos esse ferunt, non uidetur approbasse Aristoteles libro vi. de historia animalium, ubi sic inquit . Vita esse quam longa hoc animal fertur . Sed nihil certi ex ijs, quæ narrantur, uidemus : nec gestatio, aut incre- mentum hinuli ita euenit, quasi uita esset prælonga . hæc Aristoteles . Qui re uera nihil certi nancisci potuit ex his, qui centum annos post Alexandrum capti sunt cum torquibus aureis . Nec etiānum ex Cæsaris Augusti cerua, quæ similiter innumeris elapsis annis post eius imperium capta, nunquam iugulari potuit, prohibente torque argenteo te- poris diuturnitate cute quasi contecto, in quo scripta legebantur uerba hæc . Noli me tangere, quia Cæsaris sum .

Monte Asie Elapbo nomine apud Arginusam, quo loco Alcibiades mortem obiit, ceruæ omnes scissa aure sunt, quæ nota uel alibi si loca mutauerint, dignoscuntur . Mirum quippe est dixisse Aristotelem lib. viii. cap. xxxiii. de historia animalium, Aphricam nec ceruos, nec apros gignere . Cui etiam subscribit Plinius lib. viii. cap. xxxiii. Cum tamen palam omnibus sit, & aprorum, & ceruorum greges in Apbrica haberi . Nisi forsitan posteriori ævo de- liunde eo fuerint illati . Dictamnum herbam extrahendis sagittis ( ut Plinius auctor est lib. viii. cap. xxxvii. ) cerui monstrauere percussu eo telo, pastuq; eius herba eiecto . Quod tamen Dioscorides capris attribuit telo in Cer- uis uulneratis . Cerui manifesto fel in iecore non habent, quemadmodum equi, asini, muli, cameli, dæmæ : & in natatiliū genere delphinus, & phoca : sed id in uenulis continent, quæ per intestina sparguntur : quo fit, ut am- rum uiscera non modo in cibis minimè recipiantur, sed nec à canibus quidem edantur, nisi præpinguia sint : am- rescunt

Vulgaris opi-  
nio uana .

Aristotel. &  
Plinii lapsus .



rescunt enim bile, qua suffunduntur, At ceruis Achainis cognomine, fel contineri in cauda creditur, auctore Aristotele. Est quod ibi contineri aiunt, colore quidem simile felli, sed non ita ut fel humidum, leni simile parte interiore. Hoc degustantibus atrocissimum est uenenum, adeo ut breui temporis spatio hominem e medio tollat. Vermes ceruici omnes continent in capite uiuos, qui nasci solent sub lingua in concavo circiter uertebam, qua ceruici innestitur caput, magnitudine haud minores ijs, quos maximos carnes putres ediderint. Gigni uniuersi, atq; contigui solent numero adeo circiter uiginti. Ceruinus sanguis (ut Rasis inquit libro sexaginta animalibus dicato) clysteribus infusus intestinorum ulcera sanat, & diurnas alui fluxiones cohibet: ex uino uero sumptus, uenenatis sagittis resistit. Eius cerebrum ueruorum, & compaginum collectiones mundat. Cornu ad candorem usq; exustum, ex melle haustum, alui tinea pellit. Iuuenum ceruorum tenerima cornua, quae adhuc lanuginosa cuticula operiuntur (auctore Scribonio Largo) in taleolis concisa, & nouo fictili indita, ac inde operculo argilla circumlito, in clibanum imposita, donec adeo arescant, ut in puluerem facile conteri possint, additis pipere, & myrrha, coli cruciatibus mirifice medentur. Os praeterea, quod in ceruorum corde reperitur (taueisi Vesalius uir aliqui clarissimus libro, quem de humana fabrica edidit, nullum inibi os reperiri falso contendat) omnibus cordis affectibus conseruit. Quin & contra omnia uenena mirifice praestat, antidotisq; admiscetur, quae pestilentiae aduersantur. Sed cauendum est, ne huius locoplestarij bubulau tracheam arteriam accipiant in compositionibus, ut facere consueuerunt. Quod Graeci *ἐναργὸν ράπας*, id Latini Ceruinum cornu uocant: Itali, il Corno del ceruo: Germani, Hirtz horn: Hispani, Cucræ no de ceruo, & punta de ceruo: Galli, Corne de cerf.

Vermes in capite cerui.

Cervi usus in medicina.

Nomina.

## Erucae.

## Cap. LIII.

ERUCIS, quae in oleribus gignuntur, cum oleo peruncti, a uenenatis bestiis feriri negantur.

ERUCAE, quibus olitores maxime iniunguntur, animalcula sunt uulgaris notitiae, sed hortis admodum noxia, quod quandoq; adeo numerose proueniant, ut inuitis olitoribus olera cuncta una tantum deuorent nocte. Gignuntur (ut memoriae prodidit Aristoteles libro v. cap. xix. de historia animalium) ex uirentibus herbarum folijs, maximeq; ex brassica. Primum minus quid milio consistit in folio: mox uermiculi inde contrahuntur, & augentur: tum intra triduum eruculae afformantur. Haec tempore senescentes motu cessant, suaq; forma immutantur, durioriq; cortice integuntur, cuius color auro fulget: ob idq; (ut Aristoteles prodit, & post ipsum Theophrastus lib. v. de causis plantarum) appellantur tantisper chrysalides, quasi aureliae dixeris. Dum eo putamine integuntur, ad tactum tantum mobiles sunt: & palpitantes, meatibus araneosis obductae: non os, non aliud ex membris, quod conspicuum sit, possident. Longo post tempore putamine obrupto, euolant inde animalia pennigera, quos papiliones uocamus. Itaque primum dum Erucae sunt, cibo aluntur, atq; excrementum emittunt: at uero cum in aurelias transferunt, nihil uel gustant, uel excernunt. Harum, dum adhuc puer essem, ingentem copiam quodam anno peperit Hetruria, adeo ut pueri omnes mirabili quadam ostentatione numerosas in plateis gestarent aurelias, ita aureo nitore fulgentes, ut ex puro auri uersas factas quisque credidisset, nisi deprehensa fuissent palpitantes. Fuit eo anno tanta Erucarum multitudo, ut uni uero ac palpitanti fulgerent auro. Facies eis quasi humana, capite bicorni, corpore infantuli modo fascia obducti: id quod silentio dissimulauit Aristoteles. Haec uerentibus quatenus sese offerunt circa urbium moenia, & adificiorum muros, circa eos praesertim, quibus adiacent horti, ac uiridaria: plerumq; enim in adificiorum cauis capite ad terram uerso reperiuntur appensa. Caterum etsi dixerit Aristoteles, Brucas ex herbarum, oleumq; praesertim folijs ex sese gigni, absque animalis semine; uisuntur tamen hoc uero papiliones ex aurelijs exorti, auersis olerum folijs oua parere subalida, milio minora, ex quibus erucae tandem prodeunt, ut sericino Erucarum generi euenire comperimus. Vnde mihi quidem dubitandum uidetur, an rem hanc diligenter perpenderit, uel exquisitè tractauerit Aristoteles. Quamquam minime negauerim, quin & ex putri quodam humore per se Erucae nasci possint, quemadmodum & mures, angues, uermes, aliaq; complura generantur. Plinius grana illa ex rore fieri putat, soleq; addensari. quod tamen naturae speculatores non ita facile comprobant. Erucis olera non erodi auctor est Plinius, si palo in horto suspensum auxiliari narrant. Sunt etiam qui sanguineis uirgis tagunt ea, quae uolunt his obnoxia esse. haec Plinius. Columella praeterea libro xi. de re rustica circa calcem, necandis prohibendisq; erucis haec in medium protulit. Vbi uero apricis regionibus post pluuias noxia inceserunt animalia, quae a nobis appellantur Erucae, Graece autem *καμπύλαι* nominantur, uel manu colligi debent, uel matutinis temporibus frutices olerum concuti. Sic enim dum adhuc torpent nocturno frigore, si deciderint, non amplius superiorem partem prorumpunt. Id tamen superuacuum est facere, si ante saturationem semina succo herbae sedi macerata sunt: nihil enim sic medicatis nocent erucae. Sed Deacris in eo libro, qui Graece inscribitur *περί ἀγρίων*, affirmat, has ipsas bestiolas enecari, si mulier, quae uermiculos, & ita emori. Sed postrema haec, quae a Columella referuntur, superstitiosis sunt relinquenda. *Καμπύλαι* ita Graece, Latine Erucae uocantur: Arabice, Riapsa: Italice, Bruchi: Germanice, Raup, seu Holtz uurm: Hispanice, Bruchi.

Erucarum historia.

Erucarum generatio.

Remedia contra erucas.

Nomina.



## Cantharides.


## Cap. LIIII.

**E**FRUMENTIS congestæ Cantharides ad recondendum idoneæ sunt, quæ fictili uase non picato conduntur, & raro mundoque linteo obligato ore, & deorsum conuerso suspenduntur super accendi feruentis quàm acerrimi halitum, donec æstu exanimentur: postea lino transfixæ reponuntur. Potentissimæ omnes uariæ, luteis lineis, quas in pennis transuersas habent, promissoque corpore, crassæ, ac blattarum modo perpingues: sed inertes, ac imbecillæ, quæ unius sunt coloris.

## Buprestes, &amp; Pinorum Eruca.

## Cap. LV.

**S**IMILI modo reconduntur buprestes, genera quædam cantharidum, & pinorum erucæ: quæ supra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper intostæ, reponuntur. Vis omnium communis erodere, ulcerare, calorem elicere: qua de causa admiscuntur medicamentis, quæ lepras, ferosque lichenas, & carcinomata sanant. menses ciunt pëssis emollientibus additæ. Aliqui cantharidas antidotis impositas, aquæ subter cutem auxiliari prodiderunt: argumento, quòd urinam moueant. Alij pedes, pedesque contra potarum ueneficia, remedio esse tradiderunt.



Cantharidū  
consideratio.

Buprestes.

Pinorum eru  
cæ.

Error multo  
rum.

**C**ANTHARIDES uulgata sunt animalia, nomine à cantharo, qui Latine scarabeus est, deducto, ac si es dixeris paruos scarabeos. Sunt in Italia frequentissimæ, calidioribus præsertim regionibus, ubi non modò in frumentis inueniuntur; sed in fraxinis quoque stabulantur. Præstant quæ solidæ, recentesque sunt, nam ueterascentes faciliè corripi sentiunt, unde inutiles fiunt in medicamentis. Buprestes autem (ut Plinius inquit lib. xxx. cap. iiii.) non perinde in Italia sunt uulgares, & frequentes; sunt tamen scarabeis similes, quanquam minores. At pinorum erucæ merose sanè habentur in Tridentinis montibus, quòd inibi pinorum perpetuò uiuant syluæ, Ananiensi præsertim tractu, ac Flemarum conuallibus. In extremis arborum ramis, & ijs plerumque, qui in earum cacumine attolluntur, innumerales Eruca rufescentes, ac pilosæ miro artificio nidificant, quibusdā tenuissimis uelleribus innumeris inuolueris contextis. Latent in his hyeme, ita frigoris noxam euitantes. Nidi magnitudo adeò ampla est, ut nonnunquam concluduntur uermiculi millenarium numerum excedant. Inuolueri materies, qua concluduntur, tenuissima serici uelamina maxime emulantur, tenuior tamen est. Hæc sanguinis manationibus amptissima est: quare imposita confestim suorem effudit. Sed de his hætenus. Ceterum sunt medicorum quàm plurimi Mauritanos præcipue sequentes, qui quotiescunque Cantharidas medicamentis miscunt, præcipiunt capita, alas, & pedes abijci, tanquàm partes cæteris nocentiores. Quod tamen Galeni sententiæ omnino repugnat. Quippe qui lib. xi. simp. med. integras cantharidas medicamentis addendas præcipit, quemadmodum & ijs integris ipse perpetuò fuerat usus. Sed si responderint ij, illud nec eorum esse institutum, nec Mauritanorum, sed Hippocratis lib. iiii. de uictus ratione in morbis acutis, audiant quæso quibus uerbis eodem loco Hippocratis sententiam declarat Galenus, cum inquit. Quidam dictionis huius mentem haud quam intelligens audax medicus, prædictas partes à cantharidibus abiecit, deditque hydri: cui cum à primo die abscessus in sura comparuisset, post tres alios dies sectus est, effusaque copiosa aqua, curatus esse uisus est: quòd pars tumoris præter naturam plurima statim ad moderationem redacta sit, ueruntamen non multis post diebus obiit. Quam ob causam medico quidam crimen ingessit, perperam data esse cantharidum corpora inquiens. Nempe propinatis ablatis corporibus, tum caput, tum pedes, tum alas, idque esse quod in dictione enunciaretur. Quare non cunctatus audax ille medicus, hydri alteri ita propinauit: moxque factò similiter in femore abscessu, sectoque, multis post diebus hominem mori contigit. quanquam urinarum prouocatorio medicamento ex cantharidibus confecto, quidam citra bibentium incommodum usi sint. hæc Galenus. Ex quibus facile cognoscitur, Arabes non rectè Hippocratem intellexisse. Quamobrem dicendum esse existimauerim, quòd ablatis cantharidum extremitatibus, exuantur antidoto, quo natura



natura sunt prædite in proprij ueneni remedium. Quod cum accurate perpendisset Galenus, eas integras suis medicamentis semper adiniscuit; ut facile attestantur quæ libro XI. de simplicium medicamentorum facultatibus memorie prodidit, sic inquit. Veruntamen sufficientem habemus de cantharidibus experientiam, quod in ungues pso-  
 rodes cum idoneis ceratis, aut emplastris impostæ, sic illos educunt, ut toti cadant. Miscuimus eas etiam facultatibus pso-  
 ris, et lepris congruentibus, neque non quibusdam septis, atq; interim etiam ijs quæ clauos, quos uocant, eiciunt. Porro præceptorum meorum quidam earum paulû quiddam in medicamenta urinam cientia iniiciebat. At quidam solas alas, et pedes iniiciunt, quæ aiunt esse alexiteria ijs, qui corpora ipsorum bibissent. Alij contra. At uos totas indimus. Cæterum aptiores sunt ad ea, quæ expertum me dixi, eæ cantharidum, quæ inuenta in frumento, lutea transuersim in alis cingula obtinent, potissimum si iniiciantur in uas fictile nouum, deinde ori uasis linteum obductû sit rarum, et uas ita teneas inuersum, ut linteum, quod cætharidibus subest, uaporem ab aceto sursum elatum excipiat, donec emoriantur ipsæ cantharides. Et de buprestibus agens, ita subdit. Sic Buprestes quoq; reponere expedit. Sunt autem et ipsæ animalis quoddam genus cætharidibus tum specie, tum uiribus adsimile. Mox de pinorum erucis: quin et eruce (inquit) quæ in pinis nascuntur, merito nuncupata pityocampæ, huius sunt facultatis. Καυθαρίδες ut Græcis, ita etiam Latinis Cantharides appellantur: Arabibus, Dherarie, siue Carariha; Italis, Cantarelle; Germanis, Goldt heffer: Hispanis pariter et Gallis, Cantharides. Βυπρηστεις Græcè, item Latine Buprestes nominantur: Arabicè, Xofylis; Italicè, Bupresti: Germanicè, Knoelster: Hispanicè, Arebenta buci. Πιτυόκαμπε Nomina. Græci, Pinorum eruce Latinis dicuntur: Bruchi de pini, Italis: Pytoirapsa, Arabibus: die uum non fichten, Germanis: Gusanos del pino, Hispanis.


Cantharidū  
uires ex Gal.

Nomina.

## Salamandra.

## Cap. LVI.

SALAMANDRA lacertæ genus est, iners, varium, quod frustrâ creditum est, ignibus non urî. Vim habet erodentem, calfactoriam, exulcerantem. Additur, ut cantharis, in medicamenta, quorum uis est excesse, & lepras abolere: similiq; modo reconditur. Liquefacta in oleo pilos euellit. Exenterata, detractis pedibus, & capite, in melle seruatur ad eundem usum.



SALAMANDRAE in agro Tridentino copiose inueniuntur, Ananienfi præsertim ualle, iuxta semitas, et in opacis, uliginosisq; locis. Incipiunt enim apparere uerno tempore, atq; etiam autumnò, cælo maxime pluuiò. Sed æstate ob solis feruores; itemq; hyeme ob urgentissima frigora, suis è latebris non exeunt. Salamandra corporis magnitudine, formaq; lacerto similis est; uerum capitis, ac uentris crassitudine excellit, breuiore tamen cõstat cauda. Illi est altioribus nitatur cruribus, ad gressum tamen ignauior est, hic uerò contra agilis, celerq; conspicitur. Color illi niger, lutei non minimis infectus maculis, quadam leuitate pellucidus. Visu Salamandræ horribiles, atque abominande sunt, ita ut facile eorum aspectus hominibus nauseam pariat. De hac differens Plinius lib. x. cap. LXXVII. sic inquit. Salamandra animal lacerti figura stellatum, nunquam nisi magnis imbribus provenit, et serenitate deficit. Huic tantus rigor, ut ignem tactu extinguat, non alio modo, quàm glacies. Quod quidem facit prunis superposita, non semper, ut alius animalium carnes, quæ prunis assandæ traduntur. Veruntamen in medium magni ignis, ubi flamma ualentius agit, uel in fornacem proiecta, statim comburitur. Vanum est ergo credere (ut etiam Dioscorides inquit) igne eam minime absumi posse, eoq; uictitare, ut chamæleon aere: quandoquidem facto periculo, igne exustam breui Salamandram uidimus. Quo fit, ut scripserit Galenus lib. III. de temperamentis, Salamandram ad certum usq; temporis spatium ab igne nihil pati: uri tamen, si ea longius igni sit admota. Quod postea effecit, ut explicare ne sciam, quo argumeto, quæ ratione prodiderit Aristoteles lib. v. cap. XIX. de historia animalium, Salamandram igne minime comburi, sed per eum inambulantem flammam, et prunas extinguere: cum contrarium experientia facile probari possit. Illud præterea mihi dubium est; an idem eodem capite uera retulerit, cum asserit in Cypro insula ærarijs fornacibus, ubi chalcites lapis ingestus compluribus diebus crematur, in medio igne exoriri pennatas bestiolas, quod maxime id nature operibus repugnet. Adde etiam quod si hæc uera essent, ea nunquam reticisset Galenus, qui diligentissime

Salamandræ  
consideratio.

Vana opinio.

Aristot. uanæ  
opiniones.



Salamandra  
aquatica.  
Nomina.

diligentissime omnia Cypri metalla inuestigauit, ac nouit, pariterq; metallorum fornaces, cum fuerit ipse harum memorabilium rerum accuratissimus indagator. Vidi ego in Germania ararias complures fornaces, à quibus utranque cadmiam, pompholygem, spodium, æris florem, & alia necum retuli; sed muscas per ignem obambulantibus mihi non quam uidere licuit. Quia in re nesciuerim, quonam pacto Aristoteles seruari possit. Nisi dixerimus, ipsum hoc in loco non suam, sed aliorum historiam recensere. Sed de his hæcenus. Ceterum Salamandræ nihil gigniunt (ut Plinius tradit) neq; est in eis genus masculinum, foemineumue. Nascuntur enim ex putri quodam humore terræ. Morsu uenenum inferunt, serpentium modo. Quinetiam fructus, & herbas quadam oris salina ueneno insciant, maxima digostantium iactura. quandoquidem non pauci reperti sunt, qui hoc ueneno interiere. Est & Salamandræ aquaticæ genus Vtinentibus frequentissimum, capite terrestribus breuiore rotundioreq; cauda anguillarum modo, nigro undiq; dorso, uentre autem rufescente, luteis maculis resperso, horrendo aspectu, æque atque terrestre. Animal, quod Græcis οὐλαμαῖς δεικα, Latini similiter Salamandra nuncupatur: Arabibus, Adhaya: Italis, Salamandra: Germanis, Olm siue Molch: Hispanis, Salamantegua: Gallis, Salamandre.

## Araneus.

## Cap. LVII.

ARANEVS, quem holcum, alij lycon, id est lupum uocant, subactus cum splenio, & linco illitus, prolatusque utriusque temporibus, aut fronti, tertianos circuitus persanat. Tela eius impoeta sanguinem sistit, vulnera, quæ summam cutem occupant, ab inflammationis iniuria uindicat. Est & alterum aranei genus, qui candidam, tenuem, densamque telam orditur. quem in aluta ligatum, & lacerto appensum, quartanis circuitibus mederi narrant. Decoctus ex rosaceo, & infusus aurium doloribus auxiliatur,



Araneorū, &  
phalangiorum  
genera.

ARANEOBUM, & phalangiorum (ut lib. IX. cap. XXXIX. de historia animalium scribit Aristoteles) plurima sunt genera. Mordax, quod in duo distinguitur, alterum simile ijs, quæ lupos appellant, est paruum, acerrimum, procax, salax, pulex nuncupatum. Alterum maius, coloris uigri, cruribus prioribus nigris, tardum, & lente ambulans, nec uiribus ualens, neque saliens. Cætera, quæ medicamentarij propouunt, aut nullum, aut certe exilem inferunt morsum. Genus secundum, quod lupi nomen accepit, partim exiguum est, quod non mordet: partim maius, quod asperam, paruamq; telam apud terram, aut sepes orditur, bucculis intexere solitum pro mordijs intus positis obseruatur, dum aliquid in tela offendens commouerit, mox accurrit, ut capiat: partim maximum est, quod paucam uilemque telam sub arboribus facit. Tertium genus, quod sapientissimum, lantissimumq; omnium est, uostris ædificijs latissimas contextit telas. Huius, ut equidem arbitror, hic nemini Dioscorides.

Phalangiorum  
genera ex Plin.

Plinius araneos, qui ictu, uel morsu uenenum inferunt, phalangia nominat, quorum historiam libro XXXIX. cap. IIII. diffusius euarravit his uerbis. Phalangium est Italiae ignotum, & plurimum generum. Vnum simile formicæ, sed multo maius, rufis capite, reliqua parte corporis nigra, albis intercurrentibus respersum guttis. Ac cerbior huius, quam uestæ ictus. Viuit maxime circa furnos, & molas. Aequè phalangion Græci uocant inter genera araneorum, sed distinguunt lupi nomine. Tertium genus est eodem phalangij nomine araneus, lanuginosus, grandissimo capite. Quo dissecto inueniri dicuntur intus uermiculi duo, qui ceruina pelle conclusi, & multo ribus adalligati ante solis ortum, præstant, ne concipiant. Vocatur & rhagio, aciuo nigro similis, ore minime sub aluo, pedibus breuissimis, tanquam imperfectis. Dolor à morsu eius, qualis scorpione. Urina similis araneis textis. Idem erat assertio, nisi distingueretur uirgulis albis. Huius morsu genua labefactantur. Peior utroque est cæruleus, lanugine nigra, caliginem concitans, & uomitus araneosus: etiamnum deterior, à crabrone penit tantum differens. hic & ad maciem perducit. Myrmecion capitæ formicæ similis. aluo nigra, guttis albis distinguentibus. uestæ dolore torquet. Tetranthij duo genera habent, peior medium caput distinguente linea alba, & transuersum altera. hic oris tumorem facit. At cinereus posteriori parte candicans, lentior. Minime autem noxi



sius, eodẽ colore, qui telas muscis in parietibus latissimè pandit. Haftenus de araneis, & phalangijs Plinius. Cui sub-  
scribens Aetius lib. XIII. cap. XVIII. Phalangiorũ genera, inquit, plura sunt. Quæ uerò apud eos, qui de noxijs  
bestijs scripserunt, referuntur, ut plurimum sex numero existunt. Vnum quidem ex eis rhagium, alterum lupum, ter-  
tium formicarium, quartum cranocolaptes, quintum sclerocephalon, sextum scolecion appellatum. Ac primum qui-  
dem rhagium, id est acineum, figura rotundum est, colore uerò nigrũ, acini uix nigre similitudine, unde etiam appel-  
lationem accepit: & os quidem iuxta medium uentrem habet, pedes uerò ex utraq; parte quàm breuissimos. Alterũ  
uero lupus appellatũ, muscas perdit, eisq; pascitur: ac corpus quidem habet latum, ac uolubile, partes uerò circa eius  
cervicem incisæ sunt: amplius autem, & os eius eminentias tres habet. Tertium autem myrmecium, hoc est, formica-  
rium dictũ, quod formicis maximè asimilatur, colore est fuliginosum: corpus uerò eius uelut astris quibusdam insigni-  
tum, præsertim circa dorsum. Quartum deinde cranocolaptes, oblongum est, & uiride, stimulumq; iuxta collum ha-  
bet, atq; si in aliquem irruat, locus circa caput petit. Quintum sclerocephalon dictum, caput habet saxeam, & ob-  
duratum: lineamenta uerò per omne corpus similia animalibus illis, quæ lucernas noctu circumuolitant. Sextum po-  
stremo scolecium, siue uernicarium appellatum, sublongum est, & submaculosum, maximè circa caput. Atq; hæc qui-  
dem species phalangiorum enumerantur. Hæc de phalangijs Aetius. Ego autem asserere non dubitauerim, omnia  
hæc phalangiorum genera haberi in Italia: quippe quæ à me sæpius sint uisa. quanquam scribat Plinius, phalangia in  
Italia non oriri. Quin potius præter prædicta genera, inibi & alterum reperitur omnium perniciosissimum, quod  
à Taranto Apuliæ ciuitate, ubi innumera æstate tota uagantur in campis, Tarantulam appellant. Icti uerò ab his ua-  
rijs, ac diuersè torquentur: siquidem alij perpetuò canunt, alij rident, alij plorant, alij clamitant, alij dormiunt, alij  
uigilijs afficiuntur, pleriq; uomitionibus laborant, nonnulli saltant, sunt qui sudant, alij tremebundi fiunt, quidam pa-  
uoribus infestantur, & alij alia patiuntur incommoda, fiuntq; phreniticis, lymphaticis, ac maniacis similes. Quæ qui-  
dem symptomata tam uaria, ac diuersa non aliunde provenire dicendum est, quàm aut ex uario horum animalium ue-  
neno, aut ex demorsorum hominum temperamentis. Nam atra bile tentatis, pro eorum temperaturis omnia hæc acci-  
disse conspeximus: tametsi non desint, qui putent Tarantulæ uenenum dietim, uel horatim immutari, fieriq; ob hoc,  
ut tam uarijs symptomatibus uexentur, qui ab ea iciuntur. Habentur Tarantulæ etiãnum in maritimis nostris Senen-  
sis Tyrrheno litori adiacentibus, & Romano agro frequentes: ueruntamen non perinde ac in Apulia numerosæ.  
Degunt hæc inter segetes in quibusdam terræ cauernulis, e quibus interdum exeuntes, sæpe eos messorum iciunt, qui hu-  
ius insidiæ ignari, crura ocreis non munierunt. Ictos uidi ego nonnunquam in plateis iacentes, & in xenodochijs, qui  
prædictis affectibus torquebantur. Sed mirum certè, quàm facile huiusce ueneni uis musca mulceatur. Quando-  
quidem (ut equidem attestari possum) auditis lyricis instrumentis, uel tibiæ sonoro, primo statim occursum icti à Ta-  
rantulæ à languoribus cessant, & in medium tripudiare, & saltare incipiunt, tamq; diu rem prosequuntur, ac si sani  
essent, & nullo unquam tenerentur dolore. Quod si eueniat, ut tibiæ tantillum conquiescant, ac interponant, non  
multo post tempore in terram concidunt, & ad pristinos redeunt languores: nisi tandiu indeficiente sonitu saliant,  
atq; tripudient, donec ueneni uirus, partim insensibiliter per cutis meatus, partim per sudorem exeat, & discutiatur.  
Ob id igitur tibiæ stipendio conducuntur, alternatinq; mutantur, ut absq; ulla sonitus intermissione, tandiu tripu-  
dient demors, quousque penitus curati quiescant: cum tamen, dum hæc aguntur, sint, qui antidotis eos corroborent,  
nimirum theriaca, mithridatico, ac alijs, quæ uenenosorum morsibus aduersantur. Nomen ἀράχνη Græcum est,  
ut Latinum Araneus: Arabicum, Hamdebut, seu Hanchebut: Italicum, Ragno: Germanicum, Spinn: Hispanicum,  
Arana: Gallicum, Aréine.

Phalangiorũ  
genera ex Ae-  
tio.


Tarantulæ  
consideratio.

Tarantulæ re-  
medium.

## Lacerta.

## Caa. LVIII.

LACERTAE caput intritum, & appositum, aculeos, & omnia corpori infixæ extrahit: uaros,  
formicantes uerrucas, & pensiles, quas acrochordonas uocant, tollit. Iecur exesis dentibus conie-  
ctum dolores finit. Si diuulsa admoueat, ictis à scorpione leuamentum præstat.






## Seps.

## Cap. LIX.

SEPS, quam aliqui lacertam chalcidicam uocant, in uino pota, morsus suos sanat.



Lacertarum  
consideratio.

Chalcidicaru  
consideratio.

Terrantola.

Nomina.

LACERTAE, quæ ubiq; uulgares oberrant, oua quemadmodum serpentes pariunt, & cochleis maxime insidiantur. In Arabia (ut Plinius est auctor) cubitalem æquant mensuram: & in Mauritania, auctore Strabone, bicubitales reperiuntur: in India uero Nisa monte, si Plinio credimus, ad XXIIII. pedum longitudinem lacerti reperiuntur, colore fului, aut punicei, aut cerulei. Est & Insula Capraria lacertis maximis referta, ut refertur, qui ad fortunatas nauigarunt insulas. Ceterum, quæ Chalcidicæ uocantur, in Libya, & Cypro copiose promouentur, non habentur in Italia. Morantur hæc plerunque in locis aridis, & inter saxa. Varia est harum historia apud auctores: nam quidam nostratibus lacertis similes ipsas fecere, quidam uero inter serpentium genera recensent. Nicander Dioscoridi subscribit: quippe qui in theriacis suis dicat. Vitabis & Sepem corpore bimulibus lacertis similem. Verumtamen Aetius libro XIII. Sepem iter mortiferos recolit angues, sic inquit. Serpens, qui Seps appellatur, longitudine quidem duorum cubitorum reperitur, ex crasso autem in tenuem abit: recta uero, ac tardè proserpit. Caput habet latum, os acutum, uniuersum autem corpus multis albis notis respersum. Ceterum ij, qui ab eo percussi sunt, intra tres, aut quatuor dies pereunt. hæc Aetius. Pausanias porro aliter sentire uidetur: inquit enim. Aegyptum Arcadiæ quondam regem in uenatione occupatum, & imprudentem Seps oppressit. Viperæ similis est minimæ, cineris colore, maculis ex interuallò uariis, lato capite, angusta ceruice, aluo maiori, cauda breui, obliquo incessu, quasi caucer, quod & cerasæ serpenti proprium est. Quamobrem credendum putauerim, aut fabulosam esse lacertæ Chalcidicæ historiam, aut pluribus hoc nomen conuenire serpentibus. Verum minime reticendum duximus, reperiri in Hetruria, in Romano agro, ac etiam in Apulia quoddam lacertarum genus Terrantola uulgò dictum, quoniam sub terra delitescat. Quæ cum homines morsu perimat, fecit, ut necum quandoque cogitauerim, an ea fortassis Nicandro, ac Dioscoridi Chalcidicæ esset lacerta: aut Stellio, quod stellis maculata, insignitaq; cernatur. Sed hæc libro sexto, duce Deo, latius explicabimus, ubi de his, quæ morsu, uel ictu uenenum emittunt, sermonem faciemus. Quæ Græcis σαῦπα, Latine Lacerta nominatur: Italis, Lucertola: Germanis, Heidex: Hispanis, Gartixa. Quæ uero σαῦπα Græcè, Latine Seps, & Lacerta Chalcidica uocatur: Italicè, Seps.

## Scincus.

## Cap. LX.


SCINCUS aut Aegypti, aut Indiæ, aut rubri maris alumnus, quanuis inueniatur in Lydia Mauritanix. Est autem terrestris crocodilus, sui generis, sale inueteratus cum nasturtio. Aiunt carnes, quæ renes amplectantur, id sibi uirium uendicasse, ut si drachmæ pondere bibantur, ueneris accendant. Verum decocto lentis cum melle, aut femine lactucæ cum aqua poto, ueneris cupiditates inhibentur. additur in antidota.

Scinci confi-  
deratio.

Scinci Vici-  
tini.

TAMETSI scribat Dioscorides, Scincum esse terrestrem crocodilum, sui generis; aquatile tamen animal est. Quandoquidem qui Venetias importantur, in mari rubro, & in Aegypto Nilo flumine capiuntur. Hi quamuis forma crocodilos referant; magnitudinem tamen longè minorem habent: namq; qui ad summum adoleuerunt, nostras lacertas magnitudine non excedunt. Squamis uestiuntur subluteis, cæsta à capite ad caudam discurrente linea. At non eadem crocodilis tunica: quippe qui nigro natura sunt dorso. Pausanias in Libya bicubitales reperiri Scincos tradidit: ueruntamen ij ad nos non deferuntur. Sunt in agro Vicentino lacus quidam, qui Scincos etiam gignunt, sed minutulos, ac nigricantes, quibus sæpius utuntur seplasiarij deficientibus marinis, non sine magno fortasse hominum discrimine. Reprobat hos Euchsus quoq; libro primo de compositione medicamentorum, sic inquit. Scincus animal





mal est in aquis degens, lacertæ magnæ simile, sed uentricosius: cauda lata, ut anguilla, ad nataudum apta. Quapropter quos officinæ subijciunt, cum duabus caudis, ueri non sunt, sed ex Vicentino agro allati. hæc ille. Qui tamen dū aliorum errorem merito damnat, ipse (pace uiri alioquin clarissimi dixerim) in alterum nō minorem mihi quidem incidisse uidetur, quod existimauerit, legitimum Scincū, cuius effigiem damus, regi lata cauda ad natandū, anguille modo. Quandoquidem Fuchsij Scincus, quo Foro iulienſis ager, et quæ circum Vtinum ciuitatem stagnantes sunt aquæ, maximè scatent: et cui lacertæ magnæ corpus, tumidus uenter, ac maculis uariis, rotundum quadātenus caput, anguille cauda, nigrumq; dorsum est, Scincus uerus non est: sed potius animal salamandræ generi adscribendum, quod terrestrem salamandram non paucioribus referat notis, quàm aquatiles testudines terrestres repræsentant. ob id itaque reſtè Vtinenſes hoc animal Salamandram aquaticam uideant, abhorrentq; maximè, quod inter uenenata omnino reputent. Huic sanè cum Aegypto scinco nulla est cognatio: quippe Aegyptius capite constat longo, dorso quadātenus elato: uentre lacerta nō maiore: corio squamis sublucis, numerosis, minimisq; in uniuersum referto: cauda lacertæ modo tereti, breuior tamen: cassaq; à capite ad caudam discurrente linea. Talis nimirū Scincus est, qui quotannis ab Alexandria Aegypti Venetias numerosus conuehitur. Scincorum meminit Plinius libro xxviii. cap. viii. ubi ita scribit. Ex chamæleontis similitudine est Scincus, quem quidam terrestrem crocodilum esse dixerunt: candidiore autem, et tenuiore cute. Præcipua tamen differentia dignoscitur à crocodilo aquatico squamarum seta à cauda ad caput uersa. Maximus Indicus, deinde Arabicus. Afferuntur falsi. Rostrum eius, et pedes in uino albo potui, cupiditates ueneris accedunt. Vtiq; cum satyrio, et cruce semine singulis drachmis omnium, ac piperis duabus admixtis, ita ut pastilli singularum drachmarum bibantur. Per se laterum carnes obolis binis cum myrrha, et pipere pari modo potè efficaciores ad idem creduntur. Prodest et contra sagittarum uenena, antè posteaq; sumptus. In antidota quoq; nobilia additur. hæc Plinius. Porro CROCODILVS (ut refert Aristoteles in libris de historia, et partibus animalium) animal est magnum, ad quindecim usq; cubita crescens: quanuis ad duodeuiginti scripserit Plinius. Hic animal non parit, sed ouum auferini magnitudinem non excedens: idq; in terra, non autem in aquis. Parit eum plurimum sexaginta, uiuitq; diu, maximūq; animal minima hac origine euadit: nanq; fœtus ex ouo exclusus portione respondet, lacertorum magnitudinem æquans. Linguam adeo indiscretam habet, ut omnino ea carere uideatur. Cuius rei causa est, quod idem et terrestris, et aquatilis quodammodo est. Ergo ut terrestris, locum obtinet lingue, ut uerò aquaticus elinguis. Pisces enim aut nullam habere linguā uidentur, nisi ualde resupinentur, aut inexplatam habent. Solus inter cætera superiorem mouet mandibulam, minimeq; inferiorem. causa est, quod pedes ad capiendum, retinendumq; inutiles habet. Oculi crocodilo suilli, dentes exerti, et ungues in pedibus acutissimi, coriumq; durissimum, telis, ac sagittis minimè cedens. Interdum plerunq; terram incolit, noctu uerò aquis se mergit, innatatq; flumine. Duo eius esse genera Plinius est auctor loco citato. Vnum maius, de quo diximus: alterū minus illi simile, multum infus à magnitudine, in terra tantum, odoratissimisq; floribus uiuit. Ob id intestina eius diligenter exquiruntur, in cundo nidore feret. Crocodilean uocant, oculorum uitij utilissimam, cum porri succo inunctam, et contra suffusionem, uel caliginem. Illita quoque ex oleo cyprino molestias in facie enascentes tollit. Ex aqua uerò morbos omnes, quorum natura serpentis in facie, nitoremq; reddit. Lentigines tollit, ac uaros, omnesq; maculas. Et contra comitiales morbos bibitur ex aceto mulso binis obolis. Felle inunctis oculis contra suffusiones nihil utilius prædicant. Maiores dentes à dextra maxilla adalligati dextro lacerto (si credimus) coitus stimulant. Corij utriusq; cinis, ex aceto illitus his partibus, quas secari opus sit, aut nidor cremati, sensum omnē scalpelli aufert. Sanguis utriusq; claritatem uisus inuitis donat, et cicatrices oculorum emendat. Cor annexum in lana ouis nigræ, cui nullus alius color incurſauerit, et primo partu genitæ, quartanas abigere dicitur. Corpus ipsum, excepto capite pedibusq; elixum manditur ischiadicis. hæc Plinius. Veruntamen quæ is alterius intestinis assignauit, ea Dioscoridem sinit tribuisse constat. Ceterum cum Scincus Chamæleontem, cuius formam refert, mihi in mentem reuocauerit, ueniatq; et ipse in medicum usum, nō ab re fore duxi, eius tum historiam, tum etiam facultates euarrare. CHAMAELEON igitur (ut Aristoteles memoria prodidit

Fuchsij error

Crocodili historia.

Crocodili genera, &amp; uires.

Chamæleontis historia.



Chamæleotis  
uires.

Nomina.

prodidit lib. II. cap. XI. de historia animalium ) figura totius corporis lacertam plane representat. Latera deorsum ducta uentri iunguntur, ut piscibus : & spina modo piscium eminet. Rostrum siniae porcarie similitudinem : cauda prælonga in tenue desinens, & longis implicata in se orbibus. Elatior à terra est, quam lacerta. Pedes singuli bipartiti secantur, partesq; talem inter se habent situm, qualem pollex ad manus, reliquam partem obiectam. Sed ipse est tiam reliquæ partes paulotenus in digitos quosdam finduntur, aduncis unguiculis. Corpus asperum totum, crocodilo. Mutat suum colorem inflatus. Omnium ouiperorum tenuissimus est : quippe qui omnium maxime inopia sanguinis rigeat. Causa ad uiores animæ eius referenda est : præ nimio namq; metu multiformis efficitur. Motus ei piger admodum, ut testudinis. pallefcit cum moritur, defunctusq; colorem eundem seruat. Subit cavernas, & latitat more lucertarum. Caput eius, & guttur si quernis accendatur lignis, imbrium, & tonitruum concursus facere Democritus narrat. Item iecur in tegulis ustum. Dextro oculo, si uiuenti eruatur, albugines oculorum cum lacte caprino tollit. Lingua adalligata, pericula puerperij adimi. Linguam, si uiuenti exempta sit, ad iudiciorum euentus pollere dicunt. Item dextram maxillam ad formidines, pauoresq; corpore uero illito detrabi pilos : & felle glaucomata, & suffusiones corrigi, *Σελυκος* ut Græcis, ita etiam Latinis *Scincus* appellatur : Arabibus, *Aschanchur*, siue *Scanchur* : Italis, *Stinco*, & *Scinco* : Hispanis, *Stinco*.

## Terreni uermes.

## Cap. LXI.

TERRENI uermes impositi, præcisos neruos glutinant : tertianas discutunt. Decocti cum asperino adipe, infusi, affectis auribus medentur : cum oleo autem decocti, si in contrariam aurem instillantur, dentium doloribus præstant auxilium. Triti in potu ex passio urinam ciunt.

Terrenorum  
uermium, &  
eorum olei ui-  
res.


TERRENI uermes etiam in medicum usum ueniunt. quandoquidem oleo incoquantur ad articulorum, neruorumq; cruciatus. Veruntamen aberrant plerumq; myropolæ in olei conficiendi ratione. Inponunt enim uermiculos in aneu cacabum, & affuso inde oleo igni seruefaciunt : quo fit, ut paruo momento ij non modo inassentur, sed penitus coiburantur, nullo in oleo humore relicto. Fit autem rectius, cum uase uitreo excipiuntur, & diutius calore balnei macerantur, oleo innatantes : namq; hoc modo eorum succus elicatur, coëburiq; nequeunt. Præstat hoc oleum ita paratum præsertim si uermes rosaceo macerentur, ad podagricorum dolores, à calidis defluxionibus provenientes. in uulnibus prius locis dolentibus oleo, ac mox superpositis uermibus in eo elixis, tustis, admistisq; cū æquali cerati pōdere, quod tripharmacum uocant, ex argenti spuma oleo, & aceto conflatum. Quibus etiam commendauit Plinius lib. XXX. cap. IX. ipsorum uermium cinerem cum melle triduo emplastri more impositum. Quin & ipsos uermes in oleo ueteri elixos, & sepepositos. Ad hæc terrestres uermes prius uino albo eloti, ac per se absq; oleo uase uitreo excepti, operculato uasis ore, ne qui expirare possit, in balneum calentis aquæ immerguuntur, tandiuq; afferuescere permittuntur, donec in liquorem oleo similem uertantur. Præferunt quidam hoc, quod maxime præstet neruorum, & intestinalium uulnibus glutinandis. Quod longe efficacius efficit, si factitio balsamo, de quo libro primo diximus, fuerit admixtum, aut oleo, quod uitreis organis è larigna, siue abiegnâ lacryma elicatur. Namq; his additis uniuersa corporis recentia uulnera breui tēpore glutinat, ijs exceptis, quæ capiti inferuntur. Dantur utiliter terreni uermiculi igne cremati, & in puluerē contriti felle suffusis, ex marrubij, uel absinthij decocto : addunturq; in electuarijs ad idem paratis, ut Galenus docuit libro de theriaca ad Pisonem. Triti, ac rosaceo subacti (ut idem author est) podagricorum inflammationes extinguunt. *Ἰὼς ἐρπετα* Græcis, dicuntur : Latinis, uermes terreni : Arabibus, *Charatin* : Italis, *uermi terre*, *stri*, & *Lombrichi* : Germanis, *Regen uurm* : Hispanis, *Lumbrizes de tierra* : Gallis, *Vers de terre*.

Nomina.

## Mus araneus.

## Cap. LXII.

Mus araneus dissectus, & impositus sui morbus ueneficia luit.



ARANEVS



**ARANEVS** mus (ut Aetius inquit) colore quidem mustela similis est, magnitudine autem muri. Os uero sublongum habet, & exiguum caudam. Dentes ei tenues, duplici ordine nati, in utraque maxilla: quo fit, ut quatuor dentium ordines habeat. Quibus utiq; notis abunde respondent ij, à quibus picturam, quam hic damus, mutnati sumus. Meminit muris aranei Nicander in suis theriacis, dixitq; perire in rotarum orbita si progrediens in eam inciderit. Quod tamen fabulosum, poeticumq; censemus: tametsi non desint, qui terra è plaustrorum rotis excussa, huiusce succurrant morfibz. Scribit Plinius lib. viii. cap. lvi. mures araneos ultra Apenninum non haberi, cum tamen hoc euo in uniuersa reperiantur Italia. In Ananieusibus montibus, Tridentino agro frequentes uisuntur. Nihilominus incolæ inter uenenua non habent: id quod fortassis & celi, & solis temperamento euenit. Siquidem nec scorpiones ibidem exorti istu uenenum relinquunt, ut in eorum mentione superius diximus. Μύρμας Græcè, Mus araneus Latine appellatur: Italicè, Topo ragno: Germanicè, Ziss mauß: Hispanicè, Murgauho.

Aranei muris  
consideratio.

Nomina.

## Mures.

## Cap. LXIII.

**MURES**, qui in domibus oberrant, concisos scorpionum plagis utilissimè imponi, in confesso est. Si inflatos infantes ederint, oris saliuam exiccati promittunt.



**MURES** diuersorum sunt generum; siquidem domestici, syluestres, ac montani reperiuntur: sunt etiamnum aquatiles marini. Verum primum de ijs differentes, qui nostris in domibus oberrant, quiq; etiam in agris in magnam segetum perniciem morantur, Aristotelis uerba referā, qui lib. vi. de historia animalium, cap. ultimo sic habet. Murium generatio mirabilis præter cætera animalia, maiorem in modum est, tum numero, tum celeritate. Iam enim foemina prægnante in uase miliario aliquando occupata, paulò post reurato uase, musculi numero uiginti & centum reperti sunt. Mirum etiam percipimus ortum redundantis agrestis murium generis. Locis enim compluribus agri, tam inaudito modo oriri solent, ut parum ex uniuerso frumenti reliquatur: tam cito absumentur, ut nonnulli meadices agricolæ, cum pridie metendum statuerint, postridie mane cum messoribus accedentes ad segetem, absumentum inueniant totam. Interitus autem minime euenit ratione: paucis enim diebus omnino abolentur: quam superiore tempore homines uincere, uel suffiendo, uel suis, ut latibula effoderent, admittendo, non possent. Quinetiam uulpes eos ueniantur, & cati syluestres in primis: sed tamen superare copiam, & celeritatem prouentus nequeunt. Nec aliud quicquam omnium uincit, nisi imbres: ijs enim quam primum intereunt. Terræ Persicæ parte quadam mure scemina rescissa, foetus sceminum prægnantes comperiuntur. Sunt qui uehementer confirmant, Mures, si salem lambant, impleri sine coitu. Aegyptijs muribus prædurus, ferè ut erinaceis, pilus est. Habentur in murium genere & **GLIRES**. Idcirco (ut Plinius auctor est libro xxxvi. cap. primo) apud Romanos censoriæ extabant leges, Glires in coenis apponi uetantes. Verum hoc euo ganconibus maxime expetuntur in cibis, non modicam palato iniuriam fieri putantes, si tam pingui priuetur alimento. Sed ijs minime perpendunt, uel potius negligunt, quòd glires piuguedinis exuberantia uentriculi appetentiam destruant, lentum ac frigidum gignant succum, concoctumq; contumaces existant. Notatum non congregari glires, nisi populares eiusdem syluæ, & si misceantur alienigenæ, anne, uel monte discreti, in erire dimicando. Genitores suos fessos senecta alunt insigni pietate. Senium finitur hyberna quiete. Conditi enim & hi cubant, rursus æstata inuelescunt. Montibus Goritiensî agro conterminis, & in Carniolæ, Carinthiæ, ac Stiria alpinis syluis maxima est horum quandoq; foetura. Quo fit, ut numerosi à uenatoribus capiantur, præsertim cum fagina glande abundant syluæ. Exeunt uenatum nocte, & arbores suffientes, in quibus stabulantur, sic eos stupefactos innumeros capiunt, adeo ut ijs repletiis saccis domum plerumq; redeant, quos postea excoriant, & impositos præ nimia copia cadis sale, & muria asseruant, quemadmodum pisces. Horum caro ijs utiliter estur, qui canina laborant fame: namq; exuberante piuguedine obtunditur appetentia, & tollitur morbus. Discoquitur Gliris caro detracta pelle, & intestinis exemptis, melle in fictili nouo, addito nardo ad tertias, atq; ita asseruatur, quòd constat deplorata aurii uitia eo remedio sanari.

Murium con  
sideratio.

Glirium con  
sideratio.

Georgius



Agricolę error.

Murium mō-  
ranorum cō-  
sideratio.

Georgius Agricola, uir aliqui doctissimus, & acerrimus rei metallice indagator, quod fertasse ueros glires non uiderit neque cognouerit, non sine magno errore putat in libello, quem subterraneis animalibus dicauit, Sciuros uillosa cauda, qua se operiunt & inumbrant, ita uocatos, Glires esse. Sed quod hæc duo animalia inter se maxime differant, omnibus notius esse arbitror, quam ut pluribus exponi debeat. Porro MONTANI mures cuniculos magnitudine aquant, ac etiam nonnunquam superant, cruribus non usqueadeo longis. Capite leporum reserunt: uerum tam breuib; auribus sunt, ut uix supra pilos appareant. Pilo uestiuntur uario tarsi modo, oblongo

### M V S M O N T A N V S.



Villosam habent caudam, & pedes acutis uugibus armatos. Hyeme admodum pinguescunt, & obesi sunt, ita ut alio quando monstrosè iumentescant. Hi Ananiensibus, Phœbeisq; montibus, in Tridentino agro frequentes habentur, uocanturq; uulgò corrupto uocabulo Marmontane, quasi Mures montanos dixerint. Eriguntur sæpius urfi modo, anterioribus pedibus ueluti manibus, cibum ori ministrantes. Dentes anteriores quatuor habent leporis instar, sed longiores, atque acutiores, quibus sciuissimè mordent. Sed mirum est (ego enim qui periculum feci, id certò refertè possum) quod si acutis forcipibus secentur, una tantum nocte renascuntur. Domi retenti si iuuenes sint, ex uita quædantenus feritate mitescunt, sed utensilibus damnum inferunt: quippe qui omnia, quibus obuiant, erodant, & destruant. Hyeme delitescunt, fœno ac paleis, in acruum congestis plerunq; se condentes. Dormiunt integris mensibus, quædam admodum & glires. In montibus uiuunt. Stramenta in cauernas comportant, quibus à frigore se tuebantur. Externi refacti acutissimè uociferantur, ac sibillant, & ad tumultus confugiunt. Horum carnes syluestri, & grani quodam odore adeo spirant, ut quibusdam nauscam moueant. Quo fit, ut sale, & muria asseruati tum odoris granitatem, tum etiam exuperantem humiditatem ob pinguedinis copiam exuunt: cum tamen tam recentes, quàm sale conditi concoctu admodum contumaces existant, uentriculo laborem inferant, corpusq; uniuersum exalfaciant. Horum piloguedo medicis expetitur, quod contractos molliat & restituat uernos. Sunt uero & alia quoque murium genera, nempe Ponticum, Lasicum, Noricum, Pannonicum, Iudicum, à regionibus prouincijsq; cognominata. Ponticum pilo est niue candoris, sed superiore caudæ parte saturatè nigricat: ea enim digiti longitudinem non excedit. corporis magnitudo illi ut sciuro. insectatur aues & mures. Huic sanè id esse censuimus, quod Armellinum uocamus. Lasicus pilis uestitur in cinereo candidis, uentre tamen albicante: est Pontico paulò maior. hunc Varium appellamus. Norcius corporis mole domesticam mustelam aequat, pilis leporinis ferè similibus. breui constat cauda. caret auribus, non tamen foraminibus; quæ habet aurium instar. Pannonicus, cui color subuiridis, mustele speciem refert, uerum magnitudine domesticos mures non superat. Postremo Iudicus colorem habet ferè murium montanorum, albis tamen compluribus intercurrentibus pilis. capite est & ore in longum porrectis, quin & auriculis breuissimulis: cauda ab ipsis clunibus crassiore in exilitatem ad inum prolixè defluente: cruribus dodrantalibus. Corpore ferè lem aequat, pedibus aliquantò breuioribus, ac pilo hispidiore, præsertim si aduerso tractu mulecas. Atque hæc sunt de murium generibus. Caterum uurium stercus (ut in libro de theriaca ad Pisonem legitur) aceto subactum, & capillis defluentibus utiliter illinitur. Quinetiam per se potum, uesticæ lapidem comminuit. Mûs, ita Græcis, Latinitis uerò Mures appellantur: Italici, Topi: Germanici, Maus: Hispanici, Ratones: Gallici, Sorizes.

Murium alia genera.

Nomina.

Lac.

Cap. LXIIII.

LAC generatim omne boni succi est, corpus alit, aluum emollit: stomachum, & intestina infusione uexat. Venum tamen dilutius æstiuo habetur, & è uiridi pabulo aluum magis emollit. Probatur autem candidum, æquali crassitudine, quod ungui instillatum cogitur. Aluum minus tentat caprinum: quoniam pecus hoc adstringentibus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis foetibus, & terebintho magna ex parte uestitur: inde stomacho accommodatissimum reddi solet. Ouillum autem dulce, crassum, & præpingue: non autem usqueadeo utile stomacho. Bubulum tamen,



men, asininum, & equinum, uentri magis idonea: sed ipsum turbant. Quibus in locis pecora, scammoniam, ueratrum, clematidem, aut mercurialem pascuntur, lac omne uentrem, & stomachum subuertit: quale in Iustinis montibus esse, à nobis proditum est. Siquidem capræ, quibus candidum ueratrum pabulo fuerit, primo foliorum partu euomunt: & eorum lac hauustum nauseam creat, & stomachum in uomitiones effundit. Ventrem adstringit lac omne decoctum, præcipueq; candentibus calculis, pulmonis, interaneorum, uesicæ, & renum: foris uerò contra pruritus cutis, eruptiones papularum, & uitiatos corporis succos, recens cum melle crudo, addito sale, datur exigua aqua dilutum. Minus inflat quodcunque semel seruefactum. Decoctum cum calculis marinis ad dimidias, ulcerosas uentris fluxiones adiuuat. Lac quodcunque serum continet implicitum, quod ubi discessit à lacte, multò potentius ad purgationes redditur. Datur quibus sine acrimonia uolumus deiectionem moliri, ut melancholicis, comitialibus, lepris, elephantijs, & erumpentibus toto corpore papulis. Ex omenti lacte fit, quod schiston, id est scissile, appellant. Lac autem fictili nouo feruet, ramoq; ficulneo recenti monetur, insparsis, postquàm bis, aut ter efferbuerit, totidem aceti mulsi cyathis, quot sunt hementis lactis: ita enim serescens liquidum ab eo diuiditur, quod in cascum concreuit. Sed cum feruet, ne superfundatur, conueniet spongia ex frigida continuo fictilis labrum detergere, sextariumque argenteum frigida aquæ plenum demittere. Bibitur heminis per interualla singulis, usque ad quinas, ita ut intercedentibus spatiis, potantes ambulent. Lac autem recens efficax est contra rosiones, uisionesque, ab exitalibus medicamentis factas: uti à cantharidibus, aut salamandra, bupreste, aut piperis, hyoscyamo, doryenio, aconito, aut ephemero: præsertim bubulum ad id eximie conueniens. gargarizatur autem exulceratis faucibus, tonsillisque. Asininum peculiariter collutos dentes, gingiuasque stabilis. Fluxiones alui, si ulcera sentiantur, tenesmosque, ouillum, bubulum, aut caprinum, cum marinis lapillis decoctum, sistit. per se autem, & cum hordeacea prisana, aut halicacæo cremore infusum magnopere intestinorum rosiones mitigat: exulceratæ uulvæ immittitur. Humanum lac dulcissimum est, & maxime alit: mammis autem exuctum, prodest tabi, & stomachi rosionibus: contra hauustum leporem marinum præsidio est: oculis cruore ex ictu suffusis, cum thuris polline instillatur: podagricis utile est, cum meconio, & cerato illitum. Lac omne respuentis splenicis, hepaticis, comitialibus, uertiginosis, & neruorum uitio laborantibus, febriculosis, & capite dolentibus: nisi si quis interdum purgationis gratia, ut ostendimus, schistum præbeat. Prius miperæ canis lacte perunctos narrant glabrescere: potum contra uenena antidoti uicem obtinet: abortus mortuos expellit.

## Caseus.

## Cap. LXV.

CASEVS recens sine sale sumptus alit, stomacho utilis est, & facile in membra delegatur: carnem facit, aluum modicè emollit: alius tamen alio præstantior, pro natura lactis, à quo conficitur. Decoctus autem, & expressus, deinde inassatus, aluum sistit. illitus, oculorum inflammationibus, & sugillatis prodest. Qui uerò recens salitus est, minus alimenti præbet. carnem aptè minuit, stomacho aduersatur, negotium uentri, interaneisque exhibet. Vetusiore sistitur aluus. Sero, quod à caseo manauit, quàm optimè canes aluntur. Quod hippacen uocant, caseus est equinus: ea uirus redolet, magnopere alit, bubuloque proportionem respondet. Nec desunt, qui hippacen, equinum coagulum appellarint.

## Butyrum, &amp; eius fuligo.

## Cap. LXVI.

E LACTE pinguisimo probatum fit butyrum, quale ouillum est. Fit & ex caprino, agitato in uasis lacte, donec pingue separetur. Butyrum natura oleosum est, & emolliens: unde largius epotum, uentrem resoluit: prodest, ubi oleum non adfuerit, contra uenena. Cum melle si infricatur, dentitiones adiuuat: gingiuarum pruritus, & oris ulcera infantibus emendat. Illitum foris capiora alimentorum facit corpora, & ab albidis pustulis per summa scatentibus asserit. Contra inflammationes, & duritias uulvæ, quod nec uirus respit, nec uetustatem sentit butyrum efficax est: le præsertim cum nerui, aut cerebri membranæ, uesicæ cernix, uulnera acceperit. Id autem purgat, replet, carnem creat: ab aspide percussis utilissimè imponitur. Recens obsoniis additum olei uicem pensat, & adipis uice fungitur in bellariis. Colligendæ ex eo fuliginis ratio hæc est. Butyrum in lucernam nouam ingestum accenditur, fictiliq; operculato, quod supernè in siphunculi speciem desinat, & infima parte cuniculos clibani modo habeat, crematur, & subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum coaccruetur fuliginis modus, quem facere institueris: penna post deraditur ad usum. Eius effectus est in medicamentis oculorum, exicare, & adstringere: fluxiones cohibet, & ulcera celeriter ad cicatricem perducit.





### Lactis confideratio.

**LAC** est benigni alimenti superfluum in foeminarum mammillis ex bina sanguinis coctione progenitum. Conficitur autem id tribus diuersis essentijs: nimirum caseosa, butyrosa, ac serosa, quæ abinuicem separata, uariam conferuntur temperiem. Sed à lacte primum rem exorsus, de eo tantum facultates differant, cuius hac tempestate ita in cibis, quam in medicamentis est usus. Tale autem est humanum, caprinum, ouillum, bubulum, bubalinum, et asininum. Et quamuis ueteres usi fuerint tum camelino, tum etiam equino; cum tamen in Italia, ac in alijs conterminis regionibus, quod sciam, eorum nullus sit usus, hæc tanquam superuacanea omnino reticenda censemus. Præcellit igitur humanum, quod temperatum sit in omnibus suis partibus. Hoc sequitur caprinum, etsi aliquantò siccius sit. His crassius est ouillum, minusq; serosum. Bubulum deinde, ac bubalinum, præter id quod admodum sit crassum, cæteris longè pinguius habetur. Quamobrem lib. x. simplicium medicamentorum dicebat Galenus. Miror autem quo pacto Dioscorides ex ouillo, & caprino butyrum confici referat. Ego namq; ex bubulo fieri noui, ac proinde nuncupatum esse butyrum existimo, hæc Galenus. Porro asininum sicut lac omne seri exuberantia superat, sic cæteris pinguedine cedit.

### Lactis probatio.

Probatum in uniuersum lac colore, odore, sapore, ac substantia. Ob id igitur præfertur quod colore perquam albu uisitur, pellucidum, ac clarum, non uiride, non luteum, nõ nigrum, nec aliquo linore suffusum: odore suauis, sincero, minime graui, aut uiroso: sapore quidè dulci, non amaro, acri, acido, aut salso: substantia media inter crassum, & tenuem, ita ut eius gutta ungui instillata non defluat, sed in sua sphaerula permaneat. Quod autè tale fuerit, omnium sanè præstantissimum erit, & in cibis optimum. Contra pessimum præbet alimentum, uentriculum, ac totum corpus subuenit, quod contrarias notas habuerit, quodq; ex morbois animalibus emulsum fuerit, uel etiãm ab ijs, quæ reprobata, uenenosasq; plantas depascuntur. Quocirca memoriæ prodidit Galenus lib. 111. de facult. alimentorum, quod si præ, aut alterius cuiuspiam animalis scaunoniam, aut tithymalum depasti, lac cibi loco quis sumpserit, omnino illi fluet. Optimum datur utiliter ætate consistentibus, senibus uon naturaliter frigidis, biliosis, & marasmo affectis, et deniq; ubi uentriculus excrementis uacet. Noceat lac potum contra febriētibus, capitis dolore affectis, oculis, resolutis, conuulsis, fluxione tentatis, calculo oppressis, pituitosis, adolescentibus, obstructis, & ijs præseruim, qui lacte, & edulij lacte paratis, coenas & prandia claudunt: tantòq; maior inde sequitur noxa, quãtò crassius lac assumptum exiit. Ea q; propter citato loco inquit Galenus. Lac, quod seri plurimum habet, etiam si semper eo uteretur, nullum prorsus periculum adfert. Quod uerò huiusmodi humiditatis exiguum habet, caseosæ autem crassius lac multum, omnibus qui ipso frequentius utuntur, est periculosum. Cæterum ut lac, quod bibendum est, præsert, hæc præterea adsint oportet, lac nimirum recenter sit mulsam: aliquid mellis, sacchari, aut salis admixtum sit, ne in uentriculo concresecat: tantumq; ex eo sumatur, quantum concoquere ualeat uentriculus. A cibis etiam omnibus, & uino, postquam assumptum fuerit, abstinendum est, quousq; à uentriculo secesserit, minimeq; exercitio utendū est. At quoniam lac dētes inficit (etsi Dioscorides contrariū de asinino scripserit) eo statim ebibito, uino, aut hydromelite os albi luere oportet. Quod autem immixto coagulo concreuit, quanquam uerno, ac astiuo tempore, mensis frequentissimè expetatur; tamen angustiam parit, uentriculum opprimit, caput uaporibus replet, egrè concoquitur, & crassum gignit succum. Quamobrem si quandoq; in cibum ueniat, primum omnium ingeratur: siquidem ultimo loco sumptum fieri adsolet) aut statim putrescit, aut subsidentem cibum secum ad ima incoctum trahit. Lac omne, humanum præsertim, cerebrū auget, corpus impinguat, siccam & asperam tuissimè lenit, uenerem roborat, urinae ardoribus subuenit, diuina soluta corpora reficit, probi multiq; est alimenti, bonam facit aluum, facit in sanguinem uertitur, carnem auget, præterea dilatat, & cæteris alimenti maius adfert nutrimentum. Quod autem lac primiparæ canis perunctos glabrescentes faciat, potum uerò emortuos educat factus, ut nonnulli proditum esse scribit Dioscorides, reprobatur Galenus lib. x. simp. medic.

### Lactis facultates.

Butyrum præterea (ut loco citato scribit Galenus) facultatis est concoquentis, paulum habens duritiam digerendi potentia, in medijs nimirum corporibus secundum duritiem, ac mollitiem. Corporum etenim planè durorum tumores præter naturam hoc nequit medicamen digerere: at quæ in mollibus sunt phlegmose, eas & concoquit, & digerit.

### Lactis bibendi ratio.

Butyrum præterea (ut loco citato scribit Galenus) facultatis est concoquentis, paulum habens duritiam digerendi potentia, in medijs nimirum corporibus secundum duritiem, ac mollitiem. Corporum etenim planè durorum tumores præter naturam hoc nequit medicamen digerere: at quæ in mollibus sunt phlegmose, eas & concoquit, & digerit.

### Lactis coagulati vires.

Butyrum præterea (ut loco citato scribit Galenus) facultatis est concoquentis, paulum habens duritiam digerendi potentia, in medijs nimirum corporibus secundum duritiem, ac mollitiem. Corporum etenim planè durorum tumores præter naturam hoc nequit medicamen digerere: at quæ in mollibus sunt phlegmose, eas & concoquit, & digerit.

### Butyri vires ex Galeno.

Butyrum præterea (ut loco citato scribit Galenus) facultatis est concoquentis, paulum habens duritiam digerendi potentia, in medijs nimirum corporibus secundum duritiem, ac mollitiem. Corporum etenim planè durorum tumores præter naturam hoc nequit medicamen digerere: at quæ in mollibus sunt phlegmose, eas & concoquit, & digerit.



& digerit per facile. Nam parotides, & bubones, & oris phlegmonæ, aliæq; partes complures illo prorsus solo curantur, nimirum in pueris, ac mulieribus. Sed & dentientium puerorum gingiuis illitum, nibilo imbecillius melle gingivas extenuat, per quas exitus est dentibus: & alios omnes in ore affectus phlegmoniosos, posteaquàm fluxio resistit, digerit pariter & concoquit. Proinde cataplasmatibus inditur, quæ extrinsecus inponuntur parotidibus, hypochondrijs, & bubonibus. Sed & in uentrem denotatum, & ex eo distributum, magnificè confert expuitionibus ex pulmone, idq; in pleuriticis, & peripneumoniacis affectibus, cum hoc, quod eos etiam concoquat. Atque si solum lingatur, magis quidem concoquit, uerum minus educit: plus uero si cum melle, & amaris amygdalis, sed minus concoquit. Fit ex bubuli præsertim lactis pinguedine id, quod uulgo Romæ, ac in uniuersa fere Italia Capodilatte appellant, mensis plurimum expetitur, quod gustui, ac palato maximè arrideat. Verum enimvero ob pinguedinis copiam, præterquàm quod uentriculum relaxat, & cuncto supernatat cibo; nutrimentum eiicit, anteaquam concoquatur, uapores in caput mittit, & crassum generat succum. Caseus autem fit ex crassiore cuiuslibet lactis substantia, admisto coagulo, & expresso inde sero. Præfertur in cibis recens, quod noxam uentriculo non inferat, concoquaturq; facilius, quàm qui diutius asseruatur. Nanque uetus, qui quod linguam parumper uellicet, quàm plurimis gravior redditur, omnium pessimus est: quippe qui cæteris magis adurat, sitim excitet, & difficilium gignit. Quin & calculos in renibus gignit, iecur obstruit, aluum cohibet, & in calefactis corporibus atram bilem gignit. Quo fit, ut plus damni ex eius succi prauitate, & fermenti qualitate inferat, quàm quod humores crassos attenuando compensare possit. Fugiendus igitur istiusmodi caseus est, cum neque ad concoctionem, neque ad morbitatem. De hoc autem edisserens Galenus libro x. simplicium medicamentorum, sic inquit. Itaque cum mihi olim caseus allatus esset bubulus, quem ex odore acrem esse coniciebam, abiici, & iam a famulis absumptum putabam: uerum illi talia seruare soliti, longo post tempore ex promptuario proferentes, quidnam de illo fieri iuberem, rogant. Cum igitur edendo non esset propter acrimoniam, ludicrum nobis problema exitit, proponentibus, cui rei quis illum utiliter posset accommodare. Interca cum ad me arthriticus quispiam in curru conuectus esset, tophos, quos Græci τώπας nuncupant, in articulis habens, subiit mihi crure suillo falso decocto caseum eo decocto macerare, ac probe in mortario subigendo uniri, tophis inponere. Et sanè arthriticus ab hoc medicamine magnificè adiutus est. Nam rupta sponte sua cute, absque incisione uidelicet, emergebant quotidie citra dolorem tophorum particule. Vbi autem torus, qui apud me erat caseus, fuisset absumptus, talem sibi alium comparans arthriticus in postero seruauit, & postea rursus usus est inueterato: atque ubi tunc quoque idem percepit incommodum, sæpius deinceps uti perseverabat, & quosdam amicos similiter affectos docuit. Atque id quidem nos excogitauimus: cæterum comprobauit, ac confirmauit experientia. hætenus Galenus. Ex quo palam fit, eiusmodi caseum esse omnino in cibus reprobandum. Qui uero nec recens, nec uetustus fuerit, cum & ipse non sit expers læsionis; minore tamen constat noxa. Præstat cæteris ouillus. Verum sicuti Pergamenum caseum Galenus in laudem suæ patriæ præcæte commendauit libro III. de alimentorum facultatibus; ita nec mihi sanè uitio uertendum existimauerim, si Hetruscum cæteris Italicis præferam, eum præsertim, qui in nostro Senensi agro, ac citiannum Florentino ex ouillo lacte conficitur, qui uulgo appellatur Cascio marzolino, gustu dulcis atque suauis, quod lac, ex quo paratur, coagulo non sit concretum, sed cinaræ floribus, qui passim uniuersa fere Hetruriæ coaguli uicem præstant: quo fit, ut senescens nunquam acris euadat. Cui nec alter cedit, qui in nostro agro præstantissimus fit ex caprarum lacte, mensis Septembri, recensq; estur. Hunc uulgo Rauaggiuolo appellamus. Defertur is Romam, quod à Præsulibus alijsq; primatibus summo opere expetatur. Quippe qui odoratas redoleat herbas, quibus ubique nostrates referti sunt colles, ipsq; præsertim, qui non longè distant ab urbe nostra. Bubulus præterea caseus, etsi plus cæteris nutriet, pinguiorq; existat; est tamen reliquis concoctu difficilior. Caprinus uero quanquam ex temperatiori lacte sit confectus; inueteratus tamen reliquis caseis est deterior, cum statim exiccetur, & friabilis fiat. Bubalinus denique in globos illos iuueis uinculis constrictus conformatur, qui nostris Mozze, Romanis autem Priuature uulgari sermone dicuntur. Is caseus, quo passim Hetrusci uescuntur, ori quidem gratissimus est, & dulcis, sed ægrè concoquitur, quod substantiam habeat admodum pinguem ac lentam. His accedit, quæ uulgo nobis Recotta dicitur. Fit hæc ex serosa lactis parte ad ignem decocta. Recens (si Auicennæ, Rasi, & Isach credimus) minus uentriculum uexat, quàm caseus onnis recenter pressus. Confert calidis defluxionibus obnoxiijs, sitim sedat, somnium conciliat: ueruntamen obest uentriculum frigidum habentibus, & neruorum morbis. Inueterata autem ægrè concoquitur, sitim excitat, parum nutrit, aluum cohibet, & flatus procreat. Reliquum est Serum, quod lactis aquosa est substantia. Hoc (ut Galenus inquit lib. x. simplicium medicamentorum) extergendi potestatem possidet, sumiturq; subducendi uentris gratia, ac per clysteres iniicitur, extergens, & ablucens sine mordacitate intestinorum acrimoniam. Præterea si quis ulcera, quæ sanie insistantur acri, uice aquæ sero colluat, optime sanæ fecerit. Præterea quæcunque medicamenta digerere solent ecchymomata, & atra, ea præstat sero, quàm aqua diluere. Sic etiam eo utimur ad sugillata, & hyposthagnata, peculiaribus ad hæc medicamentis commiscuites. Prætulit Mesues serum, quod ex nigrarum caprarum lacte elicitur, deinde quod ex ouillo, sic inquit. Aqua lactis macerationis materia est, & per se quidem innocuum medicamentum. Præfertur, quæ fit ex lacte nigrarum caprarum, in laudatis pascuis uictitantium, recenterq; foetarum. Excalfacit hæc, atque siccat ordine primo completo, & usque ad secundum. Quinetiam attenuat, abluat, abstergit, & nitrosa, qua referta est facultate, aluum absque aliqua mordacitate leniter subducit. Bilem tum flauam, tum atram ab exustis humoribus genitam deiecit: quo fit, ut mirificè conferat maniacis, & melancholicis. Præstat item ad uiscerum infarctus, & morbis inde provenientibus opitulatur: nimirum aqua inter cute laborantibus, felle suffusis, & lieuosis. Datur utiliter febrientibus

Caput lactis.

Casei consideratio, &amp; facultates.

Recotta vires.

Seri vires ex Galeno.

Ex Mesue.



Lactis facultates ex Gal.

tibus ex bile, & uiscerum, ac uasorum obstructionibus. Competit etiānum uitij in cute à bile, & perustis humoribus emergentibus. Quare lichenibus, uiliginibus, alphis, psoris, leprisq; admodum conuenit. hæc Mesues. Lactis autem facultates memoriæ prodidit Galenus loco nuper citato, ubi ita scribit. Lac ubi aliam quamprimum exiccantem facultatem habuerit adiunctam, optimum est remedium dysenteriae, & omnium uentris acrium fluxuum. Eam accipit à lapidibus, qui prædecocto ipsi iniiciuntur igitur. Porro eos esse oportet, quos uocant *νεόγαστας*. Et lac eoque decoqui debet, dum pleraque serosi in eo humoris absumpta pars fuerit. At nos iniectis ferros in ipsum cylindris candentibus eandem, aut etiam meliorem facultatem efficiunt. Porro lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per se, tum cum mollium collyriorum quopiam est utile: præterea ad hypopiam, & hypophthalmata. Quinctiam palpebris extrinsecus, ubi ophthalmia laborant, somno sese dant, impositum simul cum melleo saceo, & ouo, phlegmonas eorum concoquet. Sed hoc esto lac mulieris recens ex mamillis expressum. Infundimus ipsum & utero ulcerato tum per sese, tum ijs medicamentis commiscens, quibus misceri potest, utique citra morsum curantibus, & ubi in sede ulcera mitigamus præ saniei acrimonia dolentia, aut phlegmonas, aut rugas perpetuanda. Sic & ad ulcera pudendorum utimur, & omnia quæ leniri postulant, siue ob inflammationem, siue morsum, siue ob malignitatem. Eaq; propter & cancris applicatur ulceribus, medicamentis anodynis commixtum, qualia sunt, quæ ex pompholyge constāt. Et quid attinet commemorare, quod ore contentum, collutum, gargarizatumq; uel maxime phlegmonas eius mitigat? Sed & tonsillis, & columellam, & antiadas phlegmone affectas admodum mitigat, & proinde anginam. Atque ut semel dicam, medicamentum est leniens, totani quidem substantia habens mordacitatis expertem: sed multo magis, ubi concoctione moderata potissima pars serosi humoris absumpta est. Si mihi uidentur etiam medici ad uenena, quæ erosionem interimunt, lac dari suadere, uelut & lepus marinus intermiscit, & cantharis. Sed & sunt, qui exhibent ijs, qui aconitum, & thapsiam sumpsissent. Sed hæc ex ratione præcerunt. Quod Græci γάλα, Latini Lac dicunt: Arabes, Leben: Itali, Latte: Germani, Milch: Hispani, Leche: Galli, Lait. Caseus uero ita Latinis, τυρός Græcis uocatur: Arabibus, Lubon, seu Gieben: Hispani, Queso: Germanis, Kesen: Hispanis, Queso: Gallis, Fourmage. At Serum Latine dictum, Græcè ὀρός appellatur: Italicè, Siero: Germanicè, Molken: Hispanicè, Suero de leche. Gallicè, Ser du lait. Quod nique Græci βούτυρον, Latini similiter Butyrum nominant: Arabes, Zebd: Itali, Burro: Germani, Butter, & Anchen: Hispani, Manteca: Galli, Beurre, & Buyre.

Nomina.

† Illud hoc loco non pretereundum duxi, quod in Græco codice manu scripto non φαρμακόν, hoc est inflationem pariens, sed φυσικόν, id est, naturale legatur. quod lac potius stomachum iuuat, quam inflatione uexet: id enim innuit uerbum naturale. Hanc lectionem secutus fuisse uidetur Serapio: quippe qui ex Dioscoride ita transcribit. Et lac confert stomacho. Quin & facilis potuit esse librariorum lapsus ob uocum similitudinem.



Lanæ, & œsypus.

Cap. LXVII.

SYCCIDAE lanæ molles è collo, feminibusque laudatissimæ habentur. Subueniunt inter initia vulneribus, percussis, desquamatis, liuidis, ossibus fractis, aceto, oleo, aut uino imbutæ: si quidem facillè succos combibunt, quibus immerguntur, & ob pecudum sordem (sic enim œsypum vocant) emolliunt. capitis, stomachi, aliarumque partium doloribus, cum aceto, & rosaceo efficaciter imponuntur. Crematarum lanarum cinis crustas obducit, excrecentias in carne cohibet, & vlcera ad cicatricem perducit. Mundæ autem, & carptæ, in fictili crudo, cæterorum more, vruntur. Nec secus simbriati marinarum purpurarum flocculi cremari solent. Aliqui cum sordibus lanas carpunt, & melle irrigant, eodemque modo urunt. Alij in fictili oris patuli, verticula inter se distantia componunt, & concerptas carminatasque lanas, oleo ita suffusas, ut nestilulare quidem possint, assulis tedæ subiectis, & eisdem, lanisque permutatim interstratis, leuiter succendunt, & vltas tollunt. Quod si è reda pix, pinguitudine ulla profluit, collecta reconditur. Lac uatur



natur ad oculorum medicamenta. cinerem in labellis, aqua addita, manibus confricant, & confidere pariantur: idque sæpius, mutant aquam, donec linguam adstringat, nec mordeat. Oesypum vocant Græci, succidarum lanarum pinguitudinem: cuius parandi ratio hæc est. Succidæ molles, radícula non curatæ, calida aqua lauantur, & quibuscunque sordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur, magnoque impetu ligula, uti respumet, agitur, aut lignea rude validiusculè conturbatur, quo largius sordida spuma colligi possit, deinde marina respergitur: & confidente pingui, quod supernatabat, collectoque in altero fictili uase, denuo aqua in labellum fusagitur: spuma iterum mari perfunditur, & demum eximitur. hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguitudine, nihil prorsus spumæ extet. Collectum oesypum manibus emollitur, & si qua infedit spurcitia, confestim demitur: exclusaque sensim omni aqua, recentique affusa, manibus misceatur, donec admotum linguæ oesypum adstringat leuiter, nec mordeat, atque pingue, candidumque spectetur: tum in fictili uase conditur. verum omnia feruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigida aqua cluunt, & manibus, non secus atque ceratum mulieres, confricant: ita enim candidius redditur. Alij elotis lanis, & sordibus quibuscunque exemptis, ac lento igni in æneo uase ex aqua decoctis, pingue, quod supernatat, collectum aqua, ut diximus, lauant: colatumque in fictilem patellam, quæ calidam aquam contineat, linteo operiunt, atque soli mandant, donec candidum fiat, & satis crassum. Alij bidui spatio aquam effundunt, nouamque adijciunt. Melius est læue, radícula non curatum: quod succidarum virus oleat, & si manu in concha fricetur cum aqua frigida, albescat, nihil in se duri, aut concreti habens: ueluti quod cerato, aut adipe adulteratur. Oesypum excalfacit, explet vlcera, & emollit; præsertim sedis, ac vuluæ, cum meliloto, & butyro. In vellere appositum menses, & partus euocat: ulcera non aurium modò sanat, sed & genitalium cum anserino adipe: contra erosos angulos oculorum, scabiososque, genas quæ occalluerunt, & ciliorum defluuia, efficax est. In testa noua torretur, donec redactum in cinerem pinguitudinem amittat. Ex eo etiam fuligo colligitur, uti demonstrauius: quæ in oculorum medicamentis commodè addi solet.

CVM Lana succidæ, & earum sordida pinguitudo, quam Græci Oesypum appellant, & officinarum uulgus Isopum humidam uocat, plenissimè à Dioscoride descripta sint, nihil nobis hic relictum est, quod declarandum, uel adijciendum esse putemus. Caterum ἔπιον quod Græcis, Lana Latinis dicitur, pariter & Italis: Arabibus, Sauf, aut Suf: Germanis, Schmutziguolen: Hispanis, Lana: Gallis, Laine. Quod uerò Græcè ὀϊστυμός, Latini item Oesypus nominatur: Arabicè, Senferatab, siue Iusaratab: Italicè, Esipo: Hispanicè, Isopilho humido: Gallicè, Gresse de la laine forge.

## Coagulum.

## Cap. LXVIII.

LEPORIS coagulum tribus obolis ex uino, uenenatorum morsibus, cœliacis, dysentericis, & fœminis fluxione uulvæ laborantibus, ac reiectionibus à pectore, auxiliatur. sanguinem in grumos concretum discutit. Post menstruas purgationes appositum uulvæ cum butyro, præstat mulieribus, ut concipiant: potum uerò partus enecat, & à puerperio, pariendi spem adimit. Equi coagulum, quam hippacem aliqui uocant, priuatim cœliacis, dysentericisque conuenit. Hædi, agni, hinnuli, capræ laticornis, & dorci, apri, cerui, vituli, bubali que coagula, similes naturas fortuntur: contra aconiti potum in uino, & concretum lac in aceto conuenienter assumuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admotum, partus spem intercipit. Vituli marini, castorei vires representat: comitialibus, strangulatis uuluis, potu conferre existimatur. Sed si sit uituli marini, hoc experimentum est: aqua inspergitur, qua paulisper cum alterius animantis, tum præcipuè agni coagulum, maduerit: nam si erit syncerum, statim liquefcit in aquam: sin minus, consimile permanet. Excipitur autem catulis, qui nondum natate possunt. In summa, coagulum omne dissipata cogit, & coacta dissoluit.

ANIMALIUM coagulum (ut Aristoteles memoriæ prodidit lib. III. cap. XXI. de historia animalium) lætis substantia est: quippe quod in eorum uentriculo, quæ adhuc lactent, contineatur. Est ergo coagulum lac ignem habens intra sese, quod cum animalis tepore concoqucretur, caseum traxerit. Habent coagulum omnia ruminantia, & inter dentata utrinque lepus. Quò uetustius coagulum est, cò præstantius: tale enim profluuium alui mederi præcipuè potest: atque etiam quod leporis est. Sed laudatissimum hinnuli. hæc Aristoteles. Quòd autem leporis coagulum sanguinem reijcientibus conueniat, ut Dioscorides scribit, minime quidem probare uidetur Galenus lib. x. simp. medicamentorum ubi sic inquit. Coagulum omne acris, ac digerentis potentie est, ac nimirum etiam exicatorie: nam necessariò id superiora comitatur. Ac leporis quidem coagulum comitalem morbum, si cum aceto ebibatur, præterea profluuium mulicbre sanare proditum est: sed & lac in uentre coagulatum dissoluere: quod ceret nos experti sumus, non solum in leporino; sed etiam in aliorum animalium coagulo. Attamen leporini omnium est præstantissimum. Sed & sanguinem in uentre concretum simili modo epotum dissoluit, ac efficacius fortasse catolis leporinum: uerum non solum, quod quibusdam scriptum legitur, sed & hoc commune est omni coagulo. Qui-

Coaguli con-  
sideratio.

Coaguli fa-  
cultates ex  
Galeno.



Nomina.

dam autem sanguinis ex thorace reiectiones leporinum coagulum epotum suppressere prodiderunt. ceterum nec aliquenquam eo usum noui, nec ipse sum ausus acriter uti remedio ad affectum adstrictionem poscentem. Porro coagulum equinum ad dysentericos, et cæliacos accommodari scripserunt nonnulli. At phocæ coagulum eximie aptum esse quidam prædicant, tanquam uires obtineat castorij. Verum quæcunque proditum est, quodque coagulum secundum essentiam totius præstare proprietatem, non est nunc tempus exponere. Eius nomen Græcum πηγά: Latinum, Coagulum: Arabicum, Anfa, Anfhae, seu Anfha: Italicum, Caglio: Germanicum, Lypp, Kymn lypp, & Kaes hypp: Hispanicum, Coalho: Gallicum, Presseure.

## Adeps.

## Cap. LXIX.

ADEPS anserinus, aut gallinaceus recens, & sine sale conditus, ad uuluarum uitia proficit. Sale inueteratus, & qui temporis spatio aerimoniam concepit, uuluarum inimicus est. Recens exemptis membranis in fictilem ollam demissus, quæ altero tantopere capacior sit, quantus sit modus adipsis, quem curare institueris, obstructo diligenter uase, flagrantissimo soli exponitur: eliquescent inde humor in fictile alterum excolatur, donec adeps omnis absumatur: mox loco uehementer frigidus reconditur, & ad usum digeritur. Alij fictile fuleiunt super aquam, calidam, aut tenuem & languidam prunam, quæ solis uicem penset. Est & alia curandi ratio. Exemptis membranarum reponitur, coniectusque in ollam eliquatur, adiecto minuti salis momento: mox lineo colo transfusus reponitur. Utile in medicamenta additur, quæ lassitudines, & fatigationes leuant. Suius adeps, & ursinus hoc curantur modo. Recens, præpinguis, renibus potissimum detractus, in largiore aqua cælesti, & quàm frigidissima, exemptisque tunicis, diligentissimè manibus confricatur, & exprimendo ferme sicatur, subindeque noua aqua abluitur: ceterum fictili capacitatis duplæ inditus, in aquam demergitur, & subditis leuibus prunis spatha mouetur: eliquatusque colo transfunditur in aquam. Vbi uero refrixit, & guttatim aquam omnem exclusit, in prælorum fictile demittitur, & infusa aqua leniter eliquari debet, & manu deprimi, quod facilius faculentum uirus pessum eat: postea in pilam spongia madefactam transfunditur. ubi coire cæpit, recondens in imo sordes eximitur. Tertiò citra aquam eliquatur, repurgatusque, fictili bene operculato, perquam frigidis locis reponitur. Hireinum seuum, ouillum, ceruinumque ita curato. Elotum ex his quodcunque tunicis (ut in suilli mentione dictum est) exemptis, pilæ emolliendum tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentum uirus excernatur, aut pingue aliquod innatet, sed nitida spectetur. Deinde in ollam fictilem conijcitur, & adiecta aqua, ut superemineat, leui pruna liquefacito, & moueto, atque in aquam colato: cumq; refrixerit, iterum in loto fictili eliquato, & quæ antè diximus, facito. Tertiò sine aqua liquefactum, in persufam liquore pilam colato, refrigeratumque, ut in suilli ratione diximus, reconditur. Bubulum autem seuum, renibus maximè detractum, exemptis membranis, aqua marina ex alto petita eluendum est: mox in pila tundendum diligenter, affusa maris aqua. Cum uero dissolutum fuerit, in fictilem ollam conijciendum, & marina aqua, quæ non minus dohrante superemineat, proluendum. decoquendum, donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui Atticas minas quaternis Tyrrenicæ ceræ drachmis: excolatumque, detractis quæ pessum ierant sordibus, in nouo fictili reponendum, opertumque soli interdiu credendum, ut ad eandem reducat, & odoris uirus euanescat. Priuatim taurorum pingue sic curari debet. Renibus euulsim pingue profunde amnis aqua abluito, detractisque tunicis, fictili nouo, postquam exiguum salem insperferis, liquefacito: dein in nitentem aquam excolato: & ubi concretere cæpit, manibus iterum conficando uehementer lauato, aqua sæpius infusa, refusaque, donec quàm optimè elotum uideatur. Rursus in olla cum pari modo uini odorati decoquito, eum iterum efferbuerit, dempto ab igni uase, ibidem finito pernoctare: postridie si grauiter adhuc oleat, noua olla repetitum, uino odorato perfundatur, eadem quæ prius, fiant, dum omne uirus euanescat. Colliquatur & sine sale, præsertim affectionum earum causa, quibus sal aduersari solet: sed ita paratum non magnopere albescit. Eodem modo pardorum, ac leonum pingua curari oportet. Taurinum autem, & uitulinum pingue, necnon ceruinum, atque etiam huius animalis medulla, odoramentis imbuitur, hac ratione. Pingue, quod odoratum reddi debet, demptis, quo diximus modo, membranarum, elotum, & uino quàm odoratissimo, nulla maris aqua diluto, seruefactum, pernoctare finitur: alterum id generis uinum eadem mensura infunditur, colliquatur, & exquisitè colatur: nouemque eius heminis, iunci Arabici septem drachmæ adiunguntur. Quod si ipsum odoris fragrantioris fieri uoles, quadraginta floris eiusdem drachmæ, cum paribus palmæ, calami, & cassiæ modis adduntur: & xyloballami, aspalathi singulæ drachmæ: cinnamomi, cardamomi, & nardi, singulæ uncia. omnia exactius curantur, & affuso uino odorato, in uase operto, quod supra carbones firmiter collocatum sit, ter efferuescunt, & semoto ab igni uase inibi pernoctant. postridie uinum effunditur, aliudque generis eiusdem adijcitur. Ter simili modo bene conferuescat: deinde matutinis exempto adipe uinum effundatur, & abluto uase, si quid imò subsidens hæsit, detergetur. postremò eliquatum pingue, & excolatum, ad usum reconditur. Hoc autem modo odoramentis imbuitur, quod antea curatum est. Verum



antè dicta prius inspissari solent, quò facilius sibi odoramentorum uires adfiscant. Itaque assumens quodcunque horum uoles, cum uino feruefacito, impositis unà myrti ramulis, serpyllo, cypero, item aspalatho plenius tuso. Aliqui tamen ad hunc usum, uno duntaxat horum contenti sunt. Cùm autem ter efferbuit, exemptum leniter, & linteo colatum, aromatis, uti expositum est, imbuitur.

Adipibus spissamenta sic fiunt (quemcunque acceperis, oportet, ut recens tundatur.) Syncerus, & sanguinis expers adeps, reliquas habens notas, quas sæpe retulimus, in ollam nouam demittitur, infuso uino albo, uetere, odorato, quod semipedis altitudinem superet: lento igni feruecat, dum uernaculus odor aboleatur, planeque uinum redoleat. At ubi deposito uase refrixit, duæ adipis minæ in ollam mittuntur, & duo uini eiusdem sextarij, & seminis loti, eius inquam, cuius è ligno ludicræ tibie factitantur, tusi minæ quatuor adiunguntur: lento igni subinde miscendo decoquantur: cùmque odoris uirus euauerit, excolatusque adeps refrixerit, una contusi aspalathi mina, cum amaracini floris minis quatuor, & uetere uino subigitur. Nocte una hæc odorem rapiunt, combibuntue: postridie in fictilem ollam tricongiam ea omnia cum adipe iniecta, additis sextarijs tribus uini, una feruecunt, quousque & uim, & odorem spissamentorum adeps ipse contraxerit: qui eliquescent colatur, & reponitur. Quòd si maiorem odoris fragrantiam efflagites, drachmas octo quam pinguisimæ myrrhæ uino macerate, quod multos in annos asseruatum est, misceto. Galinaceus, anserinusque sic odoribus imbui solent. Cuiusuis eorum percurati sextarij duo fictili olla excipiuntur: cryliscetri, xylobalsami, palmæ elatæ, & calanii planè contusi, singulorum se-scentia admiscetur: uini Lesbii ueteris cyathus unus adijcitur: ea ter effereuescunt prunis, mox uas excolantur. ubi uerò adeps coierit, concha excipitur, fictilique nouo densius operto perfri-gidis locis reponitur. Hyberno tempore id instituere oportet: æstate siquidem pinguis non co-mnia coalescant. Eadem ratione suillus adeps, & ursinus, ceterique id genus, odoramentis imbu-untur. Verum sampsuchi odorem adeps ipse representabit hoc modo. Curati quàm optimè adi-pis, præsertim taurini, mina una, tempestiuique sampsuchi exquisitè contracti sesquimina miscen-tur, & insperso largiore uino digeruntur in offas, quæ in uase cooperto nocte quiescunt. Matutinis in fictili olla leuiusculo igni, affusa aqua leuiter coquantur: dumque suum adeps odorem exuerit, defæcatus, ac bene opertus, nocte tota permanet. postero die deterfa sorde, quæ pessum ierat, sam-puchi, ut dictum est, contusi iterum sesquimina priori pastillo adijcitur, eodemque modo in offas cogitur: aliis quæ diximus peractis, decoquitur, & colatur, & si qua fundo hæsit spurcitia, deradi-tur, & frigido loco reconditur. Si quis tamen incuratum adipem anserinum, gallinaceum, aut ui-tulinum à putredine tueri uelit, ita faciendum est. Quemuis adipem diligenter clotum, & siccatum in umbra super cribrum, per lintea munda manibus uehementer exprimat, linoque consutum um-broso in loco suspendat, & post inultos dies noua charta inuolutum, frigido loco recondat. Pin-guia autem indito melle uindicantur à putredinis uitio. Vis omnium est excalfacere, mollire, ra-refacere. Taurinus adeps, bubulus, & uitulinus aliquantum adstringunt. Earundem uirium com-positio: nam resiftere cum aiunt ijs, qui insidias moluntur. Ceruino, elephantinoque per-unctos, serpentes fugiunt. Adstringentior est caprinus: quæ ex causa decoctus cum polenta, rhoe prodest, datur quoque utiliter ijs, qui cantharidum uenena hauserunt. Hircinus, ut qui ualidissimè discutiat, podagricis auxiliatur, cum simo capræ, & croco impositus. huic proportionem respondet ouillus. Suillus uerò contra uulnæ, & sedis uitia idoneus est: ambustis igni medetur. E sue uetu-rissimus quisque sale conditus excalfacit, & emollit: clotus uino pleuriticis prodest: cinere, aut cal-ce exceptus inflammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asininum tradunt cicatrices cor-pori concolores reddere. Anserinus, gallinaceusque conueniunt muliebribus malis, & ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, & contra aurium dolores. Ursinum constat raptos uitia alope-cie capillos restituere, pernionibus subuenire. Vulpinus medetur aurium doloribus. Fluuiatilium piscium pinguis perunctis oculis claritatem afferunt, si in sole liquecant, & melli admisceantur. Viperae adeps contra oculorum hebetudines, suffusionesque efficax est, addita cedria, melle Attico, & pari olco uetere: pilos alis euulsos perunctis radicibus recens, & per se illitus obliterat, atque re-nasci non patitur.

TAM ET SI de adipibus, seuis, & pinguibus, quæ in medicum usum ueniunt, copiose, & abundanter locu-tus sit Dioscorides: utpote qui non eorum modò facultates & uires tradiderit; sed etiam rationem docuerit, qua illa curentur, spissa & odorata reddantur, & à putredine uindicentur; tamen cum de eorum natura, & facultate accuratius (meo quidem iudicio) copiosius etiam, & particularius disseruerit Galenus, nec uanum, nec à nostro institutū alienum duximus, hic ea omnia referre, quæ ab ipso memoria prodita sunt libro XI. simplicium medica-mentorū, ubi ita scriptum reliquit. Pinguedo, & adeps & hæc quoque communissima sunt inter animalium partes. Nam omnia, quæ benè nutriuntur, aut pinguedinem, aut adipem obtinent. Quæ uerò macilentia sunt, ma-lesq; nutriuntur, sæpe omnino ne habere quidem apparent, sæpe uerò adeo pauculum, idq; stecum, ut ægre uti pos-

Pinguedinis uires ex Gal.



sis. Porro differt à pinguedine adeps crassitie: ac propterea auimantibus totam naturam terrofiorem habentibus adeps prouenit, uelut humidioribus pinguedo. Proinde pinguedo celeriter ab igne liquefit, nec facile, ubi liquata fuerit, rursus concrefcit, cogiturque. At adeps nec facile funditur, liquefcitque, & fusus celerrime coit, ac congelatur, multoque apparet pinguedine durior. Sus enim bene nutritus, pastusque multam habet pinguedinem, ob naturalem temperamenti humiditatem. At boues, & capræ, & quæcunque id genus cornigera, ob siccitatem adipem plurimum generant. At tu si uoles, oleosam, & pinguem in animalibus substantiam omnem adipem appellato, ut plerique medici. Sed & pinguedinem appellare totum hoc genus tibi licet. Non tamen licet tibi citra mendacium adipem caprinum humidiores esse dicere, quam suum. Nam hic omnium ferme aliorum est humidissimus, ac proinde actione sua uicinum oleum possidens, quanquam oleo magis tum emolliat, tum concoquat: ac proinde cataplasmatibus, quæ ad phlegmonas accommodantur, commisceri solet. Qui uero mordicationes perpetiuntur aut in recto intestino, aut in colicis, potius caprinum adipem, quam suillum iniicimus: non quod acrimonia plus obtundat (nam ex natura sua suillus quod capritius ob crassitiam citius concrefcit, suillus autem instar olei defluat: proinde ipsum potius dysentericis, & tinctis inofis iniicimus, quando morsum eorum mitigare consilium est. Porro ob tenuitatem partium nonnulla acrimonia minus retundunt, ubi nimirum in alio mordicatorum corporum, quod molestum est, hæserit. Nam quod crassarum mordicantium partium, minus; magis autem quod subtilium partium est, tota corpora penetrat, & omnibus ipsum saniebus mordicantibus permiscetur. Hac ratione adeps aserinus, quæ in alto corporum mordicant, magis obtundit: sed & suillo calidior est. Horum tamen in medio est gallinaceorum adeps, ac gallinarum. Porro calidior semper, ac siccior est masculorum animalium, & horum ipsorum exectorum minus tum calidus, tum siccus. Quippe mas castratus esse semper generis feminae assimilatur. Hoc autem sermonis caput commune est, cuius meminisse oportet: Pro animalium temperatura semper existere differentias eius, quæ in illis est, pinguedinis, aut adipis, aut quocunque modo appellare libebit totum hoc genus corporis in animalibus oleosi, & pinguis. Igitur cum sus omnibus prope quadrupedibus animalibus in caliditate, ac siccitate inferior sit; proinde pinguedinem quoque minus habet calidam, magisque humidam. Omnis igitur pinguedinis facultas est humectatoria, & excafcatoria humanorum corporum. Huius enim meminisse perpetuo oportet in principiis huius operis dicti. At differentie, quæ sunt cuiusque singulatim, in maioris, minorisque ratione sunt. Nam pinguedo suis, ut ad nos quidem, largius humectare potest, sed non æquæ excafcare, ut oleum: uerum pinguedinis suum talis est caliditas, qualis spectatur in nobis. Porro taurorum adeps suillo multo calidior est, & siccior. Rursum id & hic memoria repetentibus nobis, marem scemina esse tum calidiores, tum sicciores: marem autem castratum assimilari scemina, uelut quicquid inuenilis est ætatis. Et inter inuenilia scemina mare humidiores est, & minus calida. Sic & adeps uitulinus, taurino minus tum calidus est, tum siccus: & hædorum, quam caprarum, sed & caprarum minus, quam hircorum. Et rursum taurorum minus, quam leonum: nam horum adeps omnium prope quadrupedum adipe potentius digerit. Nam & ipsorum calidissimus est, & maxime tenuium partium. Itaque si per se medicamentis ad ulcera, & phlegmonas conuenientibus commisceas, non modo nihil adiuueris, uerum etiam inferis, nimirum addita maiori, quam conueniat acrimonia. Inueteratis tamen tumoribus atque scirrhi in morem induratis, tum ueruorum curuaturis (ἀρρώστας Græci uocant) & in summa quæcunque scirrhusa sunt, ijs aptissimus est, in quibus sanè inefficacissimus apparet suillus. Taurinus autem ab utroque ex æquo distat, ut quanto calidior, secior suillo est, tanto superetur à leonino. Itaque tanquam in medio consistens, merito utrique medicamentorum miscetur generi, & ijs scilicet, quæ scirrhusis medentur, & ijs, quæ phlegmonas concoquunt, cuiusmodi est tetrapharmacum, quod uocant, ex cera, resina, pice, & adipe constans. Nam siue in hoc taurinum, siue uitulinum, siue hircinum, siue caprinum, siue suillum indideris, semper puri mouendo aptum, & concoctorium medicamentum effeceris. Sed suillus ad addatur, in pueris, & sceminiis, & ut breuiter dicam, omnibus, quibus caro est mollior, competit. Sin taurinum addeceris, scissoribus, & messoribus, & omnibus carnem duram habentibus, siue ob naturalem temperiem, siue ex ratione, ac forma uite, conueniens effeceris. Ceterum adeps omnis dum inueterascit, se ipso & calidior, & tenuior efficitur, ac proinde quoque magis discussorius. Verum id omnibus ferè inueterascentibus accidit, quæ quidem putrefactæ, non anticipent. Nam uinum, mel, acetum, frumentum, butyrum, lana succida, oleum omne, siue lentissimum, siue cicinum, siue raphaninum, siue ipsum quod ex oliuis conficitur, uetustate & calidiora, & tenuioris essentie efficitur, ac proinde gustantibus apparent acriora, & ad induratos, ægreque solubiles affectus omnes adhibentibus potentius digerentia. Atque ego sanè gustantibus acriora uideri dixi. At quidam, quibus studium est nominum significans corrumpere, non acria, sed adstringentia uocant id genus omnia, adusque piper: tanquam intersit nihil, adstringens, anacre dixeris. Esti demum illos roges de galla, myrtis, mespilis, mali punici putaminibus, quæ sidia uocant, rhot, & omphacio, & hæc dicunt adstringere: tametsi aduersissimum ex illis sensum percipiamus ei, qui in nobis fit à pipere, pyrethro, uapy, euphorbio, cepa, allio, & adarce. Igitur si quemadmodum adstrictionis uocabulum de utroque affectu, quem gustu percipimus, communiter efferunt, si ipsos quoque affectus unam habere naturam existimant, quid uis aliud potius habendi sunt, quam homines, ut qui soli proprios sensus obtineant. At si omphaca, rhoa, gallam, ballastum, hypocistida contrahere, constringereque nostram fateantur substantiam: secernere uero, modicare, ac penetrare, piper, napy, pyrenthrum, improprie adstringentia nuncupant, quæ mordicant, & excafcant: ceterum in cogitoscendis ipsis medicamentis non peccant. Verum si oportet coniectantem dicere, an in uocabulis, aut in rebus hallucinentur, equidem in uocabulis potius falsos uiros illos dixerim, & maxime quibus Græca lingua insuta est, quælis est Dioscoridis Anazarbensis. qui profecto multa bene dixit eorum, quæ de materia medica memorie prodidit, ceterum significata Græcarum uocum non satis pernouit. Hic ergo cum ait magis esse adstrictorium adipem caprinum suillo: si quidem acriorem significare uelit, per magis adstrictorium, accipimus sermonem ceu uerum. At si ille



lud, talem habentem qualitatem, & facultatem, qualem rhus, rheon, hypocistis, balauftium, haud uerum esse sermo-  
nem dicemus. Porro quoniam uiperarum adipem, ubi radicitus pilos sub alis euulseris, prohibere illos recrefcere il-  
litum referunt, uisum est mihi eius facere periculum esse satius: at ubi prout iubent, feciffem, mentitos couperi, sicut  
etiam quod initia suffusionum sanat. Verum urforum adipem alopecias curare uerè scripserunt: cum tamen proba-  
tiora habeamus ad eum affectum remedia. Porro cum dicant tamen uulpinum adipem dolores aurium sanare, atsq;ue  
ut explicant, quos aurium dolores dicant, ceu nō noscentibus ipsis distinguere, quæ dicunt, attendendum non est.  
Alij piscium adipem laudant, tanquam ad suffusiones, aut quemcunque alium affectum nominare uelint, congruat.  
Alij non simpliciter piscium, sed addunt sinuatilium: alij uerò potius marinorum, quò uidelicet aliquid plus scire ui-  
deantur, quam uulgo. hæc Galenus. Cæterum de Tassi pinguedine, quæ (ut experimento manifesto constat) con-  
lenus, & Paulus. Nec præterea Galenus pinguedinis curandæ, ac parandæ rationem nullam, quod sciam, tradidit:  
nec quibus odoramentis ueteres pinguedinem imbuerent, & in unguenti morem conficerent. quemadmodum hac no-  
stra ætate unguentarij illam parant, quam uulgo POMATA uocamus. Ea autem hoc modo paratur. Sumunt cer-  
uini adipis, aut hædi binas libras: suilli uerò recentis uncias sex: deinde exemptis membranis, uino albo lauant, expri-  
muntq; tandiu, donec uinum omne exeat. Post hæc elotam pinguedinem in fictile nouum, uitro, uel plumbo oblitum  
conijciunt, additis nardi Indici granis tribus, caryophyllorum semuncia, nucis myristicæ drachmis duabus, ualis ap-  
pianis, uel syluestribus semicontusis senis, uel septenis. Hæc omnia in sufficienti aquæ rosacæ quantitate macerant  
die una: deinde lento igne tandiu decoquunt ut uas operculo contegentes, & rudicula sæpius miscentes, quousque uni-  
uersa ferè aqua euanescat. Percolant deinde linteolo spissiori subdito uase mundo, aqua rosarū madente, dimittuntq;  
concrefcere. Quo facto in fictile nouum iterum conijciunt, adiectis olei amygdalini dulcis uncias sex, ceræ albæ un-  
cijs quatuor, & ad ignem colliquant, ac postmodum linteolo percolant in nitidissimum catinum aqua rosarum affusa:  
simuntq; concrefcere. Demum eadem aqua moschum experta, aut alijs refragantibus aquis, tandiu lauant rude mi-  
scetes, donec unguentum illud ad summum albescat. Tunc enim extrahunt, & nitreo uase recondunt, seruantq; in  
frigido loco, ne raucorem contrahat. Hoc in Italia frequentissimum obtinet usu ad labiorum, manuum, & manui-  
larum rimas, tam à frigore, quam ab acri succo factas. Utuntur eo præterea ad desquamatam cutem, & ad crustosas  
papulas, quæ pueris in capite euascentur. Sunt qui ei corallia porphyreo lapide leuigata admisceant, ut melius, ei-  
tusq; rimæ occludantur. Alij uerò cinnabarin addunt, ut flammæum reserat colorem. Porro (ut libro tertio de  
facultate alimentorum scribit Galenus, & Isach Arabicus in dietis) Adeps omnis in cibis sumptus uentericulum effun-  
dit, appetentiam deiecit, pituitam auget, parum nutrit, succum illaudabilem gignit, alui fluxiones commouet, reten-  
culis facile in bilem uertitur, & in uapores caput potentes. Quare adeps est potius in ciborum condimentis, quam in  
alimentis expetendus. Στέαρ Græcis, Latinis adeps, & pinguedo appellatur: Arabibus, Menim, Vxaham, siue  
Sabam: Italis, Grassio: Germanis, Fettigkeit, & Schamaltz: Hispanis, Gordura: Gallis, Grasse.

Pomata pa-  
randa ratio, &  
usus.

Adipis in ci-  
bis facultas.

Nomina.

## Medulla.

## Cap. LXX.

LAUDATISSIMA est ceruina, mox uitulina, post hanc taurina, dein caprina, & ouilla. Col-  
liguntur ætatis exitu, cum appetit autumnus: qui quippe cum aliis anni temporibus concrementum san-  
guinis, & ueluti caro friabilis, in ossibus inueniatur: nec facile cognosci potest, ni quis eam ossibus  
extrahat, & recondat. Omnes medullæ molliunt, calfaciunt, rarefaciunt, ulcera expleant. Ceruina  
perunctos uenenata fugiunt. Curantur recentes, adipis modo, aquæ resperfu subactæ, selectisque os-  
sibus tantisper elotæ, & in linteum expressæ, donec aqua syncera emanet; & deterfa sorde pinna, si-  
qua innatet, liquata in duplicato uase in pilam exprimentur: & ubi coiere, omni facie, quæ ad ima-  
sedit, derafa, fictili nouo reponuntur. Quod si libet incuratas reponere, facito omnia, quæ de anse-  
rum, & gallinarum adipe demonstraui.

MEDULLA, ut scriptum reliquit Galenus libro. XI. simplicium medicamentorum, uim habet indurata, &  
scirrhusa corpora emolliendi, siue unsculis, siue tendonibus, siue ligamentis id accidat, siue etiam uisceribus. Opti-  
mam semper expertus sum ceruinam: deinde ipsorum iuniorum bouum, quos nitulos etiam nominant, ac proinde me-  
dullam eorum uitulinam appellant. At hircorum, & taurorum tum acrior est, tum siccior. Itaq; durities scirrhusa  
dissoluere nequit, siqua etiam memoria manet eorum, quæ in quinto libro de his sunt prodita. Ex uitulina igitur,  
& ceruina medulla pessi componuntur uteros emollientes. Et extrinsecus uteris medicamenta imponuntur, quæ ex  
medulla præparantur, uim habentia emolliendi. Accipitur autem non solum medulla ex ossibus, quæ sanè re uera est  
medulla; sed & ex spina, quam & ipsam medullam nominant, spinalem uidelicet: quæ tum durior, tum siccior est,  
quam alia. Illa enim mollior est & pinguior: ac proinde ego spinalem seorsum per sese absq; illa repono. Sed ea mihi  
utriusque medullæ cura est, ne aut putrescant, aut situm colligant. Itaq; in hyeme priuim eas capio, uelut & adi-  
ta sunt & humida, multum etiam qualitatis suæ illis impartiunt, ut aciores fiant medullæ. At si quando ambiente  
calido, & austrino medullas, aut adipem uoles reponere, paratum sit in hoc cubiculum neque calidum, qualia ferè  
sunt quæ meridiem spectant (putrescunt enim in talibus) nec humo proximum, atque humidum (nam in talibus sitim  
contrahunt) sed supernum atque excelsum, & ad aquilonem obuersum, paruas habens fenestras apertas, ut tam no-

Medullæ ui-  
res ex Gal.

ctu,



*At, quàm interdiu ab Arcto spirantes uentos accipiat . haftenus Galenus . In usu uerò ciborum spinalis medulla id nutrimenti corporibus exhibet, quod cerebrum . Idcirco pituitosum, ac crassum generat succum, egrè concoquitur, uentriculo nocet, nauscam concitat : robustis tamen uentriculis concocta, bonum præbet alimentum . Porro quæ ex ossibus elicetur medulla, quanquam largius sumpta uentriculi appetentiam destruat, pituitamq; gignat : si tamè probè conficiatur, ualentissimè nutrit, magisq; ori placet, quàm spinalis, quòd hæc sapidior sit in omnibus suis partibus .*  
*Μυελός Græcè , Medulla Latine uocatur : Arabice , Mochial balhadam, seu Moch simpliciter : Italice , Midolla : Germanicè , Marck : Hispanicè , Tuetanos, & Tutanos : Gallicè , Moelle .*

## Fel.

## Cap. LXXI.

**FEL** omne reponitur hoc modo . Recens præligato ore folliculi lino tandiu demissum in feruentem aquam, dum quis spatium trium stadiorum percurfaret, mox exemptum siccatur umbræ loco, asperginem non redolente . Sed quod ad oculorum medicamenta adijci solet, ligatum lino in vitreum vas, quod mel habeat, immittitur : circumuoluto ad os uasis lini principio, & aperto vase reconditur . Est autem omnis fellis uis acris, & excalfaciens : intensus tamen, & remissis uiribus differunt . Siquidem præstantius in effectu esse uidetur fel marini scorpionis, & piscis qui callionymus appellatur, marinæ testudinis, hyænæque : item perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, & syluestris capræ . quod priuatim prodest contra suffusiones incipientes, & oculorum caligines, argemas, & genarum scabritias . Ouillo, suillo, hircino, atque ursino, taurinum multò efficacius . Felle omni perfacilem, præsertim infantibus, deiectionem quis molietur, si intinctum eo tomentum, aut fimbriam sedi subiiciat . Priuatim taurino anginæ cum melle perunguntur : sedis ulcera sanat, & ad cicatricem usque perducit . Idem auribus fractis, & purulentis cum muliebri lacte, aut caprino instillatum, medetur : & sibilo earundem ex porri succo . Admisceri insuenit vulnerarijs emplastris, & circumlinationibus, quæ contra venenata parantur : phagedænicis ulceribus, colis, & scroti doloribus ex melle prodest : lepras, furfures cum nitro, & terra cimolia quàm optimè purgat . Ouillum, & ursinum contra eundem pollent, verùm inefficacius hæc præstant . Ursinum eclegmate comitiales adiuuat . Fel testudinis anginis, & in ore infantium nomis, prodest : naribus inditum comitiales erigit . Syluestrium caprarum felle peculiariter peruncti lusciosi sanantur . Hircinum idem obit munus : thymia abolet, & luxuriantes elephantorum extuberationes illitu reprimunt . Suillum autem contra aurium ulcera, reliquaque omnia magno usu assumitur .

Fellis uires  
ex Galeno .

Fellis bubuli  
lapis, & eius  
uires .

Nomina .

**Q**UANTVS de fellis reponendi ratione, atq; etiam de eius uiribus abundè scripserit Dioscorides ; non tamen ob hoc prætermittenda existimaui nonnulla, quæ à Galeno libro x. simplicium medicamentorum de fellis facultatibus scite memorie sunt commendata . Est igitur fel ( auctore Galeno ) succorum, qui in quoque sunt animalium, calidissimum . Itaq; sicuti sanguinem, & carnes dissimiliter temperata obtinent animalia, eadem ratione & fel . Quocirca calidissimorum fel, aliorum quoq; animalium fel excellere necesse est : & quæ illis minus sunt calida, proportionè hunc humorem illis inesse minus calidum, quantò scilicet & in alijs sunt inferiora . Cæterum hæc differentiæ habentur non modò pro diuerso animalium genere, quòd hæc magis, illa uerò minus calida sint : uerùm etiam pro diuerso eiusdem generis animalium temperamento, ac etiam irritamento . Quandoquidem fel tauri interfecti, qui finibus adlatus gatus, uolenterq; diu tractus, & cursu, & canum latratu defatigatus, & sitim, famemq; & multum laborem perpassus fuerit, ab eius felle plurimum differre inuenietur tum substantia, tum colore, tum facultate, qui in pascuis latet, liberq; uitam desidem, ac quietam duxerit . Nam defatigati, ac uexati animalis fel substantia crassius erit, color re nigrius, aut uiridius, aut magis caruleum, magisq; erugini simile : ob idq; etiam longè calidius erit, quàm alterius qui in pace, & otio degerit . Ideoq; fel animalium quantò tenuius est, ac colore constat dilutiore, tantò minus asperius, & magis colore saturatis excalfacit . Gignitur in bubulo felle lapis quidam nonnunquam oui magnitudinis, croceo colore, facileq; friabilis, cuius Dioscoridem, & Galenum meminisse non reperio . Hic ( ut plerique perhibent auctores ) potus, uesicæ calculos comminuit . Naribus inditus uisum mirificè acuit, & aquam in oculos fluentem inhibet . Tritus lentis quantitate, & betæ succo commistus, & in erinis naribus attractus, comitialibus subuenit . Non desunt etiam qui idem magno successu ex uino exhibeant potandum felle suffusus . Denique auratæ, lupi piscis, perdicis, & galli gallinæ felle mirificè delectantur in coitu foeminae, si uiri penis eo perungatur . Quod Græcis ροσι, Latini, Fel appellatur : Arabibus, Saratec, aut Merara : Italis, Fiele : Germanis, Goll : Hispanis, Hiel : Gallis, Fiel .

## Sanguis .

## Cap. LXXII.

**SANGVIS** anseris, anatis, & hædi, utilissimè in antidota miscentur . Palumbi autem, turturæ, & columbæ, necnon perdicis, oculis cruore suffusis, & recentibus eorum uulneribus, lusciosisque illinuntur . Peculiariter columbæ sanguis, cruorem membranæ cerebri erumpentem inhibet . Hirci, capræ, cerui, & leporis sanguis inassatus sartagine, dysenterias, & celiacorum profluvia sistit : in uino potus contra toxica efficax est . Leporinus sanguis ita ut tepet illitus, uitia cutis in facie, lentiginèsque emaculat . Caninus commodè ab his bibitur, quos efferata in rabiem bestia momorderit : contra epotum toxicum auxilio est . Testudinis terrestris sanguinem epotum tradunt prodesse .



disse comitialibus. Marinae autem testudinis cum uino, & leporis coagulo, cuminoque contra serpentium morsus, & hausta rubetae uenena conuenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duritias discutit, emollitque. Sanguis equarum, quæ admissuram expertæ sunt, in medicamenta additur, quæ erodunt, septica uocant. Sanguine chamæleonis genarum palpebras euelli creditum est. Hoc idem uiridium ranarum sanguine præstatur. Menstruus sanguis fœminarum, circumlitu conceptum inhibere existimatur: aut si omnino mulier menstrua supergrediatur. leuat podagrae dolores, & ignem sacrum illitus.

<sup>10</sup> DISSERENS di sanguine Galenus, statim initio libri x. de simplicium medicamentorum facultatibus, et si minime eat inficias, quin animalium sanguini aliquid insit, quod medicamentorum usui rectè competat, ut Dioscorides, & plerique alij, qui de eius uiribus scripserunt, liquidò affirmarunt: declarat tamen, multa de sanguinis uiribus à scriptoribus esse prodita, quæ factò periculo fabulosa potius, & uana reperiuntur, quam uera. Siquidem, ut idem refert Galenus, falsum sanè esse omnibus in confesso est, quòd epotus noctuæ sanguis difficulter spirantes sanitati restituat. Vespertilionum uerò perunctis uirginum mammis, eas extuberare non sinat: pilosque renasci inhibeat, ips partibus illitis, unde receuter ipsi euulsi fuerint. Falsum similiter esse asserit, comitiales ebibito agni sanguine curari: pilosque è palpebris euulsos renasci prohiberi uiridium ranarum cruore. Quibus facillè conijcere possumus, hoc in loco Dioscoridis codicem librariorum fortasse culpa mendosum esse. Quippe quòd ibi legatur, oculorum palpebras ranarum uiridium sanguine depilari, cum potius Galeni testimonio (et si sententiam hanc non approbet) euulsi in palpebris pili barum sanguine renasci prohibeantur. Quin & aliud huic capiti mendum subesse uidetur: quòd hic ea, quæ de admissariorum equorum sanguine prodidit Galenus, de equarum sanguine, quæ admissuram expertæ sunt, legantur. Nisi fortè interpretum uitium sit, qui sexum in Dioscoride perperam mutarint. Præterea inquit Galenus: Tametsi non desint, qui turturis, uel columbæ sanguinè præferant in perforata caluaria, ubi rosaceo melius inuenire nihil possis: nonnulli uerò laudibus extollant gallorum, gallinarumque sanguinem ad sanguinis florem è cerebri membranis: crocodili uerò terrestres ad roborandam oculorum aciem: admissariorum equorum, quòd septicus sit, ad exulcerandam ubique cutem: domesticorumque murium ad *ἀποχρηδύας* Græcis uocatas; id tamen nunquam experiri uolui. Metuebam enim (inquit) ne curiosus, uel stolidus uiderer, si tantis, tamque probatis remedijs semel præteritis confiderem, sanguinem horum animalium illis plus posse præstare. Quòd si quis hæc experiri uolet, certò scio, damna bit non modo, qui talia scripserunt, sed & se delusum factò periculo reperiet. Taurinus autem sanguis epotus antea quam concreseat, inter deleteria recensetur medicamenta, quòd haurientem protinus strangulet, ut sexto uolumine diffusius dicitur. Eius uomen Græcum *αἷμα*: Latinum, Sanguis, Arabicum, Dem: Italicum, Sangue: Germanicum, Blut: Hispanicum, Sangre: Gallicum, Sang.

Sanguinis cōsideratio.

Vana sanguinis experimēta.

Nomina.

## Fimum.

## Cap. LXXIII.

<sup>40</sup> ARMENTARIAE bonis fimum, si recens admoueatur, uulnrum inflammationes mitigat: folijs autem inuoluitur, & calfactum cinere feruenti superponitur. coxendicis cruciatus fotu compescit: illitum ex aceto duritias, panos, & strumas discutit. Priuatim suffitu fimi, quòd à masculo boue redditum est, procidentes uulue reprimuntur: accensum odore culices abiguntur. Fimum caprarum, præsertim in montibus degentium, potum in uino, regium morbum emendat: menses cit cum odoramentis haustum, & partus euocat. Tritum in farinam, & impositum lanis cum thure, fœminarum profluvia sistit, cæterosque sanguinis impetus ex aceto cohibet. Medetur alopecij exustum, & cum aceto, aut oxymelite illitum: cum axungia uerò impositum his, qui podagra tentantur, auxilio est. Caprillum in aceto decoctum imponitur serpentium morsibus, ulceribus quæ serpunt, igni sacro, & parotidibus. Vitalem ischiadici uestionem hunc in modum accipiunt. In eo interstitio, ubi pollex brachiali committitur, caua ueluti lacuna sublidet, in qua lana olco imbuta substernitur, deinde sigillatim feruentes stercoris caprini pilule imponuntur, dum uapor per brachium ad coxam sentiatur peruenire, & coxendicis dolorem mitigare. adultio id genus Arabica appellatur. Quillum ex aceto illitum sanat epinyctidas, clauos, peniles uerrucas, thymos, & ambusta igni, rosaceo cerato exceptum. Fimum suis syluestris aridum, in aqua, aut uino potum, reiectiones sanguinis sistit: uetustum lateris dolorem mulcet: ad rupta, & conuulsa ex aceto bibitur: luxatis cum cerato rosaceo medetur. Tam asinorum, quam equorum fimum, siue crudum, siue crematum, addito aceto, sanguinis eruptiones cohibet. Armentarii, qui herba pascitur, siccum fimum liquatum in uino, mox potum, contra scorpionum ictus magnopere auxiliatur. Columbinum uehementius & excafcit, & urit: cum hordeacea farina mistum, strumas ex aceto discutit: carbunculos emarginat, tritum cum melle, lini semine & olco: ambustis igni medetur. Gallinaceum uerò omnia eadem, sed inefficacius præstat: priuatim tamen contra uenena fungorum, & coli cruciatus ex aceto, aut uino bibitur. Ciconiæ fimum, si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini fimi thuræ, & mulso calculos expellit: subditæ infantibus muscerdæ, alui deiectionem promouent. Caninum, quòd flagrantissimo canis sydere fuerit exceptum, cum uino, aut aqua potum, sistit aluum: Humanum stercus illitum, uulnera ab inflammatione uindicat, & obiter intumescere non patitur: sed



sed ea statim glutinat. sicco ex melle anginae perungi commodissime traduntur. Terrestris crocodili simum, crocodileam vocant, quae mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremque seruat. Optima est candidissima, & friabilis, amyli modo, minimè ponderosa, in humore statim eliquescentis: quae cum teritur, fermenti acorem quadantenus refert. Adulterant eam sturnorum fimo, quos capros oryza pascunt, ipsumque non dissimile vendunt. Alij amyllum, aut cimoliam miscent, & adscito anchura colore per rarum cribrum paulatim exprimunt, ut se contrahat in vermiculorum speciem: qui siccati pro crocodilea vaneunt. Inter omnes conuenire inuenio, humanum sterces, caninumque gutturi impositum, anginis auxiliari.

Stercoris uires ex Gal.

Humani stercores experimentum.

Aqua, & oleum ex humano stercore.

Bubuli sterces uires ex Gal.

Caprini sterces uires ex Gal.

STERCVS, ut posteritatis memoriae prodidit Galenus libro x. simplicium medicamentorum, uim habet uel maximè digerentem. Verum humanum ob foetorem abominandum est. At bubulum, caprinum, crocodilorum terrestrium, & canum, ubi ossibus duntaxat uestiuntur, neque grauitè olet, & multa experientia non tantum nobis; sed & alijs medicis me natu maioribus comprobatur est. Siquidem Asclepiades, cui cognomen um erat Pharmaceon, & alia omnia composita medicamenta collegit, ut uultos impleret libros, & stercore ad multos saepe affectus utitur non modò medicamentis, quae foris inponuntur commiscens; sed ijs quoque, quae intrò in os sumuntur. Ceterum humani stercores hoc habeo experimentum. Assidue quidam à phlegmonis ad fauces existentibus uexabatur, adeò uehementer, ut suffocationis subiret periculum, & sanè ob hoc periculum uenam secare cogebatur. In hunc cum quis incidisset, pollicitus est se praebiturum medicamenti experimentum, & se uocari, si quando rursus aliqua in parte gutturis emicuisset phlegmone, ante sanguinis missionem praecipit. Itaque uocatus, medicamento illito, statim hominem curauit. Ut autem iterum profecit, non in ipso tantum; sed & in alijs, qui similiter erant affecti, rogabat is, qui assidue suffocari periclitabatur, data mercede, ut se medicamentum illud doceret. Erat enim ille & locuples, & in pecunia sumptu liberalis. Porro ubi conuentum esset de pretio, is qui uendebat scripturam: Hoc medicamentum, inquit, per antipathean quandam utilitatem obtinet. Esse autem eam antipathean, ut qui curatur nesciat, unde coniciatur. Iussit itaque alium daret, qui pro ipso disceret, quique iureiurando reciperet, sese nulli eius medicamenti facerem copiam, priusquam ipse, qui dedisset, foret defunctus. Itaque à morte eius, qui indicarat, non tantum ille qui didicerat, suum hominem; sed & alios sanabat: & mihi ne petenti quidem medicamenti exemplum uolens ac libens obtulit. Erat autem sterces pueri siccum, cum melle Attico ad leuorem tritum. Victitabat autem puer, cuius sterces accepturus erat, ut ipse qui medicamentum dederat ostendit, lupinis, illis uidelicet, qui ex more edi solent cum panis bene cocto in clibano, modicum salem, & fermentum habente. Praebat autem bibendum uinum uetus: atque haec omnia mediocri in quantitate, modò ut perfecte ea puer posset concoquere. Itaque cum primo die eo uictu esset usus, postero tamen die nondum sterces capiebat, sed in eo quoque die rursum eodem alebat uictu, ac tertio denum excrementum sumebat: ac postea aresfacto utebatur, similiter ut stercore canino, ut ante dictum est. Dicebat autem illum, qui docuerat, fugitantem alios cibos ob foetorem, praetulisse lupinos: sese uero experimenti gratia, carnes gallinaceas, aut perdicum ex aqua, aut tenui iure bene coctas persaepe exhibuisse, & medicamentum nibilo minus operatum. Atque ego sanè haec tibi de humano stercore uarrare possum, haec Galenus. Ceterum fit ex humano stercore nitreus origanis aqua, praesertimque ex eo, quod homo rufus excreuerit, quae cuniculosis, exedentibus, sinuosis, & conuulsiuibus ulceribus mirifice opem praestat. Delet & oculorum argemas, ac uibeculas. Quinetiam carcinomata sanat exterius adhibita. Intus uero sumpta comitiales iuuat: lapidem in renibus, & uestica comminuit: aqua intereunte laborantibus prodest: item & ijs auxiliatur, qui non modò à cane rabido demorsi sunt; sed etiam ab omnibus alijs animalibus icti, quae uenenum eiiculantur. Porro oleum, quod post eius stillatitiam aquam ab organo emanare solet, carcinomata, sinus, aliisque ulcera, quae Graecis cacoethae dicuntur, etiam ualentius sanat. Bubulum deinde sterces (ut idem Galenus citato loco scriptum reliquit) exiccantis, attrahentisque & ipsum est facultatis, ut palam facit, dum apum uespasumque morsus iuuat. Atque haec ut à proprietate substantiae totius iuuentur, fieri potest. Ceterum humidum illud uere collectum, cum boues herbas depascuntur, impositum rusticorum phlegmonas discutit, & aqua intereunte laborantes iuuat. Scire tamen oportet, omnia id genus medicamenta duris uigrestium hominum corporibus aptari, nempe fessorum, & messorum, & qui opus obeunt adeò ualidum. Quae & ad eorum scirrhosos tumores aceto in cataplasma matris formam composita illinuntur. Caprinum praeterea digerentis, & acris est facultatis, adeò ut induratis scirrhorum in modum tumoribus congruat, nec tantum lenis, ad quos creberrimè medici non pauci huiusmodi sterces applicant; sed etiam aliarum partium. Siquidem ego (inquit Galenus) eo usus sum ad genu tumorem habens inueteratum, & agrè solubilem, iusso fieri cataplasmate ex farina hordeacea per oxyeratam, indito uidelicet hoc sterces, & mirifice homo ille fuit adiutus. Erat autem rusticus, in quo id factum est. Et iam etiam alius rusticus, cum scissus usus esset, non tantum in genu; sed etiam alijs in partibus ad tumores similes, perinde adiutus est. Nam acrius est medicamentum, quam ut mulieres urbanas, aut pueros, aut omnino qui molli sunt carne, sanare possit. Quin & ad aetate quam intercutem, & ad splenicis uariè caprino stercore utimur. Sed & istum tenuiorum quidem partium, uerim haud manifestò redditur acrius. Quamobrem sanè ad alopecias congruit, & omnia adeò quae extergentia medicamenta desiderant, ut lepras, psoras, lichenas, & hoc genus alia. Misceatur & digerentibus cataplasmatibus, qualia sunt quae accommodantur ad parotidas, & bubonas diuturniores. Est enim uis eius cuiusque etiam uesti, abstersoria, & digerens, nec eam paruum habet digerendi potentiam. Nam medicus quissiam ex ijs, qui in agris, & uicis medicinam exercent, utebatur eo ex aceto ad uiperarum morsus, & multò sanè etiam magis aliarum bestiarum, ac profectò ex ijs complures seruauit. Et hic ipse quoque medicus arguatis potandas ipsas uiperas, hoc est, pilulas caprinas ex uino praebuit, & ad profluuium muliebri cum thure apposuit. Quae omnia sanè optimus medicus ignorare non debet: ceterum



teriam potiora eligere potissimum ad urbanos, & honoratos, alicuiusq; existimationis viros: in quibus equidem ego tali nunquam sum usus medicamine, cum multo meliorum suppeteret copia. Attamen existit nonnunquam talium usus, aut in itinere, aut in uenatione, aut rusticatione, cum scilicet meliorum nihil adfuerit, aut homo rusticus perinde fuerit carnis duræ, ac asinus. Nam eiusmodi multos in agris reperias dignos, qui bibant styrrathos. Caterum è caninibus ossa comedentibus stercus, præterquam quod cæteris tum præstantius, tum candidius habeatur, fistula gutturi insufflatum anginam curat: sicuti & dysenteriam ex lacte caprino haussit, in quo prius igniti calculi fuerint extincti, aut ignitum ferrum, quod Græci σκουρα uocant. Quinetiam periodicas, circularesue fugat febres, si cochlearis mensura in accessu ex uino præbeatur bibendum inscio patiente. Prodest & malignis ulceribus inspersum, uel emplastris ad id facientibus commistum. Pollet etiam suis uiribus Lupinum: idcirco id magnis laudibus extulit Galenus citato loco, sic inquit. Lupinum stercus quidam colicis potandum dabit, non tantum in ipsis paroxysmis: sed etiam in interuallis, si quidem phlegmone uacarent. Quorum ego quosdam uidi non amplius hoc affectu correptos, & correptos non amplius id grauitè passos, sed nec post paucum temporis. Accipiebat autem ille albius potius luporum ster= numero iuisset. Itaq; hic stercus capiebat, quod non decidisset in terram: id quod non erat inuentu difficile. Ea enim est luporum natura, quæ canum, ut suspensio altero posteriorum crurum, & inieant, & cacent in eminenti quopiam loco ex terra. Itaq; in spinis sæpe æstate stercus lupinum reperitur, & fuiticibus, uerpibus, herbisq; procerioribus. Inuenitur porro in stercore illorum & nonnihil osium deuorati animalis, quod ut effugit comman= nem: quod & ipsum contundens, ac conterens, bibendum præbuit colicis: ac si homo esset puritatis amans, miscebat & salis quippiam, ut piperis, aut quippiam eiusmodi. Ut plurimum autem ex uino albo consistentiæ tenuis bibendum præbebat: interim uero etiam ex aqua. Hoc ergo stercoris, quod patientibus ilibus applicandum esset, iubebat suspensum: quod si talis non adesset lana, ex pelle ceruina, & lorum quod cingeret in uinculo confecto ex lana non cuiuslibet ouis, uerum multo præstabat eam esse ouis à lupo laniatæ, unde quod ad hunc usum accommodaretur, esset conficiendum. Quod si talis non adesset lana, ex pelle ceruina, & lorum quod cingeret in uinculo, & in quo stercus contineretur, parari præcipiebat. At nos ollulam ad magnitudinem maximæ fabæ confecimus, quam experiundi gratia in isto stercore quibusdam suspendimus, nec potuimus non mirari, cum plurimos ipsorum uideremus adiutos: cæterum ad ollulam duas ceu aures affiximus, per quas lorum transmitti posset. Quod autem ciconia finum comitiales iuuat, planè refellit Galenus, asserens eos esse redarguendos, qui talia scripserunt. De ouillo, columbino, gallinaceo, murino, & crocodilino, cum satis superq; disseruerit Dioscorides, nec plura à Galeno, & alijs animaduertendum est: quod, quemadmodum etiam de animalium scilibus diximus, stercora ipsa inter se plurimum differunt temperamenti, & uictus animalis ratione. Quippe quod alterum sit altero plus, minusue calidum, pro animalium diuersorum generum temperie, aut pro alimentorum temperamento in eiusdem speciei animalibus. Quod Græci δρόκωτος, Latine Stercus & simum uocatur: Arabicè, Hebel, Zebel, aut Bhar haiuan: Italicè, Sterco: Germanicè, Drecken: Hispanicè, Estiercol: Gallicè, Fiente,

Canini stercoris uires.

Lupini sterc. uires ex Gal.

Ciconiæ stercus.

Nomina.

## Vrina.

## Cap. LXXIII.

HUMANAM vrinam suam cuique bibere, contra uiperæ morsus, ac uenena, incipientemque aquam inter cutem proderit: scorpionis, viperæ marinorum, draconisq; morsus, ea conuenientissime fouentur. Canina ad perfundendos canis morsus idonea est: pruritus, & lepras nitro addito expurgat. Sed uetus ulcèra capitis manantia, furfures, psoras, & feruidas eruptiones, multo magis abstergit: nomas, & præcipuè genitalium, cohibet: auribus infusa manans pus supprimit: decocta in calyce mali punici, earum uermiculos abigit. Pueri impubis resorpta urina, orthopnoia auxiliatur: decocta in æreo uase cum melle emendat cicatrices, argema, caliginesque. ex ea, & cum factum cum cyprino, inditumque, vuluæ dolores mulcet, strangulatus leuat, genas deterget, oculorum cicatrices expurgat. Taurina si cum myrra instilletur, aurium dolores lenit. Aprina uirique eisdem prædita est: priuatim comminuit uesicæ calculos, & potu expellit. Caprina ad aquam extrahit: aurium doloribus instillata medetur. Asinina traditur renum uitij mederi. Lyncis uriditum est. quare quod de ea pròditum est, uanum esse conuincitur. Est enim quod à nonnullis uocatur succinum pterygophoron, ideo dictum, quod pennas ad se alliciat. Id potum ex aqua stomacho, alioque fluxione laboranti conuenit.

VRINAE omnes quidem, ut scriptis tradidit Galeus lib. x. simplicium medicamentorum, facultate sunt calidae: sed plus tamen animalium calidorum, minus autem frigidorum. At urina hominis omnium propè aliarum urinarum est imbecillima, exceptis porcis domesticis, quibus exempti sunt testes. Nam illorum similis est totius corporis temperatura temperiei hominum, & urina similiter debilis. Verum montanorum aprorum ualida est, ut etiam ex ore appareret, qui utiq; acerrimus est. Hac utuntur Hetrusci ad puerorum uernes, oleum suo in utriculo urinae admiscentes, et in fumo tandiu suspendentes, donec crasseat ad mellis spissitudinem: deinde illud diligenter asseruat, eoque puerorum nares, tempora, & umbilicum inungunt magno sanè successu: nam & ego sæpe periculum feci. Sed

Vrinarum facultes ex Gal.

Vrina lapri.



Vrinæ medi-  
cinas cōtēph  
Galenus.

Chrysocol-  
la factitia.

Vana de lyn-  
curio opinio.

Encelij opi-  
nio uana.

Saliuæ uires  
ex Galeno.

Nomina.

quauis Dioscorides complurium urinarum uires descripserit, ut quas uarijs, ac diuersis morbis utiles esse existima-  
uerit; Galenus tamen urinarum medicamenta parauendisse uidetur. Quippe qui crediderit (quemadmodum & de  
sanguinibus differens inquit) cum parata reperiantur ualentiora medicamenta, ac experimento comprobata, ipsi præ-  
cipue morbis congruentia, quibus urinam conferre nonnulli autumant, earum medicinas ad curiosos supersticiososq;  
spectare magis, quam ad peritos medicos, qui hæc nauseosa, incertaq; remedia nunquam probatis, expertisq; præpo-  
nunt. Quod autem puerorum urina ægre spirantibus conferat (ut Dioscorides auctor est) minimè probat Galenus,  
cum loco citato inquit. Urinam pueri orthopnoæ uocata gratia ebibere necessarium non est, cum sint & alia me-  
dicamenta, quæ huic medeantur affectui. Quin cum bibisset quidam, affectu liberatus non est, ut non eximium quid præ-  
ter alia possideat. Chrysocolle conficiendæ rationem, quam fieri ex puerorum urina prodidit Dioscorides, quan-  
sepalsarij, & aurifices uulgò Borrace nominant, duobus in locis scriptam reliquit Galenus lib. 12. simpliciorum me-  
dicamentorum, ubi de ea speciatim egit, & lib. x. eorundem de urinis differens. Et quauis (ut libro quinto dicitur)  
legitima, probataq; chrysocolle fessitia habeatur; sit tamen artificio ex pueri urina in ardentissimis solis caloribus ex  
reo mortario, atq; etiam pistillo æreo tandiu circumacta, donec mellis fessitudinē assequatur. Præsertim, quæ hoc me-  
do parata sit, ad contumacia ulcera sananda, exedentiaq; coercenda. Illud profectò uanum, ac fabulosum esse mani-  
feste deprehenditur (ut hic Dioscorides scribit, & nos eum secuti superiori libro in succini mentione ostendimus) quod  
urina lyncis, simulac excernitur, duretur, coeatue in lapidem illum, quem Lyncurium uocant. Quippe quod is inter  
succini genera ab omnibus fide dignis auctoribus recensetur, quod suæ proprietate naturæ pennas ad se trahat, quæ  
admodum & cætera succini genera paleas, festucas, ac leuissima quæq; alliciunt. Quantum uerò à legitimo lyncurio  
uulgaris ille lapillus differat, qui officinis lapis lyncis appellatur, & cuius est usus apud seplasiarios, & medicos, qui  
simplicium medicamentorum scientiam negligunt, ij diiudicant, qui simplicium historias, & facultates optime norunt.  
Quandoquidem is, quem pro fabuloso lapide lyncis uenditant impostores, lyncurium succini genus haudquaquam esse  
nec alius quicuis lapis ei uiribus respondens, nec si quidem urinam cieat, & renum, uescicæq; calculos comminuat, ut se-  
plasiariorum & medicorum uulgus opinatur: qui parum Dioscoridis, aliorumq; in re medica bonorum auctorum se-  
miliaritatem curant. Ceterum hinc satis constare arbitror, Christophorum Encelium (pace uiri alioquin docti &  
xerim) planè hallucinari, quod lib. III. cap. XXVII. de re metallica, poetarum fortasse, & aliorum quorundam  
fabulis adductus magis, quam ueris probatissimorum auctorum testimonijs, probare contendat, Lyncurium ex uiri-  
na lyncis coalescere, atq; ex maris urina fuluum fieri, ex scæniæ uerò urina album. Hanc autem opinionem suam ex  
eo comprobare uidetur, quod aliquando in uescica apri, itemq; suis domestici lapillos inuenerit. Ex quo postea colla-  
git, uirum non esse, quod lyncis quoque urina in lapillos concreseat. Sed quàm leuis & infirma sit hæc ratiocinatio,  
ut comprobet quod contendit, quàmq; uana sit opinio hæc, eorum sit iudicium, qui magnis laboribus, multis studijs, &  
summaque diligentia rerum simplicium peritiæ sunt assecuti. Atque hæcenus de urinis, & lyncurio.  
modò, ut etiam de Saliua aliquid in medium afferamus. Itaq; cum eius non meminerit his libris Dioscorides, postea  
nonnullis humani corporis morbis opitulari, ea de eius uiribus, & facultatibus hic referam, quæ à Galeno libro x.  
simplic. medic. memoriæ produntur his uerbis. Sielon, siue stalon, siue ptyelon appellare libet, nihil interest.  
Verum id sciendum est, uim eius esse differentem, tum in animalium speciebus, tum in eorum unoquoque sano, aut  
ægroto, ieiuno aut sitibundo, aut cibo potuque sumpto. Etenim ut urina, & bilis, & sudor: sic etiam salina sunt  
pro quidem cibo imbecilla est: ualida & acris eorum, qui ingenti aut inedia, aut siti premuntur. In medio uerique  
est eorum, qui probè concoxere quidem, nondum tamen cibum potumue iugesserunt. Hac ergo salina uires puer-  
rorum lichenas curant, paruam uidelicet digitum rigantes, ac deinde cutem affectam, confricantes. Idq; facient  
subinde, tanto scilicet intervallo, dum saliuæ uires in lichene perdurent, ac nondum sint extinctæ. Sed & triticum  
mandantes rustici non pauci furuiculis imponunt. Nam celeriter eos & digerit, & concoquit: cum si maceraretur  
aqua, non æquè prodesset. Ex quo liquet, saliuam ipsam auxiliij robur adferre. Atq; corporibus mollioribus, & pueror-  
um, panem, non triticum imponunt ore commansum. Porro omnia sic commansa digerunt, & sugillata, ceteraque  
ecchymomata, maxime ubi panis simul cum pauco radicle fuerit commansus. Porro tota substantia uel maxime ubi  
uersa est saliuæ bestijs hominem interficientibus, ceu alicubi etiam Nicander poeta refert. Pollicitus autem mihi quidam  
incantationem sese ostensurum, quæ scorprios interficeret: ubi illam semel dixisset, in scorpionem expuit: inde rursus  
eam obmurmurans iterum scorpionem conspuat: ac ubi tertio dixisset, atq; expuisset, mortuus est scorpion. At postea  
ego absq; incantatione à sola saliuâ morientem uidi scorpionem, idq; celeriter passum à saliuâ esurientium, aut sitien-  
tium: tardè autem ab illis, qui cibo, potuq; fuerant mpleti: in alijs autem proportionem. Quod οὐρον Grecis, Lat.  
tinis, Vrina, & Lotium nominatur: Arabibus, Baul: Italis, orina. Quod οὐρον Grecis, Lat.  
cè, Saliua Latine, pariter & Italicè uocatur: Arabicè, Busach, Bezach, & Lbab.

## Mel.

## Cap. LXXV.

PRINCIPEM locum obtinet mel, quod Atticæ regionis est: præcipue ex Hymetto, mox Cy-  
cladibus insulis, & à Sicilia, cognomine hyblæum. Magis probatur dulcius & acre, odoratius, sub-  
flauum, nec humectum, graue, & minimè fluxum, quod ob sequacem lentitiā non facile abrum-  
pitur, tractumque resilit in digitos. Mel abstergendi uim habet: ora uenarum aperit, humores  
euocat. qua ratione in sordida ulcera, sinusque, commodissimè infunditur. Decoctum, atque im-  
positum, abscedentem carnem glutinat: medetur impetigini coctum cum liquido alumine, & illi-  
tum: item aurium sonitui, & dolori cum fossili sale trito, tepidum instillatur: lendes, & fœda capi-  
tis



tis animalia illitum necat: nudam glandem recutitis operit, præsertim quæ circuncisione aperta non est, si melle præputium à balneo triginta diebus emolliatur: oculorum caliginem discutit: faucibus, tonsillis, anginae collutum, gargarizatumue medetur: urinam ciet: auxiliatur tussi, & à serpente percussis: contra haustum meconium, cum rosaceo calidum assumitur: aduersus uenena fungorum, & rabiosi canis morsus linctum, aut potum proficit. crudum tamen aluum inflat, tussim lacessit, & ea de re despumati usus aptior est. Priuatum tenet in mellis genere uernum, deinde æstiuum: hybernū uerò, utpote quod crassius constet, deterrimum reputatur, ceragini faciundæ idoneum. Quod in Sardinia gignitur mel, anarum est: quoniam apes inibi absinthio uestantur. quo uitia cutis in facie, & maculae aptissimè perunguntur. Heraclia in Ponto quibusdam anni temporibus, propria quorundam florum dote, mel conflatur: quod qui edere, mente abalienantur, ac sudore diffiunt. Remedio sunt esitata ruta, & salsamenta, aut epotum mulsū, resumpta, quoties uomitione reijciuntur. Acre autem est, & olfactu sternutamenta mouet. Quod cum colto illitum, sceminarum cutem emēdat, & cum sale sugillationes rapit. Est & aliud concreti mellis genus, quod saccharon nominatur. In India uerò, & felici Arabia in arundinibus inuenitur. salis modo coactum est, dentibus, ut sal, fragile: aluo idoneum, & stomacho utile, si aqua dilutum bibatur: uexatæ uesicæ, renibusque auxiliatur. Illitum ea discutit, quæ tenebras oculorum pupillis offundunt.



MEL, quod apes colligunt, omnibusq; uulgarissimum est (auctore Galeno lib. III. de alimentorum facultatibus) oritur in plantarum folijs: earumq; neq; succus, neq; fructus, neq; pars, ullo pacto dici potest, sed eiusdem cum rore generis est: non tamen asidue, nec copiose, ut ille, prouenit: repertumq; est aliquando æstate super arboribus, ac fruticibus, herbarumq; folia mel quàm plurimum, adeo ut agricolæ uelut ludentes canerent, Iupiter melle pluit. Cui subscribens Plinius lib. XI. cap. XII. sic inquit. Mel ex aere uenit, & maxime siderum exortu, sitq; præcipue ipso strio splendente, nec omnino prius uergiliarum exortu sub lucanis temporibus. Itaq; cum prima aurora arborum folia melle rosida inueniuntur. At si qui matutino sub dio fuere, unctas liquore uestes, capillumq; concretum sentiunt. Siue ille est cæli sudor, siue quædam siderum salua, siue purgantis se aeris succis, utinam esset & purus, ac liquidus, & suæ naturæ, qualis defluit primò. Nunc uerò è tanta cadens altitudine, multumq; dum uenit sordescens, & obuiio hæc balitu infectus. Præterea à fronde, ac pabulis potus, & in uterculos congestus apum: ore enim uomunt. Ad fert. Ibi optimus semper, ubi optimorum macolis florum conditur. Atticæ regionis hic, & Siculæ Hymetto, & Hybla ab locis, mox Calydu insula. Hactenus de melle Plinius citato loco. Verum eninuero (ut idem auctor est libro XI. cap. XIII.) mel, quod in Creta Carnia monte colligitur, nusca non attingunt, nec eo in monte eadem usquam reperiuntur. Porro uenenatum mel, quod in Heraclia Ponti prouenit, cuius hic meminit Dioscorides, Plinius quoque recensuit libro antè citato, cap. XII. Subiunxitq; & alterum eodem in Ponto gigni gente Sannorum, quod ab infania, quam gignit, Menomenon uocant. Id existimatur contrahi flore rhododendri, quo scatent syluæ. Habent præterea & alia mellis genera, quæ rosida non sunt, sed ex plantis nascuntur, ut illud, quod ex anacardijs fluunt, denorum digitorum longitudine, mellis plenas, quod qui cderint, non facile enadant. Quinetiam refert Pomponius Mella tertio de situ orbis, tam pinguis alicubi, & tam feracis soli Indiam esse, ut in eo mella ex arborum frondibus defluant. Exprimuntur etiānum è uulgaribus siliquis, quæ Græcis κάρπια dicuntur, quo tam Indi, quàm qui Troglodyticam Arabiam incolunt, gingeris radices recentes uiridesq; afferunt, ac etiānum myrobalana omne genus. Quod facile conijcitur ex ijs, quæ ex Alexandria Aegypti Venetias quotannis comportantur. Ceterum non desunt inter recentiores medicos, qui disputent, an Saccharum, quod sub mellis genere scripserunt ueteres, præsertim Dioscorides, & Galenus in India, & felici Arabia nasci, idem cum nostrate Saccharo dici possit. Et quāuis plerique reperiuntur, qui dubio procul existiment, ac pro certo affirmant, communis usus saccharum, & quod ab antiquis de-

Mellis confectio.

Mel Heracliticum.

Mellis generis non rosida.

Sacchari confectio.



Manardi, &  
Fuch. opinio  
reprobata.

Antiquorum  
saccharum.

Factitij sac-  
chari inuēctio

Aliquorum  
lapis.

scribitur, unum & idem esse, quod ex eadem proueniant planta; tamen Manardus Ferrariensis, & Leonardus Fuchsius ipsum secutus, maximam inter ea ponunt differentiam, omnino opinantes in alio arundinum genere con-  
creuisse antiquorum saccharum, de quo inter mellis genera scripsere Dioscorides, & Galenus: concresecereq; ad  
hanc diem usq; ex cœlesti rore, quemadmodum & id, quod mannam uocamus: non autem in ijs arundinibus, in  
quibus in aqua decoctis huiusce ætatis saccharum in Medera, Sicilia, Creta, Rhodo, & Cypro insulis, ac etiam in Aeg-  
ypto exprimitur. Qua in re eos uiros alioqui doctissimos, planè hallucinatos crediderim, quod nullo, ut puto, san-  
ctorum probatorum testimonio ducti sibi persuaferint, manna in modum ex rore concresecere antiquorum saccharum  
solis ardore super harundinum folia tam in India, quàm in felici Arabia. Quippe quod nusquam repererim scripsisse  
se Dioscoridem, Galenum, nec ueterum, uel recentiorum quenquam, concresecere saccharum in arundinum folijs ex  
rore solis seruore concreto, siue potius exiccato, quemadmodum in quibusdam arborum frondibus manna per se con-  
crescit. Quo fit, ut mihi resellenda uideatur eorum sententia. Nam si uerum illud esset, ut ipsi imaginantur, non modò  
non est credendum, sed ne cogitandum quidem, Dioscoridem, qui diligentissimè simplicium medicamentorū historiam  
literis, memoriæq; mandauit, silentio præterisse tam pulchrum, & admirabile, scituq; dignum naturæ opus in saccha-  
ro consiciendo. Nec minus id reticuisse Galenus naturæ operum maximus indagator, quemadmodum nec reticuit lib.  
III. de alimentorum facultatibus, aerei mellis historiam, quod nos mannam uocamus, quodq; sua ætate in monte Liba-  
no, alijsq; locis super arborum frondes repertum scribit. Quàm obrem magis ueritati consonū uidetur, ut dicamus,  
nil aliud ueteribus saccharum extitisse, quàm nostratis sacchari arundinum lacryma, seu liquor, qui nimia succi co-  
pia aperto in latere calamo, perinde ac gummi, exterius cōcreuerit. Huic nostræ opinioni subscribit Plinius lib. XI.  
cap. VIII. sic inquit. Saccharon & Arabia fert, sed laudatius India. Est autem mel in arundinibus collecti gum-  
mum modo, candidum, dentibus fragile, amplissimum nucis auellanae magnitudine. hæc Plinius. Ex quibus facile con-  
gnosci potest, quod non ex rore, ut manna euenit, coalesceret antiquorum saccharum super arundinum folijs, sed quod  
fractis calamis earum internodijs cohereret collacrymans, è quibus uulgare nostrum conficitur. Quandoquidem hoc  
modo resinæ, gummaeq; omnes scisso sui arboris cortice emanant. Alia præterea hac accedit ratio, quæ (ut equi-  
dem arbitror) Manardi, ac Fuchsi sententiæ prorsus aduersatur. Nam quemadmodum in Apulia, & Calabria manna  
à sole tacta, dum arborum inhaeret folijs, paruo temporis interuallo in auram euascescit (ut libro primo dixi-  
mus in manna mentione) eadem sanè ratione id saccharo euenisset, si ex rore (ut ipsi contendunt) concreseceret.  
Siquidem à sole tactum, rarefactumq; facile disiliisset in auram, nec gummi modo concreuisset. Eoq; magis  
quod nusquam legerim in Dioscoride, nec Galeno saccharum è folijs arundinum colligi, sed in ipsis calamis concre-  
tum reperiri. Quod etiam testatur Strabo libro XV. Geographiæ, ubi aperte scribit, in India arundinè mel sit  
apibus gignere: non autem quod ex rore in arundine fiat, ut quidam peruicax, ignarusque medicus mecum contem-  
dere, atque etiam, ut suam mordicus teneret opinionem, Strabonis codicem corrumpere non est ueritus. Præterea  
cùm memoriæ prodiderint Dioscorides, Galenus, & Plinius, antiquorum saccharum durum esse, salis modo coac-  
tum, album, dentibus fragile, ex his coniectare licet, è rore saccharum nequaquam fieri. Quippe quomodo  
manna, quæ eodem modo è rore concresecit, sal minime refert, nec dentibus fragilis deprehenditur, sed potius  
mandentibus tenax, & cere modo lentescens. Quare crediderim antiquis saccharum fuisse tenuiorem, ac præ-  
stantiorem illius partem in arundinum sacchariferarum medulla, quæ per internodiorum fissuras exiens solis co-  
lore concreuerat, ut & saccharum nostrum calore ignis arte concresecit, & addensatur. Quod cùm accuratè  
tissimè perpendissent homines, liquorisq; præstantiam agnouissent, à natura edocti hoc arte se facturos existi-  
runt. Neque id incassum attentasse uidentur. quandoquidem sacchari integros calamos assumentes, minutimq; in  
cidentes, ignis calore tandiu decoxerunt, donec uniuersus liquor, absumpta igni aqua, diu effervefcens in saccha-  
rum salis modo in uasis fundo concreuerit. Verùm etsi sacchari arte facti nihil meminerint Dioscorides, & Gale-  
nus; non desunt tamen qui dicant, hoc etiam ante eos factum esse, Solini auctoritate freti, qui in Indis palmarum  
bus arundinem ita crassam progigni ait, ut fissis internodijs lembi uice uestitit nauigantes, è cuius radicibus dul-  
cem etiam exprimunt humorem ad mellis suauitatem. At qui liquorem hunc, qui ex harum cannarum radicibus  
elicitur, saccharum nostri usus fuisse existimant, procul dubio falluntur. quod Indi non modò ex decoctis cannarum  
sed aliarum quoque arborum radicibus sibi potus parent, cùm illius cœli & soli clementia frequentissime sint plan-  
tarum radices, quæ mellea dulcedine imbuuntur, ut Strabo testis est loco nuper citato, ubi sic inquit. Nullus an-  
nus in India inuenitur utroque tempore sine pluuiis. Quapropter contingit annum feracem esse, cùm semper  
terra sit fecunda: fructus autem arboreos multos gigni, arborumque radices, præsertim magnarum arundin-  
um, & natura, & decoctione dulces esse, aqua à foliis tepefacta, tam cœlesti, quàm fluuiiali. Adeo quod ea  
quæ apud alios & fructuum, & succorum maturitas dicitur, apud illos concoctio est: quæ tantum ad dulcedi-  
nem operatur, quantum ea, quæ per ignem fit. Sententiæ nostræ Lucanus quoque suffragatur, illud expli-  
cans hoc carmine.

Quiq; bibunt tenera dulces ab arundine succos.

Quintetiam Marcus Varro, qui eodem ferè tempore claruit, his tribus uersibus attestatur, dum inquit.

Indica non magna nimis arbore crescit arundo,

Illius & lentis premitur radicibus humor,

Dulcia cui nequeant succo contendere mella.

Ex ijs palam est, hos omnes de factitijs Indorum potionibus, quæ ijs uini loco sunt, fuisse locutos: non autem quod ex  
illis cannarum radicibus saccharum aliquod pararetur. Quandoquidem & nos è glycyrrhizæ radicibus, quin & è  
decoctis, præsisq; siliquis, sicut & alijs è dactylis, dulces elicimus succos ad uarij usus potationes. quemadmodum &  
occidentales



occidentales Indi è pluribus dulcibus arborum fructibus suos sibi parant potus. Sed nō ob id dicendum hos liquores, quod mellis dulcedinem præstet, esse mel, neq; saccharum. Nec mirum sanè si Indicæ arundines radicibus dulcissimū præbeant succum nō modo illæ magnæ; sed etiam quæ ibi nascuntur nostris fortasse non multo grandiores: cum etiam nostrates recentes mansæ quadantenus ori dulces sentiantur. Quod autē minores arundines in India radicibus dulces præbeant potus, superioribus carminibus explicauit abunde Marcus Varro: cui nō magna nimis est arbor. In hoc tamen à Solino dissentit: cui arundines, quarum meminit, uastissimæ sunt proceritatis. Hinc ergo eorū sententia excludenda uidetur, qui credunt ex illarum magnarum arundinum radicibus, saccharum uostro similis factitasse Indos, quod nō quidem saccharum, sed dulces inde potus uini loco sibi conficiant. Sed ut suam opinionem auctoritatibus fulciret Manardus Ferrariensis, utq; lucidius conprobaret antiquorum saccharum, perinde ac mannā, ex rore fieri, lib. i. x. epist. v. Auicennam etiam admittit, quem tamē aliis ubiq; reiecit, ac reprobauit, asserens, quod cum ipse huius fuerit sententia, ultimo capite libri secundi antiquorum saccharum mannā uocauit, cum inquit. Zuccharū albusar est manna cadens super albusar, et est sicut fracta salis. At nos, qui huic opinioni inuicē adstipulamur, dicimus Albusar, siue Alhasser (ut Bellunenſis castigauit) nullo pacto Arabica lingua arundinem significare, sed aliam Aegypti, et Arabiæ arborem, sic ab eius loci indigenis appellatam: quandoquidem Arabes (ut testatur Serapio) arundinem caſab dicunt. Quod manifestè declarat zuccharum alhasser apud Auicennam huiusce arboris esse mannā, uel gummi, non autem Græcorum saccharum in calamis concretum. Illud insuper nostram comprobatur sententiam, quod eodem loco addidit Auicenna, sic inquit. Et in zuccharo quidem albusar est cum abstersione pauca, stipticitas, et amaritudo. Siquidem auſeritatis, et amaritudinis, quæ in antiquorum saccharo fuerint, nusquam meminere Dioscorides, et Galenus: nec item quod conferret id pulmōni, et aquæ intercuti, ut paulō infrā uoluit Auicenna. Qui est dixerit deinde zuccharum hoc oculorum morbis, pariterq; renum, et uesticæ uitij auxiliari; non tamen ob hoc dici potest, zuccharum alhasser esse antiquorum saccharum. Sed rectè quidem contra Manardi sententiam, Auicennæ testimoniū (cum et ipse hoc in loco Auicennæ auctoritate nitatur) probari potest, quod antiquorum saccharum gummi modo colligens in arundinibus concreſceret, nō autem ex rore. Quippe quod is de zuccharo agens loco nuper citato, ibiq; antiquorum saccharum recensens, inquit. Assumptū sicut gummi ab arundine abstergit oculum. Quibus palam sit, antiquorum saccharum, perinde ac gummi, ab interiori medulla exterius emanasse, ibiq; postmodum foſa ardoribus concreuisse. Verum enimuero quod alhasser apud Arabes sui generis arbor sit, et ab arundine maxime differat, et quod eius zuccharum, quauis ab Auicenna manna dicatur, quod fortasse granulis concreſcat manne ſimilibus, ex rore haudquaquam fiat, sed gummiū modo ab arbore deſillet, manifestè ostendit Serapio capite de saccharo his uerbis. Alhasser habet lata ſolia, et habet zuccharum, quod egreditur ab oculis ramorum ſuorum, et à locis ſoliorum eius, et colligunt de eo homines rem conuenientem, et in zuccharo eius est amaritudo, et egrediuntur ab hac planta mala quædam, sicut testiculi camelorum, è quibus liquor quidam emanat adurens, stipticæq; facultatis, ad ea uerba peridoneus. Et lignum quidem Alhasser est leue, crassum, rectum, pulchrumq; et ideo aſimilauerunt cantilenarij in cantilenis ſuis brachia, et crura dominarum ligno eius. hæc Serapio. Ex quibus faciliè et Manardum, et Fuchſium, uiros alioqui doctissimos, hac in re hallucinatos putauerim. Ceterum Fuchſius, ut probaret antiquorum saccharum è roſcido cæli ſucco in calamis concreſcere, utq; illud à noſtrate diuerſum ostenderet, dicit, quod cum noſtri uſus saccharum, perinde ac mel, calidum reperitur, ſit inq; faciliè concitet, antiquorum saccharum eſſe non poteſt, eo quod Galenus ſuæ ætatis saccharum id efficere non prodiderit. Cuius tamen ſententia (pace ſua dixerim) experimento minime reſpondet: à quo non diſcedens Galeus lib. vii. ſimpl. medic. de saccharo ita ſcribit. Sacchar. quod ex India, atq; ſelici Arabia conuehitur, in calamis, ut aiunt, concreſcit, et ipſum mellis eſt ſpecies: nūc porro quatenus nec inimicum ſtomacho eſt, ceu noſtras, nec ſitim afferens, eatenus ab illo ſubſtantia differt. Quibus Galeni uerbis clarum eſt, quod cum saccharum melle minus ſit dulce, minus etiam calidum ſit neceſſe eſt. Ea q; propter aſſerit Galenus, saccharum non perinde ac mel, ſitim excitare: non autem quod nulla ab eo ſitis excitetur, uti Fuchſius interpretari uidetur. Quinctiam idem Galenus lib. viii. cap. iiii. methodi medendi, saccharū inter ea connumerat, quæ febrientibus exhiberi poſſunt. His igitur rationibus, et auctoritatibus adductus ſum, ut certò crediderim, antiquorum saccharum ab iſdem arundinibus emanare, à quibus uulgarè noſtrum exprimitur: ſed hanc tantum inter ſe differentiam eſſe, quod à natura factum ſit noſtrate factitio longè tenuius. Ideoq; Auicenna: Zuccharū (inquit) tabarzed frigidiuſ eſt, et ſubtiliuſ. Hoc laudibus extulit Paulus, et poſt ipſum Auicenna Archigeniſ auctoritate Sal Indum ipſum appellans, ad linguæ ſcabri, iem, ariditatemq; in acutiſſimis febribus. Sed eo nos hac ætate caremus, quod amplius non aſſeratur. quanquam ego non ita pridem à uiris fide dignis accepi, qui diui Thomæ inſulam, itemq; Mederam luſtrarunt, adhuc iſs in locis saccharum inueniri in arundinibus sacchariferis concretum (illi non diſſimile, quod arte ſit, et candidum cognominatur) poſtquā ab illis ſponte emanari gummi modo. Quod autem adſerri deſierit, non aliud in cauſa eſſe exiſtinamus, quā quod hodie paucum admodum proueniat. Siquidem Dioscoridis, et Galeni tempore, quo ad eos copioſum conuehebatur, cum adhuc non innotuiſſet exprimendi ratio, neceſſe quidem erat, ut arundines sacchari liquore prægnantes, cum annis compluribus adoleuiſſent, et falſe nunquam expertæ eſſent, per ſe liquorem exudarent, ueluti innumeris arboribus gummi, et reſinæ emanant. Proinde non mirum, ſi eius à natura facti antiquis fuerit ubertas. Sed poſtquā lucri dulcedo, fulgentiſq; auri ſtis docuit homines artem modumq; quo saccharum conciſis, decoctis, preſſisq; arundinibus copioſius elicerent, factum eſt ut Indi quotannis uniuerſos inciderint calamos, ac iterum quotannis ſeuerint. Hinc igitur euenit, ut nullis remaneantibus, quæ ſaccharo plurimum annorū ætate turgeant, naturæ impedita ſit operatio, deperdiuq; hac de cauſa ſit antiquorū saccharū. Cuius uice eo recentiores utuntur, quod officinæ candidum cognominant, arte factum pellucidum, ſalis ſoſitiq;

Manardi ratio infirma.

Alhasser quid ex Serap.

Fuchſij opin. reprobata.

Sal Indura.



foſſitij modo, dentibusq; fragile, ut antiquorum ſaccharum undequaq; referat. Competit perinde ac illud, ſcabrities lingue, pectorisq; aſperitatibus. Verum ad hæc id præſtatius eſt, quod in fiſtilibus, ubi uiolaceum lulapium aſſeruat, æſtate concreuit: eo quod uiolarum diluti facultate humectet, leniatq; magis. Quod Græcis μέλι, Latine Mel appellatur: Arabibus, Hael, ſeu Haſſel: Italis, Mele: Germanis, Honig: Hiſpanis, Miel: Gallis, Myelice, Zucker; Hiſpanicè, Azucar; Gallice, Succe.

Nomina,

## Cera.

## Cap. LXXVI.

CERA optima eſt ſubfulua, ſubpinguis, pura, odorata, & halitum quadantenus melleum reſrens, natione Pontica, aut Cretica. Secundum locum obtinet candicans, & ſuapte natura pinguis. Candida fit hoc modo. Ex ea radunt album, ſyncerumq; atque transfundunt in uas, quod ſatis habeat marinæ ex alto petitz, inſperſoque nitri momento, decoquunt: cumq; iterum, tertioque iterum, ſeparatum uas refrigerant, ac ceræ paſtillum eximunt, deterſa ſorde, ſiqua fortè adhæſit: tum denuo indita noua maris aqua feruet, uti retulimus: & uafe dempto ex igne, fundum ollule nouæ qua frigida madefactum, in ceram ſummam ſuſpenſa manu intingunt, quod celerius concreſcat, & quàm minima portio extrahatur. Suſcepto primo ceræ orbiculo, iterum ualiſimum aqua refrigeratum, tantisper in ceram immitti debet, dum tota excipiat. Orbiculi lino conſuti, interuacante ſpatio ſuſpendeduntur, & interdiu continuò ſub ſole, noctu ſub luna aſperguntur, uſque dum petiſcæ tæ albeſcant. Verum ſi eximius ille candor deſideretur, eadem faſtitari, & identidem recoqui oportet: præteritum eſt, Nec deſunt, qui pro marina, in muria quàm acerrima ſemel, aut iterum excoquant: dein laguncula tenui, rotunda, anſam habente extrahunt: poſtea orbiculos ſubſtrato aſſatim ceſſante herboſo, inſolant, donec candorem ſummum contraxerint. Præcipiunt hoc obeundum munus uere, cum ſol remiſſa uehementia humorem pariat, ut non facilè liqueatur. Cera omnis mollit, caſſacit, modicè explet corpora: datur in forbitione dyſentericis. ac milij magnitudine decem grana cere hauſta, lac in nutritibus non patiuntur coagulari.

Cere uires  
ex Galeno,

CERA, ut Galenus ſcriptis mandauit libro VII. ſimplicium medicamentorum, medio quodammodo reſcalfacientium, refrigerantium, humectantium, & deſiccantium. Habet uerò quiddam etiam craſſarum partium, atque emplaſticum. quoniam non modò exiccare; ſed & per accidens humectare uideri fortassis poterit, per ſpirationes uidelicet prohibens. Quapropter aliorum medicamentorum tum excaſſacientium, tum refrigerantium materia eſt. Ipſa autem per ſe ex genere fuerit debilius concoquentium: nec tamen intrò in corpus aſſumpta, ſed ſoris impoſita. Siquidem paulum quiddam digerentis, calidèq; facultatis retinet, que plurima melli inerat. Eius nomen Græcum κηρός: Latinum, cera: Arabicum, Hamaba: Italicum, cera: Germanicum, Vachs: Hiſpanicum, Ciera: Gallicum, Ciere.

Nomina,

## Propolis.

## Cap. LXXVII.

PROPOLIS eligi debet ſuaui, odorata, ſtyracem referens, in uehementi ariditate mollis, & maſtiche more ductilis. Magnopere caſſacit, & euocat: aculeos, & omnia infixæ corpori extrahit: in uetere tuſſi ſuffita proficit, impet ignes admota tollit. Ea in alueariorum foribus, cerolæ naturæ inuenitur.

Propolis cō-  
ſideratio,

QUANQVAM, ut hic Dioſcorides inquit, & Marcus Varro libro tertio de re ruſtica, Propolis ea eſt ceræ ſa materia, quæ in aluearijs præ foribus reperitur, ſeu, ut apertius dicam, præ ſpiraculis, ubi intrandi, excludendiq; apibus patet aditus: tamen Plinius libro XI. cap. VII. ita ſcriptum reliquit. Prima fundamenta compoſiti ſunt periti, ſecunda piſſoceron, tertia propoliu. Inter coria, cerasq; magni ad medicamina uſus. Compoſitis cruſta eſt periti ma, ſaporis amari. Piſſoceros ſuper eam uenit picantium modo, ceu dilutior. Ceræ initium, plerumque eſt mitius gummi. Propolis craſſioris iam materiæ, additis floribus, nondū tamen cera, ſed fauorum ſtabiliuentum, qua omni frigoris, aut iniuriæ aditus obſtruuntur: odore & ipſa etiānum graui, ut qua plerique pro galbano utantur. Huius etiam meminit Galenus libro VII. ſimplicium medicamentorum, ſic inquiens. Propolis extergentis, non ita ualentis eſt facultatis, ceterum admodum ualenter attrahentis: eſt enim eſſentia tenui. Porro excaſſacit reſeſſu ſecundo completo, aut certè tertio incipiente. Et ut idem quoque ſcribit libro III. de compoſitione medicamentorum ſecundum genera, Propolis ualentius attrahit, quàm cuiuſuis generis reſina. Quoniam illis in uernorum uulneribus medendis propoliu admixcet. Ceterum cum propolis, cera, & mel, de quibus hic diſſeruit Dioſcorides, medicamenta ſint omnia miro artificio ab apibus conſtata, non ab re his quoque addendam fore duximus Apum hiſtoriam. APES igitur (ut Plinius auctor eſt) ſunt & ruſticæ ſylueſtresq; horridæ aſpectu, multò iracundiores, ſed opere ac labore præſtantes. Sunt & urbanæ, quarum duo genera. Optime breues uariæq; & in rebus tunditatem compaſſiles. Deteriores longæ, & quibus ſimilitudo ueſparum, etiānum deterrimæ ex ijs pilioſæ. Apes odere ſædos odores, proculq; fugiunt, ſed & infectos. Itaq; unguenta redolentes infeſtant. Icientes perent: relicto enim aculco interiora diſrumpunt. Quin & morbos ſuapte natura ſentiunt. Index eorum triſtitia torpent: & cum

Propolis ui-  
res ex Gal,Apum cōfi-  
deratio,



et cum ante fores in teporem solis promotis alie cibos ministrant: cum defunctas progerunt, funerantiumq; more comitantur exequiis. Reges habent, pluresq; inchoantur, ne desint. Postea ex his soboles cum adulta esse cœpit, concordii suffragio deterrimos necant, ne distrabant agmina. Duo eorū genera: melior rufus, quā niger, uariisq; Omnibus forma semper egregia, et duplo quā ceteris maior: penne breuiores, crura recta, ingressus celsior: in fronte macula quodam diademate candicans. Multum etiam nitore à uulgò differunt. Cum rex procedit, una est totum examen, circaq; cum conglobatur, cingit, protegit, cerni non patitur. Reliquo tempore cum populus in labore est, ipse opera intus circūit, similis exhortanti, solus immunis. Circa eum satellites quidam, lictoresq; assidui custodes auctoritatis, Procedit foras non nisi migraturo examine. Id multò intelligitur antè aliquot diebus murmure intus strepente, apparatus indice diem tempestiuum eligentium. Si quis alam ei detruncet, non fugiet examen. Cum pro= cessere, se quæq; proximam illi cupit esse, et in officio conspici gaudet. Fessum humeris subleuant: ualidius fatiga= tum ex toto portant. Si quā lassatus deficit, aut fortè aberrauit, odore prosequuntur. Vbiq; ille confedit, ibi cum= starum castra sunt. Duce prehensio totum tenetur agmen: amisso dilabitur, migrantq; ad alios. Esse utique sine rege non possunt. Inuite autem interinunt eos, cum plures fuere, potiusq; nascentium domos diruunt. Rege consumpto, moriet plebs ignauo colore: non cibos conuehunt, non procedunt, sed tristi tantum murmure glomerantur circa cor= pus eius. Subtrahitur itaq; deducta multitudine: alijs spectantes exanimem luctum non nuntiat. Tunc quoq; ni sub= ueniat, fame moriuntur. Gaudent Apes æris plausu, ac tinnitu, antænisq; locis, et fragrantibus herbis. Ha= rum ergo causa prope aluearia oportet serere thymum, apiastrum, rosam, uioles, lilium, cytisum, fabam, eruium, cunilam, papauer, conyzam, castam, melilotum, melissophyllum (malum legere myriophyllum) ceriuthen. Est autem cerinthe folio candido, incuruo, cubitalis, capite concano, mellis succum habente. Horum florum audissimæ sunt, at= que etiam synapis. quod uiremur, cum oliue florem ab his non attingi constet. Ideoq; hanc arborem procul esse me= lius est, cum aliquas quā proximè feri conueniat: quæ et euolantium examina inuitent, nec longius abire patiantur. Corium quoq; arborem cauere oportet: nam flore eius degustato (est is nobis profluuii sistat) aluo concita moriun= tur. Remedium foris confusa è melle præbere ijs, uel urinam hominum, uel boum, aut grana punici mali amineo ui= no conspersa. Amant et genistas circumferi aluearijs, ijsq; gratissimum. Mira apum prudentia, earumq; operis obseruatio, ut annotauit Aristomachus Solensis, quem admirabili admodum diligentia duodecesaginta annis, apum a= more captum, nihil aliud egisse tradunt. Ratio autem operis ita se habet. Interdiu statio ad portas more castro= rum: noctu quies in matutinum, donec una excitet omnes gemino, aut triplici bombo, ut buccino aliquo. Tunc uniuer= se prouolant, si dies mitis futurus est. Prædiuinant enim uentos, imbresq; et tunc se continent testis. Itaq; tempe= rie celi (hanc enim inter præscita habent) cum agmen ad opera processit, alie flores aggerunt pedibus, alie aquam ore, gutt. isq; laugine totius corporis, quibus est. Quorum adolescentiores ad operam exeunt, et supradicta conue= hant: seniores intus operantur. Quæ flores comportant, prioribus pedibus feminam onerant, propter id natura sca= rant. Sunt enim intus quoq; officia diuisa: alie struunt, alie poliunt, alie suggerunt, alie cibum comparant ex eo, quod allatum est. Neq; enim separatim uescuntur, ne inæqualitas operis, et cibi fiat, et temporis. Struunt orsa ea concameratione aluei, textumq; uel usque ad summa tecta deducunt, limitibus binis circa singulos arcus, ut alijs in= trent, alijs exeant. Fauis superiore parte affixi, et paululum etiam lateribus simul hærent, et pendent unâ. Alucum non contingunt, nunc obliqui, nunc rotundi, qualiter poscit alueus, aliquando et duorum generum, cum duo exami= na concordibus populis dissimiles habuere ritus. Ruentes ceras falciant, pilarum intergerinis à solo fornicatis, ne de= sit aditus ad faciendum. Primi ferè tres uersus inanes struuntur, ne promptum sit quod inuitet furantem. Nouissi= mi maxime implentur melle: ideoq; auerso aluco faui eximuntur. Gerula secundos flatus captant. Si cooriat pro= cella, apprehensi pondusculo lapilli se librant. Quidam in humeros eum imponi tradunt. Iuxta uero terram uolant in aduerso statu uepribus hebetato. Mira obseruatio operis. Cessantium inertiam notant, castigant, mox et puniunt morte. Mira munditia. Ampliuntur omnia è medio, nullaq; inter opera spurcitia iacent. Quin et excrementa ope= rantium intus, ne longius recedant, unum congesta in locum, turbidis diebus, et operis ocio egerunt. Cum ad uespem rascit in alueo strepunt minus, ac minus, donec una circumuolet, eodem quo excitauit bombo, seu quietem capere im= perans: et hoc castrorum more, tunc repente omnes conticescunt. Si fortè fortuna apum uniuersum deperderetur genus, facile reparari posset ex bienni uitulo, ut libro IIII. Georgicorum clare docuit Virgilius, ita canens.

Apum rex, &amp; regimen.

Apes quibus gaudeant.

Mira apum in opere suo indutria.

Apum repa= tio ex Virgil.

Exiguus prinum, atque ipsos contractus ad usus  
Eligitur locus: hunc angustiq; imbrice tecti,  
Parietibusq; premunt arctis: et quatuor addunt  
Quatuor à uentis obliqua luce fenestras.  
Tum uitulus bima curuans iam cornua fronte  
Queritur: huic geminae nares, et spiritus oris  
Multa reluctanti obstruitur: plagisq; perempto  
Tunsa per integram soluuntur uiscera pellem.  
Sic positum in clauso linguunt: et ramea costis  
Subiiciunt fragmenta, thymum, castasq; uirentes.  
Hoc geritur zephyris prinum impellentibus undas.  
Antè nonis rubeant quā prata colaribus, antè  
Garrula quā tignis nidum suspendat hirundo.  
Interea teneris tepofactus in osibus humor




Aestuat : & uifenda modis animalia miris ,  
 Trunca pedum primò , mox & stridentia pinnis  
 Miscentur : tenuemq; magis , magis aëra carpunt :  
 Donec , ut aestiuus effusus nubibus imber ,  
 Erupere : aut ut nervo pulsante sagittæ ,  
 Prima leues ineunt si quando prælia Parthi .

Nomina .

De reparatione Apum hæcenus Virgilius . Caterum etiam apes in medicina usum habent : siquidem sicca & in puluerem contrita , ijs admixta , quæ ad id faciant , ex oleo , & cera inunctis alopecij capillum restitunt .  
 ut Græcis , ita etiam Latinis Propolis appellatur : Arabibus , Mum , uel Iasach alcut : Italis , Propoli : Germanis Vorstosz : Hispanis , Betum de colmena .

## Triticum .

## Cap. LXXVIII.



OPTIMA è tritici generibus ad secundæ valetudinis usus habentur , quæ recentia , & iam perfectè adulta , colorem luteum referunt . dein sequuntur trimestria , quæ nonnullis sitania nominantur . Itaque cruda in cibis teretes tineas gignunt : canum moribus profunt , mansa & imposita . Confectus eorum similagine panis , plus alit , quàm cibarius . E trimestrium farina panis , leuiorem cibum præbet , & qui faciliè in membra demandetur . Farina eorum cum hyoscyami succo illinitur aduersus neruorum fluxiones , quas Græci rheumaticos vocant : item contra interaneorum inflationes : lentigines ex aceto mulso tollit . Furfures autem in aceto decocti , turgentes mammas sedant : viperarum ictibus auxiliantur : & torminosis profunt . Farinaceum fermentum calcificandi , extrahendique vim habet : priuatim callos pedum , clauosque extenuat : & cætera tubercula furunculosque ex sale concoquit , & aperit . Si tantiorum farina , contra venenatos ictus cum aceto , aut vino commodissimè illinitur : eadem si decocta in glutini modum delingatur , cruentis ex creationibus proderit : contra tussim , & exasperatas arterias , cum mentha & butyro decocta , efficax est . Tritici pollen si ex aqua mulsâ , aut hydrelæo decoquatur , omnem discutit inflammationem . Panis & crudus , & coctus cum aqua mulsâ inflammationes omnes illitu mulcet , cum emolliat , & quadântenus refrigeret : sed herbis , succisue huic rei accommodatis admisceatur . Vetus panis aridus , adiectis mura conuenientibus , citam aluum cohibet . Recens muria maceratus , illitu vetustas impetigines sanat . Glutinum

ex similagine , & pollonie , quo chartæ glutinantur , sanguinem excreantibus prodest , si liquidius , ac tepidum cochlearis mensura detur sorbendum .

Tritici genera ex Theophrasto .

TRITICI genera ( ut Theophrastus auctor est lib. VIII. cap. IIII. de plantarum historia ) plura notantur , cognomina ex locis sortita , ut Aphricum , Ponticum , Thracium , Assyrium , Aegyptium , Siculum . quæ & colore , & magnitudine , & specie , & proprietate inter se differunt . Quædam uel aliunde cognomina sortiuntur pro suis uiribus tum alijs , tum uel maxime quæ ad cibum pertineant , ut cachrydias , stlengys , alexandrinus . quorum omnium differentias in supradictis colligere licet . Nec uerò ab re fuerit , si illa quoque pro differentijs capies : & aliud præcox , aliud serum : & aliud auctu amplum multumq; reddens , aliud ieiunum quoddam parumq; ferens : & aliud siticam grandiore effundens , aliud paruam : & aliud diu in folliculo manens , aliud aptum breui absolui , ut Aphricum : & aliud culmo tenui constans , aliud crasso . quod etiam ipsum Aphrico datum est : crasso tamen & cachrydias dictum consistit . Item aliud tunicis paucis , aliud multis uestitur , ut Thracium : & aliud unicalamum , aliud multicalum , & magis minusq; . Adde etiam si quid aliud his , aut prædictis , ratione uirium proximum est : eiusmodi namque differentia naturaliores profecto appareant . Quibus & trimestrium annumerari genus par est , & bimestrium , & si quid intra pauciores dies ualeat consummari , ut in Eubœa genus quoddam intra quadraginta dies crassari , perfici posse affirmant , idemq; firmum esse , ac ponderosum , nec trimestris modo leue . Quamobrem famulis id præberi inueniunt : etenim nec multum in hoc furfuris esse uolunt . Igitur genus id celerrimum quidem ad consummationem , sed inuentu rarissimum est . Et bimestria uerò quædam habentur , quæ ex Sicilia & in Achaia aduecta sunt : sed hæc pauca cum reddunt , parumq; sæcunda habentur : quanquam cibo facilia , & iucunda sunt . Nascuntur & alia quædam genera







## HORDEVM.



Hordei confideratio.

Hordei facultates ex Gal.

Pisanae confideratio.

Manardi opinio.

Panis hordeaceus.

Polentae confideratio.

calyce dolores finit, qui latus excruciant: aduersus intestinorum inflationes cum lini semine, foenograeco, & ruta illini iuuat: strumas cum pice liquida, cera, oleo, & impubis pueri urina, ad concoctionem perducit: & cum myrto, aut uino, aut malicorio, aut syluestribus pyris, aut rubo, alui profluvia sistit podagricis inflammationibus cum cotoneis, aut aceto prodest: decocta in aceto, modo quo hordeaceum cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Cremor uero farinae ex aqua, atq; cum pice, & oleo decoctus, puri mouendo est: cum aceto subactus, itidem & cum pice contra articulorum fluxiones prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflammationesque mitigat.

NON minus Hordeum in Italia uulgaris notitia est, quam triticum. Est autem (ut Theophrastus libro VIII. cap. III. de plantarum historia memoriae prodidit) in hordei genere differentia. quippe quod aliud binis uersibus, aliud ternis, quaternisq; cumq; plurimum senis: est enim uel eiusmodi quoddam genus. Quod uero pluribus construitur uersibus, hoc semper ferè spissius, posituq; arctius constat. Magnam & Indicium differentiam facit: quandoquidem ramiis natum sit brachuari, ut propositum sui. Et spica uero alijs grandiores, rariioresq; constant: alijs minores, frequentioresq; & alijs distantiores à folijs, alijs proximiores, ut Achilleis cognomine. Et hordeorum ipsorum alia rariustundius, minusq;: aliud oblongius, maiusq; atq; in spica rarior. Item aliud candidum, aliud accedens ad purpuram, quod & scarinam reddere copiosius creditur: & contra hyemem, & statum & in totum contra celi mutationes candido ualidius esse uidetur. haec Theophrastus. Oritur & in Gallia hordeum, quod cum Galtherinum dici putauerim, quia folliculo castratū enascitur. Gal-

li qui serunt, mundum uocant hordeum, quod sponte grauium gluma concidat, in reliquo autem non nisi egrè deglubitur. Hordeum magis, quam triticum, rubiginem sentit, minusq; tolerat imbrium impetus. Siquidem in festis imbribus, aut uliginosis locis, aut longiore pluuia dilutis satum in lolium degenerare affirmant. Hordei meminit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. Hordeum primum est ordinis in exiccando, & refrigerando: habet etiam paucillum absterisionis. Paulò etiam plus desiccet, quam farina fabacea, cui non insit cortex: cetera uero similia sunt foris utentibus. In cibo autem hoc fabis praestat, quod flatuosam naturam exuat: fabis, quantumcumq; coxeris, flatuosa natura remanet: sunt enim crassioris essentiae, quam hordeum. quamobrem co plus etiam alunt. Porro quoniam utrunq; paulum à medio recessit, multo sunt usui. Nam talia medicamenta multis alijs miscentur, ceu materiae quaedam: itaque etiam cera, & oleum, non paucis medicamentis coniunguntur. Aspicitur uero, hoc est polenta, multò plus hordeo desiccet. Et primo de facult. alimentorum sic inquit. Hoc item semen in usu frequenti apud homines est, quod non eandem cum tritico habet facultatem. Siquidem aliud palam calfacit, hoc uero non modò non calfacit (quo modo nonnulla, quae in medio sunt calefacientium, & refrigerantium, uti amylinum & elotus panis) sed quoquo modo ipso utare, siue panes ex ipso feceris, siue ptisanam coxeris, siue polentam paraueris, uim quandam refrigerandi habere cernitur. Dissidet praeterea succi specie à tritici natura hordeum: nam ex succis, quos utrunque semen gignere natum est, qui quidem è tritico in nobis prouenit, crassus, & uiscosus est: quod hordeo, tenuis, ac nonnihil deterforius. Nulla igitur apparandi ratione hordeum unquam calfacit: sed uarie pro modo praeparationis humectat, ac desiccet. Etenim manifestè cernimus, polentam ex tosto hordeo factam siccare: polentam contra humectare, si quidem ut decet fuerit parata, hoc est, cum in coctione quam plurimum intumuerit, postea igne lento per multum otium in chylum fuerit redacta. haec Galenus. Ceterum cum recentiores medici Galenorum ui ptisanam non rite, & ad unguem parare nouerint, eius uice integrum deglubitum hordeum accipiunt, & tantisper decoquunt, dum pulvis speciem referat: tunduntq; deinde, & tenui incerniculo percolant, modò saccharum, modò dulcium amygdalarum, modò melopeponum, ac papauerum seminis cremorem, pro morborum ratione addentes. Manardus uero Ferrariensis aetate nostra acutis morbis minime competere antiquorum ptisanam, minusq; recentiorum existimat: quod, ut ipse asserit, Itali huic cibo à teneris non assueuerint, quodq; nostri usus hordeum antiquorum hordeo facultate sit longè infirmius. Cuius tamen sententiae non uulgari ratione ducti medici Hippocraticam, Galenicamq; doctrinam sequentes, minime ad stipulantur. Porro hordeaceus panis praeter id, quod uentriculo laborantem inferat, frigidos, lentosq; succos generet, parum nutrit, flatuq; gignit: quanquam asserunt nonnulli podagricis hordeaceum panem peridoneum esse. Sed cum polenta speciatim ex hordei farina fiat, interponaturq; sepius à Dioscoride simplicibus medicamentis, ut omnibus palam sit, quidnam extiterit polenta apud antiquos, non alienum duximus hic de ea differere. Polentam ueteres pluribus modis faciebant, ut Plinius est auctor lib. XXII. cap. VII. Graci



Græci enim perfusum aqua hordeum nocte una siccabant, ac postero die frangebant: deinde molis frangebant. Erant & qui uehementius tostium rursus exigua aqua aspergerent, sicarentq; prius quam molirent. Alij uero uirentibus spicis decussum hordeum recens purgabant, madidumq; tundeant in pila, atq; in corbibus eluebant: siccatumq; in sole rursus tundeant, & purgatum molebant. Quocunq; autem genere preparato uicenis hordei libris, ternas seminis lini, & coriandri selibras, salisq; acetabulo, torrentes ante omnia miscebant in mola. Itali uero sine perfusione hordeum tostium in subtilen formam molebant, iisdem additis, atq; etiam milio. hæc ex Plinio. Cæterum aliam rationem parandi polentam prodidit Galenus libro primo de alimentorum facultatibus. Vbi non ex alijs seminibus aduensis, ut Plinius tradit; sed ex hordeo tantum recenti, ac nouo mediocriter tosto landatissimam fieri polentam scribit. Quare crediderim, ijs medicamentis, quæ Dioscoridis, & Galeni scriptis polentam expetere inueniuntur, eam legumini imponendam esse, quæ ex recenti, & uiridi adhuc hordeo modicè tosto, & in farinam redacto parari debeat: quod de hac utrunque intellexisse non dubitem. Hordeum quod Latinis *αριθν* Græcis appellatur: Arabibus, *Xa-haer*, aut *Shair*: Italis, orzo: Germanis, Gersten: Hispanis, Cenada: Gallis, Orge.

Nomina.

## Zythum.

## Cap. LXXX.

EX HORDEO potus fit, cui Zytho nomen est. Is urinam cit. renes, & neruos tentat: membranis, præsertim cerebrum uestientibus, officit. Inflationem parit, uitiosum succum creat, elephantiasin gignit. Perfusum zytho ebur, obsequiosum, & operi tractabile redditur.

## Curmi.

## Cap. LXXXI.

FIT ET ex hordeo potus, quem Curmi nominant, eoq; sæpe potu pro uino utuntur: uerum dolorem capitis mouet, malum succum gignit, neruis nocet. Consimilia etiam potus genera ex tritico fieri solent, in Iberia, quæ occidentem spectat, & Britannia.

ZYTHVM, quantum ex Dioscoride colligi potest, potus sanè fuerit ex macerato hordeo, uel tritico paratus, illi maxime similis, qui aquilonaribus regionibus Ceruisia appellatur. Siquidem huius rei testis est Plinius lib. xxi. capite ultimo, ubi sic inquit. Et frugum quidem hæc sunt in usu medico. Ex iisdem fiunt & potus: zythum in Aegypto: calia, & ceria in Hispania: ceruisia, & plura genera in Gallia, alijsq; prouincijs. hæc Plinius. A' zytho parum differt Curmi, quod & ipsum paratur è frugibus, nimirum hordeo, triticoq; in aqua maceratis, bibaturq; uini loco. Quamobrem credendum est, nil aliud zythum, & curmi fuisse antiquis, quam Ceruisia, quam loco uini bibit hoc duo uniuersa regio septentrionalis: nempe Germania, Bohemia: Polonia, Cimbria, Gallia, & aliæ argentes Europæ regiones. Nec aliam inter zythum, & curmi crediderim esse differentiam, quam in conficiendi ratione, cum eorum utrunque fiat ex eadem fruge. Siquidem conficiendi ratio uno, uel altero modo adhibita, rerum facultates & auget, & imminuit, cum plus, uel minus cocturæ adhibent artifices, quemadmodum etiam hac tempestate in Germania euenit. Nam etsi omnes illi potus ex hordeo, uel tritico parentur; diuersa tamen est apparandi ratio, cum saporibus inter se differant. Aliæ namq; dulces, gratæq; gustui sunt: aliæ uero amare, austeraq; habentur. quinetiam aliæ turbidæ, & aliæ claræ pellucidæq; cernuntur. In Bauaria antequam potus suos conficiant, hordeum, & triticum macerant lupulorum decocto. Quo fit, ut non leui plectatur pœna, qui lupulos secuerit, uel deperderit. Serunt enim Bauari lupulos, coluntq; hanc ob causam, ut nos uites, demetuntq; eorum flores, & fructus statutis temporibus: quandoquidem eorum decocto maceratæ fruges, non inodò fermentantur; sed & uini speciem induunt. Quapropter potus inde confectus gustatu gratior euadit. Inebriat is largius sumptus, quemadmodum & uini, perduratq; eius temulentia lōge diutius, quod crassior, concoctusq; difficilior sit, quam uinum. Zythos sic Græcè, ut Zythum item Latine, & Italicè Zitho uocatur.

Zythi, &amp; curmitis confide ratio.

## Z E A.



## Zea.

## Cap. LXXXII.

ZE A duorum generum est. una simplex: altera in geminis putaminibus grana bina iuncta gerit, ob id dicoccos appellatur. Plus quam hordeum alit, ori grata. digeritur in panificia, minus quam triticum alens.

NISI Zea, de qua hic differit Dioscorides, illud fuerit frugis genus, quod Itali partim Spelta, partim Pirra uulgò dicunt; aliam quidem frugis speciem prouenire in Italia non facile crediderim,

Nomina,

Zea confide ratio.



Zea uires ex  
Galenio.  
Nomina.

derim, quæ legitimam referat zeam. Verum enimvero quod zea, italica sit spelta, facile ex Dioscoride coniectari potest, quod scripserit duplicem esse zeam, quarum una simplex, altera dicoccos appellatur, eo quod in geminis pulueribus grana bina gerat. Nam & Spelta apud Italos diuina est generum: una spicas profert simplicibus granorum uersibus: altera uero ijs duplicibus constat, in quibus singulis folliculus quo concludit granum. Zeam hanc quidam, ut Foro iulienfes, Pirra farra uulgo appellant, quod ex ipsius deglubitis granis farris modo halicam conficiant. Plinius præterea libro xviii. cap. vii. zeam esse Italie in Campania maxime, & semen uocari ait. Id quod manifestè ostendit, cum zea fuerit copiosa fruges in Italia, facile in hunc usque diem eius perdurare prouentum. Quod cum ita esse certò credam, nil aliud antiquorum zea esse potest, quam spelta nobis uocata. Hanc Hetrusci antiquè quadantenus secuti appellant uulgo biada. Nam quemadmodum hoc nomen semen, omnibus seminibus est commune: ita biada, quæ idem est, quod seges, cunctis segetibus, & frugibus communiter aptari potest. Sunt & apud Italos bres, qui Speltam, algam quasi alicam uocent. quod facile attestatur hanc esse zeam. Siquidem & ueteres deglubebant zeam halicam appellauere. Zea meminit Galenus lib. vi. simpl. medicamentorum sic inquit. Zea uero sua facultate quodammodo in medio est tritici, & hordei. Itaq; ex illis cognoscatur. Eius nomen Græcum ἐλάκη, Latinum pariter & Italicum zea: Arabicum, Hais: Germanicum, Speltz, S. Peters horn, Kin, korn, & Dinkelkorn: Hispanicum, Spelta: Gallicum, Efeltra, & Effeautre.

## Crimnon.

## Cap. LXXXIII.

CRIMNON crassior est ex zea, triticoque farina, ex qua pultem faciunt. Abundè alit, † sed ægrè conficitur: aluum uehementius adstringit, si zea, ex qua fit, prius torreatur.

Crimni consideratio.  
Nomina.

CRIMNUM crassior zea, aut tritici farina extitit apud antiquos, quæ ad pultem conficiendam utebantur: quaq; loco panis diutius uictitarent, ut Plinius est auctor libro xviii. cap. viii. Κρίνον id Græcis, quod etiam Latini Crimum, & Hispani Farina atorcolata, aut Rolum uocant. † Neque Ruellium, neque communem, uulgatamq; Græcam lectionem hic secuti sumus: sed Marcellum, qui probatissimi codicis testimonio non ἐλάκη, quod facile conficiatur; sed ἀλάκη, quod ægrè concoquitur, legendum putat.

## Olyra.

## Cap. LXXXIII.

EIDEM zea generi † olyra adscribitur, sed minus aliquantò nutrit. In panes, ut zea, cogitur. Fit quoque ex olyra crassior farina, quam Græci crimnon uocitant.

Olyræ consideratio.  
Marcelli, & mutorū opi. reprobata.

OLYRAM zea esse speciem, Dioscoridis testimonio, ambigit nemo; tametsi hac ætate non seratur in Italia. Ideoq; Galenus iisdem Olyram polleere facultatibus ait, quibus & zea: is enim utraq; inter triticū, & hordeū medium tenere temperamentum asseruit. Adducitur autem Marcellus, ut ferè credat, olyram à Secale uulgo uocari, è quo rustici alpum cultores panem conficiunt, minimè differre. Quæ in re Plinium sibi alioqui familiarem olyra, & secale, quod tantèr legisse demonstrat, cum non animaduertit seorsum, ac differenter scripsisse Plinium de olyra, & secale, quod speciatim farraginem appellauit lib. xviii. Nam cap. x. ex arinca, quam Græci olyram uocant, fieri dulcissimum panem scribit. At xvi. ex secale deterrimum, & tantum ad arcendam famem utilem. In eodem uersatur error Otho Brunfelsius eo compendio, in quo sibi omnia Dioscoridis simplicia medicamenta declarasse, nobis autem confusè uidetur. Siquidem is inter alias ineptias asserit olyram omnino esse secale. Ad hæc non possum non admirari inter molauim, Manardum, & Ruellium alioqui doctissimos uiros: quippe qui uno ore fateantur, olyram Plinio siliginem nuncupari, cum is speciatim de siligine, et olyra, tanquam de rebus inuicem discrepantibus scripserit lib. xvii. capite octauo, nono, & decimo. Quandoquidem is pro siligine intelligit quoddam præstantissimi frumenti genus, ex cuius farina ueteres panem candidissimum, lenissimumq; conficiebant: pro Olyra autem aliam frugis speciem, ex qua dulcis fiebat panis, uocatq; hanc Arincam, sicuti etiam libro xxii. capite uigesimo quinto, non (ut ij quidem asserunt) siliginem. Horum sententiam refellit etiam Galenus libro primo de alimentorum facultatibus, ubi de pane agens, inquit. Panis quidem sincerissimus cum à Romanis, tum ab omnibus ferè, qui illorum subiaceret imperio, siliginis uocitatur. Nam siliginis, quæ Latina inflexione siligo dicitur, Græca uox non est, nec apud illos alia habetur. Quod minimè dixisset Galenus, si olyra, & siligo idem fuissent: cum olyra Græca planè sit uox. Ex quibus colligi potest, quod si olyra, & siligo idem extitissent, nequaquam affirmasset Galenus, siliginem apud Græcos carere nomine. Hallucinantur itaq; non solum qui putant ueterum siliginem, & olyram esse idem; sed & qui existimant olyram esse secale, quam Plinius farraginem, nos uero uulgo Segala appellamus. Siquidem præter rationes; & auctoritates à nobis adductas, id etiam experimento falsum esse manifestè deprehenditur, quod panis siliginis Galeno purissimus, & omnium ad alendum aptissimus reddatur. Apud nos uero impurissimus sit, nigerrimus, & ad alendum imbecillissimus, quæ ex secale, uel farragine conficitur. Zea species ὀλῦρα Græcis, Olyra similiter Latinis appellatur, quemadmodum & Italis: Germanis, Rocken, & korn: Hispanis, Centeno blanco: Gallis, Seigle blanche. † Ne quis frustra querat siliginis caput, lectorem admonitum uolumus, hic nos minimè secutos esse Ruellium, qui ὀλῦρα siliginem uertit: sed Græcam uocem retinuisse, quod olyram à siligine planè differre censeamus, ut in commentario ostendimus.

Nomina.



## Athera.

## Cap. LXXXV.

ATHERA ex zea fit tenuissimè molita. Est autem sorbitio, quasi liquida pulricula, infantibus conueniens, & cataplasmatibus efficax.

CVM Dioscorides, satis superq; declarauerit, quid sit Athera, necessarium quidem non duximus de ea plura scribere. Veruntamen illud ignorandum non est, quòd nonnulli auctores sunt, qui Atheram etiam fieri asserant ex tritico, olyra, & amylo. Hec Germanis uulgò Mosa uincupatur: ulunturq; ea plurimum non modò infantulorum lactentium cibis, quemadmodum nos panem in aqua decocto; sed & quotidianis mensis, quam ex farina, lacte, & butyro præparant, ut ij quidem norunt, qui diu in Germania uersati sunt. Quæ ἀθήρα Græcè, Athera item Latine, & Italicè nominatur: Germanicè, Muos: Hispanicè, Papas.

Atheræ consideratio.

Nomina.

## Tragos.

## Cap. LXXXVI.

TRAGOS quādam halicæ frugis figuram gerit. Multò minus, quàm zea nutrit, quòd multum aceris habeat: quare ægrius conficitur, aluumq; magis emollit.

TRAGOS, quem aliqui halicam, nonnulli uerò fur notis referre asserunt, hac ætate, quod ego sciam, non provenit in Italia. At quoniam (ut Plinius inquit lib. XVIII. cap. X.) ex oriente peregrinus nobis inuectus erat, unde nostro etiam æuo innumere deferuntur plantæ; mirum quidem non est, si tam longo temporis tractu, relicto Italico cultu, in proprium redierit solum, ex quo primum ad nos aduehi cepit, ut in alijs quàm plurimis euenisse comperimus. Nomen eius Græcum τράγος, Latinum quoq; Tragus: Arabicum, Sult: Germanicum, Hamelkorn: Gallicum, Duple turquet.

Tragi consideratio.

Nomina.

## Auena.

## Cap. LXXXVII.

AUENA genicula quædam habet: folio, & stipula triticum imitatur: & in cacuminibus dependentes paruulas ueluti locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur, utile ad cataplasmata, uti hordeum. Pulte huius aluus sistitur. prodest tussientibus in sorbitione succus.

TAMETSI Auena, uulgaris notitiæ seges, edita sit à natura in equorum potius, quàm hominū alimentum; in Germania tamen ab accribus repurgata, & iure pinguium carniū elixa, frequenter in cibis sumitur, quemadmodum in Hetruria far, & oryza. Quin & puliculam Germani ex ea parant eadem ratione, quam in Athera paulò superius retulimus. Bromos, id est, Auena (ut Galenus memoriæ prodidit libro VI. simplicium medicamentorum) unum est ex leguminibus: uerum ut medicamentum similem bordeo uim obtinet. Nam illitum desiccatur, & digerit mediocriter, & sine morsu. Temperiem autem habet paulò frigidiorē. Nonnihil etiam adstrictionis obtinet, ut uētris profluuiā inuēt. Et primo de alimentorum facultatibus: Hoc semē (inquit) in Asia perfræquens est, & potissimū in Mysia, quæ est supra Pergamum, ubi & typha, & olyra uberrimè est prouentus. Inuentum autem est alimentum, non hominū: nisi utique aliquando extrema fame, ad panes ex eo quoque semine conficiendos compellantur. Citra famem autem coctum, ex aqua estur cum rino dulci, aut sapa, aut mulso. Ceterū Auena farina (ut Plinius adnotauit lib. XII. cap. XXV.) decocta in aceto nauos tollit. Seges hæc, quæ σπάρτος Græcè, Auena Latine uocatur: Arabicè, Cartanum, siue Churtal, Italicè, Vena: Germanicè, Habern: Hispanicè, Auena, & auca: Gallicè, Auoyne.

Auenæ consideratio.

Auenæ facultas ex Gal.

Nomina.

## Oryza.

## Cap. LXXXVIII.

ORYZA frugum generis est: in palustribus, rigisque nascens. Mediocriter alit: sed aluum supprimit.



## O R Y Z A.

Orizæ facultas ex Gal.

Nomina.

Halicæ consideratio.

Halicæ vires ex Gal.

Farris, &amp; halicæ differentia.



O R Y Z A adeo omnibus in cibis familiaris, frequensq; est, ut nulla prorsus explanatione in ea describenda sit opus. Quam etiam de eius uiribus nil aliud explicandū relinquitur, quam quod literis mandauit Galenus. qui libro VIII. de simplicium medicamentorum facultate, sic de ea paucis scribit. Oryza habet assermentorum quippiam: quare mediocriter uentrem sistit. Et lib. primo de alimentorum facultatibus: Semine hoc, inquit, omnes in se stenda aluo utuntur, ipsum eodem modo, quo halicam decoquunt. Difficilius tamen quam halica conficitur, & minus alit, cui utiq; & in edendi suauitate ab ea quam plurimum deficit. *ῥυζα*. Græcis, ita etiam Latinis oryza nominatur: Arabibus, *Arz* seu *Arzi*: Italis, *Riso*: Germanis, *Reisz*: Hispanis, *Arroz*: Gallis, *Ris*.

Halica.

Cap. LXXXIX.

HALICA fit ex zea, quam dicoccon appellamus. Plus alit, quam oryza: aluum magis cohibet. Florum macho longè utilior. Decocta in aceto, illitaque lepra tollit: vnguium scabritias extricat: incipientibus ægypti loipis medetur. Decoctum dysentericis, quos exercitior dolor, infusum, idoneum est.

HALICAM antiquitus parabant ex zea, cretam, & gypsum admiscentes. Huius rei auctor est Plinius lib. xviii. cap. xi. sic inquit. Halica fit ex zea, quam semen appellamus. Tunditur granum eius in pila lignea: nam lapidis duritia conuertitur. Nobilius, ut notum est, pilo uinctorum poenali opera. Prius inest pyxis ferrea, excusis inde tunicis. Iterum ipsam ammentis nudata conciditur medulla. Ita fiunt halicæ tria genera: prima, minimum, ac secundarium, grandissimum uero apherema appellatur. Hæc inter Puteolos, & Neapolim in colle Leucogeo appellato. Halica adulterina fit maximè ex zea, quæ in Africa degenerat. Eius spica, nigrioresq; & breui stipula, pinsunt cum arena, & sic quoq; difficulter deterunt utriculos. Postea, gypsum ipsi pars quarta inspergitur, atq; ut cohereret, farinario cribro subcernunt. hætenus Plinius. Ex quo non satis dubitari possum, quod ueteres & cretam, & gypsum in cibis simul cum Halica citra noxam esitassent, cum procul dubio compertum sit, gypsum in corpus assumptum adeo spiritibus meatus obstruere, ut facile homines strangulet. Nisi fortasse dixerimus, quod quanquam aliqui cretam, alij uero gypsum halicæ commiscerent, ut candidior, & mollior esset: abluitionibus tamen prius eam expurgabant, quam decoquendam traderent. Namq; et hoc tempore gingiberis & radices fabrili rubrica inficiunt, ut illas à carie, & teredine uindictent: quæ tamen & abluuntur, & deraduntur, & creta bro excutitur, cum in ciborum condimentis, uel medicamentorum misturis ea expetuntur. Hoc enim mihi uisus est inuississe Galenus libro primo de alimentorum facultatibus, cum ait. Cæterum diligentissimè, dum ex halica elota sorbitiones parantur, animaduertere oportet. Quippe cum Halicam ad sorbitiones parandas elui præcipiat, id sane facere uidetur, ut repurgetur à creta, & gypso, quibus inficiebatur. Quod autem in cibum non sumeretur Halica, quæ ab omni mangonio non esset purgata, ostendit idem Galenus loco nuper citato, cum inquit. Halica ex genere est tritici, quæ ualenter nutrit, succumq; lentum habet, siue in aqua duntaxat coctam cum mulsio, aut dulci uino, aut etiam adstringente sumas, siue ex oleo, saleq; conditam. Qui autem per sanitatem ob uehementem uentris mordicationem siue à biliosi humoris copia, siue aliunde profectam, sorbitione egent, ijs halicam affatim coctam, quoad teneam flacciditatem adepta colliquescat, deinde conditam, & colatam, ut ptisanæ colato cremori persimilis sit, sorbendam exhibeto. Hæc Galenus. qui certè tot laudibus hac in re Halicam non commendasset, si creta, uel gypso admixta assumpsissent in cibum. Fiebat antiquitus Halica non modò ex zea, quæ dicoccos dicitur; sed etiam ex tritico, & alijs frumentaceis, ut ex Galeno, Paulo, Aetio, & alijs intelligi facile potest. Fit & hoc tempore in uniuersa Italia, quanuis eam non Halicam, sed Far falsò appellent. Nanque far ab halica longè diuersum putamus. Quod autem Far à chondro, siue halica differat, sitq; per se frumenti, uel tritici proprium genus, antiquis Adorcum nunciatum, è quo Far ipsum paratur, id sanè ex plurimum probatissimorum auctorum scriptis apertissimè constat. Siquidem id primum declarat Plinius lib. xviii. cap. viii. sic inquit. Frumenti genera non eadem ubiq; neque ubi eadem, sunt iisdem nominibus. Vulgarissimum far, quod Adorcum ueteres appellauere. Quin & eodem capite, ut fortasse palam faceret, aliud esse zeam, è qua fit halica; aliud uero far: Qui zea utuntur, inquit, non habent far. Item cap. vii. eiusdem libri: Populum Romanum, ait, farre tantum è frumèto trecentis annis usum Verrius tradidit. Quo tempore Romanis nullus fuit halicæ usus, ut ipse testatur Plinius lib. x. cap. xxv. cum inquit. Halica res Romana est.



na est, & non pridem excogitata, neq; arbitror Pompei magni atate in usu fuisse. His accedit Asclepiadis, & Galeni auctoritas lib. VII. de compositione medicamentorum secundum locos in quodam eclegmate ad cruenta sputa, ubi sic habet. Farris Clusini appellati sextarij dimidium, decocti marrubij uiridis sextarium unum. Hæc in uas uitreū coniecta per diem, & noctem macerari sinito. Sequenti die pharnacum mollito, quemadmodum halicam maceramus. hæc Galenus. Quibus palam est à farre differre halicam. Galeno deinde subscribit Aetius lib. IX. cap. XLV. ubi ex Archigene hæc habet. Quod uerò Latine in regionibus Romæ uicinis far appellant, hoc modo paratur. Frumentum modico tempore aqua madefacito: indeq; extractum, ac in pilam coniectum, ueluti ptisanam, à cortice repurgato. Vbi uerò corticem exuerit tollito, atq; in sole siccato: deinde manibus tritum, donec penitus à cortice fuerit mundatum, crassissimè molito, ita ut granum unum in quatuor, aut quinq; partes redigatur, & siccum asseruato. Vfus autem tempore halicæ modo coquitur, & à sanis in cibo sumitur. Pro ægris uerò uariæ apparatus, et epithematis quoq; admiscetur. Quidam spicas frumenti adhuc uirides tollunt, ex ipsisq; far concinnant, quo modo & suauius, & iucundius redditur. hætenus Aetius. Ex cuius, & supradictorum testimonio, illud planè omnibus patere arbitror, quod far ab halica disteat. qua de re etiam plura, duce Deo, dicemus in epistolis nostris. Quod Græcis *χώρας*, Nomina. Latinis pariter & Italis Halica nuncupatur: Arabibus, Chandaros.

## Milium.

## Cap. XC.

MILIVM in panes coactum, minus cæteris frugibus alit: sistit pulte sua aluum, urinam cit. Torretur milium, feruensque in sacco ponitur, ut torminibus, reliquisque doloribus, si foueatur, auxilio sit.

MILIVM, ut libro VII. simplicium medicamentorum prodidit Galenus, primo ordine refrigerat, exiccat uerò tertio exoluto, aut certè secundo intenso. paululum etiam habet tenuitatis. Ex hac tum consistentia, tum temperatura instar quidem edulij conestum, planè inter omnia frumentacea edulia minimum confert nutrimenti: sed & uentrem desiccatur. Porro foris impositum in sacculis idoneum est fomentum ijs, quæ citra morsum exiccari postulant: & cataplasmatibus modo illitum exiccare potest. attamen admodum friabile est, proinde difficilis est eius in cataplasmatibus usus. Quibus omnibus ea prorsus adstipulantur, quæ idem de Milio tradidit libro primo de alimentorum facultatibus, cum inquit. Milio item in pane nonnunquam utuntur, urgente frugum penuria. Panis tamen ex eo exigui est alimenti, & refrigerans. Constat insuper præaridum, & instar arene, aut cineris friabilem esse: nihil enim in se habet pinguitudinis, & lentoris. Iure ergo aluum humentem desiccatur. Agricole huius farina cocta, admixto adipe suillo, & oleo uescuntur. *Κέρας* Græcè, Nomina. Milium Latine dicitur: Arabicè, Ieuers, Geguers, siue Giaures: Italicè, Miglio: Germanicè, Hirs; Hispanicè, Milho, et Miyo: Gallicè, Millet.

Milij vires ex Galeno.

Nomina.

## Panicum.

## Cap. XCI.

PANICVM frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile, eodèmq; modo in panes subigitur. Eosdem habet usus; minus tamen & nutrit, & stringit.

PANICVM, ut scriptum reliquit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum, ex leguminum genere est, milio specie simile, facultate certè pauci nutrimenti, & exicatoria. Sistit quoq; nonnihil uentris fluxus, ceu ipsum etiam milium. Si uerò foris illinatur, exiccat, atq; refrigerat. hæc Galenus. Caterum scribit Ruellius secundo de natura stirpium uolumine, Panicum in Italia Melicam appellari. Qua in re aperte hallucinatur: nanq; melica, quæ apud Insuabres uulgo Melega nominatur, illud genus frugis est, quam nostrum uulgus in Hetruria Saggina uocat. Alij uerò in Italia populi Sordo appellant. Nec usquam, quod sciam, in Italia panicum melicæ uocatur. MELICA autem (ut utar hoc nomine) frugis est genus tam forma, quam proceritate arundinem referens, adeo ut campi, in quibus ad maturitatem usque adoleuerit, arundinetæ representare uideantur. Eius tamen calamus non ut uulgarium arundinum, inanis est, sed sacchariferarum arundinum modo, alba fæctus medulla. Panicule, quas ad Cybelis pomorum

Panici vires ex Galeno.

Ruel. lapsus.

Melicæ consideratio.



## P A N I C V M.

Nomina.



pororum magnitudinem summis proferunt culmis, quedam cum maturitatem senferint, in nigro rufescunt: quedam uere nigredinem in uniuersum contrahunt, granis compluribus onuste. Deprecitur granum à rusticis, moliturq; in farinam, & inde in agrestem cogitur panem: etsi in Hetruria potius ad columbarum, Gallinarumq; seratur saginam, quàm ad hominum alimentum. Hoc Plinio libro XVIII. cap. VII. nilium est Indicum. quod tamen non animaduertit Ruellius alioqui maximus Plinij sectator. Plinius enim sic habet. Milium intra hos decem annos ex India in Italiam inuectum est, nigrum colore, amplum grano, arundineum culmo. Adolefcit ad pedes altitudine septem, prægrandibus culmis, lobas uocant, omnium frugum fertilissimum. Quod nos Græcis, Panicum Latinis appellatur: Arabibus, Dochon: Italis, Panico: Germanis, Pfenich, Heydelpfenich pray, Fuchschuuantz: Hispanis, Panizo, & Paniso: Gallis, Paniz.

## Sesamum.

## Cap. XCII.

SESAMVM stomacho inutilis cibus. halitus grauitatem facit, quoties inter mandendum, commissuris dentium inhaeret: neruorum crassitiem illitu discutit: medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerastæ morbis: capitis dolores, qui æstuatione concitantur, ex rosaceo lenit. Eadem efficit herba decocta in uino: præsertim inflammationibus oculorum, doloribusque prodest. Ex ea fit oleum, quo Aegyptij vtuntur.

## SESAMVM QVORVNDAM.



## SESAMVM ALIORVM.



TAMETI



**TAMETSI** Sesami semen, à quo copiosum exprimitur oleum, officinis notissimum sit: pauci tamen reperiri in Italia. Siquidem quod in myropolijs habetur, ex Græcia, & Peloponneso ad nos conuehitur. Prouenit (ut Theophrastus est auctor) caule nilio simili, crassiore tamen, ac altiore: folijs rubentibus: flore uiridi, herbaceo: semine uasculis incluso, papaueris modo. Sesamum, teste Plinio, ab Indis primum aduectum est. Ibi enim copiosissimum feritur, cum oleum inde maximo prouentu conficiant, non modò ad lucernarum usum: sed ad ciborum condimentum, quemadmodum nos ex oliuis. Non temerè scripsisse uidetur Ruellius, nihil ita, ut Sesamum, emacrare solum, utpote cui crassior, & multiplicior arundo sit, quàm nilio, & radix quoq; numerosior. Siquidem id legitimus Theophrasto proditum esse lib. VII. cap. IX. de plantarum historia, ubi sic inquit. Omnium, quæ æstiuus semen tibus ager recipit, Sesama terre molestissima esse, plurimumq; posse extenuare putatur, utpote quæ multipliciori crassiori; calamo, & numerosiore constet radice, quàm nilium. hætenus Theophrastus. Cæterum duas diuersas imagines pro Sesamo exhibuimus, quòd uaria quoq; sit hoc tempore herbariorum de eo sententia: alij enim hæc plantam, illam alij pro legitimo Sesamo demonstrant. Mibi quidem (ut ingenuè fatear) neutra placet, quòd utraq; histore refragetur, quam de Sesamo Theophrastus & Plinius tradiderunt. Has tamen plantas hic depingi curauimus, ea saltem ratione, ut illud lectores admonerent, quòd ex meo iudicio, notis ueri Sesami non respondeant: quòd; in uariis erroribus uersentur, qui secus opinantur. Sesami meminit Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum, ita scribens. Sesamon non parum in se continet uiscosum, & pingue: quare emplasticum est, & emolliens, ac modicè calidum. Eiusdem facultatis est, quod ex eo conficitur oleum: & herba quoque decoctum similem uim obtinet. Et libro primo de alimentorum facultatibus: Sesami semen, inquit, pingue est, ideoq; repositum celeriter mæsit oleosum: quamobrem & eos, qui ipso uescuntur, celeriter implet, & stomachum subuertit, tardè concoquitur, & pingue corpori præbet alimentum. Liqueat ergo quòd uentris partibus uigorem, ac robur addere nequit, quemadmodum neque aliud quòd uis pingue. Est autem crassi succi, ideoq; non celeriter peruat. *Σησαμ* Nomina. Græci, pariter & Latini Sesamum dicunt: Arabes, Semssem, aut Semsfera: Itali, Sesamo: Hispani, Iorgilum, & Alegria: Galli, Iuzioline.

Sesami confederatio.

Sesami vires ex Galeno.

Nomina.

## Lolium.

## Cap. XCIII.



**LOLIUM**, quod inter segetes nascitur, molitum nomas, putrescentia ulcera, gangrænasque compescit cum raphanis, & sale illitum: & ex aceto, & sulphure uiuo feros lichenas, & lepras sanat: strumas quoque discutit, cum fimo columbino, & lini semine decoctum in uino: rumpit, quæ ægrius ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua mulsâ utilissimè ischiadicis illinitur: si cum polenta, thure, myrrha, aut croco suffiatur, conceptionem adiuuat.

**LOLIUM** omnibus notissimum est. Nascitur in aruis è tritico, & bordeo corruptis uligine seminibus, aut per hyemem imbre nimio madidis, ut superius quoque in tritici, & bordei commentatione dictum est. Verum etsi non desint, qui Lolium uere tantum exoriri putent; prouenit tamen (ut Theophrastus memorie prodidit libro VIII. capite VII. de plantarum historia) hyeme ineunte, folio angusto, piloso, & pingui, eiusq; peculiare pinguitudo notatur. Credidit Leonardus Fuchsius (ut declarauit in suis clarissimis de stirpium historia commentarijs) Pseudomelanthium, quod inter segetes frequens nascitur, legitimam esse Lolium. Id quod (pace sua dixerim) non modò communi doctissimorum uirorum, qui in stirpium doctrinâ diu uersati sunt, sententiæ refragatur; sed & ueterum scriptis, qui Lolium in spica, non calyce, non capitulis melanthij, uel papaueris modo uelut inclusum, semen proferre tradiderunt. Et quamuis Theophrasti auctoritate nitatur, ut sui Lolij effigiem representet, plura tamen ex eo redidisse uidetur, quàm ipse usquam in Theophrasto legerim. Quæ in re mihi quandoque locandi fuit occasio, ut dixerim Fuchsiū ideo in lolio tam manifestè lapsū fuisse, quòd forte eo tempore, quo hæc scribebat, contigerit ei lolium in pane comedisse. Quòd autem id legitimum sit Lolium, quod reherbaria peritis, agricolis etiam, & omnibus ferè uulgò cognitum est, testis est Dioscorides lib. III. cap. de phœnice,

Lolij confederatio.

Fuchsi error



Lolij uires ex  
Galeno.

Nomina.

phœnice, ubi phœnicem spicam lolio similem proferre prodidit. Ex quo palam fit, lolium in spica, non autem in capitulis pseudomelanthij, & papaueris modo semen ferre. Ex uulgata quoque Lolij facultate Fuchsij error deprehendi potest. Siquidem panis, in quo lolium fuerit, stupiditatem quandam, & ueluti temulentiam estantibus parit cum inexpugnabili ferè somno. Quamobrem ubiq; locorum incerniculis à tritico, alijsq; cerealibus ipsum separant, qui eius noxam sensere. Lolium, ut scriptum reliquit Galenus lib. v. i. simplicium medicamentorum, desecat, & excalfacit efficaciter, ut propinquum sit acribus, magis quàm iris. sed non est perinde ut illa subtilis essentie, uerum multum in hoc deficit. Secundum hoc ponat ipsum quispian in principio tertij ordinis excalfacientium, secundi uero extremò exiccantium. Eius nomen Græcum αἶψα: Latinum, Lolium: Arabicum, Sceilem, seu Zeuen: Italicum, Loglio, & Gioglio: Germanicum, Tuualch trespe, Rueuueysen, & Lulch: Hispanicum, Yoio: Gallicum, Luayra, & Yuroie.

## Amylum.

## Cap. XCIII.

AMYLVN ex eo appellatum est, quodd sine mola fiat. Optimum ex trimestri, natione Creticum, aut Aegyptium. Ratio faciendi amyli hæc est. Purgatum trimestre triticum madescit quinq; die, & si fieri potest, nocte, cum emollitum fuerit, effunditur sensim sine agitatione aqua, quod minus cremor utilis unà excludatur. ubi mollissimum esse uidetur, mutata aqua, pedibus calcari oportet: rursus infusa, ter; tum demum enatantes ibi furfures incerniculo eximendi. reliquumque qualilo sportisque siccatum tegulis nouis confestim torreatur flagrantissimo in sole; nanque si paulisper udm maneat, acorem concipit. Contra fluxiones oculorum, pustulas, cauæque ulcera efficac est; sanguinis reiectiones potu cohibet, exasperatas fauces lenit. lacti, atque obsonijs admiscetur. Fit etiam amyllum ex zea, quæ maceratur, ac eluitur uno, aut altero die, & subactæ farinæ modo manibus subigitur; pressaque feruentissimo in sole, ut antè retulimus, exiccatur. Nullus in medicina usus, ad alia tamen conueniens.

Amyli confectio  
deratio.

Amyli vires  
ex Galeno.

AMYLVN, quod uulgò Amidum officinis uocatur, omnibus quidem notum est. Probatum autem, auctore Plinio lib. xviii. cap. vii. leuitate, ac lenore, atq; ut recens sit, & candidum. Ceterum etsi prætulit Dioscorides Amylum, quod è Creta aduehitur; Plinius tamen longè magis Chium, cui insula (ut ipse scribit) Amyli inuentio debetur, præstare asserit. Amylum, ut memoriæ prodidit Galenus lib. i. de alimentorum facultatibus, ex tritico conficitur, leuigandi exasperatas partes uim obtinens: quæ communis est omnibus substantijs consistentia siccis, quæ neque adstrictiorem, neq; acrimoniam, neq; aliam quàm uis facultatem habent insignem. quas substantias iure & πρῶτος, id est, qualitatibus, quæ sensu deprehendi queat, expertes appellant: qualis inter beatissimas substantias est aqua. Ceterum amyllum similem lotis panibus habet facultatem: nam, ut illi, minus quàm panes non loti corpori præbet alimentum, & non calfacit, cum ceteri panes calfaciant. Quod uero ad triticum in aqua elixum attinet, cum etiam amyllum ne conferendum quidem est, cum palam id tum calfaciat, tum ualenter nutriat, si coctum fuerit: id quod factu (ut diximus) est difficile. Porro Amylon (ut Plinius tradit lib. x. v. cap. xxv.) hebetat oculos, & gulæ inutile, contra quàm credatur. Item fistit aluum, epiphoras oculorum inhibet, & ulcera sanant. Item pustulas, & fluxiones sanguinis. genus duras uero datur cum ouo his, qui sanguinem reiecerint: in uescicæ dolore senuncia amyli cum ouo, & passis tribus, sufferuescit à balneo. Quod Græci ἄμυλον, Latini similiter Amylona uocant: Mauritaui, Nixe: Itali, Amido: Germani, Amlung: Hispani, Amydon: Galli, Amydum.

## FOENVM GRÆCVM.



Nomina.

## Fœnum Græcum. Cap. XCV.

FOENI Græci farina uim habet emolliendi, discutiendiq; in aqua mulla decocta aduersus tam internas, quàm externas inflammationes, efficaciter illinitur; lienem cum aceto, & nitro trita extenuat. Succus decocti eius sciminarum malis subuenit, & siue tumor, siue præclusio sit vuluæ, fouentur, & insident. Fœni græci in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures, & manantia capitis ulcera purgat, locos dilatat, & emollit, si cum anserino adipe pessi uice subiiciatur. Viride cum aceto utilissimè imbecillibus locis, & vlcera sentientibus. Decoctum eius prodest



prodest aduersus tenesmos, fœtidamque dysentericorum proluuiem. Oleum, quod ex eo exprimitur, & myrto, capillos, & genitalium cicatrices absterget.

**FOENI** Græci semen profert planta trifolio similis, corniculis quibusdam inclusum: unde illi *Buceras* nomen imposuit Theophrastus. Huius meminit Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Fœnum Græcum calidum est secundi ordinis, desiccatur primo: proinde feruentes phlegmonas irritat, acerbaturque. quæ uerò minus sunt calidæ, & magis duræ, eas digerendo curat. Τῆλιν, & Βόυνκαρος id Græcè dicitur, quod Latine Fœnum Græcum: Arabicè, Oluæ, Helbe, seu Hebbe: Italicè, Fien græco: Germanicè, Fenigrec, & Bockshorn: Hispanicè, Alfornas & Alholuas: Gallicè, Fenigrec, & Senegrene.

Fœni Græci uires ex Gal.

Nomina.

## Linum.

## Cap. XCVI.

**LINUM** uulgò notum est. cuius semen easdem, quas fœnum græcum, uires habet. Discutit, & emollic omnem intus, forisque inflammationem, cum melle, oleo, exiguaque aqua decoctum, aut melle cocto exceptum: uitia cutis in facie, uarosque crudum tollit: illitum cum nitro, & ficulneo cinere, parotidas, duritiasque discutit: ulcera, quæ serpunt, fauosque cum uino decoctum expurgat: ungues scabros eximit, cum parimodo nasturtij, & mellis: uitia pectoris extrahit, si ex melle in eclegmatis uicem substituatur: tussim lenit, uenerem stimulat, si farina piperis, & melle exceptum, pro placenta largius adsumatur. Huius decoctum interaneorum, uulnèque erosionibus immittitur, alui excrementa euocat, ad uulnè inflammationes in descensionibus perquam utile.

**CVM** Linum, & eius semen sunt non modò medicis omnibus; sed etiam cæteris, & præsertim agricolis, uulgò notissima, superuacaneum quidem foret, pluribus eorum historiam persequi; etsi seminis usus, & uires minime silentio sint prætereundæ. Exprimitur ex semine oleum, quod non solum medicis, & seplastijs expetitur; sed etiam pictoribus, lapicidis, lignarijs, cæmentarijs, ac ferrarijs fabris. Præstat & ad lucernarum usum, quòd diutius igni resistat, quàm quod ex oliui exprimitur. In medico autem usu neruorum conuulsionibus peridoneum est. Quin etiam ad eorum emolliendas duritias, & ad osium compagines explicandas mirificè prodest. Perutile est omnibus sedis affectibus, nempe hæmorrhoidibus, condylomatibus, rimis, ac doloribus: fœminarum induratos locos mollit. Nymphæe, aut rosæ-

Olei ex lini semine uires.

Xyli mentio, & uires.

Lini uires ex Galeno.

Nomina.

## Cicer.

## Cap. XCVII.

**CICER** satium aluo idoneum est, urinam ciet, inflationem parit, colorem commendat, menfes ac partus expellit, lac auget. Cum eruo decoctum illinitur ad inflammationes testium, uerrucosas informicationes: ad scabiem, ulcera capitis manantia, impetiginesque, item contra carcinomata, & ulcera, quæ cacoethe uocantur, cum melle, & hordeo prodest. Alterum genus arictinum nominatur,



## CICER.

Ciceris con-  
sideratio, &  
uires ex Gal.Ciceris uires  
ex Aetio.

## FABA.



Nomina.

natur. Vtrunque cit urinas, dato cum rore marino hydropicis, aut regio morbo laborantibus, eorum decocto. Lædunt ea exulceratam uescicam, & renes. In uerrucarum formicantium, pensiliumque genere, prima luna singulis granis singulas tangunt, eaque grana linteolo de ligata abijci post se præcipiunt, ita decidere eas arbitrantur. Sylvestre cicer, folijs satiuo simile est, odore acris, sed semine discrepat. Idem quod satiuum præstat.

IN CICERVUM genere habetur candidum, quod & Columbinum uocatur. Est & rubrum Venerum dictum, quod ad excitandam uenerem mirifice præstat. Habetur item & nigrum cæteris minus, quod Arietinum appellant. Horum meminit Galenus primo de aliment. facultatibus, sic inquit. Cicer non minus quam faba inflationem excitat, sed ualentius nutrit. Venerem stimulat, creditumque est etiam simul semen generare: cuius gratia admixtarijs equis quidam ipsum exhibent. Inest præterea Ciceribus facultas abstergendi maior, quam fabis: adeo ut quædam ex ipsis contractos in renibus calculos euidenter frangant, atque minuunt. Nigra autem sunt ea, & exigua in Bithynia præcipue nascentia, Arietinaque uocata. Huius ex aqua decoctum potare præstiterit. Vescuntur & uirentibus adhuc ciceribus homines in te adeptam maturitatem, quemadmodum & fabis. hætenus Galenus. Nigrum uocari Arietinum tradidit Plinius, quod arietinum capita sua imagine representet. Theophrasto quoque Cicerum plures sunt differentie lib. VIII. cap. V. de historia plantarum, ubi sic habet. Cicer & magnitudine, & sapore, & odore, & forma, plerasque differentias ostendit, ut arietinum & columbinum. Candida inter omnia dulcedine præstant. Ciceris facultates recensuit etiam Aetius, sic inquit. Cicer statum leuiguen, ac alimentosum, uentri accommodatum, urinam ac menses euocat, & lac, & sperma copiose generat. Huius decoctum, præsertimque nigri, calculos renum frangit. Alterum uero genus, quod Orobieum uocatur, attrahit, discutit, incidit, & abstergit. Iecur, lienem, & renes expurgat: scabiem, & impetigines extirpat: parotidas, ac testiculorum durities discutit: affertque ad uicem maligna præsidium non poenitendum. hætenus Aetius. Cæterum sylvestre omnibus ferè notum est. & si Plinio fides est adhibenda, uentrem subducit: sed status, & intestinorum dolores agnuit. Græcis ἐπέριδος, Latinis Cicer nominatur: Arabibus Chemps, Hamas seu Alhamos: Italis, Ceci: Germanis, Kichererbs, Kichererbs, & Zisererbs: Hispanis, Grauanco: Gallis, Cicet.

## Faba.

## Cap. XCVIII.

FABA inflationem excitat, ægrè concoquitur, turba multa somnia facit, tussi confert, carnem gignit, media calidi, frigidi que natura. Decocta in polca, & cum suo cortice esitata, dysenterias & celiacorum profluuium sistit: contra uomitiones conuenienter manditur. Inflatione leuior contrahitur, si aqua prior inter coquendum abiiciatur. Viridis plus negotii stomacho exhibet, maioremque statum parit. Lomentum eius & per se, & cum polenta illitum, inflammationes, quas uulnus excitauit, mitigat: cicatrices concolores facit: turgentes grumoso lacte mammas, etiam si inflammatione tententur, adiuuat: lac restinguit: furunculos, sugillata, parotidasque cum fœni græci farina, & melle discutit: cum rosa autem, thure, & oui candido, procidentes oculos, tumores, uasque reprimat: subactum uino, suffusiones, & ictus oculorum recreat. Manducata sine cortice faba, ad auertendas



auertendas fluxiones, fronti illinitur: decocta in uino testium collectiones sanat: quò tardius pubes erumpat, pueris imò uentri illinitur: uiliginem purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascuntur, gracilescunt, & minus alimenti capeffunt: cum polenta, scisso alumine, & uetere oleo impositi cortices, strumias discutiunt. Decocto earum lanæ inficiuntur. Faba dempto cortice in illas partes diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis defluxionibus ab hirudine concitatis: nanque eas supprimit, si semisecta apprimatur.

**FABAE** omnibus notissimæ sunt. Et ut memorie prodidit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, in exiccando, & refrigerando secundum utrunque ad medium temperamentum propinquissimè accedunt. Caro Fabæ paulum quid abstergentis facultatis continet, sicut cortex nonnihil adstringentis. Idcirco medicorum nonnulli totam fabam cum oxycrato decoctam dysentericis, celiacis, & uomentibus, quos *ἐμμηνοῦς* nominant, exhibuerunt. Porro ut edulium, statulenta est, ac coctu difficilis, si quid aliud: excreationibus ex thorace, & pulmone idonea. Ut medicamentum uerò foris imposita, sine molestia desiccatur. In podagricis ea sæpenumero usi sumus ex aqua decocta, & deinde adipi suillo admissa. Ad neruorum tum contusiones, tum uulnerationes, farinam eius cum oxymelite imposui mus. Ad eos, quos ex ictu iam phlegmone occupauerat, cum polenta. Sed & testium, & mammarum aptum est cataplasma. Nam hæ partes cum phlegmone tenentur, moderatè refrigerari amant, maxime cum mamma ex lacte ipsius concreto phlegmonem patiantur. Quin lac quoque ab eo cataplasmate extinguitur, sicut puerorum pubes farina fabacea illita plurimo tempore glabra permanset. Et libro primo de aliment. facultatibus, sic inquit. Inflat is citius quocunq; modo apparetur: nec per quamuis longam decoctionem id uitij proteſt amittere, quod ptisanæ minime negatum est: deponit enim per illam quicquid habet statulenti. Qui porro affectus singulos cibos sequi natos, animaduertere, & mente consequi uolet, quandam totius corporis tensionem, quasi à statulento spiritu persentiscet, maximeque qui ad huiusmodi esculentum non fuerit assuefactus, aut ipsum minus rectè coctum assumpserit. Habent autem fabæ non densam, nec grauem, sed fungosam, leuemq; substantiam: quæ tamen ipsa nonnihil absterforiæ possidet facultatis, similiter ptisanæ. Etenim manifestè fabacea farina cutis sordes detergere conspicitur. Quod intelligentes mangones, ac mulierculæ, in balneis quotidie hac utuntur, uelut alij nitro, atq; aphronitro, & in uniuersum ijs, quæ abstergent. Illinunt præterea & faciem hac, quemadmodum ptisana: nam quæ in summa cute eminent lentes, exterrit, & maculas uelut ex sole contractas. Huius ergo facultatis nomine ne in alui quidem transitu diu cunctatur, sicut quæ glutinosa, & crassi succi sunt sine ulla abstergenti facultate, qualia halicam, tragum, similaginem, & amyllum esse perhibuimus. Cum porro ferculum ex siresa faba paratum, quod *ἑρως* Græci nuncupant, statibus non careat, multo amplius integræ fabæ inflabit cibus. quanquam fricta (nam hoc modo aliquando pro bellarijs sumunt) statum deponit, sed tum concoctu perdifficilis, tardoque descensu incommodior redditur, & crassi succi alimentum in corpus diffundit. Quòd si uiridis, immatura, nondumq; arefacta edatur, commune omnium fructuum, quos ante perfectam maturitatem ingerimus, rationem obtinens, corpori humidiores alimoniam exhibebit, ac proinde maiorem excrementorum uim non tantum in uis intestinorum; sed etiam per uniuersum corporis habitum producet. Merito igitur minus quoque nutriet, sed promptius deiecietur. Pleriq; autem hominum non crudas solas fabas comedentes, unà eas cū suilla carne decoquunt, uelut olera consueuerunt: ruri uerò etiam cū caprina, & ouilla. Alij fabas inflare sentientes, cepas admiscunt, cum in ollis pulmentum ex illis struunt. Sunt qui nō simul elixatas, sed cum pulmento cepas ingerant crudas. In omnibus nanq; dapibus quicquid flatuosum continetur, per calfacientia, & extenuantia corrigi comparatum est. *Κύαρος* sic Græcis, Latine uerò Faba uocatur: Arabibus, Hachille, Haballe, siue Bachelale: Italis, Bava: Germanis, Bonen: Gallis, Fabue.

Fabarum cōsideratio, & uires ex Gal.

### FABA AEGYPTIA.

### Faba ægyptia.

### Cap. XCIX.

**AEGYPTIA** Faba, quam aliqui Ponticam uocant, in Aegypto plurima provenit, in Asiæ etiam, Ciliciæque lacubus inuenitur. Folia habet ampla, & etiam si ad arborum frondes comparentur: caulem cubitalem, digiti crassitudine: florem roseum, dupla papaueris amplitudine, & ubi flore exiit, fert folliculos uesparum fauis similes, in quibus faba supra operculum, bullantis ampullæ modo, prominet. Ciborion, aut Cibotion, id est arculam, ideo nominant, quoniam seratur ipsa, humenti glebæ mandata, & ita in aquam demissa. Radice firmatur arundine crassiore, quæ cruda coctæue estur. ei Colocasiæ nomen est. Faba uirens manditur, & exiccata nigrescit: uulgarem magnitudine superat. Adstringendi facultatem obtinet, & stomacho utilem: dysentericis,

Nomina.





tericis, celiacisq̃ue prodest, in sparso polentæ uice, lomento: datur quoque in pulte. Cortices in uino mulso decocti, si terni inde cyathi bibantur, magis proficient. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio uiride spectatur, gustu amarum, si tritum, & cum rosaceo coctum instilletur.

Aegyptiæ fabæ confid.

SUNT qui Aegyptiam fabam suæ radicis appellatione Colocasiam nuncupent. Hanc primum Tridenti anno 1538. ostendit mihi Odoardus Polonus, qui alias quoq; plantas, & eas quidem raras, secum deferebat ex Syria & Aegypto. Caterum eos equidem in errore uersari crediderim, qui putant plantam illam ex Aegypto allatam, quæ ari speciem repræsentat, esse fabam Aegyptiam. siquidem illa florem non edit dupla papaueris magnitudine, non profert fabas, nec radicem habet, quæ cruda uandi possit ob uehementem eius acrimoniam. Huius tamen ari folia uidetur esse fabæ Aegyptiæ. Et certe hanc adeo æmulantur, ut aliquando existimauerim eas stirpes nihil inter se differre. Sed postquam rem hanc diligentius examinavi, earum discrimen cognoui, atq; illos planè falli iudicaui, qui arum Aegyptium non distinguunt ab Aegyptia faba. Meminit huius Theophrastus lib. 1111. cap. x. de plantarum historia, ubi ita scribit. Faba Aegyptia in paludibus, stagnisq; exit. Caulis eius, qui longissimus, quaterna cubita perficit: crassitudo digitalis est, similis calamo molli, non geniculato. Rimas intrinsecus habet tendentes per totum, lilij modo. Caput in cacumine orbiculatum, uespærum sauo non ab simile. Inq; singulis cellis, singule fabæ continentur, paulò super id eminentes, multitudine plurimum terdenæ. Flos papauere duplo maior, colore roseus in plenum caput. Superæ quam folia ad singulas fabas amplexa exeunt. Fabam quanq; conterenti amarum illud, ex quo pilula fit, inflexum patescit. Fructus ita se habet. Radix illi crassissima, arundine plenior, rimas similiter atq; caulis habens: manditur & cruda, & elixa, & assa: eoq; cibo, qui incolunt paludes, utuntur. Nasceitur itaq; sponte uel plurima, ceterum & scelerit in limo paleis largè admistis, ut descendat, incorruptaq; maneat: sicq; fabeta faciunt. Si autem semel apprehenderit, perpetuò manet. Radix enim ualida est, nec procul arundinum stirpibus, uerum spinis subborreus. Quam obrem eam crocodilus refugit, ne occurrrens oculo offendatur, quoniam acutè non uidet. Nasceitur hæc etiam in Syria, Ciliciâq; hætenus Theophrastus. Hanc amplissima emittere folia tradidit Plinius lib. XXI. cap. xv. ubi inquit. In Aegypto nobilissima est Colocasia, quam cyamon uocant aliqui. Hanc à Nilo metunt: caule, cum coctus est, araneoso in mandendo: thyrso autem, qui inter folia emicat, spectabilis: folijs latissimis, etiam si ad arbores comparentur, ad similitudinem eorum, quæ personata in nostris annibus uocamus. Adeoq; Nili sui dotibus gaudent, ut implexis Colocasiæ folijs in uariam speciem uasorum potare gratissimum habeant. Seritur iam hæc in Italia. hæc Plinius. Aegyptia faba (ut Galenus auctor est libro primo de alimentis) sicuti nostratam magnitudine longè præcellit, ita & naturam humidiores, magisq; excrementitiam sortita est. Planta, quæ κλάμος αἰγυπτίος Græcè, Faba Aegyptia Latine dicitur: Italicè, Fava d'Egitto: Hispanicè, Inhame.

Colocasia ex Plinio.

Nomina.

LENS.



† Græci codices hoc loco habent αἰγυπτίος, id est, instar galeri. Quæ autem horum loco affert Ruellius ex Plinio sumptis loco citato. Vbi uerbis, quæ illa sequuntur, rectius fortè hunc Dioscoridis locum interpretari uidetur.

Lens.

Cap. C.

LENS frequenti cibo aciem oculorum obtundit, ægrè concoquitur, stomachum malè habet, eumq̃ue & intestina inflat: sed aluum cum cortice cocta sistit. Perstat in cibo, quæ facillimè coquitur, nihil atri in maccuratione reddens. Vim habet adstringendi: quæ ex cauratione cohibet, si detractio antea cortice discoquatur accurate, primaq̃ue aqua inter coquendum effundatur (quippe primum id decoctum uentrem resoluit.) Somnia tumultuosa excitat: capiti, neruis, ac pulmone intertilis: melius suo fungetur munere contra alui fluxiones, addito cum aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis cotoneis, aut mespilis, sorbisue, pyris Thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris, quæ post decoctionem abiciuntur, uel rhoe, quæ obsoletis inspargitur: uerum acetum cum ea diligenter percoqui debet, alias aluum conturbat. Contra subuersionem proderit machi, triginta grana lentis delibrata deuorari proderit. Decocta cum polenta, & illita, podagras lenit: sinus cum melle glutinat, crustas rumpit: ulcera purgat. Decocta in aceto duritias, & strumas discutit: cum cotoneo, sedis meliloto medetur inflammationibus oculorum, sedisq̃ue, addito rosaceo: sed in amplo sinu, aut inflammationibus sedis, quæ maius remedium exigunt, cum putamine punici, ac siccis rosis, adiecto melle, decoquitur.

nomis



nomis quæ in gangrænam euaserunt, adiuncta maris aqua: pustulis, & his quæ serpunt, igni sacro, perionibusque, ut antea dictum est: contra mammas in quibus lac in grumos coit, & præ nimia sui copia profunditur, cocta in aqua maris, & illita auxiliatur.

**LENTE**s quemadmodum libro VIII. simplicium medicamentorum scriptum reliquit Galenus, ualenter adstringunt: in caliditate uero, & frigidityte medium tenent; desiccant tamen in secundo ordine. Ipsum itaque earum corpus desiccet, & sistit uentrem: ceterum decoctum prouocat: proinde etiam prior aqua abijcitur, ubi retentio- nis causa adhibetur. hætenus loco citato Galenus. Ceterum asserenti Dioscoridi Lentes aluum cohibere, si detra- ho antea cortice discoquantur accuratè, primaque aqua inter coquendum effundatur, omnino refragatur Galenus, qui libro primo de alimentorum facultatibus sic scribit. Ne ex lente quidem panem quis tentauerit: præarida enim sine pingui, & friabilis est. Cortex eius uehementer astringit, carnea substantia tenuiter, quæ & crassi succi, & terre- stris est. Succus porro lentis, sicut antè retulimus, astringenti est contrarius. Quocirca si elixæ in aqua iusculum sale, garo, oleoque conditum bibatur, aluum deijciat. At quod ex his decocta lente ad eum modum, quem retulimus, fer- culum apparatur, contrariam succo uini obtinet. Nam quæ uentri obueniunt, fluxiones desiccet, os uentriculi, intesti- na, & totum denique uentrem corroborans. Quamobrem coeliacis, & dysentericis accommodatus est cibus. Lens ue- rò decorticata, ut illam adstringendi uehementiam, cumque hac alia uidelicet omnia, quæ consequuntur, amittit: ita ali- bihor, quam integra illa efficitur, crassum, prauumque succum gignens, tardè cõmicans: alui tamen fluores haud desic- cat, uti ea quæ cortice non est spoliata. Lure igitur qui modum in hoc edulio non seruant, elephantiasim quam uocant, & cancerum incurrunt. Siquidem crassa, sicque cibaria faciliè in melancholicos humores uertuntur. Quare ijs dun- taxat, quibus uitiosa est habitudo ob aquam in carne diffusam, lens cibo utiliter præbetur: ceu aridis, & squalentibus admodum damnosè. Eandem ob causam uisum integrum, & inculpatum bebetat, immoderatè exiccans. Ei uero, qui contrario modo se habet, humidiori uidelicet, opitulatur. Menstruis purgationibus inepta est: crassum enim, & tar- dum sanguinem facit. At muliebri appellato profluo conuenientissima. Cum porro lens, & ptisana contrariè in- ter se sint facultatis, ex amborum commistione præstantissimum edulium componitur, quod nos in Asia phacoptisa- nam nuncupamus. Verum non æqua utriusque portio esse debet: minus enim ptisanæ adijciendæ, ut quæ per deco- ctionem in cremorem latè diffunditur, & in magnam attollitur molem: lens autem cocta exiguum quendam tumorem ascescit. Sed enim huius edulij eadem ac ptisanæ est confectio, præterquam quod satireia, & pulegio adiectis, iucun- dius & paratius concoctioni efficitur: cum ptisana illis minime gaudeat, sed solo anetho, porroque sit contenta. De- terrima est lentis conditio, quam diuturni coci sapa inficiunt, minime enim incrassantia sibi uult admisceri, sed liquida atque una lenis inflammationem inaugere, nisi addito melle corrigatur. Illud præterea non arbitror obscurum, dure scẽ tes uisceris utriusque affectus, quos scirrhus uocant, hoc epulo exacerbari. Quod si suillam simul libeat incoquere, ptis- sanæ recentem, lenti sale asseruatam congruere deprehendes: ceu utique quæ inter has media est, quam *reaxi*, id est, re- center salitam appellant, phacoptisanæ percommode & ad suauitatem, & concoctionem immittitur. Magis tamen lens cum salis carinibus esitata, crassos humores augebit. Nam hæc quoque sanguinem crassiorem, & melancholicum magis generant. Quapropter neque istis affatim, sæpeque uti expediet, præsertim cui corpus melancholico præcrasso, & om- nino prauo humori obnoxium est. Hæc eadem & de regionibus, anni temporibus, & aeris constitutionibus in unoquo- que edulio intelligere oportet. Ac autumnio quidem melancholicis, ac siccantibus cibis abstinendum: hyeme uero eis utendum: uti sanè in æstate humectantibus, & refrigerantibus: in uere medijs temperamentis, mediisque facultatis epu- las offerendum. Est porro mediorum non una, nec simplex species: quædam enim huiusmodi sunt, quoniam cum extre- mis nihil habent commune: quædam ex duorum contrariorum æquo intervallo à medio distantium mistione sunt me- diocritatem adeptæ: ut si quis iuxta id, quod paulò antè dixi, ptisanam lenti commisceat. Sic & teutlophacen, quæ ex beta, & lente nomen apud Græcos inuenit, Heraclides Tarentinus non sanis modò, uerim etiam laborantibus ex- hibebat. Est enim & hoc ex pugnantibus compositum edulium: quamobrem etiam tardius, quam beta; citius uero, quam lens per aluum descendit. Est & illud perspicuum, huius succum in corpus dispartitum, ex amborum uirtute, lentis uidelicet, ac beta, esse permixtum. hætenus Galenus. Ex cuius uerbis faciliè colligi potest, Lentes in frequen- ti ciborum usu minime esse recipiendas; præterquam ab ijs, quibus morbi alicuius ratione, ut medicamenta potius, quam ut cibus conueniant. *φακός* Græcis est, quæ Lens Latinis: Hades, Arabibus: Lentichia, Italis: Linsen, Germanis: Lenteyas, Hispanis: Lentile, Gallis.

Lentiũ uires  
ex Gal.

Nomina.

## Phasioli:

## Cap. CI.

**PHASIOLI** inflant, spiritus cient, ægrè coquuntur. Virides cibo aluum emolliunt: ad uomi- tiones idonei.

**PHASIOLI** sunt in Italia uulgares, & in hortis, ac aruis frequentes. Diuersa eorum habentur genera, uarijs coloribus distincta: nam & candidi, & rubescentes, & melini, ac diuersis respersi maculis reperiuntur. Quos superiori quoque etati cognitos fuisse putauerim, et si nonnulli eos nuper in Italia uenisse existiment. Candidi, quibus granum ceteris minus est, ceterorum leguminum more, in aruis seruntur. At rubescentes, melini, ac uarij seminan- tur in hortis alijsque locis, ubi umbra æstiuæ fuerit opus. Siquidem præterquam quod fructum suo tempore demeten- dum proferunt, suis etiam inuolucris, ac sequaci foliorum, clauicularumque reptatu, testudines, attegias, mapalia, tugurias,

Phaseolorũ  
confid.





Marcelli error.

tuguria, cameras, pergulas, scenas, ac tabernacula è lignis cancellatim fabricata opacant, ac ueluti topiario opere contexunt: solaresq; radios inibent, non secus quàm uitis, lupus salictarius, bryonia, colocynthis, clematis, periclymenum, & stirpium id genus, quæ arbores, & sepes scandunt, perreptant, implicant, ac conuestiunt. Quo fit, ut crediderim ego, illos à ueritate haudquaquam desiscere, qui dixerint, hoc Phascolorum genus hortensem esse similes, hoc etiam libro à Dioscoride descriptum: quippe quod illi maxime respondeat, ut in sequentibus dicitur. Quæ obrem longè aberrasse uidetur Marcellus in carpendo Hermolao tantopere audius, cum dixerit sibi parum uersum in le uideri ad eam altitudinem, & foliorum copiam posse legumen aliquod augeri, ut scenas, & tabernacula uestiens in umbret. Quandoquidem non modò huic refragatur Dioscorides; sed & ipsius smilacis numerosus plantarum prouentus, quæ in quàm plurimis hortis, ac uiridarijs longissimos scandunt palos, & cancellata tecta conuestiunt. Ceterum nec eos quidem hallucinari putauerim, qui pro certo asseruerint, Phasolos supradictis coloribus infectos, quos equidem nihil ab hortensi smilace differre existimo, Dolichos esse, quorum meminit Theophrastus lib. VIII. cap. III. de plantarum historia: & Galenus libro primo de facultate alimentorum: & ipsum secutus Paulus. Quippe quos

ERVVM.

Manardus notatur.



Nomina.

niam dolichi (ut adiuuante Deo infra in smilacis hortensis mentione dicemus) non sunt illud pisorum genus, quod Ausonij uulgo dicitur Rougione, Tridentinis uerò Arabeia, ut Manardo Ferrariensi placet. Quandoquidem hanc sub Ochri nomine, cum Galenus, quàm Paulus describere, ut eo, quem modò citauimus, loco patebit. Porro in hoc presenti capite Dioscorides de eadem didis tætim, ac uulgaribus phasolis differuit, non de eruiis Arabiea uulgo uocata: in sequentibus uerò capite de hortensi smilace, eorum mentionem fecit, qui uel rubentes, uel lutei, uel uersicolores enascuntur. Ita πασιδος Græcè, ut etiam Phasoli Latine dicuntur, Italicè, Fagioli.

Eruum.

Cap. CII.

ERVVM paruus frutex omnibus cognitus, angustifolio, tenuis, semina in ualuulis habens: è quibus farina fit, nomine eruina, ad medendi usus conueniens. Eruum capiti onerosum est: aluum esu turbat. sanguinem per urinam extrahit: elixo boues saginantur. Parandæ farinæ ratio hæc est. Vberiora grana candidaque deliguntur, permiscendoque aqua reperfuntur, usque donec sufficienter combibant: postea torrentur, siquidem hians cortex disrumpatur: molitaque, farinatio cribro incernuntur: postremò farina reconditur. Hæc alio utilis est: urinam ciet: meliorem colorem efficit sanguinem per uescam, aut aluum cum torminibus elicit, si largius in cibo, aut potu assumatur: ulcera cum melle purgat: lentigines, & uitia cutis in facie, & maculas, totumque corpus emendat: nomas, gangrenas, duritiasque, serpere non patitur: mammarum duritias emollit: atra ulcera, quæ theriomata uocant, fauosque emarginat: carbunculos rumpit: cum uino subacta illitus moribus



morsibus uiperarum, canum, hominumque medetur: urinæ difficultates, tenebrosque ex aceto mitigat. Eruum tabidis, qui alimentum non sentiunt, tostum, & ad nucis magnitudinem melle exceptum, sumptumque conuenit. Eius cremor perniones, & pruritus in toto corpore, sanat fouendo.

ERVVM officinae, Græcorum more, Orobum appellant. Cæterum quod ex Alexandria, Syriaque Venetias conuehitur, aliud nimirum semen representare censemus, quam Erui, quod frequentissimum in Hetruria nascitur, ac feritur. Folia mittit Eruum, quod uulgò Mocho uocamus, lathyri, uel cicercule uulgò uocata amula: florem pisforum modo, admodum rufescentem: siliquas forma teretes, et oblongas, in quibus semen, colore in aliquibus pallido, in nonnullis cædido, in quibusdam uerò rufescente. Porro cum hoc ignoraret Brasauolus, credidit Eruilliam, quæ Theophrastus, Galeno, ac Paulo ochros appellatur, legitimum esse Eruum, noninis uicinitate fortasse deceptus. Quæ in re Fuchsius quoque hallucinatus deprehenditur, quod suo de plantarum historia uolumine Cicerculanum uulgò uocatam, satium Eruum esse existimauerit: etsi cicerculam omnes rei herbariæ periti Galeno lathyrum appellari non dubitent. In cicercula enim, ut periculum facientibus clarissimum est, haudquaquam ea reperiuntur facultates, quibus pollere Eruum tradidit Dioscorides. Quandoquidem præter id, quod omni prorsus amaritudine uacat, largius esitata nunquam sanguinem per uescam, & aluum cum torminibus elicit, ut de orobo fatentur Dioscorides, & Galenus. Ex quo plane constat tam Brasauolum, quam Fuchsum, utriusque pace, hac in re deceptos esse. Sed ignorandum non est, quod etsi Eruum ab agricolis feratur; habetur tamen & inter sponte nascentia: nanque & per se inter segetes frequens oritur. Verum cum à paucis cognoscatur, illud inter uiciæ species annumerant. Animaduertendum præterea est, quod quanquam ad Eruinam farinam conficiendam eligit Dioscorides candidius Erui semen: Galenus tamen lib. I. de facultate alimentorum, candidum pallido, ac rufescente, longè minus præstare scribit. Quapropter Brasauolus Galeni rationem minime habuisse uidetur, cum sibi ex Dioscoridis tantum sententia persuaserit, album erui semen in medicamentorum usu tam rufum, quam pallidum uiribus antecellere. Erui uires prodidit Galenus lib. VIII. simplicium medic. ita inquit. Orobus desiccatur quidem excessu secundo intenso, calcit uerò primo. Porro quatenus amaritudinis est particeps, eatenus incidit, extergit, atque obstructions expedit. Cæterum si sumatur copiose, sanguinem per urinas euocat. Et libro I. de alimentorum facultatibus ait. Boves apud nos, ut apud alias plerasque gentes, Eruo in aqua edulcato pasuntur. Hominum cibis prorsus hoc semen damnatur. est enim & insuauissimum, & prauis succi. Cæterum in magna sanie nonnunquam, sicut Hippocrates quoque scripsit, necessitate coacti homines ad id etiam confugiunt. Nos eruo instar lupini præparato ex melle utimur, ut medicamento crassos polmonis, thoracisque humore expurgant. Candidum minus est medicamentosum, quam id, quod ad flauum, aut pallidum colorem tendit. Eruum bis elixum, & in aqua identidem condulcescitur, insuauitatem certè deponit, sed una cum ea & abstergendi, & incidendi uim, ut sola in eo relinquatur terrestris substantia. Itaque citra amaritudinis intellectum desiccans fit esculentum. Id Græcis ὀροβός, quod Latinis Eruum nominatur: Arabibus, Herbum, Keisene, sive Kersene: Italis, Eruo: Germanis, Eruen: Hispanis, Ieruos: Gallis, Ers.

Erui confideratio.

Brasauoli, & Fuch. lapsus.

Erui uires ex Galeno.

Nomina.

## LUPINI.



## Lupini.

## Cap. CIII.

SATIVVS Lupinus notus est. Cuius farina cum melle delinctu, aut potu, uentris animalia expellit. Ipsi quoque macerati, & cum sua amaritudine esitati, eadem efficiunt. Decoctum eorum idem munus præstat, cum ruta, & pipere potum: quare lienosis prodest. eodem ulcera tetra, quæ theriomata uocant, gangrænas, incipientem scabiem, eruptiones pustularum, ulcera in capite manantia, uirilignes, maculasque fouere utilissimum: menses, & partus extrahit, cum myrrha, & melle subditum in uellere. Eorum farina cutem, liquoresque corrigit: inflammationes cum polenta, & aqua mitigat: tubercula, & coxendicum cruciatus, ex aceto lenit: strumas in aceto cocta, illitaque dissipat: carbunculos rumpit. Decocti celestis aqua, donec in cremorem lentescant, faciem abstergunt. medentur pecorum scabiei, cum radice nigri chamaeleontis, ita ut tepente decocto abluantur. Cit urinam radix cum aqua cocta. Lupini triti, ubi maceratu dulcescere ceperint, cum aceto poti, fastidium detrahunt, & cibi aueritatem faciunt. Gignuntur & syluestres Lupini, satiuis similes, sed omnino minores: qui eadem quæ satiuus possunt.



Lupinorum  
consideratio.

Lupinorum  
facul. ex Gal.

Nomina.

SERVITVR in Hetruria Lupini non modo ad alimentorum usum, sed ad agros impinguandos. Ceterum præter satiuos Lupinos, syluestrium in Hetruria innumera exoriuntur plante, quæ maio mense in campestribus sunt, floribus roseo colore rufescentibus. Satiui duleorantur in Italia, ibiq; frequenter eduntur cum sale. pinus (ut scriptum reliquit Galenus lib. I. de alimentorum facultatibus) multi usus legumen censetur. Elixus enim deinde in aqua dulci, donec omnem sibi ingentem exuat insuauitatem, commadefactus, ita editur cum garo, ac oxo garo, uel sine his etiam, sale modico conditus: non uelut hordeum, & alia multifariam instructa. Lupini dura, ac terrestris substantia est. Quocirca uecessario concoctioni repugnat, & crassum gignit succum: ex quo non probè uenis confecto, crudus propriè appellatus succus acernatur. Et libro VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Lupinus editur coctus, multis ante diebus in maceratione in aqua amaritudinem deponens: sitq; tunc nutrimentum succi crassi. Ceterum ut medicamentum ita præparatus ex genere est emplasticorum. At qui natiuam amaritudinem habet, is etiam extergendi, digerendiq; uim obtinet. Interficet lumbricos tum illitus, tum addito melle linctus, tum ex posca epotus. Quin & decoctum eius lumbricos eijcere potest. Tum etiam foris identidem persusum, uti ligulas, achoras, pustulas, exanthemata Græci uocant, psoras, gangrenas, ulcera maligna, quæ cacoethe uocant, iuuat, partim extergendo, partim citra mordacitatem digerendo, siccandoq;. Expurgat iecur, & lienem cum ruta, & pipere satuitatis gratia assumptum. Elicit menses, ac foetum cum myrrha, & melle impositum. Porro Lupinorum farina mordicatione digerit: nec enim liuida tantum, sed & chæradas, & dura phymata curat: sed tunc in aceto, aut coque melite, aut posca coquatur oportet, idq; pro laborantium temperamento, & affectus diuersitate, quod ex usu est eligendo. Sed nõ est presentis instituti talia distinguere. Digerit item quæ liuida sunt. Et quæcunq; modo diximus præstare posse decoctum, eadem omnia efficit & farina. Sunt uerò etiam qui eam ischiadicis cataplasmatibus modo illunt. Lupinus agrestis amarior est, et ad omnia ualètiore domestico, eiusdem genere cum ipso facultatis. Lupinus satiuus sic Latinis, Græcis δέσπος ή ύεσπος appellatur: Mauritanis, Tarrinus, Arinus, seu Tormus. Italis, Lupino domestico. Germanis, Vuickbonen, Feigbonen, Vuolffasckbonen: Hispanis, Entramuce, & Entramocos: Gallis, Lupinis. Lupinus uerò agrestis Latinis, δέσπος άγριος Græcis, & Italis Lupino saluatico dicitur.

## Rapum.

## Cap. CIIII.



Rapi confi-  
deratio.

DECOCTA Rapi radix alit, inflationem parit: humentem ac fluxam carnem creat, uenerem stimulat. Decocto podagræ, pernionesque fouentur: contritoque rapum atque imposito iuuantur. Si excauata radici rosacea ceratum adigatur, & feruenti cinere eliquescat, exulceratis pernionibus proficiet. Cymæ eius decoctæ manduntur, & urinam ciunt. Semen antidotis, & theriacis, praesertim quæ sensum doloris auferunt, anodyna uocant, idoneum est: potum contra uenena salutare est: uenerè congitat. Rapum muria conditum, minus alimenti sufficit: sed multo magis appetentiam recreat. Syluestre rapum in aruis nascitur. † Frutex est in cubiti altitudinem assurgens, ramosus, leuis in cacumine. Folia fert laxia, digitali latitudine, aut maiora: & fructum in siliquis calyculatis: cumque eorum inuolucra aperiuntur, alia intrasiliqua spectantur, quæ quandam capitis speciem præbent, in qua semina paruula concipiuntur, foris nigra, intus alba. Additur in medicamenta, quibus ad detergenda cutem in facie, totoque corpore, utimur: præsertim quæ ex lupini, aut erui, tritici, aut lolij farina, fieri solent.

RAPVM in Italia uulgò notissimum est, præsertim apud Insuæres, ubi statim post messem æstate, iunio, ac iulio mensibus in aruis secundo feritur: deinde mense octobri, cum radix ad summum extuberauerit, e terra eruitur. Satiuum in triplici mandatur genere, sessile, longum, & rotundum: tametsi literis mandauerit Plinius libro XVIII. cap. XIII. longum erraticum esse. Non omittendum naturæ miraculum, ex tam paruo semine tribus penè mensibus gignitur tā magna radix, ut ea aliquibus in locis

eis plus quàm centenas libras pendat. At librarum triginta pondere nos sepius innumera rapa uidimus in Anagnin agro, longa, & colore purpurea. Rapum, & radix (ut Theophrastus est auctor lib. VII. cap. III. de plantarum historia) gaudent frigore: & sic ea dulcescere putant, simulq; incrementum in radicem, non in folia uerum. Austrinis, atq; serenis temporibus celeriter caulescunt. Nursinis Plinio palma, quod eo fortasse solo magnitudine, & dulcedine ceteris præsent. Alpibus, quibus rara seges, rapa utilia admodum, ac necessaria habentur, tam in horum minimum alimentum, quàm iumentorum pabulum. Quæ æstate feruntur, uindicantur ab erucarum iniuria, quæ plerumque



runque tenella folia in uniuersum erodunt, commista sationis tempore semini fuligine: aut maioris sedi succo per noctem macerato semine. Siquidem Columella rem hanc sibi experientia comprobata afferit. Sylvestribus rapis scarce ubiq; Hetruria, nullis reclamantibus notis. Quare in hoc cogor Fuchsij sententia refragari, qui manifestò errore re, in suis de stirpium historia doctissimi commentarijs, putat Rapum sylvestre esse Rapunculum uulgò dictū: quippe quod illi minime respondeat. Rapi uires recensuit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, ita inquit. Rapi semen uenerem excitat, utpote spiritum flatuosum procreans. Sic et radix concoctu difficilis est, inflatq; et semen generat. Et libro secundo de alimentorum facultatibus, inquit. Rapum siue *γερνυλδα*, siue *σουριδα* appellare uelis, quod eius extra terram est, oleraceum censetur. Radix, quæ terra continetur, ante elixationem et dura est, et cibo aliena: in aqua autem decocta, mirum si aliqua ex congeneribus plantis minus nutriat. Hanc quoque ipsam multifariam homines parant: nam et in muria, et in aceto reponunt, quò in totum annum usui esse possit. Succus ex ea in corpus digestus, temperato crassior est: ideoq; si quis ultra modum esitauerit, et maxime si perficere eam nequeat, crudum succum in uenis congeret. Ad alui deiectionem nec conferre quicquam, nec officere dixeris, potissimum quando bene fuerit percocta, ut quæ longam elixationem requirat, optimaq; sit bis decoctionem perpeffa, ad eum modum uidelicet, quem antea in hac præparandi ratione docuimus. Sin crudior ingeratur, concoctu est difficilior, ac flatulenta, stomachoq; noxia: nonnunquam autem et uentrem mordicat. *Γορ* Nomina. *Γορ* id Græcè uocatur, quod Latine Rapum: Arabice, Seliem, Selgem, Selgiem, siue Alsegiem: Italice, Rapo: Germanice, Rueben: Hispanice, Nabo: Gallice, Raue, seu NauEAU blanc de iardin.

† Quod in Græco hic legitur *θαμνος*, Ruellius uertit fruticosum. Quæ uox est potius ab eo ex Plinio lib. XX. cap. III. reposita, quod etiam aliàs sæpenumero facit, quàm Græcè Latina reddita. Nos fruticem uertimus, licet hac, ut alijs plerisque uocibus, Dioscoridem improprie usum fuisse existimemus.

Fuch. lapsus.

Rapi uires ex Galeno.

Nomina.

## Napus.

## Cap. CV.

COCTA Napi radix inflat, modicum alit. Semen eius potum uenenorum uires hebetat: antidotis admiscetur. Conditur sale radix.

NAPI in raporum genere recensentur. Plura Theophrasto, et Plinio produntur genera: quanquam hac tempestate duo tantum repperim, nempe album, et flauum. Flauum tametsi albos crassitudine superent, magisq; colore placeant; sunt tamen insipidiore, et gustui ob id minus grati. In Aegypto frequentius seruntur, quòd inibi ex eorum semine copiosum expriment oleum. *Βουριάς*, nomen Græcum est: Napus, Latium: Italicum, Napo: Germanicum, Steckrueben: Hispanicum, Nabras: Gallicum, Nauet.

Naporū confederatio.

Nomina.

## Raphanus.

## Cap. CVI.

RADIX, quæ Græcis raphanus dicitur, excalfacit, flatus gignit, ori suavis est: sed stomacho aduersatur, ructus ei, urinam pellit, aluo aptior: summo tamen cibo sumi debet, quò magis eius distributionem adiuet: cum autem præsumitur, cibum suspendit: quare uomituris commodissime datur ante cibum: sensuum aciem excitat. Decocta contra ueterem tussim, et pituitæ crassitiem in pectore, efficax est. Cortex ex aceto mulso, celerius uomitiones mouet: hydropicis commodissime illinitur: lienosis utilis: sugillata cum melle rapit, et nomas admolitur: contra uiperarum ictus auxiliatur: alopecias ad pilum reducit: lentigines cum loliacea farina emendat: his

qui fungis strangulantur, tam cibo, quàm potu salutaris est: menses cit. Semen, uomitiones facit, urinam mouet, lienem extenuat: cum aceto illitum gangrænas ualidissime emarginat: coctum cum aceto mulso, anginis perquam utiliter gargarizatur: contra cerastis morsus, potum ex uino, auxilio est. Sylvestris raphani, quam Romani armoraciam uocant, folia satiuo similia, sed magis lamplanam imitantur: radix gracilis, tenera subacris. Tam folium, quàm radix in olera recipitur: sed hæc excalfacit, vrinam concitat, æstuosa est.

RAPHANVS Græcis dictus, Latinis Radix appellatur. In Hetruria, quòd Latinum nomen imitetur, Radice uulgò uocant: quemadmodum et Romani suam antiquam Raphani sylvestris appellationem retinent, qui ipsum primæ literæ metathesi Ramoraciam appellant. Ceterum cum sylvestris, satiuæ longè durior,

Raphani confederatio.





Fuchſij error.

Raphani ui-  
res ex Gal.

Nomina.

rrior, acriorq; deprehendatur, Dioſcoridis codex hic, ut in alijs pleriq; locis, mendis ſuſſitione non uideat, ut pote cui  
Armoracia radicem reddat teneram mollemue, & ſubacrem. Leonardus Fuchſius, medicus ætatis noſtræ clarif-  
ſimus, Armoraciam eam eſſe ſtirpem putat, quam Raphanum ruſticum nonnulli uocauere, folijs oxylapathos maio-  
ribus, radicibus acerrimis, quibus utitur uniuerſa Germania, & Pannonia ad carnum intinctus. Qua in re cū alioſ  
qui peritum, facile hallucinatum crediderim, acerrimo fortasſe illius plantæ ſapore fretum. Quod ſi is uel Roman  
unquam proſectus eſſet, uel cæteras notas accuratius perpendiſſet, nunquam (ut arbitror) in eum errorem incidiſſet.  
Raphani Theopraſto lib. VII. cap. IIII. de hiſtoria plantarum, plura ſunt genera: nempe corinthium, eleo-  
neum, liothalaſium, bocotium. Adoleſcit ampliſſimè Corinthium, quod uel radice conſtet detecta. Hoc enim ſursum  
uerſus protruditur, non ut cætera in terram ampliari ſolitus eſt. Liothalaſium, quod Thracium uocant, ualidiſſimè  
aduerſus frigora traditur. Bocotium dulciſſimum eſt, & figura rotundum, nec ut Cleomeum prælongum. Quibus ſo-  
lia leuiora, dulciora, ſuauioraq; ſunt: quibus autem ſcabra, acriora. Genus præterea redditur, quod folijs eruce ſimili-  
lo conſtat. Raphanus (ut lib. VIII. ſimplicium medicamentorum ſcribit Galenus) excaſcit quidem exceſſu ſum-  
deſiccatur uero ſecundo: agreſtis autem in utroq; eſt efficacior eſt. Quin & ſemen ipſum planta efficacius eſt. Faciliſ-  
ei ineſt digerendi. Itaq; ad ſugillata, & alia id genus liuida ob talem facultatem accommodata exiſtunt. Meminit item  
Galenus Raphani libro II. de alimentorum facultatibus, ſic inquit. Radiculam ſolam, crudamq; urbani homi-  
nès ut plurimum prima menſa ex garo ſumunt, alii ducendæ gratia: pauci autem acetum amiſcent. Ruſtici uero  
frequenter cum pane eſtant; non ſecus ac alia, quæ nobis natura non ars parauit obſonia: in quibus eſt origanum uir-  
rides, naſturtium, thymum, ſatureia, pulegium, ſerpyllum, mentha, calamintha, pyrethrum, eruca. Quippe hæc &  
omnia uiridia, eduliorum ſunt obſonia, una cum illis ſumpta, ſuntq; herbacei generis planta. Radicule cauſis quorū  
& folia nonnunquam eduntur, ſed neceſſitate magis, quàm ſponte. Radix ipſorum numero eſt, quibus obſonij por-  
tius, quàm nutrimenti nomine aſſidue uſemur. Vini extenuatori ſu gerit, cum qua conſpicue una caſcit: acris  
nim in ea qualitas exuperat. Verno tempore, caulem in altum aſſurgentem producere ſolet, ceu alia, quæ natæ ſunt  
excauleſcere. Hic elixus eſt ex oleo, garo, & aceto, ut rape cauſis, ſinapiq; & lactuca: nutritq; magis cauſis  
iſte, quàm cruda radícula, ut qui acrimoniā in aqua deponat: quanquam minimè ſanè & ipſe alendi poteſtatem  
habet. Quidam non ſolum caulem; ſed una ipſas radículas elixantes comedunt, raparum modo. Cæterum id ſe expe-  
rientia abunde compertum habere dicunt; nullus tamen eos citra damnum potuit imitari. Radix, quæ Græciſ  
ραβδαν, Latiniſ item Raphanus & radix appellatur: Arabibus, Fugel, ſiue Fegiel: Italis, Raphano, & Radice:  
Germaniſ, Rettich: Hiſpaniſ, Rauano, & Rauanillo: Gallis, Peſort.

S I S E R



## SISER.

## SISER ALTERVM.



## Siser.

## Cap. CVII.

SISER vulgò cognitum. Cuius radix decocta ori grata est, & stomacho utilis: urinam ciet, & appetentiam inuitat.

NON desunt, qui crediderint, album quoddam Carotarum uocatarum genus, quæ naporum modo carniû iu-  
ri incoquuntur, legitimum esse Siser. Ceterum eos hallucinari putauerim, Plinij testimonio ductus, qui lib. x. x.  
cap. v. hæc habet. Inest Siseribus longitudine neruus, qui decoctis extrahitur, amaritudinis tamen magna parte reli-  
qua. Id quod in hisce Carotarum radicibus haudquaquam reperire licet: quippe quæ nec neruum concludant, nec  
gustui amaritudinem relinquunt; sed dulcedinem potius quandam præ se ferant. Quod præterea Siser sapore sit sub-  
amaro, facile ex Galeni sententia comprobari potest lib. viii. simplicium medicamentorum, ubi sic scribit. Sifari  
radix cocta stomacho grata est, & urinam mouet, secundo ordine excoalsciens, adiectâ habens amaritudinem quan-  
dam, cum leuicula adstrictione. hæc Galenus. Ex quibus facile colligi potest, Sifera ab hisce carotis plurimum rece-  
dere. Sciendum igitur est, quod Siser in Italia non feritur; tametsi in Germania, Rheni præsertim fluminis accolæ,  
suis in hortis sifera frequentissima habeant, quæ & ferunt, & colunt. Ideoq; Maguntia uenalia abunde reperiuntur,  
à Tineo agro illuc allata. Siser folio est olusatrici, caule, & umbella pastinacæ simili, radicibus dodrantalibus, neruo-  
sam intus matricem continentibus, subamaris, & colore suberocæ, & quæ gustatu gratiam cum palato non modicam  
ineant. Quartum in cibus præstantia allestus Tiberius Cæsar (ut citato loco tradit Plinius) omnibus annis à Germania  
aduêhi sifera curauit ex Gelduba castello Rheno imposito, ubi generositas præcipua. Quod Græci σισαρ, Lat-  
tini quoq; Siser uocant: Mauritanii, Culcas, Fissarum, siue Seisaron: Itali, Sifaro: Germani, Gierlin, & Giergelin:  
Hispani, Chiriuias: Galli, Cheruy, & Gyroles.

Siferis confi-  
deratio.

Sifari uires  
ex Galeno.

Siferisforma.

Nomina.

## Lapatum, siue Rumex.

## Cap. CVIII.


EX GENERIBVS rumicis, oxylapathum uocant, quod in acutum tendit, dura habens extre-  
ma, in palustribus nascens. Alius est satiuus, t illi dissimilis. Tertium genus syluestre, paruum, plan-  
tagini proximum, humile, & molle. Quartum est, quod alij oxalida, alij anaxirida, aut lapathon  
uocant. Folia eius syluestri, ac exiguo rumici similia: caule non magno: semine subacuto, ruben-  
te, acri, in caule, & agnatis appendicibus, emicante. Omnium decocto olere alius emollitur. Crudi  
illitu, melicerides, rosaceo, aut croco adiecto, discutiuntur. Syluestris, & oxylapathi, & eius, quam oxa-  
lida



OXYLAPATHVM.



OXALIS ALTERA.



OXALIS.



HIPPOLAPATHVM.





lida nominant, semen ex aqua, aut uino utiliter bibitur, contra dysenterias, & coeliacorum affectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus. Quod si quis in potu præsumat, nihil molsti ex ictu pertietur. Radices ex aceto coctæ, aut illitæ, crudæ, lepras, impetigines, & scabrosos vngues persanant: sed antea locus aceto, & nitro in sole perfricandus est. Pruritus corporis, decoctum earum sedat, si foueatur, aut in solijs balnearum confricetur. Coctæ in uino, & intillatæ, aurium, dentiumque dolorem mulcent: strumas, parotidasque discutiunt: lienem cum aceto extenuant. Aliqui amolientis strumæ radicem gestamine utuntur, eas collo appendentes. Tritæ, & admotæ fœminarum profluvia sistunt: cum uino autem potæ regio morbo medentur, calculos uesticæ comminuunt, menses cient, scorpionum ictibus auxiliantur. Hippolapathon olus est magnum, in paludibus nascens. Easdem habet uires, quas supradicta rumicis genera.

**TAMESTI** Rumex, qui & Lapathum, nonine à Græcis mutuato, appellatur, hodie in hortis non feratur; in ijs tamen sponte frequentissimus nascitur, nullis deficientibus notis, quibus, satius delineatur. Lapathum, quod in paludibus nascitur, Dioscoridi Oxylapathum uocatur, non quidem quod gustu acutum, seu acidum sentiat, ut oxalis, quam uulgo officinarum Acetosam appellat, sed quod folijs proueniat in acutum desinentibus. Siquidem oxalis Græcorum appellatione, modò significat acutum saporis respectu, modò mucronatum respectu formæ. Ad quod non aduertentes Auicenna, pariterq; Serapio Lapathum omne nullo discrimine Acetosam nominant, perperam id ad saporem referentes, quod ad foliorum figuram retulit Dioscorides in primo lapathi genere. Plinius lib. xx. cap. xxi. Oxylapathon non nisi in palustribus nascens, satiuo similis esse scribit, cum tamen alterum alteri dissimile faciat Dioscorides. Illud uero, quod ab acido succo oxalis Græcis dicitur (et si id silentio inuoluat Dioscorides) duorum est generum, maius nimirum, & minus. Illi folia sunt hortensi similia: huic uero sagittarum figura, mollia, læuia, quibusdam ueluti capillamentis subrubentibus inspersa, succosa, folijsq; maioris acidiora. Semen utrique idem, præterquam quod maiori maius, minori uero minus. Hippolapathum porro non solum in palustribus prouenire uidemus; sed etiam in montibus, ijs præsertim in locis, ubi pecudes diutius stabulari solent, & ubi eorum fimo pinguescit solum, illi plantæ omnino respondens, quæ sub Rhabarbari nomenclatura, passim hodie in hortis, ac uiridarijs plantatur.

Rumicis consideratio.  
Oxylapathū.

Oxalidis consideratio.

Hippolapathum.

Lapathi uires ex Galeno.

## LAMPANA.

Lapathi meminit Galenus lib. vi. i. simpl. medic. sic inquit. Lapathum moderatè digerentem sortitum facultatem est, atoxylapathum mistam: nam simul cum eo quod digerit, nonnihil quoque repercutit. Semen eorum manifestam quandam etiam adstrictionem obtinet, adeo ut & dysenterias, & diarrhæas, siue profluvia sanet, & maxime oxylapathi. Porro hippolapathum, quod in totum in paludibus prouenit, easdem dictis facultates obtinet, sed inbecilliores. Et libro secundo de alimentorum facultatibus: Rumicem, ait, uti antè diximus, syluestrem betam possit quis appellare, cum non gustu solum; uerum etiam facultate hortensi betæ persimilis sit. Quoniam autem beta iucundior est rumice, idcirco ea magis homines uestiuntur. Quare nec nos quoque prolixius hic de rumice scribere oportet, cum in beta omnia ad rem faciendā exposuerimus. Planta, quæ Græcis λαπάθον, Latinis etiā Lapathum & Rumex appellatur: Arabibus, Humadh, Hunadh, eu Hamad: Italis, Rombice, & Lapatio: Germanis, Ampffer: Hispanis, Labaca: Gallis, Lampe. Quæ uero Græcè oxalis, oxalis item Latine dicitur: Germanicè, Sauer ampffer: Hispanicè, Azederilha: Gallicè, Ozeille, Vinette, & Sallette.

Nomina.

† Nihil fortasse Plinius à Dioscoride dissentiet si in hoc loco se quamur lectionem Oribasij lib. xi. simplicium: qui habet οὐ κατὰ τὴν ἑμῶν τῶ πρώτῳ, id est, non prorsus simile primo. Nam ex hac patere arbitror, non tantum priora lapathi genera inter se differre, quantum uulgata lectio innuere uidetur.

## Lampsana.

## Cap. CIX.

LAMPANA syluestre olus est. Plus alit, quam rumex, & stomacho utilius. Cuius folia, caulesque coquuntur in cibo.

**QVANSIS** hic inter olera, quæ in alimentorum usum uenire, Lampsana recensetur à Dioscoride; nullis tamen notis ab ipso describitur, quod fortasse suis in regionibus notissima habetur. Id quod nobis Italis non euenit. Quamobrem dixerim unā cū Plinio lib. xx. cap. ix. inter sylvestres brassicas lampsanam esse, pedalis altitudinis, hirsutis folijs, napi simillimis, iussu candidior esset flore. Nascitur hæc frequentissima in Hetruria, Apulia, ac plerisque Italiæ locis, ijs præsertim campis, qui aratrum eo anno minime sensere: tamen si nobis hac tempestate non fuerit, nisi fors an ur-

Lampsanæ consideratio.





Lampſanæ ui  
res ex Gal.

BLITVM.

Nomina.


gente amona penuria, in alimentorum uſum recepta. Menia  
nt huius Galenus libro VII. ſimplicium medicamentorum, his  
paucis uerbis. Lampſana eſa ſuccos prauos procreat. Ceterum  
illita abſtergendi nonnullam, digerendiq; facultatem poſidet.  
Oluſ hoc ut Grecis λανφάν, ita Latinis, & Italis Lam  
pſana nominatur.

Blitum.

Cap. CX.

BLITVM eſtur oleris modo. aluo utile eſt: nul  
lius in medicina uſus.

Bliti confi  
ratio.



MALVA.

Bliti uires ex  
Galeno.

BLITVM duorum eſt generum, rubrum nimirum, & al  
bum. Vtrunq; notum, in hortis, & campis naſcens. Rubro cau  
lis, & folia adeo rubefcunt, ut coccineo colore infeſta uidean  
tur, eſi temporis tractu tandem purpureſcant. Folia amarum  
tuſ referunt, ſicut etiam cauſ. Quin & radix ſanguineo ſu  
co madet. Album prouenit iſdem folijs latioribus tamen, & co  
lore ſubalbidis. Flores & ſemen racematim coherentes, tenui  
bus inſident ramuſculis, ex alarum cauſ prodeuntibus, panicu  
larum effigie, ſylueſtris panicis modo. Hoc olus Tridentina rura  
Biedone uulgo appellant, recipiturq; nonnullis in cibum. Ad nan  
que aqua prius decoquunt, denuum aſuſo oleo, uel butyro in ſa  
tagine frigunt, additis allio, & omphacio, uel aceto. Verunt  
men cibis is nonnunquam (ut ego ex uiſu teſtari poſſum) uomi  
tiones mouet, uentriculi & inteſtinorum tormina facit, & alui  
fluxiones ciēt, excitata bile. Eaſq; propter Plinius lib. XX. cap.  
XXII. ita de eo ſcriptum reliquit. Blitum iners uidetur, ac ſi  
ne ſapore, aut acrimonia ulla. Vnde conuiuium forminis apud Ne  
nandrum faciunt mariti. Stomacho inutile eſt. Ventrem adue  
rſus turbat, ut cholera faciat aliquibus. Dicitur tamen adue  
rſus ſcorpiones potum, & uino prodeſſe, & clauis pedum illini. Ien  
lienibus, & temporum dolori ex oleo. Hippocrates menſtrua ſi  
ſti eo cibo putat. haſtenus Plinius. Bliti meminit Galenus li  
bro VI. ſimplicium medicamentorum, his uerbis. Blitum olus eſt  
eſculentum, humida, frigidaq; temperatæ, in ſecundo maxime  
exceſſu à temperatis. Item ſecundo de alimentorum facultatibus:  
Qui Porro, inquit, a triplicis, blitiq; guſtabilem qualitatem  
intelligit, braſſicæq; ſaporis commemorat, lactucam in braſſica  
ac horum olerum medio eſſe non diſſitebitur: ſiquidem illa egro  
gie deſiccatur, hæc contra plane humida, aquoſaq; ſunt. Quapro  
pter non ex ſolo oleo, garoq; ſed addito aceto ſepius, meliusq;  
aſſumuntur: aliàs nanq; ſtomacho infeſta ſunt. Diximus autem  
iſtiusmodi olera non nihil ad leuigandam aluum momenti aſſer  
re, maxime ſi cum humiditate glutinoſam lubricitatē ſortiſta ſit,  
hæc Galenus. Quo ſit, ut mirari liceat, ſi Plinij, & Galeni ſcrip  
pta perpendamus, quod dixerit Dioſcorides, Blitum aluo utile  
eſſe, & nullius in medicina uſus. Eius nomen Græcum eſt  
βλῖτον: Latinum, Blitum: Arabicum, Bachala iamenia, ſiue  
Bachale alimanie: Italicum, Blito: Germanicum, Mayer: Hiſ  
panicum Bredos: Gallicum, Poree rouge.

Malua.

Cap. CXI.

MALVA ſatina eſui longè aptior ſylueſtri. ſto  
mago adueſatur: aluum iuuat, ſed multò magis cauſes  
interaneis, & ueſicæ utilis. Cruda folia cum ſalis exi  
guo manducata, ægilopas ex melle ſanant: uerum cum  
cicatricem trahere cœperint, ea demum citra ſalem utē  
dum eſt. Contra aculeatos apium, ueſparumq; icūs, ſiue  
illita efficax eſt: eadem cruda cum oleo trita peruncta non



Nomina.



## MALVA ARBOREA.



non feriunt : vlcera manantia in capite, furfuresq; cum urina sanat. Sacris ignibus, & ambullis decocta folia, tri- taque, utilissimè ex oleo imponuntur. Eius decoctum vulvas infusione mollit : prodest erosionibus uetricæ, & intestinorum, uulvæ sedisque, clystere infusum. Ius decoctæ cum radice sua contra omnia uenena auxiliatur, si continuò à bibentibus reuomatur. contra phalangio- rum morsus remedio est. lac euocat. Semen in uino potum, addito loti sylvestris semine, uetricæ cruciatus lenit.

MALVA uulgaris adeò notitiæ est, ut nulli ferè reperian- tur, qui eam non nouerint. Plura eius genera : sed ea, quæ ali- quibus locis in Italia arborefcit, nil aliud est, quam satia cultio- rum mangonio in tantam magnitudinem asurgens, ut libro pri- mo de plantarum historia cap. v. prodidi Theophrastus, cum in- quit. Quedam etiam comperta sunt ob culturam diuersa effici, atq; à sua natura discedere, ut Malua in altum se attollens, atque in arborem transiens. Quippe ita fit neque tempore longo, sed mensibus senis, aut septenis, ita ut longitudine, crassitudineq; in- star haste possit grandescere : quapropter commodè ad usum ba- culi uenit. Tempore uerò longiore exacto, pro ratione magis quo- que incrementa capefit. haftenus Theophrastus. Plinio libro XIX. cap. IIII præter eam, quæ in Arabia septimo mense ar- borefcit, & baculorum usum præbet extemplo, est & Malua ar- bor in Mauritania Lixi oppidi æstuario, ubi Hesperidum horti fuisse produntur. Ipsa altitudinis pedum uiginti, crassitudinis quæ circumplecti nemo possit. In simili genere habetur & canabis. Maluam, quæ in arborem degenerauerat, uidi ego primum Gri- guani ad Benaci ripas in quodam monachorum cœnobio, ubi eo- rum otio, & cultu tantam sibi aseuerat amplitudinem. Est &

Maluæ confi- deratio.

ea inter maluarum genera recensenda, quæ in hortis ac uiridarijs folio exit magno, rotundo : caule tricornitali : flori- bus rosarum effigie rubentibus, candidis, uel subrubeis, nullo tamen odore fragrantibus. Nam si ut rose nares con- ciliarent, quemadmodum oculos hilari formâ, ac coloris uiuacitate alliciunt, nulli dubium est, quin de præstantia, ac pulchritudine cum ipsis rosis certare potuissent. Maluæ meminit Galenus libro VI r. simplicium medicamen- torum, sic inquit. Malua agrestis quidem digerentis paululum, & emollientis leuiter est facultatis. Hortensis ue- rò quanto plus habet aqueæ humiditatis, tanto facultate inbecillior est. Fructus eius tantò ualidior est, quanto & stecior. Porro huius generis est & ea, quæ anadendromalache nuncupatur, sed efficacissima comprehensarum in di- gerendo. Appellatur etiam althea. Et libro XI. de alimentorum facultatibus : Est, inquit, ab hac hortensi alia quæ- dam sylvestris malua, seu à lactuca est Epidaurim, id est lactuca sylvestris. Inter uerò has congeneres plantas id est discriminis, nempe quòd steciora sint sylvestria, satia humidiora. Permistum quoq; est maluæ succo aliquid glutino- sum, quo lactuca caret. A refrigerandi facultate manifestè abest, ut etiam ante sumptionem cernere licet, si ex am- bobus uicissim oleibus cataplasma ad calidum quempiam affectum, quale est erysipelas, componas : id quod faciliare homines consueuerunt, molliuscula folia perquam diligenter tundentes, donec ad leuiorem exactissimum redacta sint. Tum uanque cognosces lactucam manifestò refrigerare : maluam uerò modicum, & quasi tepidum quandam calorem obtinere. Facile hoc olus deorsum labitur, non tantum quia humidum est : sed etiam quia glutinosum, præcipue cum oleum, garumq; affatim unâ hauritur. Ad concoctionem mediocriter se habet. Si horum trium oleorum, succos inter se compares, tenuis & abstersorius betæ, maluæ crassior glutinosiorq; lactuca in utriusque medio statuetur. Nomina. Herba, quæ Μαράχιν Græcè, malua Latine uocatur : Arabicè, Chubeze, seu Chabazi : Italicè, Malua : Germa- nicè, Fappel : Hispanicè, Maluas : Gallicè, Malue.

Maluæ uires ex Galeno.

## Atriplex.

## Cap. CXII.

ATRIPLICEM aliqui chrysolachanon vocant. cognitum olus est. Duo eius genera, sylue- stre, & satium. Coctum citur, ut olus : aluum mollit. Panos discutit, siue crudum, siue coctum illi- nat. Semen cum aqua mulla potum, regium morbum sanat.



## ATRIPLEX SATIVA.

## ATRIPLEX SYLVESTRIS.



Atriplicis cō  
hderatio.

Recentiorū  
quorundā o-  
pinio repro.

Atriplicis  
alia genera.

Kali Mauri-  
tanorum mē-  
tio.

ET SI in Hetruria hortis rara admodum sit Atriplex; frequentissima tamen apud Insu-  
bres feritur, quod ex ea  
praesertim rura sibi quoddam placenta genus conficiant hoc modo. Incidunt enim acutissimo cultello Atriplicis folia,  
& caseo in scobem attrito, butyro, ac ouis commiscunt, & in sartaginibus foliosa pasta substrata, decoquunt, come-  
duntq; abunde, perunctis undiq; labijs. Haec inter olera ocysimè assurgit: nam & feritur, & manditur decimo quinq;  
to à satù die. Folia promit caule tenuis lata, in mucronem tamen desinentia, sagittarum instar, pinguis, succosa, co-  
lore ex uiridi in luteum languescit. Caulis, qui illi rubet, multis undiq; adnatis, ad quatuor cubitorum mensuram  
adulescit: semine pressis, tenuibusq; folliculis concluso. Praestat Atriplex in cibis uere tantum: siquidem ut ocysimè  
crescit, ita & uelocissimè senescit, & deperditur. Credidere recentiorum quidam Atriplicem, & Spinaciam nula-  
gò dictam, eiusdem esse generis. Verum ij, meo quidem iudicio, falluntur apertissimè. quippe praeter id quod Spina-  
cia nouum in Italia olus est, & foliorum, & caulis, & seminis forma, atq; colore ab atriplice maximè differt, sicuti  
& sapore. Namq; suspicatur Manardus Ferrariensis, nescio tamen qua ratione ductus, Atriplicem, & Spinaciam  
chrysolachani speciem esse. Sed eius sententiam minime probandam censeo: chrysolachanon enim Latinis aureum o-  
lus significat. quod tamen si Atriplici competere possit; nou tamen ob id Spinacia conuenire uidetur, quae folijs, cau-  
le, flore, ac semine perpetuò uirescit. Caterum duo alia Atriplicis genera habentur, unum sylvestre, alterum ma-  
ritimum. Illud in campestribus, atque etiam alibi sponte prouenit. Hortensi omnibus propè notis respondet, praeter  
quam folijs, quae albidiora spectantur. herba uulgò cognita est. Atriplex uero in maritimis nascens, cuius nulla  
(quod equidem sciam) facta est mentio à Dioscoride & Galeno, ijs facile sese offeret, qui non grauabuntur, ut hanc  
& alias maritimas herbas cognoscant, maris litora peragrarè. Eam nos copiosam imminimus Tergesti ad salinas in-  
maris litore, nimirum diuersam ab halimo olere maritimo, ut eius imago, quam hic damus, aperte declarat. Inibi  
quoque plantam illam nobis contigit uidere, quae KALI. Mauritanijs appellatur, cuius cinere utuntur fabri uirria-  
rij ad uitrum conficiendum: ex decocto autem eiusdem herbae paratur sal illud, quod Alkali ijsdem dicitur. Inibi  
primum terra emergit, folium est tereti forma, minori sedo non absimile: atque deinde crescens, caule erecta geniculis  
lato, non multo post tempore in digitalem ferme longitudinem attollitur. Cum uero amplius adoleuerit, & geniculis  
folia emittit pinguis ac crassa, in medio caua, & ex lata origine mucronata. Vbi deniq; planta adulta senescit, folia  
in caulium cacuminibus longè minora exilioraq; conspiciuntur, colore rufis: ex quorum ortu pilula prodeunt rotunda  
de ac paruae: quibus exile semen includitur. Caules habet pingues & rufos. Sapor uniuersae plantae salsus, ueluti  
critthmo. Hanc quidam alteram Dioscoridis Anthyllidem esse censent. Sed errant, meo quidem iudicio, ut latius di-  
ctum est in sequenti libro, tum etiam in ea Apologia, quam in Amathum illum Lusitanum scripsimus. Atriplex, ut  
memoria




SPINACIA.

ATRIPLEX MARINA.



KALI.



memorie prodidit Galenus libro VI. simplicium medicamen-  
torum, humida, & frigida temperie est; humida quidem se-  
cundi ordinis à medijs, frigida uero primi, quam utique tep-  
dam esse caliditatem posuimus; cuiusmodi ros is inest: non ta-  
men adstrictionis est particeps, sed aquea est, & minimum ter-  
rena, similiter malua. Quin & uentrem celeriter permeat,  
at illa, ob lubricitatem. Porro paululū omnino eius est, quod  
digerendi obtinet potentiam. Hortenses autem atriplex, &  
malua, quam agrestes tum humidiores sunt, tum frigidiores.  
Proinde phlegmonis, & phygethliis incipientibus, gliscenti-  
busq; & mollibus etiānum, ac uelut feruentibus hortenses;  
uigentibus autem, & declinantibus, ac indurescentibus com-  
modiores sunt agrestes. Semen eius abstergerendi uim habet:  
itaque ad morbum regium ex pituita (rectius fortē hepatis te-  
gendum) infarctu prognatam utile est. hæc Galenus. Scribit  
Serapio Rasim uidisse hominem quendam, qui ex Atriplicis se-  
mine duarum drachmarum pondere sumpto, crebris tum uo-  
mitibus, tum alui deiectionibus uexatus fuit, adeo ut ad ex-  
tremam uirium imbecillitatem deueniret. Quod mihi quidem  
mirum non est: quandoquidem noui ego pharmacopolam quen-  
dam, qui ad rusticos purgandos Atriplicis tantam semen exhi-  
bebat: quod ijs non sine molestia magna aluum abunde ciebat,  
atque etiā simul crebos prouocabat uomitus. Quæ tamen sa-  
cultas paucis, ut puto, hætenus innotuit. Atriplex sic La-  
tinis, Græcis ἀτρίπλις, & ἁρυσόληα uocatur: Arabi-  
bus, Cataf, seu Caraf: Italis Atriplice: Germanis, Mol-  
ten & Milten: Hispanis, Armoles: Gallis, Follete, & Fe-  
mes.

Atriplicis ui-  
res ex Gal.

Nomina.



## BRASSICA CRISPA.

## BRASSICA CAPITATA.



Brassica.



Cap. CXIII.

BRASSICA sativa alio idonea est, si modò leuiter seruefacta edatur. nam percocta aluum frigit, sed multò magis bis cocta, aut quæ in lixiuio coquitur: stomachum autem malè habet. acrior est astiua. In Aegypto propter amaritudinem non estur. Cæcutientibus, & tremulis esse prodest. Summo cibo sumpta crapulam discutit, & uini noxam restinguit. Melior stomacho cyma, sed acrior, & ad ciendum urinam ualidior. ea condita stomacho inimica est: aluum conturbat. Crudus succus cum nitro, & iri deuoratus, aluum emollit: cum uino quoque epotus, uiperarum moribus auxiliatur: cum fœni græci farina, & aceto, podagris, & articulorum uitijis illinitur: prodest & sordidis ulceribus, & uetustis illitus: caput purgat naribus infusus: menses extrahit, cum loliacea farina inditus. Folia per sese illita, aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus, tumoribusque: epinyctidas, ignem sacrum, leprasque sanant. carbunculos ex sale rumpunt: fluentes capillos retinent. Cocta addito melle aduersus depascentia ulcera, gangrenasque ualent. Lienosisque ex aceto cruda profunt. Mansa, deuorato succo, retusam uocem instaurant. Decoctum eius potu, aluum, & menses ciet. Flos post conceptionem in pello subditus, partum abortu uitiat. Semen eius, præsertim quæ in Aegypto nascitur, potum tineas repellit. In antidota iheriaca additur: faciei cutem, lentiginēsque expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci uetusto excepti, diuturnos laterum dolores mitigant.

## Brassica fyluestris.

## Cap. CXIIII.

SYLVESTRIS Brassica, maritimis præruptisque locis, magna ex parte gignitur: satiuæ similis, sed candidior, hirsutiorque, amara. Cuius cyma in lixiuio cocta, ori non insauis. Folia illius uulnera conglutinant, & inflammationes, tumoresque discutiunt.

## Brassica marina.

## Cap. CXV.

MARINA Brassica à satiuâ prorsus abhorret, quòd folia ferat rotundæ aristolochiæ, longa, tenuia: singula à ramulis rubentibus exeunt, singulari, ut hederæ, pediculo. Albo succo prædita est, sed pauco, falso gustu, & aliquantum amaro, pingui concretu. Herba in totum stomacho inimica, acris: vehementissimè aluum ciet in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniam cum pingui carne.

SATIVA



## BRASSICA MARINA.



**SATIVA** Brassica, Theophrasto, & Plinio auctoribus, in multiplici recensetur genere. Id quod & horti in Italia attestantur: nam in ijs multiplex, & uaria crescit Brassica. Cato brassicæ tria fecit fastigia. Vnam grandibus, latisq; folijs, caule magno consili cymarum luxuria. Alteram crispæ folio, quam ab apij similitudine apianam uocant. Tertiam proprie uocatam crambem, minutis caulibus, tenerioribus folijs, læuem, teneram, tenui succo, acerrimam quidem omnium, & magis medicamentosam. Verum Plinius libro XIX. cap. VIII. Brassicæ (ut diximus) complures enumerauit species. Inter quas eam Sabellicam appellari tradidit, quæ crispis admodum folijs, lactucæ modo in se concluditur, intus albicans, tenera, subdulcis, & quæ hac ætate omnium præstantissima habetur. Ait enim, Sabellicæ usque in admirationem crispæ sunt folia, quorum crassitudo caulem extenuat, sed dulcissima perhibetur ex omnibus. Est & capitata conglomeratis undique in orbem folijs, Plinio lacuturris appellata, qui loco citato sic inquit. Nuper subiere lacuturres ex conualle Aricina, ubi quondam fuit lacus turrisq; quæ remanet, capite pregnantibus, folio innumeri. Alij in orbem porrecti, ali in latitudinem torosi. Nec plus capitis ullis post tritium, cui pedale aliquando conspicitur: & cyma nullis serior. Quæ omnia nostratibus brassicis capitatis, quæ uulgò Capucci dicuntur, pulchrè respondet. Est insuper ex ijs, quæ nostris Italiæ hortis proueniunt, alia quædam, cuius caulis rapi in morem extuberat, manditurq; subinde medulla, pingui iure incocta raporum uodo. Huius non reperio meminisse Plinium, nec eo uetustiores alios, qui de horticorum sationibus scripsere: sicuti nec illius, quæ folijs admodum per-

Brassicæ sati-  
uæ genera.

ambitum laciniatis, minutimq; intercisis assurgit. Pernicilia porro Brassicis omnibus cum uitibus odia seruantur. Vitemq; uiuam oleris huius odore fugari Theophrastus, & Plinius affirmant: asitamq; ad olus diffugere Varro tradidit. Quo argumento usus Androcydes, Brassicam contra temulentiam pollere credidit. Sed cur crapulam sedet, id causæ reddidit in problematibus Aristoteles, quod scilicet dulcem nimirum succum, abstergentemq; contineat. Sylvestris in maritimis nostris Senensibus Argentario promontorio, alijsq; tum Tyrrheui, tum Adriatici litoribus frequens nascitur. Hanc non longè à Terracina urbe, uia qua itur Neapolim, plurimā uidimus, folijs domesticæ similibus, sed hyoscyami modo hirsutis, amaro ac insuauis gustu. Ex semine Brassicæ ueteris (ut Plinius est auctor lib. XIX. cap. X.) rapæ sunt, atq; inuicem. Brassica satina, & esculenta, ut memoriæ prodidit Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, desiccandi uim habet tum esæ, tum foris imposita, non tamen etiam admodum acrem. Alioqui & ulcera glucinat, & maligna ulcera sanat: præterea pblegmonas iam induratas, ac ægrè solubiles, & id genus quoque erysipelata. Eadem facultate epinyctidas, & herpes sanat. Habet quiddam etiam in se abstersorium, quo lepras curat. Porro semen eius potum lumbricos interficit, maxime brassicæ Aegyptiæ, quanto ea scilicet temperatura stecior est. Sane amaræ qualitatis particeps semē est, sicut uidelicet omnia alia medicamenta, quæ ad lumbricos idonea sunt. Secundum eandem facultatem ephelidas, & lentes, & quæcunq; alia modicam absterstonem postulāt, adiuuat. Caules brassicæ combusti, cineres efficiunt admodum desiccantes, ut uidelicet iam adurentem uim participant. Hac ratione ei ueterem adipem commiscentes, ad inueteratos laterum dolores, & si quid eius fuerit generis, adhibent. Nam ualenter digerens medicamentū efficitur. Brassica uerò agrestis quodammodo calidior, steciorq; domestica est, cetera alia prope omnia agrestia sui generis, domesticis secundum utraq; hanc facultatem ualentiora sunt. Quamobrem neque intra corpus citra noxam sumitur, ut quæ longius ab humana recesserit temperatura. Eadē de causa, & gustantibus amarior est, quā domestica: quanquā domestica quoq; subamarū quiddam, & acre contineat: sed utraq; habet agrestis ualidam. quare etiam extergit, & digerit quā domestica ualentius. Marina autem brassica supra quā quod uentrē deiciat, ut pote subsalsa, & subamara gustu, fuerit sanè etiam ad externos corporis usus, & ad omnia ea, ad quæ tales qualitates accommodantur, idonea. Et lib. II. de aliment. facultate: Brassica quoque, inquit, à multis ut obsonium estur: medici autem, ut desiccante medicamento, ea utuntur. Diximus de hac quædam cū de facultatibus medicamentorum ageremus, tum etiam in libro superiore: quæ nunc summam perstringemus. Ergo brassicæ succus purgandi uim quandam obtinet: contra solidum eius corpus siccitatis ratione cohibere magis, quā incitare deiectionem potest. Proinde cū expellere alui excrementa propositum erit, alieno, in quo elixa unā cum aqua fuit, propius admoto, ipsam eximere confestim, uasculūq; in quo paratur, oleum cum garo inmiscere oportebit: si salem pro garo sumas, nihil refert. At humentem aluum siccare uolentes, cū mediocriter bullisse uidebitur, priore aqua effusa repente, aliam calentem inijcimus: ac ita rursus in ea discoquimus, usq; dum tenera flaccidaq; euaserit. quod non facimus, cū uentris subducendi gratia sumitur. hætenus Galenus. Ceterum licet Dioscorides prodiderit marinam brassicam folia ferre rotundæ aristolochiæ, longa, ac tenuia; ea tamen non ab re ab omnibus esse ceusetur, quā uulgus officinarum Soldanellam appellat. Quippe quæ in maritimis nascatur, folijs lacteo succo madeat, ramulis confectis rubentibus, è quibus prodeunt ipsa folia, hederae modo, quæ gustu salsa, & amara, & quadantenus acris sentiuntur.

Brassicæ syl-  
uestris cōsid.

Brassicæ vi-  
res ex Gal.

Brassicæ ma-  
rinæ confide-  
ratio.



Locus Dio-  
scor. suspect.

Ruellij error

Syluatici er-  
ror.

Nomina.

Quamobrem Dioscoridis codicem hoc in loco, sicut & in alijs permultis, inendi suspicione non uacare putamus. Facile enim euenisse crediderim librarium incuria, ut folia *μακρά*, id est, longa, pro *μικρά*, id est, parua, hoc loco successerint: & certe facilis fuit unius literæ lapsus. Siquidem Soldanella uocata omnibus notis marinam brassicam representat, exceptis folijs, quæ sunt aristolochiæ rotundæ minora. Ruellius uir doctissimus, etsi in hoc nobiscum ceterisq; consentiat, quod marina brassica hæc sit herba, quæ uulgò Soldana, & Soldanella dicitur, nulla etiam inquit reclamante nota; in eo tamen manifestè aberrasse deprehenditur, quod Soldana folia aristolochiæ longæ, atq; etiam prælonga reddiderit. Errat præterea in hac plâta Matthæus Syluaticus pandectarum auctor, quod crediderit Arabum Chachile Soldanellam esse. Cuius error apertè conuincitur ipsius Serapionis testimonio: quippe qui Chachile suum usineæ similitudinem fecerit, folioq; non aristolochiam, sed nasturtium imitari tradiderit. Marinam brassicam in luoribus Venetis, Aquileiensibus, ac Tergestinis, ubi copiosa nascitur, nos sæpius uidimus, ac legimus. *Κράββα* in Græcis, Brassica Latinis appellatur: Mauritani, Corumb, siue Karumb: Italis, Cauolo, & Verza: Germanis, Koel: Hispanis, Colhes, & Coues: Gallis, Choils.

### BETA NIGRA.



Beta.

### BETA CANDIDA.



Cap. CXVI.

BETA duorum generum est. E quibus nigra coquitur cum lenticula, ut uentrem sistat: quod magis radice eius præstatur. Candida aluo utilis est. Vtraque tamen propter nitrosum humorem quem habet in se, noxij succi est. Vnde succus earum, cum melle naribus inditus, caput purgat: aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radices, & foliorum, furfures, lendesque deterget: permixtus fotu mitigat. Crudis folijs uutiligines, nitro antea perfrietas: alopeciarum inanitates, scapello prius exasperatas: atque depascentia ulcera, illini prodest. Eruptionibus popularum, igni sacro, ambuletisq; cocta medetur.

Betæ confide-  
ratio.

Betæ facultates  
ex Gal.

BETA tam candida, quam nigra in Italiæ hortis frequentissima nascitur. In Germania tamen habetur & rufa, non modò folijs; sed etiam radice, quæ illi raporū oblongorum magnitudine extuberat: colore adeò rufescente, ut eius succus uinum sanguinem referat. Hanc Germani hyeme cineribus calentibus obrutam coquunt, subinde corticibus exuunt, & in acetarijs asperso pipere concinnant ad esum, carotæ uulgò uocatæ modo. Sed & illis dulcior est, & quæ suui gratior. Betæ facultates adnotauit Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Beta nitroscæ facultatis particeps est, quæ tum digerit, tum extergit, & per nares purgat. Ceterum cocta nitrositate omnem aliam fitq; facultatis phlegmonis aduersæ, leuiter digerentis. Porro ad detergendum, digerendumq; ualidior est beta alba. Nam nigra adiunctum habet adstrictionis quippiam, & magis in radice, quam alijs partibus. Et libro II. de alimentorum



torum facultatibus inquit. Betae absterforius inesse succus conspicitur, adeo ut alium ad excretionem extimulet, & nonnunquam stomachum demordeat, praesertim ijs, quibus natura sensu exactiore praeditus est: ob idq; largius commansi, stomachum infestat. Huius, seu aliorum olerum, exigua est alimonia. Iecoris obstructionibus, quam malua, aptius accommodatur: magis autem ubi cum sinapi estur, aut aceto. Lienosos item similiter maducata mirifice iuuat. Iure enim quis ipsam medicamentum potius, quam alimentum dixerit, ubi hoc modo manditur. haecenus Galenus. Inueniri syluestrem Betam tradidit Plinius libro xx. cap. viii. eamq; uocari Limonium, quod describitur à Dioscoride libro quarto, à Galeno uero libro vii. simplicium medicamentorum. Cuius sententiae refragatur Galenus libro ii. de alimentorum facultatibus, cum inquit. Equidem non satiam solum maluam; sed agrestem quandam etiam esse perhibuimus, quemadmodum & lactucam. At agrestis Beta nulla est, nisi utiq; quis lapathum ita nominare uelit. Candida beta, Plinio loco nuper citato auctore, cocta, & cum allio crudo sumpta, alui tineas enecat. Succus à facibus expurgatus (ut ipse sepius periculum feci) clysteribus infusus, ad indurata alui euocanda excrementa mirum in modum pollet, praesertimq; ubi lenientia clysmata nihil profecerint. Oulus Graece Τέλον, Latine Beta uocatur: Arabice, Decha, & Celb: Italicè, Bietola: Germanicè, Mangolt, & Pieffen: Hispanicè, Aselgas: Gallicè, Porree.

Beta syluestris Plinio.

## Portulaca.

## Cap. CXVII.

PORTULACAE vis adstringit. Capitis doloribus, inflammationibus oculorum, cæterisque, cum polenta imponitur: ardoribus stomachi, sacro igni, vesicae doloribus, auxilio est: commanducata dentium stupores sedat: stomachi, & intestinorum aestuationem, fluxionesque mulcet: renes, & vesicam adiuuat. etiam si erosionem sentiant: veneris impetus exoluit. Succus epotus simili effectu prodest, in febribus ualens. Contra teretes uentris tineas, cruentam excretionem, dysenteriam, hæmorrhoidas, & profluvia sanguinis, percocta efficax est: item contra sepius morsus. Ocularibus medicamentis utilissimè commiscetur: interaneis fluxione laborantibus, atque vuluarum erosionibus, infunditur: contra dolores, quos aestus excitauit, caput ex rosaceo, & oleo fouetur: eruptiones popularum in capite, cum uino emendat: vulneribus, quæ ad syderationem spectant, ex polenta illinitur.

PORTULACA omnibus uulgarissima est. Duo eius habentur genera. Vnum satium, cui folia insunt latiora, et caulis crassior in altum se attollens. Alterum uero syluestre humi repens, minoribus, tenuioribus, ac crebrioribus folijs. Portulacæ meminit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, ubi ita scribit. Portulaca frigida, & aquea temperamento est, pauca cuiusdam particeps austeritatis. Proinde fluxiones repellit, & maxime biliosas, & calidas, cum eo, quod eas mutet, et in qualitate alteret, magnopere refrigerans. Et fuerit sanè in refrigerandi quidem facultate tertij excessus à temperatis, ac medijs: in humectandi uero secundi. Hac ratione & aestuantes, ut si quid

Portulacæ genera.

Portulacæ uires ex Gal.

aliud, adiuuat tum uentris osculo imposita, tum totis hypocondrijs, potissimum in febribus hecticis. Præterea dentium stuporem sanat, nempe quæ ab acidorum succorum contactu, asperè exiccata fuerant, leniens, atque replens, utpote cum uiscosam habeat humiditatem. Similiter uero & succus eius. Itaq; non foris modò impositus; sed epotus quoq; refrigerat. Hoc sanè & toti herbe comese accidit. Quoniã autem subastringit, utiliter dysentericis editur, & muliebri profluuiio, & sanguinis reiectionibus. Sed ad hæc quidem multò est, quam herba, succus ipsius efficacior. Et lib. ii. de alimentorum facultatibus: Portulaca (inquit) quidam ut cibo utuntur: sed imbecillum præbet alimonia, eamq; humidam, frigidam, & glutinosam. Vt medicamentum autem, dentium stupori medetur ob lentorem suum morsus expertem. de ea diffusius in opere de facili parabilibus sumus locuti. Hæc ipsa, ut tradidit Plinius lib. & cap. xx. emplastri modo imponitur umbilico prociduo. Sanat & mammarum, & podagræ inflammationes, cum melle, aut cimolia creta. Prodest in uniuersum omnibus calidis affectibus. Huius herbe nomen Graecè ἐστὶν πέχυν. Latine, Portulaca: Arabice, Bakleancha, seu Bachele albanica: Italicum, Portulaca, Procacchia, & Portellana: Germanicum, Burtzelkraut, & Portzelkraut: Hispanicum, Verdolagas, & Baladroegas: Gallicum, Pourpier, & Pourchaille.

Nomina.

## Asparagus.

## Cap. CXVIII.

CORRUDA, siue syluestris asparagus, vulgaris est notitiæ. Huius caliculi in cibo cocti, ventrem emolliunt,



## ASPARAGVS.

Asparagorū  
vires ex Gal.Ex Plinio, &  
Auicenna.

Nomina.

emolliunt, urinam cient. Radicis decoctum contra vrinæ difficultatem, regium morbum, renum vitia, & coxendicum cruciatus, in potu proficit: cum vino autem, phalangiorum moribus auxiliatur. Si decocti succus super dente contineatur, eius dolori medetur. Semen porum ad eadem valet. Canes, ut aiunt, si decoctum bibant, emoriuntur. Asparagum etiam nasci prodiderunt, arietis cornibus contusis, atque defossis. quod, quantum equidem sentio, planè à ueritate abhorret. † Aliis autem asparagus, multis ramis fruticat, folijs fœniculi, longis, numerosis: radice rotunda, grandi, spongiam habente. Huius teneri cauliculi triti in uino albo, renum dolores sedant. Assus autem, coctus uis, urinæ fistulicidium, difficultatemque, ac dysenterias mitigat. Radix cum uino, aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Decocta cum fœcis, aut ciceribus, sumpta, regium morbum sanat: coxendicis cruciatus, stranguriamque leuat. Alligata radix, aut haustum eius decoctum, conceptionem adiuuat, & sterilitatem adfert.

ASPARAGI tam satini, quam sponte nascentes, in Italia notissimi sunt. Meminit horum Galenus libro VI. simplicium medicam. sic inquit. Asparagus petraeus, aut myrsinæ thibius abstergendi uim habet, idque citra manifestam aut caliditatem, aut frigiditatem. Hinc renes, ac iecur infarctu liberat. & maximè herbe ipsius radices, & semen. Quin & dentium dolores sanat siccitatis nomine, quam uel maximè dentes requirunt. Et lib. II. de aliment. facultatibus: Insuper (inquit) asparagorum alius regius in hortis nascens, alius æneus id est, palustris appellatur, ceteri alius ab ijs, qui à bryonia oritur. Omnes asparagi

Pomacho utiles sunt, urinam cient, & parum præbent nutrimenti. Si tamen ij probe concoquantur, olerum asparagis magis alunt, nimirum quanto illis sunt sicciores. hæc Galenus. Asparagi in cibo sumpti, ut scribit Plinius lib. XX. cap. X. oculis claritatem afferunt: pectoris, & spine doloribus prosunt. Venerem stimulant, & mentis moria prodidit Auicenna. Penultima libri quarti, Asparagi in cibis suauis odore corpus totum commendat: uerum urinam foetidam trahunt. Græcis ἀσπαργός, Latinis Asparagus nominatur: Mauritanis, Halion, siue Helionem: Italis, Asparago: Germanis, Spargen: Hispanis, Bsparagos: Gallis, Esparge.

† Licet in Græcis non planè constet, hic altilis, uel satini asparagi mentionem fieri; tamen non uideo, quomodo hæc ad syluestrem quoque referri possint, ut aliqui referenda censent. Cum enim hunc notum esse antea dixisset Dioscorides non aliam, ut solet, eius subiecisset descriptionem. Quo fit, ut hæc potius ad satium referenda putemus, uel saltem mendum subesse suspicemur.

## Plantago.

## Cap. CXIX.

Dvo Plantaginis genera. Minor folia habet angustiora, minora, molliora, læuiora, & tenuiora: cauliculo anguloso, in terram inclinato: floribus pallidis: semine summis caulibus emicante. Altera maior, lætior, uirentiorque, latis constans folijs, oleracei generis: cuius caulis cubiti altitudine pergit, angulosus, subruber, à medio ad uerticem tenui semine circumdatus: radicibus nitidis, teneris, hirsutis, candidis, digitum crassitudine æquantibus. Nascitur in lacunosis, sepibus, & locis humidis. Multò utilior magna est. Vim habent folia exiccatoriam, constringentem. quare omnibus malignis ulceribus, & fluxioni opportunis, atque elephanticis, sordidisque illita profunt: profusa sanguinis, vlcera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, nomasque cohibent: uetera ulcera, & inæqualia cicatrice obducunt: chironia sanant: sinus conglutinant: moribus canis, ambustis igni, inflammationibus, panis, parotidibus, strumis, agilopijs, illita cum sale profunt. Coctum cum aceto, & sale olus, dysentericis, celiacisque, sumptum subuenit. Datur & in locum heræ cum lenticula coctum. & ad aquam intercutem, cui leucophlegmatæ nomen est, datur & herba decocta post aridas epulas, sic ut media antecedit. comitialibus, & suspiriosis data proficit. Foliorum succus, collatus subinde oris ulcera, purgat: cum cimolia, aut cerusa igni sacro medetur: fistulis infusus prodest: lippitudinibus, & aurium doloribus idem succus instillatur. additur quoque in oculorum collyria. gingiuis cruore suffusis, & sanguinis reiectionibus, potu confert: clystere dysentericis infunditur: contrahentem datur in potu: aduersus strangulationes vuluæ, in uellere subiecitur, etiam si uulua fluxione laboraret. Semen ex vino potum alui fluxiones, & sanguinis excreationes sistit. Decocta radix, & collutione



PLANTAGO MAIOR.



PLANTAGO MINOR.



& collutione, dentium dolores sedat: eadem cum folijs, vlceribus renum, & uesicæ in passo datur. Ferunt tres radices, cum tribus uini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quarta nis. Sunt qui radice gestamine, discutendis strumis utantur.

QUANQVAM à Dioscoride, Plinio, Apuleio, alijsq; omnibus antiquis authoribus, duo tantum Plantaginis genera recensentur, maius nimirum, et minus; eam tamen, quam uulgo, quod lanceæ cuspidis formam referat, Lanceolam appellat, esse tertiam quandam Plantaginis speciem, nemo est qui ambigat. Hetruscis plantago Centinuerbia uulgo uocatur, corrupto à Quinqueneruia uocabulo. Maior, eo quod eius folia, quæ latiora sunt, fibris septem tanquam neruis distinguuntur, Septinueruia appellatur. Media, quoniam in eius folijs quinque apparent costæ, Quinqueneruia dicitur. Minima uero, quod eius folia, quæ leuiter hirsuta sunt, tres tantum habeant neruos, Trinueruia dici potest. Plantago (ut scriptum reliquit Galenus lib. VI. simp. medic.) mixta est temperaturæ: habet enim quiddam aqueum frigidum; habet uero & austrium quiddam, id quod terreum est, siccum, frigidum. Itaq; refrigerat simul, et desiccatur, et in utroq; secundi excessus à medijs est. Porro medicamenta, quæ cum hoc quod refrigerant, unâ etiam sicca sunt, ea & ad ulcerum rebellia omnia, & ad fluxiones, & putredines conueniunt, ac proinde & ad dysenterias: nam & sanguinis profluentia sistunt, & si quid aduratur, refrigerant: tum sinus quoq; glutinant, & alia ulcera recentia simul & uetera. In omnibus ferè id genus medicamentis primas tenet, aut certè nulli secunda est plantago, idq; temperaturæ symmetria, et conuenientia. Nam siccitatem obtinet morsus expertem, & frigiditatem, quæ nondum obstupesciat. Semen eius, & radix similis sunt facultatis, nisi quod siccioris, & minus frigide. Sed semen etiam subtilium est partium: radices uero crassiorum. Ipsa autem herbe folia exiccata tenuioris, & minus frigide facultatis sunt: nempe dissilato ex eo, ac digesto excremento aqueo. Hac ratione & radicibus utuntur ad dentium dolores tum mandentes, tum collutionibus ipsorum incoquentes. Præterea ad iccioris, & renum obstructions, non has tantum adhibent; sed folia quoq; et multo magis semina. Hæc enim quandam in se abstergendi facultatem obtinēt: quam & in herba uiridi inesse satis conijci potest, uerum ab humiditatis copia uinci. Herba, quæ Græcis ἀπρόγλωσσον, Latinis Plantago uocatur: Arabibus, Lisen, aut Lefan alhamel: Italis, Piantagine: Germanis, Vuergerich: Hispanis, Lbantem, Tamehagem: Gallicis, Plantain.

Plantaginis consideratio.

Plantaginis vires ex Gal.

Nomina.

Sium, seu Lauer.

Cap. CXX.

Sium in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, folijs latis, olusatro similibus, sed minoribus, & odoratis. Quæ cruda, cocta q; esu, calculos rumpunt, atque excernunt, urinas cient, menses, & partus extrahunt, dysentericis in cibo auxiliantur. De sio Crateuas tradit, herbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem, rotunda, maiora quam mentha, nigra, & ad erucam accedentia.



Sij considera  
tio.

S I V M.

Plinij lapsus.

Sij vires ex  
Galeuo.


Nomina.



SISYMBRIVM HORTENSE.

SIVM in scaturientium fontium riuus, quorum aqua hyeme calent, æstate uerò frigescent, plerumq; nascitur. Ceterum saluntur apertissimè, qui pro Sio herbam Crescione uulgo uocant, tam scilicet dulcem lactucæ similem, quàm acrem, ac subamarum, cui nasturtij sapor, & erucæ folia insunt, in medicamentis usantur. Quippe quòd ea non alia sit planta, quàm sisymbrium aquaticum sequenti capite à Dioscoride descriptum, nò legitimè Sium, quod nostratibus Senensibus uulgo uocatur Gorgolestro. Hoc enim à Dioscoridis Sio nullis prorsus dissidet notis: quandoquidem pinguis est planta, caule recto: folijs latis, in ambitum serratis, oblongis, satro similibus, sed minoribus, & odoratis: floribus candidis: semine corniculis incluso. Rari admodum sunt fontium riuuli, quibus aquaticum sisymbrium innatet, qui Sium etià non habeant. Plinius lib. & cap. xxii. Sium cum aquatico sisymbrio confudisse uidetur: quòd Sio sisymbri aquatici uires assignauerit, nominis foras communitate deceptus. Nam Dioscoridis testimonio, sisymbrium hoc, quod aliqui cardaminam uocant, nonnulli etiam sium appellant. Vnde quòd fortè existinauerit Plinius Sium, & cardaminam uocare, & eandem plantam esse, uni tantum Sio utriusq; facultates reddidit: etsi prius lib. xx. cap. xxii. speciatim de syluestri sisymbrio in riguis proueniente differuerit. Serapio Sium Senacion uocat. Verum senecio Dioscoridi alia est planta, ut lib. iiii. in eius mentione explicabitur. Sij meminit Galenus lib. viii. simp. med. se. inquiring. Sium quantum gustu odoratum est, tantum etiam excocti facientis facultatis est particeps. Digerit autem, & urina mouet, & calculos renu frangit, & menses euocat. Quod Greci Sium, Latini quoq; Sium uocant: Mauritanii, Ror cathabni, & Insanabhanella, seu Hamchanelle: Itali, Sio, & Gorgolestro: Germani, Vuassfermerck: Hispani, Rabacas: Galli, Berle.

SISYMBRIVM AQUATICVM.



SISYMB.



SISYMB. AQV. ALTERVM.

Sisymbrium.

Cap. CXXI.



SISYMBRIVM (alii serpyllum sylvestre uocant) in solo inculto nascitur, menthæ hortensis similitudine, odoratius, latiore folio. Inferitur coronis. Calfaciendi vim habet. contra stillicidia urinæ, calculosque, semen ex uino bibitur: tormina, & singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti, aut temporibus illinuntur. item cōtra uesparum, apumque iētus. Vomitiones potu cohibet.

Alterum sisymbrii genus, aliqui cardaminā, alii sion appellant. Ea herba riguis gaudet, & eiusdem in locis, quibus sion, provenit: quæ ideo nonnullis cardamina nominatur, quod gustu cardamum, id est nasturtium repræsentet. Folia primum rotunda prodeunt, adulta crucæ modo finduntur. Id exalfacit, urinas mouet. crudum estur. Purgat lentigines, cutisq̃ue uitia in facie, noctibus impositum matutinisque detractum.

TAMETSI prodiderit Dioscorides Sisymbrii in solo inculto nasci, Theophrastus tamen lib. VI. cap. VII. de plantarum historia, & lib. V. cap. VIII. de earum causis, satium etiā nū Sisymbrium in hortis reperiri posteritatis memoriæ commēdauit. Quod sanē eam herbā esse crediderim, quæ hodie in omnibus ferē hortis provenit, quam nostrates officinæ Balsamitam, uulgo uerō mentham Romanam, uel crispam appellat. Quippe quod hæc proferat folia circinata, & uulgaris menthæ latiora, crispata tamen: caulem quadrangulum, rubentem, uirentemq̃: & odore, gustuq̃; mentha longē acrior sentiatur. Cuius rei illud etiā, præter assignatas notas, manifestum indicium facit, quod Balsamita hæc facile in mentham degeneret, nisi diligens admodum adhibeatur cultura. Quod libro de plantarum causis paulō antē citato, apertē testatur Theophrastus his uerbis. Sisymbrii nutritio in mentham, uelut prædictis opposita scilicet est, cū ex neglectu eueniat. Fit enim cū quis non excolit, neque curam solitam adhibet, ut radices amplius deducantur, quā in partem uī tota conuersa, debiliior pars superna consistit, odorisq̃; sui nelementiam amittit, quasi ex ambobus illis, germine, atque odore similitudo proveniat. Quippe acritudine exolescente, reliquus odor, quia mollis quidam, remissusq̃; est, proximē ad mentham accedit. Quamobrem transferre sæpenumero iubent, ne istud eueniat. Hæc Sisymbrii causa est. hætenus Theophrastus. Sed equidem non putauerim Dioscoridis Sisymbrium sponte in incultis nascens, cū Theophrasti Sisymbrio conuenire: quin potius alterum ab altero longē dissidere crediderim. Sylvestre enim in Ananienis agro in incultis natum com- pluribus locis uidimus, ac legimus, nullis deficientibus notis illi à Dioscoride tributis, quod mihi quidem satiuo effigie planē reclamare uisum est. Huc alia accedit ratio, qua facile probari potest, sylvestre Sisymbrium à satiuo plurimum differre. Quandoquidem si idem essent, cū Sisymbrium cultura negligentia in mentham degeneret, fieri quidem non posset, ut sylvestre aliter usquam inueniretur, quā in mentham permutatum, cū nulla hominum cultura nascatur. Quo postmodum fieret, ut locus, in quo Sisymbrium primò adoleuisset, breui temporis tractu ubique mentha scateret. quod tamen nusquam hætenus factum reperi. Ceterum Brasanolus, cū hæc fortasse non perpendisset, credidit Balsamitam, quam ipse Florentinam mentham appellat, tam satium, quā sylvestrem Sisymbrium indifferenter explere posse. Qui præterea fatetur se uidisse (quod potius eum oculis sefellisse putauerim) Balsamitam descuiisse in calamintham, Plinium quidem, non Theophrastum secutus. Siquidem Theophrastus in mentham, non in calamintham Sisymbrium desciscere prodidit. Plinij uerò codices nonnulli libro XIX. cap. X. scriptum quidem habent, quod Sisymbrium in calamintham degenerat, quam lectionem accepit Brasanolus: sed ea lectio deprauata censetur. Idcirco factum est, ut ij, qui Plinium castigauerunt, eam restituerint, quod compertum habuerint Plinium ex Theophrasto historiam sumpsisse. Itaque iam eius loci uera, & legitima lectio est, ut in calamintham, non in calamintham Sisymbrium in mentham desciscat, non in calamintham. Sybrium uerò, quod (ut Dioscorides inquit) aliqui Cardaminam, alij Sium appellant, ea nimirum herba est, quā uulgò nostri Crescio ne appellant, acri sapore prædita, de qua etiam diximus in præcedenti capite, de Sio differentes. Siquidem ea in fontium riuus discurrentibus comite Sio nascitur, folijs primo exortu rotundis: cū uerò adoleuerint, eruce modo dissectis: odore, ac sapore satiuo nasturtio proximis. Meminit huius Plinius libro XX. cap. XXII. quāuis libro XIX. cap. VIII. aliud Sisymbrii genus commemoret his uerbis. Sisymbrium simili modo feritur. Ietissimum nascitur in puteorum parietibus, & circa piscinas, & stagna. Hinc quidam existimarunt, Plinium de uulgari menthastro, quod in aquis passim provenit, differuisse. Sisymbrii utriusque mentionem fecit Galenus libro VIII. de simplicium medicamentorum facultate, sic inueniens. Sisymbrium tenuium partium, digerentis, exalfaciens

Sisymbrii cōsideratio.

Sisymbrii in menthā nutritio.

Brasamoli error.

Sisymbrium aquaticum.

Sisymbrii utriusq̃; uires ex Gal.




Nomina.

tis, & exiccantis facultatis est, & temperaturæ in tertio ordine. Sed & semen eius tenuium partium est, & cas-  
lidum. Quocirca ipsum quidam cum uino exhibent singultientibus, & tormina patientibus. Sifymbrium uero, quod  
quidam Cardaminem uocant, quandoquidem cardamo, hoc est, nasturtio simile quiddam gustu præfert, cum sic-  
cum est, tertij est ordinis exalfacientium, & desiccantium: cum humidum, & uiride, secundi. Vt Græci σι-  
σύμβριον, ita etiam Latini Sifymbrium dicunt: Arabes, Sifnabarion, seu Sifnasbar: Itali, Sifembro, & Menta  
Romana: Germani, Vuassermuntz, & Bachmuntz: Hispani, Hierua buena de agua: Galli, Menhe aquatique.  
Quod uero σισύμβριον ἑτερον, Græcis, Sifymbrium alterum Latinis appellatur: Italus, Sifembro aquatico,  
& Crescione: Germanis, Brunkressen, & Vuasserkressen: Hispanis, Berros, & Agriois, Gallis, Cresson.

## CRITHMUM.

## CRITHMI MARINI SPECIES.



Crithmum.



Cap. CXXII.

CRITHMUM, seu, ut aliqui, Crithamon, fruticosa, & undique foliosa herbula est. cubiti al-  
titudinem ferè petens. Nascitur in maritimis, & petrosis: foliis pinguibus, numerosis, albicantibus,  
ueluti portulacæ, latioribus, & longioribus, falso gustu: flores candidi sunt: & semen, ceu rosmari-  
ni, odoratum, molle, rotundum, quod siccatum rumpitur: habet intus tritici modo nucleum: ra-  
dices digiti crassitudine, tres, aut quatuor, grati odoris, & iucundi. Radix, semen, & folia in cocta  
uino, potu urinæ difficultati, & regio morbo auxiliatur: menses ciet. Estur crudum, coctumue in  
oler. seruantur etiam in muria.

Crithmi con-  
sideratio.Quorundam  
lapsus.

NASCITUR Crithmum non modo in omnibus Tyrreni promontorijs, scopulis, ac rupibus, præsertim  
Argentario monte in maritimis nostris seuensibus, & uniuerso circum Italiam litore; sed etiam in Adriatico sinu,  
ubi scopulosa, & prærupta superstant litora: quemadmodum nobis contigit uidere eo tractu per quem à Timauro  
fonte Tergestum nauigatur: nanque inibi illa scopulosa litora crithmo referta sunt. Crithmum Romæ, & in uniuersa  
sa ferè Hetruria Foeniculum marinum dicitur: est in alijs quàm plurimis Italiae locis, ubi à maritimis in hortis, ac  
uiridarijs translatum uirescit, herbam sancti Petri appellitet uulgius. Quo nominis argumento non desunt, qui exis-  
timent, ptantam hanc legitimum esse Empetron, libro IIII. à Dioscoride descriptum inter simplicia medicamen-  
ta, quæ deiectoria pollent facultate. Inter hos inuenio Pandulphum Collinutium in defensionibus Plinij contra  
Leonicenum. qui Empetron corrupto uocabulo Sanpetram herbam uocari putat, nulla habita facultatis, notarumq;  
ratione. Cuius sententiæ maxime refagatur experientia, quod Crithmum, quanquam abunde, copioseq; ingestum,  
nec pituitam, nec bilem, nec aquam intercutem trahit, quemadmodum empetro reddidit Dioscorides. qui propter  
re



rea illud inter ea, quæ aliu deiiciunt, medicamēta locauit. Quomodo autē Empetron quis idem cum herba sancti Petri recte dixerit, si empetron nullis alijs à Dioscoride representatur notis, quàm quòd nascatur in montibus, & mari timis, salso, & amaro sapore? Verum enimvero non modò putandum; sed etiam pro certo, meo quidem iudicio, affirmandum erit, herbam hanc Crithmum esse. Quippe quòd ea notis omnibus, quæ radicibus, folijs, caulibus, ac seminibus, & uniuerse deniq; plantæ tribuit Dioscorides, Crithmū planè referat. Crithami vires recensuit Galenus lib. vi. sim- Crithmi vires ex Gal.  
plicium medicamentorū, his uerbis. Crithmum gustantibus falsum quodammodo est, cum paucula amaritate, quam obrē-  
nis eius est exiccatoria, & abstersoria. Vtraq; tamē imbecillior in eo est, quàm in amaris. Κρίθμον Græci, Crithmū  
item & Crithamum Latini uocant: Itali, Crithano, Finocchio marino, & herba di san Pietro: Germani, Bacilen, &  
Beerschenel: Hispani, Perexil de la mar, & Vnhas de agnula yerua: Gallis, Bacille, & Fenoil marin.

## Coronopus.

## Cap. CXXII.

CORONOPVS oblonga herbula est, per terram strata, fisis folijs. coquitur in olerē. Radicem habet tenuem, adstringentem, quæ in cibo cœliacis facit. Prouenit in aggeribus, & locis incultis, & secus uias.

VARIAS, ac diuersas reperio eorum fuisse sententias, qui non parum laboris, ac studij impenderunt, ut plantarū historiam à mendis omnibus expurgatam pristinae, ac propriae redderent integritati, in inuestigando, quænam inter tot plantas legitimè Coronopus dici possit. Quorum unus extitit Nicolaus Leonicerus uir quidem ingenio, & doctrina præclarus, qui longa uerborum serie hac de re scripsit, conclusitq; tandem, Coronopum eam herbam esse, quam ipse uernacula sua lingua Capriola, nos uerò nostra Sanguinella appellamus, quòd eā pueri æstate naribus indant, ut inde sanguinem eliciant. Verum cum eius sententiā minime probandam existimauerit Manardus Ferrariensis, hac in re magis Dioscoridi addictus, quàm Plinij, ac Theophrasti placitis, qui Coronopum inter aculeata recensent, his magis adstipulandum esse iudicauit, qui uolunt Coronopum Dioscoridi eam esse herbam, quæ uulgò dicitur Herba stellata, omnibus Italiæ hortis uulgaris, ac ad modum frequens, quòd in acetarijs passim usirpetur, quàm ipsi, qui Capriolam, siue Sanguinellam dictam Coronopum esse censent. Quandoquidem hæc uisquam, quòd sciam, in cibis sumitur, sed in brutorum tantum uenit pabulum. Nec desunt præterea, qui firmiter asseuerent, quòd quæ inter plantas uulgò nonnullis Pes coruinus uocatur, aliquibus uerò Pes gallinæus, quæ utitur nonnumquam medici ad exulcerandas corporis particulas, ubi id expostulet necessitas, legitimus sit Coronopus. Inter quos non modò deprehensi sunt commentatores Auicennæ, quos nullam rei herbariæ

Coronopi cōsideratio.

Quorundam opinio damnata.

Leonice opinio reprobata.

Gramen aculeatū Plinii.



peritiam habuisse constat; sed & recentiorum quidam, præsertim ex eorum numero, qui de stirpium historia, & facultatibus scripsere commentarios. Namq; Otho ille Germanus cognomine Brunfelsius, tametsi non ignoraret, eos à probatissimis uiris refelli, qui in hanc uenerunt sententiam: tamen (quæ multorum est pertinacia) maluit cum rei herbariæ imperitis errare, quàm cum doctis, & peritis recte sentire. Quippe Pes coruinus uulgò uocatus (ut in sequentibus suo loco differemus) Coronopus non est, sed proculdubio ranunculus, qui Græcis Κατάρχων appellatur, cuius uariæ Dioscoridi produntur species: inter quas uulgaris Pes coruinus suam retinet sedem. Quòd autem Leonice ni Capriola Coronopus sit Dioscoridis, ego quidem cum Manardo nunquam affirmauerim. Nam & si gerat hæc herba in sui culmi fastigio quinq; ueluti graciles spicas, quæ cum manibus dilatantur, cornicis, uel alterius uolucris formam pedis representat; cum tamen (ut etiam Manardus inquit) in hominum cibum non expetatur, folio exeat nullis incisuris dissecto, non seratur in hortis, & arida tanquam scænum assurgat, nullo pacto asserendum censeo Capriolam esse Coronopum. Ceterum si modò quis in eo Plinii sequi uelit, quòd dixerit lib. xxi. cap. xvi. (quòd tamē ex Theophrasto sumpsit) aculeatarum caules aliquarum per terram serpere, ut eius, quam Coronopum uocant; frustra, meo quidem iudicio, probare contendet, Sanguinellam, siue Capriolam esse Coronopum, quòd eius caulis culmi modo geniculis intersectus, humi minimè repat, sed rectus in altum assurgat, & culmorum in morem spicas ferat. Verum eos non aberrare putauerim, qui dixerint Capriolam hanc aculeatam esse gramen, cuius meminit Plinius lib. xxi. cap. xix. his uerbis. Sunt qui & aculeatum gramen uocant trium generum, cum in cacumine aculei sunt plurimum quini, dactylon uocat. Hos conuolutos naribus inferunt, extrahuntq; sanguinis ciendi gratia. Neq; usquā, quòd equidem legerim, expressit Plinius (ut Ruellius testari uidetur) gramen hoc aculeatum esse coronopum. Illud præterea animaduertere oportet, quòd Dioscorides non scribit Coronopum aculeatam plantam esse, neq; eum inter aculeatas libro tertio recensuit, sed hic inter olera, quæ in ciborum usum ueniunt. Quauis contrarium fecerit Theophrastus, quòd fortasse ad foliorum formā alluserit, qui laciniarū tenuitate coronopo aculeata uidentur; cum tamen pungere non




## CORONOPVS SYLVESTRIS

Coronopi  
sylvestris mē-  
tio, & uires.

Coronopi  
uires ex Gal.

Nomina.



non ualeant, ut cum acanthinis pariter lufit Dioscorides. Quare facile adducor, ut credam, Coronopum tam Theophrasto, quam Dioscoridi idem esse. Ideoq; Plinius libro XXI. Theophrastu fecutus, Coronopum aculeatum facit: libro uero XII. Dioscoridem fortasse imitatus, aculeorum haudquaquam meminit. Sed et illud silendum nō duximus, quod ex illo graminis genere, quo pueri ludentes sanguinem ē naribus eliciunt, Sclauī Carniolae incolae, item Goritienses semen colligunt, deglubuntq; in pilis, & milij, uel pauci modo carniū iure decoquunt, granulis obloquisculis panico minoribus, gustui nō ingratis, adeo ut Germani himelclauu uocent, hoc est, caelestem mannam. Huius plantam Sclauī cornitis pedem appellant. Quo fit, ut quasi certō crediderim, quod Leonicenus ab ijs fortasse doctus, putauerit hanc plantam esse Dioscoridis Coronopum. Qui cum Coronopum scribat spinis nullis rigere seri q; in hortis in ciborū usum, eos nihil falli existimaui, qui nobiscum senserint eam plantam legitimum esse Coronopum, quae uulgō nobis Herba stella uocatur. Nempe nullam hactenus plantam uidi, quae perinde ac illa adamussim Coronopum referat. Inuenitur haec etiam sponte nascens diluto extenuatoq; solo in comitatu Goritienfi, nō longē à Sontij fluminis ripis, & in loco, qui dicitur in collibus. Eam inibi uulgō Serpētina appellat, quod eius radix in uino pota uiperarum, aliorumq; uenenosorum animalium moribus maximē aduersetur, sitq; praecipuum remedium, ita ut ipsa sola quod equidem experientia compertum habeo liberet de morsos. Coronopi uires paucis perstrinxit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Coronopodis radix ceciliis prodesse creditur manducata. Eius nomen Graecum *κρονον*, uetus *κρονος*, item & Latinum Coronopus: Italicum, Coronopo, & herba stella: Germanicum, Kraensfuß: Hispanicum, Guabelba: Gallicum, Capriole.

## SONCHVS ASPERVS.



## SONCHVS LAEVIS.



Sonchus



## Sonchus.

## Cap. CXXIII.

**SONCHI** duo genera. Sylvestrior quidam est, & magis spinis horret. Alter teneritate quadam mollescit, cibus expetitur. Caulē constat anguloso, † inani, interdum rubente: folijs in ambitu per interualla dissectis. Vtriusque uis refrigerat, modicē adstringit. unde æstuanti stomacho, & inflammationibus illiti profunt. Succus eorum stomachi rosiones sorbitione mitigat: lac elicit. in uellere appositus, sedis, ac uulux collectionibus opitulatur. Tam herba, quàm radix illita, uibratis à scorpione ictibus subuenit. Alter sonchus tenerior, arboris instar est, latis constans folijs: caulem in ramis exeuntem folia distinguunt. sed ad eadem pollet.

**SONCHVS** in Hetruria, ubi Latinum nomen adhuc perdurat, Cicerbita uulgo uocatur. Visuntur in hortis, Sonchi confederatio. campis, & uineis duo sonchi genera. Sed tertium illud genus, de quo in fine capituli differuit Dioscorides, non solum non inuenitur in Italia, ubi non recordor me hactenus uidisse plantam, quæ Sonchum arborescentem referat; sed neq; etiam de eo quicquam, quod equidem legerim, memoriæ prodiderunt Theophrastus, & Plinius. Soncho nostri utuntur hyeme in acetarijs, præsertimq; eius radicibus, quæ cum teneræ sint, mansuq; dulces, frequenter mensis expetuntur. Sonchi uires nobis descripsit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, his uerbis. Sonchus ubi adoleuerit, ex spinosis plantis est. Cæterum uiridis etiā muni, & tener estur, perinde ut cætera olera sylvestria. Temperamentum eius quodammodo mistū est: constant enim ex aquea, terreaq; essentia, utraq; leuiter frigida. Nam & adstrictionis cuiusdam est particeps: & siue cataplasinatis in morem illinatur, siue edatur, manifestò refrigerat: postea uerò quàm planè ressecatus fuerit, terrestre eius temperamentum redditur, modicam habens caliditatem. Scyros sic Græce, ut etiam Latine Sonchus appellatur: Italicè, Soncho, & Cicerbita: Germanicè, Vülderhasenhoel, Gens dystel: Hispanicè, Serralha, & Serralha: Gallicè, Lattéron, & Palais an lieure. Hec dictio xeris, quæ uacuum, & inanem significat, hic non legitur in uulgatis Græcis. Sed tamen eam habent uetusti codices, quibus etiam adstipulatur Oribasius. Ergo non erit, ut aliqui putant, ex Plinio duntaxat reposita.

Sonchi uires  
ex Galeno.


## Seris, siue intibus.

## Cap. CXXV.

**SERIS** duum generum est. Altera sylvestris, quæ picris, & cichorion uocatur. Altera satiuā, latioribus folijs conitit, stomacho quàm hortenlis utilior. Quæ iterum in duas species digeritur.

## INTYBVS HORTENSIS.

## INTYBVS HORT. ALTER.



una folio






una folio latiore prodit, lactucarum simillima: altera angustiore est folio, & gustu amara. Vtraque refrigerat, & adstringit, stomacho utilissima: aluum sistit cocta, si cum aceto adsumatur. Sylvestres stomacho meliores: quandoquidem æstuantem ipsum, & quem imbecillitas uexet, cibo leniunt. Cardiacis per se, aut cum polenta, utiliter illinuntur: podagris, & oculorum inflammationibus auxilio sunt. Herba cum radice illita, percussis à scorpione subuenit: igni sacro cum polenta medetur. Succus cum cerusa, & aceto, ualet ad illitus eorum, quæ refrigerationem desiderant.

Seridis, siue  
Intybi, consi-  
deratio.


QUONIAM in Græcis vulgatis codicibus initium istius capituli & in uerbis nonnullis, et in Seridis generibus deprauatum, & confusum legitur; ideo ex libro Oribasij simplicibus dicato, atque etiam ex antiquissimis Dioscoridis codicibus manuscriptis, illud legitime, & ordinatè legendum putamus, hoc modo. Σέρης ἀγρία, καὶ κηπό-  
τά. ὣν ἡ μὲν ἀγρία διόση. ἡ μὲν γὰρ πικρὴ, ἡ καὶ κηπόριον καλεῖται. ἡ δὲ ἡμερὸς πλατυφύλλος, καὶ  
ρα, καὶ φύσσωτότερα τῆς κηπότης. τῆς δὲ κηπότης διπλὸν εἶδος. ἡ μὲν γὰρ ἐστὶ σπιδανωδέσπερα, καὶ  
πλατύφυλλος. ἡ δὲ στενόφυλλος, καὶ ἑμπικρος. id est. Seris sylvestris, & hortensis. Sylvestris quidem du-  
plex: altera picris, quæ & cichorion uocatur: altera satiuā latioribus folijs, & ori gratio, quāni hortensis. Hor-  
tensis uerò duplex genus: una folio latiore, lactucæ similior: altera folio angustiore, & gustu amara. Huic lectio-  
ni maximè adstipulatur Serapio. quippe qui ex Dioscoride tot habeat sylvestris Seridis species, quot domesticæ. Id  
quod etiam ex usu clarissime patet, cum tam satiuā, quā sua sponte nascens Seris quotidie sit præ manibus, & sum-  
tur in cibis. Satiuā quidem ubiq; ferè in Italia in hortis colitur, folio erraticæ ampliore, leuioreq;: ab hortensi aut  
gustifolia Seride non longè dissimilis: quin & ori erraticæ gratio. Ea uerò, quæ sponte provenit, passim ferme uide-  
scit, folijs in ambitu longè magis laciniatis, angustioribus, asperioribus, & amarioribus. Sunt qui pro certo habeant,  
Scariolam à domestica latifolia Seride nihil differre, quòd ita esse comprobet Serapionis scriptura. Alij Scariolam in Se-  
uocant alterā domesticæ speciem, quæ angustiore est folio, & gustu amarior. Sed animaduertendū est, Scariolam in Se-  
rapione, Serapionis non esse, sed interpretis, cui nulla, mea quidem sententia, in hoc fuerit adhibenda fides. Quippe  
cum sciuerit is Scariolam, corrupta à barbaris uoce, nil aliud significare, quā Seriolam, Serimq;: nō aliud esse Græ-  
cis, quā Latinis Intybum, huius genus latifolium (perperam tamen) Scariolam appellauit. Qua in re eorū equidem  
sententiam magis laudauerim, qui angustifoliam Serim, quòd latifolia sit minor, Scariolam, seu potius Seriolam, ac si  
paruā Serim dixeris, uocant: tametsi in sylvestriū quoq; genere, ea etiam Seriola dici possit, quæ passim in hortis colit-  
tur, quòd domesticæ Seriole nō longè sit absimilis. Omnes itaq; in Italia uulgaris sunt notitiæ, quòd nostratibus mēsis  
frequentissimè in acetarijs apponantur. Quamobrem olitores has hyeme terra, & sabulo in hortis obruunt, quoniam  
hos



## DENS LEONIS.




CYANVS MAIOR.



hoc artificio mirum in modum albescunt, & tenerrime euadunt, & in totam asseruantur hyemem, artem hanc à natura docti, quòd uiderint sepius in campestribus Cichorium aquarum inundationibus terra, uel arena obrutum, & tenerrimū, & candidissimum reddi, exuta omni ex parte amaritudine. Verum quauis asserat Dioscorides syluestrem Intybū, quem admodum & satium duorum tantum esse generian; Chondrillam tamen, cuius historiam ipse sub duplici specie sequenti capite describit, inter Cichorij genera esse reponendam, nemo est qui ambigat. Quemadmodum & tertiam illam, quæ Theophrasto lib. VII. cap. XI. de plantarum historia Aphaca uocatur. Hæc enim illi ingustabilis, & amara est: festinanter hæc floret, sed celeriter flos senescit, atq; in pappos euanesceit. Tum alius iterum prouenit, atq; iterum alius, idq; tota hyeme, uereq; toto usq; æstatem factitatur. Flos melini speciem gerit. hæc ille. Huic per omnia in uniuersum respondet, quæ nonnullis DENS LEONIS, alijs Dens caninus, quibusdam Caput monachi, alijs Rostum porcinum, plerisq; uerò Ambubeia nōcatur. Tametsi Plinio Cichorium ipsum propriè Ambugia, uel Ambubeia dicatur. Sed profectò maxima est seplasiariorum multorum negligentia, atq; ignauia, qui cū in hortis numerosissimum, præstantissimūq; habeant Intybū, & in campestribus Cichorium ubiq; frequentissimum, harum plantarum loco modò hieracium, modò syluestrem lactucam suo lacte refertam subiiciunt, atq; ex ijs aquam, quam nomen de Endiuiā mentiri faciunt, suis plumbeis eliciunt organis. Quod maxime detestandum est: nam etsi hieracio, syluestriq; lactucæ uis frigida insit: tamen præterquàm quòd nullam cum iocinere habeant conuenientiam, lac, quo eo potissimum tempore turgent, quibusdam suis partibus calorificum adeò est, ut linguam exurat.

seplasiariorū  
negligentia.

CYANVS MINOR





Cyani men-  
tio.

Intybi, & Ci-  
chorij vires  
ex Galeno.


Nomina.

ac uellicet : quibusdam uerò adeò somnificum, ut non desint, teste infra Dioscoride, qui illud meconio permiscuit. Sunt præterea qui Intybaceo generi herbam adscribant, quæ à flore cyaneo CYANVS Plinio dicitur, alijs quibus uerò uulgo Battifecula, uel Battisuocere, nobis autem fior Campese, quod in campis inter segetes, maio, & iunio mensibus numerosus proueniat. Expetitur hic maximè rusticanis puellis, suis contexendis coronis, quibus æstatem caput & tempora cingunt. Sed quibus notis, quibusue rationibus inter Intybacea annumerari possit, quid dicam, non habeo. Huiusce vires nullus antiquorum, quod sciuerim, scriptis mandauit. quanquam Placentinus, quod ad pestilentes febres maximè commendauit, Cyanum etiam inseruit. Intybi, & Cichorij vires recensuit Galenus libro VIII. simplicium medioamentorum, sic inquit. Intybus olus est subamarum, & magis quod agreste est, quod ob id ipsum picrida, hoc est amarum, quidam nuncupant, quidam uerò Cichorium appellant. Est autem ea secca, frigidaq; temperaturæ, utrunque secundo excessu. Porro domestica magis etiam quàm agrestis refrigerat. Sed humiditatis multe admistio siccitatem extinguit: uerum utraque adstringentis qualitatibus est particeps, uelut & chondrilla: nam & ipsa est seridis, seu intybi species. Et libro VIII. de compositione medicamentorum secundum Galienum: Cichorium, inquit, & Seris cibarij generis existunt: apud nos nauque rurales ambo hæc edunt & cruda, & cocta. Facultas horum olerum subfrigida est, & subamara, ac moderate adstringens: & propter has qualitates, optima pharmaca calidis intemperaturis ipsius hepatis existunt. Ultra hoc enim, quod moderate refrigerant, amplius & robur uisceri addunt per adstrictoriam facultatem: insuperq; conuulsuras osculorum uenarum in sima uisceris parte ad eas, quæ in gibba sunt, extergunt. Neque uerò frigiditas intemperies magnopere lædunt, quemadmodum quæ frigidam humiditatem absque adstrictione, aut amaritudine possident, facere solent. Iuuare etiam uiscus talium olerum substantia potest, etiam si citra serosum, aut aliorum humorum uitiationem intemperies fiat per se, & cum humiditatis cuiuscunque complexu: ex mistura enim mellis humiditatem per urinam educunt. Quapropter citius siccata tusa, qui potioni inspergat, itidem iuuant. Quin & decoctorum decoctum potatum multum commodi affert. Si uerò non calida aliqua intemperies infuset, aut si obturatio quædam sit circa uiscus, magnopere auxiliatur ea uino albo tenui potata cum his, quæ urinam ciunt. Vtilis autem non solum succus ipsorum est tum recens, tum excrucatus; sed & ipsa olera exiccata, tusaq; ac trita potui inspersa, & eorum decoctum in potu acceptum, auxiliatur. Planta, quæ sæpius Græcis, Intybus satius Latinis dicitur: Mauritanis, Dumbebe, Hundebe, seu Endebe; Indis, Endiua: Germanis, Endiuien: Hispanis, Endiua: Gallis, Endiuie. Quæ uerò sæpius Ægyptiæ vocatur, & πικρὴς Græcè, Cichorium Latine uocatur; Italicè, Cichorea: Germanicè, Vweguneiß, & Vwegunartz: Hispanicè, Almerones, & Cichoria: Gallicè, Cichoree.

CHONDRILLA PRIMA.



CHONDRILLA ALTERA.



CHONDRILLA



## Chondrilla.

## Cap. CXXVI.

**CHONDRILLA**, quam aliqui cichorion, alij serin appellant, caulem, flores, & folia habet cichorio similia. qua ex causa nonnulli sylvestris intybi speciem esse pronunciarunt, uerum tenuior tota est. In cuius ramulis, gummi mastiches simillimum, magnitudine fabæ inueniri solet: quod cum myrrha tritum, & linteo appositum, instar oliuæ, sceminarum menses trahit. Tusa cum radicibus herba, adiecto melle, diuiditur in pastillos: qui nitro admisti uutiligines emaculant. Gummi inordinatos pilos replicat. Quod item tenera radix efficit, si intincta succo acis, pilis admouetur: contra vipersas in uino pota proficit. Succus decoctæ, in uino, aut per sese potus, aluum sistit. Aliud habetur chondrillæ genus, folium ferens oblongum, circumrosum, humi sparsum: caulis. & folia concoquendi uim habent. Succus incommodos palpebrarum pilos reflectit. Nascitur in lætis, & cultis.

**NIMIRVM** sylvestris cichorij species Chondrilla est: gracilioribus tamen folijs, caule, floribus, ac semine. Frequentissima hæc non modo in Hetruria; sed etiam in uniuersa Italia in cultis locis, scrobium aggeribus, & secus uias uirescere, ac suo tempore florescere conspicitur: nec minus etiam, quam cichorium, in acetarijs recipitur, quæ uis amarior sit. Visitur & alterum genus huic non longe dissimile, folijs tamen non ita in ambitum laciniatis, nec adeo in mucronem desinentibus. Hæc à lactis ubertate, quo in omni parte, præsertimq; radice redundat, à nostris uulgo Lactiuola uocatur. Rura eam suis acetarijs pro cichorio indifferenter admiscunt. Chondrilla uires scripsit Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum, ubi simul de intybo, & cichorio differuit, nihilq; ei peculiare reddidit, præterquam quod intybi sit species. Veruntamen libro II. de facultatibus alimentorum non sanè intybo, nec cichorio, sed lactuce Chondrillam similem fecit. Huic nomen Græcum *χονδρίλλα*: Latinum, pariter & Italicum Chondrilla: Arabicum, Candarel, Cadaron, seu Amiron: Hispanicum, Leitugas, & Lechugas dentre los planos: Galicum, Lettron.

Chondrillæ  
utriusq; con-  
sideratio.

Nomina.

## Cucurbita.

## Cap. CXXVII.



**CUCURBITA** esui apta. Cruda, trita illitu tumores, & abscessus mitigat. Ramenta eius infantibus contra capitis ardorem, quam syriansi uocant, in sincipite illinuntur: oculorum inflammationes, pudagrasque refrigerant. Succus è ramentis tussis per se, aut cum rosaceo infusus aurium doloribus auxiliatur: adustiones cutis in ardenti febre illitu adiuvat. Totius feruescentiæ, & expressæ succus, cum melle exiguo, & nitro potus, aluum leniter resoluit. Vinum in cucurbitam recentem excavatam, infusum, si mistum sub diuo teneatur, potum aluum læuigabit.

**CUCURBITA** satia, quæ per æstatem in cibum frequentissime uario sumitur apparatus, in triplici censetur genere, nempe longa, rotunda, & sessilis. Sed quanquam Cucurbitæ inter se forma dissimiles habeantur; non tamen propterea uiribus, & natura sibi inuicem repugnant. Siquidem (ut Columella tradit, & Plinius refert libro XIX. cap. V.) forma uaria in cucurbitis arte, & maugonio fieri facile potest. Nam semina, quæ proxima collo fuerint, proceras pariunt: item ab imis, sed non comparandas supradictis: quæ in medio, rotundas: quæ in lateribus, crassas, breuioribus, ac sessilibus, aptissimas quidem ad recipiendum tum uinum, tum oleum; tum alios quoslibet liquores, urceorum, et cadorum uice. Si uero cordi sit, ut fiant corpore uastiores, de media cucurbitæ parte semen inuerso seratur cacumine. Sed diligenter custodiendum est, ne eò mulieres accedant: namq; earum contactu facile elanguescunt incrementa uirentium. tantoq; magis; si eis fluxerint menses: tunc enim solo oculorum intuitu tenellos necant foetus. Quæ autem ad semina seruantur, è primo seligantur prouentu, pendeantq; in sua uite ad hyemem usq;: deinde sublata insolentur, aut ponantur in fumo, donec penitus siccificent: aliter facile earum semina, ascita putredine, depereunt. Amant Cucurbitæ mirum in modum aquas: nam si propè in patens uasculum aqua subijciatur, à quinq; uel sex digitorum intervallo, ante postremum diem

Cucurbitæ  
condetatio.



## CUCURBITA INDICA.

Cucurbitæ  
facultates ex  
Galeno.



Nomina.

idq; ad quēuis excessum ex aquo duci potest. Proinde cucurbita, quantum in se est, humidum, frigidumq; cor-  
pori alimentum præbet, omnium humidorum ciborum ratione; qui scilicet citra adstrictionem tales sunt. Nec  
sanè infelicitè concoquitur, modò non anteuertat corruptio. Nam ea illi solet nonnunquam accidere, cum an-  
uitiosè fuerit præparata, aut prauos humores in uentriculo acervatos offenderit. Est aliquando ob nimiam in co-  
moram: quod alijs quoque omnibus fugacibus, quæ humido sunt temperamento, euenire solet. Nam in uentri-  
culo corrumpuntur & ipsi, ni celeri descensu id mali effugiant. Quemadmodum ergo cucurbita pura, & ut in  
se ipsa est, succum in totum corpus alendi gratia digestum, expertem qualitatis gustabilis obtinet: ita cum alio  
uehementem habenti facultatem fuerit iuncta, faciliè illi adsimilatur; ut si cum sinapi sumatur, succus ex utro-  
que in membra diffusus acris efficietur cum manifesta caliditate. Eadem ratione, si cum salso quopiam effice-  
tur, ceu nonnulli in patinis cum salsamento instruunt, salsum in corpore humorem generabit. Est porro sic præ-  
parata cibus longè suauissimus, si salsamentum ex ponticis illi fuerit, quæ *μύλλα* appellantur. Quòd si cum  
malis cotoneis elixa, decenterq; condita fuerit, succum austerum in distributione habebit præpollentem. Alijs  
autem, uel in sartagine fricta, ut propria permultum humiditatis deponit; ita reliqua eius pars nullam sibi inueni-  
uim adsciscit, uti nec cum in iure simplici paratur. Caterum ob aqueam qualitatem sibi innatam non immerito os-  
rigano iungi gaudet. Quæcunque enim talia sunt, acris, aut acidis, austerisue, aut salis permisceri saporis  
bus postulant, si quis & cum uoluptate ea sumere, & nauseam cupiat euitare. Cucurbita Latinis dicta, *Γρο-  
cis* *κολοκύνθα* *εδωδιος* appellatur: Arabibus, *Haraha*, *Hara*, seu *Charha*: Italis, *Zucca*: Germanis, *Kurbis*:  
Hispanis, *Calabaca*: Gallis, *Vne courge*.

## Cu cumer Satiuus.

## Cap. CXXVIII.

SATIVVS Cucumis aluo, & stomacho perquam utilis habetur: refrigerat, qui corruptionem  
non sentit: uesicæ prodest: olfactu reuocat, quos animus liquerit. Semen modicè urinam mouet:  
cum lacte, aut passo, uesicæ exulcerationibus subuenit, Illita cum uino folia, morsus canum sanant:  
& epinyctidas, cum melle. Peponis caro in cibis, urinam cit: inflammationes oculorum illita  
sedat. Ramenta eius contra adustionem infantium, quam syriasin uocant, sincipiti imponuntur:  
fronti admota oculorum fluxiones auertunt. Succus cum semine, adiecta farina, siccatus in sole  
cogitur in smegmata, quæ faciem repugant, & nitorem afferunt. Radix sicca, & ex hydromelic  
pota, drachmæ pondere, uomitionem mouet. Si quisquam moderatè secundum cœnam uomere  
cupiat,



CUCUMERES.

MELONES.



ANGVRIÆ.



cupiat, geminis obolis sit contentus. Sanat quoque illita cum melle, ulcera concreta in modum faui, quæ ceria uocant.

QUANQVAM Græci (ut Galenus est auctor libro II. de alimentorum facultatibus) omnia tam Cucumerum, quàm Melopeponum genera Pepona nominant: tamen σίκκος nomine, quo præfens caput inscribitur à Dioscoride, id tantum omnes ferè comprehendi uolunt, quod Latinis cucumis appellatur. Verum non ob id plane decerni potest, an hic reddat Dioscorides nostratis Hetrusci Cucumeris uires, qui alijs Italiae populis Anguria uulgò nūcupatur, an alterius, qui propriè Insubribus, et Venetis Cucumis dicitur, Hetrusci uerò Citrus, omnibus notissimus. Siquidem non ex Dioscoride, sed nec ex alijs ueteribus hætenus quenquam reperi, qui Cucumis Græcis propriè σίκκος appellatus, notis ullis representet. Sed quòd Græci σίκκος uocabulo nostratem Citrulum, & Insubrium Cucumerem significent, facile conijci potest ex ipso Dioscoride. Quippe qui lib. III. Cucumerem sylvestrem asserat fructu solo, quem oblongis glandibus non dissimilem parit, a satiuo dissidere, cum alijs folijs, floribus, ac sarmentis satiuum prorsus referat. Verum cum huic ille per omnia respondeat, quem nos Citrulum, alij uerò Cucumerem dicunt, non possum non liberè pronunciare, Dioscoridem hic citruli nobis uocati, non autem anguriæ uires descripsisse.

Quamobrem hac in historia apertè hallucinari Brasauolum putamus, quòd procul dubio existimauerit, ueteres Græcos, præsertimq; Dioscoridem, σίκκος appellatione anguriam, uel Hetruscorum cucumim representasse. Quandoquidem assignatis iam rationibus accedit & Plinij auctoritas, qui lib. XIX. cap. V. Cucumeres, ait, in Italia uirides, & quàm minimi: in prouincijs

Cucumeris  
consideratio.

Brasauoli lapsus.



Peponum, &  
melopeponū  
consideratio.

Fuchij error.

Cucumeris  
uires ex Gal.

peponum ui-  
res ex Gal.

Melopeponū  
facultates ex  
Galeno.

quàm maximi, & citrini, aut nigri, Placent copiosissimi Aphricæ, grandissimi Mæsiæ. Viuunt hausti in stomacho in posterum diem. Quod proprium est citruli nobis uocati, non autem anguriæ uulgò Insulibribus appellatæ. Anguriæ enim in Italia in magnam extuberant molem, & cum aquæ sint substantiæ, ac prædulces, quæ maturitas tem sensere, ingestæ faciliè à uentriculo labuntur. Quod nostratibus citrulis, & Insulibrium cucumeribus non evenit. Nam cum glutinoso, frigidoq; succo referti sint, ob idq; concoctu perquam contumaces habeantur, non nisi post longum tempus à uentriculo descendunt. Ad hæc (ut citato loco subdit Plinius) Cucumeres, in fistula fistula denisso, mira longitudine crescunt. Atque iidem in tantum odere oleum, ut si è uite pendentibus uas olei subiciatur, adeò refugiunt, ut in hamum curuentur. quod angurijs, quæ sphericam formam referunt, minime eninire posse comperio. Videnus præterea Citrulos nostrates adhuc florentes in fistulas coniectos mira longitudine creuisse. E quorum semine qui postmodum orti sunt, eandem retinuerunt formam, adeò ut in uite pendentibus angurium modo contorti uiderentur. Seruantur Cucumeres (ut Plinius auctor est) usque ad alios penè prouentus, & id quidem non solam muria fit, sed & scrobe opaco in loco arena substrato, sænoq; sicco opertos, ac deinde terra obrutos: ita enim uirides seruari tradunt. Quid autem ueteribus fuerint, quidue nobis sint Pepones, & Melopepones, non equidem faciliè ausim decernere: etsi non desint, qui dicant Melopepones Galeno libro 11. de alimentorum facultatibus, communis nostros Melones esse: Pepones uerò, quos in eo genere Veneti inclisum inde uoce uulgò Pipone uocant. Verum cum uero cum asserat Galenus, quod pars intima carni semen inclisum tangens, cum in Peponibus edendo non sit, in Melopeponibus passim ab hominibus manditur, mihi animum adeò dubium reddit, ut aliquid in hac re certi statuere nequeam, neque inuenire possim, quid Pepones, & Melopepones Galeno extiterint. Quippe quoniam utriusque generis, tam scilicet Peponum, quàm Melopeponum, carnes pars semen continens estur, & non estur, prout fructus ij, plus, minusue maturitatis fuerint adepti: nam utriusque, cum ultimam senserint maturitatem, id suprema carnis unà cum seminibus in medium fructus concidit: quod cum euandidum, & insuauere reperiatur, nusquam comeditur. Quod tamen utrisque minus maturis, non evenit: eaq; propter extractis prius seminibus estur tota eorum caro. Hæc igitur tametsi me (ut dixi) dubium reddant; inclinat tamen animus ad credendam, per Melopepones Galenum nostrates Melones intellexisse, si modò ipse eorum unquam habuit notitiam. Sed quid per Pepones intellexeris, nihil prorsus (ut ingenue fatear) quod proferam, huius etenim non habeo. Veruntamen cum illis mihi non faciliè conuenit, qui Venetas Piponas dictas Galeno Pepones ipse existimant. Minus adhuc illis assentior, qui Pepones Angurias esse dicunt. Namq; Serapio cum primum ex Galeni auctoritate de Peponibus, & Melopeponibus differuisset, dein peculiare de Anguria caput fecit, quam Arabicæ lingua Dullaha nuncupauit. In cuius reddendis uiribus nullum affert Græcorum testimonium, sed tantum ipsius gentis auctoritatibus innititur. Hinc faciliè adducor, ut credam angurias ueteribus Græcis penitus ignatas fuisse. Eas equidem nunquam uidisse, uel non cognouisse demonstrat Fuchsius medicus clarissimus. quippe qui suis de stirpium historia commentarijs non sine inago errore putat cucumeres, quos citrulos Hetrusei uocant, angurias esse. Nam etsi Hetruria angurias uocet cucumeres, non tamen contra cucumeres uulgares uocat angurias, ut perperam, meo quidem iudicio, Fuchsius & intellexisse, & scriptis mandasse uidetur. Cucumeris uires memoria prodidit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, his uerbis. Cucumis esculentus maturus quidem tenuioris essentia est, qui uerò immaturus est, crassioris. Sed & abstergendi, & incidendi facultate participant. quare & urinam mouent, & corpus splendidum reddunt: ac magis quoque si quis semine arefacto, confusq; atque cribrato, uice pulueris absterforij utatur. Superat in eis humida, frigidaq; temperies, non tamen magnopere, sed quasi in secundo censetur ordine. Attamen si quis aut semen, aut radicem arefaciat, haud etiam humida fuerit naturæ, sed iam desiccantis, idq; in primo quodammodo ordine, aut etiam in secundo incipiente. Est & in istis maior abstergendi facultas, quàm in fructu ipsius carne. Et libro 11. de alimentorum facultatibus idem de Cucumeribus ita scribit. Urinam quidem & ipsi, quemadmodum pepones, ciant, sed minus quàm illi, quod ipsorum substantia minus est humida: ideoq; non facile, ut illi, in uentriculo corrumpuntur. Ergo quibus cucumeres bene concoquere datum est, dum in hoc fisti, intrepide, affatinq; ijs se explent, longi temporis tractu, gelidum, & ut unque crassum humorem in uenis aceruari contingit, qui per eam, qua uenæ funguntur, concoctionem, haud facile in probum sanguinem potest conueri. Proinde omnibus prauis succi edulij, quantumuis in uenis nonnullis conficiantur, abstinere in totum consuluerim. Clam enim sensimq; post longum tempus prauus in uenis succus ex ipsis suggeritur, atque accumulatur: qui uel leuicula putredinis arrepta occasione, febres sauisimas & mirè contumaces excitabit. Et paulò antea, de Peponibus scribens: Vniuersa (inquit) peponum natura ex gelidior cum larga humiditate existit: habent & quandam abstergendi uim: ideoq; urinam ciant, & deorsum expeditius, quàm cucurbita, & melopepones rapiuntur. Quod porro abstergeant, discere licet sordidam cutem albos fricando. Quamobrem etiam maculas calore solis factas, & lentes faciem occupantes, atque in superficie etiam extergere possunt. Sed semen, quod in eorum ueluti carne continetur, ad hoc efficacius, adeò ut renibus etiam calculo infestis sit accommodatum. Gignit pepo in corpore uitiosum humorem, potissimum quando non probè concoctum fuerit. Tum uerò morbum etiam, qui cholera dicitur, inducere consuevit. Etenim priusquàm ad corruptionem peruenit, uomitioni quoque idoneus est: largiusq; ingestus, nisi quis aliquid eorum, quæ probi sunt succi, supermandat, omnino uomitum concitabit. Et de Melopeponibus agens: Melopepones (ait) & minus humidi quàm pepones sunt, nec adeò prauis succi: minus item urinam prouocant, tardiusq; deorsum descendunt. Ad uomitum uerò excitandum non eandem uim peponibus obtinent, sicut nec celeriter adeò ut illi in uentriculo corrumpuntur, cum prauus humor in eo collectus fuerit, aut alia quæpiam corruptionis causa ipsum tamen ei.




tu pepones, officiunt. *Σίκυς ἡ πεπὸς* Græca uoce, Cucumer satiuus Latina uocatur: Arabica, Chathe, seu Chetha: Italica, Cocomero, & Cedruolo: Germanica, Cucumeru: Hispanica, Cogombro: Gallica, Cocombre. At *σίκυς* Græcis, Pepon item Latinis appellatur: Mauritanis Batheca, seu Bathiech: Italis, Mellone: Germanis, Pfeben, & Melaon: Hispanis, Melon: Gallis, Melons. Anguria ita & Latine, & Italice nominatur: Arabice, Dullah: Germanice, Gurchen: Hispanice, Cogombro: Gallice, Cogombre.

## LACTVCA CRISPA.

## LACTVCA FLORIDA.



Lactuca.



Cap. CXXIX.

LACTVCAE satiuæ, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho gratæ habentur, somnum conciliant, aluum emolliunt, lac euocant: uerum decoctæ magis alunt. Stomachicis illotas esse prodest. Epotum semen, assiduas libidinum imaginationes in somno compescit, & ueneri refragatur. Ipsæ uerò frequentiores in cibo, claritati oculorum officiunt: inflammationibus, & ignibus sacris opitulantur. Muria condiuntur. Cum in caulem exierunt, vim quandam nanciscuntur succo, aut lacti syluestris lactuæ similem.

## Lactuca syluestris.

## Cap. CXXX.

SYLVESTRIS Lactuca satiuæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & asperiora. Amaro gustu est. & uiribus aliquantum papaueri similis, unde lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per aluum elicit, potus in aceto mulso succus ad duos obolos: argema, caliginemque repurgat: contra adustiones efficaciter illinitur, cum lacte mulierum. In summa somnum allicit, doloris leuamentum præstat, menses trahit: contra scorpionum, & phalangiorum ictus bibitur. Semen non aliter quam satiuæ libidinum imaginationes in somno amolitur, ac uenerem arcet. Succus ad eadem ualet, sed uiribus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius, antea, ut in alijs liquaminibus moris est, insolutum.

LACTVCA satiuæ herbarum ferè omnium uulgò notissima est. Cuius est plura, ac diuersa in Italia reperiantur genera, ut in hortis, & olitorijs foris æstate tota conspici potest; non ob id tamen existimandum est, quod ea uiribus, & facultatibus inter se differant: quanquam non negauerim ego, alteram alteri in cibi præstare. Eam siquidem, quæ conglobatis in orbem folijs crispâ, tenerâque inuenitur, quis neget maiorem cum palato inire gratiam, quam

Lactuæ consideratio.



## LACTUCA SYLVESTRIS.

Lactuca sylvestris.

Lactucæ vires ex Gal.



quæ dura, patula, ac lactescens habetur? Sylvestris in campis sribus nascens, facile dignoscitur, quod caule, floribus, semine, & folio satiuam iam flores, & semina proferentem æmuletur: uerum gustu amara est, & lacte copiosiore referta. Memini huius Theophrastus libro VII. cap. VI. de plantarum historia, se inquit. Sylvestris lactuca folio breuior, quam satiuam est, idque consummatum aculeatur, & caule simili modo breuior perficitur: succum acrem, ac medicatum habet. Nascitur in aruis. Lac eius extrahunt per messem tritici, & purgare aquam intercutem dicunt, & caliginem arcere ab oculis, & argenti auferre, cum lacte mulieris. Satiua (ut memorie scriptum reliquit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum) humidum est, frigidumque olus, non tamen extremè (siquidem edendo non foret) uerum maxime secundum aquæ, ut sic dicam, fontanæ frigiditatem: proinde ad calidas phlegmonas accommodum est, & ad parua, & leuia erysipelata: non tam maioribus satisfacere idonea est. Est etiam edulium stim arcens. At semen potu genitura profluuium cohibet: quomobrem etiam ijs, qui libidinis somnijs uexantur, datur. Sic & agrestis lactucæ semen. Cuius quoque colligitur succus, argema, & caliginem expurgas: ad adustiones etiam cum lacte mulierum iungitur. Et libro II. de alimentorum facultatibus: Plerique medicorum (inquit) reliquis omnibus hoc olus, ceu ficius autumnalibus fructibus, prætulerunt. Nam inter ipsa aliud melioris succi non inuenias. Quod porro nonnulli uitio uerterunt, id in præcipuam ei laudem cedit: & si ita se re uera haberet, non modo nulli olerum, sed ne optimi quidem succi, ac maximi nutrimenti edulij esset secundum. nempe sanguinem aiunt lactucam generare. Quidam non simpliciter sanguinem dicunt, sed multum addunt, multum sanguinem lactucam generare affirmantes. Verum si tu metis prudenter obijciant, longius tamen alijs à uero absint, quam hoc ipsum, puta multum sanguinem procreare, non est quod

merito quis damnet. Constat enim huiusmodi edulium laudatissimi succi censendum esse, quod plurimum quidem sanguinis, aliorum uero succorum nullum producere sit comparatum. Si uero, quia permultum est lactuca sanguinis congestum, idcirco damnamus eam censeant, facillimè huic malo occurri potest: quippe cum uescientibus, & liberalius exerceri, & ea parcius uti integri sunt. Hæc ergo aduersus eos, qui olus hoc non rectè uituperant, dixisse sufficiat. Illud porro nouisse conuenit, omnibus alijs oleribus paucissimum sanguinem, & uitiosum generantibus, ex sola lactuca non multum quidem, nec uitiosum, haud tamen omni ex parte laudabilem gigni. Ut plurimum quidem cruda ipsa uescuntur. Aestate autem, cum in semen iam proruptura est, in aqua dulci præcoquentes, cum oleo, garo, & aceto assunt, aut cum aliquo ex condimentis, obsonijs uic, præsertim ijs, quæ caseo constant. Plerique etiam antiquam excusant, lescat, in aqua elixa utuntur: ut ego iam facio, ex quo dentes mihi deteriores esse coeperunt. Nam amicus quidam meus, cum olere hoc à longo tempore me ut familiari cibo usum fuisse sciret, uideretque post mandata me citra magnam molestiam non posse, cocturæ rationem indicauit. Etenim in iuuentute, quoniam assiduo os uentriculi bile efferebat, astus moderandi gratia lactucæ utebar. Cum autem ad prouectam ætatem peruenissem, olus hoc contra quam in iuuentute, somnum iam studio, & industria accersenti mihi, auxilio fuit. Quippe qui etiam iuuenis lucubranda gratia uigilijs dedita opera me assuefeceram, declinante iam ætate, ipsa ex se in somnum, grauius hoc incommodum molestabar. Aduersus quod unicuique mihi præsentissimum remedium lactuca uespere commanducata semper fuit. Lactuca sic Latini, σπινάρη Græcis appellatur: Mauritanis, Cherbas, seu Chas: Italis, Lattuca: Germanis, Lactuck: Hispanis, Lechuga, aut Alfalfa: Gallis, Lactue.

Nomina.

## Gingidium.

## Cap. CXXXI.


GINGIDIVM, aliqui lepidion, in Syria, & Cilicia plurimum nascitur. Herbula est sylvestris pastinacæ similis, tenuior, & amarior: radice parua, candicante, subamara. Olus hoc crudum, coctum, conditumue estur, magna stomachi utilitate: urinam cit. Decoctum ex uino potum uelice prodest.

Gingidij consideratio.

Huiusce sententia esse comperiuntur Ruellius, & Fuchsius uiri clarissimi (licet ille non plane ad stipulem tur) necnon etiam recentiorum alij, qui stirpium cognitionem profitentur, in hoc consentiunt, quod Gingidium ea sit herba, quam nos uulgo Cerofolio uocamus, illi uero Cherefolium. Veruntamen cum hæc radice nitatur, quæ nihil amara sentitur, sed potius aeris, & odorata, quemadmodum & folia; idcirco eorum opinionem non equidem (ut dicam quod sentio) probandam putauerim. Quinimò crediderim uel Gingidium hætenus in Italia non esse repperitum, uel inibi



## CHAEREFOLIUM.



inibi facile non oriri: præsertim cum Dioscorides, & Plinius asse-  
rere uideantur, peculiare olus esse Gingidium tam Syriæ, quam  
Ciliciæ hortis. Meminit Gingidij Galenus libro v. simplicium  
medicamentorum his uerbis. Gingidiū sicut gustu amaritudinem,  
& adstrictionem præfert, sic temperamento quoq; ipso calidita-  
tem, & frigiditatem. Secundum uero utraq; qualitatem desicca-  
torium est. Sed enim stomacho amicum est, utpote non paruum  
obtinens adstrictionem. Quamobrem non admodum conspicuam  
caliditatem possidet: secundo autem recessu desiccatur. Et lib. 11.  
de alimentorum facultatibus, sic inquit. Plurimum in Syria Gin-  
gidium nascitur: esturg; similiter ac scandix apud nos. Stomacho  
mirè utile siue crudum, siue elixum libeat sumere: longioris au-  
tem decoctionis impatiens est. Nonnulli ipsum cum oleo, & ga-  
ro mandunt. Alij uinum etiam, aut acetum adijciunt, ac multo  
magis ita stomachum inuat. Cum aceto sumptū fastidiosos ad ci-  
bum inuitat. Perspicuum uero est, quod hæc herba medicamen-  
tum potius est, quam alimentum. Quippe quæ adstrictionis, &  
amaritudinis non obscuræ, nec exiguæ particeps est. hæc Galenus.  
Ex quibus facile comprobari potest, Chærefolium non esse Gingi-  
dium, quod in ipso ex amaroris, & adstrictionis qualitates gustu  
haud manifestæ deprehendantur. Quod Græcis γινγίδιον, La-  
tini similiter Gingidium uocant: Itali, Gingidio: Germani, Ko-  
erffel, & Kerbelkraut: Galli, Cersueil.

Gingidij ui-  
res ex Gal.

Nomina.

## Scandix.

## Cap. CXXXII.

SCANDIX, syluestre olus est, amarum, subacre:  
quod crudum, coctūue manditur: stomacho, & uentri  
utile. Decoctū potu, uesicæ, renibus, & iccinori confert.

QUANQVAM Scandix antiquis rei herbariæ scriptori-  
bus stirps fuit notissima, ut quæ ab ijs in frequenti ciborum usu haberetur alijs admista oleribus; cum tamen hæctenus  
eorum reperiri neminem, cui fides sit adhibenda, qui Scandicē notis aliquibus, uel lineamentis descriperit, uesci-  
uerim profecto quoniam pacto, quæue ratione affirmari possit & in Italia Scandicem nasci, & pariter dignosci à com-  
pluribus. Caterum scribit Hermolaus uir doctissimus, & in stirpium historia omnium suæ ætatis facile primus, se ui-  
disse Scandicem in exemplari Græco Dioscoridis appictam folijs fœniculo proximis, floribus luteis, siue albis, cor-  
nuculis caule summo emergentibus. Hanc ipsam nos quoq; sæpius uidimus maio, & iunio mensibus inter segete, præ-  
sertim; in agrorum marginibus. Sed quamuis tradiderit Hermolaus eam fœniculi folijs effurgere, mihi tamen magis  
sumariam, & quadantenus anthemidem referre uidetur, quam fœniculum. Flores gerit hæc chærefolio proximos,  
albicantesq; e quibus tandem prodeunt cornicula tenuia, longiuscula, recta, acuminata, acubus, quæ in geranio  
emican, non dissimilia, quemadmodum & in chærefolio uisuntur, licet huic longè tenuiora, & fragiliora innascent-  
tur. Quo fit, ut rectè intuentibus specie tantum, non autem genere differre hæc plantæ haud dubiè appareant: id quod  
etiam indicat eorum sapor. Quamobrem qui chærefolium scripserunt esse gingidium, id non sine ratione fecerunt.  
Cum enim certò crederent, hanc, de qua in præsentia differimus, plantam legitimam esse Scandicem, facile etiam  
hinc persuaderi potuerunt, ut assererent chærefolium esse gingidium. quoniam Dioscorides consuevit stirpes per co-  
gnationes describere. Quapropter in eorum sanè irem sententiam, si hæc, quam Scandicem putant, tantum acrimo-  
niam, & amaroris gustantibus relinqueret, quantum in Scandice ueteres inueniri prodiderunt. Verum cum eas non  
obscuras quidem qualitates, quas ueteres uere Scandici assignant, in hac, ut ita dicam, noua Scandice nunquam ego  
repererim, sicuti nec in chærefolio, quæ ueteribus gingidio tribuntur, cogor omnino eorum sententiæ refragari, &  
ab ipsis dissentire. Quapropter nisi regionis, & climatis ratione, & locorum mutatione cueniat, ut hæc stirpes omnem  
tum acrimoniam, tum amarorem exuerint, non facile quidem adduci potero, ut credam harum alteram gingidium,  
alteram uero Scandicem esse. Neq; ab hac mea me deterret opinione Hermolaus, quod uiderit is Scandicem hanc in  
Græco Dioscoridis codice appictam: quippe cum inter omnes rei herbariæ scriptores nullus, quod equidem sciam,  
reperiatur, qui per notas aliquas Scandicem descriperit, nesciuerim ego quanam historia, & ratione fretus aliquis  
unquam illam picturam expresse- rit. nisi fortasse Dioscorides ipse manu propria eo in libro ipsam appinxerit. Plinius  
Scandicem anthriscu similem reddidit. Sed cum ignotum per ignotius descriperit, nihil nobis luminis his in tenebris  
effert. Scandicem commemorat Galenus lib. VIII. simp. medicamentorum his uerbis. Scandix ex agrestium ole-  
rum genere est, subacre, & amarum, adeo ut in siccando, & excoalsaciendo secundi sit ordinis intensi. Urinam ualen-  
ter ciet, & uiscera obstructione liberat, ex dictis qualitatibus constans. hæc Galenus. ex quibus etiam manifestè col-  
ligi potest, plantam, quam pro Scandice accepit Hermolaus, quamq; pro eadem pleriq; recentium herbariorum hodie  
ostendunt, nullo pacto legitimam esse Scandicem. Quandoquidem ea non tantam acrimoniam, nec amaritudinem gu-  
stus

Scandicis co-  
sideratio.Scandicis ui-  
res ex Gal.



## PECTEN VENERIS.

stui representat, ut dici possit primum caliditatis, & siccitatis, gradum excedere. Caterum si ulla est planta, cui hæc comparari possit, eam admodum mihi quidem referre uidetur, quam Plinius lib. XXI. cap. XIX. à pectinum similitudine, VENERIS pecten appellat. Siquidem hæc radice nititur candida, cauliculis semipede maioribus: folijs sylvestris pastinacæ, uel ferè anthemidis, exilibus: floribus albis, tenuibus, emicantibus summatum ab eodem capitello compluribus acuminatis rostellis, inter se disinctis, quæ pectines planè referuntur, quibus linum mulieres concunant. Quæ certè omnia reperiuntur in hac uulgari Scandice. Quæ herba οὐράρις Græcè, Latine Scandix similiter nominatur: Italice, Scandice.

## Caucalis.

## Cap. CXXXIII.

CAUCALIS, quam alij sylvestre daucum vocant, cauliculo est dodrantali, aut maiore, subhirsuto: folijs apio similibus, fœniculi modo per extrema multifidis, hispidisque: candida in cacumine umbella, suauiter olète. Crudum, coctumue olerum modo estur: urinam mouet.

VISITVR Caulis in Hetruriæ campestribus, inculto præsertim solo, ut & Ananiensi tractu in Tridentino agro, multis reclamantibus notis. Rura nostra hanc Petrosello saluatico uulgò appellant. Quippe quòd folia, quæ per ima prope radicem exeunt, apium quadantenus effigie referant, quod uulgò Petrosello dicunt. Et si quæ superiore parte prodeunt, per ambitum sit fœniculi modo capillamentis diuisa. Caulem mittit pastinacæ: in cuius cacumine umbellam gerit floribus candicantem, odoratum, dauco non absimilem. Quapropter Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum, ita de ea scriptum reliquit. Caulidem quidam daucum sylvestrem nuncupant: est enim ei adsimilis gustus simul ac uiribus. Nam excoquitur ut ille, & desiccatur, urinam ei et muria ad repositionem conditur. Vt Græcis καυκαλίδης, ita etiam Latinis Caulalis appellatur: Italis, Caulalide.

## Eruca.

## Cap. CXXXIII.

CRUDA ERUCA uenerem largiore cibo concitatur. Semen eius idem præstat, urinam cit, Concoctioni prodest, aluo perquam accommodata. Semine ad concoctionem menta utuntur: quod, uti in longum tempus asseruerunt, adiecto lacte, aut aceto, digerunt in pastillos. Cignitur etiamnum sylvestris eruca, maximè in Iberia, quæ occidentem spectat. Cuius semine pro sinapi incole utuntur. Urinam uehementius pellit, & multò satius acrior.

VULGARIS admodum planta est Eruca tam satius, quam sponte nascens, quòd frequentissime in cœnis acetarijs inseratur. Excoquitur olus hoc (ut testatur Galenus libro II. de alimentorum facultatibus) perquam manifestè, adeo ut non facile solum absque iunctis lactuca folijs edatur: nam ita iumodico calori par frigus admistum excessum temperat. Quinetiam genitale semen augere creditur, & in uenerem stimulos addere. Caput etiam magis dolore afficiet, si solum edatur. Semen (ut scribunt antiquorum nonnulli) muris aranei morsibus medetur. Ventris tineas enecat, lienemque extenuat. Tritum, & cū felle bubulo mistum, nigras uulgarum cicatrices ad candorem reducit. Cum melle uerò perunctum, uitia cutis in facie emendat, & lenigines emaculat. Herba, quæ Græcis ῥούγον, Latinis Eruca uocatur: Mauritanis, Iergit, Ergit, seu Giargit: Italis, Ruchetta, & Rucula: Germanis, Vueszsenff: Hispanis, Oruga, & Arugua: Gallis, Roquette.

Nomina.

Caucalidis consideratio.

Caucalidis uires ex Gal.

Nomina.

Eruca consideratio, &amp; uires.






ERVCA SATIVA.

| ERVCA SYLVESTRIS.



OCIMVM MAGNVN.

OCIMVM PARVVM.





**O C I M V M** uulgò cognitum. Id copiosiore cibo oculorum aciem hebetat, alium mollit, spiritum mouet, urinam pellit, lac cuocat: agrè tamen conficitur. Illitum cum poline polentæ, aceto, & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est. Draconis marini, & scorpionis ictibus per se prodest: & cum uino Chio, oculorum doloribus. Succus uisus caliginem abstergit: destillationes excusat. Semen potum conuenit atram bilem pigmentibus, difficili urinæ, inflatisque: naribus haustum, subinde mouet sternutamenta. quod idem herba efficit. Sed oculos premi necesse est, cum sternutamentum urget. Sunt qui in cibis abdicandum censeant: quandoquidem manducatum, & in sole positum uermiculos creat. Aphri autem adiungunt, si feriantur à scorpione, qui ocimum ederint, nullo conflictari dolore.

Ocimi confideratio.

**O C I M V M** quemadmodum odoratissimum, ita & omnibus notissimum est. Namque perrare sunt ubique; adium fenestra, perraræque cœnacula, ac uiridaria, quæ Ocimo non redoleant, utpote quod frequens feratur, & foueatur in fylidinis uasis. In Italia hoc duo Ocimi tria habentur genera. Quorum primum folijs assurgit amaranto longè maioribus, latis, longis, ac crassis, citriæ malo similibus, à quorum effigie ipsum facile uocarunt Arabes Ocimum citratum, quo modo ipsum Mesues nominat. Secundum folijs exit, ac ramulis, dicto longè minoribus. Tertium, quod folijs constet minutis atque angustis, sitque cæteris odore fragrantius, Italis uulgò appellatur Basilico gentile. Horum omnium meminuit Serapio, uocauitque medium hic à Dioscoride descriptum, Ocimum non garyophyllatum: garyophyllatum uero, quod cæteris tum minutius, tum odoratius habetur. Denique illud Citratum à foliorum similitudine nuncupauit, quod citri folijs æmulum esse diximus, ut facile omnibus perspicuum esse potest, qui Serapionis monumenta perlegerint de Ocimo differentis. Idcirco uideant quæso patres illi reuerendi, qui in Mesuem commentarios scripserunt, quo iure, quæue ratione in electuario de geminis se iactent Ocimum garyophyllatum hac tempestate primos adinuenisse, cum hoc Serapioni folijs exeat paruis, & caule quadrangulati: monachis uero folijs melissophyllo maioribus, per ambitum serratis, & caule minimè anguloso. Quæ in re eos, pace sua, apertè hallucinatos putauerim. Nec equidem credendum arbitror, quod de alio ocimi genere intellexerit Mesues, quam de tertio illo genere in delicijs habito, de quo diximus. Nam cum cæteris odoris fragrantia longè præstet, nulli dubium est, quin in reborandis cordis afflictijs, cæteris sit longè aptius, atque etiam præstantius, ut quod in electuariis de geminis addatur ad cordis affectus.

Monachorum iactantia.

Braſauoli lapsus.

Scribit Braſauolus suo de simplicium exanine Romæ primum excuso libro, tantum de ocimi uiribus inter Plinium & Dioscoridem esse controuersiam, ut alterum ipsorum errasse dicendum sit. Quippe ex Aphris tradit Dioscorides, quod si à scorpione feriantur, qui ocimum ederint, nullo dolore afficiuntur. Contra uero Plinius, qui libro xxi. cap. xx. si eo die, inquit, feriat quissiam à scorpione, quo ederit ocimum, seruari non posse. Quæ in re lectio in patiens deprehenditur Braſauolus: quandoquidem si eo loco Plinium de Ocimo differentem, patienter perlegisset, cognouisset utique, quam rectè Plinius ipse hanc dirimat controuersiam, ijsque respondeat, qui ocimum accusant, cum inquit. Ocimum quoque Chrysippus acriter increpuit, inutile esse dicens stomacho, urinæ, & oculorum claritati. Præterea insaniam facere, & lethargos, & iecinoris uitia. Ideoque capras id aspernari, hominibus quoque fugiendum censeat. Adjiciunt quidam tritum si operiatur lapide, scorpionem gignere. Commaducatum, & in sole positum uermes asserre. Aphri uero, si eo die feriat quissiam à scorpione, quo ederit ocimum, seruari non posse. Secuta ætatis aliorum ceterum ocimum defendit: nam id esse capras, nec minus, quam mentham, & rutam scorpionum terrestrium ictibus marinorumque uenenis mederi ex uino, addito aceto exiguo. Vsu quoque, compertum deficientibus ex aceto odoratu lutare esse. Item lethargicis, & inflammatis refrigerationi. Illitum capitis doloribus cum rosaceo, aut myrteo, aut aceto. Item oculorum epiphoris, impositum ex uino: stomacho quoque esse utile. hæc Plinius. Ex quibus clarissime patet, Plinium eorum placitis refragari, qui tam acriter ocimum damnarunt. Degenerat quandoque Ocimum in serpyllum, ut auctor est Theophrastus libro v. cap. viii. de plantarum causis, ubi sic inquit. Ocimum autem, quod loco soli exposito situm est, transit in serpyllum, quia uehementer sicatur. Folio namque minus, odoreque uehementius reditur. Quippe cum alimenti quoque minus habeant, quæ sicca sunt. Sed huiusmodi mutationes ita euenire putandum, ut aliquid similitudinis faciant, non ut omnino speciem exprimant alienam. hæc tenus Theophrastus. Ceterum Autocenna libro de uiribus cordis à Dioscoride dissentire uidetur. Nam ocimum, scribit, sanguinem turbidum, & melancholicum generat, quoniam superflua humiditas, quæ est in ipso, parit inflationem in uenis. Nec aliter uidetur sensisse Galenus, qui libro viii. simplicium medicamentorum de ocimo ita scriptum reliquit. Ocimum ex secundo sumatur, dine calfacientium: habet autem recrementitiam humiditatem: proinde nec commodum est, quod in corpus sumatur. Ceterum foris illitum, ad digerendum, & concoquendum utile est. Item libro xi. de alimentorum facultatibus, inquit. Ocimo etiam plerique ut obsonio utuntur, ex oleo, & garo estantes. Vitiosum autem est succi. Admentum autem ob hoc quidam dicentes, si tritum fistili nouo inditum operiatur, celerimè intra paucos dies scorpiones gignere, præsertim ubi quis quotidie ollam ad solem calfecerit. Sed hoc sanè à uero abest. Id porro uerè de eo dixeris, ocimum per prauum succi, stomacho noxium, & concoctum difficile. Sed illud in Ocimo non ignorandum puto, quod ocimum per y ab ocimo per i maximè differre deprehenditur probatissimorum auctorum testimonio. Siquidem apud antiquos Ocimum erat pabuli genus dictum uel quod citò proueniret: uel primum inter cætera pabuli genera è terra erumperet, uel quod iumentis citaret alium, sic appellatum uerò ab Græca uoce, quæ Latinis ualeat citò. Ocimum uero herba fore illa odorata, de qua supra disputauimus, sic nominatū ab ὄζω uerbo Græco, quod redolere significat. Vnde rectius fore tē per ζ, quam per c scribendū esset. Ceterum ocymū antiquis quibusdā boum pabulū erat ex secta uiridi segete, primum

Ocimi degeneratio.

Ocimi uires ex Gal.

Ocimi ab ocymo differentia.



quàm indurescerent culmi : uel ex seminibus pluribus simul in agro satis. Nempe è fabarum modijs decem, uicia duobus, & eruiiæ tantundem una in iugero satis, & ante maturitatem recisis. Catoni tamen è uicia, scæno græco, faba, eruoq; in unum, commistis, et exinde satis ocymum est. Quo fit, ut putauerim ocymum antiquis, non modò herbecem, uiridemq; fuisse segetem, è pluribus seminibus unà in agro satis in primum iumentorum pabulũ; sed etiam ex unò tantum cerealium genere, nempe hordeo, auena, uicia, eruo, alijsq; his cognatis, quòd eiusmodi pabulo uerno tempore, nò modò alantur boues, ac etiam equi; sed etiam repurgentur. Id quod nostra quoq; ætate fit pluribus in locis in Italia, præsertim cum hordeo, eruo, & uicia. Nec placet eorum sententia, qui sibi nulla, ut arbitror, ratione, nec auctoritate persuadent, Ocymum plantam esse sui proprii generis. quòd è ueteribus nullum hactenus inuenerim (quantũ equidem uidi, & legi) qui ocymi herbe historiam literis memorizq; mandauerit: sed comperi quidem, quòd uocabulũ hoc non magis uni, quàm alteri conueniat. quandoquidem unicuiq; pabuli generi, quod primo statim uere citò proueniat, accommodari potest. Quare planè explodenda uidetur Adami Loniceri opinio, quòd non sine errore ridendo frumentum Turcicum, siue, ut alijs placet, Saracenicum, quod Tridentina rura uulgò appellant Formentone, & Foroiuniensis à pullo seminis colore Saracino, ocymum esse firmiter existimet. Quinetiam is turpiter aberrasse deprehenditur, quòd huic plantæ, quæ suum Ocymum est, omnes odorati ocymi facultates reddiderit. Nec alia ratione uotus frumentum Saracenicum ocymum esse censet, quàm quòd satum tertia à satu die erumpat. Verum ocymũ non ea de causa nomen hoc (mea quidem sententia) sibi comparauit, sed quòd citius cæteris pabulorum generibus uere primo adoleseat: nam innumera essent ocymi genera, si id omne, quod statim ferè à satu oritur, ocymum uocari debeat. Quod uero (ut ante dictum est) Græci, ocimum item Latini appellant: Mauritanii, Berendarios, & Bedarog: Itali, Basilico: Germani, Basilien, & Baslgram: Hispani, Albabaca: Galli, Baslich.

Adami opinio vana.

Nomina.

## Orobanche.

## Cap. CXXXVI.



OROBANCHE cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subruber, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, aut in luteum vergente: radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit. caulis, fistulosus. Hanc inter quædam legumina nasci constat, & castrangulare: unde orobanche sibi cognomen usurpauit. Estur, ut olus, cruda, & in patinis, asparagi modo decocta. Legumētis addita concoctionem accelerare creditur.

OROBANCHEN, quæ omnibus notis legitime Dioscoridis respondet, uidimus primum in Anauensi agro supra Tridentum, ac deinde ubique ferè in Italia nasci comperimus, in campis non modò inter omnia leguminum genera, sed et inter segetes, cannabim, linum, & in uijs secus agrorum sepes. Cæterum et scriptis mandauerit Theophrastus lib. viii. de historia, & v. de causis plantarum, Orobanchem erui necare amplexu, complexuq; suo; ea tamen, quæ hic à Dioscoride representatur, & à Plinio lib. xxi. cap. ultimo, nullo sanè complexu, sed sua tantum præsentia, legumina, segetes, cannabim, & linum interimit, quæ prope ipsam oriuntur. Quam ob causam Ananienfes, quòd uicias stranguet, ac deuoret plantas, Herba lupa uulgò orobanchem appellant. Profilit hæc (ut inquit, Dioscorides) nullis unquam folijs, sed uno tantum assurgit cauliculo, asparagi instar, colore subrubro, hirsuto, molli, pinguiq; & qui sesquipedalem non excedat longitudinem. Flos è quibusdam patescit globulis in cacumine congestis, subalbidus. Radix digitali uisitur crassitudine, fungosa, ac fragilis. Hæc planta nonnullis etiam uulgò Coda di leone appellatur, alijs uerò Herba tora uocatur, quòd uaccæ

Orobanches consideratio.

ea degustata (ut pastores facto periculo testantur) statim taurum adeant. Sunt & qui (ut loco citato scribit Plinius) Enomorion eam appellant à similitudine canini genitalis. Ex quibus omnibus nò temerè dicendum existinauerim, uel Theophrastum (pace sua) hæc in re deceptum esse, uel aliam à Dioscoride, & Plinio orobanchem concepisse. Orobanche, ut Galenus est auctor libro viii. de facultate simplicium medicamentorum, est sicca, frigidaq; temperaturæ in primo ordine. Huius plantæ nomen Græcum est *οροβάνχη*, quemadmodum & Latinum Orobanche, necnon Erui angina: Italicum, Orobanche.

Orobanches facultas. Nomina.



## Barbula hirci.

## Cap. CXXXVII.

BARBULA hirci, quæ ab alijs come vocatur, brevis est caule: folijs croci: radice longa, dulci: magno super caulem calyce: è cuius summo semen nigrum dependet, unde nomen inditum est. Herba esui apta est.

HIRCI barbula, quam Hetruria vulgò appellat Sassefica, vulgaris admodum est notitie. Radix, quod gustu dulcis, inundaq; sit, estur hyeme frequenter in acetarijs. Folijs exit hæc croci, latioribus tamè, ac longioribus: flore aureo, rostro porcino vocato non absimili, maiore tamen, qui calyce continetur. Is sereno celo fatiscit, nubiloso uerò contrahitur, ocluditurq; calyce, quem admodum & chamælonis echinus. E concluso calycis uertice barbula dependet incana, prolixaq;. Vnde nomē accepit, ut Theophrastus prodidit lib. & cap. VII. de plantarum historia. Sed certe ne scierim ego, qua ratione ductus negauerit Hermolaus, hæc Theophrasto, et Dioscoridi legitimam Hirci barbula esse, cum illa pithure huius notis respondeat. Glutinat hæc recentia vulnera, si pithurorum succus, uel eius stillatitia aqua splenis, & attritis linteculis superponatur. Τραγοπύρον ita Græcis, Latinis uerò Barbula hirci uocatur: Italis, Barba di becco, & Sassefica: Germanis, Bocks barth, & Gauch brott: Hispanis, Barba de cabron.

## Ornithogalum. Cap. CXXXVIII.


ORNITHOGALVM cauliculus est tener, candicans, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus agnatis: à quibus flores prodeunt foris herbacei: & cum hiantes se pādunt, lactei visantur: inter quos dissecū, cachrios modo, capitulum emicat. Coquitur cum pane, ut melanthium. Radix bulbosa, cruda, & cocta manditur.

T R A S I.


Barbula hirci consideratio.

Hermolai error.

Nomina.



ORNITHOGALVM.



ORNIS



**ORNITHOGALVM** adeo inter segetes frequens oritur, ut si maio mense in aruis requiratur, perpen-  
 prius uotis illi à Dioscoride attributis, facile ab omnibus inueniatur. Ruellius in Gallia ornithogalum copiosum na-  
 sci scribit, pueris non incognitum, qui propter astantes, cum ab agricolis aratro terra proscinditur, aut in latiores por-  
 eas sulcatur, ornithogali radices uomere erutas colligunt: & cum sint castaneis suauiores, ijs & crudis, & in cineri-  
 bus incoctis uescuntur, odore incundissimo, os mirum in modum commendante. Radices in orbem ferè collectæ sunt:  
 cortice pullo: candidissima intus carne, perquam odorata: uere, uel æstate cum fronde uirent, hyeme uel autumno  
 cum exarantur agri, radicitus uelluntur. Diu seruari possunt, & ubi annonæ premit inopia, plebis rustice famem,  
 & ieiunia castanearum more satiant. Mirè suis expetuntur, qui rostro serobiculos excauant, & harum capti dul-  
 cedine, gregatim ad has eliciendas, radicitusq; uellendas aduolant. Ceterum cum ornithogali radices suauitatis  
 sue præstantia, in mentem mihi reuocauerint illas, quæ in agro Veronensi, ubi tantum, neq; alibi, quod sciam, na-  
 sciuntur in Italia, uulgò uocantur **TRASI**, saporis dulcedine castaneis proximè accedentes, recentioribusq;  
 quibusdam in medicamentis eadem expetantur, eas hic recensere non ab re fore duximus. Sunt igitur Trasi radi-  
 culæ figura, ac forma persimiles sericinis erucis, quæ feruenti balneo elixæ contrahuntur, dum serica stamina inde  
 mulieres conglomerant. Harum cremore pectoris, & laterum uitia expurgantur. quo fit, ut tussientibus opem  
 non modicam præstent: tunduntur enim, maceranturq; carni iure, deinde per linteolum exprimitur cremor,  
 quem etiam ueneris potionibus miscet recentiorum nonnulli. Sunt radices hæ, ut experientia compertum est, &  
 ex dulcedine conijci potest, in calfacientium, & huiusmodi genere, sed status quodammodo gignunt. Planta  
 germinat uere, & æstate folijs farragini similibus, cuius radicibus Trasi coherent. Has uerò satis repræsen-  
 tare uidentur radices illæ, quas **DORONICOS** uulgo officinarum nominat. Quas quidem in primis com-  
 mendarunt Arabes, & præsertim Auicenna ad cordis affectus, contra uenena, & deleteria medicamenta. Plan-  
 tam, cuius hæ sunt radices, hæcenus non nidimus: quanquam asserit Ruellius folijs esse ferè acuti rumicis. Alij uerò  
 ea leucoio similia esse uolunt. **Doronicus** Astuario carnabadium dicitur. Affertur ex Alexandria Aegypti, & ex  
 Gargano Apuliæ, sed uiribus longè infirmior. Quod *ὀρνιθογάλον* Græci, Latini pariter Ornithogalum nomi-  
 nant: Itali, Ornithogalo.

Ornithogali  
consideratio.Traforū men-  
tio, & vires.Doronici cō-  
sideratio.

Nomina.

## Tubera.

## Cap. CXXXIX.

**TUBERA** rotundæ radices sunt, sine caule, sine folijs, flauescences, vere fodiuntur. Cruda,  
 & cocta eduntur.



**TUBERA**, quæ occulta quadam facultate terra in se parit, & conglobat, numerosi in Hetruria à rusticis  
 effodiuntur, quod magnatibus maximè expetantur in cœnis. Duo eorum in Romano agro habentur genera. Quo-  
 rum alteri candida, pulla uerò alteri pulpa subest. Rimosus utrisque cortex, ac niger. Est & tertium genus in Ana-  
 toleni, & Tridentino tractu proveniens leui cortice, colore subrufo, ceteris longè mimis, inspidum, & gustu iniui-  
 cundo. Tuberum meminit Plinius lib. x. cap. 11. sic inquit. Et quoniam à miraculis rerum cœpimus, sequemur  
 eorum ordinem, in quibus uel maximum est aliquid nasci, aut uiuere sine ulla radice. Tubera uocantur hæc, undiq; ter-  
 ra circumdata, nullisq; fibris mixta, aut saltem capillamentis, nec utiq; extuberante loco, in quo gignuntur, aut rimas  
 urgente, neq; ipsa terra coherent. Cortice etiam includuntur, ut planè nec terram esse possimus dicere, neq; aliud,  
 quam terræ callum. Siccis hæc ferè, & sabulosis locis, frutetosissq; nascuntur. Excedunt sæpe magnitudinē mali co-  
 tonei, etiam librali pondere. Duo eorum genera arenosa, dentibus inimica, & altera sincera. Distinguuntur & co-  
 lore rufo, nigroq; & intus candido. Laudatissima quæ Aphricæ crescunt. An ne uitium id terræ & neq; enim aliud in-  
 telligi potest: malum ne id ea protinus globetur magnitudine, qua futurum est, & uiuat ne, aut non, haud facile arbi-  
 tror intelligi posse. Putrescendi enim ratio cōmunis est ijs cū ligno. Lartio Licinio pretorio uiro iura redditi in  
 Hispania Carthagine paucis his annis scimus accidisse, inordenti tuber, ut deprehensus intus denarius primos dentes  
 inflecteret. Quo manifestum erit terræ naturam in se globari. Quod certum est ex ijs, quæ nascuntur, & feri non  
 possunt.

Tuberum cō-  
sideratio.Historia ex  
Plinio.



Tuberum vi-  
res ex Gal.


Ex Auicenna.

Nomina.

possunt. Et libro eodem capite tertio: De tuberibus (inquit) hæc traduntur peculiariter. Cum fuerint imbres æ-  
tinales, ac tonitrua crebra, tunc nasci, & maxime è tonitribus, nec ultra annum durare, tenerrima autem uerno es-  
se. Quibusdam locis acceptantur riguis, & seruntur, sicut Mitylenis. Negant nasci, nisi exundatione fluminum  
inuelo semine ab Tjariis. Est autem is locus, in quo plurima nascuntur. Sunt & in fungorum genere à Græcis disti-  
pexica, qui sine radice, aut pediculo nascuntur. Hætenus de tuberibus Plinius. Tuberæ (ut memoria proditi  
Galenus libro II. de alimentorum facultate) radicibus, aut bulbis sunt annumeranda, ut quæ nullam euidentem habent  
qualitatem. Qui ergo his utuntur, ad excipienda condimenta tanquam materiam habent, cetera alia qualitatis exper-  
tia, & innoxia, gustuq; aquosa sunt. Quibus omnibus commune est, ut alimentum nulla insigni facultate constans  
corpori præbeant, sed frigidiusculum duntaxat, crassitudine tale, quale id ipsum est, quod ingestum fuerit: ex tuber-  
ribus quidem crassius, ex cucurbita liquidius & tenuius. In alijs eadem est proportio. Sed longè aliter de his scri-  
psit Auicenna, cum inquit. Tuberæ terrena magis, quàm aquea sunt, omniq; prorsus sapore expertia. Aerabiles,  
& crassos gignunt humores, magis quàm cetera ciborum genera. Quo fit, ut frequenter deuorati apoplexiam, &  
paralysem concitent. Ad hæc concoctu contumacia sunt, & uentriculum aggrauant. Quæ Græcè ὄζυρα, Tuberæ  
Latine dicuntur: Arabicè, Ramech, Alchamech, Tamer, & Kema: Italicè, Tartuffi: Germanicè, Hirtz brunn:  
Hispanicè, Turmas de tierra: Gallicè, Truffle.

### Smilax hortensis.

### Cap. CXL.



Smilacis hor-  
tensis consi-  
deratio.

Manardi ex-  
sor.

HORTENSIS Smilax frutex est, cuius semen à  
nonnullis lobia vocatur. Folia habet hederæ,  
tamen: tenues caules, & capreolos vicinis fruticibus cir-  
cumuolutos: qui tantum adolefcunt, ut topiarias scenæ  
repræsentare videantur: siliquas fœni græci profert, lon-  
giores, torosiores: in quibus semina renum similia, sed  
inæquali colore, recluduntur: quæ quadam ex parte ful-  
uescunt. Siliqua cocta, cum semine in oleribus asparagi  
modo estur. Vrinam ciet, & tumultuosa somnia facit.

HORTENSIS Smilax (ut supra nobis dictum est in Phas-  
seolis, sub quorū appellatione falsò credidit Manardus de eruilia  
scripsisse Dioscoridem) nil aliud, mea quidem sententia, esse po-  
test, quàm ea Phasedlorum genera, varijs coloribus depicta, quæ  
uulgò Italis dicuntur Fagioli Turcheschi. Siquidem præter id,  
quod rubentes, uersicolores, & (ut Dioscorides inquit) renum fi-  
gura cernantur, folijs exeunt hederaceis, caule tenui: quo capreo-  
li prodeunt, quorum reptatu non modò palos, & arbores scenæ  
dunt, ac uinciunt; sed in hortis attegias, pergulas, testudines, sca-  
nas, & tentoria inumbrant, & opacant. Hos Galenus lib. primo  
de alimentorum facultatibus, ex auctoritate Theophrasti dolichos  
appellat, sic inquit. Dolichus adactò longo palo confurgit, &  
fructum gerit: sin hoc adminiculo careat, uitiosus fit, & rubigine  
tentatur. Quod quotidie uisitur in hoc phasiolorum genere, & con-  
pe quod nullo sustentaculo in altum euecti, humi repunt, & con-  
tracto tractu temporis humore, situ, ac rubigine deperunt. At  
ubi longissimo inheserint pedamento, breui temporis spatio ad cul-  
men usque illi se circumuoluunt. Quo fit, ut longè aberrasse Ma-  
nardum existimè, quod asserat lib. I. epist. III. Dolichos nil aliud

esse Galenio, quàm Eruiam, quæ Italarum nonnullis uulgò appellatur Rouiglione, alijs uerò Arabeia, cum tenella  
Galenus, itemq; Paulus Eruiam appellent Ochruum. Nec nobis obstat, quod Eruiam (ut ipse asserit) rubiginè con-  
trahat, cum adminiculis caret, quibus à terra subleuetur, quodq; huiusce tantum leguminis siliquæ unà cum semine  
comedantur, ut Galenus libri II. de aliment. facult. præfatione, & Paulus Dolichos mandati testantur. Nam etsi diu  
quando Eruiæ secti arborum rami apponantur, ut illos implicent; nunquam tamen longissimi adfiguntur pali: quod  
ea minime illos scandere ualeat, uersicolorum phasiolorum modo. Ad hæc Eruiam, quæ humi serpat, rubiginè nullo  
nimè deperit, ut Tridentinus ager ubiq; testari potest. Quippe quod ibi frequentissima feratur, diuinitaturq; nullo  
prope fixo pedamento humi accumbere. Nec obstat præterea (ut ipse Manardus scribit) quod sola Eruiam inter les-  
gumina cum siliquis comedatur. Nam quanuis decocta unà cum siliquis mensis apponatur; nunquam tamen aliquem  
me uidisse fateri possum, qui siliquas simul cum granis deuorauerit: est enim eruiliæ inuolucrum suisbus potius, quàm  
hominibus in cibum exhibendum. Vnde equidem omnes, quod uiderim, Eruiam mandantes, semina delinquant. See-  
hant, & membranosas, exhaustasq; siliquas dentium attritui prorsus repugnantes, in patinis suisbus reliquam conser-  
cus autem cum huiusmodi phasiolorum corniculis euenit: quandoquidem cum tenella adolefcunt, antequam conser-  
nescant, aqua prius elixa, non modò in acetarijs integra, nullisq; abiectis putaminibus, assumuntur in cibum, sed bene  
tyro, uel oleo fixa addito gingibere, & omphacio, iucundissime deuorantur. Hinc itaq; fit, ut certò potius credam



hoc phasolorum genus dolichos esse, quàm eruiliam Manardo uocatam. Illud insuper hac in re sentit Manardus, quòd Dioscorides phasolorum appellatione, de quibus suprà mentionem fecit, non quidem communes, ac triuiales, sed Eruiliam significauerit: Smilacis uerò hortenſis nomine, de qua hic sermo, uulgares illos phasolos representauerit. Qui (ut suam tueatur sententiam) consentaneum minime uideri inquit, quòd duobus diuersis capitibus eodem libro de phaseolis scripserit Dioscorides. Sed handquaquam à ratione, & ueritate eum alienum existimarem, qui resum primùm tractasse Dioscoridem de uulgaribus, & candidis phaseolis, qui passim in campis aliorum leguminum more seminantur, ubi de omni segete, & leguminibus disseruit. Deinde uerò de uersicoloribus, qui in hortis, & uiridarijs ad opera topiaria explenda seruntur, inter ea, quæ in hortis, & uiridarijs coluntur. Quamobrem ut hortensibus à campestribus secerneret, inquit: Hortensis Smilax frutex est, &c. Quod manifestè declarat, eum hic de hortodog; admirari Manardum medicum alioquin ingenio, & doctrina insignem, quòd tam faciliè adductus esset, ut assenseret dolichos esse eruiliam, cum eum legisse existimandum sit, Galeno, & Paulo eruiliam ochrum uocari. Planta, quæ quia & κηρία Græcis, Smilax hortenſis Latinis appellatur: Arabibus, Lubia: Italis, Smilace de gli horti, & Fagiolo Turchesco: Germanis, Vuelsch bonen: Hispanis, Feyones: Gallis, Fascoles, & Fabes painctes.

Nomina.

## Medica.

## Cap. CXLI.

**MEDICA**, cum recenter prodijt, folijs, & caule trifolio pratenſi similis est: procedens uerò folia contrahit, caules edens trifolij, & siliquas corniculorum modo intortas, in quibus semen lentis magnitudine dependet. Id siccatum, iucundi saporis gratia, conditaneo sali admiscetur. Viride, quibus refrigeratione opus est, illitu suffragatur. Herba tota pro gramine vtuntur, qui pectora alunt.

**MEDICAM** inde nominationem inuenisse certum est, quòd primùm, Plinio lib. xviii. cap. xvi. auctore, ex Media in Italiam aduecta fuerit. Verùm etsi hæc quondam in uniuersa Italia sereretur ad pecorum pabulum, & omnibus ferè cognosceretur; nunc tamen pauci sane reperiuntur, qui Medicam uiderint, ne dum serant, quanquam non desunt, qui eam se consecutos existiment: Sed cum ab amicis hoc anno semen accepiſsem, illudq; magna cū diligentia terere mandasse, accidit, solo forsitan repugnante, ut nulla exorta sit planta: unde quid de ea iudicem nō habeo. Hæc (ut Plinius tradit loco citato, & antiquorum plerique testantur) uno tantum satū plus tricenis annis perdurat. Eadem (ut quidam referunt) abundat Hispania, ubi magna admodum cura colitur ad iumentorum, & pecudum pabulum: eamq; Alfalfa uocant, nomine ab Arabicis corruptè mutuato. Nam (ut lib. ii. capite de Cot inquit Auicenna) uocatur etiānum Aphris Alfafasat. Nascitur & in Gallia, si Ruellio credimus, ibiq; maius trifolium appellatur. Medica sic Latinis, & Italis, ut Græcis μανδύκη nominatur: Mauritanijs (ut modò dictum est) Cot, & Alfafasat: Hispanis, Alfasse, Erucye, & Alfalfa.

Medicæ consideratio.

Nomina.

## Aphaca.

## Cap. CXLII.

**APHACA** in aruis nascitur, altior lente, tenuibus folijs: siliquas lenticula maiores fert, in quibus terna, quaternæue semina nigra, lente minora, continentur. Quæ adstringendi vim habent. quare torrefacta, stomachi, aluiq; fluxiones sistunt, si fresa lentis more decoquantur.

**NON** solum in uniuersis Italiæ locis Aphaca sponte nascitur, sed & à multis in campis scriitur leguminum, & erui modo ad columbarum saginam. Folio germinat uiciæ maiore, crassiori; quadrangulæ caule, flore subrubeo, siliquis inde dependentibus pisorum instar, breuioribus tamen, sed lenticulæ maioribus, in quibus includitur semē, uiciæ quadantenus maius. Goritiensī agro frequentissima nascitur inter segetes, & prope sepes. Quo fit, ut maxime aberrent, qui censent Aphacam nihil à uiciæ differre, quæ inter segetes ubiq; copiosè prouenit. Quippe quòd hæc minori sit folio, tenuiori caule, flore in purpuram rubescente, siliquis longioribus, gracilioribus, ac rotundioribus. Ea; propter de Aphaca, & Viciæ differens Galenus lib. i. de alimentorum facultatibus, ita scribit. Aphaca, & uiciæ seminum figura non rotunda est, ueluti fabarum, sed aliquantò latiuscula, similiter lenti. Hæc quoq; cum sua planta, & ualuelis integra rustici reponunt, ut brutis pecudibus pabulo sint. Per famem tamen quosdam noui, qui hæc quoq; comederint, potissimum uere, cum etiānum uirent, quemadmodum fabas, & cicera esitare consueuerunt. Semina autē hæc non solum insuauia sunt, sed concoctu etiā difficilia, & aluum retinentia. Perspicuum ergo est, cum huiusmodi namelancholici generationem. hætenus Galemus. Caterum illud animaduertendum est, quòd Theophrastus lib. vii. cap. vii. & xi. de plantarum historia, Aphacam inter intybacea, uel cicborij genera connumerat. Quare mirandum non est, si etiam in alijs quibusdam à Dioscoride discrepet, quemadmodum in coronopo, orobanche, ac alijs nonnullis uerbum retulit: libro uerò xxi. Theophrastum secutus, eam inter cichoracea reposuit. Quæ Græcis ἀφάκη, Latinis item Aphaca, & Aphace nuncupatur: Arabibus, Apaki, Afaki, siue Albikia: Italis, Aphaca: Germanis, Vuilde wicken, & Vogels wicken.

Aphacæ consideratio.


Quorundam lapsus.

Aphaca intybi genus.




APHACA.


VICIA.



Porrum capitatum.



Cap. CXLIII.



Porri consideratio.

CAPITATVM porrum inflationem facit, noxium succum creat, tumultuosum somnium parit, vrinam ciet, aluo accommodatur, extenuat, oculorum aciem hebetat, menses pellit: sed lædit exulceratam vesicam, renesque. cum ptisana uerò coctum, esu pectoris vitia extrahit. Coma eius in aqua maris, & aceto cocta in defensionibus ad præclusiones uulvæ, & duritias, utilis habetur. Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida maceratum, dulcescit, & multò minus inflat. Semen acris est, & quandam adstrictoriam vim habet. quare succus cum aceto, addito thure, aut manna, sanguinis profusio sistit, maximè si naribus erumpat. Venerem stimulat: contra omnia thoracis vitia, tabemque, pro delictu efficax est: arteriam esu purgat: sed si assidue estur, uisus obscuritatem inducit: stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, aut illitus, contra bestiarum morbus auxilio est. Ipsum quoque cum aceto aut thuris polline, lacte aut rosaceo, vtiliter aurium doloribus, & sonitu instillatur. Varostollunt folia illita cum rhoe, qua ad obsonia utuntur: epinyctidi medentur: crustas ex sale illita rumpunt. Veteres sanguinis reiectiones cohibent, seminis drachmæ binæ, cum æquali baccarum myrti pondere potæ.

PORRVM, quod copiosum quadragesimalis nostri ieiunij tempore plerumq; in foris olitorijs unâ cum oleribus uenale reperitur, omnibus notissimum est. Ceterum etsi magnopere laborant hortorum cultores, ut eorum porri, longi, crassi, candidi, ac teneri euadant; nesciunt tamen eos capitatos efficere, ceptum insit;



instar : quanvis ij apud ueteres in frequentissimo usu fuissent, quod longis, qui proprie sectiui appellantur, sapidiores, gustuiq; gratiores haberentur. De his igitur tanquam præstantioribus scripsit Dioscorides, nō tamen quod à sectiui genere differrent, è quibus māgonio capitati sunt, tegula in transplantatione supposita, incisus prius ante medullā solidis, ne adolendi facultas in sublime feratur, nec ad radices, sed in ipso capite confideat : uel sarculo conuelluntur radices, ut delumbatē alant, neque distrabant, ut scriptum reliquit Plinius lib. xix. cap. vi. Porri facultates recensuit Galenus lib. ii. de alimentorum facultatibus, ubi simul etiam de allio, & cepis agens, sic inquit. Harum plantarum radicibus percrebro uestuntur homines, rarius caule, folijsq; acri admodum facultate præditi pro radicū portione. Corpus excalfaciunt, & crassos in eo humores extenuant, glutinososq; incidunt. Bis tamen, aut ter in aqua decocta, acrimonia spoliantur : quauquam ne sic quidem uiu perdunt extenuandi. Verū facultatem quandam obscurissimam alendi corporis exinde acquirunt, cuius antea, quā decoquerentur, nihil profus obtinebant. Ceterū allium non modō ut obsonium, uerū etiam ut medicamentum sanitati accommodum, quod obstruat solvere, & discutere possit, usurpatur. Aliquantisper elixum, usque dum acritudinem abiciat, uiribus quidem suis imbecillius sit, sed succi prauitatem non amplius seruat, quemadmodum nec porri, nec cepæ, cū bis fuerint decocta. Γράτον κεφαλαίων id uocant Græci, quod Latini Porrum capitatam : Arabes, Curat, seu Kurat : Itali, Porro capitato : Germani, Lauch : Hispani, Puerro : Galli, Pourreau.

Porri facultates ex Gal.

Nomina.

## Ampeloprasum.

## Cap. CXLIH.

AMPELOPRASVM stomacho magis, quā porrum aduersatur : plus autem excalfacit : urinam, & menses uehementius ciet. Id contra serpentium morsus esse conuenit.

PROVENIT agreste porrum plerūq; in uineis, unde à natalibus ἀμπελόπρασον, quasi uineale porrum, Græcis appellatur. Nascitur hoc in uniuersa Hetruria non solum in uinetis sed etiam frequens admodum in agrorum marginibus, & in amoenis collinum locis. Rura nostra ipsum uulgari sermone appellant Porrandello. Estur à rusticis, & agricolis in acetarijs crudum, recentis allij uice : quauquam mausu durius sit, gustu acrius, & concoctu difficilior. Est præterea Ampeloprasum (ut lib. vi. simplicium medicamentorum prodidit Galenus) acrius, & siccius domestico, sicut agrestia omnia reliqua domesticis : ac proinde stomacho, quā illud nocentius : sed & crassos, ac lentos humores potentius incidit, ualentiusq; infarcta organa obstructione liberat. Hac quoq; ratione urinas, & menses sæpe prouocauit, ubi à crassis, & lentis retinebantur humoribus. Adeo uero est calidum, ut illitum cataplasmatibus modo exulceret. Dictum est autem antea, quod quæ eum in modum sunt calida, extremi sint ordinis. hæcenus Galenus. Ceterū illud silentio haud dissimulandum puto, quod Galenus minus fortasse recte id tribuerit Ampelopraso, quod nominis significationi reclamatione, et potius scorodopraso competere uidetur, cū loco citato inquit. Si inter allium, & porrum medium quiddam concipias, facultatem ampeloprasī inuenieris. Quandoquidem scorodoprasum, teste infra Dioscoride, ut allij, et porri uires ; ita & nomen sibi uendicauit : ampeloprasum uero dictum est, quod in uinetis nascatur. Id quod ipsemet Galenus con-

Agrestis porri confid.

Nomina.

firmat libro viii. simp. medicamentorum his uerbis. Scorodoprasou sicut gustu, & odore mediam allij, & porri qualitatem possidet, ita & uires. Et libro ii. de alimentorum facultatibus : Ampeloprasī (inquit) à porro tanta est differentia, quanta in allijs congeneribus plantis inter sylvestria, & satia inuenitur. Sunt qui hoc in totum sequentē annum reponant, aceto condientes, haud aliter quā cepas, eaq; ex parte cibo commodius, & prauo minus succo obnoxium efficitur. Quod ἀμπελόπρασον Græci, Latini Porrum agreste, & Ampeloprasum dicunt : Mauritanii, Nabati : Itali, Porro saluatico, & Porrandello : Germani, Vuild lauch : Hispani, Ayo, & Puerros de las uinhas : Galli, Pourree de chien.

## Cepa.

## Cap. CXLV.

CEPA longa acrior est, quā rotunda, item flaua quā candida, & sicca quā uiridis, & cruda quā cocta, aut sale condita. Omnes tamen mordent, flatus gignunt, appetentiam inuitant, sitim mouent, & extenuant, fastidium pariunt, & expurgant : aluo utiles sunt. Eæ detractis purgamentis in oleum coniectæ, hæmorrhoidas, reliquosq; excretionum exitus referant, subditæ pro balanis.



## C E P A.



Ceparum historia ex Theophrasto.

Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, ar-  
gemis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxilia-  
tur: anginae eodem perunguntur: suppressos menses pel-  
lit: caput purgat, naribus infusus: canis moribus cum  
aceto, ruta, & melle illinitur: cum aceto autem perun-  
ctas in sole uirilignes sanat: & cum pari spodio, scabras  
lippitudines sedat: uaros cum sale reprimat: contra cal-  
ceamentorum attritus, cum gallinaceo adipe utilis est: ci-  
tae aluo prodest: in auribus sonitum, ac grauitatem emē-  
dat: ad purulentas aures, & eliciendam earundem aquā,  
ualet: alopeciae earum succo perfricantur, qui celerius  
quam alcyonium pilos euocat. Largiore cibo cepa capi-  
tis dolores ciēt, cocta quē uehementius urinam pellit: eos  
lethargicos efficit, qui ualitudinibus aduersis, ea etiam co-  
cta, plus æquo uescantur. elixa, & cum pasis unis, & fico  
illita tubercula concoquit, & celerrimē rumpit.

CEPARVM plura Theophrasto notantur genera libro  
VII. cap. III. de plantarum historia, ubi sic habet. Differunt  
cepae, & allia genere. Sed Ceparum genera plura, ut quae e-  
cis nomina acceperunt: gardiae, cnidae, samothraciae: item setianae,  
& fisliles, & ascaloniae. Ex his Setianae minimae, sed large dulces.  
Fisliles uero, & ascaloniae, tū cultu, tum natura inter se differunt.  
Fislilem etenim hyeme sua cum coma, inertem relinquunt, uere  
externa folia detrahunt, & reliqua colunt: detractis his folijs, al-  
tero germinant, simulq; inferius finditur, unde fisliles appellatae  
sunt. Quidam uel omnibus detrahenda folia censent, ut uini suum  
imo contineant, neq; effusae seminescant. Ascaloniarum peculiari-  
ris quaedam natura notata est: etenim sole fisliles, & quasi steri-  
les, ab radice consistunt, nec ea parte crescere, ac proficere possunt.

sunt. Quamobrem non eas deponunt, sed semine serunt: deinde circa uer, cum germinatū sit, transferunt. Perficiuntur  
adeo celeriter, ut cum ceteris, aut etiā prius euelli possint. Plus temporis dimisse in terra, putrescunt. Plantae caule  
edunt, semenq; tantummodo fundunt: tum exinaniuntur, atque inarescunt. Harum igitur talis natura est. Differunt  
& colore nonnulla: etenim apud Ision cetera quidem candidis similes constant, sed colore candidae admodum pro-  
ueniunt, Sardianisq; similiter ferre affirmant. Cretenesium peculiaris maxime natura notatur, sed Ascalonijs quodam  
modo proxima, ni forte nel eadem dici debeat. Est enim in Creta genus quoddam, quod semine quidem satum in radi-  
ce crassatur; depositum uero, in caulem, semenq; totum funditur: sine capite, saporeq; dulce est. Id enim quasi e-  
contrario ceteris habet: omnes namque depositae melius, celeriusq; perficiuntur. Omnes post arcturum proueniunt,  
tepido adhuc solo, ut depositas imbres occupent. Seruuntur & toto capite, & circunciso, sed germinationes haud si-  
miles fieri solent. Parte namque inferiore cepae nascuntur, superiore herba tantum erumpit: sectae uero in relictum,  
germinare omnino nequeunt. Gethyan dictum sine capite est, & quasi longa ceruice consistens: ob id germinatio to-  
ta in fronde, saepiusq; retondetur, ut porrum. qua de causa semine seritur, id nec deponitur. Cepas hisce ferre dispo-  
rentijs discernere licet. haecenus Theophrastus. Nascuntur Cepae in uniuersa Italia frequentissima, quae etiam inibi  
multiplici signantur genere, ut refert Plinius lib. XIX. cap. VI. & ut nos quotidie uidemus. Quandoquidem for-  
ma aliae maiores, aliae minores, quaedam longae, quaedam rotundae, quaedam uero sessiles proueniunt. Sicut colore  
rubentes, & subrubentes aliae, quaedam uirides, & candidae nonnullae. Quin & sapore uel acerrime, uel medio-  
cri acrimonia praeditae sunt, aut nihil penitus acres inueniuntur. Omnium maxime sunt, quae Caieta Romam impo-  
tantur. Haec tametsi ad summum rubescant, ac crassioribus tunicis compactae sint; leniuscula tamen acrimonia po-  
lent, mansuq; tenerrime comperiuntur: ob idq; in cibis ceteras antecellunt. In Hetruria eae minus acres notantur,  
quae magis rubent. Contra uero albae, quippe quae omnium ibi acerrimae proueniant. Quam ob causam ad medicame-  
nta potius, quam ad cibos seruantur: quanquam secus fortasse in Graecia eueniat, quod flauas candidis acrioribus  
esse memoret Dioscorides. Connumerantur etiamnum inter ceparum genera (ut locis supra citatis Theophrastus,  
& Plinius testantur) quae Ascaloniae ab Ascalone Iudaeae oppido appellantur, & quae his simile sunt Theophrasto  
sessiles nominatae, nobis uero in Hetruria uulgo Cipollie maligie. Cepa (ut memoriae prodidit Galenus libro VII.  
simplicium medicamentorum) ex quarto est ordine excalfacientium: essentia autem eius potius crassarum est partium.  
Vnde etiam hemorrhoidas aperit tum apposita, tum cum aceto inuncta. In sole alphas abstergit, tum alopecij ac-  
ta pilos alcyonio citius restituit. Porro si succum eius exprimas, quod reliquum est, admodum terrea substantia est  
eiusq; calida: at succus aquae, aereaeq; caliditatis. Hic igitur ijs, qui suffusi sunt, aut aciem oculorum obusam  
pre crassitudine humorum obtinent, inunctus prodest. Ex huius temperatura tota cepa statiosa est manducata. Itaq;  
quae temperatura sunt sicciore, minus flatuum generant. haec Galenus. Quod autem Cepae corporibus praebant su-  
mentum, supra in porri mentione retulimus ex ipso Galeno, qui de ijs simul differuit libro II. de alimentorum su-  
cultatibus.


Ceparum ui-  
res ex Gal.



eulatibus. Κρόμμυον Græcè, Cēpa & Cepe Latine uocatur : Arabicè, Basil seu Bassal : Italicè, Cipolla, Ger- Nomina.  
manicè, Zuibel : Hispanicè, Cebolha : Gallicè, Fiboule, & Oignon.

## Allium.

## Cap. CXLVI.



**A L L I V M** quoddam satium, atque hortense habetur. quod in Aegypto, singulari ut porrum, capite constat, dulce, in purpureum uergens, paruum: reliqua uerò magna & candida, ex pluribus coagmentantur nucleis, quos aglithas, id est spicas, Græci nominant. Aliud est syluestre, quod ophioscorodon, id est anguinum, uocant. Vis allij acris est: excalfacit, mordet, excernit, aluum turbat, inflationes facit, stomachum exiccatur, sitim gignit, flatum permouet, summam corporis cutem exulcerat: aciem oculorum esu hebetat. Eisdem effectus præbet anguinum, quod & elaphoscorodon dicitur: latas uentris tineas in cibo sumptum abigit, urinas detrahit: contra uiperarum ictus, & priuatim hæmorrhoidi, prodest, ita ut non aliud magis, si cum uino iugiter assumatur, aut tritum in eodem ebibatur: contra rabioforum morsus, & illitu, & cibo ualet. Magnæ & allio utilitates contra aquarum mutationes: uocem clarificat: ueterem tussim crudam, coctumue lenit: potum autem cum origani decocto, pediculos, & lentes enecat: cremati cinis illitus sugillationibus cum melle, & alopecij cum nardino unguine, medetur: eruptiones papularum cum oleo, & sale sanat: uirilignes, lichenas, lentigines, ulcera capitis manantia, lepras, & furfures, cum melle eximit: cum thure, & teda decoctum, dentium dolorem leuat, si in ore contineatur: contra uenenatos muris asine morsus, cum ficulneis frondibus, & cumino illinitur. Feruæfactæ comæ ius, sceminarum defensionibus additum, menses, & secundos partus extrahit. Allium eiusdem gratia sufficit. Factum ex eo, & nigra oliua intritum, quod myttota uocant, elicit urinam, ora uenarum patefacit, hydropicis utile.

**A L L I V M** uulgaris est notitiæ. Ceterum quanquam scribit Dioscorides Allium, quod non coherentibus nucleis, siue spicis, sed singulari, & solido capite constat, in Aegypto nasci: eiusmodi tamen & in Hetruria, & in compluribus alijs Italiæ locis provenit, ibiq; Allium mas appellatur. Alij meminit Theophrastus lib. VII. cap. IIII. de plantarum historia, sic inquit. Allium ante solstitia, aut paulo post solstitia seritur nucleatum diuisum. Discrimen eorum, quod aliud præcox aliud ferotinum: est enim genus quoddam eiusmodi, ut sexaginta diebus perfici possit. Diferunt præterea magnitudine singulari. Cyprium uocatum maxime tale est, quod non decoquant, sed in myttotis utuntur: & cum tunditur, mirum quam spuma increseat. Quin & illud differentiam facit, quod quedam non nucleis coagmentantur. Dulcedo autem, & odor, & crassitudo, eorumq; causa, tempore, cultuq; penè nidentur contingere, ut etiam aliorum. Perfici etiam semine potest, sed tardè: primo etenim anno caput accipit porri, sequente discernant. Radicis autem allij, aut cepe haud similis ortus fieri solet: allij namque cum nucleus extumuerit, tota intorquetur: & hinc aucta in nucleos rursus discernitur, atq; ex uno plura efficiuntur, dum caput consummatur. At cepe continuo ab radice aliud, atque aliud obducit, ut & bulbos, & scyllas, eiusmodi omnia. Etenim allia, & cepe, si non euellantur, plura indies fiunt. Super fistula quoq; & allium capitari posse, & cepe affirmant. hætenus Theophrastus de alio domestico. Syluestre uerò, quod Græci οφιοσκορον, id est, anguinum allium uocant, ubique, in montibus præsertim, & collibus nascitur, nullis diuisum nucleis, satiuo longè minus, sed odore, & sapore illi persimile: folijs angustioribus, gracili caule: in cuius cacumine flos emicat, ex rubeo purpurascens, à quo nigrum gignitur semen. Hoc, cum aliquando in montibus legerem unà cum alijs herbarijs, nobis occasionem præbuit loquendi de errore detestando, in quo turpiter uersati sunt Arabes, & eos secuti: quod pro scordio herba, quæ triflaginem fomentione (Deo fauente) Latini explicabimus. Porro illud hic silentio non dissimulandum duxi, ne forte seplastarijs imponat, quod Brasauolus aperte falli deprehenditur libro suo de simplicium examine Romæ prius excuso, ubi syluestre allium ampeloprason, siue scorodoprason à rei medicæ auctoribus appellari scribit. Quæ in re non uno tantum, meo quidem iudicio, sed duplici, pace eius dixerim, notatur errore. Primum quod existimauerit, allium syluestre scorodoprasum,

Allii confideratio.

Allium iynae stre.

Arabu lapsus

Brasauoli error.




doprasum, uel ampeloprasum esse. Deinde quod certo crediderit, ampeloprasum, & scorodoprasum unam & eandem plantam esse. Hi Brasauoli errores manifestè redarguuntur Dioscoridis auctoritate. Siquidem is non solum eas plantas nominibus, sed etiam capitibus, & facultatibus distinxit: quem etiam secutus est Galenus, licet, ut in ampelopraso diximus, huic tribuerit, quod scorodopraso tribuendum erat. In his igitur palam fit, allium sylvestre ophioscorodum appellari: sylvestre porrum: quod in uincis proueniat, ampeloprasum: tertium uerò, quod promiscuas allij, & porri facultates obtineat, scorodoprasum. Quare mirari subit Brasauolum uirum alioqui doctissimum, quomodo is, qui simplicium medicamentorum examen conscripsit, hæc in Dioscoride, & Galeno non uiderit, uel non animaduernerit. *Σκородον* Græci, Latini Allium dicunt; Arabes, Chaum, Cairin, & Thum: Itali, Aglio: Germani, Knoblauch: Hispani, Ayos: Galli, Ail, & Aux.

Nomina.

## Scorodoprasum.

## Cap. CXLVII.



SCORODOPRASVM magnitudine porrum æquat, qualitatum porri, & allij particeps. Vnde promiscuas sibi uires ex utroque uendicauit, effectus allij, & porri præbens: inefficacius tamen. Coctum, porri modo, dulcescit, & in olerum uicem transit.

QUONIAM antiquorum nullus, præter Dioscoridem, Galenum, & Paulum, Scorodoprasum meminit, propterea existimat Marcellus arte, & cultorum mangonio ex allio, & porro in unum sub terra colligatis, non autem natura, scorodoprasum prouenire. Sed hæc in re Marcellum, pace sua dixerim, cæcisse illud manifesto iudicio est, quod compertum sit, legitimè Scorodoprasum natura, non mangonio factum, in compluribus Italianis locis sponte sua nasci: ac inde postea translatum, in hortis, & in ridarijs depositum uirescere, ita ut intuentibus legitimè se ostendat, & Marcelli errorem prodat. Crescit id porraceis folijs, quæ digitis attrita ita allium, & porrum simul respiunt, ut illorum etiam effectus præbent, quemadmodum rectè prodidit Dioscorides, & Galenus attestatur lib. VIII. simp. medicamentorum, his paucis. Scorodoprasum sicut gustu & odore median allij & porri qualitatem possidet, ita & uires. Id Græcè *σκородον* Latinè similiter Scorodoprasum appellatur: Italicè, Scorodopraso: Germanicè, Aber knoblauch: Gallicè, Ail porreau.

## Sinapi.

## Cap. CXLVIII.

SINAPI hortense, aliqui napi uocant. Eligi debet adultum, ualde rufum, non magnopere siccum, sed quod fractum internè uirescat, & ueluti quodam succo madeat, cæsiu colore: siquidem recens id genus, tempestiuum habetur. Ad calfaciendum, conuandandum, extrahendum, efficax est. Ad eliciendam capitis pituitam manditur: contra præduros collarum tumores, ac ueterem, callosamque arteriæ scabritiem, succus ex aqua, & melle conuenienter gargarizatur: sternutamenta ciet, tritum, & naribus admotum: comitialibus quoque auxiliatur: feminas uulvæ strangulatu oppressas excitat: lethargicis, derafo capite, illinitur. Cum ficis admistum, donec rubescat locus, & ad coxendicum cruciatus impositum, ad lienes, & omne genus dolores confert, cum permutandæ ualitudinis causa ex alto uitia extrahenda sunt: alopecii illitum ineditur: faciem purgat: fugillata cum melle, adipe, aut cerato rapit: feræ impetigines, & lepræ, eo cum aceto perunguntur, contra febrium circuitus aridum bibitur, aut potui, polentæ modo inspargitur: extrahentibus emplastris, scabiemque extenuantibus, utiliter admisceri solet: tritum grauitati aurium, & sonitui cum fico impositum prodest. Succus ad hebetudines oculorum, & genarum scabritias magna utilitate cum melle illinitur. Expressus recenti semine succus in sole siccatur.


Sinapi consideratio.

SINAPI, Plinio libro XIX. cap. VIII. auctore, trium est generum. Quorum unum gracili assurgit folio: alterum rapitiam frondem exprimit: tertium eruca folio laciniatur. Hæc omnia Sinapis genera obseruantur in Italia: illud siquidem, quod tum folio, tum etiam semine tenui nascitur, erraticum est. Quod uerò rapi fronde constat, cæteris maius, hortense est, cuiusque in officinis usus. Tertium deinde & ipsum satiuum est, semine albo, minusque acriter tritum hoc, mustoq; recenti commistum, diutius eius dulcedinem tuetur, atq; eam deficere prohibet, quod ebullitionem reprimat. Eaq; propter qui ex Tridentino agro in Germaniam mustum comportant, hoc Sinapis genere cædis imposito, dulcedinem musti conseruant. Sinapis temperamentum tantummodo expresse Galenus libro VIII. simplicium

Sinapi uires ex Gal.




SINAPI PRIMVM.



SINAPI SECVNDVM.



SINAPI TERTIVM.



NASTVRTIVM.





Nomina.

plicium medicamentorum, sic inquit. Sinapi calfacit, & desiccatur quarto ordine. Huic nomen Græcum ὁ σινάπι & σινάπι : Latinum quoque Sinapi, & Sinapis : Arabicum, Cardel, aut Chardel : Italicum, Senape : Germanicum, Seness : Hispanicum, Mostaza : Gallicum, Seneue.

## Nasturtium.

## Cap. CXLIX.

NASTURTIVM optimum constat esse Babylonicum. Omnium semen est acre : excalfacit, stomacho aduersatur, aluum turbat, tineas exentit, lienem imminuit, partus exanimat, menses cit, venerem stimulat, sinapis, & eruez simile intelligitur : lepras, & impetigines absterget. Illitum cum melle lienem extenuat, fauos expurgat : pulmonum uitia extrahit, forbitionibus incoctum : serpentium uenenis potum resistit, atque eas suffitu fugat : capillorum defluuia cohibet : carbunculos ad suppurationem perducit, & rumpit : coxendicibus cum polenta commodè ex aceto illinitur : tumores, collectionesque discutit : emittit furunculos illitum cum muria. Herba ad omnia eadem effectus, licet minor.

Nasturtii cōsideratio.

Nasturtii uires ex Gal.

Nomina.

NASTURTIVM hortis familiaris, & frequens herba est, tenuis : folijs paruis, laciniatis : caule tenui, squipedali : flore albo : semine in rubeum nigricante, folliculis rotundis, ac pressis contento, thlaspi modo. Plinius de thor est lib. xx. cap. xiii. album, & nigrum reperiri. Verum cum Nasturtium uenerem inhibere scribit, uel crediderim, quod experimento, & Dioscoridi repugnet. Nasturtij semen (ut libro vii. de simplicium medicamentis) facultate memorie prodidit Galenus) adurentis facultatis particeps est, sicut sinapi. Proinde coxendicis, & capitis dolores atq; adeo quocumq; aliud rubrificationem postulat, eo perinde atq; sinapi excalfaciunt. Miscetur quoque remedijs, quæ exhibentur asthmaticis, tanquam scilicet id, quod crassos succos ualenter incidere ualeat, uelut & sinapi. nam omnino ei simile est. Porro & herba arefacta similem semini uim possidet. Humida uero adhuc, & uiridis propter aqueæ humiditatis admistionem, multo semine inferior est : adeoq; sic mordacitas eius moderata est, ut cum pane ea uti liceat, ceu obsonio. Καρδάμων Græcis, Nasturtium Latinis uocatur : Mauritanis, Norf alchaf, seu Narf : Italis, Nasturtio, & Agretto : Germanis, Kressen, & Gartenkress : Hispanis, Nastureyo, & Malpica : Gallis, Cresson de iardin, & Nasitort.

## Thlaspi.

## Cap. CL.



Thlaspi cōsideratio.

Thlaspi uires ex Gal.


THLASPI herbula est angustis folijs, digitali longitudine, in terram uersis, subpinguibus : binum dodrantum cauliculo, tenui, non sine adnascensibus ramis : fructu circa ipsum totum, ab extremo in latius se pandente : semine nasturtij, incluso uasis in cacumine diuisis, t lenticulæ effigie, nisi quod infringitur : unde nomen accepit. flos albicat. Nascitur in semitis, & sepibus, fossisq; . Semen asperi gustus, excalfaciens : bilem utrinq; extrahit. potum acetabuli mensura : prodest ischiadicis infusum : sanguinem potu educit, internas suppurationes rumpit : menses ciet, sed partus enecat. Alterum thlaspi tradit Crateuas, quod aliqui Persicon sinapi uocant, latis folijs, radicibus magis : utile ischiadicorum infusum.

TAMETSI uon desint, qui existimauerint, Thlaspi, & Eursam pastoris unguis dictam unam, & eandem esse plantam : cum tamen huiusce Eursæ pastoris folia, quæ per ambitum sinuati laciniata uisuntur, semenq; his, quæ de Thlaspi memorie prodidit Dioscorides, & Galenus, minimè conueniant, eorum sententia prorsus explodenda uidetur. Caterum legitimum reperiri in Italia certum est : siquidem eo maximè abundant & Goritij ager, & Gradisca moenia, ea parte qua Sontius alluit. Nascitur frequentissimum, & acerrimum in Pago sancti Petri non longe à Goritia, alijsq; circumstantibus locis, semine perquam acris in folliculis incluso, in cacumine diuisis, lenticulæ effigie, superna parte pressis, ut Dioscorides inquit. Meminit Thlaspi Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Thlaspi semen habet & ipsum facultatem acrem, adeo ut internos abscessus potum dirumpat. Menses ciet, & foetus enecat. Per sedem infusum sanguinolenta euacuans, ischiadibus prodest. Est enim alioqui tum supernè, tum infernè biliosorum humorum euacuatorium, acetabuli mensura potum. Et libro primo de antidotis : Utuntur Thlaspi (inquit) quod è Creta affertur, quodq;

sanguinolenta euacuans, ischiadibus prodest. Est enim alioqui tum supernè, tum infernè biliosorum humorum euacuatorium, acetabuli mensura potum. Et libro primo de antidotis : Utuntur Thlaspi (inquit) quod è Creta affertur, quodq;



## BURSA PASTORIS.



ARABIS.



quodq; ubiq; nascitur, colore inter luteum, & flauum mediū, figura rotundum, exiguum adeo, ut multoties grano milij cedat. Melius est autem ē Cappadocia comportatū thlaspi imponamus. Hoc ad nigredinem inclināt: figuram nō exactē rotundā habet; & antedictū magnitudine permultū superat, atq; ab uno latere paruum quandam, ueluti compressionem præ se fert, unde et nomen obtinuit. Prouenit autem ut hoc, ita & illud in Cappadocia quā plurimū. Ideoq; non absolutē quod inde asportatur, optimū censendum est, sed quod peculiariter in Sauro nascitur, nec Cretico, nec passim nascenti simile. Hæc de thlaspi Galenus. Ex quibus satis cōstat, Italicū thlaspi illi, quod Cappadocia profert, non esse uiribus comparandum. Porro illud animaduertendū esse duximus, quod hoc in loco legitur in Dioscoride: Θλάσπι βοτάνιον ἐστὶ τενὸν τοῖς φύλλοις, ὡς δακτύλου μήκος, πεπρωμένον ἐπὶ τῆς γῆς, ἀκροσχηδόν, ὑπολιπαρὸν. id est. Thlaspi herbula est angustis folijs, digitali lōgitudine, in terrā uersis, in cacumine diuisis, subpinguibus. Atqui diuisuræ eæ in nostrati non uisuntur in folijs, sed in felliculorum cacumine. Quo fit, ut planē suspicer hoc loco Dioscoridis codici inendum ac uitū subesse, ut in alijs compluribus: & quod fortasse nota hæc, quæ propria felliculorum est, librariorum incuria in folia transferit, præsertim quod in cæteris notis nostrū Dioscoridis, et Galeni descriptioni prorsus adstipulatur. Hæc igitur ratione is locus, nobis uisus est, qui restituatur, & legatur, quemadmodū nūc in textu legi potest. Reliquum est, ut de BURSA PASTORIS, cuius superius nemini aliquid in medium afferamus. Sed cū ueteres nihil de hac posteritatis memoriæ mandauerint, ea tantum recensebo, quæ a recentioribus de eius uiribus adnotata inuenio, cū planta ipsa omnibus uulgō notissima sit. Est igitur Bursa pastoris ex refrigerantium, exiccantium, & adstringentium genere. Quapropter prodest attrita, & emplastri more imposita inflammationibus, et sacris ignibus. Decoquitur pluuiāli aqua cū plantagine, et Armenio luto, bibiturq; eius decoctū ad intestinorum difficultatem, & ad cruentas excreationes. Herba succus recentia uulnera glutinat, et auribus purulētis infusus medetur. Sistit mensium abundantiam, si eius, & persicariæ decocto insideant mulieres. Esturq; ad idem, & contra deniq; omnes sanguinis fluxiones, efficax est tenui pulcicula circumlita, & in oleo frixa. Additur in emplastris, quæ ad capitis uulnera componuntur, & in unguentis compluribus. Quæ herba θλάσπι Græcis, Thlaspi quoq; Latinis dicitur: Barbaris, Nasturtium tectorum: Italis, Thlaspi: Germanis, Bisemkraut: Hispanis, Paniqueso de flor blanco: Gallis, Senecle Sauvage.

Dioscoridis  
locus restitu-  
tus.Bursæ pasto-  
ris uires.

Nomina

† Hoc loco Ruellius legisse uidetur *κακιστὸς*, quod uerte-  
rit lenticulæ effigie: nec temere, quod Thlaspi semen illi pulchrè  
respondeat. Verū uulgati Græci codices habent *διονιστὸς*  
hoc est, disci figura.

## Arabis, siue Draba. Cap. CLI.

DRABA herba ad cubiti altitudinem assurgit, tenues  
spargens ramos, & ex utroque latere folia, ceu lepidij, sed  
moliora, & candidiora. In cacumine uerò sambuci um-  
bellam gerit, candidos flores habentem. Herba hæc cū  
prisana coquitur, in Cappadocia maximè. Semen aridum  
pro pipere obsonijs admiscetur.

NASCITUR in Ananiensi agro, præsertimq; in campe-  
stribus, & agrorum marginibus, cubitalis planta, folijs lepidio  
non dissimilibus, & umbella frè sambuci, Drabam adamusim re  
D frens

Drabæ con-  
sideratio.




Nomina.

frengens. quemadmodum et in Gallijs nasci Ruellius testatur in noualibus, & sepe cultis. Ceterum quoniam Serapionem nasturtij mentione, de Draba etiam differit, eamque Nasturtium orientale nominat, quod insignis eius acrimonia indicium est: & quoniam in nostrate leuiuscula sentitur acrimonia, idcirco an hæc, quæ in Italia nascitur, Serapionis sit tem sit Draba, ego profecto affirmare non ausim: nisi forte in Drabæ accadat pro regionum diuersitate, quemadmodum Aro, euenire inferius dicitur ex Galeni auctoritate. Herba, quæ ἀραβίς, & δρᾶβη Græcè, Arabis & Draba Latinè, pariter & Italiè appellatur: Barbaricè, Nasturtium orientale: Gallicè, Draue.

## Irio.

## Cap. CLII.



Erysimi, seu Iriionis consideratio.

**ERYSIMON**, Latini Iriionem uocant, iuxta urbes rudera, hortosque nascitur: folijs erucæ syluestris: cauliculis in lori modum lentis, & obsequiosis: floribus luteis; siliquis in cacumine gracilibus, ut fœno græco, corniculatis: semine nasturtij, exiguo, urentis gultus. Contra thoracis fluxiones efficax est, & si purulenta extusuntur: regio morbo, & coxendicibus prodest: contra uentana in delinctu cum melle datur. Illinitur ex aqua, aut melle utiliter cæcis carcinomatibus, parotidibus, duritijs marumarum, & testium inflammationibus. In totum extenuat, & excalfacit. Mitius multò ad clysteres fiet, si aqua melle defcat, atque torreatur, vel linteo illigatum, pinfita farina oblitum perassetur.

**QUANQVAM** Theophrastus, & antiquorum alij Erysimon inter cerealìa commemorant: & sesamo simile faciunt: quod tamen à Dioscoride representatur, folijs erucæ emulis, tanquam ab illo admodum dissimile, hic inter acerrimas plantas, non inter frumentacea, ubi de sesamo differuit, ab eo repositum est. Erysimon propter facile dici potest, Erysimon aliud designare Theophrastus aliud uero Dioscoridi. Ideoque Plinius utrisque in Erysimi hystoria ad stipulari uidetur. Namq; lib. xvi. cap. vii. ac x. Theophrastus secutus, ipsum frugibus adscribit, sesamoque simile facit. Et lib. xxii. cap. xxv. Dioscoridem imitatus, folijs erucæ paulò angustioribus, & semine nasturtij Erysimum esse prodidit. Hoc idem pliniam fecisse Galenum: quippe qui lib. vi. simplicium medicamentorum, Erysimum plantis comparauit, quæ acrimonia facilius sunt, uti nasturtium, & sinapi. Et lib. i. de alimentorum facultatibus ipsum inter fruges retulit, quæ in cibum ueniunt, una cum sesamo.

Ruelli, &amp; Her molai lapsus.

mo, sic inueniens. Ut porro milio panicum ad simile est quodammodo, sed ad onnia deterius, ita & sesamo Erysimum corporis substantia nonnihil affine: sed mansum insuauius est, & tenuior alimentum, adeo quod in omnibus illis deterrimus existit. Ceterum Ruellius, quod dixerit Plinius Erysimum, & sesamum rubentibus prouenire folijs, item ipsi uirentibus nullum animal uesci, illud frugis genus autumat Erysimum esse, quod uulgo Tridentina rura appellat. Formentone, Foroiulienses uero, quod pullo sit colore, nominant Saracinò. Verum hæc in re Ruellius deceptus, quod uulgo appellatur Formentone, caule tantum rubet, non folijs, à nulloque pecude respuitur, sed ab omnibus audistis deprecatur, nec ulla ex parte sesamum emulatur. Porro sciendum est, Dioscoridis Erysimum non esse syluestrem erucam illam, quam nos nobilem appellamus, ut credit Hermolaus, itemque Ruellius ipsum secutus, sed stirpem esse, quæ passim in plateis edificiorum areis, & rudibus, & secus uias oritur, folijs erucæ, floribus luteis, paruis: e quibus cornicula prodeunt, tenuia, acuminataque: semine nasturtij, minore tamen, & acri. Id Græcis ἐρύσιμον dicitur, quod Latinis similiter Erysimum, & Irio: Italis, Erisimo, & Irione: Germanis, Hederich, & Vuilder senff: Hispanis, Rinchaon: Galliis, Velar, ou de la tortelle.

Nomina.

## Piper.

## Cap. CLIII.

**PIPER** in India nasci, breui arbore traditur. quæ inter initia, prælongum fructum, ueluti lilium quam, promit, quod longum piper est: habet intus aliquid tenui milio simile, quod tandem in perfectum piper euadit. Id autem suis temporibus dehiscens, pandensque sese, racemos emittit, & granula ferentes qualia uidemus. Ea acerbam candidum piper faciunt, aptum ocularibus remedijs, antidotis, & medicaminibus, quæ contra uenenata parantur, theriaca uocant. Longum uero uehementius mordet: & quoniam priusquam ematurescat, decerptum est, subamarum relinquitur, antido-



lectum, sit odoratum esse constat, candido suauius, acrius, & origratius, necnon ad condimenta vtilius. sed candidum, & adhuc in acerbum uergens, antedictis infirmius est. Eligi oportet grauissimum, plenum, nigrum, sine multis rugis, recens, ac minimè furfurosum. Inueniuntur etiamnum in genere nigri semina nutrimento defecta, casta, inania, minimè ponderis, quod uocant brasma. Vis omnium excalfacit, urinam ciet, concoquit, extrahit, discutit, absterget caliginem, quæ oculis obuersatur. Piper febrium horroribus circuitu repetentibus, siue potu, siue illitu subuenit: serpentium moribus auxiliatur: partus extrahit: conceptum adimere creditur, statim à concubitu suppositum: tussi, omnibusque pectoris uitijis, siue eclegmate, siue potu succurrit: cum uua passa manducatum pituitam à capite elicit: ualitudinem tuetur, dolores finit, appetentiam mouet, concoctionem adiuuat. ad intinctus esculentorum additum: strumas cum pice discutit; uutiligines ex nitro emaculat. Fictili nouo, † ut aiunt, motum torretur. Non est huius arboris radix gingiber, ut aliqui existidit, sicuti paulò post ostendemus. Nanque piperis radix costo similis est, ora gustantium accendit, saluam ciet. Hæc liencm reprimat, cum aceto illita, aut pota: caput etiam purgat, manducata cum semine pedicularis herbæ, quam staphidem agriam uocant.

**LYSITNAI** navigationibus suis hoc æuo confectis per oceanum Atlanticum uersus austrum priuò, & hinc deinde in orientem ad Calecut, Taprobanam, aliasque Indici pelagi insulas: item Hispani liburnicis uelut ad occidentales Indias, Peru, atque alias complures regiones, quæ antiquos Geographos penitus latuerunt, non modò Piperis, sed et huiusmodi odoratis simplicibus uniuersam repleuerunt Europam: sed et stirpium historias, à quibus oriuntur, posteritatis memorie prodiderunt. Quod postea fecit, ut nobis planè ignorasse uideantur Theophrastus, Dioscorides, & Plinius aut ob regionum distantiam (indigenam potius in hoc fidem secuti, quàm quòd forte ea uiderint, quæ de pipere scriptis tradiderunt) aut ob aliam quânuis causam, plantæ illius formam, ac notas, quæ piper in Indis gignit, ac quoniam modo piperis planta suum edat fructum, an scilicet racematim, an corymborum modo, an in siliquis inclusum, an baccifarum arborum more. Siquidem Plinius lib. XII. cap. VII. ita scribit. Arbores quæ piper gignunt, iuniperis nostris sunt similes. Quamquam in fronte Caucaſi solibus opposita gigni tantum eas aliquid tradidere. Semina à iunipero distant paruulis siliquis, quales in phastolis uidemus. Hæ priusquàm dehiscant, decerpæ, tostæque sole, faciunt, quod uocatur piper longum. paulatim uerò dehiscences per maturitatem, ostendunt candidum piper, quod deinde tostum solibus colore, rugisque mutatur. hæc Plinius. Quibus à Dioscoride non longè distidere uideretur, nisi piperis plantam similem iunipero reddidisset: nanq; Dioscorides nullis eam notis repræsentauit, neque alicui similem fecit. Theophrastus præterea quamquam scriptum reliquit lib. IX. cap. XXII. de plantarum historia, Piperis duo esse genera unum rotundum, alterum oblongum; eius tamen arboris effigiem silentio præterijt. At hi, qui suis liburnicis immensa traiecerunt maria, propriasque perlustrarunt regiones, ubi piperis utriusque plantæ innumere uirescunt, nigri, ac rotundum gigni narrant à quibusdam infirmis uiticulis uicinas arbores altiore complexu scandentibus, acutæ clematidi non dissimilibus, folio tamen malum Assyrium æmulantibus. Quin et racematim proferri uuarum labruscæ modo, confertius tamen, deinde mense octobri per maturitatem decerpi, et subseruienti sole tegetibus palmeis expansum torreri, quousque uigrescat, et rugosum euadat: quod tridui spatii plerumque fit. Longum autem, ut iidem testantur, aliæ ferunt arbores, estque uelut nucamentum quoddam, exilibus granulis squamatim compactum, quod uelut iulus in pontica nuce, cui pulchre adstipulatur, uermiculosa facie dependet, piperato gustu: nunquam tamen in album, uel nigrum piper coalescit. Galenus indigenam fidem, uidimus nos Neapoli, qui Lusitanorum descriptioni maxime respondere uisus est, quòd uiticuloso caule esset, clematidis acutæ modo. Sed et aliam arbusculam piper racematim proferentem uidi Venetijs, quæ prorsus illius plantæ faciem exprimit, quam uulgus Ribeni appellat. Viret hæc in horto clarissimi medici Maphei à Mapheo, in quo plurima simplicia notatu digna uisuntur. Quo fit, ut mirum non sit, si in piperis historia uariant auctores. Quandoquidem cum uarie in Italia piperis feræ habeantur arbusculæ, facile credendum est, uarietatis longè maioris eas in Indis reperiri. Piperis meminit Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Piperis radix uirescens etiam maturo humidius est. Porro fructus eius nuper quidem admodum germinantis, longum piper est: quare sed post paulò incipiat, uerum plusculum duret. Porro fructus, qui uelut onuphax est, piper album est, nigro quidem acrius. Nam illud iam quasi superassatum est et superexiccatum. Verum utrumque ualenter tum excalfacit, tum desecat. Ceterum quoniàm Dioscorides inter simplicia de CARYOPHYLLIS, quæ mihi piperi in mentem redegit, nihil posteritatis memorie mandauit, cum ea ex eisdem afferantur regionibus, sintque in præcipuo medicorum usu, adeò præstantissimam, odoratissimamque medicamentum, silentio non dissimulandum duxi. Prouenit igitur Caryophyllorum arbor in orientali plaga, quibusdam Indici pelagi insulis, non longè à Badan. Huius caudex buxo similis est, eademque materies. Folia uerò cinnami uulgaris instar habet: sed rotundiora. Fructu est paruo, ex atro rufescente, inclauis modum capitato, exerts in aduersum quatuor denticulis sese stellatim decussantibus, prostrato prius circumquaque tegetibus palmeis solo. Caryophylli meminit Plinius libro XII. cap. VII. his uerbis. Est etiamnum in India piperis grani simile, quod uocant Caryophyllon, grandius, fragiliusque. Tradunt in Indico luco id signi. A duebitur odoris gratia. Horum nusquam inuenio mentionem scisse Galenum: tamen si Serapio ex Galeni auctoritate

Piperis, & plæ  
te eius histor.

Plinij lapsus.

Piperis plæte  
in Italia.

Piperis uires  
ex Galeno.


Caryophyl-  
lorum hist.



Caryophylli  
floris & eius  
mentio.

floritate plura de Caryophyllis tradiderit suo de simplicium medicamentorum uolumine. Quamobrem crediderim aut Galeni librum, in quo de Caryophyllis differuit, perijisse, aut Pauli potius, quam Galeni testimonio de his scrip-  
pisse Serapionem. Nam de Caryophyllis prius Paulus iisdem, quibus postea Serapio, uerbis tractauit, libro vi. ubi hæc habet. Caryophyllon, quasi dicas nucifolium, non eam habet substantiam, qua nomine pretenditur, sed est India ueluti flores cuiusdam arboris fistucacei, & nigri sunt, longitudine fere digitali, odorati, acres, subamari, calidi, & sicci in tertio propemodum ordine: qui multiplicis usus sunt, tum ad obsonia, tum ad alia multa medica-  
menta. Caryophylli, ut scribit Serapio, iecinori, stomacho, & cordi auxiliantur. Concoctionem adiuuant, & alui fluxiones cohibent. Quinetiam eorum puluis quatuor drachmarum pondere cum lacte sumptus, ueneras uires ad-  
auget. Exacuunt præterea, Auicenna auctore, oculorum uisum, & eorum mubecculas, argemasque exterunt. Atque hæc  
que hætenus de historia & uiribus Caryophylli seminis aromatici. Cæterum quoniam in Caryophylli nomen uacat  
dimus, hic non prorsus intactos reliquemus flores illos, qui ab odore similiter CARYOPHYLLI, & Caryophyl-

## CARYOPHYLLVM FLOS ALTILIS.



## CARYOPHYLLVM FLOS SYLVESTRIS.



uulgo uocantur. Hi quidem non fuerunt, quod ego sciam, a ueteribus cogniti, etsi nobis hodie sint adeo celeberrimi, ut  
gares æque ac iucundi, ut superuicaneum putem & plantam, & flores eos describere. Quare satis fore duxi, si  
hoc loco eorum imagines duntaxat exhibuero. Cum igitur duo sint eorum summa genera, nos primo Caryophyl-  
lum florem altilem seu satium, deinde sylvestrem depingi curauimus, ut ex duplici effigie, quam damus, aperte  
cognoscitur. Quod Græci πέντεπρι, id Piper Latini uocant: Mauritanii, Fulsul, seu Fulsul: Itali, Pepe: Ger-  
mani, Pfeffer: Hispani, Pimienta: Galli, Poyure. Quod uero Græcis καρπόφυλλον, Latinis pariter Caryo-  
phyllum appellatur: Mauritanis, Carunsel, seu Charunsel: Barbaris, Gariophilus: Italis, Garofano: Germanis, Naro-  
gel: Hispanis, Clauo de especia, siue Clauel: Gallis, Giroples.  
Ex Græcis uulgatis codicibus aliqui hoc in loco scriptum habent πέντεπρι, quod sonat, ut dicunt: alij uero πέντεπρι  
φάνη; id est, ut lenticula. Vnde etiam ex interpretibus alij hanc, alij illam secuti sunt lectionem. Oribasius uero nec  
hoc, nec illud legit: qui præterea alia multa & hic, & alibi non describit, quæ fortasse non temere quis illegitime  
iudicare possit.

Nomina.

## Gingiber.

## Cap. CLIII.

GINGIBER sui generis planta est, in Trogodytica Arabia magna ex parte nascens. Quæ uir-  
rente ad multa, perinde atque nos ruta, utuntur: & primis potibus, & edulij admiscunt. Huius  
radices, cyperi modo, parue sunt, candicantes, & odoratæ, atque piper sapore imitantur. Lig-  
debet.



debent, quæ teredines non nouerunt. A multis tamen ob id condiuntur, quòd celeriter cariem sentiant: & fistilibus in Italiam asportantur. Ginger cibo conueniens est, & cum condimento assumitur. Excalcetoriam uim, & excoquentem habet: aluum leniter emollit: stomacho utilis est: effica aduersus ea, quæ oculis caliginem offundunt, in antidota addi solet. In summa, piperis uiribus respondet.

**GINGIBER** (ut referunt Lusitani, qui plurimum se uidisse fatentur in India) radix est, quæ geniculatis repit internodijs, folijs arundinaceis, quæ bis, teruè in anno reuiuiscunt, ac reuiescunt, sed quæ in cacumine fastigiantur graminis amplitudinem non excedere aiunt, nec quicquam in ea regione frequentius inueniri. Subdunt nonnihil subesse discriminis in sapore cum præcox eruitur. Opportunum demetendi tempus, cum folia inaruerint, alioquin & teredini obnoxium est, & carie tentatur. Eruiiturq; uoumquam eius radix libra pondo. sed non omnibus eadem est amplitudo. Plus in profundum non agitur, quam ad ternos, quaternosue palmos. Cum eruitur, radices internodum in scrobe fissores relinquunt, terramq; illi aggerunt, ceu eius radices semen, proximo anno eructuri fructum, id est, regerminatas radices. Aduerhitur ginger in Italiam copiosum ex Calecut magno India emporio, atque ex Troglodytica Arabia non solum tractu temporis exiccatum, sed & saccharo recentissimum asseruatum, uel quodam mellis genere, quod quibusdam è siliquis exprimunt. Id sanè longè magis Veneto præstat: cum hoc officinarum mangonio ex aridis fiat radicibus, longo temporis tractu modò acerrimo lixiuio, calce, quernòque cinere parato; modò muria; modò dulci aqua maceratis, & edonitis, quibus non modò odor deperditur, ac euanesceit; sed & sapor, & acrimonia subtrahitur. Illud uerò cum statim è terra effosum nulla ferè maceratione condiatur, uires & facultates non exiit, sed eas seruat. Quamquam Brasauoli non rectè, meo quidem iudicio, uelle uideatur, quòd Venetijs mangonizatum Ginger gustantibus plus acrimoniæ relinquat, quàm illud, quod recentissimum in India siliquarum melle, aut saccharo conditum asseruatur, & cum alijs aromatum generibus ad nos conuehitur. Quod quantum à ueritate, & ratione dissonet, ij iudicare poterunt, qui diu in myropolijs uersati, rem omnino exploratam habent. Gingeris uires memoriæ prodidit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Gingeris radix utilis est, quam utique ex Barbaria ad nos conuehant. Excalcetoriam potenter, sed non primo statim occurso, uelut piper: unde sanè & minus esse subtilium partium, quàm piper, existimandum. Siquidem in tenues solueretur partes, & celerrimè actu ut illud fieret calidum. Apparet enim illaborata, & crassior adhuc quædam ei inesse substantia, nec ea sicca, & terrestris, sed humida potius atque aquea. Quo fit, ut facile perforetur, cum scilicet recrementitia insit humiditas. Neque enim quicquam eorum, quæ aut plane sicca sunt, aut humida, sed elaboratam, & familiarem continentia humiditatem, huic uitio obnoxia sunt. Idem usu uenit piperi longo. Atque hinc est, quòd diutius perseverat, quæ proficiscitur à gingere, aut pipere longo caliditas, quàm quæ ab albo, aut nigro. Nam sicut ab aridis calamis flamma simul celerrimè accenditur, & undequaque dispergitur: eundem in modum, quæ à siccis potestate medicamenti editur caliditas. At quæ prodit ab humidioribus, ceu ligna sunt uiridia, & tardius accenditur, & durat diutius. Ex quo fit, ut utriusque medicamenti diuersus sit usus. Siquidem ubi totum corpus celeriter excalfacere consilium est, ea tum exhibenda sunt, quæ & celeriter à caloris nostri contactu incallescant, & celeriter quocumque ferantur. Verum ubi partem quamuis refrigeratam recalfacere studemus, contrà agendum, uimirum quæ tardè calescentia plurimo tempore perdurent, ea offeruntur. Caterum licet ginger, & piper album hac ratione à nigro pipere differant; non magna tamen est differentia. At nasturtium, napi, thapsia, & agrestium columbarum sterus maiori tempore persistè accenduntur, & plurimo tempore perdurant. hæcenus Galenus. Faciem gingeris representat radex illa, quam Mauritani, & officinæ ZEDQARIAM appellant, odoratio tamen, amariuscula, neque adeò ut ginger acris. Huius iusquam, quod sciam, meminerunt ueteres Græci, etsi recentiores ab Arabicis ea clxxii. testis est Serapio) conuehitur è Sinarum regione ultra extremas Indiæ oras. Excalcet, & siccet oras præ secundo. Flatus discutit, & pinguedinem auget propria quadam facultate, non quidem elementari. Post sumitur: alui fluxiones sistit, uteri abscessus resoluit, uomitiones reprimit, & coli cruciatus tollit, itemq; uentriculi. Alui tinea quasunque enecat, & in antidotis additur. Ideoq; dixit Auicenna, nihil esse ea præstantius ad ebibitum napellum. Non desunt, qui crediderint, quòd ARNABO, de quo scribit Paulus, & Mauritanorum zedoaria non esse, sed nec in Europam ad nos aduehi. Quo fit, ut Cordus aberrasse deprehendatur: quippe qui zumbet zedoarie genus existimet. Hunc fortasse secutus Fuchsius medicus doctissimus, in libro de compositione medicamentorum, quem locupletatum nuper edidit, non sine magno errore putat zumbet & zedoariam idem esse. Qui non minus in Arnabo quoque errasse cognoscitur, quòd uelit Doronicum orientale id esse, quod Paulo Arnabo. atqui res hæc aliter se habet, ut ex antè dictis satis colligi potest. Hallucinatur etiam hac in re Brunfelsius: quòd is scripserit suo de medicis uocabulis onomastico, quòd arnabo unguentum est odoriferum. Verum eius lapsus non aliam causam fuisse arbitror, quàm quòd oscitanter Paulum legerit: nam Paulus

Gingeris historia.

Brasauoli error.

Gingeris uires ex Gal.

Zedoaria historia. & uires.


Arnabo, & Zumbet historia.

Cordi, Fuchsius, & Brunfels error.



## HYDOPIPER.

Nomina.



Hydropiperis confid.

Ruel. lapsus.

## PERSICARIA.



apertissime afferit, Arnabo unguentis expeti, quod suauius  
leat, non autem unguentum esse, ut Bruusfilius somnasse uide-  
tur. Id *Zyrisep*, *Zyrisepis*, & *zyrisepis* Græce, quod  
item Latine *Zingiber*, & *Gingiber* nominatur: Arabicè, *Lam-  
gibel*, seu *Zingibel*: Italicè, *Gengeno*: Germanicè, *Ingher*.  
Hispanicè, *Gengiure*: Gallicè, *Gingimbre*. Quod uero *Zin-  
dap*, *Zádoup*, & *Zádapa* posterioribus Græcis, *Zadura*, &  
*Zedoaria* Latinis: pariter & Italis appellatur: Germanis, *Zi-  
tuuen*: Gallis, *Cretonart*.

## Hidropiper.

## Cap. CLV.

**HYDROPIPER** apud aquas nascitur, quæ su-  
gnant, aut pigro lapsu repunt. Caulem edit geniculatum,  
solidum, multis alis concavum: folia mentha-  
iora, molliora, candidioraque, gustu piperis, acri, citra  
tamen ullam odoris gratiam: fructum acrem, in succu-  
lis paruis, prope folia racematim coherentem. Folia  
semine illita tumores, veteresque duritias discutiunt, sa-  
gillata delent: quæ postquam inaruerunt, tusa pro pipe-  
re in obsonijs admiscuntur. Radix parua, nullius in me-  
dicina usus.

**TAMETSI** pro uirili parte contendat Ruellius, ut non  
minus doctis, quam elegantissimis uerbis comprobet, eam non  
spemendam stirpem, quam uulgo officinarum *Eupatorium* ap-  
pellat, legitimum esse *Hydropiper*; is tamen hac in re aperte ha-  
lucinari deprehenditur, quauis alioqui fuerit non modò in medi-  
ca materia peritus, sed & Latinis, & Græcis literis apprime  
doctus. Siquidem Dioscoridi *Hydropiper* folia edit mentha-  
iora, molliora, candidioraq; gustu piperis, acri, citra tamen  
ullam odoris gratiam: non autem amaro sapore, ut Ruellius ait.  
Dioscoridis uerba peruertens, quò facilius suam astruat senten-  
tiam. Vulgare uerò *Eupatorium* folijs crescit cannabinis, duris  
hirsutis, amaro gustu, non quidem acri, ut piperis: quinetiam  
adeò odoratis, ut hac de causa herbam esse uiribus insignem, qua-  
uis ab antiquis siletio prætermisam, semper existimauerim, cum  
tamen odoris fragrantia in *hydropipere* reperiri neget Diosco-  
rides. Præterea *hydropiperi* caulis inest geniculatus, solidus, &  
foliorum, & adnatorum exortu alis plurimis concavum: semine  
etiānum acri, in ramusculis prope folia racematim coherente.  
*Pseudo-eupatorio* uerò caulis est procerus, minime geniculatus:  
in cuius ramis nullum apud frondes racematim coheret semen:  
sed in cacumine flores gerit subrubetes, qui diuisi muscarij specie  
syluestris origani modo, per maturitatem in pappos euanescentem  
e quibus semen prodit amarum totius plantæ sapore; quamquam  
esse hoc acrimonia præditum non rectè Ruellius asseueret. Qui  
quoniã uulgare *Eupatorium* plerumq; in aquosis oriri consue-  
rit, id omnino legitimum esse *Hydropiper* pro certo asserere nõ  
dubitauit, nulla prorsus habita ratione, an aliæ inter se responde-  
rent notæ. Quamobrem, ut ex dictis rationibus clarissime patet,  
Ruellius hac in re nõ ita mature mihi uidetur sensisse, ut eius cla-  
ra doctrina, ingenijq; præstantia exposcere uidebatur. Quando  
quidẽ cum uulgare hoc *Eupatorium* primo statim occurru gustui  
amarorẽ relinquit haudquaquam obscurum, facillè hinc indicium  
consequi potuisset, hoc non esse *hydropiper*, quo unã cum sale in  
ciborum cõdimentis piperis uice prisca ætas utebatur: nam quæ  
amara sunt, præterquam quòd piperis uicem explere minime  
ualent in cibis addita, ab omnibus respuuntur tanquam natura  
inimica. Ceterum si in Italia *Hydropiper* nascitur, illa meo  
quidẽ



quidem iudicio est persicaræ ( ut uocant ) species, quæ in alterius discrimen, cui folia insunt pullo colore emaculata, nullis si milibus inficitur uotis, sed folio tantum uiridi adolescit. Quippe quæ folijs proueniat oblongis, menthæ maioribus, mollioribus, ac candidioribus: caule admodum geniculato, duroq; alis concauo: è cuius adnatis rufum semen racematim prodit, acri admodum gustu, ita ut linguam uehementer uellicet. Illud insuper hæc opinionem corroborat, quod prope stagnantes aquas hæc planta plerunq; uirescat, ubi eam Dioscorides nasci testatur. Meminit Hydropiperis Galenus libro viii. simplicium medicamentorum, sic inquires. Hydropiper à locis, in quibus nascitur, & à similitudine, quæ illi cum pipere in gustu est, nomen sortitum est. Cæterum calidum est, sed non tantum, ut piper. Attamen herba ipsa etiānum uiridis cum semine, cataplasmatibus in modum imposita, sugillata, & tumores induratos digerit. Herba, quæ Græcis ὑδροπέπερι, Latini similiter Hydropiper uocatur: Italis, Hidropepe, & Pepe acquatico: Germanis, Vuasser pfeffer, & Mucken kraut: Hispanice, Hierua pexiguera sin manchas.

Quæ Persicaria sit Hydro-piper.

Hydropiperis uires ex Gal.

Nomina.

## Ptarmica.

## Cap. CLVI.

PTARMICA exiguus frutex est, furculos habens paruos, multos, & rotundos, abrotano non dissimiles: & circa eos folia oleæ, longa, multa: & in cacumine capitulum, uti anthemidis, paruum, rotundum. quod suo acri odore sternutamentum excitat: unde nomen accepit. Folia cum floribus illita, sugillationes rapiunt. Flores sternutamenta efficacissimè mouent. Nascitur in montibus, & petrosis.

PTARMICA in Hetruria frequentissima prouenit. Nascitur & in Tridentino agro, præsertim Ananienfi tractu, furculis frequentibus, paruus, rotundus, abrotano non dissimilibus: è quibus plurima prodeunt folia incana, oleæ modo oblonga: unde & Oliuella à multis uulgò nominatur. Gerit in furculorum cacuminibus capitulum, chamæmeli deflorentis modo: cui quemadmodum & herbe, uis quædam adeo acris inest, ut olfactu statim sternutamenta exciet. Rura nostra ex Ptarmica scopas, quibus pauimenta uerrantur, conficiunt, nec in aliū colligunt usum. Huiusce nemini Galenus libro viii. simplicium medicamentorum, his uerbis. Ptarmicæ flores ciende sternutationis uim obtinent: est enim temperies eius calida, & sicca, uiri lis etiānum ordine secundo, siccata tertio. Eius nomen Græcum πταρμική: Latini item Ptarmica, & Sternutamentaria: Italicum, Ptarmica.

Ptarmicæ historia.

Ptarmicæ uires ex Gal.

Nomina.

## Radicula, seu lanaria herba. Cap. CLVII.

STRUTHIUM herba uulgò nota. qua purgandis lanis utuntur, qui eas eluunt. Huius radix est acris, uriniam ciet: prodest tussi, iocinorosis, orthopnææ ex melle sumpta, cochlearis mensura: aluum soluit. Eadem cum panace, & capparidis radice, calculos frangit, & cum urina exturbat: duritiā lienis absumit: menses imposita trahit: partus efficaciter enecat. Cum polenta autem, & aceto illita, lepras tollit: tubercula discutit, cum farina hordeacea, & uino decocta. Miscetur & malagmatis, & ocularibus collyrijs, claritatis causa. Sternutamenta mouet: per os purgat, trita cum melle, & naribus infusa.

STRUTHION, seu Radicula, adeo olim uulgaris uotitia fuit, quod purgandis lanis ea uterentur, ut Dioscorides eam uotis ullis representare superuacaneum duxerit. Sed cum tractu temporis huius exoleuerit usus, eius quoque notitia simul abolita uidetur. Quo fit, ut arduum sit nobis nunc diiudicare, quænam planta Italis Struthion iure dici possit. Mauritanis, & officinis Condisit ea nominatur, quam illi frequenter medicamentis adnascunt, quibus naribus inditis sternutamenta ciet. Nec propterea usquam in officinis nascatur in Italia: quippe quod hæcenus ipsum non modo non uiderim, sed neminem, qui illud cognosceret, & ostenderet, adinuenerim. Theophrastus inter folia aculeatas Struthium habet lib. vi. cap. iii. de plantarum historia. Plinius uero libro xix. cap. iii. his uerbis Struthion describit. At quæ uocatur Radicula, lauandis demum lanis succum habet: mirum quantum conferens candori, mollietateq; Aequè nascitur satiuā ubiq; sed sponte præcipua in Asia, Syriaq; saxosis, & asperis locis. Trans Euphratem tamen laudatissima, caule ferulaceo, tenui, & ipso cibus indigeuorum expetito, & tingenti quicquid sit, cum quo decoquatur: folio oleæ, Struthion Græci uocant. Floret ætate, gratia aspectu, uerum sine odore, spinosa, & caule lanuginoso. Semen ei nullum. radix magna, quæ conciditur ad quem dictum est usum. Struthij uires adnotauit Gale-

Struthij consideratio.



Struthij uires ex Gal. nus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Struthij radice potissimum utimur, utpote gustu acris, & calida, siccaq; temperamento, ex quarto quodammodo ordine. Sed & abstergit, & irritat: proinde quoq; sternutatio nem prouocat, ceu cætera omnia, quæ calida sunt temperie, & gustu acris. Ex his omnibus palam fit Fuchsiū uisum alioqui doctissimum, in hoc errasse, quod in suis de stirpium historia clarissimis commentarijs, plantam uulgò Struthium uocatam legitimum Struthium esse censeat, eamq; pro Struthio depingat. Hæc enim folio plantaginis exit, non oleæ; læui, non aculeato: caule geniculato, non lanuginoso: gustu potius insipido est, quam adeo acris, ut quatuor ex calfacientium ordinem attingat. Quæ herba spoudion Græcè, Struthium, Radicula, & Herba lanaria Latine dicitur: Arabicè, Condes, Chundes, seu Kunder: Barbarè, Condisi: Italicè, Radicetta, & Herba lanaria.

Nomina.

## Cyclaminus.

## Cap. CLVIII.



CYCLAMINVS folia habet hederæ, purpurea, varia, in quibus supra infraque albicant maculæ: caule nudo, quaternos digitos æquante: floribus in eo purpureis, rosarum effigie: radice nigra, & aliquantum pota, ut rapum uideri possit. Quæ cum hydromelice potuitam, aquamque detrahit: menses potu, appositum abiciet. Tradunt, si prægnans radicem transgrediatur, abortum fieri. partum appensa accelerat: contra venena, præsertim leporis marini, ex vino bibitur: illita contra serpentium ictus remedio est: immista vino inebriat: regium morbum discutit, tribus drachmis pota, cum pullo, aut diluto mulso. Sed oportet eum qui ebibit, multis vestibis contextum, loco calido, & à perfrictionibus tuto, recumbere, quod facilius exudet: eiectiones autem sudores fellei colore inueniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur: ad deicienda quoque alui excrementa, in vellere sedi subijcitur: illito umbilico, & imo ventre coxarum tenuis, aluum emollit, & abortum efficit: suffusionibus, & retusæ oculorum aciei, oblitus cum melle succus prodest. medicamentis abortum inferentibus admiscetur. Succus cum aceto illitus, prociuum sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix autem purgat, eruptiones papularum reprimat: uulneribus ex aceto perse, aut cum melle medetur, lienem absument, vitia cutis in facie, & alopecias emendat. Eius decocto luxata, podagras, & capitis ulcuscula, pernionesque foueri congruum est: ipsaque in oleo vetere seruescenda, illito oleo ulcera ad cicatricem perducit. Cauata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdum Tyrrenicæ ceræ momento, ut strigenti crassitudinem vnguentum contrahat, cum primis vitæ pernionibus. Radix, scillæ modo, concisa reponitur. Narrant, ad amatoria assumi contusam, & in pastillos diuisam. Nascitur in umbrosis, maximè sub arboribus.

## Alter cyclaminus.

## Cap. CLIX.

EST ET altera cyclaminus, quam cissanthemon, aut cissophyllon vocant: folijs hederæ, sed minoribus: geniculatis caulibus, crassisque, circa vicinas arbores, capreolorum modo se voluentibus, flore candido, odorato: acinis hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris: radice superuacua. Nascitur in asperis. Huius acini, drachmæ vnius pondere poti, cum uini albi cyathis duobus, quadraginta diebus, lienem per yrinam, & aluum absument: ad orthopnoeam bibitur: reliquias à partu purgat.

Cyclamini consideratio. Ruel. lapsus.

TAMETSI Cyclaminus prima, quæ uulgò Panis porcinus dicitur, planta sit uulgaris notitiæ; secundam tamen hucusque mihi uidere non licuit in Italia: quanquam asserit Ruellius, hanc illam esse stirpem, quam herbariorum, & officinarum uulgo Sigillum sanctæ Mariæ uocat. Et cum plures sint herbæ, quæ ab imperitis eo nomine appellantur, polygonatum scilicet, Serapionis secaculi, & tertia, quæ hydropiperi similis est; harum Ruellius nullam esse Cyclaminum putat, sed aliam ab his longe diuersam, cuius facies, ut ipse delineat, nil aliud representare uidetur, quam se Sigilli sanctæ Mariæ nomen sibi asciuisse, quod eam Mauritanii Bothomarienses nominant. Quæ in re Ruellius, eius pace dixerim, aperte fallitur: quandoquidem tota Mauritanorum familia primum tantum genus, non autem alteram



ram Cyclaminum Bothomarien nuncupat. Cyclamini primi generis duæ (ut Mesues auctor est) reperiuntur species, maior, & minor. Hæc radice provenit parva, nucis auellanae, cicerumq; magnitudine. Illa uero magna constat radice, in rapi modum extuberante, pullo colore: quæ (ut diximus) uulgaris admodum est, & passim in syluis, & umbrosis nascens. Minorem uidi ego in agro solùm Tridentino in uallis Anania montibus, ubi copiosa nascitur. Cyclaminus (ut idem Mesues memoria prodidit) tam hausta, quàm clystere infusa pituitam uiscosam mirifice detrahit. Colicruciatus tollit à pituita progenitos, aut ab induratis excrementis. Succus in erinis additur ad expurgandum cerebrum, quod diuturnos finiat capitis dolores, frigidisq; conueniat hemicranijs. Item resolutis opitulatur, ac omnibus medicamentorum, ubi ita scribit. Cyclaminus uarias uires obtinet: nam & abstergit, & incidit, & ora uenarum aperit, & attrahit, & digerit. Clarum uero id est ex particularibus operibus. Adeo uehemens eius facultas est, ut abdomine illito, uentrem subducatur, foetum interimat. Kunda ueros herba sic Græcis, Latinis quoq; Cyclaminus, & Rapum terra uocatur: Mauritanis, Buchormarien, Buthermarien, seu Bothormaria: Barbaris, Cyclamen, Panis porcinus, & Arthamita: Italis, Ciclamino, & Pan porcino: Germanis, Schuueinbrot, Erdapffel: Hispanis, Pan de puerco: Gallis, Pain de pourceau.

Cyclamini  
genera, & ui  
res ex Mes.

Cyclamini  
uires ex Gal.

Nomina.

## DRACUNCVLVS MAIOR.

## DRACUNCVLVS MINOR.



Dracunculus maior.

Cap. CLX.

DRACUNCVLVS maior in umbrosis circum septa gignitur. Caulem habet rectum, lauem, dum cubitorum, baculi crassitudine, versicoloribus draconum maculis, purpureis tamen euincens: folia rumicis, sibi inuicem implicata. Fructum summo caule facit, racemosum, coloris primum cineracei, mox per maturitatem in crocum, & purpuram vergentis: radicem prægrandem, rotundam, candidam, cortice tenui uelutitam. Colligitur, dum marescit, & succus exprimitur, siccatuq; in umbra. Radix quoque mensibus effoditur, elotaque particulatim conciditur, & funiculo transfixa siccat in umbra. Vis ei calfaciendi cum diluta uini potione. Crudam, coctam uero cum melle delingi prodest contra orthopneas, rupta, conuulsa, tussim, & destillationes: pota cum uino uenerem stimulat: ulcera, quæ cacoethe uocantur, atque phagedænica expurgat, præsertim cum uite alba. ex ea, & melle collyria ad fistulas, & partus euocandos componuntur. ad vitilignes cum melle, efficaciter illinitur: polypos, & carcinomata absumit. Succus ad oculorum medicamenta, item contra nubeculas, caliginem, albuginesq; effectum præbet. Herba, radicisque odor teneros conceptus abortu uitiat. item si triginta grana eius in posca bibantur. Sunt, qui eius succum cum oleo, an-

rium



rium doloribus infudere: quinetiam folia, utpote quæ adstringant, uulneribus recentibus imponere, & cocta in uino pernionibus. Qui folia manibus affricuerit, aut radicem exemerit, posse à uipera feriri inficiantur.

## Dracunculus minor.

## Cap. CLXI.

DRACUNCULVS minor folio constat hederaceo, magno, candidis notis insigni: caule recto, bicubitali, uersicolore, maculis resperso purpureis, ita ut anguem planè referat, baculi crassitudine: fructus summo caule recematum cohæret, colore primùm herbaceo, & cum ematuruit, croceo, gustu feruens, mordaxque, radice aliquantulum rotunda, bulbosa, aro non absimili, tenui obducta cortice. Nascitur in sepibus umbrosis. Seminis succus cum oleo instillatus, aurium doïorem mitigat: naribus etiam ex lana impositus, polypum absorbit: carcinomata illitu sistit: triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt. Odorem aiunt, postea quàm flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc teneros enecare. Radix excalfacit: orthopnceis, ruptis, uulsis, tussis, destillationibus auxiliatur: humores pectoris excreatu faciles reddit, siue cocta, tostaq; cum melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle delingatur. urinam pellit, uenerem excitat, cum uino pota: phagedænas ulcerum, & quæ cacoethe uocantur, trita cum melle, & bryonia alba expurgat, & ad cicatricem perducit: collyria ex ipsa ad fistulas, & eijciendos partus fieri solent. qui radice sua manus perfricauerunt, à uiperis feriri negantur, illita ex aceto uiliginis emaculat. Folia recentibus uulneribus linamentorum vice, conuenienter imponuntur: decocta in uino pernionibus apposuisse prodest. Caseus folijs inuolutus, à putredine defenditur. Succus radice ad nubeculas, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cocta, crudæue, ad sanorum usus, pro oïere recipitur. In Gymnesijs insulis; quæ Balaeres uocantur, coctam radicem cum melle multo, in coniuuijs placentarium loco offerunt. Radix melsibus effoditur, lotaq; frustatim conciditur, & lino traiecta, siccatur in umbra, & ita reconditur.

Dracunculo-  
rum confide-  
ratio.

LICET in uetustis quibusdā Dioscoridis codicibus maioris, minorisq; Dracunculi historia speciatim diuissis capitulis adnotata reperiatur: at tamen cum altera ab altera parum dissidere uideatur, cumq; etiam Galenus, Paulus, & Serapio, qui in simplicium materia Dioscoridem ad unguem secuti sunt, eiusq; dicta bona fide retulerunt, unius tantum Dracunculi meminerint; non ab re credidere recentiorum nonnulli, horum alterum ex alterius auctoris officina profuisse, & alicuius curiositate hic historia Dioscoridis accreuisse. Quamobrem ego quoq; cogor eidem adductus rationibus, aliquatenus in eorum ire sententiam. quanquam ingenue fateri possum, me utrumq; Dracunculum Tridactyli, ac Venticis uidisse. Alterum quidem, qui maior est, ari, siue rumicis folijs, sibi inuicem implicitis: caule bicubitali, baculi crassitudine, uersicolore, maculis in purpuram nigricantibus resperso, adeo ut angui similis uideatur. Alterum uero, qui & minor, & omnibus uulgaris est, folijs hederaceis, albis, quibusdam maculis conspersis: caule, ac fructu uiridibus. Quippe quod longam ex se uaginam emittat externa parte herbaceam, interna uero nigricanti purpurea infectam, è cuius medio corniculum profilit purpurascens, à quo demum racemosum oritur semen (ut Dioscorides inquit) cinereo primùm colore, per maturitatem uero aureo rufescent. Quinetiam in cæteris totius planta uoris, à maioris Dracunculi historia nihil ferè differre conspicitur. Quapropter etsi prædictæ recentiorum sententiæ non assensum refragari, quod rationibus satis eidentibus iuitatur, & doctissimorum consensu confirmetur; cum tamen sepius maiorem & minorem Dracunculum uiderim, non prorsus alienum esse mecum quandoq; cogitauimus, si quis suspicetur duo ut sunt dracunculi genera, à Dioscoride fuisse duplici etiam historia representata. Hanc quoq; illi suspicionem augere poterit Plinius, qui non tantum duas, sed quatuor enumerat Dracunculi species lib. xxi. cap. xvi. sic inquit. Id autem quod Græci Dracontion uocant, triplici effigie mihi demonstratum est, folijs betæ, non sine thyrsos, flore purpureo. hoc est simile aro. Alij radice longa, ueluti signata, articulosaq; monstrauere, tribus omnino cauliculis. Tertia demonstratio fuit folio maiore, quàm cornus, radice arundinacea, totidem (ut affirmabant) geniculata nodis, quod haberet annos, totidemq; esse folia. Quarti uero generis meminit ipse in sequentibus lib. xxv. cap. ii. cum inquit. Eadem Lusitania prouincia cognoui in agro hospitis nuper ibi repertum dracunculum appellatum, caule pollicari crassitudine, uersicoloribus uiperarum maculis, quem ferebant contra omnium morsus esse remedium. Alij sunt, quos in priori uolumine eiusdem nominis diximus: sed huic alia figura. Aliudq; miraculum exeuntis è terra ad primas serpentinæ ueruaciones bipedali ferè altitudine, rursusq; cum iisdem in terram se condentis: nec omnino occultato eo appareret serpens. hæc Plinius. Huc etiam accedat Theophrasti auctoritas, qui libro vi. cap. xi. de plantarum historia secundum dracunculi genus inter ari genera constituit, his uerbis Dracunculi autem radix (sunt enim qui genus quoddam ari dracunculum appellent, quod eius caulis uarietatem habeat quandam) cibo inepta penitus est, & medicis tantum commoda. Ex his igitur, & Plinij uerbis perspicuum omnibus fieri potest, plura esse Dracontia, siue Dracunculi genera, ut etiam Venetijs oculata fide comprobari potest in horto clarissimi medici Maphei à Mapheo, ubi præter Arum duo uidentur estate Dracunculi genera. Dracunculus, ut Galenus testatum reliquit lib. vi. simplicium medicamentorum, quiddam Aro persimile obtinet, tum folijs, tum radice. cæterum illo tum acrius est, tum amarior: ac proinde calfactorum magis, & tenuioribus partibus. Habet etiam leuem quandam adstrictionem, quæ quandoquidem cum prædictis duabus qualitatibus, acris scilicet, & amara, coniuncta est, medicamentum factum est intiq; maxime efficax. Nam radix uiscera omnia expurgat crassos potissimum, & lentos succos extenuans: optimumq; remedium est contumacium ulcerum, quæ κατὰ δὲ δὲ nuncupant. hæc Galenus. Cæterum de Dracunculo differens Mesues inter cætera simplicia medicamenta

Dracunculi  
species ex Plinio.



Dracunculi  
uires ex Gal.



medicamenta, quæ deiectionia ui pollent, scripsit, eo hausto deijci e corpore pituitam. Qua in re à Manardo acriter reprehenditur: quippe quòd ubi dixerit Galenus, ac etiam Paulus ipsum secutus, Dracunculum omnia corporis uiscea expurgare, non quòd deijciat, id agere intelligunt, sed quòd obstructiones aperiat, crassam pituitam attenuet, & uasa detergat. Ab omnibus his forma maxime differt HORTENSIS Dracunculus, quo in acetarijs uestimur.

## DRACUNCVLVS HORTENSIS.

## OPHIOGLOSSVM.



utimur; ad intinctus acerrimo gustu, folio oblongo, radicibus humi repentibus, graminis modo. Sunt qui asserant hanc plantam cultorum mangonio factitiam esse, & non sui natura prouenire: eam siquidem nasci putant lini semine excauatis cepis imposito, ac deinde terra recondito. Sed hos falli crediderim, quòd facto periculo, operam quidam perdidderint. Huius nec Græci, nec etiam Mauritanii, quod sciam, meminere. Verum perpensa eius acrimonia, qua maxime linguam uellicat, eorum esse medicamentorum, quæ ualentissimè excalfaciunt, facile conijci potest. Habetur præterea & alia herba, quam inter Dracunculi species, quidam recensent, quòd LINGVA Serpentina nonnullis dicatur, etsi non desint, qui Lucciolam, & Argentinam ipsam appellitent. Nascitur hæc in pratis, sed ocysime deperditur. Proflit enim mense maio, sed cum tenerrima sit, paucò post tempore euasida flaccescit, ac subinde nuda quam apparet. Mittit unum tantum folium, pingue, plantagini aquaticæ uocatæ haud dissimile, è cuius inferiore sinu cauliculus exit, pallidam serpentis ligulâ in cacumine gerens: unde Græcorum uoce Ophioglossi nomen inuenit. Præstat hæc maxime ad recentia uulnera glutinanda. Quo fit, ut eam quidam mirifice extollant ad enterocelas. Macerantur in oleo, quo utuntur chirurgici ad prædicta felici (ut aiunt) successu. Δρακόντιον quod Græci uocant, Latine Nomina. Taragontia: Gallis, Serpentine.

Dracunculus hortensis.

Lingua serpentina, siue Ophioglosson.

Nomina.

## Arum.

## Cap. CLXII.

ARON, apud Syros lupha uocatum, folia emittit dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta maculis: caulem subpurpureum dodrantalem, pistilli specie, à quo croceum semen exit: radice dracunculi alba. quæ decocta estur, utpote cum minus acris sit. Folia ad esum condiuntur, & arida perse, decocta manduntur. Radix, semen, & folia dracunculi uires habent. Priuatim radix ex fimo bubulo podagris illinitur. & dracunculi more reponitur. In totum, ob mitiorem eius acrimoniam, in cibum expetitur.



Ari confide-  
ratio.

ARVM.

Ari uires ex  
Galeno.

Nomina.




ARISARVM.

ARVM in Hetruria, item in agro Goritienſi, frequentiffi-  
mum prouenit, in campeſtribus, in uineis, in ſcrobium margini-  
bus, & paſſim in ſemitis propter ſepes, præſertimq; in maritimis  
noſtris Senenſibus, ubi uulgò ipſum uocant Gigarò ad Iarum allu-  
dentes: quo modo officinis Arum corrupto uocabulo appellari ſo-  
let. Noſtrates mulieres ex Ari radicibus ſtillatitias aquas ad ſu-  
perant, quas ad faciẽ erugandam, illuſtrandamq; magnis Landi-  
bus efferunt. Id quod etiam efficaciter præſtat inſolatus radicum  
ſuccus, ceruſſa ſpeciem referens, quem Gerſa uulgò nominant:  
is ſiquidem mirum in modum carni ſplendorem, & candorem con-  
ciliat. Ari uires memorie prodidit Galenus lib. xi. ſimp. med.  
ubi ita ſcribit. Arum terrena eſſentia conſtat, ſed calida: proinde  
extergendi uini poſidet, uerum non ualentem, ſicut draconium.  
Eſt itaq; in exiccando, & calefaciẽdo primi ordinis. Radices eius  
maximè ſunt utiles: ſiquidem comẽſe craſſitiem humorum medien-  
riter incidunt, adeo ut & excreationibus ex pectore idoneæ ſint:  
ſed magis tamen aptum eſt draconium. Et lib. ii. de aliment. fac-  
cult. ſic inquit. Ari radix rapi modo mandatur. In quibuſdam au-  
tem regionibus acrior quodammodo uſcitur, ut draconio ſere ſi-  
milis ſit. Dum rectè parare uoles, prioris decoctionis aqua effuſa,  
repente in alteram calidam inſicere conuenit. Cyrenis contra,  
quàm in noſtra regione, Arum ſe habet: nam illic minimum medi-  
camentuſi, minimumq; acrimoniæ poſidet, adeo ut uel rapiſ ſit  
utilius. Idecirco radicem quoq; in Italiam comportat, ut quæ abſq;  
ut putreſcat, aut regerminet, longo tempore perdurare poſſit.

Herba, quam Græci ἄρον, & Latini ſimiliter Arum dicunt  
Mauritanis Iarus & Sara uocatur: Barbaris, Aron, Barba-  
aron, Dragontea minor, & Serpentaria minor: Italis, Aro,  
& Gigarò: Germanis, Klein natter wurtz: Hiſpanis, Yaro: Gal-  
lis, Vid de chien.

ARISARVM ALTERVM.





## Arifarum.

## Cap. CLXIII.

ARISARVM exigua herbula est: cuius radix oleæ magnitudinem implet, longè maioris quam aro-  
aron acrimonie. Vnde illitu nomas sistit. Fiunt collyria ex ea, ad fistulas efficacia. Illitu radicis, ge-  
nitale animalis cuiuscunque in perniciem agitur.

ARISARON, Plinio lib. XXIII. cap. XVI. auctore, in Aegypto nascitur, similis aro, minor tantum, Arisari histo-  
ria.  
minoribusq; folijs, & utique radice, quæ tamen oliuæ grandis magnitudinem implet. Huius duo hodie ab herbarijs  
ostenduntur genera: quorum utrunque ad me primian misit Aloistus Anguillarius Romanus horti Patauini præfe-  
tus, diligentissimus rei herbarie inquisitor. Qui præterea testatus est, Arisarum plurimum nasci in agro Romano,  
non longe ab urbe. Hec eadem Arisari genera postea ab alijs etiam accepimus. Vtriusque picturam exhibere libuit,  
non quod utrunque probemus (alterum enim non uerum putamus) sed ut de ijs aliorum etiam sit iudicium. Memi-  
nit Arisari Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum his paucis. Arisarum multò minus est aro. Radicem habet  
oliuæ magnitudine. Est autem multò ipso acrius. Vt Græcis ἀρίσαρον, ita etiam Arisarum Latinis, & Arisaro Nomina.  
Italjs nominatur.

## Astula regia.

## Cap. CLXIII.



HASTVLA REGIA vulgaris notitiæ est: folijs maioris porri: caule læui, ferente in cacumine flo-  
rem, quem anthericon appellant: radices subiacent ob-  
longè, rotundæ, glandibus similes, gustu acres. Quæ  
excalcant: urinas, & menses epotæ ciunt: lateris do-  
loribus, ruptis, conuulsis, & tussibus, drachmæ pon-  
dere potæ ex uino medentur. Ea uerò vomitiones adiu-  
uat, ludicri tali magnitudine commanducata: à serpente  
demorsis datur aptissimè, trium drachmarum pondere,  
verum folijs, floribus, & radice ex uino morsus illinire  
oportet: item vlcera sordida, & depascètia: mammarum  
quoq; & testium inflammationes, tubercula, furuncu-  
losq; decoctis in facce uini bulbis, recentibus inflam-  
mationibus ex polenta auxiliatur. Radicis succus adie-  
cto uetere uino dulci, myrrha, & croco decoquitur, sitq;  
perquam utile oculis medicamentum: ad purulentas au-  
res per se, & cum thure, melle, uino, & myrrha tritus, pro-  
dest: in contrariam anrem infusus, dentium dolorem mi-  
tigat. Cinis è radice illitus, alopecias ad pilum reducit.  
oleum in excauatis radicibus igni decoctum, illitu exul-  
ceratis pernionibus, & ambustis igni, conducit: & sur-  
ditati instillatum in aurem auxiliatur. Candidam uitili-  
ginem, linteo antea perfrictam in Sole, illita radix emen-  
dat. Semen, floresque in uino poti, scolopendræ, &  
scorpionum uenenis, mirum in modum resistunt: aluum  
purgant.

HASTVLA regia, quæ Græcis dicitur ἀσφodelός, Asphodeli hi-  
storia.

planta est non ignota. Huius caulem (ut Plinius est auctor libro  
XXI. cap. XVIII.) Theophrastus, & ferè Græci omnes cu-  
bitalem, & sæpe duum cubitorum, anthericum uocauere: radicem uerò, id est, bulbos, asphodelon. Latini au-  
tem illud albucum, & asphodelum hastulam regiam dixerè. Planta hæc spectatu mira, & iucunda est, cum integra  
effoditur, ob ingentem bulborum numerum, qui circumquaq; dependent: quippe quod aliquando eius aliquam uiderim  
bulbis ultra centum radici coherentibus. quanquam loco citato tradit Plinius, Asphodeli radicem alijs numerosio-  
rem esse, ut quæ octoginta simul acernatis sæpe bulbis reperiatur. Vermes Albucum creat (ut Theophrastus ait)  
qui in uolucres bestiolas salscutorum specie degenerant: ij tandem cum staccescens inaruerit scapus, eroso concepta-  
culo prouolant. Mandebatur antiquitus, Hesiodo teste, huiusce plantæ tum caulis in cinere tostus, tum bulbos cum  
semine, oleo, & sale addito: quinetiam cum ficis, mira uoluptate. Extulit magnis laudibus Asphodeli radices Nicau-  
der in suis theriacis, ad serpentium morsus, & scorpionum ictus. Meminit earum quoq; Galenus lib. VI. simplicium  
medicamentorum, sic inquires. Asphodeli radix utilis est, sicut ari, asari, & dracontij, nempe extergentis, &  
discutientis facultatis. Vsta autem cinis calidior, & exiccantior, subtiliorq; ac digerere potentior efficitur, ac pro-  
inde & alopecias sanat. hæc Galenus. Ceterum asphodeli radix mirifice commendatur Actio libro primo ad cien-  
dos

Asphodeli vi-  
res ex Gal.



Nomina.

dos menses, his uerbis. Asphodeli radix in uino albo uetere decocta, & uino calido meraco cyathi mensura hausta, menses suppressos celerrimè ciet. Planta, quæ *δοσάδελος* Græcè, *Hastula regia* Latine uocatur: Arabice, Cheunce, Bhunte, Biruach, Abg, seu Axeras: Italicè, Asphodelo, Amphodillo, & *Hastula regia*: Germanicè, Gold Wurtz, & Heidnisch: Hispanicè, Gamones, Gamonites: Gallicè, Aphrodiles.

## Bulbus esculentus.

## Cap. CLXV.

**ESCVLENTVS** bulbus vulgò cognitus, à nobis estur. Stomacho, & aluo utilis rufus, & qui ex Aphrica defertur. Amarum uerò, & scillinum, stomacho aptior est, & concoctionem adiuuat. Bulbi omnes acrimoniam habent, exalfaciunt, uenerem stimulant, linguam, tonsillasque exasperant, multum alimenti præbent, carnes creant, inflationem pariunt. luxatis, fractis, articulorum doloribus efficaciter illinuntur: spicula extrahunt: gangrænas, & podagras ex melle, aut per sese hydropicorum tumores, & canum morsus cum melle, & piperis polline illiti cohibent: sudores compescunt: stomachi dolores mitigant: furfures, & ulcera, quæ in capite manant, cum tosto nitro abstergunt: fugillata, varosque per se, aut ex oui luteo, & lentigines cum melle, uel aceto, emendant: fractis auriculis, vnguibusque, ex polenta medentur. Iidem calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus: item cum cinere è mænarum capitibus, impositi. Cremati uerò, & cum alcyonio misti, uitia cutis in facie, atrasque cicatrices, in sole illiti emaculant. faciunt ad rupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam neruos tentant.

## Bulbus vomitorius.

## Cap. CLXVI.

**BVLBVS**, quem vomitorium vocant, folia habet lentiora multò, & longiora, quàm bulbus esculentus: radicem similem, cortice nigro. Ea radix mansa, aut decoctum eius potum, uesciæ malis medetur: uomitiones mouet.

Bulborum cōsideratio.

**BVLBORVM** genera, esculentum, & uomitorium, antiquis uulgò notissima fuisse ex eo maxime constat, quòd eorum faciem non representauerit Dioscorides. Nobis uerò Bulbi eam ob causam, uel quòd iandiu exoleuerim, hodie omnibus tum medicis, tum herbarijs adeò incogniti sunt, ut neminem hactenus inuenerim, qui eos legitime demonstraret. Veteribus autem fuerunt in frequentissimo ciborum usu; his præsertim admisti, quæ ueneris concilianda gratia parabantur, utpote qui uenerem stimulent. Quòd autem ad id expetiti, & commendati fuerint, Martialis aperte testatus est in Xenij suis dum cecinit.

Cum sit anus coniunx, cum sint tibi mortua membra,

Nil aliud bulbis quàm satur esse potes.

Mulcorum error.

Ceterum non defuere, qui crediderint Bulbum esculentum esse Ascalonium cepe, aut fissile illud ceparum genus, quod Hetruscis uulgò uocatur Cipolla maligia. Sed horum error manifestè deprehenditur ex Theophrasto, qui Ascalonium, fissileque cepe inter ceparum genera libro VII. cap. IIII. de plantarum historia recensuit, non autem inter Bulbos, de quibus speciatim differuit libro VII. cap. XIII. Bulborum meminit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic scribens. Bulbus esculentus frigidior, & crassior est, lentumque succum procreat. Nam & coctu difficilis est, & flatuosus, & uenerem prouocans. Attamen illius ob amaritatem, simul & asstrictionem, abstergit, simul & glutinat, & nimirum etiam exiccat. Est enim amaritudinem in extergentibus esse substantijs, adstrictionem uerò in glutinantibus. At siccitas utranque consequitur. Bulbus autem uomitorius multò est calidioris temperaturæ, quàm prædictus bulbus. Et libro II. de alimentorum facultatibus, sic de bulbis scribit. Bulbi genere cum prædictis conueniunt. Nam horum quoque uariis direptis folijs manditur: in uere interdum ipse etiam coliculus. Amarum, austerumque uim euidenter bulbi in se habent: quamobrem elanguescentis stomachi aliquatenus excitant auiditatem. At uerò neque ijs aduersantur, quibus è thorace, atque pulmone pus conuenit expuere: quanquam crassiore, ac glutinosiore sunt corporis substantia. Etenim amaritudo crassitudini reluctatur, lenta, crassaque nata incidere, quemadmodum in commentarijs de medicamentis prodidimus. Quapropter bis elixi uberius quidem alent, sed excreare uolentibus aduersantur, utpote omni amaritudine exuti. Tum uerò ex aceto, oleo, garoque mistis, estare satius fuerit: nam ita magis profectò oblectabunt, ac nutrient, minusque inflabunt, ac facilius concoquentur. *Βολβοὶ* qui Græcis *Βολβοὶ ἐμῆτι νός*, Latinis Bulbus esculentus cognominatur: Mauritanis, Basar alzir: Italis, Bulbo che st mangia. Qui uerò Græcis *Βολβοὶ ἐμῆτι νός*, Latinis Bulbus uomitorius dicitur: Mauritanis, Zir: Italis, Bulbo uomitorio.

Nomina.

## Scilla.

## Cap. CLXVII.

**SCILLA** uim acrem, atque feruentem habet. assatam ad multa utiliore esse constat. Polline ad crustam subacto, aut luto oblita, in clibanum conijcitur, aut carbonibus obruitur, donec obducens crusta sufficienter intosta fuerit; quæ exempta, si non emollecat, altero polline simili, aut luto circumlinitur, & eadem, quæ prius, fiunt; nam quæ ita non assatur, interaneis maxime noxia est. Torretur item in olla, indito operculo, quæ in furnum demittatur. Sumi etiam solet quod



## A detailed botanical illustration of the Spring Squill (Scilla verna). The plant features a central bulb with several long, narrow, pointed leaves emerging from it. Two tall, slender flowering stalks rise from the center, each bearing a cluster of small, bell-shaped flowers. The entire plant is shown with its root system, including a large, textured bulb and numerous fine, fibrous roots extending downwards. The illustration is rendered in a classic scientific style with fine lines and cross-hatching for shading. The text 'Scilla verna' is partially visible at the bottom left corner.

Pancratiū. Cap. CLXVIII.

Scillæ vires, & præparationem habet, eodemq; pondere in morbis efficaciter assumitur: cui tamen minor, quàm scillæ facultas inest. Radicis succus cum erui farina digeritur in pastillos, qui hydropicis, splenisq; cum hydromelite, commodissimè dantur.

Scille, & Pan-  
cratij confi-  
deratio.

Scillæ præpa-  
ratio.

Scillæ vires  
ex Galeno.

Nomina.

## CAPPARIS.

Cap. CLXIX.

E 2



CAPPARIS.



Capparũ cõ  
sideratio.

Capparū sa-  
tio.

Capparis ui-  
res ex Gal.

ETHIOLI COM M.

Etā tamē stomacho, quā eruda utilior est. Fructus drachmis duobus in uino potus, quadraginta diebus, liēnem absūmit, & urinā, cruentūq; excrementum emittit: bibitur utilissimē in coarctam doloribus, & neruorum resolutione, item ruptis, & conuulsis: menses ciet, caput purgat. Dentium dolorem sedat semen ex aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus radicis cortex ad eadē proficit: vlcera omnia uetera, & sordida, & quæ occalluerunt, expurgat: leuosis cum farina hordei illinitur: dente demorsa, dolor eius auxiliatur: cum aceto trita, vitilignes albas abterget. Radix, foliaq; in trita, strumas, ac duritias discutiunt. Aurium vermiculos insusussucco enecat. Aphrica, & præsertim Marmarica capillis, uelenter inflat. Apula vomitus facit. & quæ à Lybico, & quæ Rubro mari, deferuntur, mirum in modum acris est: liquidum in ore pitulas excitat, gingiuasq; osse tenus exest. quare in cibis non abiecienda.

**CAPPARIS** frutex est in Italia vulgaris satis notitia. Floribus enim, & fructibus muria asseruatis frequentissime in ci-  
bis uiuimur. Ex ijs suauiores, & qui cum palato maiorem ineant  
gratiam, sunt recentes acerrimo asseruati aceto, quod pleriq; sa-  
ciunt in Hetruria. Præstantissimæ cappares ex Alexandria Aeg-  
ypti Venetias aduchuntur. Est & in Apulia capparum promen-  
tus, unde etiam plurimæ deferuntur, uerum longè deteriores his,  
quæ ex Aegypto importantur. Vomitiones cappares bandquæ  
quam cient, ut Dioscorides inquit: nisi fortasse hac facultate sint  
prædita, dum recentes, ac uirides comeduntur, antequam mu-  
riam experiantur, & inde elixentur. Proueniunt etiam Rome  
in collapsis ædificiorum parietibus, ruderibusq; præsertim circa  
Pacis templum: itemq; Senis, quæ quidem Apulis saporis præ-  
stantia nimium cedunt. In cultis nasci cappares negat Theophras-  
tus lib. vi. cap. v. de plantarum historia. Seruntur tamen hac  
ætate, colunturq; perinde ac segetes, & legumina, quemadmodum  
& Plinij tempore. qui serendi rationem lib. xix. cap. viii. his  
uerbis explicauit. Quippe cum capparis quoque seratur, sicut  
maximè, area in defossu cauata, ripisq; undiq; circumstructis la-

pide, aliàs euagatur per agros, & cogit solum sterilefcere. Floret æstate. uiret ufque ad Vergiliarum occafum. Sabuloſis familiariffimum. Capparis uires reddidit Galenus libro VII. ſimplicium medicamentorum, ſic in-  
quies. Capparis radicis cortex uincentem habet qualitatem amaram, proximam acrem, deinde acerbam. Ex quo  
liquet, quòd diuerſis, pugnantibusq; conſtet facultatibus. quippe abſtergere, purgare, incidere poteſt amaritudi-  
ne: excalfacere, incidere, digerere acrimonia: porrò contrahere, denſare, conſtringere acerbitate. Idcirco lie-  
nes induratos, ſi quid aliud, hoc medicamentum iuuare ualet, tum foris idoneis illineidis remedijs admiſtum, tum  
intrò in corpus aſſumptum, ſiue decoctum in aceto, aut oxymelite, & id genus, ſiue aridum conuſum, illiſq; ſed-  
miſtum. Quippe cum apertè craffos, lentosq; humores hoc pacto ſumptum euacuet, nec eoſ tantum per urinas, ſed  
& per uentrem: ſepe etiam ſanguinolentos deſert, unde & lienes adiuti ſunt, & coxarum dolores. Quinetiam  
menſes promouet, & ex capite purgat, detrahitiq; auxiliaturq; ruptis, atq; conuiſis. Cæterum cumam ulceribus  
tioni in quoque affectuum miſceri conueniat, non eſt præſentis inſtituti perſequi. Porrò radicis eius cortex deſecra-  
maliguis cataplaſmatis modo impoſitus, non malum eſt remedium, ut qui illa extergere ualet, nec ſequitur deſecra-  
re. Præterea dentium labores prædictarum qualitatum ratione adiuvat, interim cum aceto coctus, interim cum ſi-  
no, ſepe etiam ſolus dentibus manſus, ac morſus. Ex dictis ergo clarum eſt, incidendi quandam ei facultatē inſeſ-  
itemq; extergendi, digerendi, contrahendi. Vitiligines ſiquidem cum aceto detrahiti, & chæradas, & dueros tumores  
digeriti, idoneis ad ea medicamētis miſtus. Radicis cortici, fructus proportionē uirium reſpondet, niſi quòd ad omnia  
ſit imbecillior. Imò & folia, & caules eius, ſimilem uim obtinent. meminiq; me ſolijs quandoq; paucis diebus doctis  
chæradis naturam referentem diſcuſſiſſe. Sed admiſcemus ſcilicet illis quippiam, quòd eorum uirium obtundat uehe-  
mentiam. Nec mirum eſt, quòd aurium uermes ſuccus amaritate occidat ſua. Porrò capparis, quæ in admodum ſer-  
uentibus regionibus provenit, ut quam fert Arabia, multò eſt noſtrate acrior, adeò ut plurimum etiam habeat ſacila  
tatis adurentis. Et lib. II. de aliment. facultatibus, ſic de Cappare ſcribit. In Cypro Capparis plurima provenit.  
Facultas eius tenuiſſimè admodum eſt partium: proinde minimum alimenti in corpus eorum, qui ipſa uelſcuntur, diſſi-  
buit. quemadmodum & alia omnia, quæ tenuibus conſtant partibus. Vtimur autem fructu huius plantæ magis, ut  
medicamento, quàm ut alimento. Importatur ad nos etiam ſale conſperſus, quia ſolus aſſeruatus putreſcit. Clarum  
ergo eſt, quòd capparis adhuc uiridis, antequàm ſale condiatur, plus habet nutrimenti: nam ex ſalitura permul-  
tatur, donec omnem ſalis naturam exuat, ut minimi ſanè alimenti cibus eſt, ita obſonium, & medicamentum, cum ad  
excitandum proſtratum appetitū, tum ad deradendam, deijciendamq; pituitam uentri adhæreſcentem accommodatum  
erit, ac deniq; ad licnis, iecoriſq; amoliciſdas obſtructiones. Verum in hos uſus cum oxymelite, aut oxelæo ante alias om-  
nes dapes ſumi oportet. Tenellis porrò capparis germinibus homines, ut terebinti turionibus uelſcuntur: cumq; ad-  
huc



Incident, in oxalme, & aceto, non secus atq; hos, reponunt. Planta, quæ κατάρπις Græcè, Capparis simi- Nomina.  
liter Latine dicitur: Arabicè, Cappar & Kappar; Italicè, Capparo: Germanicè, Kappren: Hispanicè, Alca-  
parras: Gallicè, Cappelz.

## LEPIDIVM DIOSC.

## LEPIDIVM PAVLI, ET PLIN.



Lepidium.



Cap. CLXX.

LEPIDIVM, aliqui gingidium vocant, herbula vulgò nota. muria cum lacte servatur. Vis fo-  
lorum acris, & exulcerans. quapropter ischiadicis trita, præsentissimum est auxilium, si cum hele-  
nij radice, quarta parte horæ, illinatur: lienosis simili modo prodest, lepras eximit. Radix appensa  
collo, dolore dentium liberare existimatur.

CVM satis superq; à nobis ostensum sit, in primi libri calce, in Iberidis commentatione, Iberidem nihil à Lepi-  
dio differre, superuacaneum esset, hic ea repetere quæ ad Lepidij historiam explicandam loco citato diffusius addu-  
ximus. Siquidem eò quisq; facile accedere potest, qui ea, quæ ibi diximus, scire desiderat. Veruntamen illud silentio  
non inuoluendum duxi, quòd Plinius in Lepidij historia prorsus à Dioscoride dissentire deprehenditur. Quippe qui  
scripsit lib. XIX. cap. VIII. Lepidium cubitali longitudine assurgere, folijs laurinis, non autem nasturtij, ut Dio-  
scorides inquit. Quod sane nobis insinuare uidetur, Plinij Lepidium eam esse Iberidis speciem, quam scribit Paulus  
lib. III. de coxendicium dolore agens, folia lauri proferre. Hæc enim (ut libro superiore diximus) ea facile fuerit,  
quam vulgus herbariorum ideo Piperitum nominat, quòd acerrimo gustu linguam mirum in modum uellicet. Ceterum  
non possum non admirari, quòd tam facile crediderint Hermolaus, Manardus, & Ruellius illos secutus; Lepidium eam  
plantam esse, quæ vulgò in Italia appellatur Raphano. Nam cum hæc folijs sit belenio paulò minoribus, & uerbascio  
maioribus, nullo pacto Dioscoridis Lepidium referre potest, ut quod tenuis admodum sit herba. Nec item Plinio ad-  
scripsi videntur, qui Lepidium prodidit laurinis folijs exire in cubitalem altitudinem: nisi fortasse ij clarissimi viri  
nos. Lepidium quoq; Latini uocant: Mauritanij, Seitaraçi, Hausab, Asceitaragi, seu Sitharegi: Itali, Lepidio: Ger-  
mani, Gauchbluon, & Vuilder kresz: Galli, Passeraige, & Nastort sauage.

Lepidij con-  
sideratio.Lepidiū Pli-  
nij.Lapsus Her-  
molai, Manar-  
di, & Ruellij.



RANUNCVLVS PRIMVS.



RANUNCVLVS SECVNDVS.



RANUNCVLVS TERTIVS.



RANUNCVLVS QVARTVS.





## RANVNCVLVS QVINTVS

## Cap. CLXXI.



COMPLVRA Ranunculi genera. uis tamen omnibus una, acris, & uehementer exulcerans. Nam unum coriandri folijs constat, latioribus, subalbidis, pinguius: flore luteo, interdum purpureo: caule gracili, cubitum alto: radice alba, exigua, amaraque, multis capillamentis, hellebori modo, fibrata. nascitur in limitibus humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, plurimū in Sardinia proueniens, quā acerrimum, quod syluestre apium appellant. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lacteo. Folia, flores, & cauliculi recentes, illitu exulcerant, & crustas non sine dolore gignunt. quare ungues scabros extricant, scabiem eximunt, stigmata delent: formicantes uerrucas, & peniles, alopeciasque paulisper illita tollunt. Tepente decocto perniones fouentur. Sicca radix, tritaque sternutamenta ciet, naribus admota: dentium dolorem appensa leuat, ipsos tamen frangit.

RANVNCVLVS, qui Græcis βατραχίων dicitur, uul-  
us herbariorum in Italia, & alibi etiam Pedem corui, & Pedem  
galli, quanuis perperam, uocant, ut superius quoque in coronopi  
mentione diximus. Planta est uulgò nota, pluribus tamen, & di-  
uersis generibus distincta. Et quanuis quatuor tantum generum  
meminerit Dioscorides: nos tamen & quintum, & sextum genus  
sepius uidimus. Ex his, quorum particulatim non fecit mentio-  
nem Dioscorides, unum genus est, quod nobis quinto loco assigna-  
bitur, quod quidem folijs primo proximis prouenit, sed cui inter  
complures, quibus nititur, radices, tuberosa quedam pendeat ra-

Ranūculi cō-  
sideratio.

Apium risus.

Quorundam  
error.  
Ranunculi ui-  
res ex Gal.

Nomina.

## Anemone.

## Cap. CLXXII.

Duo Anemones genera, unum syluestre, alterum in cultis nascens. Cuius multæ species: una phœniceum florem profert: altera candicantem, aut lacteum, aut purpureum. Harum folia coriandro similia, cæterum scissa tenuius in terram inclinantur: caules lanuginosi, tenues, in quibus flores, ut papaueris, & in medio capitula nigra, aut cærulea: radix oleæ magnitudine, aut amplius paulò grandescit, ac ueluti geniculis quibusdam cingitur. Syluestri amplitudo prorsus maior, latioraque

E 4 folia,



folia, & duriora: oblongius caput: flore puniceo: tenuibus, & multis radicum capillamentis. Acrior est, quæ nigra habet folia. Vis utriusq; acris. ea de causa succus naribus infusus purgat caput. Com-  
manducata radix pituitam trahit. decocta in passo, & illita, medetur oculorum inflammationibus: cicatrices eorundem, & hebetudines emendat: sordida ulcera abstergit. Folia, & caules, si cum pisa-  
na decocti edantur, copiam lactis præbent: menstrua ciunt, uellere apposita: illita quoque lepras exi-  
munt. Sunt qui errore ducti argemonem nominari eupatorium putent: quoniam à sylvestri Ane-  
mone, argemonem, & papauer, quod rhœada appellant (de quo inter papaueris genera referemus) propter colorum cognationem in floribus distinguere non possunt. Verum papauer, & argemone colore minus saturato spectantur, & utraque tardius floret. Quinetiam argemone croceum succum, gustu admodum acrem, reddit: rhœas uerò candidiorem, & acrem. Insuper anemone, & rhœadi capitula sylvestris papaueris similia insunt, sed in anemone supernè crassiusculum, in rhœade suban-  
gustius. Anemones genera succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen. In aruis illa sapius nascuntur.

ANEMONE.



ANEMONE ALTERA.



Anemones  
confid.

Brasauoli la-  
pus.

Fuch. lapsus.

Pulsatillæ hi-  
storia.

NON DESUNT profecto, qui credant, Anemonem, & sylvestre papauer idem esse: sin minus, saltem  
eiusdem esse generis. Sed ij, mea quidem sententia, falluntur, & prorsus aberrant à Dioscoridis proposito. Quon-  
doquidem si hoc idem sensisset Dioscorides, alterum ab altero diuersis capitibus non distinxisset, neque, ut legitur in  
huius capituli calce, differre Anemonem à sylvestri papauere tradidisset. Tametsi existimet Brasauolus, Diosco-  
ridis Anemonem id omnino esse sylvestris papaueris genus, quod flore prodit cæteris rubentior: minimè animadu-  
tens, quòd si huius cauliculi frangantur, statim lac ipsum distillant. Quin nec illud quidem animaduertisse uidetur,  
quòd hoc longa constet radice, non autem oliuæ modo rotunda: capitulumq; ferat papaueris, non asparagorum ca-  
minibus simile. Fuchsius præterea in eo libello, in quo tantum stirpium imagines expressit, Anemones purpure-  
æ loco, illam depingit herbam, quæ plerisque PULSATILLA cognominatur, etsi nullam, quantum equi-  
dem sentio, habeat cum Anemone cognationem. Illa namq; cum primum erumpit, folia mittit admodum hirsuta, ni-  
lutinq; laciniata, quæ sapore sunt perquam acri, adeo ut non minus exulcerent, quam ranunculus, & flammula uil-  
gò dicta. Flos, qui in stellæ modum, similiter hirsutus, ineunte uere debiscit, antequam folia erumpant, nigricanti  
splendet purpura: è cuius medio quidam aurei flosculi enicant eos admodum emulantes, qui rosis iunascuntur: in quo-  
rum umbilico floccus quidam purpureus uisitur, sericium referens opus. Exteriori uerò parte in ipsius caulis eadem  
mine circa floris basim uillosus alter circumquaq; se pandit floccus, colore cinereo, sericino stamini molliora, ac leuo-  
re minime cedens. Semen capilloso, incanoq; capitulo, iuglandis ferè magnitudine, continetur. Radix illi subespi-  
dali



## PVLSATILLA.



dali longitudine, exesa, nigri chamælonis modo: cui sapor quidam subdulcis, non autem acris: ueluti folijs, & caulibus. Sunt qui hanc miris laudibus efferant contra pestilentiam, & ad hanc uenena, itemq; contra omnium uenenosorum tum morsus, tum ictus: quamobrem in antidotis additur. Ceterum legitimam utriusque generis Anemonem legimus nos in Ananienſi agro, quæ, ut arbitror, Dioscoridis descriptioni nihil prorsus reclamant. Eas ite postea uidi Vinetijs, in horto clarissimi medici Maphei à Mapheo. Scribit Ruellius Anemonem in Gallia copiosam nasci, eamq; esse plantam, quam herbarij Herbam uenti uocant. Verum si herba uenti helxine fuerit, uel solidago minor, ut Simon Ianuensis interpretatur, aberrasse Ruellius manifestè deprehenditur: sin aliter, quid dicam nescio, cum me omnino lateat, quid Ruellius per herbam uenti intelligere uoluerit. Meminit Anemonis Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, ubi ita scribit. Anemone omnes acrem, extergendi, attrahendi, & ora uasorum reserandi facultatem obtinent. Itaq; radix commansa pituitam euocat: & succus ex naribus purgat, & oculorum cicatrices extenuat. Insuper sordida ulcerum anemone expurgant, & lepras detrahunt, mensesq; appositæ eliciunt, & lac trahunt. Ut Græcis ἀνεμών, ita Latinis, pariter & Italis, Anemone uocatur: Arabibus, Iackaik alnahamen, seu Sakaik anbeamen.

Ruel. lapsus.

Nomina.

## Argemone. Cap. CLXXIII.

ARGEMONE in totum syluestri papaueri similis est. Folia habet anemones, diuisa: florem puniceum: caput in cauliculo papaueris rhœadis, oblongius, & summis partibus latum: radicem rotundam: succum croci colore, acrem dimittit. Argema, & nubeculas expurgat. Folia illitu inflammationes compescunt.

EXTANT nonnulli Dioscoridis codices, in quibus duo Argemones genera diuersis capitibus leguntur, nonnulli uero hoc tantum habent, quod nos legitimum esse credimus, non dissidentes à compluribus doctissimis uiris, qui alterum huc illegitimè accessisse censent: præsertim cum Galenus, & Paulus illius nusquam meminerint. Veruntamen, ut satisfactum omnibus sit, alterius quoq; Argemones historiam hic adiiciendam duximus, quæ sic habet. Argemone altera folijs syluestri papaueri similis est. Vis ei inest, si recens trita imponatur, intercisiones sanare, & oculorum inflammationes mitigare. Pota cum aqua dysentericis auxiliatur, uulnera conglutinat, & inflammationibus utililis est. Conuulsis, & uellicatibus inposita medetur: contra serpentium morsus utiliter cum uino bibitur. Plinius libro XXV. cap. VIII. Argemones tria fieri genera memorat, idq; demum probari, cuius radix thus redolet. Prouenit argemone frequentissima in Hetruria, præsertim in agro nostro Senensi: sicut & in quibusdam locis uallis Anagninae Tridentini tractus, quæ nullis, quantum equidem iudicio, notis Dioscoridis descriptioni refragatur. Quamobrem in maximo errore fuisse deprehenduntur ueteres nostri tum medici, tum seplasiarij, quod Eupatorium Argemones uice acceperint suo Agrimonie nomine, de qua libro quarto suo loco, Deo duce, latius differemus. Argemones uires sanè quam paucis perstrinxit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Et huius herbe sacculas abstersoria est, & digerens. Ea Græcè ἀργεμόνη, Argemone item Latine, atq; Italicè dicitur.

Argemones confid.

Caput Argemones adulterinum.

Veterum nostrorū error.

Argemones uires ex Gal. Nomina.

## Anagallis.

## Cap. CLXXIII.

DVO sunt Anagallidis genera, quæ tantum flore distant. nam quæ cæruleo flore est, fœmina dicitur: mas quæ phœniceo. Frutices sunt parui, in terra iacentes: folijs in quadrangulo caule pusillis, subrotundis, ad helxinæ folia accedentibus: semine rotundo. Vtraque mitigandi uim habet; inflammationem arceat, adactos corpori aculeos extrahit, nomas cohibet. Succus earum gargarizatus, capitis pituitam purgat: & naribus infusus, dolorem dentium lenit, si in aduersam narem injiciatur: argema cum melle Attico emendat: retuse oculorum aciei auxiliatur: contra uiperarum morsus, iecinoris, & renum uitia, si ex uino bibatur prodest. Tradunt eam, quæ cæruleum edit florem, prociudam sedem reprimere: quæ uero phœniceum, illitu euocare.


ANAGALLIS tam mas, quam fœmina, quæ officinis uulgo Morsus gallinæ dicitur, notissima est. Ceterum plane, meo quidem iudicio, hallucinantur, qui Anagallidem eam esse plantam putant, quæ in Hetruria uernaculo nomine Centone uocatur, Insubribus uero Pauarina. Nam hæc florem fert candidum, & caulem rotundum, Anagallidum

Anagallidis confid.



ANAGALLIS MAS.

ANAGALLIS FOEMINA.



MORSVS DIABOLI.


Anagallidum  
uires ex Gal.Morsus dia-  
boli histor. &  
uires.Opinio su-  
perstitiosa.

dum uero alteri flos est ceruleus, alteri puniceus, & quadrangulus utrisq; caulis. Anagallidum uires recensuit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Anagallis uirga tam ea, quae ceruleum habet florem, quam ea, quae purpureum, admodum extergentis sunt facultatis. Habent uero quendam etiam calorem attractorium, ita ut et infixos corpori aculeos extrahant. Succus earum ex naribus purgat eadem de causa. In summa autem tem desiccandi uim habent citra mordicationem: quamobrem & uulnera glutinant, & putrida adinuant. haec Galenus. Verum cum Morsus gallinae eam stirpem in mentem mihi reuocauerit, quia uulgus herbariorum MORSVM diaboli, alij Succisam appellant, cunctisq; putem me, quam plurimis fortasse rem gratam facit, his nostris commentariis ipsam quoque inferam, hic locus uisus est, ubi commodè de ea aliquid dicam. Morsus igitur diaboli herba est, & locis incultis proueniens, saltibus, ac etiam interdum pratis, & dumetis. Folij constat plantagini, quam uulgo lanceolam uocant, similibus, leuioribus tamen, & quae circa caules, qui ad binum cubitorum longitudinem assurgunt, exeant breuiores, angustiores, leniterq; per ambitum laciniata. Floret aestate, scabiosa uocata modo. Multifidas habet radices, nigricantes, succisas, & circumrotas: unde superstitiosum nomen inuenit. Siquidem scripserunt nonnulli superstitionibus dediti, quos credulum uulgus sequitur, haec daemona ob tantae efficaciae radicem inuidere hominibus, atq; haec de causa, ubi succreuerit, statim eam undequaque dentibus succidere, & circumrodere: tanta est hominum superstitio. Herba haec si uiridis cruda, tritaq; carbunculis pestiferis imponatur, praesentaneo remedio (ut aiunt) eos sanat, aut si uinum, in quo decocta fuerit, bibitur. Radix per se estur, aut eius decocti uinum uti libitur non modo ad uteri dolores, sed etiam ad pestilentem uisum arcendam. Gustu quomodo amara est: ex quo perspicuum esse



esse potest, eam esse calidam, & siccam facultatis. Siccata puluerem præbent plerique ad alui tineas necandas, ac eadem sugillata illitu emendant. Herba, quæ ἀναγallis Græcè, Anagallis quoque Latine vocatur: Italicè, Anagala. Nomina. Iude: Germanicè, Gauch heyl: Hispanicè, Muruges: Gallicè, Morgelline, & Mouron.

HEDERA HELIX.



Hedera.

HEDERA ARBOREA.



Cap. CLXXV.

HEDERA differentias multas in specie sortitur, summas autem generetres. Nam quædam candida est, altera nigra, tertia helix. Candida fructum fert candidum: nigra nigrum, aut croci æmulum, quam vulgus Dionysiam vocat. Helix fructum non gignit, sed tenues habet viticulas, & folia parua, angulosa, & rubra. Hedera omnis acris est, & adstringens. nervos tentat. Flos trium digitorum carptu, facit ad dysentericos, in uino bis die potus: ambustis cum cerato tritus illinitur. Recensia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum, & corymborum succus cum irino unguento, melle, aut nitro, naribus infunditur: & contra ueteres capitis dolores, caput eo cum aceto, & rosaceo perfundi utile est: purulentis auribus, aut dolentibus, cum oleo medetur. Nigra hedera succus, aut epoti corymbi, corpus infirmant, mentemque turbant largius sumpti. Acini quinque triti, calfactique in punici mali cortice cum rosaceo, si instillantur à contraria aure, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillum illiti corymbi. Folia in uino decocta illinuntur omnium ulcerum generi, etiam si cacoethe sint. vitia cutis in facie, & ambusta sanant, uti antea diximus. Mouent menses triti, & subditi corymbi: iidem poti, post purgationes sceminarum, drachmæ pondere, concipiendi spem adimunt. Pediculus foliorum melle irrigatus, ac uulua indit, & partus extrahit. Instillatus succus putrida tædia narium, graueolentiamque emendat, & sanitati restituit. Lacryma hedera psilothrum est: illitu pediculos enecat. Succus radicum in aceto potus, contra phalanga prodest.

HEDERA, cuius hic tria tantum summa genera fecit Dioscorides, etsi plures eius in specie differentias esse testetur, planta est vulgaris notitie. Verum si quis Hedera plura genera nosse desiderat, non fortasse Plinio cōtenuis, licet de ipsis abunde differuerit lib. XVI. cap. XXXIII. legat Theophrastum lib. III. cap. XVIII. de plantarum historia, ubi hedera sigillatim species diligentissime persequitur, & de ijs copiosissime petraçtat: uel potius ipsum audiat, nam hæc, quæ sequuntur, ipsi ad uerbum accepta referimus, qui loco citato sic habet. Hedera quoque multigena est: quædam enim humi repens, quædam se in excelsum attollens: & excelsarium genera plura, sed trina summa patescunt, candida, nigra, tertiaque helix, id est clauicula. Horum item species plures: quippe alia fructu tantum candida,

Hedera confideratio, & generis.



candida, alia etiam folijs: rursus fructum tantum candidum ferentium, alia maiusculum, densum, & uelut in globum circumactum fructuum profert, quam corymbiam quidam uocarunt, Athenienses acharnicam rigam eam appellant: alia minorem, sparsiorēq; modo nigra. Habet uigra differentias, sed non hunc in modum conspicuas. Sed helix differt maxime discernitur: etenim folijs plurimum distat, cum paruitate, tum quod angulata, concinnioraq; sint: cum hedera rotundiora, simplicioraq; habeat. Distant etiam internodiorum longitudine, atq; etiam sterilitate, quoniam hedera fructum quædam non ferant: quod non in hedera transfigurentur, ut quidam uolunt: at uero si omnes hedere scant, ut alijs placet, ætatis certè, dispositionisq; non generis erit discernen, quemadmodum pyri ad pyrastrium. Tamen eius quoq; folium multum ab hedera distat, uerum id rarum, & in paucis euenit, ut uetustate permutetur, ceu in populo alba, & crotone. Ergo helicis plura genera, sed quæ conspectiora, summaq; occurrant, tria sunt. Herbacea, quæ plurima est: secunda candida: tertia uersicolor, quam Thraciam quidam appellant. Et harum quæq; distat ut detur, quippe herbacea quædam folio tenuiori, oblongiori, atq; etiam densiori: quædam minus hæc omnia habens. Et in uersicoloris genere, alia folio ampliori, alia uiniori, macularumq; habitu diuersa: pari modo & magnitudine, coloreq; distat. Auctu perfacilis herbacea, inq; plurimum uenit. Manifestum esse quæ hedere scat, affirmant, non tantum folijs, quæ maiora, latioraq; habet, uerum etiam germinibus: protinus enim erecta gerit, non inflexa gracilitate, & longitudine. Herbacea uero crassiora, breuioraq;. Ac hedera, ut semē proferre inceperit, germen subline, rectumq; edit. Est quidem uniuersa hedera radice numerosa, densa, flexuosa, surculosa, crassa, nec nimis alta, sed præcipue nigra, & inter candidas, quæ asperissima, immitissimaq; habetur. quamobrem eius amplexus arbores omnes infestat, omnes enim necat, & exiccat, ablato alimento. Crassatur hæc maiorem in modum, atq; arborescit intantum, ut per se ipsa hedera arbor fiat. Attamen ex maiore parte semper super aliud uitam degere solet, atq; (ut ita dixerim) amplexu xicaulis est, ita pro sua natura, uel quiddam eiusmodi illico gerit. Nam è germinibus radículas asiduè inter folia mittit, quibus arboribus, murisq; obrepit, quasi de industria à natura exhibitis: atq; ita humorem auferens, exhaustisq; arefacit. Et si inferius succidatur, nihilo minus uiuere, durareq; potest. Habet uel aliud discrimen nō mediocre in fructu: nam alius dulcis, alius uehementer amarus, tam in candida, quam in nigra. Indicium, quod alium aues mandunt, alium minime attingunt. Hedera ita se habet. Hactenus Theophrastus de hedera generibus. Hedera (ut auctor est Galenus lib. VII. simpl. medic.) ex contrarijs composita est facultatibus: habet enim quiddam adstringentis substantie, quam terrenam, & frigidam esse ostendimus: habetq; etiam nonnihil acris, quam calidam esse uel gustus comprobabat. Nec deest tertia: aquæ namq; substantiam quandam tepidam obtinet, certè si uiridis sit. Siquidem dum arefacit, hæc prima exhalet necesse est, manetq; quæ terrea est, & frigida, adstringens, & ea quæ calida, & acris. Hedera, quæ ita Latinis, Græcis *κισσός* nominatur: Mauritanis, Cussus: Italis, Hedera: Germanis, Mauera, Ephraim, Ephraim, Hispanis, Edera, Era, Gallis, Lierre.

Hederae facultates.

Nomina.

#### CHELIDONIVM MAIUS.



† Non ab re quidem suspicandum est (ut doctissime adnotauit Marcellus) huic loco in Dioscoride mendum subesse, & quod non ἐρυθρά, hoc est, rubra, ut habent uulgati codices, legendum sit, sed ἐκυμώτερα, id est, cōcinniora. Nam præter alias rationes huic lectioni adstipulatur Theophrastus, qui li. III. ca. xviii. de plantarum historia eo nomine hederae helicis folia depingit.

#### Chelidonium maius. Cap. CLXXVI.

CHELIDONIVM maius, caule est gracili, cubitali, aut altiore, agnatis foliosis: folijs ranunculi, mollioribus tamen, & colore castis: flore uioleæ albæ, secundum singula folia prodeunte. In eo succus croci, mordax, acris, & aliquantulum subamarus, grauer olens. Radix supernè singularis, infernè in multa crocea capitula fibratur. Siliqua, ceu corniculati papaueris, tenuis, in metæ figuram longa: in qua semen papaueris maius recluditur. Succus in æreo uase, cum melle prunis decoctus, oculis claritatem adfert. Folijs, caule, radice, succus exprimitur ineunte æstate, & siccatus in umbra digeritur in pastillos. Radix cum aniso, & uino albo posita cum uino, aut manducata, dentium dolorem sedat. Hoc nomen sibi uidetur uendicasse, quod aduentu hirundinum exoriatur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrant, hirundines matres ex æcatis pullis, admodum herba, uisum restituere.

CHELIDONIVM, quod maius cognominatur, uulgò in Hetruria Celidonia dicitur. At imperiti, præsertim chymiste, quædam


Chelidonii maioris consideratio.



## AQVILINA.



Chelidonium minus.



que multorum stultitia est, quod Græci nominis uin ignorent, non Chelidonium, quod Latine nil aliud, quam hirundinariam significat, sed Cæli domum appellant. Qua postea falsa nominis præstantia freti, ex hac herba quandam quintam essentiam fieri prædicant, non modò suis uanis alchymicis imaginationibus ac commodatissimam; sed ad tuendam etiam hominum sanitatem, morbosq; quàm plurimos profligandos utilem. Prouenit Chelidonium ubique in Italia propter sepes, in scrobium ripis, secus uias, inter rudera, & in ædificiorum ruinis, seu parietinis. Sunt, qui Chelidonium maius uocent herbam, quam aliqui AQVILINAM, alij Aquilegiam nominant: folijs ferè chelidonijs maioris, paulò tamen rotundioribus, ac mollioribus, caule cubitali, recto, tenuiq; in cuius cacumine flos emicat purpureus, à quo quatuor exeunt cornicula, reflexa, ac intus undiq; concava: semine atro, in capitulis recluso, melanthij modo. Sed quibus hæc uiribus prædita sit, hæcenus neq; mea, neq; aliorum experientia compertum habeo. Chelidonijs maioris meminit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, ubi hæc scribit. Chelidonium maius extergentis admodum, & calide facultatis est. Sed & succus eius ad acuum uisum commodus est, utiq; in quibus crassum quiddam in pupilla colligitur, digestionem atq; discussionem indigens. Vsi sunt quidam radice eius ad morbum regium à iccoris obstructione proficiscentem, in uino albo eam potui exhibentes cum aqua. Pari modo mansa dentium doloribus confert. Id χελιδονίου μέγα Græci, quod Latini Chelidonium maius, uocant: Mauritani, Kauroch, Chalidunium, Chilodomontoma, & Memiram: Itali, Celidonia: Germani, Scheluurtz, & Schelkraut: Hispani, Celiduenha, & yerua de las golundrinhas: Galli, Chelidonie, & Esclere.

Vanitas chy mistarum.

Aquilina.

Chelidonijs maioris uires ex Galeno,

Nomina.

## Cap. CLXXVII.

CHELIDONIUM minus, quod triticum syluestre aliqui nuncuparunt, herbula pediculis ab radice pendens, sine caule: folijs hederæ, multò rotundioribus, & minoribus, teneris, & subpinguibus. radices habet ex eodem callo complures, pusillas, in granorum tritici modum aceruatim congestas: quarum tres, aut quatuor in longitudinem exeunt. Iuxta aquas, & lacus nascitur. Vis ei acris, & anemones modo summam cutem exulcerat. psoras, & scabros ungues eximit. Succus radicibus expressus ad purgandum caput, naribus infunditur. Decoctum eius ex melle gargarizatum, magnificè id præstat, & omnia pectoris uitia extrahit.

PLANTA, quam omnes ferè rei herbarie periti Chelidonium minus appellant, omnibus Italiae locis, uerno duntaxat tempore, frequens gignitur uliginoso præsertim solo, & in scrobium, fossarumq; marginibus: folijs hederæ minoribus, rotundioribus, ac subpinguibus, sine caule: flore luteo, etsi eius non meminerit Dioscorides, tenui pediculo appenso. Radicibus nititur compluribus, ex eodem callo prodeuntibus, pusillis, in granorum tritici modum aceruatim congestis, quarum uonnullæ tantum in longitudinem progrediuntur. Herba hæc breui deperditur: quippe quæ uere & nascatur, & arescat. Sunt qui hanc Scrophulariam minorem appellant, à radicum similitudine, ut quæ multis granorum tritici grumulis, ueluti strumis, quæ Græca imitatione scrophule uocantur, coaluisse uideantur. quanquam alij ex hoc potius sic dictam putant, quòd strumis, siue scrophulis (ut quidam asserunt) imposita medeatur. Nostris eã in Hetruria uulgò uocari Fauoscello putauerim, quòd fabarum modo folia subpinguia proferat. Nec ea

Chelidonijs minoris consideratio.



Fuchsij opinio reprob.

Chelidoni minoris vires ex Gal.

Nomina.

aliunde sibi Chelidoni nomen uēdicasse existimatur, auctore Theophrasto lib. VII. cap. XIII. de plant. histor. quā quod hirundinum aduentu florem excitet, quemadmodum & chelidonium maius. Verū an hæc sit Chelidonium minus, cuius meminere Dioscorides, & Galenus, non parua uidetur esse dubitatio: quod nullam prorsus nec folijs, nec radicibus præ se ferat acrimoniam, cum tamen acerrima, & mordax esse deberet, longeq; magis, quā chelidonium maius: quandoquidem, Galeno teste, Chelidonium minus cutem exulcerat, & excalfacit ordine quarto. Id quod satis manifestè ostendere posset, hanc non esse Chelidonium minus: nisi quis in hoc illud dixerit, quod de Aroscriptum reliquit Galenus libro II. de alimentorum facultatibus. Nam facile contingere potest, quod quemadmodum arum Cyrenis minimum medicamentosi, minimumq; acrimonia possidet, adeo ut in cibis uel rapis utilius habeatur; in Italia uero, ac minori Asia contra adeo acre, ut medicamenti duntaxat expetatur: ita & Chelidonium minus, quod in Italia nascitur, minimum acrimonia sortitur; quod uero in Græcia prouenit, acre admodum sentitur. Si quidem excepta acrimonia tantum, nostri nihil præterea deesse uidetur, quin legitimum Chelidonium minus dici queat. Ex quo facile adductus sum, ut credam, quod quauis in Italico desideretur acrimonia; non tamen id esse Chelidonium minus diffidendum est: tanetsi inficias ire non liceat, nostrum Chelidonium minus, quod omnino acrimonia sit expers, ijs morbis haudquaquam conuenire posse, quibus illud conferre, quod in Græcia gignitur, tradiderunt Dioscorides, & Galenus. Nam hac deficiente qualitate, necesse quidem est, ut & uires, quæ illam consequuntur, deficient, & pereant. Hinc igitur fit, ut non possim ego subscribere iudicio Fuchsij uiri alioquin eruditissimi, qui in libro de compositione medicamentorum, quem auctum secundo excudit, Chelidonium minus esse alteram Malacocissi speciem. Quinimo eius opinio mihi refellenda uidetur, quod planta illa nullis ferè notis aliquam mollem hederam referat. Ea quidem folijs hederam quodāmodo æmularur, sed quod magis attendendum erat uircusulas non profert, quibus huius repat: id quod hederæ cuiq; natura tributum est. Minoris chelidoni uires memorie prodidit Galenus lib. VIII. simpl. medic. sic inquit. Chelidonium minus, cum acius sit maiore, celeriter illitum cutem exulcerat, unguisq; scabros eiecit. Succus eius per nares purgat, utpote admodum acer. Itaq; hæc herba quarti ordinis fuerit absoluti iam, idq; tum in calfaciendo, tum in siccaando. Herba hæc Græcis χελιδόνιον minus dicitur: Latinis, Chelidonium minus: Mauritanis, Mamiten, & Chilodomon: Italis, Celidonia minore, & Fano scellor Germanis, Feigwartzen, Blauter kraut, Psafenhoedlin, & Meienkraut: Hispanis, Scrofularia menor: Gallis, Caillons des prestes, & Esclere petite.

## Othonna.

## Cap. CLXXVIII.

OTHONNAM aliqui maioris chelidoniæ succum esse aiunt: quidam glaucij: alij succum floribus corniculati papaueris expressum. Alij permistos cæruleæ anagallidis, hyoscyami, & papaueris succos esse contendunt. Alij Troglodyticæ cuiusdam herbæ succum, quæ othonna uocatur: nascitur eam in eo Arabiæ tractu, qui ad Aegyptum spectat. Othonna folijs erucæ, perforatis cribri modo, & ueluti à tinca derosis, squalore obstitis, paucis: flore croci: latifolio: quare quidam anemones speciem esse putauerunt. Extractus succus oculorum medicamenti adijcitur, ubi expurgare est opus: mordet enim, & absterget omnem caliginem, quæ oculis offunditur. Tradunt humorem quandam ex herba emanare, qui clotus, semotis calculis, in pastillos ad eadem digeritur. Aliqui tamen affirmant lapidem esse Aegyptium, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, æreo colore, gustu cum feruore quodam, & attritione, mordaci.

Othonnæ consideratio.

Nomina.

OTHONNAM Dioscoridi fuisse incognitam, illud nobis manifesto argumento esse potest, quod nihil ex se de ea certi scribat, sed omnia alijs accepta referat, ex quorum tantum opinione fama; hæc de Othonna memoria prodidit. Quare mirari non licet, si nostra quoque ætate Othonna minime cognoscatur. Hanc cum denuiniscat Paulus suis medicamentis, asserit quibusdam in locis maioris chelidoni succum esse, eorum fortasse opinionem secutus, qui ita scripserunt, ut refert Dioscorides. Eius nomen Græcum ὀθὼνα, Latinum item, & Italica Othonna.

## Auricula muris.

## Cap. CLXXIX.

MURIS auricula, quam myosotida uocant, herba est caulibus pluribus ab una radice, aliter quatenus ab imo rubentibus, & concauis: folijs angustis, oblongis, dorso acuto, elato, nigricantibus, per interualla assidue geminatis, atque in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus: flosculo, ut anagallidis, cæruleo: radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. Radix illita ægilopia sanat. Sunt qui alfinem, muris auriculam vocitant.

Auriculæ muris confid.

REPERIUNTUR quidam Dioscoridis codices, qui hoc loco alfinem habent, quæ libro quarto post helxinem describitur, quod & ipsa nonnullis Muris auricula appelletur. Quæ forsitan nominis cognatione adducti, posteriorum quidam, ex quarto Dioscoridis uolumine in hunc locum ipsam translulare, ubi sui generis, uel potius nominis alteram representauit Dioscorides. Sed quoniam ipsa Dioscoridis scribendi series clarissime demonstrat, Alfinem statim post helxinem sequi debere, quod ei adeo similis sit, ut tradat Dioscorides eandem fuisse cum helxine, nisi humilior esset; idcirco libro quarto de ea nobis dicendum erit, quod inibi eius legitimum



## AVRICVLA MVRIS.



timam sedem esse existimemus. Ceterum hæc, de qua hic mentio est, passim mense maio floribus ornata uisitur, nimirum in pratis, in campis, in hortis, secus uias, & ubique fræ locorum. Huiusce uires paucis perstrinxit Galenus lib. VII. simp. med. sic inquit. Auricula muris desiccata ordine secundo: ceterum nullam euidentem caliditatem possidet. Ea Græcè *μυρὸς ὀρίων* uocatur: Latine, Auricula muris: Italicè, Orecchia di topo: Germanicè, Vualdt mangolt mit blauuen bluomen: Hispanicè, Orey de raton yerua: Gallicè, Orelge du ratte.

Nomina.

## Glastum.

## Cap. CLXXX.

SATIVVM Glastum, quo infectores lanarum utuntur, folium habet plantagini simile, uerum pinguius, nigriusque: cuius caulis duum cubitorum altitudinem excedit. Illita folia tumores omnes discutiunt, cruenta uulnera glutinant, sanguinis profluvia sistunt: ignem sacrum, phagedænas, putrescentia ulcera, & quæ serpunt, sanant. Syluestre glastum satiuo simile est. Folia fert maiora, lactucaceis proxima: caules tenuiores, multifidos, quadamtenus rubentes: in quorum cacumine folliculi multi dependent, quandam linguarum effigiem referentes, in quibus semen: flore tenui, luteo. Eadem, quæ & suprâ dicta, præstat, potu, & illitu lienosis auxiliatur.

ISATIS satiuâ, quam in Hetruria uulgò Guado appellamus, tingendis lanis fullonibus, & infectoribus maxime expetitur, quod lanarum infectus, quibus cum admiscetur, firmet, & nunquam deperdi patiatur. Huiusce maximus habetur prouentus

Isatidis, seu Glasti consideratio.

## ISATIS SATIVA.



## ISATIS SYLVESTRIS.





Ifatidum uires ex Gal.

Nomina.

in Umbria circa Noceram, ubi oppidum est Guadum ideo appellatum, quod ibi Isatis frequentissima seratur. Glasium sylvestre Plinio inter sylvestres lactucas recensetur lib. xx. cap. vii. quippe quod illi non sit ab simile. Fit ex Isatide de ceruleus ille color pictoribus expetitus, quem Indicum uocant, de quo diffusius lib. v. suo loco differemus. Minit utriusq; Isatidis Galenus lib. vi. simpl. medic. sic inquit. Isatis satina, qua uiuntur tinctores, facultatis est ualenter exiccantis, nondum tamen mordentis: est enim simul amara, atque adstringens. At Isatis sylvestris manifeste iam acre quiddam tum gustu, tum actione praefert. Proinde quam satina ualentius desiccans, ualentius etiam humidis putredinibus obsistit. Planta Graecis *ισατίς ὑμέρος*, Latinis Glasium satium nominatur: Italis Guado domestico. Quae uero Graecis *ισατίς ἀγρία*, Latinis Glasium sylvestre, & Italis Guado saluatico appellatur. Vtrumq; Glasium uocant Mauritanii Dili, Dileg, Vesme, Chate, Chatis, seu Alchat, Adlen, aut Adhlen, & Nil: Germani, Vucidt: Hispani, Pastel: Galli, Pastel de languedoc.

## Telephium.

## Cap. CLXXXI.


TELEPHIUM herba portulacae similis, & caule, & folijs: alas binas in singulis foliorum generculis annectit: ramuli à radice seni, septeniue prodeunt, folijs referti caeruleis, crassis, lentis, carnosis flore luteo, aut candido. Nascitur in cultis, & maximè inter uites tempore uerno. Folia senis horis illita albam uiriliginem sanant: sed postea hordeacea farina illini debet. perunctam ex aceto etiam in sole uiriliginem tollunt: sed ubi inaruerunt, absterguntur.

Telephij conseruatio.

QUANQVAM non desunt rei herbariae periti, qui existiment, Telephium eam esse stirpem, quam quidam Fabariam, alij Fabam pinguem seu crassam, quidam uero Fabam inuersam appellant: cum tamen nulla reperitur

### FABARIA.

Telephij uires ex Gal.



Nomina.

qualitate praedita, qua absterforia, siccantisq; facultatis participes dici possit, ut Galenus Telephium esse testatur, folijsq; proferat portulacae longe maiora, eorum sane sententia plane adimpleri non ausim: tamen si ea compluribus notis Telephium referre uideatur. Telephij uires memoriae prodidit Galenus lib. vii. simplicium medicamentorum, ubi ita scribit. Telephium exiccandi, & detergendi facultate est, non tamè insigniter calida: uerum in hoc forsitan quispiam ipsum primi esse ordinis censseat. Desecat tamen secundo ordine inteso, aut certe principio tertij: proinde ad putrida ulcera conuenit, & leucas, & alphas cum aceto sanant. haftenus Galenus. Caterum illas quidem Telephij qualitates eius pictura, quam hic damus, aperte satis demonstrat. At si faccultates tantum obstant, quò minus ea planta Telephium esse dici mereatur, in hoc illa ratio non parum ponderis habenda est, qua superius ostendimus, uerum Chelidonium minus herbarum illam esse, quam in eius mentione depictam exhibuimus. Nam si Arum, teste Galeno, ijs caret facultatibus in Italia, quibus in Graecia praeditum est, nil mirum uideri debet, quòd & alia plantae cum solo uires mutauerint suas, ut illi plantae, & huic Fabariae dictae facile euenisse suspicandum est. Velim tamen in his, ut in alijs quoq; dubijs plantis, suum cuiq; esse iudicium. Herbae quae τηλεφίον Graece, Telephium item Latine dicitur.



# PETRI ANDREAE MATTHIOLI MEDICI

## Senensis Commentarii,

### IN LIB. TERTIVM PEDACII DIOSCORIDIS

#### ANAZARBEI, DE MEDICA MATERIA.

**S**UPERIORIBVS, charissime Aree, commentarijs, tradidimus de aromatibus, vnguentis, oleis, arboribus, earum fructibus, & lacrymis: item de animalibus, cerealibus, oleraceis, & herbis acrimonia praeditis. In hoc autem tertio radices, succos, semina, herbas, & quae vernacula, & inter se cognata censentur, quaque pluribus scatent remedijs, prosequemur.

#### Agaricum.

#### Cap. I.

**AGARICVM** radix fertur laerpitij similis, sed facie summa solutior, & rariore, fungosoque tota contextu. Duo eius genera: foemina, quae praefertur, rectis intus uenarum discursibus constat: mas rotundus est, & vndique compactior. Vtrique gustus in initio dulcis, mox ex distributione in amaritudinem transit. Gignitur in Sarmatiae regione, quae Agaria dicitur. Sunt qui radicem esse plantae affirmant: alij ut fungos nasci in arborum caudicibus, quadam putredine. Gignitur in Galatia Asiae, & Cilicia in cedris, sed friabile, & infirmum.

Adstringendi, calfaciendique naturam habet. efficax est contra tormina, cruditates, & rupta: prodest itidem contusis, & ab alto deuolutis. Datur duobus obolis in uino mulso febrim non sentientibus: febriculosis uero in aqua mulsa: arquatis quoque, suspiriosis, iocineris, renumque vitio laborantibus, dysentericis. Item si urina aegre reddatur, si uuluae strangulatus urgeat, si pallor membra decoloret, drachma una dari solet: si tabes infestat, ex passo: si lien negotium exhibet, ex aceto mulso: si dissolutio stomachi est, ita ut cibi tenax non sit, manditur, & sine ulla humoris sorbitione deuoratur: simili modo acida ructantibus propinatur. sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxendicum, & articulorum dolores, & comitiales morbos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur: menses ciet: foeminis, quas inflatio vuluae uexat, utiliter aequali modo datur: horrores soluit, datum ante febrim accessiones: aluum purgat, drachma vna, aut altera, si cum aqua mulsa bibatur: venenorum antidotum est denarij instar, cum diluta portione sumptum: si serpentes ictum vibrarunt, morsumque subfixerunt, tribus obolis ex uino potum, mire auxiliatur. In summa, internis omnibus uitij conuenit, pro uiribus, & aetate datum, nunc ex aqua, nunc ex uino: ijs ex aceto mulso, alijs ex a-



um est denarij instar, cum diluta portione sumptum: si serpentes ictum vibrarunt, morsumque subfixerunt, tribus obolis ex uino potum, mire auxiliatur. In summa, internis omnibus uitij conuenit, pro uiribus, & aetate datum, nunc ex aqua, nunc ex uino: ijs ex aceto mulso, alijs ex a-

**AGARICVM** fungus est in arboribus nascens. Plura de eo diximus libro primo in laticis arboris historia. Agarici consideratio. Praestantissimum habetur in Tridentinis montibus, ubi sepiissime proprijs manibus illud diuulsimus, adacta securicu-



**Fuch. lapsus.** la. Caterum tametsi Plinius lib. XVI. cap. VIII. omnes glandiferas arbores Agaricum ferre tradit; in Tridentinis tamen sylvis, ac etiam in reliquis Italiae locis, quod equidem uiderim, soli tantum larici innascitur. In cedro Agaricum gigni, tum in Asia Galatia, tum in Cilicia scribit Dioscorides, nulla eius mentione facta, quod in larice ipsa, ac glandiferis (ut Plinius inquit) arboribus prouenit. Fuchsius medicus etate nostra celebris in libro de compositione medicamentorum, quem imper auctum excudit, Agaricum ex Sarmatia per Illyriam Venetias afferri tradit, & ex Galatia & Cilicia Alexandriam, & ab Alexandria Venetias. ea fortasse argumento ductus, quod Dioscorides auctor sit agaricum nasci in Sarmatiae regione, in Galatia Asia, & Cilicia. Verum iam pridem desijt ex illis locis importari, ut testantur mercatores & pharmacopœi. Equidem compertum habeo, omne ferè agaricum, quod Venetijs uenditur, partim deferri ex Tridentinis montibus; in quibus sunt sylue laricibus refertae, partim ex Vulturi agro, & alijs finitimis locis, partim ex Norico tractu. Neque certè unquam, dum ego Venetijs agerem, intelligere potui, quod agaricum aliunde conueheretur. Quare adducor, ut putem, Fuchsum uirum alioquin eruditissimum, in hoc plane deceptum esse. Agarici meminit Galenus sub quodam radicis genere lib. VI. de simplicium medicamentorum facultate, ubi sic inquit. Agarici radix, hoc est, quae trunco innascitur, primo quidem gustu dulcis, sed paulò post subamarè apparèt & acrimonia quandam speciem temporis spatio inducit, leuiculaq; adstrictionis. est & consistentia laxa. Ex quibus omnibus manifestum est, si quidem quæ superioribus commentarijs dicta sunt, meminimus, quod medicamentum hoc compositum est ex substantia aerea, & terrea à caliditate extremata: porro minimum habet substantiae aqueae. Hac ratione, & digerendi, & calfaciendi uim habet, & crassitudinem incidendi, tum infarctus uiscerum expurgandi. Proinde regio morbo laborantes sanat, eos utique, qui sic ab infarctu iecoris laborant. Iuuat & morbo comitiali obnoxio eadem facultate, tum rigores per circuitum recurrentes ex crassis, aut uiscosis humoribus uatos sequat. Iuuat & morsos à bestiis frigore ledentibus, aut compunctos, tum feris in affecta parte impositum, tum intro in corpus sumptum pondere draçmæ unius cum uino diluto. Est & purgatorium. Et lib. primo de antidotis idem Galenus inquit. Agaricum fraudem nullam admittit. optimum est leuissimum, densum uerò, & graue, & lignosum deterrius. Quod autem inter hæc medium est, quantum signis, tantum & uiribus ab utrisque distabit. hætenus Galenus. De uiribus Agarici Mesues quoque scripsit, sic inquit. Agaricum deiecit utranque bilem, ac etiam pituitam ipsam: crassos, lentos, putrescentesq; humores expellit. Eius propria facultas est cerebrum, omniumq; sensuum organa, ac musculos expurgare: excrementa, quæ spinali medulla pariter & neruis inhaerent, educere: pulmonem, ac pectus à lentis, ac putrescentibus humoribus detergere: ac deinde uentriculum, iecur, lienem, & renes, & mulieribus uterum mundare. Præter hæc soluit Agaricum compaginum omnium contumacem materiam. Quapropter non mirum uidetur, uocasse Democritum agaricum familiarem medicinam, cum ad omnes corporis partes conformitatem habeat. Nam non imbecilles possidet uires ad plerisque, tum capitis, tum cerebri, tum eiusdem membranarum morbos: nempe diuturnum dolorem, comitalem morbum, apoplexiam, uertigines, maniam, atram bilem, & cerebri inflammationes. Est etiam morborum omnium, quorum causa fuit obstructio, medicina admodum singularis. quo fit ut regio morbo affectis, aqua inter cute laborantibus, ac lienæ uexatis leuamentum præstet. Urinam quoq; pellit, ac menses commodè ciet. Coloris nitorem Agarici usus toti corpori commendat. Ventris tineas tum uecat, tum deiecit. Coxendicum doloribus conuenit, & diuturnas febres dissipat. Quod Græci ἀγαρίον, Latini quoq; Agaricum dicunt: Mauritani, Garichum, seu Garicum: Itali, Agarico: Germani, Daunen schuam: Hispani, Agarico: Galli, Agarie.

## Rhaponticum.

## Cap. II.

**RHA**, aliqui rheum, Latini rhaponticum uocant, prouenit in ijs, quæ supra Bosphorum sunt, regionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, centaurio magno similis, sed minor, & rufior, fungosa, aliquantum læuis, sine odore. Optimum habetur, quod teredines non sensit, si gustatu cum remissa adstrictione lentescat, manducatumque colorem reddat pallidum, aut ad crocum inclinantem. Id epotum facit ad inflationes, stomachi imbecillitatem; & omne genus dolores, ad conuulsas, ruptas, lienofos, hepaticos, tormina, & renum, uesicæ, & pectoris uitia, aduersus intenta præcordia, & uulnæ mala, coxendicum dolores, sanguinis excreationes, suspiria, singultus, dysenterias, & celiacorum affectus, contra febrium circuitus, & uenenatorum morsus. Datur in singulis ualerudinebus eadem, quo agaricum pondere, & cum eisdem liquoribus: si febris careant in mulso: sin aliter ex aqua mulsa: si tamen experiuntur, ex passo: si lienis exercet, in aceto mulso: si dissolutio est stomachi, id est, cum cibi tenax non est, manditur, & sine sorbitione ulla deuoratur. Liuentia, lichenasq; tollit, cum aceto illitum. Inflammationes omnes ueteres ex aqua oblitum dissipat. Summa eius uis adstringens, cum aliquanto calore.

**Rhapontici  
consideratio.**

**RHAPONTICVM** officinæ Rheuponticum uocant. Quod nomen sibi asciuisse uidetur à Rha fluminis regionem quandam Ponto conterminam præterluente, in cuius fluminis ripis numerosum nascitur. Cuius rei testis est Ammianus Marcellinus lib. XII. suarum historiarum, ubi sic scribit. Tanais, qui inter Caucasas oriens rupes per sinuosos labitur circumflexus, Asiæq; ab Europa distermians, in stagnis Maoticis delitescit. Huic Rha uicinus est amnis, in cuius supercilijs uegetabilis quædam eiusdem nominis gignitur radix, ad multiplices medelarum usus proficiens. hæc Ammianus. Legitimè paucis abhinc annis ad nos aduehi cœpit. Nā multo antea tempore Rhapontici uicem maioris centaurij radix in medicina usum irrepsit. Qua etiam nostra etate non desunt, qui Rhapontici loco utantur.



tur, recentiorum inuenta ressuantes, cum haftenus legitimum Rhabarbarum neque nouerint, neque uiderint: tanta est quorundam pertinacia. Credidere ad haec peritissimorum medicorum quidam, praeterito nuper aeo, Rhabarbarum a Dio-  
 scoridis nullo discrimine differre. Quippe quoniam eorum temporis curriculo legitimum Rhabar-  
 barum Italia non uiderat. Quod cum paucos post annos ad nos esset allatum, non defuere qui priorum reuocauerint  
 sententiam. Id quod maxime palam facit Manardus Ferrariensis in suis epistolis. Quandoquidem is lib. v. i. epistola  
 II. firma hac, et stabili ducebatur opinione, uulgares nostri usus Rhabarbarum, et Dioscoridis Rhabarbarum et idem  
 esse, et nihil inter se cognatione differre. Veruntamen cum postea legitimum conspexisset Rhabarbarum e Moscho-  
 nia allatum, quod Dioscoridis historiam notis omnibus referret, nouum statim induit opinionem, et priorem, quam  
 habuit, reuocauit, ultima quinti libri epistola ad Leonicenum scribens. Rhabarbarum primum uidi ego Venetijs in  
 officina ad medici insignium e Constantinopoli allatum, ac deinde alijs pluribus in locis etiam ex Alexandria conue-  
 ctum. quod nullis reclamantibus notis, uerum antiquorum Rhabarbarum refert. Inuehitur Auerroes lib. v. suarum  
 collectanearum tum in Galenum, tum in reliquos, qui dixerunt Rhabarbarum facultate tantum adstringenti pollere,  
 quod purgatorium; quae illi inest, facultatem minime compererint: cum tamen Auerroes ipse sit maximopere carpen-  
 dus, quod neque Galenus, neque ceteri seniores Rhabarbari nostri usus usquam meminerint, nec quicquam de eo po-  
 steritatis memoriae prodiderint, tamen si de Rhabarbaro a Dioscoride descripto plura tradiderint, inter cuius facul-  
 tates nulla penitus, quae purgando sit, inueniri potest. Rhabarbari meminere, sub Rhabarbari tamen titulo, nisi in-  
 terpretis (ut ferè suspicor) sit lapsus, cum Serapio, tum etiam Auicenna. quandoquidem non plures suo Rhabarba-  
 ro assignauere facultates, quam qui eos praecesserunt, Rhabarbaro assignauerint. Quippe quod eorum neuter scri-  
 pserit, suum Rhabarbarum deiectionis facultate pollere. Id quod uerum indicium praebet, scripsisse hos de Rha-  
 barbaro, non autem de Rhabarbaro. Quo fit, ut non ab re putandum sit, id euenisse interpretum ignorantia Rha-  
 barbarum in Rhabarbarum permutantium. Cognouit tamen legitimum (ni fallor) aetatis nostrae Rhabarbarum Pau-  
 lus Aegineta, cum ipse meminerit libro VII. cap. XI. in quibusdam medicamentis aduersus podagras, quorum co-  
 gnomen sunt diacorallion, compositio Agapeti, et compositio atactos. Verum non propterea credidit ipse, Rha-  
 barbarum a Rhabarbaro differre. Cuius rei auctor is fidei manifestam facit libro primo cap. XLIII. ubi scribit,  
 quod deuorata terebinthina resina oliuae quantitate dormituris aluum leniter molliat, et quod id praestatur efficacius,  
 si Rheipontici momentum admiscetur. Ex quibus palam fit, per Rhabarbarum Paulo Rhabarbarum designari, quod  
 forte inter haec existimauerit nullam intercedere cognationis differentiam, quemadmodum credidere recentiorum  
 quidam, de quibus paulo ante diximus. Paulo enim si Rheipontici, et Rheibarbari aliqua intercessisset differentia,  
 ubi peculiariter de simplicibus medicamentis agit, de utrorumque facultate speciatim scripsisset. Sed cum ibi tantum  
 Pontici meminerit, indicium haud dubium est, illi Barbari, et Pontici nullam fuisse differentiam. Ceterum Ruellius  
 opinio, alterum ab altero minime disidere: atque si qua differentia reperiatur, eam non aliunde prouenire, quam  
 regionum, ubi gignitur, diuersitate, clementia, uel inclementia celi. Neque alia ratione asserit, Ponticum nullo  
 odore commendari, quam aquilonarium regionum, in quibus oritur, immani frigidity: cum tamen Pontica regio  
 non usque adeo sit frigida, ut Ruellij sententia admitti debeat, sed ut potius tanquam inanis reprobanda uideatur.  
 Quandoquidem sequeretur, quod cetera stirpium genera, quae tam in oriente, quam in meridie odoris fragrantia  
 commendatur, in aquilonari plaga: et in ipsa Ponti regione penitus inodora reperiuntur. Quod tamen falsum  
 esse semper crediderim: nam quamuis stirpes omnes, quae in aquilonaribus regionibus oriuntur (de his, quae natura  
 odoratiores habentur, intelligo) ex climatum, et aeris algore, sint odore, ac ceteris qualitatibus imbecilliores;  
 non ob id tamen harum qualitatuum adeo expertes deprehenduntur, ut discerni nequeant: quin et in quemlibet usum,  
 ubi scilicet conferant, non recipiantur suis in regionibus. Quippe si ob frigoris, ac regionum inclementiam suas in-  
 natas qualitates penitus exuerent, adeo ut sola tantum forma remaneret, propriam omnino peruerterent speciem.  
 Quod tamen nulla ratione, nec auctoritate probatur. Siquidem compertum iam pridem apud nos est, quod quamquam  
 Celtica nardus, quae a quibusdam Carinthiae, et Stiriae alpijs nobis affertur, a quibus penè quatuor, uel quinque  
 rotius anni mensibus, nix colligata labitur; itemque acori radix, quae nostro aeo ex Sarmatia Europae glacie, et ni-  
 uibus maiore anni parte semper obducta, aduehitur in calani odorati usum, odore tam ualido, naresque feriente fra-  
 grare non deprehenduntur, quemadmodum Celtica illa nardus, quae ex Liguria, et Istria defertur, et acorum,  
 quod ex Ponto, Syria, et Aegypto petitur; non tamen ob hoc euenit unquam, quin suis proprijs ac naturalibus fra-  
 grent odoribus. Quo fit, ut infirma admodum, quantum equidem conicio, sit Ruellij sententia. Quare hinc nobis  
 concludere liceat, Rhabarbarum odoris expers non esse, aeris, soli, et regionis algore, sed quod alia a Rhabar-  
 barico, uel Indico sit planta. Declarant praeter haec, Rhabarbarum a Rhabarbaro plurimum distare purgatoria-  
 uis, quam natura ipsa Rhabarbaro largita est, odor nares feriens, compacta simul substantia, aureus color, aridis-  
 tas, amaritudo, quae gustu percipitur, et ponderis grauitas. Quandoquidem Rhabarbarum nullo odore commenda-  
 tur, minime deiectionem molitur, cum potius adstringat; non est amarum, sed subacre; non aridum, sed lentum; non  
 compactum, sed rariatum; non ponderosum, sed admodum leue. Quibus rationibus fretus non temere asserendum puta-  
 uerim, Ruellium hac in re magnopere hallucinatum fuisse, praesertimque cum dicat, nullo alio discrimine Rhabarbarum  
 a Rhabarbaro differre, quam odore tantum. Vanum quippe uidetur argumentari, Rhabarbarum, et Rhabarbarum  
 unam et eandem esse radicem, quod forma, colore, ac specie nihil inter se distare oculorum sensibus appareant, cum  
 tam in facultatibus, quam qualitatibus, maxime inter se differant. In simili errore uersantur etiam ij (sunt enim  
 qui ita sentiant) qui sibi falso persuadent, abietis lacrymam a larigna nihil disidere, ac unam et eandem lacrymam  
 esse, eo quod in colore, in substantia, ac in ceteris notis, in quibus perpendendis oculi tantum indices sunt, adeo per-

Quorundam error.

Vana Auero-  
rois calūnia  
contra Gal.Rhapontici,  
& rhabarbari  
discrimen.Ruellij, & ali  
quorū error.



Rhapōtici ui  
res ex Gal.

Rhei Turcici  
nomēclatio.

Rhei Indici  
nominatio.

Rhei Barbari  
ci nomenclatura.

similes uideantur, ut uisibili facultate altera ab altera discerni non possit. Verum si quis rem ceteris sensibus experiri aggrediatur, discriminis certior fiet: namq; olfactu odoris fragrantiam haud insuauem, gustu uerò amarorem in arietibus lacryma comperiet, quibus larigna caret. Et quisnam iuniperi resinam à lentiscina secerneret, nisi rei ipsius in corruptus index fuerit gustus? Quis à strobolina resina, & à quibusdam gunmi globulis thus ipsum agnosceret, nisi adulterium tum igne, tum gustu deprehenderetur? Tanta præterea intercedit similitudo inter pistacium & unguentariam glandem, ut uisi hæc amaritudinem gustui relinqueret; illud uerò dulcedinem, difficillimum sanè fuerit alterum ab altera distinguere. Quid porrò inter se similius reperitur, quàm cassia, & ciunamomum, etsi hæc omnino specie non conueniant? Hinc facile adductus sum, ut nullius momenti eorum argumenta semper existimauerim, qui res secundum quasdam tantum qualitates diiudicant, quibus etiam sæpe decipiuntur, ut ij, qui hac leui ratione ducti, Rhabarbarum, & Rhaponticum idem esse contendunt. Meminit Rhapontici Galenus lib. viii. simplicium medicamentorum, ubi de eius uiribus ita scriptum reliquit. Rheum, quidam ipsum Rha nuncupant: mistam habet tum temperaturam, tum facultatem. Habet enim quiddam terrestre frigidum, ceu indicio est adstrictio, & adiuncta est quædam illi caliditas: siquidem si plusculum mandatur, subacre conspicitur. Quinetiam aerea cuiusdam substantie subtilis est particeps, quod indicat tum laxitas, tum leuitas: uerum non minime & opera. Ob id enim licet adstringens, tamen non tantum conuulsis, sed & ruptis, & orthopnæa prodest. Sic quoq; liuentia, & lichenas sanat cum aceto illitum. Porro quòd adstrictionis opera haud instrenua sunt, hinc discere liceat, quòd sanguinem expuentibus, cæciliacis, & dysentericis conferat: nec enim reluctatur terrestri frigido tenue aerium, imò eo quòd deducat, et in altum perducatur, ualentioris affectus causa existit. Et in libro de antidotis primo: In Rheo, inquit, quoque fraus committitur: nam quibus in locis nascitur, simul atq; euulsus est, ipsam elixant; quòd succum remittant, ac tam succum, ut syncerum, & aquæ impermistum, quàm Rheum exiccatum, ut non elixum ad uos postea mittunt. Idcirco scire oportet adulteratum dignoscere. quòd facillimè ab his deprehenditur, qui Rheum sua sponte nascens uiderunt. hæc uisus Galenus. Ceterum adulterium, quod in Rheo fieri prodidit Galenus, id (ut paulò post dicturi sumus) de Rhabarbaro tradidit Mesues. Cui tria Rhei constituantur genera, nempe Turcicum, Barbarum, & Indicum, quod & Sceniticum uocat, omnia à regionibus, à quibus conuehantur, cognominata, uel in quibus proueniunt. Quippe Turcicum nil aliud illi designatur, quàm Ponticum, uel quòd è Ponto ad Turcas uicinas deferatur, uel quòd ab ijs saltuosius conuallibus, in quibus ultra Tanain fluuium priores Turcæ, Pomponij Melæ, & Plinij testimonio, uenationibus ferè uixere tantum, iam pridem in Pontum fuerit delatum. Siquidem ab his non longè distat Rha fluuius, circa quem Rha, quod Ponticum posteri uocauerunt, probatissimum auctorum testimonio, oriri certò scimus, fluminis illius nomine pariter appellatum. Quo fit, ut hac in re non dubitauerim errasse etiam Mesuem. quippe qui inter Rhei genera nomine ducentia Ponticum admiscuerit, à ceteris tum specie, tum facultate diuersum, quauis fortasse rectius id Turcicum appellauerit, quàm Ponticum. Porro Indicum ab India dictum, ubi frequentissimum prouenit, nemo est qui ambigat. Sed quauam ratione Sceniticum, & Indicum idem esse dixerit Mesues, hæcenus compertum non habeo: nisi fortasse Sinicum rectius legendum fuerit, quòd à Sinis extremæ Indiæ populis (ut arbitror) deferatur, cum plura quoq; aromatum genera ea regio mittat. Id quod manifestè idem declarat Mesues: quippe qui Scenicum, uel Sceniticum Indum esse affirmat. Scenitæ enim (ut infra dicemus) Indiæ populi non sunt, sed potius Sini, à quibus Sinicum, non Scenicum, ut uulgata habet lectio, nra quidem sententia, uocari debet. Sunt tamen qui uelint Scenicum, nec Indicum esse, nec à Sinarum regione oriundum, quod à Mauritanis non Sinicum, sed Scenicum dicatur. Quamobrem eorum quidam, ut Adamus Lonicerus, in Arabia hoc nasci censet, & à Scenitis illius regionis populis Scenicum, siue Sceniticum uocari putat. Fuchsius uero Mesuis opinionem secutus, nullam inter Indicum, & Scenicum facit differentiationem, quippe qui scripserit libro primo de compositione medicamentorum, Rheum Indicum esse uocatum, quòd ex India, aut locis Indiæ proximis, nempe à Scenitis populis, ut auctor est Stephanus de urbibus Persidis, deferatur. Verum cum Scenitæ desertæ Arabiæ populi omni aromatum genere sint destituti, cumq; asserat Mesues Sceniticum rheum, & Indicum idem esse, cadit, peritq; Loniceri opinio. Velim tamen si possem Fuchsij sententiã probare. Verum cum Scenitæ etiam Straboni populi sint è Parthorum collegio Arlæ, & Martyanæ montes incolentes, distentq; ab Indiæ finibus milliariibus plusquàm mille & quingentis, uestio profectò, quoniam modo Indicum rheum à Scenitis Parthorum populis Sceniticum dici possit. quo fit, ut etiam Fuchsij opinionem longius sustinere nequeam. Ad hæc de Barbarici nomenclatura uaria admodum est recentiorum medicorum sententia. Quandoquidem sunt qui uelint sic dictum à Barbaria Aphricæ prouincia, sic uulgariter appellata, ubi olim Carthago clarissima habuit sedem. Horum opinionem sequitur Fuchsius, quòd scripserit libro primo de compositione medicamentorum, id uerum fuisse Rhabarbarum, quod superioribus annis secum adduxere milites, qui cum Carolo Imperatore Tunetem expugnauere. Alij Barbaricum uocari credunt, quòd à Barbari Indiæ ciuitate, quæ intra Indi fluuij fauces est sita, deuehi censent, rati Indicum, & Barbaricum idem esse. Alij autem à Barbaria Erythræi pelagi insula, sic appellatum existimant, quòd Indiæ naues, ac liburnicæ aromata deferentes magnum suæ mercis ibi iam pridem habuerint emporium, à quo per Arabicum sinum, traiecto prius angustò mari de Mecha, aromatum omne genus in Aegyptum per alias deferebatur nationes. Sed aliter se habet opinio nostra: quippe quòd semper existimauerim, Rhabarbarum ex Troglodytica Aethiopiarum regione ad nos deferri, et ibi etiam oriri, quòd ea regio Barbarica antiquis fuerit appellata. Siquidem inuenio Galenum scripsisse tum lib. vi. de simplicium medicamentorum facultate, tum lib. iiii. cap. vi. de tuenda sanitate gigniber ex Barbaria ad nos conuehi: quod tamen Dioscorides superiore libro, & Plinius lib. xii. cap. vii. à Troglodytis deferri, & in eorum regione nasci tradunt. Quinetiam reperio, glandem unguentariam, quam Galenus ex Barbarica regione adferri scribit, Dioscoridem libro sequenti in Aethiopia, ubi est Troglodytica regio, & Plinium libro xii. cap. xxi. Troglodytis nasci posteritatis memoriæ prodidisse. Ex quibus sanè liquidò constare puto, Troglodyticam



dyticam regionem, & Barbaricam antiquis unam & eandem fuisse. Huc præterea accedit alia Plinij auctoritas, qui libro iam bis citato, cap. x l x. ubi raritatis cinnamomi causam reddit, id accidisse scribit, incensis sylvis Barbarorum ira. Nam cum ipso inibi teste, oriatur cinnamomum in Aethiopia Troglodytis connubio permixta, non alias utiq; gentes Barbaras appellasse credimus, quam Troglodytas. Quamobrem & myrrham Troglodyticam appellavit Barbaram cap. x v i. eiusdem uoluminis. Nec ab re quidem Galeno, & Plinio Troglodytæ Barbari speciatim dicuntur, cum scripserit Pomponius Mela grauisimus auctor libro primo de situ orbis, eos magis stridere, quam loqui, specus tantum subire, & ali serpentium carnibus. Quæ sanè omnia ita in mea me firmant opinione, ut certò credam, Rheim illud uerè esse Barbaricum, quod ex Troglodytica afferatur regione. Sententiam nostram magis adhuc confirmare uidetur Strabo, quòd lib. x v. suæ Geographiæ aperte testetur, ea omnia in aromatum, & plantarum genere oriri in Aethiopia, quæ in India australi proueniunt, quòd hæ regiones sole persimiles sint. Non placet igitur, ut dicam liberè quod sentio, Fuchsij opinio ob prædictas tum rationes, tum auctoritates, tum etiam quoniam apud nullum usquam legerim ex ea Aphrica parte, quæ uulgò dicitur Barbaria, Rha aliquod afferri, quod ibi prouenerit. Quin nec aliorum sententias comprobauerim, quoniam nec illud, quod à Barbari Indiæ ciuitate, nec illud, quod à Barbaria Erythræi pelagi insula aduehitur, rectè Barbarum dici potest, cum ex India utrunq; petatur, & quòd nullus extet auctor, qui à Barbari ciuitate Rhabarbarum scribat suam duxisse originem. Quare illud legitimum esse Rhabarbarum mea demum firma sententia est, quod ex Troglodytica Aethiopie regione fuerit aduectum. Quod facillè fortasse Veneti, qui quotannis in Alexandriam nauigant, seligere possent ab Indico: quod certò sciam, multa aromatum genera præter Indica eò ex Aethiopia, & felici Arabia per carouanas (ut uocant) comportari. Cæterum, antiquam de Rhabarbari uiribus agamus, illud in primis ignorandum non est, quòd falsa, ac uana sit uulgare, & aliorum quorumlibet opinio, qui sibi firmiter persuadent, Rhabarbarum uolentum admodum esse medicamentum, & quòd propterea à medicis non exhibeatur, nisi in deploratis firè morborum affectibus. Siquidem (ut inferius clarissime patebit) illud haud dubiè iutò & pueris, & utero gerentibus mulieribus omni tempore, & ætate exhiberi potest. Atqui in eiusmodi hominum mentibus inualuit hæc inanis opinio: quoniam elapsis temporibus tanta Barbaricæ huius radices extitit penuria (æquali enim cum auro pondere uidebatur) ut ad prætij magnitudinem cuitandam, cam tunc non dedissent medici, nisi ubi morbos uel mortis periculo, uel diuturnis languoribus non uacare, certis signis coniecissent. Quo factum fuit, ut passim hac reprobanda opinione ducerentur homines ad credendum, quòd in morbis curandis ualentissimum, imò uolentissimum omnium medicamentorū esset Rhabarbarum. Huius uires cæteris diligentius, latiusq; descripsit Mesues, sic inquit, Rhabarbarum innocens, clemens, & excellens est medicamentum, multas dotes medicamento purgante maximè expetitas complexum. Præcellit in omni genere Indicum, quod recens sit, colore subnigro rufescente, ponderosum, quanuis sua substantia rarum, & quòd cum frangitur, rufum, & glaucum colore alternante spectatur: item quod mansuui croceo inficit colore. Adulteratur autem, quod omnino te animaduertere cautius oportet, hoc modo. Accipiunt impostores Rhabarbari multum, totumq; aqua macerant quinq; diebus, exemptum deinde stecant, subtractaq; ui, & quasi anima uendunt. Aquam uerò, qua maduit, igne, uel sole similiter stecant, & in pastillos conformant ad regales usus. Fraus cognoscitur, quòd syncerum non uehementer adstringat, substantia rarius sit, & colore croceo inficiat. Adulteratum uerò contrà se habet, coloris interni uarietatem amittit, & subnigricat. Calefacit, ac stecat secundo ordine, etsi nonnulli primo tantum dicant. Constat tum aëreis, tum terreis qualitatibus, quæ adstringentem ei facultatem tribuunt, & eius substantiam conseruant: Est & aëreis raritatem substantiæ conferentibus particeps. Nec igneis quidem expers est, à quibus amaritudinem, concurrentibus etiam terreis qualitatibus, acquirit. Ac ipsa terrestris qualitas in imo delitescit: ignea uerò in sublime feratur, quo fit, ut eius diuidantur qualitates cum aqua, aut uino perfunditur. Operatur autem in obstructionum affectibus igneis tantum facultatibus: terreis uerò, ubi adstrictione sit opus. Omni penitus uoxa uiscat, daturq; omni tempore, & ætate, adeò ut pueris ætate tenuellis, & prægnantibus facillè exhiberi possit. Anget Rhabarbari uires cænarum serum, uel si maceretur intubi, uel apij aut plantaginis decocto. Nulli memoria excidat, quin semper Indicæ nardi tantillum ipsi commisceatur, cum maximopere conserat. Addendum etiam semper erit uini albi odorati modicum, præsertimq; ubi ad obstructions referendis paratur. Illud præterea memoriæ retinendum est, quòd scilicet in adulterato nulla deiectionia reperitur facultas. Synceri macerati expressio probè conuenit, ubi tantum abstergione, deiectione, ac infarctus liberatione sit opus. Quod si post hæc functiones, uiscera adstrictione roborante egerint, ipsam quidem in puluerem contritum exhibendum fuerit. At illud, quod igne torrescit, uehementer operatur, ac uehementius quod comburitur. Purum, selectum, ac substantia compactum, absq; iactura in tenuem puluerem conteri potest. Rarum uerò, ac laxum minimè, quoniam ex uehementi, ac longiori contritione facillè enanescit, ac deperditur. Resoluitur item eius uis, cum aqua, uel uino decoquitur. Deijcit Rhabarbarum non modò bilem, sed etiam pituitam ipsam. Eiq; propria facultas inest cum abstergeri, tum etiam roborandi tam uentriculum, quam iecur, & eorum compunctiones amouendi. Clarificat Rhabarbarum sanguinem, obstructions aperit, ac omnes pariter affectus sanant, quos generant obstructions: nempe aquam intercutem, regium morbum, lienis crassitiem, ac diuturnas febres: sanguinem reijcientibus, ac eius à qualibet parte manationibus qualitate, ac facultate substantiæ prodest. Datur etiam ab alto deuolutis, ruptis, & tam internè, quam externè fractis maximo iuuamento, præsertimq; si uino austero drachmæ pondere commisceatur, addito synceræ mumiæ momento, ac etiam erythrodani radice tantundem. Singulis uientibus opitulatur, dysenteriam cohibet, præsertim quod igne sit torrefactum, addito tamen adstringente uino, & plantaginis succo. Vindicatur à carie, & tere dine annis tribus, uel quatuor. Verum si cera oblinatur, uel in melis reponatur, uel psyllij semine, uel milio sepeliatur, diutius integrum, & syncerum seruari poterit. In Italiæ quoque Rhabarbarum quoddam in hortis, & uiridarijs passim reperitur, à peregrino non absimile. quod etiam (ut à medicis

Opinio falsa.

Rhabarbari vires ex Mes.

Rhabarbari Italianum.



Nomina : à medicis fide dignis mihi relatum est ) bilem deiecit , quanuis peregrino sit longè infirmius . Radix ; quæ præcipue  
ἐὶν Græcis , Rhaponticum Latinis appellatur : Arabibus , Raued , seu Rauend : Italis , Rhapontico .

## GENTIANA.



Gentiana.

## GENTIANA MINOR.



Cap. III.

GENTIANAE inuentio prima assignatur Gentio Illyriorum regi, à quo cognomentum habuit. Folijs partim proximè radicem, inglandi, plantaginæ similibus, subrubris: partim à medio caule, & præsertim iuxta cacumen, paulum dissectis. caule cauo, & læui, digiti crassitudine, geniculato, & ex interuallis maioribus foliato, binum cubitorum altitudine. semine in calycibus lato, læui, glutinoso, satis ad sphondilij semen accedente. radice longæ aristolochiæ, longa, crassa, amara. nascitur in sublimibus montium iugis, vmbrosis locis, aquosisque. Vis radice excalescentia, & adstringens: contra morsus serpentium, duabus drachmis, cum pipere, rutâ, & vino pota auxiliatur. Extracti succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi deturbatis, ruptis, & conuulsis prodest: hepaticis, & stomachicis, pota cum aqua subuenit. Radix collyrij modo subdita, partus eijcit: impo-  
ta, vt lycium, vulneraria est, & vlcera cuniculatim depascentium medela. Succus præcipue eodem effectu prodest: oculis inflammatione laborantibus illinitur: pro meconio collyrijs acris immiscetur. Radix vitiliginem absterget. Succus extrahendi ratio hæc est. Contusa radix quinque diebus aqua maceratur: postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices: & vbi refrixit aqua, li-  
teo excolatur: mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat, siccilique reconditur.

Gentianæ cõ-  
sideratio.

Gentianæ ui-  
res.

GENTIANA planta est uulgaris notitiæ. Frequentissima excelsis Tridentinis montibus prouenit, præsertimq; in Ananijs, in quorum cacuminibus sæpius eius effodi radices brachiali crassitudine, & bicubitali longitudine. Hanc à Gentio Illyriorum rege inuentam, unde illi nomen, non modò Dioscorides; sed aliorum etiam ueterum monu-  
menta testantur. Plinio lib. xv. cap. vii. ea est omnium præstantissima, quæ in Illyrico nascitur, ubi fortasse præ-  
miam inuenta est. Gentianæ uires paucis admodum perstrinxit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, sic  
inquiens. Herbe Gentianæ radix ualde efficax est, ubi extenuatione, purgatione, absterstone, obstructionis libera-  
tione opus sit. Nec mirum, si hæc possit, cum impense sit amara. Hæc (ut Auicenna ait) excalescit ordine tertio,  
siccatq; secundo. Vrinam, & menses ciet, & aduersus scorpionum ictus cæteris antidotis præstat. Eius aqua, præ-  
sertim quæ uase duplici balnei uapores uitreis organis elicitur, febres (ut ego sæpius expertus sum) ab infarctione  
uiscerum, tum uasorum excitatas mirifice pellit. Alui tineas necat, maculasq; in facie qualescunq; detergit, si ea fre-  
quentius



quentius maculae abluantur. Est præterea quedam vulgaris etiam planta, aliquibus CRUCIATA dicta, quæ non parum cum Gentiana cognationem habere uidetur: quandoquidem & notis, & facultatibus illi plurimum respon-  
deat. Vnde eos, non longè aberrare crediderim, qui hanc Gentianam minorem appellauerint. Hæc in incultis præ-  
cipue locis nascitur, caule rotundo, dodrantali, ac etiam maiore, in cacumine rufescente, paribus fere interuallis ab-  
imo ad summum geniculis intersecto: è quorum singulis alis bina prodeunt folia suppinguia, longa, vulgaris dictæ Sa-  
ponariæ æmula, & Gentianæ foliis in summitate erumpentibus similia. Flores, qui purpureo colore nitent, in sum-  
mo circum caulem in orbem exeunt. Radix illi alba, longa, anaristimo gustu, locis pluribus ab utroque latere crucis  
instar perforata: unde illi Cruciatæ nomen indiderunt. Sunt etiam in hoc genere duæ aliæ plantæ: sed longè mino-  
res, tenuibus radicibus, & caule admodum paruo. Harum, & prædictæ radices recentioribus magnis laudibus effe-  
runtur contra pestilentiam, & uenenosorum animalium ictus. Cæterum ego quidem illud experientia cõpertum ha-  
beo, quòd radice tusa, & uentri emplastri modo imposita, uermes, qui in intestinis fuerint, procul dubio necantur:  
& ulceratæ strumæ sanantur, si ijs eodem modo contusa, quæ nuper effossa sit, uel sicca, & in puluerem contrita ad-  
bibeatur. In summa non desunt, qui asserant, has ea omnia præstare posse, quæ Gentiana. quod ex prædictis facile  
probari potest. Ananiensis rura Cruciatam uulgò uocant Pettimborsa. Ex quo quis conijciat, si lubet, hanc illis in-  
digenis, corrupta Italica uoce Metti in borsa, ideo Pettimborsa nominari, quòd tot uiribus commendetur, ut perinde  
ac gemma, crumenis asseruari mereatur: aut quòd tantum uiribus excellat, ut medici ea utentes ingentem argenti,  
& auri copiam crumenis sint reposituri. Tertiam planta sic Græcis, Gentiana similiter Latinis uocatur: Mau-  
ritanis, Gëtiana, Gentiana basilica, seu Basateca: Italis, Gentiana: Germanis, Entzian, Bitter uurtz, siue Creutz-  
uurtz: Hispanis, Gentiana: Gallis, Gentianne.

Cruciatæ con-  
sideratio.Cruciatæ  
uires.

Nomina

## ARISTOLOCHIA ROTVNDÁ.

## ARISTOLOCHIA LONGA.



Aristolochia.

Cap. IIII.

ARISTOLOCHIA nomen ex eo sibi adoptauit, quòd existimetur optimè puerperis opitula-  
ri. Triæ eius genera traduntur. Rotunda, quæ fœmina uocatur, folijs hederaceis, præstanti odore  
cum acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab vna radice germinibus, prælongisque palmiti-  
bus: floribus candidis, pilci similitudine, in quibus quod rubrum est, grauiter olet. Longa ma-  
scula appellatur, nonnullis dactylitis: longiore quàm rotunda folio tenuibus ramulis, dodranta-  
libus: flore purpureo, grauiter olente, qui marcescens in pyri similitudinem turbinatur. Radix ro-  
tundæ in orbem conglobata, rapi modo: longè uerò digiti crassitudinem, & dodrantis longitu-  
dinem implet, nonnunquam paulò maiorem. Ambæ colore intus buxco, gustu amaro, & graui.

Est



Est etiānum tertia longa, quæ clematidis uocatur, ramulos habens tenues, refertos folijs subrotundis, minori semperuiuo similibus: flores rutæ: radices longiores, tenues, crasso cortice, odoratoque vestitas, priuatim vnguentorum spissamentis conuenientes. Rotunda cæteris venenis resistit. Longa uerò aduersus angues, & venena, drachmæ pondere ex vino bibitur, & illinitur. Pota cum pipere, & myrrha menses, partus, & omnia vuluarum onera eiecit: eadem efficit subdita in pello. Rotunda ad eadem pollet: insuper singultibus, suspirijs, horroribus, lien, conuulsis, laterum doloribus, pota cum aqua, singulariter auxiliatur. Aculeos, & spicula extrahit: ossium squamas illitu adimit: vlcera putrida exest, & sordida expurgat: caua cum iri, & melle explet: gingiuas, & dentes extergit: Clematidis ad eadem pollere creditur: viribus tamen inferior est.

Aristolochiæ  
confid.

Plinij, & Leonici  
lapis.

Opinio quorundā  
reprobata.

Pistolochia.

Alia opinio  
refutata.

ARISTOLOCHIAE, quam officina Aristologiam uocant, tria statuuntur genera, nempe rotunda, longa, & clematidis. Hæc rara admodum, & paucis nota: illa uerò omnibus serè rei herbariæ studiosis notissima. Quæ rotunda uocatur, etsi non ubiq; in Italia proueniat: in agro tamen Goritensi plurima, pulcherrimaq; nascitur: præstanti odore. Vtraque flores edit, & fructus: qui in longa pyri imaginem referunt, sumq; inglandibus longè maior: res: in rotunda uerò rotundiores, pauloq; minores spectantur. Quia in re non potui non maxime Plinium admirari, quod lib. xxv. cap. viii. utraq; ferre bacculas paruas ueluti cappares tradiderit, nisi quis illud dixerit, quod Plinio contigerit, Aristolochiæ utriusq; fructus uidisse, priusquam ad summum adoleuissent. Sed certè is eodem in loco excusari, meo iudicio, non potest, quin manifestè hallucinatus, & Græci sermonis non admodum peritus deprehendatur, cum Aristolochiæ nomen dedisse gravidas, tradat. Quandoquidè non ab utero gerentibus mulieribus, sed à puerperis Aristolochia (ut Dioscorides scribit) id nominis sibi comparauit. Cuius rei non modò indicium præbet nomen ipsum ἀριστολόχια, quod nil aliud denotat, quàm optima puerperis, non (ut Plinius inquit) gravidis; sed etiam ipsius facultas, quæ ad remorantes à partu secundas, mensesq; ciendos uagnopere commendatur. Quapropter fuerit hæc prægnantibus procul dubio exitiale potius, quàm salubre medicamentum, cum ea sanè omnia, quæ secundas, & menses educunt, fœtum etiam trahant, & quandoq; interfaciant, præsertim cum fuerint amara Aristolochiæ modo. Nec minus præterea Leoniceum uinum aliqui nostræ ætatis doctissimi uiri, satis admirari possum, quòd dum nimio fortasse aliorum errata corrigendi studio, uel auaritia ductus, de cyclamino, & aristolochijs Plinium accusat, in eadem, in qua Plinius, foueam ceciderit, asserens cum Plinio Aristolochiæ prægnantibus sibi nomen adinuenisse. Quod ne sine auctore pronunciasse uideretur, Dioscoridem quidem adducit, sed eius historiam, quantum equidem sentio, corrumpit, ac peruertit. Sunt è recentioribus Cordus, Adamus Lonicerus, & monachi illi, qui in Mesuem cœmentaria edidere, qui sibi certò persuadent, eam esse Dioscoridi Aristolochiam clematitim, quæ officinis omnibus passim longa cognominatur: argumento quòd hæc radices proferat admodum longas, & sarmentorum modo prætenues. Quin & ut suam tueantur, ac magis roborent sententiam, hoc in loco Dioscoridis codicem omnino deprauatum esse contendunt: & ubi uulgata lectio habet, κλωνία ἔχουσα λεπτὰ, φύλλοις ὑποσπογγύλοις, ἀειζών μικρὸν εὐκρόσι, hoc est ad uerbum, ramulos habens tenues, folijs subrotundis, semperuiuo paruo similibus, non ἀειζών μικρὸν, sed ἀειζών μικρὸν, quòd asaro paruo similia sint folia, legendum esse censent. Horum sanè sententiam nunquam probare potui, neq; probandam arbitror, pluribus cum rationibus, tum auctoritatibus adductis, quandoquidem Orbasij lectio aliter non habet, quàm communis hæc Dioscoridis, nec aliter legunt Serapio, & Auicenna. Id quòd manifestè ostendit, hoc in loco Dioscoridi nullam subesse mendam. Adde, quòd cum unum tantum Dioscoridi sit aristolochiarum, nec minoris asari usquam, quòd legatur, meminerit, absurdum sanè uideretur, quòd minori asaro Aristolochiam clematitim comparasset. Accedit & alia ratio, quòd cum uulgaris Aristolochia longa rutæ flores non edat, clematidis esse non potest. Præterea si Dioscoridis lectionem accuratius perpèdamus, nil aliud esse uidetur longa, quàm ficinariū, quàm longa Dioscoridis: aut fortassis eius species, cuius nulla, quòd extet, ab antiquis facta sit mentio. Quippe quòd proferat hæc folia longiora, latioraq; quàm rotunda: ramulos dodrantes: florem grauitè oleum, & fructum edat pyri modo turbinatum. Nam quòd fructum ferat clematidis, non scribit Dioscorides: nec folia longiora, & ut uulgaris habet Aristolochia, sed subrotunda, & minori semperuiuo similia. At si contrà dixerit quisiplariū, quàm uulgarem Dioscoridis longam non esse, quoniam flos illi purpureus non sit, sed melinus, & radix non palmari, nec digiti crassitudine, sed longior admodum, & longè tenuior. Huic faciliè responderi poterit, id locorū regionumq; uarietate cucire posse, & quòd natura cum florum coloribus in quàm plurimis ludat: quòdq; uidimus etiam nos Aristolochiæ longæ plantam à Calabria allatam, radice (ut in theriacis scribit Nicander) cubitali longitudine, pollicari crassitudine: cui folia erant, quæ à nostrate longa nullo discrimine differebāt. Ad hæc Clematidis radix Dioscoridi & Plinio crasso contegitur cortice: quòd tamen in longa officinarum, nostratq; non uisitur, cum tenui cortice per se petuò uestiatur, odore potius graui, quàm odorato. Quamobrem inclinare nunquam potuit animus, ut crederem hæc Aristolochiam longam, cuius hic effigiem appinximus, esse clematitim. Sed potius eò deductus sum, ut suspicarer hæc fortasse esse Pistolochiam sic Plinio uocatam, quòd & ipsa puerperis commendetur. Nam præterquàm quòd hæc illi quarto Aristolochiæ generi assignetur, tenuior est, quàm clematidis, densis radices capillamentis, iunci plenioris crassitudine. Illud mihi suspicionem auxit, quòd uiderim etiam præter hanc aliam, quæ radice palmari, & crassitudine digitali constabat: sed in omnibus alijs partibus alteri adeo persimilis, ut nullam inter eas intercedere differentiam cōpererim. Sunt præterea recentiorum quidam rei herbariæ & studiosi, & periti, quibus persuasum est, non tamen sine aliqua ratione, quòd Aristolochiæ longæ præter clematitim duo habeantur genera: quarum altera sit radice (ut Dioscorides inquit) digiti crassitudine, & dodrantis lōgitudine: altera uerò tenui ac longiore, quæ (ut auct.) ab Andromacho & Gal. lib. i. de antidotis ἀριστολόχια λεπτὴ, hoc est Aristolochia tenuis appellatur. quin & hanc affirmant eā longam



longam esse cuius hic imaginē exhibuimus, cuiusq; passim est usus. Quo fit, ut pro certo existiment hanc esse eā Aristolochiam, quæ in Andromachi theriacam addi debeat, Andromachi iunioris, et Damocratis testimonio innixi, quod in theriaces cōpositione huiusce tenuis tantum meminerint. Id quod (ut dicunt) præ se ferre uidetur, alterū etiānum ipsius Aristolochiæ longæ genus esse præter clematitim, radice constans tenuiore ac longiore. Hoc autem comprobatū fuisse putant à Galeno lib. antè citato, ubi docens quomodo nonnulla, quæ ab Andromacho seniori obscure tradita sunt, explicari debeant, ita scribit. Si quid adhuc aliud superest, quod minus dilucidè sit ab Andromacho seniori elegiacis uersibus dictum, planum fiet theriacam legentibus ab eius folio soluta oratione descriptam. Quod enim ille Cecropium mel obscurius appellat, hic Atticum apertè nominat. Centaurium ille nulla adhibita distinctione in carmine pronunciat, hic uerò in prosa tenue apponit, eo quod aliud quoque centaurium extet crassum appellatum. Idem et Aristolochia fecit, cum præter tenuem aristolochiam, alia quoque reperiatur, quæ crassam radicem habeat, et rursus tertia, quæ rotunda. hætenus Galenus. Quibus nimirum uerbis illi credunt suam satis firmasse sententiam. Sed ego quidem aliter sentio, ut qui putem, Aristolochiam tenuem non aliud Andromacho, et Galeno fuisse, quam clematitim cognominatam. Etenim ut omittam, quod Dioscorides et Galenus non plura, quantum inuenerim, quam Aristolochiæ genera commemorant, nempe rotundam, longam, et clematitim; clematitidis priuatim à Dioscoride Aristolochiæ longæ subscribitur, et quodammodo eius species constituitur, ramulis tenuibus, radicibus etiam tenuibus ac longioribus. Ut hinc facillè nobis liceat conijcere, Andromachum et Galenum non aliud supradicto loco per tenuem Aristolochiam intellexisse, quam clematitim. Adde quod si ad omnium qualitates et facultates spectes, scilicet clematitidis dignior est, quæ in theriacam recipiatur. Hæc enim radicem habet, Dioscoride teste, cortice odorato uestitam, unguentorum spissamentis conuenientem. Plinius deinde lib. xxv. cap. viii. clematitim cæteris præcūlit ijs uerbis. Tertium longissima tenuitatis, uitis nouellæ, cui sit præcipua uis, quæ clematitidis uocatur, ab alijs Cretica. Et paulò post idem ait. Odor omnium medicatus, sed oblonga radice tenuiori; gravior. hæc ille. Quibus utique adstipulari uidetur etiam Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, ubi de Aristolochiarum uiribus differuit, ut infra patebit in earum commentatione. Quare non est, meo quidem iudicio, asserendum, quod Aristolochia æπὸν Andromacho et Galeno sit aliquod quartum Aristolochiæ genus ita uocatum. quandoquidem æπὸν hic nullum facit per se genus: neque solum tenuem indicat, sed etiam minorem. atque certè in longarum genere huiusmodi est clematitidis. Ceterum si Aristolochia Græcis æπὸν nominata esset aliud genus per se, necessariò statueretur foret esse tertium quoque centaurij genus præter magnum et minus, quod peculiariter Græcis ἀπὸν uocatur. Sed hoc dupliciter falsum esse conuincitur. Primò quod apud Dioscoridem, Galenum, aliosq; antiquiores, qui de plantarum historia ac uiribus scripserunt, nusquam plura, quod equidem legerim, quam duo centaurij generis scripta reperiuntur, scilicet maius et minus. Secundò quod constat, Plinio lib. xxv. cap. vi. centaurium cognomine lepton nullum per se genus esse, sed ea appellatione illud tantum centaurium describi, quod à Dioscoride et Galeno minus appellatur. quinetiam idem de huius centaurij uiribus ea omnia tradidit, quæ illi centaurio minori reddiderunt. Sed quid tot uerbis opus erat, quibus nostram tueremur, et aliorum reselleremus sententiam? cum huic difficultati satis fere facere possint uerba ipsius Dioscoridis, quibus Aristolochiæ clematitidis radices expressit in hunc modum. ῥίζες μακροτέρας, (μακροτάτας, quod est, longissimas legit Oribasius) λεπτάς. id est, radices longiores, tenues. Ut uel ex his intelligi possit, haud absurdum esse, quod aliquis Aristolochiam clematitim etiam tenuem nominet, quemadmodum ab Andromacho seniori, et iuniori uocatam fuisse existimamus. Ex his itaq; omnibus colligendum esse arbitror, quod Aristolochia tenuis dicta ab Andromacho, non sit genus distinctum ab alijs, sed eadem cum clematitide: et quod sub Aristolochiæ tenuis nomine clematitim intellexerint Andromachus, et Galenus. Erit igitur, mea quidem sententia, Aristolochia clematitidis, utpote tenuior, odorator, et præstantior, in theriacæ compositionem addenda: non autem illa longa, quam hic depictam dedimus. Quæ tamen à nobis, fortè rectius, Plinii Pistolochia censetur, ut supra dictum est: aut certè aliud Aristolochiæ genus ueteribus incognitum. Veruntamen Fuchsius medicus clarissimus, suis de plantarum historia commentarijs, aliam plantam Pistolochiam putat: quæ tamen (eius pace dixerim) à Plinio Pistolochia prorsus abhorret. Est enim Pistolochia Fuchsio mollis in uersum planta, quæ uere primo unā cum chelidonio exoritur, et Maio, uel ad summum Iunio contabescit. Creasceit hæc tenellis, subalbidisq; folijs, coriandro, uel ranunculo primi generis proximis: radice tuberosa, inferiori parte sessili, superiori uerò monticuli instar elata, intus ubique concava, nigro exterius cortice, buxæa interius pulpa, odore aristolochiæ, et gustu amara. Quapropter Germanis hæc, quod uera Aristolochia rotunda sint destituta, quidem uicem infeliciter explet. Non tamen ob id censendum est hanc esse Pistolochiam, quæ à Plinio describitur. Si quidem hæc illi tuberosa, et inani radice non constat: sed clematitide tenuior est, densis (ut dictum est) radicis capillamentis, iunci plenioris crassitudine. Sed rectius, ueriusq; quantum equidem sentio, dici posset, hanc plantam esse Plinio fumariæ alterum genus, quod ab eo lib. xxv. cap. xii. ijs depingitur uerbis. Alia est Capnos fruticosa, præterea, folijs coriandri, cineracei coloris, flore purpureo. Nasceitur in hortis, et segetibus. De hac etiam Aetium locutum fuisse existimauerim lib. x. cap. ii. in curatione obstructi iecinoris, ubi chelidonijs Capni meminit, eo quod (ut diximus) unā cum chelidonio primum erumpat hirundinum aduentu, ut libro quarto latius differemus, ubi consultò fumariæ historia tractabitur. Porro quod huius plantæ radix Aristolochiæ rotundæ uicem supplere possit, atque in huius penuria illa uti liceat, adnotatum reliquit Fuchsius in libro de compouendis medicamentis, quem nuper locupletatum edidit, in theriaca dia tessaron. Attamen si Galenum sequi uolumus, pro Aristolochia rotunda longam substituemus. Aristolochiæ genera memoriæ prodidit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, ubi eorum uires explicauit ijs uerbis. Aristolochiæ radix ad medicationes utilissima est, amara, et subacris. Sed ex illis omnium subtilissima est rotunda, ad omnia efficacior. Aliarum uerò duarum, quæ Clematitidis appellatur,

Fuch. opinio  
recta.

Aristolochiæ  
vires ex Gal.  
& Mesue.




tur, fragrantior est. Itaque ea ad unguenta utuntur unguentarij : sed ad sanationes infirmior. At longa minus quidem tenuitatis obtinet, quam rotunda, sed nec ipsa inefficax est : uerum abstergeri, atq; excalescendi potentiam possidet, minus quidem quam rotunda abstergit, ac digerit, sed non minus calefacit, imò forsitan plus quoq; Itaq; in quibus usus est modica abstersionis, commodior est longa, puta in carnum exulcerationibus, & fomentationibus uteri. At in quibus crassum humorem ualidius extenuare oportet, illic usus est rotunda. Proinde dolores ab infarctibus crassitie crudorum flatuum natos magis curat rotunda, & spicula extrahit, & putredines sanat, & sordida ulcera res purgat, ac dentes, gingiuasq; candidas efficit. Auxilio est & asthmaticis, singultientibus, comitialibus, podagricis, si cum aqua bibatur : tum ruptis, & conuulsis, ut si quod aliud medicamentum, idouea est. haec tenus Galenus. Aristolochiam uim purgatoriam inesse (quod tamen silentio præterierunt Dioscorides, & Galenus) auctor est Mesues, qui ita scribit. Aristolochiæ radix pituitosos per inferna ducit humores, atq; etiam ut nonnulli asserunt, biliosos. Pulmonem, ac pectoris particulas ab humorum lentore, ac putredine efficaciter mundat. cuius rei indicium est, quod asthmaticis maximum adferat iuuamentum. Quæ Græcè ἀριστοχία, Aristolochia, quoque Latine dicitur : Arabinicè, Zazaund, Masimocra, seu Zazaue : Italicè, Aristologia : Germanicè, Osterlutey : Hispanicè, Astronomia : Gallicè, Foterlle, aut de la Sarasine.

Nomina.

## Dulcis radix.

## Cap. V.



Dulcis radicis consider.

Plinij lapsus.

DULCIS radix plurima gignitur in Cappadocia, & Ponto. Fruticosa est, ramis binum cubitorum altitudine assurgentibus : folijs lentisci, densis. pinguibus, & utique gummosis : flore hyacinthi : fructu pilularum platani magnitudinis, asperiore, qui siliquas lentium modo habet rufas, & paruas : radicibus longis, ut gentianæ, coloris buxci, subacerbis, & dulcibus : quæ denantur in succum, lycij exemplo. Is in arteriæ scabritia efficaciter habetur : uerum oportet, ut linguæ subditus conuescat : æstuanti stomacho, thoraci, ac iocineri conuenit : sanat uescicæ scabiem, & renum dolores, cum passipotus : idem eliquatus sitim sedat : vulneribus illitus accommodatur : commanducatus stomacho prodest. Re centis radicis decoctum ad eadem conuenit. Eiusdem farina pterygijs commodissimè inspargitur.

DULCIS Radix, quam Græci Glycyrrhizam, & officina Græcum uomen corrumpentes, uel potius Barbaros secuti, Liquiritiam uocant, & Hetrusci uulgò Regolitia, planta est paucis non cognita. Abundat hac Apulia, præsertim Gargano monte, unde quotannis succus in pastillos condensatus ad nos conuehitur, & radicem quam plurimum. Visitur etiam in uarijs pluribus locis in Italia, non modo ad spectaculum salis, sed & ad medicamentorum usum. Siquidem radix recentis habet sicca longè magis præstat, & ori gratior in medicamentis habetur. Sed non possum non ualde admirari Plinium, quod Glycyrrhizam inter aculeatas numerauerit plantas lib. xxi. cap. ix. sic inquit. Glycyrrhiza sine dubio inter aculeatas est, folijs echinatis, pinguibus, tactuq; gummosis. Et lib. xxi. cap. xv. dum catalogo quodam aculeatas, commemorat stirpes : spinosarium, inquit, multæ species. In totum spinosarium est asparagus, scorpio, nullum enim folium habet. Quædam spinosa foliata, ut carduus, eryngion, glycyrrhiza, & urtica. Iis enim omnibus folijs inest aculeata mordacitas. hæc ille. Quo fit, ut sine controuersia dici possit, Plinium Glycyrrhizam minime nouisse, cum certè nusquam gentium, quod equidem sciam, aculeatis folijs præueniat, sed (ut Dioscorides scribit) lentisci æmulis, densis, pinguibus, tactuq; gummosis. Cuius erroris causa illud facile esse potuit, quod sui potius Græci codicis fidem secutus fuerit, quam rei ueritatem, in quo forsassit lubricoq; librorum non aduertentium lapsu ex xiv. pro xiv. scriptum legebatur : uel quod Græcæ linguæ non exactè peritus uocabulorum, uocumq; similitudine deceptus (ut alibi quandoque demonstrauimus) Plinius in hoc errauerit. Nam huiusmodi opinio adeo firmiter ueritati coheret, ut facile ij quoque deprehendi possint à ueritate desciscere, qui credunt Glycyrrhizam olim spinis fuisse præditam, sed mangoæ uo sponte per se nascitur, nullibi aculeata spectetur. Dulcis hæc radix à Theophrasto libro ix. cap. xxi. Scythica appellatur, eo quod Scythæ hac contenti absque alio alimentorum præsidio decem, duodecimq; dies degant. Nam (ut idem testatur) circa Meotim paludem plurima nascitur. Glycyrrhizæ meminit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Huius fruticis radicem succus in primis utilis est, similiter ut eius radices dulcis

Glycyrrhizæ vires ex Gal.



dulcis, cum leui quadam adstrictione. Proinde asperitates lenire potest, nec modò in arteria; uerum etiam uescica scabra, idq; temperatura mediocritate. Quocirca fuerit sanè natura eius familiaris nostræ temperatura: nam tale monstratum est esse id quod dulce est. Sed cum adstrictio quadam adiuncta sit, uniuersum eius temperamentum, quantum ex caliditate, & adstrictione est, tepidæ potissimum caliditatis fuerit, quàm proximè accedens ad symmetrum, siue temperaturum. Porro quoniam temperie quoq; humidum est, quod modicè dulce est, iure sanè etiam sitim extinguens medicamentum est, nimirum modicè humidum, simul & humana natura frigidius. Refert Dioscorides, radicem siccam ad leuorem redactam, pterygiorum illiù idoneum esse remedium. *Γλυκύριζα* sic Græcis dicta, Latinis *Glycyrrhiza*, & Dulcis Radix appellatur: Arabibus, *Sus*: Italis *Regolitia*: Germanis, *Leckritz*, siue *Sueszboltz*: Hispanis, *Regaliza*: Gallis, *Reclisse*, seu *Reygallisse*.

Nomina.

## Centaureum magnum.

## Cap. VI.



**CENTAVRIVM** magnum folia habet iuglandis, oblonga, uiridi brassicarum colore, serrata in ambitu: caulem, ceu rumicis, binum, aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita, ceu papauerum, in rotunditate oblonga. Flos cæruleus: semen cnico simile, ceu lanceis quibusdam inuolutum. Radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo prægnans, cum adstrictione aliqua, & dulcedine acris, & rubescens. Amat solum pingue, & apricum, ac syluas, & colles. Copiosissima est in Lycia, & Peloponneso, in Arcadia, Helide, & Messenia, pluribusque locis circa Pholoen, Lyciam, & Smyrnam. Radix conuenit ruptis, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, ueteri tussi: sanguinem expuentibus, drachmis duabus tria datur, si febris sit, in aqua; cæteris in uino: item ad tormina, & uulvæ dolores. Ramenta eius in collyrij formam vulvæ subdita, menses, atque partus extrahunt. Succus eadem præstat. Vulneribus prodest: nam recens tusa, aut arida antè madefacta, ea glutinat, & coniungit. Carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro lycio utuntur.

**CENTAVRIVM** magnum (ut in Rhapontico superius diximus) nil aliud, mea quidem sententia, est, quàm illa insignis admodum radix, quam præterita nuper ætas Rhaponticum esse credidit: quamq; etiam hoc tempore eodem nomine quidam appellant, qui cum imperitis superioris ætatis errare maluit, quàm cum peritis recentioribus uera cognoscere simplicia medicamenta. Ceterum contendat licet Musa Ferrariensis medicus. **Cētaurij magni consider.**

eius clarissimus, radicem, qua Rhapontici loco plerumq; officine utuntur, Centaurij magni radicem non esse; ista tamen hac in re decipi (pace eius dixerim) manifestè deprehenditur, cum ea radix, quæ uulgaribus Rhapontici uicem explet, omnibus sanè notis Centaurium magnum representet. Quippe quod crassa sit, grauis, compacta tripedalis, & rubeo succo prægnans, qui gustui non modò quadantenus sit acris; sed etiam cum aliqua adstrictione dulcis. Adde quod & folia, caulis, capitula, flores, & semina illi prorsus sint eadem, quibus constare Centaurium magnum Dioscorides, & Galenus memoriæ prodidere. Ea, quæ hodie ad nos conuehitur, Gargano præclarissimo Apulie monte numerosa nascitur: quin & in alijs Italiae locis, nempe in Veronensi agro Baldo monte, quem Benaci alluit unda, sed infirma radice, si ad Apulam compares. Non desunt præterea hac tempestate rei herbarie ignari nebulones, qui bonis quibusdam seplasiarijs persuadere conentur, eam plantam esse Centaurium magnum, quæ in aquosis provenit, caule quadrato, bicubitali: folijs salicis modo longis: flore rubenti, spicato, quam quidam pro *Lysimachia* accipiunt. Neque alio, quod sciam, argumento nituntur, quàm quod hæc planta flore sit rubro, & caule quadrangulati, quemadmodum & Centaurium minus. Sed quantum isti hallucinantur, quantaq; in erroris caligine uersentur, ij quidem iudicent, qui in stirpium historia multum studij, & temporis consumpserunt. Porro utriusque Centaurij uno tantum capite mentionem facit Mesues: sed adeo alterum cum altero in seet, ac confundit, ut mirandum non sit, si à nonnullis ætatis nostræ diligentissimis rei herbariæ inquisitoribus acriter fuerit accusatus: quemadmodum & Auicenna, qui cum illo pariter errat, & cum utrisq; Serapio. Siquidem is scripsit ex auctoritate *Aben Mesuai*, Centaurij magni radicem lentam trahere pituitam, simul & bilem, & coxendicum doloribus opitulari. Quæ tamen facultates Centaurij maioris non sunt, sed minoris, ut sequenti capite explicabimus. Ceterum neq; Plinius ab errore uindicari potest, qui tametsi in Centaurij magni historia lib. xxv. cap. vi. **Arabû lapsus** **Quorundam hallucinatio.** **Plinij error.**








tionis, atq; ob eiusmodi temperamētum admodum exiccatorium est medicamen, expers mordacitatis. Porro quod omnia talia utiliora sint, suprà commonui, & nunc nihilo secius tamen nos repetere tempestivum est, omnes eius particulatim actiones memorantes. Vulnere itaque magna herbæ ipsius recentis illitu glutinantur: & uetusta, quæque ægrè ad cicatricem perducere queunt ulcera, cicatrice eodem modo utentibus obducuntur. Arefacta uerò glutinatorijs, & desiccatorijs miscetur facultatibus, ijs uidelicet, quæ sinus, & fistulas sanare sunt natæ, ueteresq; duritias emollire, tum ulcerum maligna, quæ cacoethe uocantur, sanare. Miscetur etiam ijs, quæ rheumaticis affectibus medentur: in quibus ea medicamenta optima sunt, quæ uehementer desiccantia, cum quadam adstrictione nullam habent mordacitatem. Decoctum herbæ quidam ischiadicis infundunt, seu biliosa, & crassa ducens: nam & talia purgat. quanquam cum adeo uehementer operabitur, ut cruenta euacuet, tunc plus prodiderit. Succus porro eius, cum adsimilis sit facultatis, hoc est, exiccatoriæ, & absterforiæ, & cætera iam dicta pulchrè efficere potest; & cum melle oculis illinitur, mensesq; & scetum appositus euocat. Sunt qui ipsum præbeant & ijs, quibus nervi affligi sunt, ut qui euacuet, & desiccet innoxie quæ impleta sunt. Quippe cum iecinoris quoque obstructions optime expedit, bonumq; sit lieni indurato remedium, foris impositum, nec secius, si quis bibere sustineat. *Κενταύριον* Nomina. sic Græcè, Latine uerò Centaurium minus dicitur: Arabicè, Chanturion sege, et segir, seu Katarion sages: Italice, Centaurea minore: Germanice, Taufent guldent kraut, Fieber kraut, Erdgall, seu biber kraut: Hispanicè, Fiel de tierra: Gallicè, Centauree, aut Fiel de terre.

## CHAMAELEON ALBUS.

## CHAMAELEON NIGER.



## Chamæleon albus.

## Cap. VIII.

CHAMAELEON albus, ixia ideo aliquibus uocatur, quod quibusdam in locis uiscum circa radices eius inueniatur: quo pro mastiche utuntur mulieres. Folia habet silybo, aut scolymo similia, asperiora, acutiora, uigroq; chamæleone ualidiora. Caulem non promit, uerum ex medio spinas, echini marini, aut cinaræ modo, erigit. Flores purpureos, ueluti papporum lanugines emittit: semen cnico simile: radicem in latis collibus crassam, in montosis uerò graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, graui odore, dulcem. Quæ pota acetabuli mensura, latas interaneorum tineas pellit: bibitur autem in uino austero cum origani freuefacti succo. Hydropicis commo- dissimè drachma in uino datur: etenim eos extenuat. Contra difficultatem urinae decoctum propi- natur. Hausta in uino, serpentium uenenis resistit: occidit canes, & sues: mures item necat, subacta cum polenta, aut aqua, & oleo madefacta.



## Chamæleon niger.

## Cap. IX.

CHAMÆLEON niger folijs scolymo similis effct, nisi minora, tenuioraque, ac rubro distincta uideantur. Caulem emittit dodrantalem, crassitudine digitali, subrubrum: & in umbella flores spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, uersicolores: radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quæ dissecta flauescit, & commanducata mordet. Prouenit in campestribus, siccis, & cliuosis tractibus, & maritimis. Radix trita, addito atramenti sutorij exiguo, cedrino oleo, & axungia, scabiem absterget: eadem, cum sibi sulphur, & bitumen asciuit, & cocta in aceto illinitur, impetigines absterget. Decoctum collutione, dentium dolorem mitigat. Cum pari pipere, & cera oblita radix, dolenti denti auxiliatur. Radice concisa, & in aceto decocta, dentes fouentur: eos quoque frangit, si scriptorio stylo feruens admoueat: uitia cutis in facie, uirilignesq; cum sulphure emendat. Erodentibus medicamentis admiscetur: phagedænas, tetraque ulcera illitu sanat. Quare chamæleon uocetur, à uarietate foliorum euenit: mutant enim cum terra colorem: hic uiridia, illic albicantia, alicubi cœrulea, nonnisi quam rubra inueniuntur.

Chamæleon-  
tis utriusque  
consideratio.

Quorundam  
error.

Monachorū  
opi. explosa.

Quorundam  
opinio repro-  
bata.

CHAMÆLEON albus tam ab Hetruscis, quam cæteris fratre Italiae incolis uulgò Carlina uocatur. quod credat uulgus (ut facile solet) herbam hanc magno olim Carolo regi ad fugandam sui exercitus pestem ab angelo demon- stratam fuisse, tanquam antidotum omnium præstantissimum. Quo argumento freti uulgares quàm plurimi, ad arcen- dam pestilentiam huiusce plantæ radices miris, magnisq; laudibus commendant. Nec quidem ab re: quando enim pos- ta radix (ut Dioscorides, & Galenus testantur) latas interaneorum tineas interimat, et serpentium uenenis resistat, mirum utiq; non fuerit, quod eadē in pestilentia opem ferre ualeat. Falluntur nimirum, qui putant, stirpem illam pternici non abstinilem (nostri eam Carciofò uulgò appellant) aculeis horrentem, cuius flore coaguli uice Hetruria utitur, album esse Chamæleonem. Nam eorum error ex eo maximè diluitur, quod hæc contra Chamæleontis albi de- scriptionem, in longo admodum caule echinatos suos proferat fructus. Porro Chamæleonem album nunquam Eu- chysium (pace uiri alioqui eruditissimi dixerim) uidisse existimauerim: quod libro suo de plantarum historia primū scribat, nullum hunc edere caulem, subinde huius forte oblitus, eodem in loco eundem procero satis caule depingat. Quin nec nigrum idem nouisse uidetur, cum depictus ab eo, quem tamen planè non probat, nullis notis legitimo, meo- quidem iudicio, respondeat. Nascitur niger in Tridentino agro, Ananienfibus admodum frequens tum montibus, tum collibus, nullis reclamantibus notis. Quæ in re hallucinantur monachi reuerendi, qui Mesuem commentati sunt, cum certò sibi persuadeant, Carlinam (ut eorum utar distinctione) caulem proferentem, quam legitimum Chamæleonem nigrum Dioscoridis semper existimauimus, eiusdem esse spinam albam, quam Græci *καλινάρα λευκή* dicunt. Mauritanii uerò Bedeguar: item Carlinam alteram caule uiduam esse spinam Arabicam ab Aphris Suchaa uocant. Quippe cum spina alba (ut Dioscorides est author) bicubitali sit caule, ipsoq; albicāte, unde fortasse nomen traxit, & inani, flore uerò purpureo nitefcet; Carlina uerò hæc caule sit dodrante paulò maiore; pleno, non inani; subrubro, non albicante, floribus hyacinthi æmulis, nulla ratione dici posse putauerim, Carlinam hanc esse spinam albam, sed potius rufam. Cum nec similiter monachi unquam probare possint, Carlinam alteram caule uacantem Arabicam esse spinam: quod uisquam Dioscoridem scripsisse inuenerim, spinam Arabicam caule uacare, sed spinæ albe potius esse persimilem. Ex quo rectè, (ut arbitror) concludi potest, quod cum spina alba procul dubio caulem edat, eundem quoq; Arabica promat. Sunt etiam qui uelint, Carlinam caulem gerentem nihil differre ab altera, quæ caulem non fert, nisi sexu, nempe quod altera mas, altera uerò fœmina fortasse fuerit: negantq; omnino has plantas esse Chamæleones, illamq; præsertim nigrum Chamæleonem esse nolunt, quæ caulem rufum gerit. Hocq; argumento nituntur, quod scripserit Galenus lib. v. simplicium medicamentorum, Chamæleontis nigri radicem lethale quiddam obtinere: eamq; ob causam in extrinsecis tantum uenire medicamentis. Sed cum raphani uice à compluribus copiose cum acetarijs respon- datur nullo penitus incommodo, nec esse hanc nigrum Chamæleonem, nec eius speciem probant. Quibus facile respon- di potest, quod fortasse hæc in re (sit tamen cum uenia tanti medici dictum) errauerit Galenus, cum omnibus in confusio sit, quod si in altero duorum aliqua deleteria uis insit, ea potius in albo, quàm in nigro esse possit. Quandoquidem non modo scribit Dioscorides Ixiam lethale medicamentum in albo tantum Chamæleonte nasci; sed quod eius radix canes & sues, ac mures necet, si ab eis deuoretur. Quæ sanè euident argumentum faciunt, quod potius albus, quàm niger lethale quiddam obtineat: præsertim cum nigro nullam lethalem uim assignauerit Dioscorides. Verum enim uero, ne cui temeritatis nomine suspectus sim, quod à Galeno audeam dissentire, concedamus, non præter rationem id scripsisse Galenum, quod Ixia etiānum oriatur in nigri radice, ut Cretenses affirmant, qui ex utriusq; Chamæleontis nigri rati- Ixiam colligunt ad pennas sagittis conglutinandas, quodq; scriptum reliquerit Theophrastus, Chamæleontis nigri rati- dice canes pariter necari. Alia nobis sese offert ratio, qua rectius, ut puto, illis respondere possumus. Siquidem facie- le fieri potest, quod in Græcia, fortasse in Ponto, alijsq; conterminis regionibus Chamæleontis nigri radix sit uenenos- sa, & in Italia salubris, exuta ob cæli huius clementiam lethali facultate, quemadmodum & Persea, quæ tametsi Pere- sis semper fuerit lethifera; Aegyptijs tamen innocua facta est, soli & cæli bonitate. In Ponto enim non modo mel- uenenosum est, sed & plantæ quàm plurimæ lethifere sunt: inno & animalium partes (quod scribat Strabo Ponticum castoreum uenenosum esse.) quæ tamen omnia nobis salubria sunt. Arum præterea Cyrenis adeo mitis est, ut rati- pi modo in ciborum usum ueniat; cum tamen in Græcia, & Italia adeo acerrimum sit, ut nec coctum, nec crudum edi possit. Quin & scorpiones in compluribus terrarum orbis partibus istos interficiunt; in aliquibus uerò, ut in Tri- dentino



dentino tractu, nullum ictu venenum reliquunt: quo etiam in loco nigrum ueratrum nulla deiectione ui pollet. Cæterum illud præter dicta me maxime ad credendum inducit, Carlinam caulem fundentem esse Chamæleonem nigrum, quod hæc planta omnibus in uniuersum notis nigrum Chamæleonem referat. Quandoquidem folijs constat scolymio minoribus, tenuioribusq; subrubra per medium excurrente costa; caule item dodrantali, crassitudine digitali in rubro: floribus in inbella spinosis, uersicoloribus: radice crassa, exterius nigra, densa, & aliquando corrosa, quæ fracta intus flauescit. In qua certè delineatione hæc plantæ ita adamussim conueniunt, ut nemo, nisi sensibus & ingenio obtusus fuerit, Carlinam, quæ caulem mittit, Chamæleonem nigrum esse non uideat, & perspicue intelligat. Id quod equidem certior ob diligentiorē inquisitionē factus, hoc tempore asserere nō dubitauī, licet alias aliter senserim. Hæcq; in sententia permanere decreui, donec aliquis rei herbariæ diligentissimus æquē & doctissimus indagator alios à Carlinis Chamæleones ostendat in Italia, qui rectius suis notis Dioscoridis historiā repræsentent: tunc enim in hoc, ut in alijs quoq; non grauabor mutare sententiam. Explodendi sunt Arabicæ factionis scriptores, ut qui non sine detestando errore, Græcorum uocabulorum nicinitate decepti, Chamæleam, quam sua lingua Mezerion appellant, cum Chamæleone confundant. Nam Auicenna de Mezerio disereus libro & tractatu 2. cap. 464. circa finem, suum errorem prodidit ijs uerbis. Mezerion bibitur cum uino ad morsum uermium uenenosorum, & est propriè nigrum, uenenum mortiferum. Et quando miscetur cum saue, & coniungitur cum aqua, & oleo, interfecit mures, & canes, & porcos. hæc ille. In quibus duplici notatur errore: primo quod Mezerio cas tribuerit uires, quas albo Chamæleoni reddidit Dioscorides: deinde quod nigrum, non utiq; album ea præstare crediderit contra Dioscoridis sententiam. Meminit utriusq; Chamæleonis Theophrastus lib. IX. cap. XII. de plantarum historia, ubi sic habet. Chamæleonum, unus candidus, alter niger. Vires autem radicum inter se distant, & ipsæ etiam radices specie differunt. Candidi enim candida est, & dulcis, & crassa, & grauius olens. Vtilis traditur ad fluxiones, cum confecta orbiculatim modo raphani decocta est, iunco transfixa in seriem. Valet & ad interaneorum animalia lata, cum passa uua comesa acetabuli mensura euino bibitur austero. Occidit & canes, & sues: canes in farina hordeacea subacta cum aqua, & oleo: sues cum brassica. Etsi hominem ægredientem experiri uolueris, an uiuere possit, lauandum ea radice triduo iubent. Hoc enim si tolerauerit, moriturum nequaquam existimant. Nascitur æquē omnibus locis, folio scolymio simili, uerum ampliori, & terræ proximo: capite magno, acano simili, unde quidam acanum eum uocant. Nigri filio constat ad simili, præterquam quod minori, leuiorq;. Tota autem herba umbraculi speciem repræsentat: radice crassa, & nigra extrinsecus, sublaui intrinsecus nititur. Loca gelida, humidaq; amat. Lepram, & uitiliginem abolet trita cum aceto, & ramentis illita: necnon & canes occidere potest. hæc Theophrastus. Illud in super non ignorandum est, uiscum scilicet, quod Ixiam appellant, in Chamæleonis albi radice nascens, uenenum esse mortiferum, cum tamen modica tantum quantitate sumptum somnolentos uigilantes reddat. Quamobrem Cretenses mulieres suarum lucubrationum gratia, ne somnum inean in opere, ex eo tantillum, aut modicum à cæna nullo inconmodo assumunt. Huius plerisq; locis meminit Plinius, & de eo nusquam non intellexit, ubi contra sumptum uiscum aliquod remedium protulit. Χαμαλέον λευκός sic Græcè, Latine uerò Chamæleon albus appellatur, Mauri tantis, Chemelon leute, seu Chamalium: Italis, Carlina, & Chamelone bianco: Hispanis, Cardo pinto: Gallis, Carmos; Italis, Chameleone nero; Germanis, Eber wurtz; Hispanis, Cardo pinto; Gallis, Chardonette.

Arabum trapis error.

Chamæleonum histor. ex Theophrasto.

Nomina.

## Crocodilium.

## Cap. X.

CROCODILIVM. chamæleontis nigri figuram habet. Nascitur in syluosis, radice longa, leui, aliquantulum lata, odore, ut nasturtij, acuto. Feruifaceta in aqua, & pota radix, sanguinem copiosum per nares pellit. datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen ei rotundum inest, duplex uti scutum: quod suapte ui urinam ciet.

SUNT qui uelint, Carlinam uulgo uocatam, eam inquam, quæ caulem profert, legitimum esse Crocodilium. Sed eorum opinio mihi quidem nullo modo satisfacere potest. Siquidem (ut præcedenti capite retulimus) Carlina, quæ caulem emittit, adeo omnibus in uniuersum notis chamæleonti nigrum repræsentat, ut uix unquā persuaderi possim, eam esse Crocodilium: præsertim cum facto periculo ijs sanè uiribus careat, quibus Crocodilium præstare scribunt. nempe quod radice decoctum potum sanguinem per nares copiosum trahat. Adde quod Crocodilio radix sit longa, leuis, aliquantulum lata, & odore, ut nasturtij, acuto. Illi uerò Carline generi crassa, nigra, densa, exesaq; non autem lata, nec leuis, nec nasturtij odorem spirans. Non desunt alij, qui Eryngium marinum Crocodilium existiment. Verum cum illud in litoribus maris nascatur, chamæleoni nigro sit ab simile, nec sanguinem è naribus eliciat; Crocodilium uerò proveniat in syluosis, compluribus alijs reclamantibus notis, ijs etiam haudquaquā ad stipulari possum. O quam magnificerent medici Crocodilium, si in Italia nasceretur, ubi tamen hæcenus ipsum uidere non licuit, cum eius radice decoctum tanta sit facultate præditum, ut potu tantum sanguinem copiosum per nares pellat. Crocodilium meminit Plinius lib. XXVII. cap. VIII. non tamen plura tradidit, quam Dioscorides, à quo illa omnia accepisse uidetur: quanquam in hoc ab eo dissentit, quod Crocodilium in sabuletis nasci prodiderit, cum tamen in syluosis nasci scribat Dioscorides. Huius facultates lib. VII. simplicium medicamentorum memoria prodidit Galenus, sic ingerentem, & exiccantem. Succus tum caulis, tum seminis, ut quæ similis sint facultatis, nephriticos adiuuant. Radix peccoris excreationibus ualenter conducit, minus quidem quam semen acris, non tamen minus amara. Trahit uerò etiam per nares sanguinem. Quod κροκόδειλον Græci, Latini quoq; Crocodilium dicunt: Itali, Crocodilio, Dipfacus,

Crocodilii confid. opinio explosa.

Alia opinio reprobata.

Crocodilii uires ex Gal.

Nomina.



## DIPSACVS, SIVE LABRVM VENERIS.

## CAP. XI.

DIPSACVS aculeatarum generis est. Caulem habet altum, spinis horridum: foliis lactucæ, spinosis, binis, genicula singula complectentibus, prælongis, ceu quasdam bullas intus, & extra aculeatas, in dorsi medio habentibus, concauo alarum sinu, in quo imber, aut ros asseruetur: unde dipsaci, quasi sitientis, nomen traxit. In cacumine caulis, singula furculis capitula insunt, oblonga, echinata spinis: quæ arefacta, candida spectantur, dissectaque medulla tenuis, uermiculos ostendunt. Sanat rimas sedis, fistulasque, si tusa, & decocta in uino radix, usque dum sit crassitudo ceræ, immittatur. Medicamentum ærea pyxide recondendum. Aiunt formationibus, uerrucisque pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorum in folliculo alligati collo, aut brachio appensi, præduntur quartanis febribus remedio esse.

DIPSACVS, quem Latini Labrum Veneris uocant, in Italia uulgaris est planta, ijs præcipue locis, ubi lanificia exercentur. Siquidem echinato eius capitulo mangones rudem adhaerentur. Siquidem echinato eius capitulo mangones rudem adhaerentur. In pannum pectunt, expoliunt, detractisq; floccis concinnant. In Hetruria Dipsacum uulgò appellant Cardo da cardare, Foroulienses uerò Garzo. Seritur is hodie in compluribus Italia locis, præsertimq; in agro Bononiensi, singulari à cultoribus adhibita diligentia. Sed & syluestris quoq; sponte in campestribus, in agrorum, & scrobium aggeribus, in uijs iuxta sepes frequentissimus nascitur, nullis prorsus repugnantibus notis, quas illi reddidit Dioscorides. Inuenitur autumnii tempore (ut experientia quæque docere potest) in eius capitulo iam exarefacto, medullitisq; dissecto uermiculus ille, quem collo adalligatum quartanis febribus remedio esse produnt, piscatoribus hamo affigendus maxime expetitus: et si Marcellus Dioscoridis interpres, & commentator, uermiculum hunc nunquam sibi compertum fuisse scribat.

Dipsacus officinis, & herbariorum uulgo Virga pastoris maior nominatur. Quippe minorem etiam illius æmulam ostendunt; quanquam non adeo striato caule, ac spinis horrido constat, silijs item infirmioribus sit, et capitibus multo minoribus, ut quæ olina magnitudinem non excedant. Sunt autem huius capitula tenuibus capillis referta, ita ut sericis uiridi colore infectis floccis similia uideantur. Ceterum animaduertendum est, neutrum Dipsaci genus, quod tum Serapioni, tum Auicennæ describitur, esse Virgam pastoris. Quandoquidem ijs, quantum ex eorum scriptis colligere potui, Pastoris uirgam nil aliud esse putauerim, quam polygonum, cuius tam fœminæ, quam maris historiam libro quarto tradidit Dioscorides. Quapropter illud mihi semper persuasum uelim, quod non à Mauritanis Dipsaco Virgæ pastoris nomen inditum sit, sed à seplastarijs ijs, qui suis potius pandectis, quam ceteris castigatissimis, & probatissimis scriptorum monumentis, fœdem præstare consueuerunt. Namq; Mattheus ille Syluaticus pandectarum auctor, Dipsacum Virgam pastoris appellat: qui deinde in grauiorem errorem lapsus, Dipsacum ipsum cum polygono no turpiter confundit, utpote qui illud assequi non potuerit, quod Arabum Pastoris uirga, esset Dioscoridis polygonum, non autem Dipsacus: qui quidem tantum à polygono differt, quantum leporis ab uris. Dipsaci meminit Galenus lib. v. i. simpl. med. his paucis. Dipsaci spinæ radix secundo ordine exiccatoria est, habetq; nonnihil absterforium. Planta, quæ Græcis δι-λακος, Latinis Labrum Veneris nominatur: Mauritanis, Dipsacos: Italis, Cardo, & Dissaco: Germanis, Kartendistel, Garden kraut, Buobenstrel, & Vueber karten: Hispanis, Cardencha, Cardo pentadactylus: Gallis, Cardon à carder, & Verge à bergier.

Spina

Dipsaci consideratio.



VIRGA PASTORIS MINOR.

Virga pastoris duplex.



Syluatici halucinatio.


Dipsaci uires ex Gal.

Nômina.



## Spina alba.

## Cap. XII.



SPINA alba nascitur in montibus, & syluosis. Folia fert albi chamæleonis, angustiora, candidiora, aliquantum hispida, & aculeata: caulem supra bina cubita altum, pollicari, aut ampliore crassitudine, albicantem, intus cauum: in cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum: flores purpurei, in quibus semen, ceu cnicum, sed rotundius. Huius radix pota, coeliacis, stomachicis, & iis, qui cruenta extulsiunt, efficax est: urinam cit: tumoribus illinitur. Decocto eius dentes in dolore collui prodest. Epotum semen conuulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur. Gestatum pro amuleto serpentes abigere traditur.

SPINAM albam seplasiarij Arabas (ut plerunq; solent) imitati, Bedeguar appellant. Sed non parua inter hos, & medicos oritur contentio, quænam in aculeatarum genere, quas plurimas genuit natura, Spina alba legitime, notis omnibus adstipulantibus, appellari possit. Verum etsi tantam litem transigere nequeant; interim tamen pro Spina alba alij alias herbas ostentant, & quisq; suam ueram existimat. Quandoquidem sunt eorum complures, qui sibi certò persuadent, Spinam albam eam aculeatam herbam esse, quam aliqui Carduum benedictum uocant, alij uerò uulgò herba Turca. Sunt alij, qui Carlinam uocatam id est album chamæleontem, Spinam albam esse contendunt. Inter quos inuenio monachos, qui in Mesuem scripserunt, quorum sententiam, superius in chamæleontis utriusq; mentione, ut falsam reprobauimus. Sunt præterea, qui Spinam albam esse uelint echinatam illam, ac spinis rigentem herbam, quæ Hetruscis in latæ cogendo coaguli uicem explet. Non desunt insuper qui unam, uel alteram syluestrem, ac spinis borrentem plantam, pro Spina alba nullo discrimine accipiant. Quo fit, ut omnes ij nullo ueritatis lumine ducti, in huiusmodi tenebris oberrent. Errat, meo quidem iudicio, hac in re Leonardus Fuchsius ætatis nostræ medicus alioqui clarissimus: quippe qui ultimo suorum paradoxorum capitæ, Spinam albam eam aculeatam herbam appellat, quæ omnium in uniuersum aculeatarum plantarum generum amplissimis constat folijs, latè hami se spargentibus, ac crebris, albisq; seu lacteis tota conspersa maculis. Vnde apud quosdam Lactaria herbæ nomen adinuenit, etsi à quàm plurimis, præsertim mulierculis, Carduus diuæ Mariæ dicatur. Hallucinatur inquam, pace eius dixerim, eo quòd non animaduertent, hanc folijs albi chamæleonis triplo, quadruploq; maioribus in campestri planitie nasci, ut nostra testatur Hetruscia, ubi passim ferè frequens nascitur, non autem in montibus, ac syluis, ubi Spina alba Dioscoridis testimonio prouenit. Ego uerò, qui à Dioscoride ne latum quidem unguem recedere soleo, in syluosis montium iugis Spinam albam legitimam oriri, mihiq; inibi compertam fuisse existimo, folijs albi chamæleonis similibus, angustioribus tamen, ac candidioribus, subhirsutis, spinis rigentibus: caule uerò bicubitali, pollicari, uel ampliore crassitudine, subalbo, & inani: in cuius cacumine echinus subalbidus insidet, sed minor, & oblongior, purpureis intus floribus, & semine cnico simili. Huc planè descriptioni, quæ etiam Dioscoridis est, adstipulantur frequentissima plantæ, quæ suis echinis, ac spinis rigentes, in excelsioribus Ananiæ uallis montibus lariceis, abiegnis, & piceis syluis refertis Iulio mense uisuntur. Quapropter, ut quæ ad eos pertinent, rectè agant seplasiarij, uideant, sciantq; non in planitie, & conuallibus Spinam albam prouenire, sed in montibus: quorum si quandoq; tum cacumina, tum syluas adire non grauibuntur, procul dubio non magno etiam labore ipsam nanciscentur, quemadmodum & ego inibi eam sepius reperi. Hæc enim non modo seplasiarijs maxime conducet, ut legitimam Spinam albam suis compositis medicamentis immisceant; uerum & eorum errorem reprehendunt (in hoc etiam Ruellius uersatur) qui sibi persuadent, Spinam albā illud esse cardui genus, quòd à Tuscis, eo quòd (ut paulò antè diximus) coaguli uicem præstet, uulgò uocatur Presura. Error autem ijs facile deprehendetur, si illud adnotare uoluerint, quòd aculeata hæc planta in hortis passim feratur, folijs albo chamæleonti longè maioribus: & capitula ferat, quæ marinum echinum non parum excedant. Commiscuit Mesues Spinam albam, ac etiam Arabicam, quarum alteram suo idiomate Bedeguar, alteram uerò Suchaa appellauit, syrupo de eupatorio uocato, quem miris laudibus extulit ad diuturnas febres finiendas, ad eas præsertim, quibus naturalia uiscera, nempe uentriculus, & iecur imbecillia sint reddita; & ubi à sua naturali temperie recesserint. Cuius tamen sententiæ non parum refragatur Musa Ferrariensis: quippe qui longo sermone contendat, nec Arabicam, nec albam Spinam huiusmodi syrupo admiscendam esse, quòd utraq; adstrictoria ui polleat, quæ (ut ipse ait) syrupi huius intentionibus admodum repugnat, cum ad diuturnas obstructions tantum referandas, semper huius apud medicos fuerit usus. Quæ in re non solùm

Spinæ albæ  
confid.

Fuch. lapsus

Quorundam  
error.

Brasauoli ca  
lumnia con  
tra Mesuem.



solum ostendit Musa auctoris mentem non percepisse, sed nec etiam in hoc (pace uiri alioqui clarissimi dixerim) etiam curandorum morborum rationem calluisse. Nam cum Mesues syrupum hunc composuisset ad illas curandas febres, quibus naturalia uiscera imbecilla sunt reddita, optima componendi methodo tam Spinam albam, quam Arabicam illi inseruit, utpote quæ adstrictoria ui, qua pollet, languida illa, ac infirma membra, plurimum roborarent. quibus incommodis solent periti, ac docti medici ijs medicamentis occurrere, quæ odore fragrantia adstrictoria facultate commendantur. Hinc itaque facile intelligi posse crediderim, quàm absurda, explodendaq; sit hæc Musæ sententia. Quin nec illud consilium eius seplastarijs accipiendum putauerim, quod spinæ albe, & Arabicæ loco, siliculæ radicem, ac sabine folia huic syrupo substituere possint, & debeant, ut magis atq; magis tū uasatum uiscera laxet. Quippe quod si tantum laxandi, ac referandi facultate hoc medicamentum debuisset esse præditum, non modò harum spinarum radicibus carere debebat; sed etiam rosis, lentiscina resina, Indica nardo, & malabathro expoliari: cum tamen hæc omnia nature, diligenterq; examinata, non sine methodo, ut quæ robur his uisceribus allatura sint, ab ipso Mesue huic syrupo fuerint admista, ne scilicet natura diuturna fibre imbecillis facta, & à relaxantibus, ac admodum reserantibus medicamentis uexata, totam humorum molem alui profluuii ob contentricis facultatis amissum robur, tamquam uiribus omnibus destituta ad mortem usq; demitteret. Meminit Spinæ albe Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Spinæ albe radix desiccatoria est, & modicè adstringens. Quamobrem & coeliacos, & stomachicos iuuat, & sanguinis reiectiones cohibet, & oedemata illita contrahit, ac denibus dolentibus prodest. decocto eius colluantur. Semen tenuis essentia, & calide facultatis est. Itaq; potum ijs, qui conuelluntur, conuenit.

Quæ planta *ἀναθαλάσσι* Græcè, Spina alba Latine dicitur: Arabicè, Bedeguard: Italicè, Spina bianca.

Spinæ albe  
uires ex Gal.

Nomina.

## Spina Arabica.

## Cap. XIII.

ARABICAM spinam natura albe spinæ similem esse constat. Ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, cæterasque fluxiones radix etiamnum ualeat. Prouenit in asperis.

Spinæ Arabice  
confid.

Ruellii hallucinatio.

Spinæ Arabice  
uires ex Galeno.

Nomina.

ERRASSE eos nimirum crediderim, qui sibi persuaserunt, Arabicam spinam, cuius hic meminit Dioscorides, eam aculeatam Arabiæ esse arborem, quam Acaciam uocant. Cuius erroris illud in primis indicium est, quod nusquam consueuerit Dioscorides alicuius stirpis historiam diuersis capitibus repetere, nec etiam arbores herbis commiscere. Nam cum longa historia Acaciam arborem, quæ etiam Aegyptia spina uocatur, primo libro inter arbores descripserit, absurdum quidem uideretur, si eandem præter morem hic inter aculeatas herbas repeteret. Ad hoc indicium etiam illa ratio accedit, quod si seorsum harum plantarum historiam tradidit Dioscorides, diuersas quoq; plantas esse necessæ est. Quamobrem non parum Ruellius hallucinatus deprehenditur, quod non animaduertit, in sua huiusmodi bice spinæ mentione, Dioscoridem hoc loco aculeatam quandam Arabicam herbam albe spinæ in uniuersum enulam intellexisse, non autem (ut ipse putat) acaciam nuncupata. Qua in re non satis uirum hunc admirari possum. qui non modò & Græcis, & Latinis literis sit habitus peritissimus, ac inter eos, qui hac nostra ætate de stirpium historia scripsere, facile princeps; sed qui etiam Plinij historia fuerit studiosissimus, quem tamen si accuratius perlegisset, ac sequi uoluisset, nunquam arbitror in eum errorem incidisset. Quadoquidem Plinius lib. XIII. cap. XII. alteram ab altera separauit. Et primò huius, de qua agimus, mentionem faciès, sic inquit. Spinæ Arabice odororum loco diximus: & ipsa spissat, stringitq; distillationes omnes, & sanguinis excreationes, mensiumq; abundantiam, etiamnum radice ualentior. Quæ à Dioscoride uerbotenens transulisse perspicuum est. Mox meminit Arabice alterius spinæ, quæ in arborem assurgit, his uerbis. Est & Acaciæ spina. Fit in Aegypto alba, nigraq; arbore, item uiridi, sed longè melior est prioribus. Eisdem meminit etiam lib. XIII. cap. IX. postquam Persæ arboris materiam miris laudibus commendauit, ubi hæc habet. Nec minus Aegyptia spina celebratur in eadem gente, duntaxat nigra, quoniam incorrupta etiam in aquis durat: candida uerò facillè putrescit. Quibus ex locis palàm est, non credidisse Plinium, unam tantum Arabicam, uel Aegyptiæ esse spinam, quanuis Ruellius non ita rem acceperit. Qui item Galeni sententiam hac in re non animaduertisse uidetur: siquidem Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum ita scripsit. Spinæ Arabice radix profluuium muliebri iuuat, & alia quæcunq; quibus auxilio est quæ apud nos nascitur spina: sed efficacius tamen omnia iuuant tum radix, tum fructus ipsius. Hic uerò & columellæ prodest, & ijs, quæ in sede inflata sunt: tum ulcera ad cicatricem ducit, mediocre habens, & non molestam astringentem. hæc Galenus.

Qui ut has plantas diuersas habuit; ita etiam seorsum de earum uiribus disseruit. Plauta *ἀναθαλάσσι* Græcis dicta, Spina Arabica Latinis pariter & Italis appellatur: Mauritanis, Suchaba.

## Carduus.

## Cap. XIII.

CARDVVS Græci scolymon uocant, folia chamaeleonis habet, & albe spinæ, nigriora, & crassiora: caulem longum edit, foliosum, capite spinoso: radice nigra, & crassa. Quæ illita grauelentiam alarum, totiusque corporis emendat: item si decocta in uino bibatur. copiosam autem urinam foetidamque expellit. Herba cum recens tenerescit in olera, asparagi modo, transit.

Carduorū cōsideratio, & genera.

ET SI unius tantum Cardui breuiter etiam hoc loco meminerit Dioscorides; Theophrasto tamen, Plinio, ac de alijs probatis auctoribus, plura Cardui genera traduntur. Verum ut primum de his, qui natura cultrice sponte proueniunt,



nunt, sermo, scire sanè conuenit, quòd eorum diuersa sunt genera: quorum tamen uomina propria, quòd sciam, non habentur. Atqui Plinio lib. xx. cap. xxiii. duo tantum eorum genera produntur: unum fruticosus statim à terra: alterum uerò uniuersale, & crassius. Satiuorum autem, qui tum in hortis, tum in agris seruntur, multiplex est genus. Horum principem locum tenent, qui Hetruscis uulgò uocantur Cardoni. Nanque ij diligenti cultura adeò teneri, fragiles, albiq; euadunt, ut magno quidem apparatu, secundis cœnis pro bellarijs cum sale, & pipere expectantur. Quo argumento ductus, equidem putauerim de his uerba fecisse Theophrastum lib. vi. cap. iiii. de plantarum historia, cum ita scribit. Quæ autem Cactus nuncupata est, in Sicilia tantum nascitur, Græciæ nusquam habetur. Sui generis planta: hæc enim statim ab radice caules repentes in terram mittit, folio lato, atq; spinoso. Cautus hos cactos appellant. desquamati cibo idonei sunt, paulò amaricantes: & reseruare eos aqua salsa conditos conueniunt. hæc Theophrastus. Nostrates, quibus ubiq; nunc Hetruria scatet, eò ex Neapoli allati fuerunt, Neapolim uerò (ut audio) ex Sicilia. Quapropter nostri cum hoc Theophrasti genere maxime conuenire uidentur, quòd scripserit, Cactum Siciliæ peculiarem esse plantam. Continentur præterea in Carduorum genere etiam ij, quos in Italia Hetruscum uulgo appellat Carcioffi, alijs uerò inibi Archibiochi dicuntur. quorum item meminit Theophrastus eodem loco, cum subdit. Alium uerò caulem erectum producit, quem pternicem uocant. Is quoq; cibus aptus excreuit, sed reseruari non patitur. Fructus, in quo semen, echinata specie est. Verum exemptis lanuginosis seminibus, is quoq; uescendus relinquatur, & cerebro palmæ similis est. hæc Theophrastus. Qui pro palmæ cerebro illud quantum equidem reor, intelligit, quòd Galenus encephalon pluribus in locis appellari tradidit, & quòd nunc corrupta uoce Neapolitanis, & Siculis uulgò uocatur Cefaglione, de quo libro primo in Bdellij uentione abunde distinximus. Carduorum autem, quos uulgò Carcioffi uocari diximus, nobis plura sunt genera, uaria capituli forma distincta. Si quidem proferunt omnes echinata capitula, sed aliqui spinis sursum respicientibus constant, alij uerò ad terram uersis, nonnulli etiam aculeis uacant. Sunt præterea in hoc postremo genere, quibus echini in longum fastigiantur, quibus uerò in globum extuberant, dehiscentibus in altero squanati spicis, in altero iisdem squamis, ueluti corticosis unguibus in unum compactis, & coagmentatis, nucis pineæ instar. Ex quo faciliè in eam sententiam deductus sum, ut crediderim, hæc Cardui speciem postremam nucis pineæ emulam, esse Carduum pineam Theophrasto uocatam, quòd is loco antè citato ita de ea scribat. Est Cardus pinea ab radice foligera: qua de media seminalis acinus, ueluti malum, extuberat. hæc ille. Caterum Cardui aculeati genus & illud est, cuius echinati capituli floribus Hetrusci coaguli uice utuntur, etsi Cardui satiui omne genus idem suis floribus præstet. Spinis carebunt, ut hortorum cultores testantur, Carduorum capitula, si priusquam feratur semen, acuminata eius latera retundantur. Sine aculeis etiam nascuntur, si delibratis lactuæ radicibus, & dissectis semina integra condantur. Vnde illud faciliè potuit factum esse, ut ij, qui aculeis non rigent, humano cultu mitiores euaserint, cum natura Carduorum omne genus spinis uacare nequeat. Cardui meminit Galenus lib. viii. simplicium medicamentorum: nec tamen plura de eius uiribus tradidit, quam fecerit Dioscorides. Sed de temperamento differens, ei caliditatis secundum ordinem completum, aut tertium incipientem; siccitatis uerò secundum assignauit. Et libro ii. de alimentorum facultatibus, Carduum Cinaram appellauit, ac alimentum, quòd corpori præbet, meritò damnauit, quòd melancholicum succum generet. *Σκόρδαρος* ea planta est Græcis, quæ Latinis Cardus, Cinara, & Strobilus nominatur: Arabibus, Raxos, Harxos, siue Saco-lomas: Italis, Cardo, & Carcioffo: Germanis, Strobildorn: Hispanis, Cardo de coner, seu Cardos: Gallis, Arichault, & Charchiophe.

Cardui Carcioffi.

Cardui nires ex Gal.

Nomina.

## Poterium.

## Cap. XV.

POTERIVM, Iones neurada uocant, largè fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, tragacanthæ proximis: folijs paruis, rotundis: flore exiguo, candidi coloris: femine nullius usus, sed gultu acuto, & odorato. Nascitur in aquosis, & collibus. Radices demittit binum, ternumue cubitorum, neruofas, & firmas: quæ proximè terram recisæ, dant succum gummi similem. Tusæ, præcisus neruis, & uulneribus glutinandis illinuntur. Decoctum quoque eius neruorum affectibus prodest.

EX REI herbariæ peritis hæcenus ueminem reperi, qui Poterium in Italia nasci dixerit, atque ipsum ostendit. Quamobrem faciliè crediderim, quòd illud non procreet Italia. Nam si inibi nasceretur, fieri quidem non potuisset, quin hæc etas, quæ rerum cognitioni maxime dedita est, ipsum adinuenisset: præsertim cum Dioscorides, ceterisq; scriptores Poterij faciem clare satis descriptam reliquerint. Sed hic subit nobis mirari Cornarium uirum alioquin etatis nostræ insignem, quòd primum syluestrem putauerit uerum Poterium esse. Quæ certè sententia ut est, meo iudicio, absurda: ita non immerito à Fuchsio medico clarissimo refellitur. Caterum etsi nobis hæcenus incomperatum est Poterium; non tamen omittendæ sunt eius uires, de quibus sub titulo Neuradis Galenus disseruit lib. viii. simplicium medicamentorum, ijs uerbis. Neuras, quidam poteriū uocant, desiccandi absq; morsu facultatem possidet, adeò ut & neruos incisos glutinare credatur. Radices eius potissimum sunt eiusmodi. quin & decoctum earum quidam exhibent ijs, quibus affecti sunt nerui. Id Græci *ποτρίσιον* quod item Poterium Latini uocant: Itali, Po-

Poterij consideratio.

Cornarii opinio falsa.

Poterij uires ex Gal.

Nomina.



## Acanthium.

## Cap. XVI.

ACANTHIVM albæ spinæ simile, foliis aculeatis per extremitates, † & lanugine araneosa obductis, ex qua collecta, & neta, uestes bombicinis similes texunt. Folia, uel radices ad remedia opisthotoni bibuntur.

Acanthii cōsideratio.

Quorundam error.

Nomina.

QVOD Acanthium, cuius hic inter aculeatas herbas meminit Dioscorides, in Italia nascatur, equidem affirmare non ausim. Quandoquidem hactenus neminem inveni, qui folia alicuius aculeatæ herbæ mihi ostenderit, quæ adeo araneosa, ac subtili lanugine obducta spectarentur, ut ex ea neta uestes bombicinis similes texere quis potuisset, ut hic Dioscorides, & lib. XXIIII. cap. XII. testatur Plinius. Quamobrem ingenue asserere non dubitauerim, eos magno in errore uersari, qui pro Acanthio quandam Cardui montani speciem, echino lanugine quadam obducto, demonstrant. Nam præterquam quod hæc folia habeat nulla lanugine uelata, nullo pacto quæ echinatum capitulum circumuestit, depecti, uel neri potest, utpote quæ tenuissima sit, siue uillis, fragilis, ac omnis lentoris experta. Quod Græci ἀκανθίων, Latini similiter Acambium, & Itali Acanthio dicunt.

† Verba illa de lanugine non leguntur in Græcis Dioscoridis exemplaribus: quæ tamen hic desiderari ostendit abruptus auctoris sermo. Vnde ea non temere ex Plinio adiecerunt interpretes, eius tantum, ut puto, auctoritate freti. Nos uero eò audacius illa addenda putamus, quod ea legantur in Orbasij codice manu scripto, in quo ex probatissimo Dioscoridis libro ita transcripta inueniuntur, καὶ δ' ἀπαρχοειδὲς ἐστὶ χνούς, quæ ad uerbum sonant. Circa quæ araneosa est lanugo.

## Acanthus.

## Cap. XVII.



Acanthi cōsideratio.

ACANTHVS, Romani pæderotam uocant, nascitur in hortis, petrosis, & riguis. Folia habet multò lactucaceis latiora, & longiora, erucæ diuifura, nigricantia, pingua, læuia: caulem binum cubitorum, digitali crassitudine, læuem, prope uerticem ex interval- lis circumdatum foliolis, ceu nucamenta quædam oblonga referentibus, spinosis, è quibus flos prodit albus: semen oblongum, luteum: caput thyrsi specie: radicibus nititur longis, mucosis, rubris, & glutinosis. Quæ uis igni, & luxatis artubus illitæ subueniunt: potæ urinam ciunt, sed aluum cohibent: ruptis, conuulsis, tabem sentientibus, mirè profunt. Nascitur & syluestris Acanthus, scolymo similis, aculeatus, breuior quàm saturnus, & is qui in hortis prouenit. Cuius radix ad eadem ad quæ iuperior efficax.

CREDVNT omnes ferè huiusce temporis rei herbarie studiosi, Acanthum eam esse plantam, quæ nobis uulgò uocatur Branca ursina. Quorum sententia nec prorsus refragari, nec planè adstipulari possum. Nam etsi in eorum opinionem multis adducar rationibus, non solum quod ij magnæ sint apud me auctoritatis; sed etiam quod ipse uiderim hæc, quæ Branca ursina dicitur, folijs lactuca latioribus, longioribusq; erucæ modò laciniatis, nigricantibus, ac molli quodam læuore pinguib; caule item læui, bicubitali, pollicari crassitudine, per internodia ipsum usq; uerticem foliolis quibusdam oblongis, ueluti nucamentis, circumdato: è quibus flos prodit candidus, & inde semen oblongum, luteumq; atq; etiam radice eadem constet, quæ Acanthus: aliqua tamen relinquatur dubitatio, an Branca ursina legiti- mus sit Acanthus, cum foliola, quæ nucamenti instar illius caulem cingunt, nullis spinis horrida conspiciantur, plan- taq; ipsa uideatur topiarijs operibus inepta: ad quæ Acanthus olim (ut Plinius libro & cap. XXII. auctor est) conue- niens habebatur: ac etiam ea hodie ab omnibus ferè negligatur, & ueluti ignobilis planta, in perpaucis tum hortis, tum uiridarijs seratur, cum apud antiquos Acanthus celebris, & in magno honore habitus sit, ac plurimis laudibus fuerit decantatus. Neq; illud suspicionem nostram diluit, quod dixerint aliqui Acanthina folia, quæ in quibusdam Italiae locis marmoreis columnis, præsertimq; Corinthias imitantibus, insculpta reperiuntur, nulla prorsus linea à Brancæ ursinæ folijs differre. Siquidem contrà ijs quispiam facile respondere posset, quod etsi utraq; eandem retineant formam, non ob id tamen necessario unam & eandem speciem representant. Quare quemadmodum dubium est asserere, Brancæ ursinam ab Acantho non differre; ita idem negare uitium esse uidetur. Ceterum ad hæc tollendam dubitationem illud



illud non parum, meo iudicio, facit, quod iisdem facultatibus. Branca ursina prædita sit, quibus pollere Acæthum Dioscorides, & Galenus memoriæ prodiderunt. Illud insuper addiderim, quod etsi dicat Dioscorides, oriri Acanthum caule foliolis spinosis, seu nucamentis, prope uerticem usq; ex internallis circumuestito; potest tamen intelligi, quod non reuera foliola illa aculeis horreant; sed quod adeo acuminata erumpant, ut sanè spinis persimilia uideantur. Id quod facile credi potest, cum cæteris omnibus notis Branca Ursina Acantho à Dioscoride representato adamussim respondeat. Neq; impedit, quod loco citato asserat Plinius, Acæthum in hortis crepidines marginum, assurgentiumq; puluinorum toros uestire. Quauis enim nocti baud facile ex se ualeat; tamen tum caulis, tum folia ob eorum molli-  
tiem, lentoremq; adeo flecti queunt, ut uimineo aliquo nexu topiario operi etiam non inconmodè aptari possint. His itaq; rationibus innixus, eos equidem non aberrasse existimo, qui Acanthum, & Brancam ursinam, unam & eandem plantam esse scriptis tradiderunt. Reperitur & syluestris Acanthus carduo (ut Dioscorides inquit) similis, spinosus, folijs tamen domestico angustioribus. Quocirca non ab re Plinius quoq; duo Acanthi genera constituit. Acanthi meminit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum. sic inquit. Acanthos, alij quidem Melampyllum nomenant, alij uerò Paderota. Folia quidem mediocriter digerentem facultatem obtinēt. At radix exiccatoria est, & leuiter incisoria, & tenuium partium. Planta, quæ Græcè ἀκανθῆς, Latine similitur Acanthus nominatur: Italia-  
cè, Acantho, & Branca ursina: Germanicè, Beren klauu: Hispanicè, Yerua giguante, & Branqua ursina: Galli-  
cè, Branize ursine. Quæ uerò Græcis ἀκανθα ἀγρία, Latinis Acanthus syluestris uocatur: Italia, Acantho  
syluatico.

Acæthi facul-  
tas ex Gal.

Nomina.

### Anonis, siue ononis.

### Cap. VIII.


ANONIS, quam aliqui ononida appellant, ramos habet fruticosos, dodrantes, aut maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis alarum multis, capitibus rotundis, folijs lenticulæ, tenuibus, pusillis, ad rutæ, aut pratensis loti folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, non iniucundè olentibus. Muria conditur, antequàm spinosa fiat, cibis gratissima. Rami acutioribus spinis, & ueluti spiculis firmiter horrent. Radicem mittit candidam. Quæ excalfacit, & extenuat. huius cortex ex uino potus urinam ciet, calculos comminuit, margines ulcerum erodit. Radix cum decoquitur in posca, dolorem dentium collutione mitigat. Decoctum eius potu hæmorrhoidas sanare creditur.

NASCITVR Anonis in pratis, cultis, atq; etiam in cul-  
tis locis, arido præsertim solo: folijs tenuibus lentis modo, pusilla-  
lis, quæ ad rutæ, uel pratensis loti effigiem proximè accedunt, ac  
cæteras omnes notas refert, quibus à Dioscoride depingitur. Ru-  
sticis ob id notissima est, quod non modo suo ramorum, ac radicum  
inplexu, aratra inuitis bubulcis in medijs agrorum sulcis sæpius  
remoretur, unde Resta bouis compluribus nominatur; sed quod et-  
iam in uestibulis, & scensicis spinis suis acutis admodum sit infe-  
sta. Nam etsi prædura, callosaq; sit eorum cotis; eam tamen suis  
perforat aculeis, quibus quasi spiculis, cum maturuerit, horrida  
conspicitur. Insuadet hanc uulgo Bonaga uocant. Cæterum quan-  
uis floris eius nihil meminuerit Dioscorides; constat tamen flore  
plerumque purpureo subalbicante, interdum tamen aureo. Sed  
hæc quibusdam in locis aculeis uacat. Meminit Anonidis, ono-  
nidis nomine, Theophrastus libro VI. cap. v. de plantarum hi-

Anonidis cõ-  
sideratio.

Anonidis hi-  
stor. ex Theo-  
phrasto.

floria, sic scribens. Ononis ramis aculeigerum est, anno tantum perdurans, folio rutæ similis, sed per totum  
caulem apposito, ut ueluti coronam ex internallis tota species representet. Florem minutulum, & in siliqua non  
undique septum edit. Nasceitur glutinosa, latoq; solo, & præcipue in segetibus, atque cultis: qua de causa agri-  
colis inimica exit. Viuax admodum est. Cum enim altam nacta tellurem fuerit, protinus sua infima pellit, & sin-  
gulis annis, furculis in latus emisissis, rursus postero anno deorsum uersus pellere solita est. Ideoq; effodienda tota,  
extripandaq; penitus est. Incipit germinare æstate, perficiturq; autumno. hætenus Theophrastus. Huius quoque  
mentionem fecit Plinius lib. XXVII. cap. IIII. ubi sic inquit. Anonim, quidam ononida malunt uocare, ramosam,  
in re errasse deprehenditur: siquidem non post uer spinosa redditur, sed (ut Theophrastus auctor est) in au-  
tumno. Id quod etiam experimento comprobatur. Anonidis radix uim maximam præstat ad renum calculos com-  
minuendos, expellendosq; obstructis præsertim urinae meatibus. quod multorum testimonio compertum est qui cal-  
culo affecti, ubi tantum radices corticis puluerè ex uino diutius bibissent, pristina sanitatem recuperarunt. Noni ego  
quendam





Anonidis uires ex Gal.

Nomina.

quendam, qui huiusce radicis puluere duntaxat pluribus mensibus sumpto, carnosum ramicem absumpsit, & sanatus est: licet à medicis nullo alio medicamento, quàm sola sectione, uisioneq; hanc curari posse antea statueretur. Anonidis uires descripsit Galemus lib. VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Ononis radicem, habet tertio quadantenus ordine excalfacientem. Cortex eius maxime est utilis, habens quippiam & absterforium, & incisoriū. Proinde non tantum urinas prouocat; sed & lapides confringit. Eadem facultate & crustas cito detrahitis. Utuntur porro ea quoque & ad dentium dolores, in oxycrato decoquentes, & collui decocto iuuentes. Huic plantæ nomen Græcum est ἀνωϊς, & ἀνωϊς: Latinum item, Anonis, & Ononis: Italicum, Anonide: Germanicum, Hauuheckel, & Stallkraut: Hispanicum, Gatilhos, & Gathinos: Gallicum, Bugraues, & Bugrundes.

## Leucacantha.

## Cap. XIX.

Leucacanthæ confid.

Ruel. lapsus.



LEUCACANTHA, prædita est radice cyperi, ualida, & amara. Quæ manducata dolorem denique sedat: ueteri laterum dolori, atque ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex uino potio. Eadem ruptis, & conuulsis medetur. Radicis epotus succus eisdem præbet effectus.

IN manifesto errore uersantur, qui sentiunt, Leucacantham, hoc est, albam spinam, de cuius historia, & uiribus hoc capite tractatur, ab Acantha leuce, id est, spina alba, de qua paulo superius differuimus, nullo pacto differre. Quia in sententia, uel potius errore, fuere nonnulli ex recentioribus, aliqui rei herbariæ periti. In quorum etiam numero Ruellius fuisse ex eo maxime præbenditur, quod cum debuisset, more suo, post Anonidis tractationem, cuius titulo spinam albam quoque adiunxerat, quam tamen albam spinam nominasse rectius fortè erat, eiusdem albe spinæ historiam referre, ex industria eam silentio præterijt. Nam cum existimasset, alteram ab altera non distingui, non opus esse iudicauit, earum historiam in Alba spina repetere, quam antea in Spina alba mentione tradiderat. Quo tamen in loco ab errore uincit, dicari non potest: quippe quoniam postquam spinæ albe, quam Mauritani Bedeguar appellant, meminere, alteram eius nominis spinam subdidit, quæ cum in arbusculum undique aculeis armatum surgat, sepibus extruendis rusticis nostratibus maxime expetitur. Non tamen ob id declarat ipse hanc esse Leucacantham: sed lubrico quodam lapsu, quasi sui ipsius, & cuius spinæ albe mentionem faceret, oblitus, in capitulis calce aculeate illius arbusculæ radicibus, quæ (ni fallor) candida est Dioscoridis rhomæ nus, omnes tribuit facultates, quibus legitima spina alba à Dioscoride commendatur. Qui quidem Ruellij error omnibus euidentior est, quàm ut pluribus refelli postulet. Quod autem differant inter se Acantha leuce, & Leucacantha, non modò Dioscorides inter ceteros simplicium medicamentorum scriptores princeps ostendit: sed Galemus etiam, & Paulus. qui præterquam quod alteram ab altera dixeris capitibus distinxerunt, earum singulam differentibus facultatibus præditam esse tradiderunt. Quorum sententia subscribit Plinius: nã de Acantha leuce differens lib. XXI. cap. XII. sic inquit. Spinæ albe semen contra scorpiōnes auxiliatur. Corona ex ea imposita capitis dolores minuit. Sed uires longè alias ab his Leucacanthæ idem retulit lib. XXII. cap. XVI. ubi sic habet. Leucacantham alij phyllon, alij ischiada, alij polygonaton appellant, radice cyperi, quæ commanducata dentium dolorem sedat. Item laterum, & lumborum (ut Hicesius tradit) semine potio drachmis octo, aut succo. Eadem ruptis, conuulsisq; medetur. hæc Plinius. Quæ quidem uidisse debuerat Ruellius, aliqui Pliniane historiæ studiosissimus: aut certè Hermolao doctissimo uiro credidisse, à quo (et si nunquam illum ciret) inter gra quædog; capita, imò (pace eius dixerim) integrè ferè surripuit opus, ita ut is omnibus illud suum fecisse uideatur. Siquidem Hermolaus, cum in Leucacantham, tum aliàs se penumero conuenit in suo Corollario, hanc ab acantha leuce differre. Porro illud etiam nobis silentio nō dissimulandum, ut ingenuè quod sentimus de simplicibus dicamus, quod Leucacantha herba est, non autem arbuscula sepibus conficiendis idonea, ut falsò, mea quidem sententia, Brasauolus suo de syrupis libello in eupatorii syrupo existimat. Nam hoc loco de herbis tantum, & non de arbusculis scribit Dioscorides: qui nimirum in stirpium historia peritissimus, arbusculam illam supra libro primo inter Rhomni genera descripsit, & sub candido, ut puto, complexus est. Ceterum cum nec Dioscorides, nec Plinius tradat, quibus folijs, quo caule, flore, ac semine Leucacantha proueniat, difficile quidem fuerit inter tot aculeatarum stirpium genera, uiam secernere, quæ uerè Leucacanthæ representet. tanetsi damnandus usquequaq; non esset, qui dixerit Leucacantham esse fortasse aculeatum illum Carduum, de quo in Acantha leuce diximus, cuius folia albis quibusdā maculis

Brasauoli error.



Nōmina.

Leucacanthæ  
uires ex Gal.

lis depinguntur. Nam præterquàm quòd coniectura quadam dici posset, eam à maculis illis albicantibus sibi Leuca-  
canthæ nomen adinuenisse, radicis etiàm ipsius tum durities, tum amaritudo, etsi forma cyperinas non æmuletur, con-  
sentire videntur. Sed hoc potius disputandi, quàm asserendi gratia proponimus: cum adhuc nihil certi nobis comper-  
tum sit. Leucacanthæ uires paucis perstinxit Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Leu-  
caceanthon, quidam autem polygonaton, alij ischiada nuncupant. Huius amara radix est, ac proinde incidit, et exic-  
cat in tercio ordine: in calfaciendo autem ex primo est ordine. Λευκανανθα quæ Græcis, Alba spina Latinis ap-  
pellatur: Italis, Bianca spina.

## Tragacantha.

## Cap. XX.

TRAGACANTHÆ radix lata, & lignosa summo cespite nititur: unde surculos humiles, ro-  
bustos, latissimè fundit: in quibus minuta folia, multa, nonnunquam tenuia exoriuntur: quæ sub se-  
spinas albas, rectas, & firmas occultunt. Est etiàmnum tragacantha lacryma, quæ uulnerata radice  
manans, concreuit. Præstat pellucens, gracilis, lævis, syncera, & subdulcis. Cutis spiracula, ut gum-  
mi, obstruit. Huius increbuit usus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas  
uoces, cæterasque destillationes, cum melle in delinctu: subdita quoque linguæ liquefcit. In passo ma-  
defacta, drachmæ pondere bibitur, contra renum dolorem, & uesicæ rosiones, misto cornu cerui usto,  
& eloto, aut scissi aluminis momento.



TRAGACANTHÆ plantam, à qua effigiem, quàm hic exhibemus, deprompsimus, iam pridem ad nos misit  
quidam rei herbariæ studiosus, qui illam attulerat ex Apulia Gargano monte. Ea certè est, quæ nullis prorsus notis  
Dioscoridis historia dissentiat, ut ex eius pictura omnibus liquidò constare potest. Cæterum lacryma è uulnerata  
radice manans, quam seplastarii uulgò uocant Gomma draganti, passim in officinis concreta uisitur, è Creta, Asia,  
& Græcia aduecta. At non modò hæc (ut Dioscorides inquit) è uulnerata prius radice manat; sed etiàm sponte (ut  
Theophrastus est auctor) ab ea scisso in latere cortice distillat. Sed hanc, qua utimur, Monachi illi reuerendi, qui  
in Mesuem commentarios ediderunt, ueram esse Tragacanthæ lacrymam negant, quòd legitima linguæ subdita faci-  
le, Dioscoridis testimonio, colliquescat: hæc uerò nunquam, cum linguæ supposita adeò lenta, tenaxq; euadat, ad-  
mixta salina, ut nullo frè temporis tractu dissolui liquariq; possit. Qua quidem in re ij (pace eorum dixerim) toto  
celo aberrant, ut qui Dioscoridis sententiam perperam acceperint. Siquidem Dioscorides non de sola lacryma lin-  
guæ subdita, sed in eclegmate cum melle conformata, illud fieri scribit, cum inquit. Usus eius ad oculorum medica-  
menta, ad tusses, exasperatas fauces, retusas uoces, cæterasq; destillationes, cum melle in delinctu: liquefcitq; su-  
per se tantum, sed in eclegmate cum melle paratam linguæ esse subiiciendam, ut clarissimorum medicorum institu-  
tione fieri adsolet cum bechicis catapotijs, & diatragacanthæ trochiscis, quibus ipsa commiscetur. Quippe cum  
oporteat medicamenta, quibus aspera arteria, pulmo, ac pectus uniuersum expurgari debent, quadam temporis  
diuturnitate ore retenta, uel linguæ subdita sensim, leniterq; liquefcere, ut commodè in tracheam percolentur ar-  
teriam, uoluit hic Dioscorides eclegmatis usum recta methodo describere. Nam si huiusmodi medicamenta de-  
norarentur, nihil prorsus proficerent, cum ita non in pectus & pulmiones deferantur, sed in uenterculum. Huic  
quidè, ut sui moris est, quibus in morbis id facitandum esset. quandoquidem planè absurdum uideretur scribere,  
quod aliq; quid gummi linguæ subiiciatur, paulatimq; liquefcere cogatur, ac deinde silentio inuoluere, quibus in mor-  
bis id faciendum. His itaque rationibus non modò rectè, meo quidem iudicio, intelligi potest uoluisse Dioscoridem ec-  
legma, quod Tragacanthæ lacrymam exceperit, linguæ subiiciendum esse, non ipsam tantum lacrymam; sed, eam  
an Monachos in hoc, ut aliàs sepe, deceptos esse. Tragacanthæ uires scriptas reliquit Galenus libro VIII.

Tragacanthæ  
consideratio.Monachorū  
erratum.



Tragacanthę  
vires ex Gal.

Nomina.

simplicium medicamentorum, his paucis uerbis. Tragacantha similem gummi uim obtinet, emplasticam quandam, acrimoniam hebetiorem (legunt aliqui, quę acrimoniam obtundit.) Et sanę similiter illi desiccatur. Sic Gręce, ut etiam Latine, & Italicę, Tragacantha uocatur: Arabicę, Chitira, Itica, Chateth, Alcuted, seu Alcutad; Germanicę, Dragan; Hispanicę, Alquetira.

### ERYNGIVM.



Eryngium.

### ERYNGIVM MARINVM.



Cap. XXI.

ERYNGION aculeatarum generis. Cuius folia in principio, sale condita, in cibos recipiuntur. Lata autem sunt, & extremo ambitu aspera, gustu aromatica: sed ubi adoleuerunt, circa conplures caulium eminentias in spinas aculeantur. in quorum summitatibus globosa capitula, durarum acutissimarumque spinarum ambitu stellatim circumuallantur, quorum colos aliàs uiridis, aliàs albus, interdum cęruleus inuenitur. Radix oblonga, lata, foris nigra, internę candida, pollicis crassitudine, odorata. Nascitur in asperis, & campestribus. Vim habet calfactoriam. Pota menses, & urinas pellit: tormina, inflationesque, discutit: contra iocinerum uitia, serpentium, morsus, & hausta uenena, cum uino prodest: bibitur aduersus plurima, cum seminis pastinacę drachma una, apensa, illitaue, tubercula discutere proditur. Pota cum hydromelite radix, opisthotonicis, & comitialibus medetur.

Eryngij consideratio.

LONGE quidem aberrant seplastarij Senenses in Eryngij cognitione, utpote qui pro Eryngij radicibus sumant aculeatę cuiusdam stirpis radices, quam Cacatreppolı uulgò uocant. Hinc error omnibus facile deprehenditur, quòd nulla penitus illius plantę nota eryngio respondeat. Legitimum Eryngium, quod meo iudicio, Dioscoridis descriptioni nihil refragetur, frequens inuenitur prope Tridentina mœnia, ac in Goritienſi agro, quoniam in compluribus Italia locis. Est & Eryngium marinum, quo Veneta litora undiq; referta spectantur. Assurgit hoc folijs altero latioribus, circinato ambitu spinosis: radicibus longioribus, mollioribusq; saccharo asseruantis longè magis idoneis, quàm alterius. Huius tametsi non meminerit Dioscorides; Plinius tamen lib. x xii. cap. vii. utriusque historiam tradidit. Quo fit, ut eorum sententiam minime probauerim, qui Eryngium marinum Crocodilium esse existimant, ut in crocodilij mentione superius diximus. Sunt & qui credant, Eryngium Mauritanicū a Secacul non differre. Veruntamen ij quoque hallucinantur: nam cum Serapio in capite de Secacul, neque Dioscoridem neque Galenum citet, quos maxime in simplicium historia sequitur, quorumq; dicta bona fide refert, sed tantum suę gentis auctoribus nitatur, clarissimum prębet indicium, Secacul diuersum fuisse, & plantam Gręcis cognitam

Quorundam errores.




guitam, Siquidem si pro eryngio Secacul scripsisset Serapio, ei sanè non fuisset opus, paulò inferius de eryngio tractare ex Dioscoridis, & Galeni sententia, magno uirum & notarum discrimine. Quamobrem non parum falluntur, qui Secacul ab eryngio secernere nescientes, Eryngij radices tum saccharo, tum melle asseruatas ueneris infelicitè commiscunt auxilijs, ut qui ederint, fortiores, salacioresq; reddantur. Quippe hac facultate Eryngium præstare nusquam hastenus apud Dioscoridem, & Galenum mihi reperire licuit, quæ tamen pollere Secacul nemo prædiderunt Arabes. Ceterum animaduertendum est Serapionem Astera Atticum, siue Bubonium cum eryngio, confudisse, stellarum similitudine deceptum, quæ cæruleo colore se inuicem æmulantur: etsi quæ Bubonio insunt nullis aculeis horreant. Meminit Eryngij Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Eryngium soliditate quidem aut parum, aut nihil, quæ temperata sunt, superat. Siccitatem uero in tenui essentia consistentem non paruam obtinet. Eius nomen Græcum ἑρύγγιον: Latinum item, Eryngium: Italicum, Eringio, & Iringo: Germanicum, Brachendistel, Manstreun: Hispanicum, Cardo corredor: Gallicum, Panicault.

Eryngij uires  
ex Galeno.  
Nomina.

## Aloc.

## Cap. XXII.



**ALOES** folium scillæ similitudinem habet, crassum, pingue, modicè latum, rotundum, retrorsus pandum: folia gerit curta, quæ utrinque ex obliquo longioribus interuallis striantur, & in spinulas desinunt. Caulis emittitur non dissimilis antherico: flos albus: fructus hastulæ regię cognatus: graui tota est odore, & gustu amarissima: radice una, ceu palo, in terram depacta. Plurima, præpinguisque in India gignitur, ex qua coactus succus adfertur. Nascitur etiam in Asia, & Arabia in locis quibusdam maritimis: & in insulis (ut in Andro) non ualde succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda uulnera sanè quàm utilis, si detrita illinatur.

Duo succi genera: quoddam arenosum, quod sedimentum purissimæ esse uidetur: alterum ad iecinoris imaginem uergit. Eligi debet boni odoris, syncera, quæ nihil doli sensit, nitida, calculorum experts, rufi coloris, friabilis, ac iecinoris modo coacta, facillè liquefscens, eximie amaritudinis. Improbatur nigra, & fractu contumax. Gummi eam adulterant: quod deperhenditur gustu, amaritudine, & ualido odore: eoque argumento, quòd digitis friata non ad minima usque frusta resoluitur. Nec desunt, qui acaciam immisceant. Natura eius est spissare, exiccare, somnum allicere, & corpora densare, aluum soluere. Stomachum repurgat binum cochlearium mensura, in aqua frigida, aut egelida pota: sanguinis reiectiones sistit: regium morbum purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu: deuorata cum resina, aut cum aqua, uel melle cocto sumpta, al-

uum soluit: purgationis perfectæ causa tribus drachmis sumitur. alijs purgatorijs medicaminibus admista, præstat, ut minus stomachum infestent: sicca glutinandis uulneribus inspargitur: ulcera ad cicatricem perducit, cohibetque. Eadem peculiariter exulceratis genitalibus medetur, & disructa puerorum præputia iungit: condylomata, rimasque sedis ex passo sanat: hæmorrhoidum abundantiam, & sanguinis eruptiones sistit: pterygia ad cicatricem ducit: liuores, & insignita ex melle tollit. Priuatim scabras lippitudines, pruriginisque angulorum permulcet: dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita, ex aceto & rosaceo: capillum fluentem continet cum uino: tonsillis, gingiuis, & omnibus oris ulceribus, cum melle & uino proficit. Oculorum medicamentis torretur in munda, & candenti testa, pennaque subinde uersatur, ut possit æqualiter torreri. Lauatur, ut quod sit arenosissimum, tanquam inutile subsidat, & læue, ac plinguisimum assumatur.

Non dubium est, quin ea legitima sit Aloe, quæ passim officinæ utuntur. Nam electissima, ac purissima (adulterata enim quandoque; etiam inuenitur) omnes præstat tum notas, tum uires, quæ syncerissimæ à Dioscoride assignantur: Aloe ætate nostra in quàm plurimis Italiæ locis uirescere conspicitur, præsertim Romæ, & Neapoli, ubi super aditu fenestris, ac atrijs in fistilibus uasis terra plenis alitur, ac fouetur ad spectaculum potius, quàm ad medicum usum. Quemadmodum & herba Plinio **OPUNTIA** dicta, folio Aloe longè crassiori, ac ampliori. Mirum quòd ex huius folio tantum plantato radices fiunt, atque eæ ita non secus nascitur, ac si tota planta sereretur. Illud etiam eam spectanti bus permirum accedit, quòd temporis spatio fructus profertur ficis similes. unde à plerisque Ficus Indica nominatur. Inuehantur acerrimè in Mesuem Manardus Ferrariensis, & Fuchsius ipsum secutus, quòd affirmauerit

Aloes confectio.

Opuntia Plinij.  
Mesues à calumnia iudicatus.



## OPVNTIA.

Aloes uires  
ex Galeno.



gerere simul potest, cum hoc, ut paulum extergat, quantum uidelicet ulceribus puris non sit molestum. terea idem Galenus libro VIII. de compositione medic. loc. in hiera mentione, de Aloe ita scriptum reliquit. Atqui ipsam aloem Andromachus quidem lotam, ex alijs autem aliqui etiam sic, aliqui uero illotam adijciunt. Verum iam nosse operapretium est, ad uentris subductionem illotam aloem aptiorem esse, multum uero de medicamentaria ui deponere lotam, quam etiam febricitantibus dare aliquis audeat, si non uehementer, sed ualde debilis sit febris. Quidam uero etiam ex illota aloes pharmacum multis sic febricitantibus exhibuerunt, deinde cum nihil manifeste leuissent, in alijs rursus maximum experti sunt uocamentum. Infestissima est enim aloes, etiam lota, his qui citra uisum totos humores ex intemperie calida et sicca affliguntur. Proximam ab his lesionem percipiunt, qui siccam intemperiem habent, etiam cum frigiditate coniunctam, et in uniuersum qui ex sola qualitate particulam aliquam lesam habent. Etenim in humoribus intemperatura, pharmacis ipsas euacuantibus egerit. quæ uero absque his confisunt, peruenitus in tabem deueniunt ex pharmaci huius ex aloes constantis usu. Itaque, ubi humiditas uitata tunicas uentris obgat, ex aloes picra utilis est, expurgans humiditatem. Omiuino autem sic affectis accessio uasæ plus aut minus adest. Euacuatio igitur affligentis humoris per solam aloem contingit, quæ purgatoria uim non fortem habet, sed ut ea quæ circa aluum sunt, quæ etiam contingit, purgare possit. Et si aliquando ampliori pondere exhibeatur, usque ad locos circa hepar conscendit. non tamen totius corporis purgatoria aloes existit. Cæterum ex his quæ ei admiscetur, mastiche ut stomacho commoda et odora, et quæ medicamentariam aloes uim frangere queat, admiscetur. Cinnamomum uero eadem gratia, et præterea quod tenuissimarum partium est, ut aperire uentris meatus possit, extergereque ac attenuare, si quid uiscosum aut crassum in humoribus feratur. Crassos enim humores ob purgatorie facultatis imbecillitatem, aloes trahere non potest. Quapropter biliosarum uentris affectionum optimum pharmacum est, adeo ut in uno die sæpe multos stomachicos creditos persauet. Inuat autem et hos, et alios omnes affectus ex uitis humoribus ortos, cinnamomum admistum: utpote quod alterantem habet facultatem uitiosarum qualitatum in id quod secundum naturam habet. Hactenus de aloes ex Galeno locis citatis. Deijcit Aloe (ut Mesues auctor est) non modo bilem: sed et pituitam ipsam. Caput, uentriculumque, mundat, quorum etiam cruciatibus maxime succurrit. Vire flammato, æstuantique, bilis redundantia uentriculo auxilio est. Quotidianus eius usus à mortiferis morbis tuerit. Vnde dicat à putredine, addita myrrha, non modo uiuentium; sed etiam defunctorum corpora. Cum draconis sanguine, et myrrha ulcera contumacia sanat, quod sine morsu aliquo exiccare possit. Sensus omnes, intellectumque, acuit, iecur ab infarctu purgat, et regio morbo medetur. Hemorrhoidibus tamen, ac cæteris sedis inflammationibus nocet: quia obrem ijs ab eius assumptione abstinendum est, qui aliquam in illis partibus noxam patiuntur. hæc Mesues. Cæterum necat Aloe uentris tincas ex lacte, uel melle sumpta: aut umbilico tenus apposita, bubalo sille, et aceto subacta. Plant.

ille, Aloem per os sumptam uenarum oscula, adeo referre; ut inde de postea sanguis facile exiliat, cum id (ut ipsi aiunt) tum Dioscoridis, tum Galeni placitis maxime repugnet. Verum quam longè ij, quorum pace dictum sit, à ueritate descuerint, non multo quidem labore demonstrare possem, ni præter institutum nostrum id esse censerem, niq; compertum haberem, illis prius recte, meo iudicio, responsum fuisse à Iacobo Syluio clarissimo etatis nostra, qui tam probatissimis rationibus Mesuem tueritur, ut non amplius Mandado, ac Fuchsio hic cum lacerandi locum relictum esse putem. Aloes meminit Galenus lib. VI. simpl. medic. ubi sic habet. Hæc herba non admodum apud nos prouenit: et quæ nascitur in magna Syria, aquosior est, et facultatis imbecillioris: attamen usque adeo desiccare potest, ut uulnera cõglutinet. At in regionibus calidioribus, qualis est Cœle Syria, et Arabia, multo est melior. Optima autem Indica, cuius liquor est id, quod ad nos importatur, medicamentum Aloe cognominatum, ad plurimas res, propter suam citatem mordicationis expertem, utile. Est autem non simplicis nature, sed ut indicio est gustus, adstringit simul, et amara est: adstringit quidem mediocriter, sed uehementer amara est. Subducit, et uentrem, ut puta ex numero medicamentorum, quæ Græci ab excernendo stercore uocant ἐκκροτική. Itaque ex dictis patet (si quidem memoria tenemus, quæ in quarto libro sunt demonstrata) quod tertij sit ordinis exiccantium, calfacientium autem aut primi intensi, aut secundi exoluit. Sed et ipsius facultatis misturam attestantur particularia eius opera: nam et utile stomacho medicamen est, ut si quid aliud: et sinus glutinat. Sanat et ulcera, quæ ægrè ad cicatricem ducuntur, et maxime, quæ in ano sunt, et pudendo. Inuat et eorum inflammationes aqua subacta, et uulnera eundem modum glutinat. Congruit similiter utenti et diuturnis in ore, ac naribus, et oculis. In summa, repellere, et præ-



## ABSINTHIUM.

Planta, quæ Græcis ἀλόν, Latinis etiam Aloe uocatur: Ma-  
tanis, Saber, Paber, siue Sabar: Italis, Aloe: Germanis, Ale-  
patic, & Bitter aloes: Hispanis, Hierua babosa: Gallis, Aloes,  
seu Perroquet.

Nomina.

## Absinthium.

## Cap. XXIII.

ABSINTHIUM, aliqui bathypicon, herba uul-  
gò cognita. Præstantius in Ponto, & Cappadocia, in mō-  
te Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi, & adstrin-  
gendi. Bilem expurgat, quæ & stomacho, & uentri inhæ-  
sit: urinam cit, & crapulam præsumptum arcet. ad in-  
flationes uentris, & stomachi dolores prodest, cum fese-  
li, & nardo Gallico potum: fastidia discutit, & arqua-  
tos sanat madefacti dilutum, aut decocti ius, quotidie tri-  
bus cyathis haustum: menses cit potum, aut cum melle  
appositum. Contra fungorum strangulationes conue-  
nienter ex aceto bibitur: aduersatur ixiæ nenenis cum  
uino: item cicutæ, & muris aranei moribus, & draco-  
ni marino. Anginæ eo cum melle, & nitro perunguntur,  
& epinyctides ex aqua. Ad sugillata, & oculorum cali-  
gines, ex melle illinitur: item auribus, si manat sanies.  
Dentium, auriumque dolores decoctum vaporis suffitu  
compescit. Decoctum in passo dolentibus oculis obli-  
nitur: item præcordijs, & iecinori, tritum cum cerato  
cyprino: stomacho quoque longa ualerudine laboranti  
cum rosaceo: cum ficis autem, aceto, & loliacea farina,  
aquæ inter cutem, lienosisque subuenit. Vinum ex eo  
fit, quod absinthien uocant, præsertim in Propontide,  
& Thracia, quo ad antè dicta vtuntur, cum febris carent:  
alioquin in æstate propinant, & acceptam huic vino in-  
columitatem referunt. In parsum arcis absinthium, ve-  
stes ab erodentium iniuria vindicat: culices ex oleo per-  
unctum abigit, & à corpore arcet: atramentum libra-  
rium diluto eius temperatum, literas à murium erosio-  
ne tuetur. Existimatur liquamentum eisdem præstare  
effectus: atamen potionibus improbat, quoniam sto-  
machum malè habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui  
cocta amurca, liquamentum adulterant.

## Absinthium Marinum.

## Cap. XXIII.

ABSINTHIUM marinum, quod aliqui Seriphium  
vocant, copiosissimum in Tauro monte, iuxta Cappa-  
dociam, & in Taphorisi Aegypti gignitur: quo Iliaci  
pro oliuæ ramo utuntur. Herba est tenuis, abrotoni  
parui similitudine, referta minutulis seminibus, suba-  
mara, stomacho inimica. Ea grauitè olet, & cum qua-  
dam calfactione adstringit. Per sese, aut cum oryza co-  
cta, interaneorum animalia, teretesque tineas, adiecto  
melle enecat. alium læuigat: cum edulio autem, vel len-  
ticula decocta, eadem præstare potest. Pecora maximè  
pinguescunt hoc pabulo. Tertium genus absinthio af-  
signatur, quo Gallia albis finitima scatet. Id pario  
nomine Santonicum uocant, regionis, in qua nascitur,  
cognomento, absinthio non dissimile: verum subama-  
rum est, non adeò seminis fecundum. Eadem quæ seri-  
phium potest.



Abſinthiorū  
cōſideratio.

Quorundam  
errores.

Fuch. lapſus.

Monachorū  
opinio falſa.

ABSINTHII generat tria hic à Dioscoride traduntur, nempe uulgare noſtrum, marinum, quod Seriphium uocant, & Santonicum, quo Gallia alpiſus finitima abundat. Abſinthium, quod in Ponto naſcitur, ceteris præſtare ad iecinoris, & uentriculi inflammationes libro undecimo capite decimoſexto Methodi medendi prodidit Gaſſenus, ſic ſcribens. Cum autem duplex in omni Abſinthio facultas, & qualitas ſit, ueluti in libris de medicina mentis eſt traditum, utique in Pontico adſtringendi qualitas non parua eſt. In reliquis omnibus amara quidem qualitas eſt uehementiſſima, adſtrictio uero (quam ſaltem guſtu agnoſcas) aut planè obſcura, aut proſus nulla ſentitur. Proinde Ponticum ad iecinoris, & uentris phlegmonas eligi præſtat. Porro id eſt tum folio, tum flore longè quàm cætera abſinthia minore. Odor quoque huic non modò non inſuauiſ; uerum etiam aromaticus. Cuius auctoritate freti credere recentiorum nonnulli, Ponticum abſinthium à communi noſtrate ſpecie non parum differre, quemadmodum Seriphium, & Santonicum. Sed equidem nullo alio discrimine alterum ab altero diſſimulare crediderim, quàm quòd Ponticum ſit climatis illius temperie, & folijs, & floribus noſtrate longè minoribus: quin & eam ob cauſam adſtrictoria facultate, ac etiam odore præcellat. Quod abunde declarauit Galenus libro vi. ſimplicium medic. ubi de Abrotono agit, cum inquit. Abrotoni duæ ſunt ſpecies, altera: quàm marem, altera quàm feminam nuncupant. quod ipſum definitum eſt, tum apud Dioscoridem, tum apud Pamphilum, alioſq; innumeros. At aliud eſt ab eo Abſinthium, cuius rurfum tres ſtatuendæ ſunt ſpecies, quarum unam eodem cum genere ipſo nomine appellant, cuiusmodi potiſſimum eſt Ponticum, alterum Seriphium, tertium Santonicum. hæc ille. Quocirca res eſt quidem ſenſiſſe uidetur Dioscorides, quòd in uulgaris Abſinthij genere Ponticum præ ceteris commendauerit. Ex his igitur palàm eſſe putò, ſpecie quidem à noſtrate non differre abſinthium, quod in Ponto gignitur; ſed quibusdam tum facultatibus, tum qualitatibus tantum. Abſinthium autem huiusmodi, quod ceteris præſtantius ſit, non ſolum in Ponto naſcitur, uerum etiam in Hungaria, Tranſyluania, & Bohemia. Huic omnibus plane notis cum eo conuenit, quod Galenus deliniuit. Etenim id folio, caule, flore, ac ſemine conſtat longè, quàm commune noſtrum. Abſinthium, minoribus. Saporem habet amariuſculum, cui non parua adſtringendi uis coniuncta eſt. Odorem etiam præſtat (ut Galenus teſtatur) non inſuauiſ; ita ut odorati non nihil reſpiat. Meſues, ut Syluius doctiſſime adnotauit, præſtat tamen qua ratione ductus, Ponticum, Romanum appellat. Monachi uero, qui in Meſuem commentarios ſcripſerunt, pulant magno quidam errore, id Meſui Romanum abſinthium eſſe, quod non modò in agro Romano, ſed etiam in uniuerſa Italia prouenit. Plinius lib. x. xvii. cap. vii. Ponticum ſcribit multò Italico amariuſ; eſſe. in quo ſanè Galeni ſententiæ & reſragatur, & errat. Ponticum abſinthium efficacem uim obtinet ad aquam intercutem, ut meſui iam ſæpius experimento compertum eſt. Equidem quosdam noui hydropicos quaſi deploratos, qui ex longo eſu comarum eius, quæ ſaccharo adſeruata fuerant, ſanitati reſtituti ſunt. Parandi ratio hæc eſt: Sumito comarum recentium abſinthij Pontici libram unam: ſacchari albiſſimi libras tres. Comas illas tundito in mortario lapideo: deinde iſ; optime tuſis ſaccharum in puluerem tritum adijcito. rurfum omnia ſimul tantisper tundito, donec in unum corpus redigatur: mox ad uſum recondito. Ex abſinthio ita ſaccharato ſemuncia quotidie aſſumitur tribus horis ante cibum. Sunt porro qui putent ſemen illud, quod officinæ Sanctum cognominant, quodq; ſaccharo circumdatuſ; peritiſ; necandis interaneorum uermibus præbent, Abſinthij marini eſſe ſemen. Attamen, ut fatentur rei herbariæ peritiſ; ex Gargano Apuliæ monte inter multa ſimplicium genera, ſemen hoc ad nos comportant, à planta quadam proferri Abſinthio noſtrati paululum abſimili. Ex quo facile (ut mea fert opinio) conijci poteſt, id potiùs eſſe Santonicum abſinthij ſemen, quàm Seriphij: præſertim quòd Sanctum illud nomen non aliunde, quàm à Santonico deductum eſſe uideatur. Ceterum procul dubio hallucinari deprehenduntur qui Canabel Serapionis ſemen ſanctum interpretantur, cum longè admodum hæc inter ſe differant. Quippe Serapioni nil aliud eſſe Canabel conſtat, quàm terra tenuiſ; ſimo ſabulo perſimilis: quæ (ut ipſe ait) una cum pluuiæ à cælo decedit, cuius non modò apud Arabes ad interaneorum tineas necandas; uerum & ad ſiſtilia fraſta conglutinandam increbuit uſus. Abſinthium marinum, ſive Seriphium, in quàm plurimis tam Tyrrheni, quàm Adriatici pelagi litoribus prouenit, præſertimq; Aquileienſibus, & Tergeſtinis. Sed Fuchſum ſuſpicor illud non cognouiſſe: ſiquidem quod in ſuis clariſſimis commentarijs magno uolumini appictum ſpectatur, abſinthium marinum non eſt. Quod cum fortasſe & ipſe animaduertiſſet, in paruo ſimplicium libello ſententiam mutauit. Veruntamen uon priùs ab hoc errore ſeſe uindicauit, quàm in alium incidit: quippe quòd eandem plantam pro ſylueſtri naſturtio perperam, meo iudicio, depinxerit. Marinum itaq; abſinthium, primum à terra erumpit, folio eſt abſinthio ſimili, craſſiore tamen. Sed poſtquàm adoleuerit, & caules ediderit, maturis in longum foliolis, iſ; præſertim quæ ubiq; caulem ambiunt, abrotonum æmulatur, non tamen caulis ſerè racemosis. Semen proſert exiguum, copioſumq; abrotoni modo inter folia erumpens, atq; in ſummitate caulis ſerè racemosis, ut hæc pictura eius demonſtrat, amari, & adſtringentis guſtus. Volunt patres illi reuerendi, qui Meſuem commentati ſunt, tantum ſuperficie tenus Abſinthium uulgare amareſcere; inis uero partibus dulceſcere, ob idq; guſtu gratum eſſe. Vnde etiam aquam, quæ ab eo ignium ui diſtillat, dulcem potiùs, quàm amaram ſentiri contendunt. Quæ in re iſ; parum rem naturalem callere deprehenduntur. uam quòd Abſinthij ſtillatitia aqua ſit dulcis, non ex eo ſiſtente equidem ſentio quòd Abſinthium ipſum conſtet extrema parte amarum, medullitis uero dulce; ſed quoniam eorum exteriores illæ partes, quibus amaror ineſt, admodum ſint tennes, ac in uaporem facile reſolubiles, ignis calore etiam nuioreſ; factæ, non magno quidem labore reſoluuntur: euenitq; ob hoc, ut ſtillatitia, quæ inde fluit aqua, omnis ſit amaritudinis expers. Præterea dulcedo, quæ in ipſa inuenitur, non ab intinis Abſinthij partibus emanat, ſed eam tantum à plumbeis instrumentis, quibus conſcitur (ut diuturna docet experientia) prouenire comperimus. Nam ipſius dulcedinis qualitas non modò in Abſinthij ſtillatitia aqua ſentitur, ſed etiam in quauis alia, quæ ex herbis temperamento calidis extrahatur. Siquidem cum plumbeum instrumentum huiusmodi herbarum uaporibus tum actu, tum potentia




potentia excoalscentibus, terrena quadam substantia superficie tenus inficiatur, quæ actutum in dulcissimam uelut cerussam conuertitur, nō mirum quidem uidetur, si aquæ inde manantes ascititia dulcedine imbutæ, gustu dulces percipiuntur. Quod quidem ijs non euenit absinthij scillatitij aquis, quæ duplici uase uitreis organis, calentis aquæ balneo conficiuntur. nam hæc sufficienter amarescere cognoscuntur, nec tantillum quidem dulcedinis gustantibus præbent. Euenit sanè hoc, quoniam balneum suæ ipsius aquæ humiditate, partes tenuiores illas retinet, conseruat, ac cohibet. Quo fit, ut non adeò in uaporem uertantur, quemadmodum cum illis fieri solet, quæ carbonum, & lignorum uiolento igne in auram euanesce coguntur. Dulcedine præterea carent, eo quod à uitreis organis, quibus eliciuntur, nullam ascititiam qualitatem recipiant. Quare satius, mea quidem sententia, esset, ut otium, quod superest, consumerent monachi in re christiana, & medici in re medica, & singuli de arte sua bene mereri discerent: uel saltem quisque quam rectè instituit, uitam sequeretur. Absinthij meminit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Absinthium adstrictorium, & amarum, & acrum simul qualitatem possidet, excoalscens pariter, & excoalscens, & roborans & desiccans. Proinde biliosos uentris humores per egestionem infernam propellit, ac per urinas euacuat. Magis autem quod in uenis est biliosum, per urinas expurgat. Ob hæc contentam in uentre pituitam, oblatum nihil adiuuat. Sic neque si in thorace, aut pulmone contineatur: nam adstringens in eo facultas, quam amara, ualentior est. Porro quod inest quoque acrimonia, idcirco maiori portione calidum est, quam frigidum. At si opus est generatim comprehensam eius temperiem secundum primas circumscribere facultates (et si anomæ omnes & dissimilares sit) calidum ipsum dixerim primi excessus, siccum tertij. Succus autem eius longè quam herba ipsa, calidior est. Sed cum de Absinthio marino, siue Seripho ageret lib. viii. simplicium medicamentorum: Seriphum, inquit, specie, & gustu absinthio simile est. Id quod de Santonico scripsit Dioscorides, cum tradiderit magis cum abrotono conuenire Seriphum, quam cum absinthio. Quamobrem relinquitur suspicio, quod aut Dioscoridis, aut Galeni scriptura sit hoc loco librariorum incuria deprauata. Herba, quæ Græcis ἀβρίδιον, Latinis item Absinthium appellatur: Arabibus, Assinthium; Italis, Assenzo: Germanis, Vuermuot, Eltz: Hispanis, Asentios, Alosua: Gallis, Aluyne, & Absinçe.

Absinthij uires ex Gal.

Nomina.

## ABROTONVM MAS.

## ABROTONVM FOEMINA.



Abrotonum.



Cap. XXV.

ABROTONVM duorum est generum. Fœmina quadam arboris specie fruticans, candicat, circum ramulos folijs, seriphi modo, minutim incis: floribus referta est, comantibus in summo, fulgore auri, corymbis. quod per æstatem prodijt, suauiter olet, cum grauitate quadam, & amaro gustu. Id genus Siculum esse constat. Alterum mas uocatur, sarmentosum, gracilibus ramulis uti absinthium.



sinthium. Plurimum in Cappadocia gignitur, & Galatia Asiatica, atq; in Syria Hierapoli. Vtriufque semen crudum tritum, & feruifacium ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, conuulsis, ruptis, coxendicibus, vrinæ angustijs, mensibus suppressis, aut remorantibus. In uino potum exitiale uenenorum antidotum est: horroribus ex oleo illinitur. Serpentes & substratu, & nidore fugat: contra ictus eorum cum uino potum prodest, priuatim efficax contra scorpionum, & phalangiorum uenena. Oculorum inflammationibus commodè illinitur cum cotoneo cocto, aut pane. tritum cum farina hordeacea, decoctumque tubercula discutit. Irini compositionibus admiscetur.

Abrotoni cō  
sideratio.

Quorundam  
error.

Veronicæ cō  
sideratio.

Abrotoni ui-  
res ex Gal.

Nomina.

ABROTONVM mas planta est vulgaris notitiæ. Cuius duo obseruauimus genera, hortense, & per se in cam-  
pestribus nascentis, tenuioribus folijs, & minutiore semine. Quod uerò fœmineo generi adscribitur, non omnibus no-  
tum est: non ideo, quod & ipsum frequentissimum non seratur in hortis; sed quod à paucis pro Abrotono fœmina co-  
gnoscat. Quandoquidem id alij Cypressum, alij Santolinam uulgò appellant, alij uerò marinum esse absinthij exi-  
stimant. Sed ij profecto falluntur: quippe Santolina uulgò uocata, nil sanè aliud est, quàm Abrotoni fœmina. Quod  
primum (ut Dioscorides inquit) arboris speciem quandam representet, unde & à quàm plurimis Cypressus uulgò dis-  
ta est. Deinde quod candicantibus constet folijs, circum ramulos minutim incisis, floribus aureis, orbiculatis, caulem  
summum, æstatis & autumnii tempore, corymborum modo comantibus. Postremo quod in uniuersum suauiter oleat  
cum grauitate quadam, & amaro gustu. Ex hac equidem delineatione adducor, ut decernere non dubitem, banc plantam,  
quàm uulgo Cypressum, siue Santolinam appellat, esse Abrotonum fœminam. Hinc itaq; Fuchsum aliqui rei  
herbariæ gnarum errasse crediderim, quod pro fœminei generis Abrotono plantam iubeat ab eo longè diuersam.  
Qui etsi Santolinam seorsum postea depinxit; non tamen eam Abrotoni fœminæ nomine agnouit, sed herbariorum, ut  
arbitror, uulgo secutus, eam Chamæcyparissum, hoc est, pumilam cupressum nuncupauit, eiusq; nullam à Græcis fa-  
ctam fuisse mentionem falsò credidit. Ceterum quod Goritienfes Abrotonum marem Veronicam appellant, ea fœ-  
minæ planta mihi in mentem uenit, quæ recentiorum quibusdam VERONICA uocatur, magnis (ut aiunt) insignita na-  
ribus. Hæc duum est generum. Mas, quæ humi repit, caule est dodrante maiori, rubescente, lanuginosoq;: folijs obli-  
gis, nigricantibus, birsutis, & in ambitu serratis. Flores edit purpureos circa summum caulem emicantes, & semen  
in siliquis, loculi formam referentibus. Radice nititur tenui, quæ in plures diuincatur partes. Fœmina caule exi-  
lanuginoso, folijs rotundioribus, minime laciniatis, subpinguibus. Flores profert in luteo purpurascens: semen in  
uasculis rotundis inclusum: radicem uerò maris æmulam. Nascentur in locis asperis, & incultis. Floret iunio mense.  
Gustu quidem adstringens, & amara est: unde conijcere licet, eam esse tum excalfaciendi, tum siccandi ui prædita.  
Medetur cruentis uulueribus, & etiam diuturnis ulceribus. Sunt, qui dicunt quendam Francorum regem elephanti-  
tis laborantem à uenatore suo hac tantum herba fuisse sanatum. Tumores præterea in uniuersum discunt, præci-  
puè qui in ceruice emergunt. Nec desunt, qui illam summis laudibus efferant ad pestiferas febres, ad tabidos, & ior-  
cineris, & lienis infarctus. Sed ut nostrum sequamur institutum, iam Abrotono medicinæ reddendæ sunt ex Gale-  
no, qui lib. v l. simplicium medicamentorum, ita de eius uiribus posteritatis memoria scriptum reliquit. Abrotoni  
calidum, & siccum facultate, in tertio ordine seu recessu post media situm est. Inuenimus autem eius temperamen-  
tum non minime quidem & ex gustu ducta coniectura, ut pote cum sit admodum amarum. Porro saporem eiusmodi,  
cum terreæ sit essentia, à largo calore extenuatum ostendimus. Itaq; non instrenuè & excalfacit, & irritans uides  
siue comam cum floribus (reliqua enim eius palea inutilis est) contusam ulceri puro illinas, mordax, & irritans uides  
bitur: siue eo in oleo macerato, caput, aut uentrem perfundere uoles, admodum calefacere reperies. Quin & si qui  
per circuitum rigoribus capiuntur, eos ante inuasionem rigorum hoc uoles conficere, minus utiq; rigore concutien-  
tur. imò & sensus quidem protinus ubi admotum fuerit, ipsum calefacere percipit. Porro quod lumbricos interimit, sed  
par est, nimirum cum sit amarum. Scies autem protinus, quod & digerendi, & incidendi quandam uim habeat: sed  
& quod magis quàm Absinthio id ipsi necessariò insit, in promptu erit colligere. Primum quidem ex gustu: pauces-  
sime siquidem acerbis partis Abrotonum est, non pauca uerò Absinthium. Deinde ex eo quod inimicum sit sto-  
macho Abrotonum, uelut etiam Seriphum: gratum uerò, & amicum Absinthium. Siquidem de istis supra ostensum  
est, quod amarum ipsum per se omnifariam infensum sit stomacho: austerum uerò, aut a cerbum, aut in summa adstrin-  
gens stomacho utile & amicum. Porro ubi qualitates hæc inuicem permixtæ fuerint, quæ uehementior fuerit, ea utiq;  
uicerit. Ceterum Abrotonumustum calidum, & siccum facultate est, magis adhuc quàm cucurbita sicca usta, & a-  
nethi radix. Illa enim ulceribus humidis simul & citra phlegmonem callo induratis conueniunt: ac proinde maxime  
ac idcirco cum oleo tenuium partium, cicino scilicet, aut rhabbanino, aut sicyonio, aut ueteri, & maxime Sabino, ad  
alopecias accommodatur. Barbam quoq; segnius tardiusq; nascentem cum aliquo distorum oleorum elicit: sed nec  
& calidum, quas utiq; maxime eius facultates nouisse oportet, nec quicquam præterea particulare in hoc tractatu  
requirere. Id Græci ἀβρότον dicunt, quod etiam Latini Abrotonum: Mauritani, Catsum, Kesum, seu Gassum:  
Itali, Abrotano: Germani, Stabuuert, Scheszuuert, & Gertuuert: Hispani, Abrotano, & Hierua lombriqua:  
ra: Galli, Auron, Auroque, & Garderobbe.


## Hyssopum.

## Cap. XXVI.

HYSSOPVM, herba nulli non cognita, duum generum est, montanum, & hortense. Optimum  
est Cilicium. Vim habet extenuandi, & calefaciendi. Decoctum cum ficis, aqua melle & ruta, po-  
tumque



## HYSSOPVM.



tumque peripneumonicis, diuturnæ tussi, suspiriosis, destillationibus, & orthopnoicis auxiliatur: tineas enecat. Idem facit, si cum melle delingatur. crassum humorem per alium extrahit, decoctum ex aceto mulso epotum. Ad subducendam aluum cum ficis viridibus detritis manditur: vehementiusque addita iri, cardamomo, aut irione, deijcit: colorem in corpore fouet. Lienis, & aquæ inter cutem, cum fico nitroque, inflammationibus quoque ex vino illinitur: cum feruente aqua impositum, fugillata discutit. cum decocto ficorum, optimè anginis gargarizatur. Decoctum cum aceto dentium doloris collutione sedat: inflationes auricularum uaporis suffitu discutit.

NON modò sunt, qui dubitent, an uulgarè Hyssopum legitimum appellari possit; sed & qui certò credant, id ipsum cum Dioscoridis Hyssopo nullam habere cognationem. Horum opinio nem sequuntur Monachi illi, qui in Mesuem commentariis ediderunt, argumento quòd scripserit Dioscorides (ut Marcellus interpretatur) origanum Heracleoticum folio esse hyssopi, non tamen habere umbellam hyssopi modo rotæ figura in orbem circumactâ, sed multifidam, & ueluti diuisam. Quæ quidem nota non uisitur in nostrate Hyssopo, ut quod flores spicatos proferat, non autem digestos in umbellam rotæ modo circumactam. Quo fit, ut non ab re illi dubitauerint, an uulgarè Hyssopum legitimum sit; hi uerò crediderint, eo omnino nos esse destitutos. Ceterum mihi iam compertum esse puto, hos omnes in dubio, & errore uersari peruersa Marcelli interpretatione deceptos. quandoquidem se aliter habet uulgata Dioscoridis lectio (cui etiam Oribasius, & ueluti quidam Græci codices adstipulantur) quàm uerterit Marcellus: ita enim Græcè legitur. Ὅριζανος ἡρακλεωτικὴν, ἡ δὲ

Hyssopi consideratio.

Opinio reprobata.

Marcelli mala interpretatio.


ἡρακλεωτικὴν, φύλλον ἔχει ἑμπερὲς ὑσσώπου. σκιαδίων δὲ οὐ τροχιδές, ἀλλ' ὡς περ δ' ἡμπερμένον. id est. Origanum Heracleoticum, quod alij Cunilam uocant, folium habet hyssopo simile: umbellam autem non in rotæ speciem orbiculatam, sed ueluti multifidam. hæc Dioscorides. Ex quibus palam est, non comparasse Dioscoridem origani flores ipsius hyssopi floribus, ut perperam Marcellus uertit, cum absolute dixerit, nulla facta cum Hyssopo comparatione. Origano umbellam esse non in rotæ modum orbiculatâ, sed ueluti multifidam. Illud insuper hac in re non parum ambigendi ansam præbuit, quòd Dioscorides libro IIII. in Chrysocomes capite prodidit, cum inquit. Chrysocomæ palmi altitudine fruticat, comam habens specie corymborum, hyssopo similem. Veruntamen si quis præstanti iudicio Dioscoridis uerba accurate perpenderit, illa sanè nihil eorum sententiæ refragari comperiet, qui Hyssopum, quo passim utimur, legitimum esse contendunt. Siquidem in plantis coma, probatissimorum auctorum testimonio, non solum de floribus, & corymbis intelligitur; sed etiam de folijs, & ramusculis, dummodo hæc hilari quadâ uenustate plantam totam, uel summa eius exornent. Vnde rectè Plinius lib. XII. cap. XXV. balsamo folium proximum rutæ, perperam coma reddidit. Item Virgilius lib. III. Georgicorum perpulchrè cecinit.

Ille coma mollis iam tum tondebat acanthi. Ex his perspicuum fieri arbitror, Chrysocomen coma hoc est folijs, & ramusculis hyssopo esse similem, non autem ipsi corymbis, quibus fortasse in uniuersum scætet. Quamobrem hic nullus, quâ tum equidem sentio, relinquitur amplius dubitandi locus. Sed quòd Hyssopum communis usus, uerum, legitimumque sit, nobis manifestè demonstrat Symphytium petreum à me (ut spero) proximis annis repertum, quòd folia uulgari hyssopo similia proferat. Nam cum scribat Dioscorides, Symphytum petreum folio esse origani, Origanum uerò folia habere hyssopi, clarissimum præbet argumentum, quòd hyssopum, quo passim utimur, sit uerum. Quinetiam cum idem auctor tradiderit, Hyssopum duorum esse generum, nempe montanum, & hortense, & utrumque genus in nostrate passim habeatur omnibus notis simile, non modò quòd cum Dioscorides congeneres, uel similes plantas seriatim coniuncteq; describere consueuerit, statimque post hyssopum stæchadem representauerit, quæ folio, & spicato flore hyssopum nostrum admodum æmulatur, ostendit quidem hallucinari eos, qui hyssopum hoc non legitimum esse hactenus iuerunt inficias. Adde etiam quòd idem (ut experientia comprobatur) ijs omnibus polleat uiribus, quas illi reddidit Dioscorides. Hyssopum montanum in comitatu Goritiensti saluatino monte frequentissimum nascitur, facie, floribus, & coma hortensi non absimile, rudiore tamen folio, & gustu amarior, nec usque adeo acri. Mitescit tamen, si transplantetur in hortis, sitque hortensi simile, exuta syluestri natura. Hyssopi paucis meminit Galenus lib. VIII. simpl. medicamentorum, sic inquit. Hyssopum desecat, & exal facit ordine tertio: sed & tenuium est partium. Hyssopi quoque uires descripsit Mesues, ita ad sensum scribens. Hyssopum hortense pituitam facili deijcit, quanuis dixerint aliqui, quòd & atram bilem educit addito fossili sale, aut Indo.

Hyssopi uires ex Galeno, & Mesue.



## GRATIOLO.



Gratiola hirsuta &amp; uires.

Nomina.

## STOECHAS.



Stoechadis consideratione.

Stoechadis uires ex Gal.

Indo. At ipsum pituitam purgare manifesto experimento constat, praesertim quae in pectore, ac pulmone continetur. Facit hyssopum ad pituitosos tum cerebri, tum neruorum affectus: quod non modo mundet; sed quod etiam roboret. Quin & pectus, & pulmonem detergit, praesertim senibus, quorum pectus lenta, crassaque pituita refertum est: quo fit, ut asthmaticis, & tussientibus opituletur. Discutit hyssopi usus contumaces inflationes, cibi appetentiam inuitat, menses & urinam ciet, & febrium horrores excutit: uisum acuit. Melle commistum interaneorum tincas necat, utri tamen addito momento. Oleum, quod tum folijs, tum floribus paratur, neruos algore affectos inunctum sanat, & roborat. Potest eadem & montanum, atque etiam haec omnia efficacius praestat. haecenus Mesues. Ceterum nonnulli crediderunt, herbam illam, quae uulgò ab aliquibus GRATIOLO uocatur, ab alijs Gratiolae, à quibusdam etiam, ut à Foroiulienfibus, Stoecha cauillo, quod equi eius pabulo mirè defatigantur, esse hyssopum illud montanum, de quo Mesues in suis scriptis mentionem facit. Sed ij, omnium ferè iudicio, euidentius hallucinati sunt, quam ut pluribus demonstrare sit opus. Quoniã uerò in Gratiolae herba sic dicta sermonem incidimus, hic locus postulat, ut de ea aliquid dicamus. Nascitur haec in locis humidis, praecipue in pratis uliginosis, prouenit etiam in palustribus. Herba est, quae deducit talem altitudinem excedit, caule quadrangulati, folijs hyssopifoliorum, & longioribus. florem fert in purpura albicans, inter folia erumpentem quae caulem ambiunt. Gustu herba haec amarissima est, quo etiam quadantenus adstringens sentitur. Alium uehementer purgat, tam recens quam si cca sumpta bilem, pituitamque ur. hit. Vulneribus celeriter medetur, trita & superposita. Herba *ὄστρος* Graecis dicta, Latinis Hyssopum appellatur: Arabibus, *Cyfe*, *Iufa*, seu *Iabes*: Italis, *Hissopo*: Germanis, *Firsch hyssop*, & *Hofter hyssop*: Hispanis, *Hissopo hierua*, & *Hissopilbo hierua*: Gallis, *Hissope*.

## Stoechas.

## Cap. XXVII.

STOECHAS, iuxta Galliam insulis eiusdem nominis è regione Mafiliæ gignitur: unde cognomen accepit. Herba tenuibus furculis, coma thymi, longiore folio, subamara gustu, & aliquantùm acris. Cuius decoctum, hyssopi modo, ad pectoris uitia efficax est. Antidotis utiliter miscetur. Viscera omnia, & uniuersum animantis habitum extenuat, confirmat, & ab obstructionibus & fartu liberat.

STOECHADEM officinarum uulgus *Sticados* appellat. Nascitur haec non modò in Gallia (ut Dioscorides scribit; ex aduerso Mafiliæ in insulis illis, quas *Stoechadas* uocant; sed & in Arabia, unde cum alijs mercimonijs, quae ex Alexandria adueniunt, Venetias cõportatur. Quapropter tam à medicis quam à seplasiarijs, indito ab Arabia cognomen, hodie Arabice uocatur: etsi Mafiliensis pelagi *stoechas* plerumque Arabice uocem expleat. Prouenit praeterea in nonnullis Italiae locis, uerum ea ceteris in Italia praestat, quae ex Gargano Apuliae monte aduenit. quauquam omnium probatissima est peregrina, quae ex Arabia defertur: hanc deinde sequitur, quae in *Stoechadis* insulis nascitur, à quibus primum nomen adiuuenit. De *Stoechade* uires scripsit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. *Stoechadis* gustu quidem qualitas amara est, & mediocriter subadstringens. Ceterum temperies composita: nempe ex terrena essentia frigida exigua, unde sanè adstringit: & ex attenuata altera terrena copiosiore, à qua utiq; amara est.




Ob utrorumque uero conuenientiam & coitum, obstructione liberare, extenuare, extergere, roborareq; tum uiscerum omnia, tum totius corporis habitum est nata. Suprà nanque ostensum est, quòd quæ ex eiusmodi essentijs constant medicamina, dictos effectus reddere possunt. Huius quoque meminit Mesues, ita de eius uiribus differens. *Stichæ* Ex Mesue. chas deiecit tum pituitam, tum atram bilem: cerebrum, ueruos, ac sensuum omnium organa mundat, ac roborat. Prodest contra frigidos morbos qualescunque sint, ideoq; comitialibus conueniens remedium habetur, addita Scilla, aut etus aceto. Balnea, simenta, ac lacuica, quæ ex ipsius tum decocto, tum uapore fiunt, oculos narium meatus aperiant: neruorum, & compaginum cruciatus mitigant: ac interna uiscera frigido humore affecta roborant. Abstinentiam tamen ab ea biliosis est, præsertim si eorum uentriculus sit bile repletus: uam eos maxime turbat, nauseam commouet, sitim accendit, & calore quodam molestissimo uniuersum afficit corpus. Quæ planta Græcè *σικχης*, Nomina, Latine item *Stichas* nominatur: Arabicè, *Astochodos*, *Astuhorados*, siue *Astuchudes*: Italicè, *Stechade*: Germanicè, *Stichas kraut*: Hispanicè, *Cantuesso*: Gallicè, *Stechados*.

## Origanum.

## Cap. XXVIII.

**ORIGANVM** Heracleoticum, quod & cunilam uocant, folium habet hyssopo non dissimile: umbellam autem non in rotâ speciem orbiculatam, sed ueluti multifidam: semine in summis uirgis haudquaquam denso. Excalfacit: unde decoctum cum uino potum demorsis à serpente conuenit. qui autem cicutam, aut meconion hauserunt, ijs ex passo: si uerò gypsum, aut ephemeron, ex aceto multo propinatur. ruptis, conuulsis, hydropicis cum fico esui datur. Aridum acetabuli mensura potatur. Ad pruriginem, psoras, regiumque morbum, decoctius in balneis prodest. Succus uirentis, rosasillas, uiam, & oris ulcera sanat, & per nates ex oleo irino infusum trahit. aurium dolores cū lacte mulcet. Conficitur ex eo, & cepis, & rhoe, quo ad obsonia utuntur, vomitorium medicamentum, his omnibus in cupreo uase per dies bis uicenos insolis, dum caniculæ sydus flagrat. Herbarum autem substratu serpentes fugantur. Quæ onitis appellatur, candidiore est folio, & hyssopo similior. Semen origanum, aliqui panaces Heraclicon, alij cunilam uocant, ex quibus est Nicander Colophonius. Folij est origani: ramulis tenuibus, dodrantem altis: in quibus umbellæ anethi insunt, flores candidi: radix tenuis, superuacua. Peculiariter percussis à serpente: folia, & flores ex uino poti auxiliantur.

**ORIGANVM HERACLEOTICVM.****ORIGANVM ONITIS.**




## ORIGANVM SYLVESTRE.

## TRAGORIGANVM.



Tragoriganum.



Cap. XXIX.

TRAGORIGANVM tenuis frutex est, sylvestri serpyllo, aut origano similis, folio, & ramulis. Quibusdam in locis latius, uirentiusq; inuenitur, & latioribus folijs. satis glutinosum. Alterum exilibus surculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui prasium uocauere. Optimum est Cilicium, & Cretense, & Smyrnum, & in Chio, Coog; proueniens. Omnia excalfaciunt, urinam cient, alio accommodantur. Decocto potio bilem deiciunt: lienosis ex aceto bibere prodest: contra potior venena in uino bibuntur: menses trahunt: peripneumonicis, tussientibus, ex melle in eclegmate dantur. Grata, ac mitis eorum potio est: quare cibum fastidientibus, & stomacho acida ructanti, imbecilloque præbetur: item si à maritima iactatione nausea, & ætus præcordiorum excitetur. Tumores uerò cum polenta illita discutunt.

Origani historia varia.

Plinij lapsus.

Brasavoliopio reiecta

VARIA, ac confusa est apud antiquos rei herbarie auctores Origani historia. Quandoquidem Theophrastus lib. VI. cap. II. de plantarum historia duo tantum constituit Origani genera, nigrum sterile, & candidum fructuosum. Plinius uerò lib. XX. cap. XVII. post Onitidis origani, & Tragorigani mentionem, Heracleum origani subiunxit, quod tria habere genera prodidit. Vnum nigrius, latioribus folijs, glutinosum. Alterum exilioribus, mollibusq; sampsucho non dissimile, quod aliqui prasium uocauere. Tertium inter hæc medium, minus quam cetera efficax. In quibus uerbis Plinius deprehenditur non sine errore Tragoriganum cum Origani generibus confuisse, quod Heraclij nomine, quod constat Origani genus esse, duas illas Tragorigani species, quæ à Dioscoride traduntur, huius fere imitatione expresserit: licet tertium quoque addiderit ex alio fortè auctore. nisi dixerimus, quod & hanc pro aliquo Origani genere sumpserit, & simul confuderit. Sed dimissis aliorum placitis, & Dioscoridum quem nobis ducem, & auctorem proposuimus, duntaxat secuti, dicimus tam Heracleoticum, quam Origani appellatum Origanum aut in Italia non oriri, aut inibi hætenus, quod sciam, à nemine fuisse repertum. Et si Brasavoliopio Ferrariensis medicus nostræ ætatis clarissimus asserere uideatur, Heracleoticum illud herba genus esse, quod in Italia passim nascitur, quodq; perperam Origanum uulgo ab omnibus uocatur. Verum huic (pace eius dixerim) minus quam assentiri potui: quin potius eam plantam sylvestris Origani genus esse semper existimaui, quod sita sponte in campestribus, asperis, cliuosisq; locis, & montibus proueniat, purpurascens admodum umbella. Nam quædam à Dioscoride una tantum sylvestris Origani species describitur, floribus candidis; nil tamen obstat, quin in alijs quoque à Grecia regionibus una, uel altera eius species floribus differens gigni possit. Siccum origanum, quod Venetia



Creta aduehunt, flore est albo, acerrimo gustu, fragrantiq; odore. Quo fit, ut hoc esse putem sylvestre Dioscoridis origanum (quanquam apud plerosq; Heracleotici, uel alterius nomen sibi falso uendicet) non solum quod floribus sit candicantibus; sed etiam quod gustatu linguam admodum uellicet. Siquidem hinc facile conijci potest, sylvestre origanum ceteris (ut Galenus testatur) ualentiorum esse. Heracleoticum origanum, itemq; Onitum misit ad me hoc anno clarissimus medicus Lucas Ghinus (quæ mihi sunt eius non solum præstantis doctrinæ; sed etiam ingenui, ac liberalis animi certa ac firma indicia) utrunq; è Creta (ut ad me scripsit) allatum. Quæ duo Origani generæ quod satis Dioscoridis historiæ respondeant, hic pictura exprimenda duximus. Tragoriganum uero, cuius etiam plantam pictam exhibemus, frequens nascitur in Foro iulienſi agro, folijs serpylli æmulis; sed gustu pulegij. Vnde non ab re statim post ipsum pulegij meminit Dioscorides. De omni tam Origani, quam Tragorigani genere differens Galenus lib. vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Origanus, Heracleotica quidem efficacior est onitide; sed agrestis, quam quidam panaces Heraclium, alij conylem cognominant, ualentior utraq; est. Omnes uero incidendi, extenuandi, calfaciendiq; facultatem possident: hæcq; tertio excessu obtinent. Porro ea, quam Tragoriganum appellat, assumptum etiam adstrictionis quippiam. hæc Galenus. Ex cuius doctrina patet, rectè cum ijs agi, qui sylvestre ex Creta petunt suis medicamentis inferunt. Planta Græcis ὀρίανος, Latinis pariter Origanum uocatur: Mauritanis, Fandeni, Fudenegi, seu Faudenegi: Italis, Origano: Germanis, Vuolgemuot, Rottkosten, & Costentz: Hispanis, Oreganos: Gallis, Origan, aut Mariolaine bastarde.

Origani vires ex Gal.

Nomina.

## Pulegium.

## Cap. XXX.

PVLEGIVM herba vulgaris notitiæ. Extenuat, calfacit, decoquit: potum menstrua, secundas, ac partus eijcit. Pulmonis uitia ex melle, & aloe potum extrahit, & conuulsis auxiliatur. nauſcas, stomachiq; erosiones ex posca permulcet. atram bilem per aluum exigit. Bibitur in uino utilissimè contra serpentium morsus: defectos animo recreat, cum aceto naribus obiectum: gingiuas arefacti cinere corroborat. Illitum cum polenta inflammationes omnes sedat: podagris per se subuenit, impositum usq; dum rubescat locus: cum cerato uaros extinguit: lienosis cum sale utiliter illinitur. Decoctum eius ablutas pruriginis mitigat: cõuersas uulnas corrigit: contra inflationes, duritiasque vuluæ in defesiones conuenienter adijcitur. Vocant aliqui blechona, quoniam dum floret gustatum à pecoribus, balatum concitat.

ET SI dubitauerint recentiorum quidam, an uulgare Pulegium legitimum sit, quod ob eius uulgarem notitiam, nullis foliorum florumq; notis eius faciè descripserit Dioscorides; non desunt tamen rei herbariæ periti, qui uelint Pulegium uulgaris usus Dioscoridis, aliorumq; antiquorum esse pulegium. Hocq; argumento nituntur, quod non modò experientia compertum sit, uulgare Pulegium omnibus ijs uiribus esse præditum, quas suo tribuit Dioscorides; sed quod etiam Pliniana historiæ maxime respondeat. Plinius siquidem lib. xx. cap. xiiii. duo Pulegij produntur genera: scæmina, cui purpureus flos: mas, cui albus. Horum utrunq; fert solum Italicum, utrunque in Hetruria præstantissimum gignitur. Quapropter eos apertè hallucinari crediderim, qui Pulegium cõmunis usus unan, uel alteram calaminthæ speciem esse contendunt.

Pulegij consideratio.

Quorundam error.

Pulegij vires ex Galeno.


Nomina.

Quippe quod certò putem (ut infrà suo loco dicitur) omnia calaminthæ genera, quorum meminit Dioscorides, à nobis iamdudum fuisse reperta. Quin & illud Pulegium nostrum legitimum esse ostendit, quod folio sit Cretensi dictamno simili, cui folia pulegio similia reddidit Theophrastus, item Dioscorides, qui tamen illa maiora fecit. Germanica mulieres Pulegium in hortis serunt, ac etiam in figulinis uasis fouent diligenti admodum cultura, suis affectibus eo consulentes. Vbi lætius tota coma conspicitur, & secundo calaminthæ generi (hanc enim illi assimilauit Dioscorides) folio simile, acerrimo gustu, quadatenus amaro. Quamobrem rectè quidem Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, de Pulegio differens, ita scriptum reliquit. Pulegium cum acre, & subamarum sit, ualde tum excalfacit, tum extenuat. Porro quod excalfaciat, abunde magnum est signum, quod illitum rubrificat, & quod si quis diutius toleret, exulcerat quoque. Quod uero extenuet, satis indicat, cum humida, crassa, & lenta ex thorace, & pulmone excreatu facilia faciat, mensesq; moueat. ῥάνην herba sic Græcis, Pulegium Latinis dicitur: Mauritanis, Alnan, Alnegen, seu Aluegen: Italis, Pulegio: Germanis, Poley, & Hertz poley: Hispanis, Polcio: Gallis, Pulege, & Poulliot.




## DICTAMNUM.

## PSEVDODICTAMNUM.



Dictamnium.



Cap. XXXI.

DICTAMNUM, aliquibus sylvestre pulegium uocatur. Cretensis herba est, acris, lævis, pulegio similis, sed maioribus folijs, quæ tomento quodam, spissaq; lanugine pubescunt. Florem nullam, aut semen profert. Præstat omnia, quæ satium pulegium, sed efficacius multò: nam non potum modò, sed appositum quoque, aut suffitum, defunctos partus eiecit. Produnt in Creta capras sagittis percussas, huius herbæ pastu eas excutere. Purgandi uim habet succus illitus, aut cum polenta tritus. Herba impactos pedibus, reliquoue corpori aculeos, illitu refigit. ad lienis dolorem efficax habetur: siquidem ipsum imminuit. Metunt æstate, & autumnò. Radix eius gustu calfacit: partus accelerat. Succus cum vino potus, contra serpentium morsus præsidio est. Tanta herbæ facultas est, ut olfacta abigat bestias, quæ venenato ictu sæuiant, appensaque contactu exanimet. Vulneribus ferro illatis, & uenenatis moribus infusus succus, præsentaneo est remedio, si etiam ab instillatione statim in potu assumatur.

## Pseudodictamnium.

## Cap. XXXII.

QVOD Pseudodictamnium uocant, multis in terris nascitur, antè dicto simile: sed minus, quam illud acre. Eosdem effectus præbet, sed ineffacius multò.

## Dictamnium alterum.

## Cap. XXXIII.

DEFERTUR à Creta alterum dictamni genus, folijs sisymbrij, ramis maioribus: in quibus flores sylvestris origani, nigri, molles. Odor foliorum inter sisymbrium, & saluiam, iucundissimus. Efficax ad eadem, sed minus nares ferit. Miscetur emplastris, & medicaminibus, quæ aduersus serpentium iniurias confinguntur, theriaca uocant.



DICTAMNVM legitimum, ac probatissimum in Creta insula tantum gignitur: neque tamen inibi passim, Dictamni cō  
 sed in angusto loco duntaxat provenit, ut auctor est Theophrastus. qui lib. IX. cap. XXVI. de plantarum historia fideratio.  
 Dictamnium posteritatis memoriae prodidit, his uerbis. Dictamnium Cretæ insule proprium est, ni mirabile, & ad  
 plura perutile, sed ad partum mulierum potissimum pollet. Folio pulegio simile constat, nec sapore absimile est: ra-  
 mulis tenuioribus conditur. Vfus foliorum, non ramorum, nec fructus est: ualeut enim ad multa, & præcipue ad  
 difficiles partus mulierum, ut dictum est: aut enim facile posse parere faciunt, aut certè dolores penitus sedant. Dan-  
 tur bibenda ex aqua. Rara hæc herba: locus enim, qui fert, exiguus admodum est, eumq; capræ depascunt capes-  
 sendæ causa uoluptatis. Quod etiam de telis fertur, uerum esse affirmant: capras enim sagitta transfixas dictamno  
 deuorato telum eijcere. Dictamnium tale est, uiresq; eiusmodi possidet. Falsum dictamnium folio quidem simile con-  
 stat, sed ramulis minus, & uiribus longè inferius. quanquam enim eisdem in rebus proffit; tamen multò deterius, atq;  
 debilius. Vis dictamni in ore percipi continuò potest: excalfacit enim ex paulo uebementer. Manipulos in ferula,  
 aut canna intercludere solent, ne expiret: est enim imbecillius, cum expirauerit. Non desunt, qui naturam Dictamni,  
 & falsi Dictamni eandem esse existiment. Sed quod locis lætioribus exeat, degenerare, falsumq; cognominari, sicuti  
 etiam alijs pluribus euenit, ut uiribus deterioribus ex loco reddantur. Dictamnium enim asperum solum uebementer  
 amare inquit. Est etiam aliud Dictamnium ueluti æquiuocè appellatum: nec enim speciem, nec uim habet eandem.  
 quippe quod folio simili sifymbrio constet, & ramis condatur maioribus. Vfus item, & uis non eisdem conueniunt.  
 Hoc igitur (ut dictum est) mirum, simulq; proprium Cretæ insule dicitur. hæc Theophrastus. Caterum ut etati  
 quoque nostræ Dictamni rationem aliquam reddamus, ut in omnibus frè plantis facere consueuimus, nō diu quidem  
 est, quod ex Creta insula Venetias legitimum Dictamnium adferri coeptum est. Siquidem Manardus Ferrariensis, uir  
 non solum ingenio & doctrina celebris, sed etiam simplicium medicamentorum acerrimus indagator, lib. VI. epist.  
 111. inquit. Dictamno, nisi eam rursus Venus ab Ida/Jylua deportet, omnino deficiamus. Sed certè (ut ingenue fa-  
 teor) nescio, qua auctoritate, uel ratione scripserit Dioscorides, Cretense Dictamnium nec florem, nec semen pro-  
 ferre, cum id, quod è Creta ad uos aduehitur, unà cum floribus deferatur, nullis præterea deficientibus notis, quæ  
 in legitimo requiruntur. nisi dicamus hunc locum deprauatum esse, ut ferme suspicor. Quod autem fructum ferat  
 Cretense Dictamnium, & ex consequenti etiam florem, uidetur suprâ declarasse Theophrastus, cum dixit. Vfus est  
 foliorum, non ramorum, nec fructus. Atqui id ipsum non obscure à Damocrate explicatum est, ut in Galeno legitur  
 lib. V. de compositione medicamentorum per genera, cap. X. in emplastro ex dictamno, quod acceptum refert Da-  
 mocrati. Hic nimirum dictamno Cretico florem assignauit in illis Græcis uerbis, quos solutis uerbis sic uertimus.  
 His quoque omnibus addito dictamni herbe læuis sicca florum habentis drachmas uiginti. Hoc idem etiam credimus  
 Virgilium carminibus expressisse lib. XII. suæ Aeneidis, ubi ita cecinit.  
 Hic Venus indigno nati concussa dolore,  
 Dictamnium genitrix Cretæa carpit ab Ida,  
 Puberibus cauleni folijs, & flore comantem  
 Purpureo: non illa feris incognita capris  
 Gramina, cum tergo uolucres hæfere sagittæ.  
 Plinio Dictamnium non modò flore, & fructu caret; sed etiam caule. quod tamen experientia, & antè dictorum te-  
 stimonio planè falsum esse deprehenditur. Pseudodictamnium porrò hodie paucis (ut arbitror) notum, Pistis hoc tē-  
 pore ad me misit clarissimus medicus Lucas Gbinus, caule dodrantali, lanuginoso, albicanteq;: cui folia è caulibus  
 erumpunt ex interuallis bina, dictamni tomento pubescentia: è quorum omnium medio flores purpurei prodeunt, mar-  
 rubij, uel melissophylli modo, sapore pulegij, minus tamen acri. Vulgare autem Dictamnium, album uulgo co-  
 gnominatum, quod folio fraxineo, floribus odore fragrantibus, citreis æmulis, radice alba, hircinum uirus oleute,  
 & amara provenit, nullis prorsus notis aliquod Cretensis dictamni genus representat. Viribus tamen quàm pluri-  
 mis, præsertimq; antidotis conficiendis, summiopere commendatur. Quo fit, ut non satis admirari possim, quod ue-  
 teres rei herbariæ peritissimi, huius insignis plantæ nusquam, quod sciam, meminerint. De eius historia, ac uiribus  
 libro primo latius disseruimus. quare nuuc ea repetere superuacaneum esse duximus. Dictamni, ac falsi Dictamni  
 uires tradidit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Dictamnium tenuiore essentia constat, quod ue-  
 ram pulegium: cetera illi simile. At quod uocant pseudodictamnium, ad omnia imbecillius dictamno est. Quæ  
 herba Græcè dictamnion, Latine quoque Dictamnium appellatur: Arabicè, Mescatrenefir, Aluegem araba, siue  
 Bari: Italicè, Dittamo: Germanicè, Vuilden poley: Hispanicè, Ditamo, & Ditamo real. Quod uerò Græci δα-  
 δαδὶταμνον, Latini item Pseudodictamnium, & falsum Dictamnium dicunt: Itali, Falso Dittamo.  
 Hic locus illi prorsus est similis, qui in uulgatis Dioscoridis exemplaribus legitur libro primo in capite Nardi  
 montani. Idcirco in hoc similiter, atq; in illo adnotauimus, mendum subesse arbitramur. Ergo communis quoq; erit  
 utriusque loci ratio, qua uterque suæ, ut spero, integritati restitatur. Et quoniam superuacuum esset ea referre,  
 quæ alibi à nobis dicta sunt, nunc dicam tantum quomodo hic legendum censeam. Vulgata & ea quidem deprauata  
 lectio, quam secuti sunt interpretes, habet οὕτε δὲ ἀνθος, οὕτε καρπὸν φέρει. At illa, quam nos ueram putamus,  
 erit. οὕτε δὲ ἀνθος, οὕτε καρπὸς φέρει. quæ uerba ita Latine reddemus: Neque uerò flos, neq; semen confert.  
 Ex hac castigatione illud facile fiet, quod Dioscorides auctor grauiissimus non solum erroris suspicione non condem-  
 nabitur, sed etiam maxime commendabitur, quod ea scriptis tradiderit, quæ cum alijs ueteribus conueniunt.

Dictamnium  
fert flores.

Pseudodicta-  
num.


Vulgare Di-  
ctamnium.

Dictamni vi-  
res ex Gal.

Nomina.



## SALVIA MAIOR.



Salvia.

## SALVIA MINOR.



Cap. XXXIIII.

SALVIA, siue eleliphacón, frutex est ramosus, longus, virgas habens quadrangulas, & canas folia mali cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & quæ sensim attritarum quasi uestium scabritiem referant, hirsuta, subalbida, perquam iucundo odore, sed graui: semen summis in caulibus sylvestri hormino simile gerit. In asperis nascitur. Menses cit, & urinas decoctum foliorum, ramorumq; potum, & partus extrahit, & pastinacæ marinæ ictibus auxiliatur. Capillos denigrat, viderum sanguinem cohibet, tetra ulcera purgat. Testium pruritus sedant rami foliaq; si eorum decocto cum uino foueantur.

Saluæ consideratio.

AD EO est uulgaris notitiæ Salvia hortensis, ut nulli prorsus reperiantur horti, in quibus hodie frequens posita non spectetur. Est etiam præter hanc Salvia sylvestris, quæ in campestribus, asperis, incultis, & non ictibus prouenit folijs domesticæ similibus, candidioribus tamen, et hirsutioribus. Quo fit, ut longè aberrant, qui pro sylvestre Salvia, agrestem Scleaream sic uocatam usurpant, quam seplastarij Centrum galli, & Gallitricum etiam appellant. Verùm animaduertendum est, quòd illa, quam sylvestrem appello, ea sanè non est, quæ in Hispaniæ campestribus, & asperis locis, ac in Massiliensi agro una cum nostrate nardo, & lauendula frequentissima nascitur. Quandoquidem hæc non sylvestris Salvia est, sed ea ipsa, quam domesticam uocant: nam quæ in hortis habetur alia non est, quam campestris in hortos translata. Ideoq; nō scribit Dioscorides, Saluiā in hortis nasci, sed in asperis tantum locis. Ceterum Theophrasto duo Saluæ produntur genera lib. VI. cap. II. de plant. histor. ubi sic inquit. Sphacelus, et salvia inter sese distant, quasi alterū urbanum, alterū genus sylvestre dixeris. Sphacelo foliū lenius, contractius, minusq; squarrosum: saluia scabrius. hæc ille. Porro genera hæc Saluæ, quæ à Theophrasto redduntur, in Italia quoque foeminant. In quàm plurimis inueniuntur: in eaq; sum sententia, ut existimem sphacelum marem esse, saluiam uerò foeminam. In Creta, ac etiam in quibusdā Apuliæ, et Calabriæ locis Saluia in cacumine gignit tubercula quædā, gallarū instar, subalbida: quorum aliàs mihi copiam fecit Ioannes Baptista Rhannus Illustris. Senatus Veneti secretarius, uir moribus, ac doctrina præclarus: is enim (quæ sua est humanitas) cum ea ex Creta sibi allata essent, mihi uideret tradidit. Saluiam Græci eleliphacón uocant. Vnde factum esse puto, ut Plinius lib. XXI. cap. XXV. uocabulorū cognatione deceptus, quod Græcis lens phacos appelletur, crediderit magno errore eleliphacón lentis speciem esse. De eius uiribus Galeno lib. VI. simp. medic. teste, temperamentum est euidenter excalescente, ac leuiter adstringente. De eius uiribus copiosius disseruit Actius, sic scribens. Saluia manifestè calefacit, & leniter adstringit. Tradunt quidam, suffictā saluiam

Plinij lapsus  
Saluæ vires  
ex Galeno, &  
Actio.



niam menses immoderate fluentes, & omnino muliebri profluvium compescere. Agrippa sacram herbam uocauit, quam prægnantes mulieres, si fluida, laxa; fuerint, utilissimè comedere prodidit: continet enim conceptum, uitalemq; reddit. Ac si succi huius heminam cum modico sale, quarto à secubitu die, mulier potauerit, deinde uiro miscetur, procul dubio concipiet. Aiunt in Copto Aegypti post seuas pestilentias, ab his qui superfuerunt, ad eum succum bibendum mulieres coactas fuisse, plurimosq; uide productos fœtus. Dato, inquit Orpheus, sanguinem expuentibus succi saluæ cyathos duos, ieiunis cum melle bibendos, & sanguis illico cohibebitur. Tabidis pilulæ in hunc modum parantur. Sumito spicæ uardi, gingiberis, sing. drachmas duas: seminis saluæ assati, triti, & cribrati drach. octo: peris longi drach. duodecim, & cum succo saluæ pilulas conficito, & mane ieiunis drachmam unā exhibeto, eodemq; modo in uestire, ac postea aqua puræ quippiam propinato. Saluia Latinis dicta, Græcis ἑλεσιφακος nominatur: Nomina. Mauritanis, Aelisfacos, seu Elifacos: Italis, Saluia: Germanis, Salbey: Hispanis, Saluia, & Salua: Gallis Saulgs.

## MENTHA.

## MENTHA ALTERA.



Mentha.

Cap. XXXV.

MENTHA cognita herba est. Calfaciendi, adstringendi, atque exiccandi uim habet. Sistit sanguinem, potò ex aceto succo: tineas in uentre teretes enecat: uenerem stimulat. Singultus, uomitiones, cholerasque sedant terni ramuli cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illinatur. Imposita fronti capitis dolores mulcet: manimas sitendantur, aut lacte turgent, compescit: cum sale canum moribus illinitur: aurium doloribus cum aqua mulsâ subuenit: uulua ante coitum admota conceptioni resistit: linguæ scabritiem confricta læuigat. Lac coire, densarique in caseum non patitur, si folia potionibus lactis immergantur. In summa stomacho utilis est, & in condimentis peculiarem gratiam habet. Syluestris mentha, Latini menthastrum uocant, hirsutiore est folio, & prorsus maiore, quàm sisymbrij, grauiori odore. quare minus ad sanorum usus expetitur.

MENTHA cum hortensis, tum etiam syluestris, quam Hetrusci nostri Latinum nomen retinentes uulgo Menthastrum appellant, adeò omnibus uulgaris, notaq; est, ut sine uitio eius delineationem silentio prætermitti posse putauerim. Et quauis plures, quàm hic scribat Dioscorides, in hortis sint Menthae species (una enim breuioribus, & crispioribus cõstat folijs, alia rubenti caule, & flore, alia uerò albicante) huiusmodi tamen specierum differentie nõ sunt, meo iudicio, plurimi faciendæ. Viuax Mentha admodum est: nam in hortis semel tantum sata, tam restibili fertilitate durat, ut uix in posterum extirpari possit, quin renascatur. Venereis uoluptatibus Mentha commendata est:



## MENTHASTRUM.

menthe vires  
ex Gal.



Menthae græ-  
cæ mentio.

## MENTHA GRAECA.



Nomina.

et si Plinius non sine errore lib. xx. cap. xiiii. plantæ contrarium scriptis tradiderit. Huius menthe facultatis causam scite reddidit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, ubi de ea ijs differit uerbis. Hediosmos, alij uero minthen odoratam nuncupant. Est enim et alia quedam minthe non odorata, quam calaminthen uocant. Vtraque gustu acris, et facultate calida est, tertio ordine excoficientium. Infirmior tamen est mentha odorata, quam calamintha, et minus excoficient. Ut enim in uniuersa sumedicam, hæc ceu sylvestris quedam est, illa ceu domestica. Quamobrem sanè ob eam, quæ ex cultu accedit, humiditatem, mediocriter item ad uenerem excitat. Id quod omnibus communis ne est, quæ humiditatem semicoctam, et flatuosam continent. Ob talem ipsius herbe temperaturam in abscessibus ea quidam cum potentia mista utuntur. Id quod in Calamintha facere nequeas, propterea quod ualentius cum excoficient, tum desiccat, quam id genus possant. Habet uero etiam quiddam amarum in se, et acerbum: et amaro quidem lumbricos interficit; acerbitate uero si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis reiectiones reprimit. Substantia est, ut si qua alia herba, tenuium partium. hæc Galenus. Verum animaduertendum est, hoc loco Galenum per sylvestrem Mentham non intellexisse legitimam Calamintham, quod is de odorata Calamintha (ut sequenti capite dicturi sumus) initio septimi libri de simplicium medicamentorum facultatibus copiose tractauerit. Ex quo facile conijcere licet, Galenum in hoc non suam, et ueram appellationem retulisse, sed aliorum, et forte Græci uulgi, qui sylvestrem mentham calaminthe nomine appellare consueuerit: id quod etiam Galani locutio confirmare uidetur.

Ceterum est et herba passim in hortis crescens, folio saluie longiore, latioreque, betonice amulo, in uiridi albicante: caulibus cubitalibus, et aliquando maioribus, in quorum cacumine flores exeunt corymbacei, colore melino, tanacetii modo. Planta in uniuersum amara est, subadstringens, et grauiter odorata. Coriatiensibus hæc uulgo uocatur MENTHA GRÆCA: in Hetruria uero Salvia romana, quod potius folijs saluiam referat, quam mentham: quin et herbam diuæ Mariæ nominant. Sunt etiam, qui Lapsulata appellant: sed unde apud hos id sibi nomen ascriuerit, nescio, ipsi dicant. Porro Valerius Cordus in suo dispensatorio, in unguento Marciati magno, duas profert Menthas, nempe crispan, et Saracenica: pro Saracenica autem mentha hanc, de qua præsens mentio, imponendam esse censet. Sed quoniam id nulla comprobatur auctoritate, uel ratione, eius quidem sententiæ ad stipulandum non tutum esse arbitror: præsertim cum Nicolaus nuper à Fuchsio laudatus, nullam huiusce Saracenice menthe mentionem faciat, sed rubæ, et agrestis tantum. Id quod facile nobis indicat, ut libere dicamus, Cordi dispensatoriū quàm plurimis scetere mendis, quippe quod non omnes medicamentorum descriptiones ex bonorum auctorum fonte hauserit. Plantam hanc (ut ipse scribit) Germani uocant Vnser frauuen muntz, id est, mentha sanctæ Mariæ. Vnde etiam Fuchsius aliam eodem nomine ab hac longè diuersam ostendit. Qui uero horum errauerit, in hoc Germanicæ lingue peritiores iudices erunt. quanquàm si Hetruscis Germanica, uel Germanicis Hetrusca nomina respondent, Cordo potius (quantum ad uocabulum spectat) quàm Fuchsius accesserim, quod, ut modò diximus, herbam diuæ Mariæ eā uocet in Hetruria. Huius epotus succus aluit tinea, et lumbricos enecat: frigido utero subuenit. Ventriculi roborat, tam haustus, quàm illitus, et uomitiones compescit. Totā planta tam substratu, quàm suffitu serpentes fugat, et eorum uenenis resistit, quin et infarctus expedit, et capiti robur addit. Ea Græcis ὀσώρις: Latinis, pariter et Italis Mentha uocatur: Arabibus, Nahana: Germanis, Muntz: Hispanis, Hierba buena, et ortelana: Gallis, Mente.

Calamintha



CALAMINTA MONTANA.

CALAMINTHA ALTERA.



Calamintha.



Cap. XXXVI.



EX CALAMINTHAE generibus quædam montibus familiaris, folia ocimi habens, incana: surculos, & caules angulosos, purpureum florem. Altera pulegio similis est, sed maior: quam sylvestre pulegium ideo appellarunt, quòd odore ipsum æmuletur. nepetam Latini uocitant. Tertia menthastrò cognata est, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus, quàm superiora, sed uiribus inefficacior. Omnium folia gustu impensè feruentia, & acria: radix superuacua. Nascitur in campestribus, asperis, & aquosis. Potu, aut illitu demorsis à serpente opitulatur. Decoctum potu menses, & urinas expellit: ruptis, conuulsis, orthopnææ, torminibus, cholericis, horroribusque auxiliatur: regium morbum expurgat. Præsumpta in uino uenenis resistit: tineas, cæterasque interaneorum animalia cum sale, & melle pota, enecat, nec secus cocta, crudæque, si teratur. Elephanticos esitata adiuuat, si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita, si in uellere subiiciantur, menses extrahunt, & partus enecant: accensa, aut substrata, serpentes fugant: nigris cicatricibus candorem reddunt, in uino cocta, & illita: fugilata tollunt. Calamintha ischiadicis imponitur, ut ex alto humores euocet, summam cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus.

CALAMINTHA officinis Calamentum dicitur, cuius tres numerantur species. Sed eius frequentior est usus, quæ Latini Nepeta uocitatur, secundo loco hic à Dioscoride tradita. Non enim hæc apud Hetruscos in hunc usque diem retinet: siquidem nostrates eam, corrupto tamen nomine, uulgo appellant Nipotella.

Ceterum

Calaminthæ  
confid.



Brasauoli er  
ror.

Ceterum hac in re Brasauolus (pace eius dixerim) aperte hallucinari deprehenditur, quod pro certo existimet Calamintham secundo loco à Dioscoride descriptam illam herbam esse, quam, eo quod catti magna eius capiantur uoluptate, Gattaria quidam uulgò nominant. Error hinc manifestè proditur, quod GATTARIA, cuius hic imaginem

## HERBA GATTARIA.



Ruellii erratum.

Monachorū  
lapis.

Calaminthæ  
uires ex Gal.

damus, sit herba folijs urticæ, aut apiastro similibus, quæ quantum à pulegij folijs desideat, non modò cæteris notis; uerum etiã odore, in quo Brasauolus nititur, ij dijudicent, qui has differẽtis rectius norunt. Sunt tamen è uulgaribus, qui Gattariam etiã Nepetam appellant, quorum nomenclaturam magis fortasse secutus Brasauolus, quam plantæ ipsius notas, hallucinatus deprehenditur. Nepeta itaq; Dioscoridi nil aliud unquam, mea opinione, fuerit, quam uulgaris calamintha, qua officina utuntur, quamq; nos uulgò uocamus Nipotella. quandoquidem uulgaris usus Calamintha, non modò folijs pulegium æmulatur; sed etiã saporis & odoris fragrantia. Quo fit, ut mirum nõ sit, si Dioscoridis testimonio, à quibusdam syluestre pulegium uocata fuerit: nõ enim odore tantum (ut Brasauolus uelle uidetur) Nepeta pulegium imitatur; sed & folijs, & caule. Quamobrem dicamus licet, secus facto existimandum esse, Gattariam herbam esse Nepetam tertiam Calaminthæ speciem. Neq; etiã putandum, eandem tertiam esse, quemadmodum falsò credidit Ruellius. Quippe quoniam fecerit hanc Dioscorides menthastro similem, non autem melissophyllo, aut urticæ, quas (ut paulò antè diximus) Gattaria reple sentat. Quapropter nõ modò ea de causa eius sententiam explorandam putauerim; sed etiã quòd sapius ipse in locis aquisitè repererim tertiam Calaminthæ speciem, menthastri æmulam, sublebidioribus tamen folijs, ac gustu acriori. Non secus & montana mibi frequens olim occurrebat in excelsis uallis Ananie montibus, folijs albicantibus, ocimo similibus, caule quadrangulo, & flore in purpura rufescente. Quamquam in hoc errore, mea quidem sententia, uersantur Monachi illi reuerendi, qui in Alexandrensis commentarios ediderunt, ut asserere non dubitent, montanã hanc Calamintham legitimam esse Nepetam. Calamintha meminit Galemus lib. VII. simplicium medicamentorũ, sic de eius uiribus differens. Calamintha essentia est tenui, & calida, sicq; tenui


perie, ex tertio quodammodo ordine utraq; qualitate. Horum manifesta sunt indicia, partim gustu apparentia, partim experientia cognita. Gustu siquidem acris, & palam calida est, ac paulum omnino subamari habet. Periclitantibus autem, & corpori admoventibus extrinsecus imposita, primùm quidem ualde exalfacit, & mordicat, cutemq; laniat, postremò etiã ulcus efficit. In corpus autem intrò assumpta, tum ipsa per sese sicca, tum etiã cum melle toto, perspicuò calfacit, & sudores ciet, omneq; corpus tum digerit, tum exiccat. Ea ratione ducti quidam ipsam contra rigores per circuitum repetentes adhibuerunt, foris quidem oleo incoctam toti corpori inungentes cum frictione non segni, intrò uerò assumentes, sicuti est dictum. Quinetiam & coxendicibus eam quidam in egritudine ischiadicis, tanquam strenuum remedium illinunt. Trahit enim quæ in profundo hærent ad superficiem externam, totumq; adeò articulum exalfacit, cutemq; non obscure adurit, mensesq; tum epota, tum apposta admodum efficaciter prouocat. Bonum etiã elephantiorum remedium, non eo tantum, quòd strenuè tenues humores digerat; uerum etiã quia extenuet, & incidat ualenter crassos, quales sunt qui hunc morbum procreant. Sic & cicatricibus atris candorem reddit, & sugillata digerit. Sed in talibus in uino coctam cataplasmati modo imponere uiridem magis, quam siccam præstat. Quippe arefacta uehementior redditur, & ad urendum promptior. Porro talis cum sit ad uenenatarum bestiarum morsus asumitur, uelut etiã cauteria, & quæcunq; medicamenta calida sunt, & acria tenuiumq; partium, quæq; faciliè ex alto ad sese circumiacentem omnem qualitatem possunt attrahere. Ceterum quæ illi inest amaritas, planè exigua est: uerum ad quædam ita efficaciter agit, ut quæ ualentissima est, nimirum cum coniuncta sit uehementi calori cã tenui essentia. Quare & ascaridas, & lumbricos succus eius aut insusus, aut epotus enecat. Et adeo ratione aurium uermes, aut si alicubi in corporis parte sinuosa, aut implicata, quæ putredine tentetur, talis prouenerit affectus. Sic & conceptum seu pota, seu admota interimit, & eiicit. Igitur incidendi quidẽ ei nis adeptus propter calorem eius, tenuitatem, & amaritudinem: abstergerendi uerò propter unicam amaritudinem, sicut alia ferè omnia antè dicta prodest: ictericis uerò siue regio morbo laborantibus potissimum ob amaritudinem, sicut alia ferè omnia amara, utpote abstergentia, & expurgantia in iccinore prouenientes obstructions. Ad omnia iam dicta efficacior est montana. Kalamintha herba sic Græcè, ut etiã Calamintha Latine dicitur: Arabicè, Calamentum: Italicè, Calamintha, & Calamento: Germanicè, Vuilden poley: Hispanicè, la Neuada: Gallicè, Pouliot sauvage.

Nomina.



## Thymum.

## Cap. XXXVII.



THYMVM ab omnibus cognoscitur, surculofus frutex, exilibus foliis, multis, & angustis circumdatus: capitulis in cacumine, flore purpurascens refertis. Gracili solo, & petroso provenit. Vim habet hanc, ut cum sale, & aceto potum, pituitam per alium detrahat. Decocti ius prodest orthopnoicis, & anhelatoribus: tineas ventris exigit: menses, partus, & secundas pellit: urinas ciet. Cum melle in eclegmate faciles facit excreationes: recentes tumores discutit, cum aceto illitum: concretum sanguinem dissolvit. verrucas thymi colorem reddentes, pensilesque tollit. Ischiadicis cum uino, & polenta impositum subuenit: hebetibus oculis in cibo prodest. Perquam utile pro condimento, duntaxat ad usus eorum, qui recte valent.

THYMVM duorum generum esse testatum reliquit Theophrastus lib. VI. cap. I. de plantarum historia, ubi de eo disseruit his uerbis. Quin & thymum candidum, nigrumque reddunt. Serò id admodum floret: nam circa æstium solstitium incipit. Melapes hinc capiunt, & hoc augurio apiarum constare affirmant, an probe melletur, nec ne. Etenim si aliter defloruerit, mellatio minus probe succedit. Destruitur, peritque flos, si imber inceperit. Semen secundum satureiam, atque etiam magis origani manifestò sentitur: thymi uerò nullum ostendi potest, sed floribus quodam permiscetur modo. Flores etenim serunt, itaque oritur thymum. hæc Theophrastus. Ceterum nunc thymum in Italia notissimum est. Præstat autem quod ex Apulia fertur: quanquam laudatissimum est, quod est Creta insula, alijsque nonnullis Græciæ locis aduehitur. Vnius tantum thymi, minoris uidelicet, meminit hic Dioscorides. Verum cum is libro quarto in epithymi historia, Epithymum florem esse scribat è thymo duriore, satureie simili, hæc dubiè ostendit se non secus ac Theophrastum, duo Thymi genera obseruasse. Vnum, quod mittit surculos complures exilibus folijs, angustis, & numerosis circumdatus: in quorum cacumine sunt capitula flore purpureo referta. Alterum uerò lignosius, fruticosius, ac durius, satureie simile. Thymo hoc duriore passim ferè scatet Gortyniensis ager, cuius præcipue colles: in eoque (ut libro quarto suo loco dicitur) legitimum epithymum oritur. Thymi meminit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum, ubi de eius uiribus ita scribit. Thymum incidit, & calfacit manifestè: ob id & urinam, & menses ciet, factum euellit, & uiscera potum expurgat: educendis ex thorace, & pulmone confert. Itaque in excalfaciendo, & exiccando in tertio ordine statuendum est. Præter has autem à Galeno descriptas, alias quoque Thymo uires reddidit Aëtius sermone primo, sic inquit. Hæc uerò experimentis de Thymo composita sunt. Dato ieiunis articulari morbo laborantibus, Thymi aridi minutissimi drachmas quatuor cum oxymelitis cyathis. Bilem enim, reliquosque humores, atque acrem saniem euacuat: facit & ad uesicæ affectus. Ventre autem inflato, ubi scilicet intumescere cœperit, drachmam unam dato ieiunis cum cochleari aquæ mulsæ. Ad lumborum coarctandorumque dolorem, lateris, & thoracis, ac hypochondriorum suspensiones ac inflationes, pondere trium drachmarum cum oxymelite temperati mensura cochlearij ieiuno exhibeto. Similiter etiam & melancholicis, & mente turbatis, timoreque detentis drachmas tres cum oxymelitis temperati cochleari præbeto. Dato item ieiunis, & ante coarctationem aduersus lippitudinem, & uehementem oculorum dolorem. Præterea contra podagram, etiam quæ motum omnino interceperit, cum uino utilissimè propinatur. Postremo ad tumefactos testes ieiunis trium drachmarum pondere exhibeatur. Verum ab atro thymo astinere oportet: corrumpit enim temperamentum, bilemque gignit. Eligendum quod purpureo flore est, præstantius tamen quod album illum habet. Planta, quæ Græcis θυμός, Latini item Thymus, & Thymum appellatur: Mauritanis, Hasce: Italis, Thimo, Germanis, Romischer quendel, & Vuelscher quendel: Hispanis, Tomilbo salsero: Gallis, Thym, seu Mariolaine d'Angleterre.

Thymi historia.

Thymi uires ex Galeno, & Aëtio.

Nomina.

## Satureia.

## Cap. XXXVIII.

SATUREIA triuialis notitiæ est. Gignitur in asperis locis, & tenui solo, thymo similis, minor tamen, & tenerior: defert spicam florum plenam, coloris herbacei. Eadem potest, quæ thymum, si modo consimili sumptitetur. Aptus sanis usus. Est etiamnum quædam satia, syluestri prorsus minor. quæ propter mitiorem acrimoniam commodius in cibos recepta est.







sylvestre etiam genus est, quod deferentes ex montibus serunt, ut apud Sycionem fieri solet, atque etiam Athenis ex monte Hymetto: apud alios uero, ut in Thracia, montes, & plana omnia Serpyllo scatent. Peculiaris huic auctio germinum: quippe cum in quantumvis longitudinis procedere ualeat, nactum scilicet adminiculum, aut iuxta sepes aliquas satum. Genera urbana reddere non est, ut retulimus: ferocia esse affirmant. Hoc enim in montibus, tum satui reiatum quoddam, atque uehementissimum: tum gratum odore, molliusq; comperiri. Tempus serendi plurimum autumnus: hoc enim primum serere nimirum properant. haecenus Theophrastus. Ex cuius etiam uerbis satis perspicue colligi potest, duo esse sylvestris Serpylli genera. Quare etsi palam unius tantum generis mentionem fecerit Dioscorides; duorum tamen obscure meminisse potuit, cum inquit. Sylvestre, & ygis appellatum, non serpit, sed in altitudine assurgit. Nam si unum tantum sylvestris Serpylli genus Dioscoridi notum fuisset, ei sane necessarium non erat addere ygis cognomen differentiae causa. Satiuum radicibus quidem serpit, sed ramulis attollitur, amaracimodo, quemadmodum sylvestris altera species, quae malum citreum olet. Proinde scite Plinius lib. xx. cap. xxii. uis de eo memoriae prodidit. Serpyllum a serpendo putant dictum. quod in sylvestri eyenit, in petris maxime. Satiuum non serpit, sed ad palmi altitudinem increscit. Serpylli uires paucis perstrinxit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Serpyllum usque adeo excaesfacit, ut & menses, & urinas moueat. est autem & gustu admodum acre. Eius nomen Graecum *εργυλλος*: Latium, Serpyllum: Arabicum, Hemen: Italicum, Serpyllo: Germanicum, Quendel, & Huener koel: Hispanicum, Serpollio, & Serpan: Gallicum, Serpoulet.

Serpylli uires ex Gal.  
Nomina.

## Sampsuchum.

## Cap. XL.

**SAMP SVCHVM** in Cypro, & Cyziceno laudatissimum. Secundum sibi locum uendicauit Aegyptium. Amaracum gens Sicula, & Cyzicena appellat. Herba est ramosa, per terram repens: folijs eius calaminthae, quae tenui folio constat, hirsutis, & rotundis. suauissimum odorem spirat: ideo coronis inseritur. Vis eius excaesfaciens. Succus decocti potus, conuenit incipientibus hydropicis, & ijs quos urinae difficultas, aut tormina excruciant. Illita ex melle arida folia, fugillata tollunt: menses subdita in pello trahunt: contra scorpionis ictum ex aceto, & sale illinuntur: luxatis, tumoribusque cerato excepta, imponuntur: aduersus oculorum inflammationes, cum polline polentae, illini prodest. Acopis, malagmatisque caesfaciendi gratia commiscetur.

**CVM** superius libro primo in Sampsuchini unguenti commendatione, Sampsuchum, & Amaracum idem esse latius ostenderit, etsi Galenus, & Paulus diuersis capitibus Sampsuchi, & Amaraci meminerint, eadem hic repetere superuacaneum duxi: quod ea huc facile transferre possint ij, qui rem hanc se aliter fortasse habere existimant. Sampsuchum in Italia Hetruscis uulgo appellatur Persa, quod forte illis e Persia fuerit allatum: ceteris uero inibi Maiorana, nomine a Latinis mutato. Herba haec tantam cum mulieribus inuit gratiam sui odoris iucunditate, ut nulle ferre reperiantur, quae suis in hortis, aut scitilibus uasis Amaracum non ferant, uel plantas non transferant, ac diligenti admodum cultura foueant. Quo fit, ut putauerim ego, ex eo Maioranae sibi nomen adinuenisse, quod maiori cura, ac diligentia seratur, colaturq; quam ceterae plantae. Neq; id ea solum ratione, quod, ut

Sampsuchi confid.

Sampsuchi uires ex Gal.

Nomina

paulo ante diximus, odore perquam iucundo commendetur; sed quod etiam perpetua uireat coma. Sampsuchi nomen Galenus libro viii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Sampsuchum tenuium partium, & digestis quoque Sampsuchum, Amaracus, & Maiorana uocatur: Arabibus, Merzenius, seu Morsangius: Italis, Maiorana, & Persa: Germanis, Meyeron, Maiorana, & Meyram: Hispanis, Maiorana: Gallis, Marone, & Mariolaine.

## Melilotus, siue Sertula Campana.

## Cap. XLI.

**SERTVIA** campana laudatissima in Attica, & Cyzico, & Chalcedone nata: cuius color uicinus croco, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nola, colore in luteum languescente, odore uim habet adstrictoriam. Inflammationem omnem emollit, praesertim quae in oculis, vul-

K ua,



ua, sede, aut testibus erumpat, si ex passo cocta illinatur: interdum autem addito oui luteo affato, aut fœni græci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis papaueris, intyboue. Recentes melicerides per se cum aqua, & ulcera manantia in capite illita cum creta Chia, vino, aut galla sanant: stomachi dolores, & cruda, & cocta cum aliquo ex antè dictis leuat: doloribus aurium mitigandis cruda ex passo instillatur: in aceto, aut rosaceo madefacta, capitis dolorem lenit.

Meliloti consideratio.

Meliloti nires ex Gal.

Nomina.

**PROBATISSIMA**, legitimaq; Melilotus non modò in pluribus Campaniæ locis; sed etiam Gargano Apuliæ monte provenit. Cuius semen in tenuibus corniculis inclusum nuper Venetias afferri cœpit. Quo factum est, ut iam cognouerint medici uulgaris usus Melilotum illegitimam esse, potiusq; lotum urbanam referre, cuius historiam libro quarto tradidit Dioscorides. Meliloti meminit Plinius lib. XXI. cap. IX. ubi ita scriptum reliquit. Ergo coronamenta folio uenere apiastrum, meliloton, quod Sertulam campanam uocamus. Est enim in Campania Italia laudatissima, Græcis in Sunio, mox Chalcidica, & Cretica, ubicunque uerò asperis, & syluestribus nata. Coronas ex hac antiquitus factitas, indicio est nomen Sertula, quod occupauit. Odor eius croco uicinus est, & folia ipsa cana placet, maximè folijs breuissimis, atque pinguisimis. Melilotum, ut Galenus memoriæ prodidit libro VI. simplicium medicamentorum, mistæ facultatis est: habet enim quiddam adstringens, sed & digerit, & concouit: copiosior enim in eo est substantia calida, quàm frigida. hætenus Galenus. Ceterum neminem inuenio e Græcis auctoribus, qui explicauerit, quæ Meliloti pars in usum medicine recipiatur, an folia, aut radices, aut caulis, an flores, aut cornicula, aut semen. Quod tamen docuerunt Mauritanii, præsertim Serapio, qui ex auctoritate Isaac Eben anram de Melilotò scribit in hunc sensum. Melilotus herba est, quæ folia fert rotunda, & uiridia ramulos emittit admodum exiles, in quibus folia rara. Semen gerit in siliquis tenuibus, ac rotundis: quæ granis includunt pauca, glauci coloris, rotunda, infra sinapis magnitudinem. Porro in melilotò usum sibi uendicauerunt siliques, & semina, quæ in eis continentur. Μελιλωτος ita Græcè dicitur, ut Latine Melilotus, & Sertula campana: Arabicè, Alchilelmelich: Italicè, Melilotò: Hispanicè, Corona de rei.

## Marum.

## Cap. XLII.

**MARVM** herba cognita uulgò, surculosa, flore origani, folijs multò candidioribus, flore odoratiore. Vim habet sisymbrio consimilem: substringit enim, & modicè calfacit. Qua de causa illitu serpentia ulcera sistit, & in calidas illitiones additur. Iuxta Magnesiam, & Tralleis copiosissimè magnitur.

Mari mentio ex Galeo.

Marum Italicæ peregrinum.

Nomina.

**ET SI** Galenus inter simplicia medicamenta nusquam, quod equidem inuenerim, Mari meminerit: libro tamen primo de antidotis in Hedychroi compositione eius mentionem fecit, cum ita scribit. Aliæ hedychroi descriptiones reperiuntur, quæ neq; Amaracum, neq; Marum prorsus habent: quædam alterutrum tantum continent. Neq; enim duo hæc omnes noscunt unguentarij, eo quòd herbas solum e Creta aduectas emant unà cum seminibus, atq; succis. Ego uerò & easdem herbas scio in Asia nasci, ac in alijs quidem regionibus raras esse, in Cyzico autem frequentes. In Italia quoq; ut & alias quasdam herbas, ita & Amaracum uidi, quæ odore multum à Maro superatur. Marum enim ualde redolet, putaretq; aliquis sola nominis appellatione ductus, unguentum amaracinum, quod in Cyzico faciunt, amaraci plurimum capere, sicq; forsitan ab antiquis unguentum conficiebatur, sed nunc solum marum imponunt. Hanc herbam aliquoties cum ipse degustassem, ac eam amaram quidem plurimum, ærem uerò parum deprehendissem, horum sum quendam eorum, qui Amaracinum conficere solent, ut amaraci tantum compositioni immitterent, quantum uiriri. Ac mihi uisum est id unguentum minus quidem odoratum, nihil autem uiribus inferius. hæc Galeni uerba. Ex quibus palàm est, Marum ab amaraco uiribus, & facie parum admodum disidere, etsi tum amarius sit Marum, tum etiam odore fragrantius. Quapropter non planè eorum sententiam explodendam putarem, qui Marum amaracum illam esse arbitrantur, quæ maiorè spirat odorem, maioremq; amaritudinem gustu præfert: quæq; folijs uiret minusculis, candidioribus, & tenuioribus: unde non immeritò à nostris in Hetruria uulgò cognominatur Persa gentile. Sampsiacum enim, siue Amaracum, uiribus Persa uulgò uocari superius indicauimus. Cuius illud genus, quod folijs constat pinguioribus, latioribus, uiridioribus, gustuq; acrioribus, minus tamen amaris, legitima omnibus Amaracus esse confetur. Illorum inquam sententiæ ferme adstipularer, nisi eidem aduersari Galenus inueniretur: quippe qui loco citato testatus sit, se in Italia amaracum uidisse, nulla quòd inibi Marum uiderit, facta mentione, sed tantum quòd hoc in alijs ab Asia regionibus rarum oriatur. Hinc itaq; facile adducor, ut existimem Marum non nasci in Italia. Auger nobis opinionem Plinius, qui quasi Galeno subscriberet, Marum duxit esse rarum inuentu, & Italiae peregrinum. quare ipsum collocauit lib. XXII. cap. XXIII. inter ea dumtaxat odoramentorum genera, quæ ab externis regionibus in Italiam conuehebantur, sic inquit. In Aegypto nascitur & Maron peius quàm Lydium, maioribus folijs, ac uarijs: illa breuia, ac minuta, & odorata. hæc Plinius. Ceterum non ob id eos errare crediderim, qui graciliorem amaracum Mari loco substituunt. Quandoquidem testatur Galenus, quòd unguentum illud, in quo Amaracum pro Maro admisceri iussit, etsi minus quidem odoratum uideretur; non tamen uiribus inefficacius erat. Quod Græci



Acinus.

Cap. XLIII.

ACINOS, aut aconos à Græcis dicitur, tenui, siccoque ramulo herba, ocimo similis, odorata, sed hirsutior: qua coronæ faciuntur. à nonnullis olitoribus colitur. Menses, & aluum pota sistit. Illita panos, ignemque sacrum sanat.

De Acino opinio quorū-  
dam explosa.

Manardi opinio non accepta.

## Nomina.

Baccharis.

Cap. XLIIII.

**BACCHARIS** herba fruticosa, quæ in coronas additur, cuius folia aspera sunt, media uiolæ, & uerbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti altitudinē petens, aliquantulum asper, non sine appendicibus adnatis: flore purpureo, subalbicante, odorato: radicibus ueratro nigro similibus, quibus odor inest cinnamomo proximus. Asperum, squalidumque solum amat. Radix in aqua decocta ruptis, uulsis, ex alto præcipitatis, spirandi difficultati, salutaris: item diurnæ tussi, & urinæ difficili: menses pellit: contra serpentium morsus utilisinè datur in uino. Recens radix apposita partum extrahit. Puerperis eius decoctum in defensionibus prodest. In diapsmata utiliter inferitur iucundi odoris gratia. Folia, utpote quæ adstringant, capitis doloribus illitu profunt: oculorum inflammationibus, mammis tumētibus à partu, ægilopijs incipientibus, ignibusque sacris auxiliantur. Odor somnum gignit.

Baccharis cō  
sideratio.

And. Lacunæ  
literæ.

K after:





asper: radices nigro ueratro similes, quæ odore, & sapore imitantur exquisitissimum cinnamomum. Porro flores, quos per inclementiam temporis nunc mittere ad te non licet, in nonnullis locis purpurei, in alijs lutei uisuntur: ita ut huius stirpis esse duæ species uideantur, uel si meminerit unius tantum Dioscorides. Postremo huius plantæ uires, & facultates sunt omnino eadem, quas suæ Bacchari diuus tribuit Dioscorides. Hic amicus literis suis finem imposuit: Sed certè illud mihi permittum accessit, quod eadem die, & ferè hora, qua Baccharim Roma accepi, eandem Arimino ad me misit Iulius Moderatus diligentissimus pharmacopola, herbarumq; studiosus: id quod aperte testatur hortus eius apud herbarios Italiæ non uulgaris, ut qui sit uarijs ac nobilibus plantis refertus. Hanc sanè comperi nullis prorsus reclamantibus notis, Dioscoridis Baccharim representare. Nam præterquam quod constaret, ut illi folijs asperis, magnitudinem inter uiolam & uerbasum referentibus, caule anguloso, cubitali altitudine, aliquantulum aspero; habebat etiam in caule sua adnata folia, non coliculos. Hinc obier suspicor legendum esse *παπαῖδας*, non *παπαῖδας*, ut uulgati Græci codices habent: quandoquidem illi lectioni adstriplatur etiam Oribasii manu scriptus codex. Præterea flores, quibus illa carebat, huic in purpura candicabant, odorati. Eius denique radices erant ueratro nigro similes, & odore cinuamomo proximæ. Huius igitur plantæ delineatione, quæ adamante sim historia Dioscoridis respondet, ut eius quoque effigies, quam pictam damus, affabrè demonstrat, facile adducitur ut affirmare non dubitem, hanc esse ueram, & legitimam Baccharim. Ceterum Leoniceum, & Brasanolum ipsum secutus, eam plantam magno errore putarunt Baccharim esse, quam quidam Selaream, nonnulli uerò Martiensem appellant. Sed cion huius radices nō sint ueratro nigro similes, neq; minimum quidem odore cinnamomum imitentur, planè eorum sententia improbanda uidetur: præsertim quod ueram Baccharim eam esse censeamus, de qua superius differuimus. Non desuerunt etiam, qui crediderint, Baccharim Dioscoridi accreuisse, caputq; hoc adulteritium esse, eo fortasse argumento, quod eam hætenus inuenire non potuerint. quorum suspicionem augere potuit Galenus: quippe qui in simplicium censu de Bacchari quicquam, quod equidè legerim, memoriæ nō prodiderit. Vnde ij in eam sententiam deuenierunt, ut Baccharem eandem esse cum asaro certò putarent. Verum horum quoq; error iam omnibus euidentior factus est, quàm ut hîc à me explodi debeat. Neq; enim ea solum ratione proditur, quod pridem legitima Baccharis reperta sit; sed etiam quod legitimum hoc Dioscoridis caput esse cōprobet Oribasius, in quo illud ex Dioscoride transcriptum legitur. Quintianus idem confirmat Paulus Aeginetas, qui Baccharis meminit lib. vii. atque ea scribit, quæ facili, si conferantur, Dioscoridi accepta ferrentur: sic enim inquit. Baccharis odorata est herbæ, & re cinnamomo proxima, coronaria; aeris. Huius radices decoctum meatus obstructos aperit, urinam, & menses citat. Folia ipsius, cùm sint adstringentia, fluxionibus opitulantur. Huic herbæ nomen Græcum est *Βακχαρίς*, Latinum quoque Baccharis.

Leoniceum, &  
quorundam opi-  
reprobata.

Baccharis ui-  
res ex Paulo.  
Ex Mesue.

Nomina.

## Ruta.

## Cap. XLV.



RUTA montana, syluestrisque, satiuæ, & hortensæ acrior est, & in cibis damnata: satiuæ uerò, quæ sub ficu arbore enascitur, magis in cibos admittitur. Væraque urit, calfacit, exulcerat, urinam ciet, menstrua pellit, aluum sistit potu, ciboue. Lethalium medicamentorum antidotum est, si semen ex uino acetabuli mensura ebibatur. Folia per se præsumpta, aut cum nucibus iuglandibus; aridisque ficis, inefficaces uenendorum vires reddunt: contra serpentes simili modo sumere conuenit. Genituram cibo, potuue extinguit: cum anetho siccò decocta; tormina sedat. Facit ad pectoris, laterumque dolores, difficultatem spirandi, tussis, pulmonis inflammationem, coxendicum, articulorumque cruciatus, & horrores febrium circuitu repetentes, pota, ut antè dictum est. Item ad inflationes coli, vulux, rectique intestini cum oleo decocta, & infusa. Fœminas uulux strangulatu liberat, si à genitali sedetenus cum melle excutijciatur. Peruefacta ex oleo, & pota, uentris tincas excutit: articularijs doloribus ex melle, aquæ inter cutem cum ficis illinitur: eisdem in potu auxiliatur: decocta in uino ad dimidias partes, & oblita. Cruda, conditaq; cibo, uisus aciem excitat: dolores oculorū illita cum polenta lenit: doloribus capitis cum rosaceo, & aceto illita, auxiliatur: profluentem naribus sanguinem sistit: tuta, & indita. Testium inflammationibus cum myrro, folijs imposita, & eruptionibus papularum cum myrro, & cerato prodest: cum pipere autem, vino, & nigro affricata: albæ utiligini medetur: cum eisdem illita torminationes tollit, & uerrucas, quæ thymi florè reperiuntur.



contra impetigines cum alumine, & melle utilissimè imponitur. Succus in mali punici calyce calfactus, aurium dolori efficaciter infunditur. Idem oculis, qui hebetudinem sensere, cum fœniculi succo, ac melle inunctus, opitulatur. Ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, aut in capite manant, cum acetato, rosaceo, & cerussa illitus per sanat. mansa alliorum, ceparumque acrimoniam domat. Montana si copiosius estur, interficit. Dum florem promit, & ad murias colligitur, cutem inflat, & rubore quodam inficit, cum pruritu ac uehementi inflammatione. oportet itaque eam unctis antea manibus, & facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pullis insparsum, feles arcere. Adijciunt eam, quæ in Macedonia circa Haliacmon amnem prodeat, comedentes interimere. Montosus autem is locus, viperis scatet. Semen eius potum contra intestina uitia efficax est. In antidota commodè additur. Contra incontinentiam vrinæ tostum seipen septenis diebus potui datur. Radix huius montanum moly uocatur. Syluestris ruta satiuæ similis est. Prodest comitialibus, & coxendicum doloribus: menstrua mouet, partus enecat. Acrior est uiribus, quàm hortensis, & ualidior. Syluestris, ut pote noxia, cibis abdicatur.

**RUTA** utraque planta est uulgaris notitiæ, tam satiuæ inquam, quàm syluestris. Non tamen uelim de illa syluestri intelligas, de qua capite proximo differendum est, sed de ea tantum, cuius meminit Dioscorides in presenti capite, quàmque in eius calce satiuæ similem fecit: siquidem hæc ab illa plurimum differt. Nascitur hæc syluestris Ruta in Goritiensi agro copiosissima, adeo ut qui circumstant montes, ea ubique scateant; præsertimque Saluatius mons, qui eadem ferme uestitur. Facie hæc hortensi perquam similis est, graciliori tamen folio, & gustu acriori, amariorique. Id quod Monachorum in Mesuem scribentium (pace tamen eorum dixerim) ineptijs prorsus refragatur. quippe qui asserant nullam ferè esse differentiam inter hanc, & androsamum, siue hypericum, ut quæ in alterius locum substitui possint. Qua in re manifestè deprehenditur magna eorum inscitia: quandoquidem hic (ut equidem arbitror) in triplici uersantur errore. Primum quod existimauerint, turpi nimirum lapsu, syluestrem Rutam ab androsamo, & hyperico non dissidere. Deinde quod putauerint hallucinati etiam, androsamum, & hypericum unum & idem esse, cum tamen Dioscorides de his scorsum, tanquam de differentibus plantis tradiderit. Huc tertius accedit error, & is quidem, mea sententia, detestandus, quod prodiderint, hanc syluestris Rutæ historiam à Dioscoride descriptam reperiri, magnamque habere cum hyperico cognationem. Quod potius somniasse, quàm libero sensuum iudicio scripsisse uidentur Monachi, cum non huius Rutæ caput sit illud, in cuius fronte in quibusdam codicibus, ijsque non probatis, illa legantur, quæ doctissimorum testimonio hic ascripta, hyperici autem propria censentur; sed quod proximè sequitur, in quo alterius syluestris Rutæ, quam alij Moly, alij Harnabisa uero Besasan appellant, tractatur historia. Quare caueant pharmacopole, qui fortasse horum patrum scripta sequuntur, ne unà cæcutientes sæpe ducantur in uarios errorum labyrinthos. Seritur Ruta (ut auctor est Plinius lib. XIX. cap. VIII.) fauonio, & ab æquinoctio autumnii. Odit hyemem, & humorem, ac finum. Apriscis gaudet, & siccis, terraque; maximè lateritia: cinere uult nutriri, hic & semini miscetur, ut careat erucis. Subscit umbra libentius aquiescit: cuius rei causam suis in problematis reddidit Aristoteles. Mustela cum serpente dimicatura, in murium uenatu Rutam prius edendo se munit, quara hanc contra uenena pollere. Utuntur & ipsa hoc nostro tempore ad cacodæmones depellendos, fortasse quod contra fascinationes eam commendauerit Aristoteles in problematis. Planta Rutæ mirabilis magnitudinis uisa est (Flauo Iosepho auctore) Macherunt, quod olim fuit municipium Iudææ oppidum. Is enim lib. VII. cap. XXV. de bello Iudaico ita scriptum reliquit. Erat autè in ipsa regia Herodis temporibus perseuerasse: mansissetque; ulterius profecto, sed à Iudæis, qui locum ceperunt, excisa est. Rutæ syluestris, & satiuæ meminit Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Ruta agrestis ex quarto est ordine excofacientium: domestica uero ex tertio. Est autem non solum gustu acri; sed & amaro. Ex quo etiam sanè digerere, atque incidere crassos, lentosque humores potest. Ob eandem uim & urinas mouet. Quin & tenuium est partium, flatusque; extinguit. Quare ad inflationes competit, ac ueneris appetitum cohibet: digeritque, atque exiccat strenuè. Est enim eorum ex numero medicamentorum, quæ ualenter desiccant. Porro quod superius Moly, & Besasan nominari diximus, & ipsum utique fuerit ruta syluestris. *Ῥίζαν* Græcis herba est, quæ Latine, pariter & Italis Ruta nominatur: Mauritanis, Sadeb, seu Sedab: Germanis, Raut, & Vucin raut: Hispanis, Arruda: Gallis, Rue.

Rutæ confederatio.

Monachorum hallucinatio.

Rutæ uires, ex Galeno.

Nomina.

## Ruta Syluestris.

## Cap. XLVI.

**VOCANT** etiamnum syluestrem Rutam, quod in Cappadocia, & Galatia Asiæ finitima moly dicitur. Frutex est, qui ab una radice multos emittit cauliculos: folijs multo, quàm alterius rutæ longioribus, tenerioribusque, odore graui: flore candido: capitulis in cacumine paulò maioribus, quàm satiuæ rutæ, quæ tribus maximè partibus constant: in quibus triangulum semen, subrufum, gustu amarum recluditur. cuius est usus. Semen autumnio maturefcit. quod cum melle, vino, croco, & fœniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur contra retusam oculorum aciem. Sunt qui eam harmalam uocent, Syri besasan: qui Cappadociam incolunt, in moly, quoniam quandam cum moly seruet similitudinem: radice nigra, flore candido. In cellibus, & læto solo prouenit.



Rutæ sylue-  
stris alterius  
confid.

Seplafiariorū  
grauis error.

Fuch. lapsus,  
& Auicennæ  
defensio.

Quorundā  
error, & lo-  
cus Auerrois  
restitutus.

Rutæ sylue-  
stris alterius  
vires ex Gal.

Rutæ capra-  
rie mentio, &  
vires.

INVENIUNTUR ex Græcis codicibus Dioscoridis, item ex Latinis illorum fidem ad unguem secutis, qui uel maximo librariorum lapsu, uel potius eorum temeritate, qui nimis scioli uideri uolunt, plura de hac altera legio stri Ruta in capitis fronte scripta ostendunt, quæ doctissimorum quorumq; consensu adiectitia sunt, & hyperico aberra-  
tione debentur. Hæc deprauata, imò addititia lectione decepti quidam rerum, literarumq; parum gnari, turpiter aber-  
rarunt, certò credentes syluestrem hanc Rutam ab hyperico nihil differre. Quorum error simul deprehensus est,  
atque Dioscoridis lectio restituta à peritissimis uiris, qui rei discrimen exactissime nouerunt, & uetustissima Græci  
exemplaria consuluerunt, in quibus nihil tali offenderunt. quemadmodum neq; id sese offert lectitandum in Orbis  
codice manu scripto, herbarum descriptiones Dioscoridi acceptas referente. Quo fit, ut nullus amplius supersit am-  
bigendi locus, quin ea ascititia sint, & ex hyperico, cuius propria sunt, hic perperam repetita. Sed hæc iam missa  
faciamus, & constituamus duplicem esse sylvestris Rutæ speciem: unam domesticæ similem, de qua diximus in præ-  
cedenti capite: alteram uerò, de qua nunc agimus, quam quidam Harmalam uocant. Hanc, ut ingenue fatear, hæc  
ætenuis non uidi: non desunt tamen, qui eam demonstrare promittant in Italia, ac etiam iam ostendatur (ut audio) in  
publico horto Patauij. Quod non equidem negauerim, tamen si fuerit hæc peculiaris Cappadociæ, & Galatiæ plan-  
ta. Aphri corrupta à Græcis appellatione Harmel pro Harmala dicunt. Verum enim uero grauissimo errore du-  
cuntur seplafiarij, qui Luminis apothecariorum scripta secuti, huius Rutæ, siue Harmel loco, scetidæ, & aggre-  
gatiuis dictis catapotijs, alijsq; compositis medicamentis cicutæ semen admiscunt. Quod non solum suis tum qualita-  
tibus, tum facultatibus Harmalæ omnino repugnat; sed etiam uenenum lethale existit. Errandi causam præbuit Qui-  
ricus Augustus Tortorensis: quandoquidem is, ubi in conficiendis scetidæ catapotijs, quid sit Harmel explanare con-  
tendit, ait Syluatici Pandectarum auctoris testimonio, quod quotiescunq; reperitur Harmel cum aspiratione nil aliud  
apud Arabes designat, quam semen cicutæ: sine uerò afflatu, Rutæ sylvestris semen. Quod euident, ac execrandum  
est mendacium: siquidem Harmel tam afflatum, quam nudè scriptum Mauritanis perpetuò agrestem Rutæ significat,  
ut Serapionis, & Auicennæ auctoritate facile probari potest suis in libris, in quibus simplicium historias, et facultates  
posteritatis memoriæ prodiderunt. Nam quæ illi de Harmel scripserunt, Dioscoridi, & Galeno Rutam hanc descri-  
bentibus prorsus adstipulantur. Caterum Auicenna ipsius Harmel etiam meminit libro quarto sui Canonis, ubi uiperæ  
rarum morsus curationem tradens, sic inquit. Ruta sylvestris (& non est albarmel, secundum quod existimauerunt  
quidam, imò est species rutæ ipsius) confert morsibus uiperarum. hæc ille. Sed ne fortè quis Auicennam non rectè  
intelligens, in his uerbis decipiatur, ut suis in Paradoxis Fuchsum, uirum aliqui expertissimū, in Auicennam acriter  
agitem, deceptum fuisse deprehendimus, ut qui illum, ut puto, minus intellexerit, sciendum profectò est (quemadmodum  
etiam antea aliquoties retulimus, & nunc, quoniam ad rem faciat, id ipsum repetere non aliterum erit) quod non eius  
utiq; generis est sylvestris Ruta, de qua una cum domestica superius tradidit Dioscorides, & hæc, quam Græcorum  
quidam Harmalam, Mauritani uerò Harmel, siue Albarmel appellant. Ex hac omnibus perspicua Rutæ sylvestris dis-  
tinctione, quatum equidem reor, liquido patebit, Auicennam haudquaquam errasse, ut errorem immerito illi iniungit  
Fuchsus. Quippe eian inquit Auicenna, Ruta sylvestris (& non est albarmel, secundum quod existimauerunt quid-  
dam, imò est species rutæ ipsius) confert morsibus uiperarum, ijs uerbis declarat se illam hic syluestrem Rutam in-  
telligere, quæ domesticæ æmulatur: non autem illam, de qua hoc loco differit Dioscorides, quamq; sue Arabice sa-  
milæ auctores Harmel, siue Albarmel uocant. Eius tamen loco citato, paulò antè meminerat, sic inquit. Et de  
harmel est de medicinis liberantibus. Vbi per Albarmel eam sanè Rutam syluestrem intelligit, de qua præsens sermo  
est. ob cuius differentiam, postea alterius Rutæ sylvestris mentionem faciens, subiungit illa uerba, quæ iam bis cita-  
uimus. Ut hinc palam saceret, se non modò de alio sylvestris Rutæ genere intellexisse; sed etiam occurrisse, ne quis  
si sine distinctione locutus esset, se idem frustra repetisse calumniatur. Porro non desunt qui sustinere contendit,  
Harmel esse Cicutam, Auerroem in medium adducentes, quem lib. v. suarum collectanearum ita scriptum reliquisse  
uolunt. Harmel, id est Cicutæ, calida est, & sicca in tertio gradu, incidit crassos humores, & prouocat urinam, &  
menses, & ualet dolori scapularum, & purgat phlegma. Hæc isti nituntur auctoritate. Quibus ita facile respon-  
dendum, quòd cum Cicutæ hoc loco eas Auerroes tribuat facultates, quas etiam Harmalæ, nomine tamen Moly, reddi-  
dit Galenus, manifestè deprehenditur Auerrois codex librariorū incuria fuisse deprauatus. Neq; difficilis lapsus fuit,  
quòd ij uocum similitudine decepti Cicutam pro Ruta legerint, ac scripserint. Adde etiam illud (hoc enim medicorum  
neminem latet) quòd tantum abest, ut Cicutæ tertium caliditatis gradum obtineat, cui illam assignat deprauata Auer-  
rois lectio, ut ne primum quidem attingat, cum Dioscoridis, & Galeni testimonio, in quarto frigiditatis ordine collo-  
cetur: ob idq; eam lethale uenenum esse affirmant. Quapropter quam pessimè agatur ab ijs, qui Cicutæ formidanda  
semen ijs compositis medicamentis addunt, quorum usus est ad deiciendos, incidendos, extenuandosq; lentos humo-  
res, ij diiudicent, qui ueritatis studio dediti huiusmodi cauillationes, quæ sæpe hominibus perniciem pariunt, tolerare  
non possunt. Rutam hanc syluestrem appellat Galenus Moly lib. vii. simplicium medicamentorum, ubi de ea dis-  
serit his uerbis. Moly, hoc quidam uocant pegauon agrion, hoc est, Rutam syluestrem, nonnulli harmolan, Syri be-  
san, sicut Cappadoces moly, quia radicem habeat nigram, & florem lacteum. Vis eius tenuium est partium, & calida  
tertio abscessu: unde crassos humores secat, ac digerit, & urinam mouet. Hæc Galenus de altero Rutæ sylvestris ge-  
nere. Cui constat & primum sylvestris Rutæ genus perpulchrè respondere. Ex quo crediderim, quòd sine ullo er-  
rore seplafiarij alteram alterius loco subicere possint, quoties Arabum harmel in suis compositis medicamentis admi-  
scendum reperiunt. Est & alia Rutæ species, quæ recentioribus quibusdam CAPRARIA cognominatur, quibus-  
dam uerò Galega dicitur, nostrates eam uulgò appellant Lauanese. Passim hæc in scrobium aggeribus, humentibusq;  
locis prouenit, sceno græco persimilis. Magnificiunt ipsam uonnulli suis experimentis nixi non modò aduersus pesti-  
lentiam, & lethalia medicamenta; uerum etiam contra ferarum omnium, quæ dentibus, aut aculeo uenenum emittunt,  
tum



tum morsus, tum ictus: in quem usum herbam, uel eius succum bibendum præbent, ac etiam emplastri modo uulnera-  
tis partibus imponunt. Laudant aliqui succum sesquiuincie pondere haustum pueris comitali morbo uexatis. Cate-  
rum apertissime falluntur, qui putant Rutam hanc caprariam dictam Polemoniam esse, ut latius libro quarto suo lo-  
co dicemus. Quæ planta *ῥύανον ἄγριον* Græcè, *Ruta sylvestris* Latine dicitur: Arabicè, *Harmel*: Italicè, *Nomina*.  
*Ruta saluatica*.

## Moly.

## Cap. XLVII.

**MOLY**, folia habet graminis, latiora, humi sparsa: florem albæ uiolæ similem, sed minorem, ma-  
gnitudine uiolæ purpureæ æmulum, lactei coloris: caulem candidum, quaternum cubitorum: in cui-  
us cacumine inest aliquid, quod alli speciem referat. Radix parua, bulbosa, quæ mirum in modum  
ualet ad uulnæ apertiones, si trita cum irino unguento, in pello subijciatur.

**MOLY**, ut scriptum reliquit Theophrastus libro IX. cap. XV. de plantarum historia, apud Pheneum exit, atq; Moly histor.  
apud Cyllenam esse (quemadmodum Homerus dixit) affirmant: radice rotunda, non absimili cepæ, folio scillæ. Vsum ex Theophr.  
eius contra ueneficia summa: non tamen effodi difficulter, ut ait Homerus. Moly quoque meminit Plinius lib. XXV. & Plinio.  
cap. IIII. ita scribens. Laudatissima herbarum est, Homero teste, quam uocari à dijs putant Moly. Ast inuentionem  
eius Mercurio assignat, contraq; summa ueneficia demonstrat. Nasci eam hodie circa Pheneum, & in Cyllene Arcæ  
die tradunt, specie illa Homerica, radice rotunda, nigraq; magnitudine cepæ, folio scillæ: effodi autem difficulter.

Græci auctores folium eius luteum pinxere, cum Homerus candidum scripserit. Inueni e peritis herbarum medicis,  
qui & in Italia nasci eam dicerent, afferriq; Campania mihi aliquot diebus effossant inter difficultates saxæ, radices  
triginta pedes longæ, ac ne sic quidem solidæ, sed abruptæ. hæc Plinius. Ex cuius sanè uerbis facile cognosci potest,  
Moly ab eo secundo loco redditum, quod in Campania effossim, & sibi allatū scribit, ab illo plurimum disidere, quod

Homerus, & Dioscorides notis non planè consentientibus representarunt. Moly, cui Dioscoridis delineatio respon-

deat, hætenus in Italia reperire non potui, neq; ab alijs inibi repertum, aut aliunde aduectum scio. Caterum her- Moly uires  
bam Moly Dioscoridi appellatam, eandem nimirum esse putauerim cum illa, quæ Galeno lib. VII. simpl. medic. Myle ex Galeno.

uocatur, cum inquit. Myles radix paruo bulbo similis est, facultatis contrahentis. nam cum farina ærina, (hoc est  
folij) apposita apertam uulnam sanare scribit Dioscorides. His uerbis Galenus non solum quidem Myle suam Dio-

scoridis Moly acceptam refert: sed etiam nos commonet mendi cuiusdā, quod hucusq; latuit in codicibus Græcis Dio-  
scoridis. Quippe quod ubi in huius capitis calce legitur *μετὰ ἱρίνου μύρου*, quod est, cum irino unguento, Galeni

testimonio, legendum sit *μετὰ αἰρίνου ἀλδύρου*, id est, cum farina loliacea. Et certè in id uitium facile librarij qua-  
dam scripturarum uicinitate labi potuerunt. Sed addamus ratio-

nem, quæ uulgaris lectio deprauata manifestè deprehendetur. Nam si unguentum irinum efficaciter aperit, non uideo quid Mo-  
ly radix cum eo præstare possit *πρὸς ὑστέρας ἀναστομώσεως*, hoc

est, ad uulnæ apertiones. Sic enim ex Græco rectius reddendum  
puto, quàm ad aperiedas uulnas, ut uerterunt Marcellus & Ruel-

lius. qui tamen secus facere non poterant, si unguenti irini ratio-  
nem habere uolebant. Id *μῶλον* Græci dicunt, quod Latini item Moly.

**PANACES HERACLEVM.** **Cap. XLVIII.**

**PANACES** nonnullis Heracleum dicitur: ex quo  
opopanax colligi solet. Plurimum in Bæotia, & in Pho-

cide Arcadiæ nascitur: ibique compendij, & quæstus,  
qui ex eo liquore factitatur, gratia, studiosè colitur. Fo-

lijs est asperis, in terra iacentibus, herbacei coloris, mul-  
tūm ad ficulnea accedentibus, in ambitu quinqueparti-

tō diuisis: caule, ut ferulæ, altissimo, qui lanugine qua-  
dam incanescit, folijs etiam minutoribus oblitus: mu-

scarij, ceu anethi, in cacumine: flore luteo, & semine o-  
dorato, feruenteque. Radices habet multas ab origine

una, candidas, graueolentes, crassi corticis, & subamari  
gustus. Nascitur in Cyrene Libyæ, & Macedonia. Ex-

cipitur succus incisa radice, recenti caulium pullulatu.  
Ea candidum succum emittit, qui siccatus in summa cu-

te croceum colorem contrahit. Effluentem autem succū  
excipiunt, folij excauato solo stratis, quæ siccata tollun-

tur. Simili modo caule melisibus inciso, profluentem suc-  
cum eximunt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, di-

stantæque,





stentæque, sicæ, quæ cariem non sentiant, aromaticæ, feruentes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maxime in hoc succi genera probatur, quàm amarissimus, internè albus, aut subfulvus, foris ad croci colorem inclinans, levis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquescent, graui odore. Niger improbat, ac mollis. Adulteratur ammoniaco, aut cera. Sed sinceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluatur, & lactescat.

Excalfacit, mollit, extenuat: horroribus febrium, circuitibusque, vulsis, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio urinæ conuenit. Contra vesicæ scabiem ex aqua mulsâ, aut uino bibitur: menses trahit, foetum enecat. Inflationes, quæ uulnam male habent, duritiasque, ex melle dilutus, discutit: ischiadicis illinitur. acopis, & capitis medicaminibus admiscetur: carbunculos rumpit. Podagricis, cum uua passa illitus subuenit: dolore dentium liberat, cauis inditus: oculorum aciem illitu excitat. Ex eo, & pice optimum fit emplastrum contra bestiarum morsus, quæ in rabiem efferantur. Radix in ramenta confecta, vuluæ admodum, partus extrahit: ad uetera ulcera efficax est. nudata ossa corpore operit, si trita cum melle illinatur. Semen cum absinthio sumptum, menses pellit: cum aristolochia, prodest aduersus animalia, quæ venenum eiulantur: & contra vuluæ strangulatus in uino bibitur.

### Panaces asclepium.

### Cap. XLIX.

PANACES Asclepij caulem à solo emittit tenuem, cubitalem, geniculatum: circa quem folia funduntur: in niculo similia, maiora tamen, & hirsutiora, odorata: in cacumine umbella, ubi flores emicant aurei, acris gustus, & odorati. radix parua est, & tenuis. Auxiliarem vim habet flores, & semina, contra vlcera, phagedænas, & tubercula, si trita cum melle imponantur. aduersus serpentes ex uino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui panaces sylvestre origanum vocant, alij cunilam, de qua in origani mentione diximus.

### Panaces chironium.

### Cap. L.

PANACES Chironium in Pelio monte maxime prouenit. folium eius amaraco simile: flos aureus: radix parua, quæ non altè demittitur, gustu acris. Potest radix serpentium ueneno resistit. Illita coma, eadem præstat.

PANACES Heracleum in Apulia frequens nascitur, quæ admodum in Apennini iugis, & in Argentario promontorio in nostris maritimis Senensibus. Habetur & in quàm plurimis Italiæ uiridarijs, ubi summa diligentia colitur ab his, qui simplicium medicamentorum studiosi, ad suum aliorumque commodum innumera plantarum genera suis in hortis, ac uiridarijs serunt, ac colunt. Verum non ob id affirmauerim, eius lacrymam, quam officina Opoponacum uocant, excipi in Italia. Nam quæ Venetijs uenalis reperitur, ex Alexandria Aegypti conuehitur. Legitima non desit, utpote excolens, emolliens, & digerens: ponatque ipsum quispiam in calfaciendo tertij ordinis, in desiccando uero secundi.



Panaces consideratio.

Mes. lapsus.

et si adulterata frequentior sit usus apud eos, qui ex quauis herba manipulos colligunt. In Panacis historia aperte-  
tissime aberrauit Mesues: quippe qui initio capitis omnia eius genera confundat. Quod omnibus iam notius est, quàm  
ut à nobis ostendi debeat. Panaces Asclepium nuper uidimus, eiusque effigiem hic appinximus. Sed Chironium non  
prouenit, quod sciam, in Italia. Quanquam non desunt, qui pro Chironio panace ostendant plantam, quæ folium ha-  
bet oblongum, hyssopi fere modo: florem pentaphylli, sed maiorem, aureo tamè colore: surculos numerosos, tenues,  
lignososque: radicem item lignosam, rufescentem, gustu adstringentem. Verum quòd Dioscorides panaci Chironio tri-  
buerit folia amaraco similia, & radicem gustu acrem, non uideo quomodo ingenuè possim eorum sententiæ subscribere.  
Panacis genera ab inuentoribus cognominari tradunt. nempe Asclepium ab Aesculapio, Chironium à Chirone, &  
Heracleum ab Hercule: quare & Herculeum à plerisque est appellatum, cuius tantum lacryma hoc tempore officina  
utuntur. Semen enim, ac radix, etsi in pluribus ualeant affectibus: ad nos tamen, quod uiderim, non adferuntur.  
quorum defectu optime chirurgi, cum denudata ossa carne explere uolunt, radicem segmenta, quæ lacrymæ compa-  
cta reperiuntur, quæque illa sint, non paruo labore seligunt, & ad hunc usum in puluerem redigunt. Panacis uires  
descripsit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, his uerbis. Panaces Heracleum, inquit, ex hoc fi-  
uocatus Opopanax, radicibus eius, & caulibus excisis. Porro opopanax ipse longe est ad plurimos usus aptissimus  
utpote excolens, emolliens, & digerens: ponatque ipsum quispiam in calfaciendo tertij ordinis, in desiccando uero

Panacis uires  
ex Galeno, &  
Mesue.



secundi. Cortex radicis exicatorium simul, & excafactorium est medicamentum: sed minus quam succus. quin & nonnullam habet abstergendi facultatem. Quare eo quoq; utimur & ad ossa denudata, & ad ulcera maligna, & con-  
tumacia. Sufficiens enim talia carnem procreant, scilicet abstergendo simul, & desiccando, nec ita magnopere  
calfaciendo: quæ omnia ad carnem generando necessaria sunt, uelut in libris de curandi ratione ostendimus. Fru-  
tus calidus & ipse est, ac mensibus moriendis medicamen accommodum. Ceterum nescio, quo pacto nunc ferè omnes  
ex more non panaces, sed panacea herbam hanc uocitent. Panaces autem Asclepium minus est calidum supra dicto pa-  
nace: quamobrem eo, & floribus eius, & semine melli mistis ad ulcera, phymata, & phagedænas utuntur. Pana-  
ces uerò Chironium & ipsum similem prædicto facultatem possidet. hæc Galenus. Porro deijcit Panacis lacryma  
(ut auctor est Mesues) à remotis corporis partibus, præsertimq; ab articulorum compaginibus, lentam, crassam, con-  
tumacemq; pituitam. Cerebrum, & neruos expurgat, præcipue cum frigidis torquentur morbis. *πανάξες* nō pá-  
naces sic Græcis, ut etiam Latinis Panaces Heracleum, nominatur: Arabibus, *Steusir*, Ieusir, siue *Giausir*: Italis  
Panace Heracleo. Huius gummi Græcis *ο ποπάναξ* dicitur: Latinis item Opopanax: Italis, Opoponaco: Hispanis,  
Opoponaque. *πανάξες* uerò *δ σκληρότερον* sic Græcè uocatur, ut Latine similiter Panaces Asclepium: Ara-  
bicè: *Panax Aschilibet*: Italicè, Panace Asclepio. *πανάξες* denique *χρησάμενον* ita Græcis, Latinis pariter Pana-  
ces Chironium appellant: Mauritanis, Panax caromon: Italis, Panace Chironio.

Nomina.

## Ligusticum.

## Cap. LI.



LIGUSTICVM, quod alij panaceam, alij pana-  
ces uocant, plurimum in Liguria nascitur, in monte A-  
pennino Alpibus contermino: unde nomen traxit. Pa-  
naces incolæ non ab re appellant, quoniam & radice, &  
caule Heracleotico panaci simile sit, & uiribus eisdè præ-  
ditum. Gignitur in altissimis, asperisque montibus, ac  
umbrosis, maximè iuxta fluentia. Cauliculum fert ana-  
thi, geniculatum, tenue, & in circuitu folia fertula  
Campanæ, molliora, odorata, prope uerticem gracilio-  
ra, & longè magis diuisa: in cacumine muscarium, in  
quo semen dependet nigrum, solidum, & oblongum,  
fœniculo proximum, gustanti acre, & aroma olens: ra-  
dix candida, Heracleotici panacis similis, odorata. Ra-  
dicis, feminisque uis excafactoria, concoquens. Pro-  
dest ad intest. no. dolores, tumores, concoctiones, item  
ad inflationes, præsertim quibus stomachus turgat: &  
contra serpentium ictus: urinas, & menses potu trahit.  
Eisdem præstat effectus apposita radix. Semen cum ra-  
dice oxyporis, & medicamentis decoquentibus admi-  
scetur. ori perquam utile: quare pro pipere utuntur eo  
indigenæ ad obsonia. Adulteratur semine quodam simi-  
li: quod facilè gustu discernitur: amarum enim est. Alij  
semen fœniculi, aut seselis admiscentes, ligusticum do-  
lo uitiant.

FALLVNTVR aperte, ut mea quidem fert opinio, qui  
herbam uulgò hodie Leuisticum uocinam, quam legitimum hip-  
poselinum censemus, putant esse Ligusticum hic à Dioscoride re-  
præsentatum, quod Galenus unius literæ mutatione Libysticum  
appellauit. Siquidem hoc caule assurgit tenui, & folijs fertulæ Campanæ similibus. Illud uerò caulem profert altum,  
crassum, concauum, & geniculatum: folia apij palustris æmula, maiora tamen, ac etiam crassiora. Ceterum quan-  
tum proueniat, sitq; inibi adeo uulgaris notitiæ, ut eius semine passim utantur incolæ in ciborum condimentis; non ob-  
stantem per cætera Italia loca hætenus, quod sciam, deferri cœpit. Nascitur in Ananienfibus montibus, quin &  
in Goritiensibus. Venetijs etiam uideri potest in borto Maphei medici clarissimi. Galenus de Libystico differens li-  
bro VII. simplicium medicamentorum, sic breuiter inquit. Libystici radix, & semen ex genere excafacientiū sunt,  
adeo ut menses cieant, & urinas pronocent, flatusq; discutiant. Quod Græci *λυβυστικόν*, Latini similiter Ligusti-  
cum, & Libysticum dicunt: Itali, Ligustico.

In Ligustico  
quorundam  
error.Libystici ui-  
res ex Gal.

Nomina.

## Pastinaca.

## Cap. LII.

PASTINACA syluestris folia gingidij habet, latiora, subamata: caulem rectum, scabrum: um-  
bellam similem anethi: in qua flores insunt candidi, & in medio purpureum quiddam, ferme croceum.  
radix digiti crassitudine, diodrantis, odorata, quæ cocta manditur. Semen potum, uel impositum,  
menstrua



## PASTINACA SATIVA.

## PASTINACA SYLVESTRIS.



CAROTÆ.



Pastinacæ cō  
sideratio.

Ruellij erra-  
tum.

Quorundam  
error.

menstrua mouet. Iis conuenit in potione, quos vine  
di ficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut li-  
qua cutem subiit: serpentium moribus, ictibusque pro-  
dest. præsumentes id, nulla affici iniuria à serpentibus  
traduntur: conceptus adiuuat. Radix urinam pellit, ve-  
nerem stimulat, partus apposita eiecit. Folia tria, & cum  
melle imposita, phagedænas ulcerum purgant. Satia  
ad eadem pollet, inefficacior tamen, & cibo aptior.

VULGARES admodum sunt in Italia tam sativæ, quam  
sylvestris Pastinacæ radices, ut quæ passim quadragesimalis ieiun-  
ij tempore non ingratis in ciborum usum recipiantur. Ceterum  
quoniam fortassis in Gallia non feruntur in hortis, Ruellius man-  
festo errore putauit, Carotas nobis uulgo uocatas, quas cōstat, sa-  
le, oleo, & aceto additis, hyeme usurpamus in acetarijs, ut  
esse Pastinacas. Ut hinc maxime admirari subeat Ruellium, qui  
rū alioqui doctissimum. Siquidem hætenus neminem inueni  
herbariæ scriptoribus tam Græcæ, quam Arabicæ familiæ, qui  
memoria prodiderit, Pastinacam satiuam radice niti aded rursus  
ut sanguineo succo maceat, qualis Carotæ dictæ inesse deprehē-  
ditur. Satia in Italia frequentissima feritur in hortis. Errata  
uero nonnunquam in campis ac incultis sua sponte nascitur. Vix  
que albicantibus cōstat radicibus, quæ in locis quam plurimis co-  
ctæ manduntur. namque eæ in quadragesimo præsertim ieiunio co-  
farina, & oleo fringuntur, & ita sepe, ubi desunt pisces, eorum ui-  
cem supplēt: licet pro ieiunantium instituto, essent porius coru-  
cibus abdicandæ: uenerem enim non obscure stimulant. Fallun-  
tur præterea, qui Dauci loco, agrestis Pastinacæ semen accipiūt,  
illius scilicet, in cuius florentis umbellæ medio exiguum quid pur-  
purei emicat. Aliud enim est à Pastinaca erratica Daucus, ut pau-  
lò inferius suo loco dicitur, ubi eius tres species à Dioscoride red-  
duntur.



duntur. Nam quauis tam ex illius, quam Galeni sententia libris tum de simplicium medicamentorum, tum de alimentorum facultatibus, Daucus à sylvestri Pastinaca parum, uel potius nihil uiribus differat, ob idq; alterum alterius uice in medicina usu capi possit; non tamen recte dici potest, Daucum erraticam esse Pastinacam. Pastinacæ meminit Galenus libro viii. simplicium medicamentorum, sic inquit. 'Pastinaca sativa imbecillior: agrestis ad omnia potentior est. Vrinæ mouet, & menses prouocat cum herba quidem tota, tum maxime semen, ac radix. Habet porro etiam abstersorium in se quippiam: quonobrem ulcera phagedænica quidam folijs eius uiridibus cum melle, quod pura reddant, illinunt. Planta, quæ Græcè σαυλίσκος, Latine, pariter & Italice Pastinaca uocatur: Arabicè, Iezar, Gezar, seu Giezar: Germanicè, Pasteney, & Pastinachen: Hispanicè, Canaoria blanqua: Gallicè, Pastenades.

Pastinacæ uices ex Gal.

Nomina.

## SESELI MASSILIENSE.

## SESELI AETHIOPICVM



Sefeli.



Cap. LIII.

SESELI Massiliense folia fœniculi habet, crassiora: caulem uegetiorem: umbellam anethi, in qua semen oblongum, angulosum, degustanti statim acre: radix longa est, iucundi odoris. Semen, & radix exsiccandi uim habent. Potu stranguriæ, & orthopnœæ medentur: suffocationibus muherum, comitialibusque profunt: menses, & partus trahunt: ad omnia interna mala pollent: tussim ueterem sanant. Semen cum uino potum, concoquit, & tormina discutit: epialis febribus utile. Contra perfrictiones in itineribus, cum pipere, & uino bibitur. Capris, cæterisque pecudibus datur in potu, quò facilius suos fœtus enitantur. Aethiopicum seseli, folia habet hederæ, minora. & ad pediculi modum oblonga. frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis: ramis sesquipedalibus: capitulo anethi: semine in tritici morem denso, nigro, amaro, Massilensi odoratiore, & acriore, multum suauis. Peloponnense folia habet cicutæ, latiora, & crassiora: caulem supra Massiliense magnitudinem, ferulaceum: & latius in cacumine umbellam, in qua semen latius, odoratum, & carnosius pendet. Eisdem uiribus præditum est. Nascitur in alperis, riguis, & collibus. inuenitur etiam in insulis.

## Creticum Sefeli.

## Cap. LIIII.

TORDYLIVM, quod aliqui Creticum seseli uocant, iuxta Ciliciam in Amano monte nascitur, herbula surculosa, semine duplici, rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra urinæ difficultatem bibitur: potu cit menses. Succo seminis, caulisque uirentis, ternis obolis ex passo decem diebus haulto, renes sanantur. Efficax est radix ad ciendas pectoris excreationes, in delinctum cum melle.

SESELI



## SESELI PELOPONNENSE.

Seseli conf.  
deratio.Seseli vires  
ex Galeno.

Nomina.

ANISVM.

Sison semen  
incognitum.

Nomina.

SESELI Arabibus Sisileos dicitur. Officinæ uerò id Siler montanum appellant. Legitimum Seseli Massiliense in omnibus frè Tridētini montibus legitur. Sed maxime animaduertendum est, quod quanquam in quibusdam Italiae pharmacopolijs, uerum sit reperire Seseli; inquam plurimis tamen quoddam semen Seselis uicem explens uenditur, quod nulli prorsus Seseli à Dioscoride descripto respondet: quippe quod amaritudine tantum sit praeditum, & olfactui cinicum foetorem representet. Porro Seseli Aethiopicum, ac Peloponense, quæ prius in Italia non uiderantur, hoc anno à me, ut spero, reperta sunt. Ceterum aliquando credidimus, Tordylium, siue Creticum Seseli in quodam nostro hortulo natum esse, quod eius semen (ita enim aiebant) è Patuino simplicium uiridario allatum, terræ commississem. Verum cum postea accuratius eius faciem contemplatus essem, itemq; saporem examinasset, id à legitimo longè admodum disidere cognoui. Seselis monstratio prima assignatur ceruis foeminis. Siquidem tradit Aristoteles lib. IX. cap. V. de historia animalium, ceruas statim à partu Seselium herbam petere, & cum eam ederint ad prolium redire. Seseli omne genus in uniuersum memoria prodidit Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum, ubi ita scribit. Seseli & radix, atq; etiam semen usque adeò excalfacit, ut admodum urinam mouere queat. Sed & medicamentum est tenuium partium, ut & comitali morbo, & orthopnoæ competat. Quæ herba Græcis σίσυον, Latinis, ut etiam Italis Seseli nuncupatur: Arabibus, Sisalios; Barbaris, Sisileos; Germanis, Steinbrechi; Gallis, Sermontain.

Sison.

Cap. LV.

SISON exiguum semen est, in Syria natum, apio simile, oblongum, nigrum, feruentis naturæ. Contra lienis uitia bibitur: urinæ difficultatem potu emendat, remoratos menses citat. Eo in condimentis, cum cucurbita, & aceto indigenæ utuntur. In cacumine granula multa gerit.

SISON, ut hic Dioscorides testatum reliquit, semen est in Syria proueniens, nobisq; incognitum: quandoquidem plantam, quæ illud profert, apud ullum auctorem suis notis descriptam non inuenio: nec semen ipsum, quod equidem sciam, ad nos è Syria deferretur. Quapropter illius patriæ gentibus relinquendam duximus, ubi eius notitia, & seminis usus. Nam præterquam quod difficile sit, etiam periculosum iudico, de rebus peregrinis, quarum delineationes latent, aliquam proferre sententiam. Id uero Græcè dicitur, quod Latine quoq; Sison.

Anisum.

Cap. LVI.

ANISVM in summa excalfacit, exiccat. oris halitum iucundiores facit, doloris leuamentum præstat. Urinam ciet, discutiendi uim habet hydropicis potum sitim extinguit. Animalium uenenis aduersatur: ualeet ad inflationes: aluum, & alba foeminarum profluvia sistit: lac ad mammas elicit: uenerem stimulat. dolores capitis leuat, suffitum naribus. cum rosaceo tritum, instillatumque fractis auribus medetur. Melius semper recens, plenum, non fursurosum, odore præstans. Inter prima laudatum est Creticum, proximo loco Aegyptium.

ANISVM



## CARVM.



ANISVM vulgaris omnibus frè notitiæ planta est, nihilq; fecius uulgò eius semen notum. Quamobrem longiori sermone eius historiam prosequi non operæpretium duximus. Ceterùm ut nostrum sequamur institutũ, non sunt à nobis silentio prætereunda, quæ de eius uiribus scriptis tradidit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Anisi semen maximè utile est, acre, subamarum, ut propè ad urentium accedat caliditatem. Est autem & in siccando tertij ordinis, sicut & in calefaciendo. Proinde & urinam ciet, & digerit, atque etiam uentris inflationes sedat. Planta, quæ Græcis ἀνισον, Latinis item Anisum appellatur: Mauritanis, Aneisum, seu Auexissum: Italis, Aniso: Germanis, Anisx, & Enisx: Hispanis, Matabalua, & Yerua dulce: Gallis, Anis.

Anisi confideratio, & vires ex Galeno.

Nomina.

## Carum.

## Cap. LVII.

CARVM, semen est uulgaris notitiæ. Excalfacit: urinam concitat, stomacho utile, os commendat, concoctionem adiuuat. Vtiliter miscetur antidotis, & oxyporis. anisi uicem præbet. Radix cocta, pastinacæ modo, manditur.

CARVM officinis uulgò Carui dicitur. semen omnibus notissimum. Planta nascitur in pratis, et collibus. Semen passim Germani panis suo subigunt, ciborumq; condimentis indunt, quemadmodum nos anisum, & fœniculum. Sed maximè, meo quidem iudicio, redarguendi sunt Monachi illi, qui in Mesuem commentarios ediderunt: quippe qui non sine magno, & aperto errore crediderint, Carum semen esse rubentis illius radicis, quæ uulgò Carota uocatur. Quandoquidem Carotarum semini nulla Cari qualitas inest: id enim adeo acre non est, ut tertio calfacientium, ac exiccantium ordini adscribi possit. Quod tanè de Caro testatur Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, sic scribens. Cari semen calfacit, & exiccat tertio quodammodo ordine, moderatè acrem qualitatem possidens. Itaq; & status extinguit, & urinas ciet, non semen tantum; sed & planta. Cuius nomen Græcum est ἀνισον: Latinum, Carum: Arabicum, Caruia, Karauia, seu Karui: Italicum, Caro: Germanicum, Mattkumich, & Kim: Hispanicum, Alcarauca: Gallicum, Carui.


Cari confideratio.

Monachorũ error.

Cari vires ex Galeno.

Nomina.

## ANETHVM.



## Anethum.

## Cap. LVIII.

ARIDI Anethi comæ, seminisque decoctum, potu lac euocat: inflationes, & tormina sedat: aluum, vomitionesque sistit: urinas ciet, singultus lenit. oculorum aciem hebetat, genituram restinguit, assidue potum. Decoctum eius sceminis vuluæ malo opportunis, ad defensiones utile. Condylomata illitus seminis cremati cinis tollit.

ANETHVM hortis omnibus frequentissimum, omni adeo ex parte fœniculum æmulatur, ut sæpius colligentes fallat, nisi gustum consulant. Ceterùm Anethum, ut auctor est Galenus lib. VI. de simplicium medicamentorum facultatibus, adeo excalfacit, ut habendum sit aut secundi ordinis intensè, aut tertij remissi. Exiccantium uerò ordinis est secundi incipientis, aut primi finientis. Itaq; merito in oleo decoctum digerit, dolorem sedat, sonnũ conciliat, & crudos, & incoctos humores concoquit. Fit enim ex eo oleum, cuius propinqua sit tẽperies pus mouentibus, et concoquentibus uocatis medicamentis: nisi quatenus paulò illis tum calidius, tum tenuiorum partium est, ac proinde digerendi facultate

Anethi cõsideratio, & vires ex Gal.



Nomina.

te præditum. Vstum autem tertij ordinis tum excalfacientium, tum desiccantium fit: & propterea ulceribus nimis humidis, mollibusq; prodest, potissimum ijs, quæ in pudendis cõsistunt. At quæ in præputio sunt inueterata, ea probe cicatrice includit. Cæterum uiride humidius est, & minus calidum: itaq; magis quam siccum concoquit, & somnum conciliat, sed minus digerit. Ideirco mihi uidentur ueteres in conuiuijs usi esse coronis ex eo concinnatis. Plantæ quæ Græcis ἀνέθον, Latinis item Anethum appellatur: Mauritanis, Xebet, Iebet, siue Sebet: Italis, Anetho: Germanis, Dyllen, & Hochkraut; Hispanis, Eneldo: Gallis, Anet.

## CUMINVM SATIVM.



Cuminum satium.

## CUMINVM SYL. ALTERVM.



Cap. LIX.

CUMINVM satium origatum est, sed multò magis Aethiopicum, quod Hippocrates regium appellauit. Secundum locum tenet Aegyptium. reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Terentia, & plerisq; alijs tractibus. Excalfacit, adstringit, exiccat. ad tormina, inflationesq; conuenit, coctum, & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. orthopnoicis datur in posca: demorsis à serpente, in vino. testium collectionibus auxiliatur, impositum cum uua passa, aut lolij farina, ceratoue: mensium abundantiam inhibet. Contritum autem in aceto, & naribus obiectum sanguinis profliuia sistit. Colorem bibentium, aut perunctorum mutat in pallorem.

## Cuminum sylvestre.

## Cap. LX.

SYLVESTRE Cuminum, plurimum, efficaciusque in Lycia, & Galatia Asiæ, atque Carthagine Hispaniæ gignitur: frutice paruo, dodrantali caule, ac tenui: quaternis, aut quinis folijs, tenuibus, ueluti ferratis, & gingidij diuisura. In cacumine capitula quina, aut sena habet, mollia, rotunda: in quibus est semen acerosum, gustu satiuo acriore. nascitur in collibus. Bibitur semen ex aqua, aduersus tormina, inflationesque: item contra venenatas bestias ex uino. Singultus ex aceto sedat: stomacho utile, quem humor uexat. Sugillata tollit, si manducatum cum melle, & uua passa illinatur: testium inflammationibus, adiectis eisdem, illitum medetur. Est & aliud sylvestris Cumini genus, facilius non dissimile, quod à singulis floribus elata promit cornicula, in quibus semen est melancholicum simile. Quod potum omnium serpentium moribus præsidio est. Calculosis, & ijs, qui urinæ stillicidio uexantur, aut concretum sanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur. sed apij semen seruetur: postea bibendum est.

SATIVM



**SATIVVM** Cuminum omnibus notum est. Sed an sylvestre, idq; præsertim, quod primo generi à Dioscoride assignatur, in Italia proveniat, ego quidem affirmare non auctum: quod nec illud uiderim, aut repererim unquam, neque præterea ab alijs repertum, uel ex Lycia, Galatia, & Hispania allatum audiuerim. Quod uero secundo ascribitur generi, si in Italia gignitur, id equidem cum Ruellio, & Gesniero, uiris doctissimis, eam plantam esse putauerim, quæ Germani uulgò Ritterstorn, hoc est, Equitis calcar, & Consolidam regalem uocant. Quandoquidem planta hæc nascitur in segetibus. Caulē profert simplicem, ramulis multis, tenuibus, longis, diuisis, sylvestris nigellæ modo. Flores edit purpureos, nigra uiolæ æmulus: ex altera quorum parte prodeunt cornicula sursum spectantia, quæ ueterum calcaris formam exprimere uidentur: unde & illi nomen à Germanis inditum. Semen fert melanthio simile in paruis corniculis conclusum. Vt ex hac descriptione existimem, uix aliam reperiri posse plantam, quæ magis, quam hæc, potest Cuminum genus refrat. Caterum Monachi illi reuerendi, qui in Mesuem scripsere, flani coloris Melanthium, quod officine Nigellam citrinam uocant, primum sylvestris Cuminum genus esse contendunt. Sed ij, mea quidem sententia, in magno & aperto errore uersantur. Nam, ut unusquisq; sanæ mentis per se cognoscere potest, Nigella citrina sic seplasiarijs uocata, nil aliud unquam fuerit, quam flauo coloris Melanthium: cum omnibus palam sit, non in alio Nigellam hæc, & Melanthium inter se specie differre, quam in seminis colore: cætera namq; in forma, magnitudine, sapore, ac omni deniq; facultate illis maximè consentiunt. Sed quid multa? nonne hoc idem in papauerum semine quotidie comperimus? in quibus tamen uariis seminis color nō prohibet, quin omnia sint papauera. Id quod etiā perspicuum est, in hyoscyamo, lactuca, & alijs pluribus plantis: quarum semina etsi alba & nigra inueniantur, non tamen aliud ab illis plantæ genus constituunt. Hinc fit, ut in huiusce sylvestris Cuminum historia patres illi, et qui eos sequuntur, planè hallucinari deprehendantur. Quippe primi generis sylvestris Cuminum semen in capitulis mollibus, ac rotundis acerosum gignitur, fortasse (ut opinor) uulgaris pimpinellæ modo, non autem in capitulis melanthij instar, durum, solidum, fractuq; contumax, quod in pimpinella uulgò uocata non uisitur. Satiuum folijs ferè fœniculum representat: unico exit caule, pluribus adnatis ramusculis: floret in umbella, ueluti fœniculum, in qua copiosum profert semē: radix ei albicans est, summo cespite repens. Tractu gaudet calido, & putrescibili: quanobrem frequentissimum in maritimis nascitur. Cuminum uires scriptas reliquit Galenus lib. vii. simp. medic. sic inquit. Cuminum semine potissimum utitur, quemadmodum anisi, ligustici, cari, & petroselinii. Est autem & facultatis excofacientis, sicut illorum unumquodq; tum urinam mouentis, & flatum discentientis: ex tertio ordine excofacientium. *κύνινον ἴππερον* Nomina. *κύνινον* Cuminum & Cuminum satiuum Latinis dicitur: Italis, Cumino domestico: Arabibus, Camum, seu Kemon: Germanis, Kimmel: Hispanis, Comino: Gallis, Comin. Quod uero Græci *κύνινον ἄγριον*, Latini Cuminum sylvestre nominant: Itali, Cimino saluatico.

Cumini consideratio.

Monachorum error.

Cumini uires ex Gal.

Nomina.

## Ammi.

## Cap. LXI.

**AMMI** Aethiopicum cuminum appellant. Plerique hoc natura diuersum esse ab illo existimant. Vulgò notū est, semen exile, multò minus cumino, organū respiciens. Eligendum est purum, minimè furfurosum. Vis ei excofactoria, feruens, & exiccans. Facit ad tormina, urinæ difficultatem, serpentium ictus, cum uino potum: mentis ciet. Miscetur derodentibus cantharidum medicamentis, quæ ecdoria uocant, ut inde exortis urinæ difficultatibus resistat. Sugillata cum melle tollit. Colorem potui, aut illitu mutat in pallorem. Suffitum cum uua passa, aut resina, uulvas purgat.

**QUANQVAM** uaria, ac diuersa semina uiderim, quæ leuigitimum Ammi mentiuntur; nullum tamen ex ijs hactenus mihi sese obtulit, quod animum ad credendum alliceret, uerum Ammi ex Alexandria Aegypti ad nos deferri. Quod Ameos nomine in officinis passim habetur, cum probatissimum, Plinio teste, cumino sit candidius, id nigricat, adeoq; uulgaris petroselinii semini æmulatur, ut uisu ab eo dignosci minime possit, sed in hoc gustum consulere oportet. Nam cum haud leuiter sit acre, facultatis discrimen gustu facili deprehenditur. Præterea cum hoc nullum organum saporem gustui representet, quem tamē referre uerum Ammi Dioscorides est auctor, adhuc clarius fit, id non esse legitimum. Veruntamen contrariū sensisse uidetur Ruellius: quippe qui minus fortasse accuratè ea examinauerit, quæ de Ammi, Hippocratis testimonio, scriptis tradidit Plinius, ei alioqui familiarissimus lib. xx. cap. xv. cum inquit. Est Cumino simillimum quod Græci uocant Ammi. Quidam uero Aethiopicum Cuminum id esse existimant. Hippocrates regionem appellat, uideli-

Ammios consideratio.

Ruell. lapsus.





Monachorū  
error.

Anmios vi-  
res ex Gal.

Nomina.

cet quia efficacius in Aegypto indicauit. Plerique alterius naturæ in totum putant, quoniam sit exilius, & candidius. Similis autem & huic usus: nam & panibus Alexandrinis subigitur, & cum alimentis interponitur. hæc Plinius. Cæterum non equidem negauerim, Anmi in Italia nasci, etsi in officinis hætenus uerum non reperiatur. Si quidem Aloisius Anguillarius Romanus in herbarum cognitione diu uersatus, ex Patauio, ubi horti publici curam gerit, nuper ad me misit legitimum Anmi, nulla prorsus reclamante nota. Verum enim uero huic sanè illud non adstipulari certum est, quo magno, ut arbitror, errore ducti Monachi illi, qui in Mesuem commentarios ediderunt, se usos fuisse asseuerant. nam præter rationes, error satis ex suis scriptis exploditur, utpote qui suum Anmi nullo origani sapore commendari fateantur. Herba, quam uocant Anmi, semen, ut Galenus testatum reliquit libro VI. simplicium medicamentorum, maxime est utile. Facultatis est excofactoriæ, & desiccatoriæ, tenuiumq; partium: sed & gustu subamarum est, & acre. Et clarum est, quod & digerat, & urinam moueat. Fuerit autem in calfaciendo, desiccandoq; ex ordine tertio intenso. Planta, quæ Græcè ἀμμή, Latine item Anmi uocatur: Arabicè, Nannochach, Anazue, Nanachua, seu Nanachue: Italicè, Anmi, ut etiam Hispanicè: Germanicè, Amey.

## Coriandrum.

## Cap. LXII.



Coriandri fa-  
cultas ex Gal.

CORIANDRUM, aut coriannum uulgaris est naturæ: uim refrigeratariam habens. Quare illitum cum pane, aut polenta, ignibus sacris, & vlceribus, quæ ferpunt, medetur. Epinyctidas cum melle, uel uua passa, testium inflammationes: carbunculosque sanat: cum faba fresa, strumas, & tubercula discutit. Tineas intercorum expellit semen, cum passo modicè potum, & genituram adauget: largius tamen sumptum, mentem non sine periculo mouet. quare continuo, & copiosiore usu abstinendum. Succus cum cerussa, spumæ argenti, necnon aceto, & rosaceo illitus, ardentes summæ cutis inflammationes emendat.

CORIANDRUM omnibus notissimum est. In cuius facultate indaganda Galenus productus est, ut longè sermonem faceret contra Dioscoridis sententiam lib. VII. simplicium medicamentorum, ubi ita scribit. Coriannon, siue Corion, aut utcumque uocare lubet. Vetusiores Græci Coriannon nominant: recentiores medici omnes Corion appellant, sicut & Dioscorides, refrigeratariam esse herbarum dictitans, sed perperam. Siquidem ex contrarijs facultatibus componitur, plurimum habens calidæ sentie amaræ, quam ostendimus esse tenuium partium, & tenuium. Nec parum etiam aqueæ humiditatis obtinet, quæ tepentis est facultatis. Habet autem & adstrictionis pauillum. Ex quibus omnibus uariè quidem agit ea quæ scribit Dioscorides, tantum ex refrigeratione. Cæterum ego cuiusq; particularium actionis causam enarrabo, tametsi propositum fuerat, mei unius obsequio taxat hoc in libro sententiam expromere. Sed forte nihil obstat: imò, si uerum fatendum est, proderit nonnihil, superiores medicos, quæ ad hunc modum in paucis medicamentis sunt dictæ, hic repetere. Primum ergo non Dioscorides tantum, sed & alij complures medicorum indeterminatè de morbis pronunciat, sicut sanè hac quoq; tempestate non paucos inuenias medicos uel insignes, præter alia, hac in re maxime hallucinantes. Interdum enim atra, liuida, frigidaq; redolentia parte, quæ erysipelas habuit, nec amplius refrigerantia poscente medicamenta, cum antea, sed ea quæ infixæ partem præter naturam humorem euacuent, ij tamen refrigerare perseverant. Aliquando autem ad digerentia quidem transierunt: cæterum erysipelas sanare dicunt. Et sanè scribunt, incipientibus etiamnum, & crescentibus erysipelas etiam esse medicamenta, alia uerò iam declinantibus, ac flaccescentibus. Sed ita res non habet. Neque enim erysipelas, neque uocari debet, posteaquam inflammatio eius, & feruor, ac biliosum illud abierit: neq; quæ facultate sunt frigida, neque quæ huiusmodi affectus sanant, remedio esse putandū est: sed uelut si uel initio protinus aut percussis, aut alia de causa quauis tumor in parte quapiam aut liuidus, aut niger extiterit, eum esse frigidum affectum existimabis, & quæ digerentia excalfaciuntq; medicamenta poscere. Ad eundem modum, si calida affectio in frigidam reciderit, negligenda quidem prior est, sed secunda alio appellanda nomine: aut si displicet nominis mutatio, saltem sicut quidam alia scribunt principij, alia declinationis remedia, haud frigida esse autumantes declinationis remedia, concedendum sanè est, si cuius placet, ut talis affectio etiam erysipelas uocetur: sed eam etiam calidam dicere, ubi iam refrigerata est, id uerò nec minus quam concedendum. Itaq; ne quod tuuc ei auxilio est, refrigeratorium esse credamus, sicut Dioscorides Coriandrum, quod ut ipse inquit, cum pane, aut polenta illitum, erysipelas curet. Nam quod exquisitum est erysipelas, quod uisum



inflammatum est, & flauum, haud unquam sanare poterit cum pane Coriandrum, sed illud quod iam refrigeratum est. Proinde nos superioribus uoluminibus, cum determinata, ac definita experientia, cuiusq; medicamenti facultatem explorandum censuimus, quam maxime fieri posset, simplicissimum eligi affectum consuluimus. At pleriq; medici neque quod uel plurimi morborum protinus ab initio compositi inuadant, norunt: neq; quod alius affectus sit erysipelas exatum, alius uero is, qui uocatur ab omnibus nobis uisitate, ut à ueteribus quoq; phlegmone: alij autem inter hos medij plurimi, partim, ut sic dicam, erysipelata phlegmonode, partim phlegmonæ erysipelatodes. Ac inuenias nonnunquam ubi neutrum uincat, sed ad unguem paria sint. Quinetiam nonnunquam œdematodes esse erysipelas conspicitur, sicut aliud scirrhomides, ut compositorum morborum non paruus aceruetur numerus. De quibus copiosius, cum alibi differuimus, tum in libris de curandi ratione. Dicitur autem & nunc quoad saltem eorum memuisse necesse est, quod exactum erysipelas haud unquam ab antè dicto cataplasmate curari possit. Voco autem exactum, cum à biliosa fluxione pars completa fuerit. Porro quod longè à refrigeratione absit Coriandrum, uel ex ijs, quæ ipse scribit Dioscorides, discere licet. Nam strumas, inquit, cum lomento dissoluit. Quod uero nullum refrigerantium medicamentorum idoneum sit strumas sanare potentia, quæ omniatim temperie calida, tum actionibus digerentia esse confessus est. Hastenus Galenus à Dioscoride in Coriandri facultate dissentiens. Porro uero ac in re Galeno maxime refragatur Auicenna, qui in ipsum aperte inuehitur lib. II. cap. CXLIII. sic inquit. Scripsit Galenus Coriandrum esse compositum ex diuersis facultatibus, etsi terrea facultas in eo cæteris excellat, simul cum aquea quadam tepida, & adstrictoria pauca. Verum, ut ego coniicio, aqueitas, quæ in ipso reperitur, absq; dubio frigida, non quidè tepida existit: nisi ei forsitan admiscetur aliquid excalfacientis substantiæ, quæ sui tenuitate uelociter in aurâ euanescat. Quapropter dixit Hucennum, remouet Galenus frigiditatem à Coriandro, & Dioscoridirepugnat. At ego quidem aliter sentio, cum frigida eius substantiæ meminerint Archigenes, Rufus, & aliorum posteriorum nonnulli. Frigidum igitur est Coriandrum natura in fine primi, & usq; ad principium secundi, & siccum in secundo. quanguam, sententia mea, & siccum est, & ad caliditatem aliquo modo uergit. Sed Galenus ipse sentit, Coriandrum esse ex omni parte calidum. Id quod fortasse euenisse putandum ex ea caliditatis particula, quæ dum bibitur, aut comeditur, ab ipso disperditur. Aliter nec necessarium foret, si homines sua frigiditate interficeret, ut in multa exhiberetur quantitate. Illud præterea subdidit Galeus, si Coriandrum strumas dissoluit, quoniam igitur pacto frigidum erit? Cui facile responderi potest, id agere Coriandrum sua quadam oculata facultate, ac forma: aut quod reperitur in eo aliqua tenuis facultas, quæ in profundum penetrare possit, frigida substantia exterius relicta. Sed cum bibitur caliditas illa resoluitur, quo fit, ut sola frigida remaneat, & in corporibus agat. Hæc Auicenna in Coriandro Galeni dicta resellens. Quæ etsi aliquid in se rationis, ac ueritatis habere uideantur; tamen cum omnibus compertum putem, Galeno neminem adhuc parem extitisse, qui diligentius strimum tum naturas, tum facultates inuestigauerit partim saporis gustu, partim odoris olfactu, partim substantia, et coloribus, partim deniq; ex longa experientia profundissime philosophiæ coniuncta, operæ pretium est eius potius ac quiescere sententiæ, quam reliquorum omnium. Veruntamen Brasauolus in hoc maluit fortasse cum Auicenna errare, quam cum Galeno rectè sentire. Qui præterea cum nesciuerit, Coriandrum in Hetruria passim in pratis, & campestribus sua sponte nasci, asserit in suo simplicium uolumine, satiuum tantum reperiri Coriandrum. Cæterum quod in hoc capite Dioscorides auctor sit, Coriandrum sumptum mentem non sine periculo commouere, quodq; alij tum ex Græcis, tum ex Mauritanis memoriæ prodiderint, eiusdem succum potum interimere: ideo factum est, ut inulti, quorum ego sententiam ante hæc secutus sum, coriandri usum prorsus damnauerint. Sed id nunc certè mihi uidetur iniuste factum, siquidem Coriandrum mentem non conuouet, nisi largius et immoderatè sumatur. Quid quæso mirum erit de coriandro copiosius sumpto, si uinum etiam, cuius tamen est usus quotidianus, liberalius epotum, dolores, morbos graues, strangulatus, & mortem deniq; inferat? quod si moderatè bibatur, præter alias utilitates, quas humano corpori præbet, uenterculum roborat, concoctiones adiuuat, excrementosa pellit, cor exhilarat, intellectum acuit, spiritus claros reddit & uiuificat. Quare non equidem uideo, quid obstet, quod uiuius simili ratione credamus, tantum abesse, ut Coriandri semen noceat, ut etiam maxime proficit, si tamen parçè & modicè sumatur. Quippe ab eius usu moderato non abhorruisse Galenum puto: nam lib. VIII. cap. IIII. de compositione medicamentorum secundu dum locos ex Archigene refert, ructu acido affectis coriandrum cochlearij mensura exhibendum esse. Galeno autem apertissime ad stipulatur è recentioribus Græcis Symeon Sethi, utpote qui in coriandri mentione scribat, id stomacho bonum esse, & eundem corroborare: cibum in uentriculo retinere, donec probè concoquatur. Quæ auctore huic de temperato coriandri usu tradidisse, nulli dubium est. Ex his igitur facile colligamus licet, quod nō sit admittenda, sed potius explodenda illorum recentiorum opinio, qui coriandri usum omnino fugiendum esse censent. nos enim iam non omnem eius usum, sed immoderatū tantum, ut nocuum, uitandum esse existimamus. Id Græcis κόριον, & κοριανδρο appellatur: Latinis, Coriandrum: Mauritanis, Rusbor, Rasbera, Kuzbara, seu Kuzibara: Italis, Coriandro: Germanis, Coriander, & Coleander: Hispanis, Culantro, & Ciliandro.

Coriandri facultas ex Auicenna.

Brasauoli error.

Coriandri seminis usus.

Nomina.

## Hieracium.

## Cap. LXIII.

**HIERACIVM** magnum caulem emittit asperum, subrubrum, spinosum, cauum: folia ex interuallis rariusculè diuisa, similia soncho per ambitum: luteos flores, in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modicè substringendi: unde illitum, stomacho æstuanti, inflammationibusque prodest. Succus erosionem stomachi sorbitione mitigat. Herba cum radice illita, uibratis à scorpio-aciculis auxiliatur. Hieracium paruum, folia ex interuallis habet, diuisa in ambitu: cauliculos teneros,



teneros, uirentes: in quibus lutei flores orbem circinantes, emicant. Vim suam ad eadem, ad quæ superior impendit.

## HIERACIVM MAIUS.

## HIERACIVM MINUS.



Hieracij con-  
sideratio, & vi-  
res ex Plin.

**HIERACIVM** tam maius, quàm minus frequentissimum ubiq; in Italia nascitur, soncho non admodum dissi-  
mille. Horum autem non reperio Galenum mentionem fecisse, nec etiam Paulum, in libris de simplicium medicamentor-  
um facultatibus. Meminit tamen eorum Plinius lib. x x. cap. vii. inter lactucarum agrestium genera, sic inquitens.  
Sunt, qui herbam Hieraciam uocent, quoniam accipit res scalpendo eam, succoq; oculos tingendo, obscuritatem eorum  
sensere, discutiant. Succus omnibus candidus, uiribus quoq; papaueri similis. Carpitur per messes inciso caule. Com-  
ditur in fictili nouo ad multa præclarus. Sanat omnia oculorum uitia cum lacte mulierum. Arcet nubeculas, cicatri-  
ces, adustionesq; omnes, præcipue caligines. Imponitur etiam oculis cum lana contra epiphoras. Idem succus aluum  
purgat, in posca potus ad duos obolos. Serpentiū ictibus medetur in uino potus. Et folia tosta, thyrsiq; triti ex ace-  
to bibuntur. Vulneri illinuntur maxime contra scorpionum ictus. Verum contra phalangia commisto uino ex ace-  
to. Alijs quoque uenenis resistunt, exceptis quæ strangulando necant, aut ijs quæ uesicæ nocent, item psimythio ex-  
cepto. Imponuntur & uentri ex melle, atq; aceto ad detrahenda uitia alui. Vrine difficultates succus enendat. Cere-  
teuas eum & hydropicis obolis duobus in aceto, & cyatho uini dare iubet. Peculiares earum uires partim iam disse-  
sunt, somnum faciendi, ueneremq; inhibendi, estum refrigerandi, stomachum purgandi, sanguinem augendi. Nunc ad  
pauca restant, quoniam inflationes discutiant, rustus lenes faciunt, concoctiones adiuuant: cruditatem ipse nequa-  
quam faciunt. Nec ulla res in cibis auaritatem incitat, inhibetq; eadem in causa alterutrinq; modus est. Sic & alui  
copiosiores soluunt, modicæ sistunt, lentitiam pituitæ digerunt, atq; ut aliqui tradiderunt, sensus purgant. Stomachum  
dissoluti utilissimè adiuuantur, in eo usu, & oxypori obolis asperitatem addito dulci ad intinctum aceti temperantes.  
Si crassior pituita sit, scillite, aut uino absinthite: si & tussis sentiatur, hyssopite admisto. Dantur celiacis cum me-  
tubo erratico, & ad duritiam præcordiorum. Dantur & melancholicis candidæ copiosiores, & ad uesicæ uires.  
Praxagoras & dysentericis dedit. Ambustis quoq; prosunt recentibus, priusquàm pustulæ fiant cum sale illite. & alui  
cera etiam, quæ serpunt, coercent, initio cum aphronitro. mox in uino trita igni sacro illinuntur. Conuulsa, & alui  
xata caulibus tritis, cum polenta ex aqua frigida leniunt: eruptiones papularum ex uino, et polenta. In cholera quoq;  
coctas patellis dederunt: ad quod utilissimæ, quàm maxime caule, sed amaræ. Quidam lacte infundunt. Deserue facti  
ij caules & stomacho utilissimi traduntur. Has omnes Plinius tam Hieracijs, quàm sylvestribus Lactucis uires contra-  
buit. Quod Græci ἱερᾶκον, Latini similiter Hieracium uocant: Itali, Hieracio.

Nomina.

APIVM



Apium hortense.

Cap. LXIII.

HORTENSIS Apii herba ad eadem, ad quæ coriandrum conuenit. Inflammationibus oculorum cum pane, aut polenta illinitur: æstuantem stomachum mulcet: mammarum duritiam ex lacte conerecto contractâ, reprimit. Vrinam ciet, siue crudum, siue coctum edatur. Decoctum eius, radicisquæ potum, uenenorum noxæ resistit, cum uomitiones cœcit: aluum cohibet. Semen uehementius urinam pellit: contra serpentium uenena, aut epotam argenti spumam auxiliatur: inflationes discutit. Admiscetur medicamentis, quæ dolorum leuamenta præstant, theriacis quoq; ac tussis remediis.

Eleoselinum in humidis nascitur, satiuo grandius, & ad eadem efficax. Oreoselinum caulē est do drantem alto, ab radice tenui ex cunte, per cuius ambitum ramī, & capitula cicutæ, multò tamen tenuiora: semine cumiā oblongo, acri, & odorato, tenui. Nascitur in petrosis, & montibus. Vrinam ciet, semine, ac radice in uino potis: menses trahit. antidotis, necnon medicamentis urinam cientibus, & exsalfactoriis, inseritur. Nec hallucinari nos oportet, existimantes oreoselinum esse, quod in saxis prouenit: aliud enim est petroselinum. Petroselinum in Macedonia prouenit, in præruptis locis, semine ammii, odoratiore, sapore acri, aroma olente. Vrinam cit, ac menstrua: contra stomachi, & coli inflationes, & tormina prodest. Laterum, renum, & uesicæ doloribus, in potu subuenit. Admiscetur antidotis urinam cientibus. Hipposelinum Latini olusatrum appellant, aliqui smyrnion, quanuis aliud sit, quod propriè smyrnion dicitur, ut paulò post referemus. Est autem maius:

HIPPOSELINVM.

APIVM PALVSTRE.





& satiuo apio candidius : caule alto , cauo , molli , habente ueluti lineas : foliis latioribus , in puniceum uergentibus : coma rorismarini , florum plena : dependentibus in cacumine corymbis antequam deflorescat . Ea semine turget nigro , oblongo , acri , solido , aromatico . Radix dimittitur tenuis , odorata , candida , quæ os commendat . In umbrosis , & palustribus enascitur . olerum generis , ut apium . Radix cruda , coctæue estur . Folia cum caulibus , decocta manduntur , & per se aut cum piscibus præparantur , crudæq; muria condiuntur . Vim hanc habet , ut poto semine ex mulso uino menies cieat : algentes calfacit potu , aut illitu : urinæ stillicidio auxiliantur . Radix eosdem præstat effectus .

Apri hortensis  
confid.

Eleoselini cō  
sideratio .

Ruellii opin.  
non accepta.

Oreoselini  
confid.

Petroselinū.

Hipposelini  
confid.

Marcelli , &  
Brasæ lapsus.

Fuch. error.

PVTANT dubio procul omnes ferè ætatis nostræ medici , ijq; præsertim , qui diu uersati sunt in simplicium medicamentorum inquisitione , quiq; multum laboris ac studij impenderunt , ut hanc medicinæ partem penè abolitam restituerent , nil aliud apud antiquos satiuum fuisse Apium , quàm uulgare nostrum Petroselinum , hodie hortis omnibus frequentissimum . Quorum equidem sententiam nunquam ausim improbare : cum nostrum hoc notis omnibus sit præditum , quibus constare Apium ueteres tradidere . Plinius siquidem libro XX. cap. XI. naturalis historie ita scribit . Apio gratia uulgò est : naq; rari largis potionibus per iura innatant , & in condimentis peculiarem gratiam habent . Hoc etiā nunc confirmare uidetur Galenus lib. II. de alimentorum facultatibus , cum inquit . Apium inter cetera familiarissimum est , & ori , stomachoq; gratissimum . Quæ sanè omnia in uulgari nostro Petroselino cernuntur : quippe quod nobis omnium olerum familiarissimum in ciborum condimentis perpetuò habeatur . Ceterum quoniam id uarios nostrarum mensarum cibos frequentissimè commendat , scripsere tamen tum Chrysippus , tum etiam Dioscoridius ( ut Plinius auctor est ) Apium ad cibos non admittendum , imò omniuo nefas : nam id defunctorum epulis feralebus dicatum . Ipsius quoq; uisus claritati inimicum . Caule scemine uermiculos gigni . Ideoq; eos , qui ederint , sterilescere mares , sceminasq; . In puerperijs uerò ab eo cibo comitiales fieri , qui ubera hauriunt . Innocentior tamen esse uia . Ea q; causa est , ne inter nefastos frutices damnetur . hæc Plinius . Quare mirum non fuerit , si recentiores quoq; Apio comitalibus interdixerunt . Cum igitur his tum rationibus , tum auctoritatibus , notis præterea singulis fragantibus , constet uulgare Petroselinum legitimum esse Apium , putandum quidem fuerit , quin potius affirmandum , id quod officinis omnibus satiui Apij uicem explet , nil aliud esse , quàm Paludapium , siue Apium palustre , Eleoselinum Dioscoridi uocatum . Quandoquidem hoc in humientibus , & palustribus locis nascitur , caule , & folijs satiuo maius , rarioribusq; . Ea q; propter Theophrastum lib. VII. cap. VI. de plantarum historia , de eo differit his uerbis . Paludapium , quod apud aquæ ductus , & in paludibus prouenit , folio raro , nec hirsuto consistit , sed simile quodammodo Apio est , odore , sapore , figuræq; . Hinc itaq; fit , ut Ruellio minime ad stipulandum censeam , qui plantam Apium Italicæ Macerone uulgò appellatam , Paludapium esse putat . Quippe ( ut paulò post , atq; etiam in proxima Smyrnijs commentatione dicetur ) non parua sunt inter uocatum Maceronem , Eleoselinum , & Hipposelinum intercedit differentia . Apij porro in montibus nascentis , quod ideo Græcis Oreoselinum dicitur , nulla à Dioscoride redditur delineatio , nisi in eo scriptura fuerit deprauata , ut feruè suspicor . Verum Theophrastus , & Plinius Oreoselinum descripserunt folijs cicutæ , radice tenui , & semine unus , alter uerò caule anethi , minutiore tamen . Unde factum est , ut nonnulli crediderint Theophrastum hoc in loco deprauatum esse , & quod ubi in Græcis codicibus legitur , τὰ ῥάλλα ἔχει κωνίω εἴρη , id est , folia habet cicutæ similia , legendum sit , καὶ ῥάλλα ἔχει κωνίω εἴρη hoc est , capitula habet papaueri similia . In quam opinionem hos facile potuit adduxisse uulgata Græca Dioscoridis lectio , in qua uimur capitulorum papaueris , non autem foliorum cicutæ mentio est . Veruntamen ego potius ( ut modo dixi ) Dioscoridis lectionem uitiatam putauerim , quàm Theophrasti , licet contrà senserit Hermolaus . Nam præterquam quod Theophrasto subscribat Plinius , est Oribasij codex , in quo non κωνίω , sed κωνίω legitur . Præterea ea ipse sæpenumero uidit Apium in montibus nascentis , quod à Theophrasti , & Plinij pictura nullis prorsus notis distinet . Prouenit enim folijs cicutæ , radice tenui , & semine in umbella anethi modo : quæ omnia Apij generi maxime ad stipulantur . Illud insuper addiderim , quod Apij longè magis proprium est folijs consurgere cicutæ modo per ambitum laciniatis , semine in umbella anethi instar , quàm capitulis papaueri similibus incluso . Sed an legitimum Petroselinum Macedonicum uocatum , in Italia proueniat , nõ equidem asserere ausim , etsi Monachi illi , qui in Mesum scripserunt , se in Romanis quibusdam montibus illud adinuenisse testentur . quod tamen ( si uera referunt ) Romanum quidem , non Macedonicum appellandum fuerit . Quod uerò Hipposelinum uocatur , nil certè aliud esse opinor , quàm quod nonnulli hodie Leuisticum nominant , grandius planè inter omnia apiorum genera , adeo ut meritò Hipposelinum dicatur . Id sane notis omnibus refert Hipposelinum : licet Brasauolus Ferrariensis herbam Maceronem uulgò uocatam falsò Hipposelinum existinet , à peruersa fortasse Marcelli interpretatione deceptus , qui præter Dioscoridis sententiam , Hipposelino radicem intus caudam , foris uerò nigram reddidit , cum tamen in Græcis Dioscoridis exemplaribus nulla nigredinis fiat mentio . Quo quidem argumento Maceronem Hipposelinum non esse , satis superq; comprobatur , præsertim cum hæc coloris radicum opposita qualitate inter se discrepent . Huius Marcelli lapsus illud causam fuisse arbitror , quò legerit apud Theophrastum , nasci Hipposelinum folijs paludapio proximis : caule magno , ac hirsuto , radice raphani modo crassa , sed nigra : nigroq; etiam semine , magnitudine eruo ampliore . Qua fortasse Theophrastus fretus Marcellus , nigram Hipposelino radicem inesse addidit in Dioscoride . Sed animaduertendum est Theophrastum eo loco non descripsisse Dioscoridis Hipposelinum , cum alterum ab altero pluribus differat notis , sed Smyrnium potius . Id quod ex eo conijci potest , quò Dioscorides , itemq; Galenus asserant , nonnullos inueniri qui Hipposelinum à Smyrnio non separent . Quibus uerbis nil mirum inter eos , qui ita sentirent , Theophrastum quoque ab illis comprehensum fuisse . Ceterum hac in re etiam Fuchsius , cuius tamen pace dixerim , aperte hallucinatur : quippe qui legitimum Hipposelinum Leuisticum uulgò uocatum , smyrnij loco in suis clarissimis de stirpium historia commen-




tarijs depiuxerit. Idem præterea errasse deprehenditur in libro de compositione medicamentorum, quem nuper auctum edidit. Nam etsi primum recte scribat, illud quo officinae hodie pro apio bortenſi utuntur, non esse nisi eleoselinum, id est apium palustre; tamen postea perperam (meo quidem iudicio) scriptis tradidit, petroselini semen seplasijs apij semen uocari, atque in eius locum usurpari. Etenim eleoselini semine, non petroselini, quod nobis hæcenus desiderari existimo, apij seminis loco utuntur omnes ferè pharmacopœi, idque etiam apij semen nuncupant. Apij meminit Galenus libro VII. simpl. medic. sic inquit. Apium usque adeo calidum est, ut et urinas, et menses cieat. Flatus quoque discutit, et magis semen, quam herba ipsa. Sed et oreoselini, et hipposelini similis uis est: uerum hipposelinon imbecillius est, oreoselinum ualentius. Eodem quoque libro superius tamen, de Petroselino differuit bis uerbis. Petroselini semen maxime usui est, cum tota etiam herba una cum radice similem, sed imbecillio rem, facultatem sortiatur. Est autem ut gustu acre cum amaritudine, sic et in operibus calidum, una cum incidendi effectu. Hinc menses, et urinas largè prouocat. Flatus quoque discutit. Fuerit itaque et ipsum tertij ordinis tum ex calfacientium, tum desiccantiũ. Sed de Petroselino Macedonico fusiùs differens libro primo de antidotis, ita scribit. Quod ad Petroselinum attinet, laudatissimum Macedonicum est omnibus cognitum: quod Estreaticum etiam quidam appellant, à loco in quo nascitur, nomen imponentes. Verum exiguum est prorsus quod ibi prouenit, cum et præruptus, et angustus is locus sit. Estreaticum itaque Macedonicum hoc, quod à Macedonibus in omnes gentes affertur, paucum et ipsum in Macedonum terra gignitur. Sed idem in petroselino Macedonico accidit, quod in Attico melle, et uino Falerno contingit. Mercatores siquidem in omnem ferme orbis terram, ut mel Atticum, uinum Falernum, sic petroselinum Macedonicum aduehant, cum tamen in Macedonia petroselini tantum non oriatur, quantum gentibus omnibus satis esse queat. Verum in Epiro petroselinum plurimum gignitur, quemadmodum in Cycladibus insulis mel: atque ut mel ex insulis Athenas affertur, sic petroselinum ex Epiro prius in Macedoniam comportatur, plurimumque, et prope totum in Thessaloniam: inde uerò tanquam Macedonicum exportatur. Idem in uino Falerno contingit. nam cum in exiguo quodam Italiae agro Falernum proueniat, complura alia uina in Falerni speciem à uini magistris concinnantur, quæ perinde atque Falernina, in omnes provincias Romano imperio subiectas importantur. Tibi uerò si petroselinum Estreaticum quandoque deerit, ne peiorem existimes theriacam futuram, si alium imposueris. Non enim si mortiferis uenenis, si uenenatorum morſibus aliud ab Estreatico petroselinum minus congruit, propterea reliquis etiam morbis, ut torminibus, uentriculo debili, aquæ inter cutem, et id genus alijs, segnius opitulatur, quos in primis sanare theriaca non prouenit. Ad hæc Estreaticum petroselinum theriacam plane amariorem facit, præsertim cum recens adhuc imponitur. differt enim ab alijs petroselinis, quod ut acerrimum, ita quoque amarissimum est. Σέλινον χιπάζων id Græci, quod Latini Apium hortense, nominant: Mauritanii, Charſs, Carſi, seu Chares: Itali, Apio domestico, et Petrosello: Germani, Peterſilien, et Peterlin: Hispani, Perexil: Galli, Perſil de iardin. Id uerò ἐλεοσέλινον Græci dicunt, quod Latini, Apium palustre, et Paludapium: Mauritanii, Asafalis: Itali, Apio palustre: Germani, Eppſich, et Eppich: Hispani, Perexil dagoa, et Apio: Galli, Perſil de ſeau. Quod autem ὀρεοσέλινον Græci, Apium montanum Latini uocant: Mauritanii, Acraselinum: Itali, Apio montano, Hispani, Perexil montesino: Galli, Perſil des montaigne. Πιτροσέλινον deinde id Græcis dicitur, quod item Latinis Petroselinum, et Italis, Petroselino. Postremo ἱπποσέλινον id Græcè uocatur, quod etiam Latinè Hipposelinum: Arabicè, Salis: Italicè, Hipposelino: Germanicè, Lieſtockel: Gallicè, Ache, et Ache large.

Apii generũ  
uires ex Gal.

Nomina.

### SMYRNIVM.



### Smyrniolum.

### Cap. LXV.

SMYRNIVM, quod in Cilicia petroselinum uocant, plurimum in Amano monte gignitur. Caulem habet apij, & stolones multos: folia latiora, suppinguia, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia iucunda, colore in luteum languescens: capitibus caulium orbiculatis, ut anethi: semine brassicæ, rotundo, nigro, acri myrrhæ sapore, ita ut alterum alterius loco cedat. Radix quoque odorata, gustu acri. fauces mordet succosa, mollis. Cortex eius foris niger, intus uiridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis, & collibus, atque squalidis, & limitibus terrenis. Vis radice, herbæ, & seminis ex calfacere. Foliiis muria maceratis ad obsonia utuntur: aluum sistunt. Radicem contra serpentium ictus bibere conuenit: tussis, & orthopnœas mitigat: urinæ difficultati medetur. Illita recentes tumores, collectiones, duritiasque discutit: uulnera ad cicatricem perducit. partus abortu uitiat, si feruefacta subiiciatur. Semen lienis, renum, & uesicæ uitiiis prodest: menses, & secundas



secundas pellit. commodè datur ischiadicis in uino: inflationes stomachi lenit: sudores ciet, & rictus. Peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus.

Smyrni con-  
sideratio.

SI SMYRNII singula uote, quæ illi à Dioscoride tribuuntur rectè, diligenterq; expendantur, faciliè quidem perspicere poterit, Smyrniū ei herbe simillimum esse, quæ à nostris in Hetruria uulgò uocatur Macerone. Siquidem hanc nasci clarum est caule apij, stolonibus multis referto: folijs latioribus, subpinguibus, robustis, ad terram uersis, odore medicato, cum quadam acrimonia iucundis, colore in luteum languescente. Præterea in caulium cacuminibus umbellam gerit anethi modo: semine brassicæ maiore, oblongo tamen, nigro, acri, odore myrrham referente. Radice deniq; nititur odorata, acri, succosa, ac molli, quæ exteriori cortice nigricat, interiore uerò parte ex albo uiscescit. Quas quidem uotas ferè omnes constat Smyrniō Dioscoridem reddidisse. Verum quispiam, cui fortè hæc non fuit, Huic illud responsum uolumus, quòd cum ceteræ in uniuersum uotæ illi respondeant, facili in seminis delineatione mendum subesse potest. Vel quòd non in rotunditate, sed in alio uini cum altero semine intercedat similitudo, quanuis memoriæ nō prodiderit Dioscorides, quòd Smyrniū feratur in hortis, in quibus hodie nostrum illud feritur, sed quòd sponte in Amano Ciliciæ monte gignatur, tum etiam in collibus, incultis, ac saxosis locis; Plinij tamen hortensia referens, inquit. Et Smyrniū olus iisdem locis feritur, myrrhamq; radice respicit. Idem quoq; testatur Galenus, quòd ipsum inter olera connumeret libro 11. de aliment. facultatibus, & de eo scribat in hunc modum. Smyrniū non est insuauis. Ideoq; Romæ plurimum uenit. Multò autem acrius est, & calidius, quàm apium: quin & odorati quidpiam habet. Quapropter efficacius urinam ciet, quàm apium, hipposelinum, & sion: & mulieribus menses mouet. Veris tempore caulem producit, qui crudus edendo est haud aliter quàm folia, quæ sola per hyemem inerat plantæ, nondum caulem habenti, sicut neq; tum apium habet. Postea uerò caule accedente, tota planta iucundior redditur, siue quis crudam ipsam, siue coctam mandat, siue ex oleo, & garo, siue uinum, siue acetum uelit adijcere. Nonnulli cum aceto, & garo tantum edunt, ueluti apium: alij uerò paululum olei ijs adijciunt. hæc Galenus. Ex cuius si nē uerbis liquidò apparet, Smyrniū ueteribus etiam inter olera fuisse receptum. Galeno nimirum adstipulantur etiam quæ de Smyrniō mihi retulerunt Siculi. namq; ij affirmant, plantam Maceronem appellatam passim coli in suis hortis, atq; eam ueris tempore (ut etiam Galenus perhibet) caulem tenerimum emittere: qui non solum edendo sit, sed gratiam quoque ineat cum ore, præsertim si cum fule & pipere cinare modo comedatur. His itaq; fortasse, uel etiam ualidioribus rationibus adductus Manardus Ferrariensis, uir quidem ingenio, & doctrina celebris, Smyrniū esse nostrum dictum Maceronem constanter asseruit.

Ruellii opin.  
improbata.

#### IMPERATORIA.

Smyrni uires  
ex Gal.

Quorundam  
hallucinatio

Imperatoria  
plantæ descriptio,  
& uires.




Quo fit, ut minus dubitem Ruellij opinionem improbandam esse, quòd suspicetur (ut proxima commentatione diximus) esse Paludapium. Smyrniū uerò eam esse stirpem certò putet, quàm in Gallijs uocant uulgò Leucèchia. Smyrniū tum historiis tum facultates descripsit Galenus libro VIII. simplicium agrestium, sic inquit, Smyrniū quidam Hipposelinum agrestium cognominant. Ex eodem genere & ipsum cum apio est, & petroselino; fueritq; apio quidem ualidius, petroselino autem inbecillius. Menses itaq; & urinas mouet, calidum, siccumq; tertio ordine. Cilices petroselinum nominant, quòd in Amano monte nascitur. Est quidem & ipsum Smyrniū, minus uerò petroselino, & Smyrniō acre. Proinde & ulceribus imponi potest, quia uidelicet sine molestia deficet. Sed & digerere, quæ indurata sunt, ualeat. Reliqua uis eius apio, & petroselino similis est. Quocirca et semine eius utimur ad menses, urinas, & asthma, siue anhelationes. hæc Galenus. Ceterum non desunt ex recentioribus, qui hallucinantes contendunt, plantam Imperatoriam uulgò uocatam legitimum esse Smyrniū, argumento quòd eius radices exterius nigrescant, interius uerò uirescant. Verum ij ex eo aperte decepti deprehenduntur, quòd non animaduertierint, an hæc plantæ ceteris inter se notis conueniant. Sed posteaquàm de Imperatoria herba incidit mentio, ob sui nominis maiestatem, uirumq; præstantiam, prætereundum sanè non duximus, quin hic eius tum historiam, tum facultates edisseramus. Præstantissima igitur Imperatoria in Amaniensibus montibus supra Tridentum frequentissima nascitur, folijs sphondylion minoribus, solo accubantibus, robustis, hirsutis, ac asperis: caule bicubitali, purpurascens, rotundo, hirsutoq; in cuius cacumine umbella floribus candidis ornatur: è quibus postea semen prodit seselis modo acutum, pariterq; odoratum. Radix inest ei non longa, mediocriter crassa, rugosa, dura, lignosaq; quæ foris nigra est, intus uerò subnigra, & rida. Ea gustu admodum acris deprehenditur, ac mordax, subamarè.



maria, & odorata. Ex quo non temere aliquis conijcere potest, Imperatoriae radicem ex calfacere tertio excessu conpleto, & quarto inchoante: siccare uero secundo. Discutit hæc mirifice tum uentriculi, tum intestinorum, tum etiam uteriflatus. Quapropter coli cruciatibus ac uentriculi torminibus maxime utilis est. Cit item menses, atq; urinam. Rouetur eius decocto utiliter in dolore dentes, præsertim si in uino austero radix decoquatur. Eadem ex uino pota uteri strangulationibus prodest. conceptum adiuvat, quem frigiditas intercipit: concoctionem roborat. Commansa est ueluti præstantissimus apoplegmatis mus, ut quæ efficaciter cerebri pituitam expurgat. In puluerem contrita, uinoq; subinde pota, frigidis occurrit morbis. Quamobrem resolutis, comitialibus, conuulsis, auxilio est. Aiunt nonnulli quartana eos sanari, qui pulueris coelearij dimidium hora una ante accessionem, ex mero biberint. Oris halitum commendat, & omnes roborat sensus. Epidemijs morbis, uenenis ferè omnibus, ac uenenosorum animalium tum moribus, tum ictibus opem præstat. Asthmaticos, seu anhelos iuuat, obstructions aperit, aqua intercute laborantem sanat, itemq; liene affectos. In summa ex calfacit uniuersas corporis partes, quas frigus occuparit. Vt hinc patet, herbam hanc non immerito sibi Imperatoriae nomen asciuisse, cum tot tantisq; uiribus prædita sit. *Συμπλάκη* Nomina. *Id Græci*, quod Latini item Smyrnum, & Olusatrum, nominant, Mauritaui, Seniruion: Itali, Smirnio, & Macedonia: Hispani, Apio Macedonico.

## Elaphoboscum.

## Cap. LXVI.



ELAPHOBOSCO foeniculaceus caulis est, aut rorimarino similis, geniculatus: foliis duum digitorum latitudine, ut terebinthi, prælongis, aliquantum asperis, circumfractis. Adnata multa habet, ferentia umbellas anethi similes, & semina eiusdem: florem sublu-teum: radice tertium digitorum longitudinis, & crassitudinis unius, candida, dulci, esui apta. Caulis tener pro olere manditur. Contra serpentium ictus, datur semen in uino. Fama autem est, hoc pabulo ceruas serpentium moribus resistere.

QUANQVAM aliqui profitentur, se Elaphoboscum in Italia inuenisse, atq; etiam quibusdam in hortis ostendere; herba tamen, quam pro eo demonstrant, folia profert incisuris multis diuisa, leuiatq;: Adeo ut hinc perspicue intelligi possit, eam à legitimo Elaphobosco plurimum distare, si Dioscoridi magis, quam Plinio fides est adhibenda. Plinius siquidem libro, & cap. xxii. Elaphoboscum folijs smyrnij, & semine corymbaceo depinxit his uerbis. Elaphoboscum ferulaceum est, geniculatum, digiti crassitudine: semine corymbis dependētibus, simili effigie, sed non amaris: folijs olusatri. & hoc laudatum in cibis. hæc Plinius. In quibus uerbis, quod ea planè à Dioscoride dissentiat, Manardus Ferrariensis Plinij codicem deprauatum esse existimat. Ceterum Ruellius tradit Elaphoboscum legitimū paucis hodie cognosci, etsi frequens ubiq; reperitur, illudq; esse censet, quod uulgo officinis simul & herbarijs Gratia dei nominatur, è qua sui nominis unguentum conficiunt. Sed hanc Ruellij sententiam non admittendam, quin potius explodendam putauerim, si per Gratiam dei eam plantam intelligit, de qua nos superius differuimus in hyssopi commentatione, & qua officinè utuntur. Quippe quod hæc caule, & folijs hyssopo sit per similis, non autem foeniculo, ac terebintho. Quamobrem aut aliam in Gallia plantam esse eodem nomine appellatam, aut Ruellium omnino deceptum existimauerim. Ipse equidem herbam quandam sæpius uidi, tum in Tridentino, tum in Goritienfi agro, cuius etiam hic picturā damus, quæ ita notis omnibus Elaphobosco respondet, ut non potuerit animus non inclinari ad credendum, hanc legitimum esse Elaphoboscum. Paucis admodum Elaphobosci facultates perstrinxit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Elaphoboscus facultatis est calidæ, & tenuium partium, ac proinde exiccatorie secundo maxime excessuum ordine. Eius nomen Græcum est *ἐλαφόβοσκος*: Latini similiter Elaphoboscum, & Cerui ocellum: Italicum, Elaphobosco.

Elaphobosci  
cōsid.

Ruellii opin.  
suspecta.

Elaphobosci  
facul. ex Gal.  
Nomina.

## Foeniculum.

## Cap. LXVII.

FOENICVLVM, si herba edatur, aut semen cum pitfana bibatur, mammas lacte replet. Comæ decoctum in renum doloribus subditum proficit, quippe quod urinam excitet. contra serpentium ictus in uino conuenienter bibitur: menses ciet. in febris nausæam, & stomachi feruorem ex aqua frigida potum sedat. Contritæ radices, & cum melle illitæ, moribus canum medentur. Succus caule, &



## FOENICVLVM.

Fœniculi con-  
sideratio.Fœniculi ui-  
res ex Gal.

Nomina.

le, & foliis exprimitur, & in sole siccatus, in medica-  
ta adiicitur, quæ ad excitandam oculorum aciem commo-  
dè temperantur. Extrahitur succus ad eadem ualens, etiam  
semine uiridi, ramulisque, & radicibus prima germina-  
tione incisis. In Iberia, quæ ad occidentem spectat, suc-  
cum reddit gummi similem. Caulem medium, dum her-  
ba floret, rustici demetunt, ignique admouent, quod faci-  
lius ui caloris exudans, gummi remittat: quod efficacius  
succo est, ad medicamenta oculorum.

## Fœniculum erraticum.

## Cap. LXVIII.

EST & syluestre fœniculum, magnum: fert autem  
men cachryi simile. Cuius radix iucundè olet, potaque  
stranguriæ medetur: menses imposita cict. Ventrem liti-  
radice, aut semine pôto: contra serpentium morsus auxi-  
liatur, calculos comminuit, regium morbum expurgat:  
Lactis abundantiam facit, decoctum foliorum haultum:  
fœminas à partu purgat. Traditur aliud hippomarathri  
genus, longo, exili, & angusto folio: semine coriandri, ro-  
tundo, acri, odorato. Excalfaciendi naturam habet, & ui-  
ribus fœniculo respondet, sed ad omnia infirmius.

FOENICVLVM tam erraticum, quàm satium omnibus  
in Hetruria notum est. Seritur domesticum Februario mense uere  
incunte, locis apricis, & modicè saxosis. quippe quod non minus  
in ciborum condimentis gustui acuta quadam dulcedine placeat,  
quàm utile sit in medicamentis. Fœniculi meminit Plinius lib. x.  
cap. XXIII. sic inquit. Fœniculum nobilitauere serpentes, quæ  
statu senectam exuendo, oculorumq; aciem succo eius rescicendo.  
Vnde intellectum est, hominum quoq; caliginem præcipuè eo releuari. Colligitur hoc caule turgescente. In sole sice-  
catur, inungiturq; ex melle. Vbiq; hoc est: laudatissimum tamen in Iberia è lacrymis fit, & ex semine recenti. Fit es-  
tiam è radicibus prima germinatione incisis. Est & in hoc genere syluestre, quod alij Hippomarathron, alij Myrris-  
neum uocant, folijs maioribus, gustu acriore, procerius, brachiali crassitudine, radice candida. nascitur in calidis,  
sed saxosis. Diocles & aliud Hippomarathri genus tradit, longo, & angusto folio, semine coriandri. Hec Plinius,  
qui ea ferè omnia à Dioscoride mutuatus esse uidetur. Porro alterum syluestris Fœniculi genus, cuius semen coriandri  
effigiem refert, à nemine hactenus, quod sciam, in Italia cognoscitur, & ostenditur. Fœniculum, ut memoria  
prodidit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, tam ualenter excalfacit, ut ex tertio ordine excalfaciens  
tium censeri possit. Desiccatur uerò non æquè, sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posuerit, proinde lac pro  
creat. quod si admodum desiccaret, non sanè generaret. Suffusis eadem ratione auxiliatur. Vrinæ, mensesq; ciet.  
Est & alterum Fœniculum syluestre, quod præ magnitudine hippomarathrum nuncupant, cuius radix ac semen an-  
plius quàm domestici, desiccandi uini obtinet, quocirca uentrem quoq; eo nomine sistere uidetur. Nec sanè manifestè  
illis inest adstrictio, Huius non radix modò, sed & multò magis semen cachryi ad simile est, potestq; & calculos si an-  
gere, & auriginosos sanare, mensesq; mouere, & urinam excitare: non tamen lac congerere, sicut illud superius.  
Aliud est Hippomarathrum, cuius semen rotundum est, & acre, simile semini coriandri, facultate quidem hippomar-  
rathro simile, sed debilius. Planta Græcis μάραθρον, Latinis Fœniculum appellatur: Arabibus, Raienigi: Ita-  
lis, Finocchio: Germanis: Fenchel: Hispanis, Hinoio, & Funcho: Gallis, Fenoil.

## Daucum.

## Cap. LXIX.

DAUCVM aliqui daucium uocant. Creticum foliis fœniculo simile, minoribus, & tenuio-  
ribus: caule dodrantali, umbella coriandri, flore albo: semine acri, candido, hirsuto, suauissimi  
odoris in mandendo. Radix digitali crassitudine, & dodrantis longitudine adolefcit. In saxosis na-  
scitur, & locis sole illustratis. Aliud eius genus, syluestri apio simile, acre, odoratum, aroma-  
lens, feruentis gustus. Probatissimum Creticum. Tertium assignatur genus foliis coriandri,  
floribus albis, capite, & semine anethi, muscario pastinacæ: semine oblongo, ceu cumini, acri. On-  
nium semen excalfacit. potum urinam, menses, & partus extrahit: torminibus liberat, ueterem tus-  
sim mitigat. phalangiorum moribus potù in uino, auxiliatur: tumores illitu discutit. Seminis dun-  
taxat in aliis generibus inualuit usus: in Cretico etiam radice, quæ maximè contra uenenatorum in-  
iuriam in uino bibitur.



DAUCVM.



TAMETSI nonnulli inueniantur plautarum exploratores, qui Daucum ab erratica pastinaca nihil prorsus differre contendunt, affirmantes, hoc idem sensisse Galenum, & post ipsum Paulum; ij tamen quantum equidem sentio, manifestè falli deprehenduntur. Nam etsi rectè dici possit, Daucum esse sylvestris pastinacæ genus; non ob id tamen illa, meo iudicio, fuerit unquam sylvestris pastinaca, cuius paulò superius meminit Dioscorides. Quandoquidem si unam, & eandem plantam esse Daucum, & agrestem pastinacam credidisset Dioscorides, de ijs sanè seorsum non differuisset, neq; alterum ab altera proprijs capitibus distinxisset. Ceterum cum non desint, quibus uideatur Galenus inter has plantas nullam facere differentiam, uidendum est, an ita se res habeat. Mihi quidem inter eas discrimen fieri noluisse Galenum, illud maximum argumentum est, quod Dioscoridem secutus, & ipse uarias utrisq; tribuerit uires, easq; diuersis locis descripsit Dauci siquidem libro VI. Pastinacæ uerò lib. VIII. mentionem fecit in simplicium censu. Hinc itaq; fit, ut aperte conijciam, Galenum inter illa discrimen nouisse: atq; eos decipi, qui in hoc Marcellum, & Ruellium secuti, contrarium asserunt. Quorum præterea sententiam, ipsius Galeni testimonio, facile explodi posse putauerim, nec solum quod diuersis capitibus utriusq; uires speciatim tractauerit; sed quia libro VI. simplicium medicamentorum, Daucum non esse pastinacam clarissimè ostendit, cum inquit. Daucus, quem quidam staphylinum nominant, agrestis quidem domestico minus est esui idoneus. In quibus sanè uerbis Galenus perspicuè satis declarare uidetur. Daucum nō sibi, sed alijs

Dauci consideratio.

Quorundam error.

Dauci uires ex Galeno.

Nomina.

pastinacam agrestem appellari. Quamobrem cum Dioscoride nou modò dixerim; sed etiam affirmauerim tria Dauci genera inueniri. quorum illud Italise frequentius est, quod sylvestrem pastinacā æmulatur. Hoc enim in Senensi agro, præsertim in maritinis, frequentissimum nascitur. Creticum autem legitimum ex Creta tantum afferri existimaue-  
rim. Porro Daucus, qui coriandri folijs prouenit, & semine cumino simili, in quàm plurimis etiam Italise locis reperitur. Dauci uires tradidit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum supra citato, ubi ita scribit. Daucus, quē quidam staphylinum nuncupant, agrestis quidem domestico minus est esui idoneus, ceterum in omnibus uehementior. At domesticus comestilis quidem, sed imbecillior. Acrem, & calefaciendi facultatem obtinet, ac proinde etiam ex-  
tenuandi. Certè radix præter iam comprehensa flatuosum quiddam obtinet, ac uenericum. Semen autem domestici quidem & ipsum quandam ad uenerem stimulandi potentiam possidet. Agrestis uerò planè statu caret, quod æquor  
uocant: ac proinde urinam, mensesq; ciet. Atque hæcenus de facultatibus dauci Galenus. Qui subinde de semine eiusdem scripsit, eiq; seorsum uires suas reddidit his uerbis. Dauci herbe semen excalfaciendi uehementer facultatem habet, ut inter priua efficax sit tum urinæ mouendæ medicamen, tum mensibus prouocandis. Multum etiam digerere  
per hanc potest, foris impostum. Ipsa uerò herba similem quidem uim obtinet, tamen semine infirmiore, ni-  
mirum ob aquæ humiditatis misturam. quanquam utique & ipsa calida sit temperie. Δαῦκος ita Græcis ut etiam  
Daucus Latinis appellatur: Mauritanis, Ducu, Gezar, seu Ciezar: Italise, Daucio: Germanis, Beruurtz: Hispanis,  
Dauco Cretico: Gallis, Carote sauages.

## Delphinium.

## Cap. LXX.

DELPHINIUM furculos emittit à radice una sesquipedales, aut maiores: à quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa, prælonga, quæ delphinorum effigiem repræsentat: unde tractum nomen est. Flos violæ albæ non dissimilis, purpureus: semen in siliquis, milio proximum: quo non aliud uti-  
lius bibi potest, ab scorpione percussis. Aiunt enim obiecta herba, scorpiones resolui, atque igna-  
nium, quod Romani buccinum uocant, superiori simile, sed folijs, & ramis longè gracilius. Vi-  
ribus eiusdem pollet, sed non ita efficacibus.

QUANQUAM scribit Ruellius, herbam in Gallia nasci, cui rura nullam adhuc nomen imposuerunt, quæ om-  
nibus prorsus notis Delphinio respondet; in Italia tamen nemo hæcenus, quod sciam, legitimum ostendit. Ex quo  
tamen abest, ut putauerim unquam, illud Ruellij uerum ac legitimum fuisse Delphinium, ut etiam sim plerunque su-  
spicatus, hoc Delphinij caput in Dioscoride spurium ac ascititium esse. Nec temere, ut arbitror: nam suspicio inde  
ortum suum habuit, quod Delphinium nusquam, quantum equidem legerim, describatur à Galeno, Oribasio, &  
Paulo: cum tamen horum alius historiam, alius uires platarum ex Dioscoride bona fide in suo quisq; simplicium censu  
referat. Ceterum non desunt etiam qui uelint, eam plantam Delphinium esse, quam Germani uulgo uocant Ritter-  
sporn, id est, Equitis calcar, herbariorum uerò uulgus Consolidam regalem: quam nos inter sylvestris Cumini ge-  
nera

Delphinij cōsideratio.

Quorunua opiniones reprobatae.



Sena delinea-  
tio.



Ruellij hallu-  
cinatio.

Coluteæ, &  
Colyteæ me-  
tio.

nera superius retulimus. Verum cum hæc unum tantum emittat à radice caulem, non autem plures surculos; folia non ferat delphinorum effigie, nec flores albæ violæ ænulos, horum sententiam cur probem, non habeo. Fuchsius ætatis nostræ medicus præstanti eruditione & rerum peritiâ, antedictorum opinionem sequitur in libro de componendorum medicamentorum ratione, quem iam recens locupletatum excudit. Sed ipse quoque (si rectè sentio) una cum illis in errore versatur. quandoquidem non solum (ut diximus) nusquam, quod ego inuenerim, Delphinij me-  
minerunt illi præstantissimi medicinæ auctores, quos uouiuui, qui tamen simplicia ex Dioscoride transcribunt, & mutuatur; sed neque etiam eius caput legitur in antiquissimo Dioscoridis codice Longobardis literis scripto, cuius sepe fidem citat & probat Marcellus Virgilius, ut mihi licuit uidere in eo, cuius copiam mihi fecit Viennæ claris-  
simus iurisperitus Ioannes Albertus Vuidmanstadius Austriæ orientalis cancellarius. Quod certè manifestum  
argumento esse potest, Delphinij historiam planè fabulosam esse, uel saltem Dioscoridi adscriptam & illegitimam. Non defuere præterea, qui Senam Mauritanis uocatam, siliquarum conuexitate freti, & decepti, Delphinium  
esse crediderint. Quorum grauis error ita euidentis est, ut iam ab omnibus explodatur. Idq; non iniuria, quod in  
Delphinio (denus eius caput legitimum esse) folia, non siliquæ, quæ delphinorum formam representent, depin-  
guntur: foliaq; sint tenuia, longa, diuisa: flores uerò purpurei: & tota denique Delphinij facies ea depingatur, quæ  
cum Sena quàm maxime pugnet, ut mox patebit. Nam quoniam Delphinij occasione in Sena sermonem incidimus,  
cùm huius nusquam, quod inuenerim, meminerint Dioscorides, Galenus, Paulus, & ueterum Græcorum alij, quæ  
in repurgandis humoribus uon modo innoxium, sed etiam summè utile medicamentum, hunc locum non transe-  
undum duximus, quin de Sena differamus, eiusq; historiam, & uires cùm ex alijs, tum ex eo quod nobis compertum  
est, describamus. Constat itaq; SENA, Mauritano nomine dicta, folijs glycyrrhizæ crassis, suppinguis, fo-  
barum sapore: caule cubitali, à quo ramuli exeunt in lori modum flexiles. Flores ei emicant arrei, ueluti brassicæ,


#### SENA.

purpureis intercurrentibus uenulis: quibus succedunt folliculi  
falcati, adeoq; natura compressi, ut superior membrana inferio-  
ri cohereat: in quibus semen continetur in uigro subuiscens,  
unuarum uinacis usque adeo simile, ut non facile primo oculorum  
intuitu alterū ab altero discernatur. Folliculi è ramisculis pro-  
minent, tenui pediculo appensi. quo fit, ut maturescen-  
tes uentorum flatu facile decutiantur. Planta est frigoris impa-  
rens. ob idq; feri uult maio, nec ultra autumnum perdurat. si qua-  
dem (ut pluries expertus sum) prius sata, facile frigore depere-  
ditur, serius uerò hyemem siuuliter non tolerat. Meminit Senæ  
Serapio in suo de simplicium medicamentorum uolumine, ubi se  
habet ex auctoritate Abohanisa. Sena asseruatur sicca, siliquas  
lunatas, & oblongas proferit: in quibus semina in ordinem digesta  
clauduntur. Siliquæ tenui pediculo pendent: ob idq; facile uen-  
torum impetu deturbantur. Caducas opiliones colligunt. hæc Se-  
rapio. Cuius postremis uerbis fortasse deceptus Ruellius, Sena  
nam eam esse arborem existimauit, quæ Theophrastus lib. II. ca.  
XVII. de plantarum historia Coluteam appellat. quandoquidem  
hæc antiquis pastoribus fuit saginandis ouibus expetita. Unde fa-  
cilè Ruellius, qui nunquam forsitan in Hetruria fuerat, ubi pos-  
sim legitima Sena seritur, præsertim in Florentino agro, Coluteam  
errore putauit, Senam uon herbam esse, sed arborem Coluteam  
uocatam, ratus easdem plantas esse. Sed eius error hinc præte-  
rea apertissime diluitur, quod Colutea siliquas proferit colore  
in purpuram primum uergentes, mox albicantes, statu turgens  
in purpuram primum uergentes, mox albicantes, statu turgens  
paruo, rotundo, lentis effigie. Sena uerò siliquatur folliculis lu-  
natis, qui nullo spiritu tumido distenduntur, quibus semen inclus-  
ditur uiucearum instar. Adde etiam, quod Colutea arbor sit ma-  
tis perdurans annis, Sena uerò non nisi paucis mensibus uiuat.

Quo fit, ut iam omnibus palàm sit, Ruellium hæc in re manifestè  
cæcutiuisse, & inter Senam, & Coluteam non paruam intercedere differentiam. Et quamuis asserat Fuchsius in  
suis de plantarum historia commentarijs, has plantas facultate inter se minime differre; eum tamen in errore uer-  
sari putauerim, quod certò sciam Coluteæ semen non minus, quàm genistæ uonitiones ciere. COLUTEA  
ut de ea quoq; hic aliquid dicamus, Theophrasto auctore loco paulò antè citato, Liparæ propria traditur. arbor ma-  
gitudine præstans, fructum in siliqua ferens, magnitudine lentis, quo oues mirum in modum pinguescunt. Nas-  
citur in aqua pullulare inceperit. Folium habet non absimile fœno græco. Germinat primo uicaculis, triennio maxime  
ret, quam maxime à Colutea differat Sena. Fuchsius & medicinæ, & Græci sermonis peritissimus, plantam hanc  
non Colyteam, sed Coluteam à suo se errore uindicans, appellandam censuit. Et rectè quidem, meo iudicio.



## COLYTEA.



Colytea longè alia est ab illa, Theophrasto teste loco modò citato. ubi eam ipsi depingit uerbis. Arbor circa Idam proueniens, quam COLYTEAM uocant, genus aliud est. Est autem fruticosa, ramosa, alofa, inuentu rara, non crebra: folio laurino, lauri latifolia, sed rotundiori, ampliori; ut uel ulmeo simile appareat, oblongius tamen, colore parte altera herbido, tergo autem albido, neruoso; cortice non leui, sed quasi uirgineo: radicibus per summa gracilibus, & solutis, uerum uibratis, & admodum flauis. Fructu, flore; carere putatur. Ex his Theophrasti uerbis perspicuum est, Colyteam à Colutea plurimum differre. Quæ tamen etsi Theophrasti auctore Liparæ peculiaris fuerit; hoc tamen tempore pluribus in locis sponte natam uidimus, præsertim; in Tridentino agro apud Ananios, ubi ego primum eam quam plurimis ostendi. Sed ut cò, unde digressa est, iam nostra redeat oratio, credidit Mesues Senæ folliculos in deicienda aluo folijs longè præstantiores esse. Huic uerò reclamationi non solum Mauritius Ferrariensis uir doctissimus; sed etiam diuturna medicorum experientia: etsi Brasauolus, qui Mesuem tueri uidetur, contrarium putet. Ceterum ne quis ex altercationibus confundatur, dicam ingenuè quid hac in re sentio, nec quicquam ab eo recedam, quod experimento plureis comprobauim. Sciendum igitur est, Senæ folliculos, qui siccati asseruantur, duum esse generum: alterum per se caducum, & in plantam arefactum, à quo semen eximunt, nigrum, & prorsus euanidum: alterum uerò, quod ante maturitatem demetitur, crassum, ponderosum, succo prægnans, & tegetibus expansum in umbra siccatur, sed hoc uenundatum rarum. Cui sane, ut iam millies periculi scimus, non minor deiectionis uis inest, quam folijs. Primum uerò genus, quo Venetijs omne ferè officinæ scætent, non modò minorem huiusmodi uim habet; sed propè nullam. Ut hinc planè colligere liceat, Mesuem hic non esse sine limitatione damnandum: quandoquidem is, ut arbitror, de folliculis decer-

Mesuis, & Brasauoli lapsus.

ptis intelligat, non autem de caducis, quibus tantum utuntur ipsi, qui Mesui falsò reclamationem. In quorum numero ego quoque, quandoque fui. uerum cum postea integrum Senæ campum seuissem, ut folliculos decerptos uirentes, & succo prægnantes, mox siccatos experirer, rem aliter facto periculo se habere facile comperi. Quare nostro exemplo, qui folliculis uti uoluerint, Senam serant, ut folliculos optimos habeant, uel saltem probatissimos emant, si tamen eiusmodi reperiri poterunt: sin minus folijs tutius, & efficacius utantur. Obest Sena (ut idem Mesues inquit) non nihil uentriculo. quamobrem ut hæc tollatur noxa, & eius roboretur facultas, gingiber addendum præcipit: quin & ea, quæ cor, & uentriculum corroborant. Veruntamen non desunt, qui hanc reprobent sententiam: quòd degustatis Senæ folijs, aliquid adstrictionis, nonnihil siccitatis, atque etiam tantillum amaritudinis perceperint. quæ omnia potius Senam roborare uentriculum indicant, quam ipsum perturbare, ac imbecillum reddere. In quorum sententiam ego quoque pedibus eo: nam etsi quibusdam, præsertim; mulieribus, quandoque contingat, ut epoto Senæ diluto, eorum intestina torminibus uexantur, id nunquam ex Senæ facultate prouenire existimari, sed ex crassis, pituitosis; excrementis, ab hoc pharmaco eò impulsis, quæ sua crassitie intestinorum meatus adeò replent, ut in eis non paruum extensionem faciant, dum uiam ad exitum querunt. Neque tamen me unquam aliquem inuenisse memini, qui diceret se epota Sena, uentriculi dolore laborasse. Proinde Actuarius, qui solus, quantum extat, inter Græcos Senæ uires descripsit, Senam citra noxam bilem, & pituitam deiectione memoriæ mandauit. Id quod non sine erubescencia silere coegit quendam Philippum de Set medicum, qui (ui fallor) ut suam potius tueretur sententiam, quam ueritatem, pharmacum quoddam improbauerat ex Senæ diluto, rhabarbaro, atque agarico conflatum quod cuidam Illustriss. ac Reverendiss. Cardinalis, ac Principis Tridentini nepoti in quadam quotidiana febre dederat clarissimus medicus Andreas Gallus Tridentinus. Is autem pharmacum illud damnandum esse censebat, quoniam Senæ dilutum, agaricum excipiebat, argumento quòd hæc duo (ut ipse asserbat) maximè uentriculum læderent, immemor, ne dicam ignarus, quantum præstantie, ac uiriū agarico tribuerint in febribus diuturnis finiendis, à pituita præsertim infarctu exortis, Dioscorides, Galenus, & Mesues, quantisq; laudibus Senam extulerit Actuarius. Ceterum è Sena, ea magis, præstat, quæ ex Alexandria Aegypti, uel ex Syria affertur, quanuis è nostrate adhuc in agro uirente, & rosarum diluto ego quotannis Syrupum parare consueverim. qui tutò, largèq; omnes purgat humores. Daturq; commodè prægnantibus, & pueris, & cuiuscunq; ætatis hominibus. Dilutè tamen magis præstat, quam decoctè, quòd nulla ex parte exhalet: cuius uicè quinq; uel sex aluum modestissime, & sine molestia solunt. Quòd tutò dari possit prægnantibus, & pueris, experientia docuit, cui subscribit Actuarius, qui Senam citra noxam purgare tradidit. Redditur medicamentum hoc in deicienda aluo præstantius, atque ualentius, si cassia nigra, aut manna, aut rhabarbaro, aut rosarum diluto, aut rhodopharmaco, quod officinæ Syrupum rosatum solutiuum uocant, commisceatur, aut si maceretur Sena caprino sero. Præstantissimum dilutum hoc modo paratur. Sumuntur foliorum electissimæ Senæ drachmæ

Senæ, & eius diluti uires.

Diluti præparatio.

M 2 sex,



Sene uires ex  
Mef. & Scrap.

Nomina.

sex, gingeris, aut cinnamomi contriti drachma una, florum buglosi drachmae duae: miscenturq; omnia, & scilicet uitro circūlito, siue stagneo uase angusti orificij excipiuntur, & affusis feruentis aquae, aut feri caprini uncijis decem, uasis osculū adeo occluditur, ut nullus penitus spirandi pateat exitus. His peractis puluinari plumis anserinis faretur igniq; calefacto uas inuoluitur, reponiturq; in arca, ubi pernoctare finitur. Sic enim conseruato calore dilutum omne facultatem in se recipit. Sunt praeterea, qui uindemiae tempore Sene folia in mustum conijciant, uinum inde confectum, quod alui deiectionem uim obtinet. Educit Sena per inferna (ut Mesues testatur) bilem tum atram, tum flauam, & (ut Actuarius ait) non bilem tantum, sed etiam pituitam: quod sanè experientia comprobatur. Mundat Sena cerebrum, cor, iecur, lieneu, pulmonem, & omnes corporis sensus, confertq; omnibus eorum incommodis. Viscerum obstructions aperit, auget iuuentutem, seniumq; retardat, & animi hilaritatem affert. Folia in capitis persufusionibus utiliter decoquuntur, praesertim addita anthemide. Roborat enim hoc modo cerebrum, nervos, oculorum aciem, & auditoriam facultatem. Optima demum in uniuersum est medicina morbis omnibus diuturnis, & melancholicis. Quamobrem Serapio, Sena, inquit, mirificè prodest delirio, amentiae, scissuris totius corporis, resolutioni nervorum, phtiriasi, cephalalgiae, scabiei, pustulis, pruritu, & epilepsiae. Cor etiam roborat, si tamen ijs potissimum conmiscatur medicamentis, quae ipsum maxime confirmant, ueluti uiola. Planta, quae Graecis δελφίνιον, Latinis quoque Delphinium appellatur: Italis, Delphinio. Quae uero posterioribus Graecis σενά, Latinis item Sena uocatur: Arabibus, Sene: Italis, Sena: Germanis, Senet: Hispanis, Sen de Alexandria.

### Pyrethrum.

### Cap. LXXI.

Pyrethri con-  
sideratio.



Pyrethri ui-  
res ex Gal.

Nomina.

Pyrethrum Romanis saluarem uocant. Folia, caulemque emittit, ut daucum syluestre, & fœniculum: umbellamq; anethi, circinatae rotunditatis. radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimio. Pinitam elicit: ideo in dolore dentium, decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur: mansa pituitam extrahit. Sudores ciet, peruncto ex oleo corpore, diuturnis horroribus efficax. contra persfrictiones membrorum, resolutionesque eximiè conducit.

Pyrethri radix officinis omnibus est nota, in frequētiq; usu habetur, praesertim in dentium cruciatibus. Nasceitur Pyrethrum in quibusdam quidem Italiae montibus, sed non adeo acre, ut quod ex Orientalibus regionibus Venetias aduehitur. Huius plantas uidi primum ego in Bausano Tirolensium imperio in hortulo quodam Blasij Sbaicher medici in simplicium facultate peritissimi, quae folijs, caule, radiceq; nullis discrepantibus notis Dioscoridis Pyrethrum referebant. Veruntamen non illis erant umbellae anetho similes, quales Pyrethro reddidit Dioscorides, sed potius flores anthemidis modo spectabantur. id quod etiam testatur Ruellius de Pyrethro, quod in Gallia provenit. Ex quo facile adductus sum, ut suspicandum putem, aut hoc in loco Dioscoridis codicem librariorum negligentia deprauatum esse, aut plura Pyrethri genera reperiri. Caterum sunt ex rei herbariae prudentibus, qui nouum quoddam Pyrethrum ostendit, passim ferè in pratis, ac incultis nascent, folijs hortensium pastinacae proximis. Cuius radix etsi primo statim gustu acris non sentitur; postea tamen cum diutius manditur, tum linguam, tum fauces sua feruenti acrimonia mordet, ac quodammodo incendit. Sed tamen huius acrimonia non est (nisi fallatur gustus) cum legitimi Pyrethri sapore comparanda: quippe qui et acrior, & multo acrior, & feruentior percipiatur. Pyrethri meminit Galenus lib. viii. simplicium medic. ubi eius uires ijs descripsit uerbis. Pyrethri radice potissime utimur, causticam, urentemue facultatem obtinente: qua utique etiam dentium refrigerationum dolores lenit: & ad rigores ante periodum cum oleo conficitur. Ad haec stupidos quoq; quos νάρκωσις uocant, & resolutos adiuuat. Πύρεθρον sic Graecè, Latine uero Pyrethrum, & Saluarris herba uocatur: Arabicè, Macharcaraba, seu Hacharcharba: Italicè, Pirethro: Germanicè, Bertram: Hispanicè, Peliter: Gallicè, Pyrethre.

### Rosmarinum.

### Cap. LXXII.

Duo Rosmarini genera. Vnum fœcundum, frugiferumque, cuius semen cachrys uocatur. Folia fœniculi habet, crassiora, & latiora, in rotæ speciem, humi sparsa, iucundè olentia: caulem cubitali altitudine, aut maiorem, multis concauum alis: in cacumine umbellam, in qua semen copiosum.



## ROSMARINVM.

## ROSMARINVM CORONARIVM.



Rosum, candidum, sphondylion simile, rotundum, angulosum, acre, resinaceum, quod in mandendolinguam exurit. radix thus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferens latum, nigrum, uti sphondylion, odoratum, minime exurens: radice foris nigra, intus si frangatur, alba. Verum id quod sterile dicitur, illorum planè similitudinem refert: sed neque caulem, neque florem, neque semen promit. Nascitur in saxosis, & asperis. Trita omnium herba communiter hæmorrhoidum profluuia sistit: sedis inflammationes, & condylomata mitigat: concoquit strumas, & abscessus, qui ad maturationem ægrè perducuntur. Siccæ radices cum melle ulcera purgant: torminibus medentur cum uino potæ, & contra serpentium morsus conueniunt: menses, & urinas cient: ueteres tumores illitu discutunt. Tam radicis, quàm herbæ succus, adiecto melle, illius oculorum aciem exacuit. Potum semen ad eadè pollet: si comitiale malum sentiatur, aut uetus pectoris uitium, auxilio est. regio morbo laborantibus cum uino, & pipere datur: sudores modet, cum oleo perunctum: ruptis, & conuulsis prodest. podagris, cum loliacea farina, & aceto tritum, illinitur: purgat uirilignes; addito aceto quàm acerrimo. Semine in potionibus utendum, eius quidem quod cachryn non ferat: quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinum cum erica nasci, folijs lactuæ syluestris amaræ asperioribus, candidioribusque, radice breui, Theophrastus auctor est: potuque idipsum alterutra parte purgare. Cachrys uim habet excalfaciendi, & uehementer exiccandi. Quare abstergentibus medicamentis inseritur. contra oculorum fluxiones capiti illinitur, ita ut tertio die soluat.

## Rosmarinum coronarium.

## Cap. LXXIII.

ROSMARINVM, quo coronarij utuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minuta, densa, longa, exilia, subter incana, supernè uirentia, grauiter odorata. Excalfactoria ui præditum est. Regium sanat morbum, si decoctum in aqua, ante exercitationes bibatur: & ubi laborans exercitationi se crediderit, in balnea descendat, & merum potet. Acopis, gleucinoque unguento admisceri solet.



Rosmarino-  
rum confid.

Rosmarini ui-  
res ex Gal.

Cachrys  
quid.

Nomina.

PRIMUM, ac summum Libanotidis, siue Rosmarini genus, quod mas appellant, sub duplici differentia & Dioscoride representatum, aliquoties uidi Venetijs in horto amoenissimo Maphei medici excellentissimi, nullis sane deficientibus notis, quas illi Dioscorides assignauit. Idem quoque frequens satis nascitur in agro Goritienfi Sue pra Salicanum in monte Gargaro, in uia qua ad eadem diuæ Virgini sacram ascenditur. Verum alterum genus, quod foeminam dicunt, haftenus in Italia nusquam mihi uidere licuit, tametsi id inibi nasci non negauerim. Sed certe Cordum in suo dispensatorio hallucinatum crediderim: quippe qui existimauerit syluestrem Angelicam esse Libanotin. Porro Rosmarinum, quo (ut Dioscorides inquit) coronarij utuntur, nostras nimirum uulgare est, quod in hortis, ac uiridarijs passim, & in uineis alicubi plantatum conspicitur. Id in frequentiori usu est, notiusq; omnibus, quam ut de eo plura dici debeant. Caterum uariat, mea quidem sententia, in Rosmarini descriptione Theophrastus, qui libro IX. cap. XII. de plantarum historia, de Rosmarinis hæc posteritatis memorie prodidit. Rosmarini genera, inquit, duo, alterum sterile, alterum fertile: & alterum tam fructu, quam folio utile, alterum tantum radice. Fructus cachrys uocatur. Fertile folium habet palustri apio simile, sed multo maius: caulem ad magnitudinem cubiti, aut maiorem: radicem magnam, crassam, candidam, & uelut uinum redolentem: fructum candidum, scabrum, oblongum. Nascitur potissimum solo squalido, atque saxoso. Radix medicamento ulcerum utilis, & mensibus pota in uino nigro austero. Fructus ad urinæ stillicidia, & aures, & eroga gemam, & ad oculorum morbum lippitudinem nuncupatum, & lactis ubertatem mulieribus facit. Sterile illud folio lactuæ amaræ constat, sed scabrius, candidiorq; radice breui. Nascitur id quoq; prædicto solo (alijs, ut Heron molaus legendum censet, & hic à Dioscoride commonemur, ubi erica) letissimum. Radix partim superius, partim inferius purgat. Quod enim germen uersus cõstit, superius purgat: quod terram uersus, inferius. Prohibet & uisceribus interposita uermiculos noxios. Colligitur per messem tritici. hæc Theophrastus. Libanotidis, siue Rosmarini tum historiam, tum facultates descripsit Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Libanotis tres sunt, una sterilis, due fructum ferentes: omnes uero eiusdem facultatis, emollientis, & digerentis. Sterilis tum radice, tum herbae mistus melli obtusam oculorum aciem ab humorum crassitudine curat. Porro eius palustis notidis, quæ ad coronas est utilis, quam Romani rosmarinum nuncupant, decoctum, regio morbo laborantes potum adiuuat. Omnes enim libanotides abstergentis, & incidentis facultatis participes sunt. hæc Galenus. Cachrys non modò Rosmarini semen; significat; sed etiam quarundam arborum nucamenta, uel potius excrementa, quod nec fructus, nec flores propriè dici possint: quæ tamen ante fructus erumpunt, & decidunt, qualia uisuntur in corylo, cui sunt longo piperi similia, item in nucæ, ac quercu. Nisi inter hæc ueteres Græcos auctores aliquam uisuisse differentiam sit iudicandum, quod apud plerosq; non cachrys, sed cachrys, pro Rosmarini semine scriptum reperitur. quæ tamen uoces haftenus à recentioribus confundi inuenio. Planta, quæ ῥοσμάριος Græcis, Libanoti notis & Rosmarinum Latinis dicitur: Mauritanis, Xaier albae riam, Alpina fachs, & Cachola: Italis, Rosmarino. Quæ uero ῥοσμάριος ῥοσμάριος Græcè, Rosmarinum coronarium Latinè uocatur: Arabicè, Elkialgeber: Italicè, Rosmarino coronario: Germanicè, Rosmarin: Hispanicè: Romero: Gallicè, Rosmarin.

### SPHONDDYLIVM.



Sphondilij cõ-  
sideratio.

### Sphondylium. Cap. LXXIII.

SPHONDYLIVM folia quadantenus platani, & panacis habet: caules sceniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius assurgentes: in quorum cacumine semen duplex, fefeli simile, sed latius, candidius, & magis palaceum, grauis odoris: flores eius albi, aut pallentes: radice raphani, candida. Nascitur in palustribus, & aquosis. Potum semen pituitam per aluum extrahit. Medetur iecinoris uitij, regio morbo, comitialibus, & thopnoicis, uuluarum strangulationi: ueternosos suffitu reuocat. Cum oleo commodè infunditur capitis dolori phreneticorum, & lethargicorum, item capitis doloribus: cum ruta illitum, serpentia ulcera cohibet. Datur radix contra regium morbum, & iecinoris uitia: circumsa eadem, & iniecta callos fistularum derodit. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulentisque accommodatur. qui cæterorum succorum mori exprimi, deinde recondi solet.

RARA admodum sunt pratæ, uligine madentia, quæ inter alias complures herbas, innumeras quoq; Sphondylii plantas non habeant: cæq; precipuè, quæ in montibus potius, quam in planitie uirent. In his sane Sphondylium copiosum nascitur, folio platani, aut panacis: caule sceniculi, cubitalem longitudinem excedente.



dente; in cuius cacumine umbella infidet, albis floribus referta: e quibus semen prodit, feseli non abstimile, latius tamen ac squamosum, sapore iniucundo, ut quod cimices ferme respiciat. Radicem profert albam, raphani æmulam, gustum non ingrato. Huius semine utuntur quidam feselis uice, quod alterum alterius effectus præstare existiment. Porro Euchsus non uidetur satis Sphondylium nouisse, quod ipsum unâ cum Acantho depingat, uocetq; Acanthum Germanicam. Cui facile imposuerunt officinæ Germaniæ, quæ foliorum similitudine deceptæ, pro Branca ursinæ Sphondylium usurpant. Sphondylii facultates memoriæ prodidit Galenus libro VII. simplicium medicamento- rum, sic inquires. Sphondylii fructus acris, & secantis est facultatis. Itaque ad asthma, & comitialem morbum æ- prum est medicamentum: prodest & regio morbo. Et radix nimirum abstimilis facultatis, ad eadem accommodatur. Sed & insuper fistularum callos tollit: ceterum imponere eam oportet circumrasam. Porro floris etiam succus ad diuturniora aurium ulcera conueniens reponitur. Quod Græci σφονδύλιον Latini similiter Sphondylium uo- cant: Itali, Sphondilio.

Fuch. error.

Sphondylii  
uires ex Gal.

Nomina.

## Ferula.

## Cap. LXXV.

**E VIRIDI** Ferula medulla pota utilis est ad cru- entas excreationes, cæliacosque: contra viperarum mor- sus in vino datur: erumpentem naribus sanguinem in- dita sistit. Semen potum torminosis auxiliatur: sudo- res ciēt, vncto ex oleo corpore. Caules si edantur, ca- pitis dolores faciunt: muria condiuntur. Ferula ita- quæ caulem profert ternum sæpe cubitorum: folia fœ- niculi, longè asperiora, & latiora. qua ab imo caule vul- nerata sagapenum efficitur.

**FERULA** æsinosis nascitur locis: ideoq; nil mirum, quod Apulia Ferularum sit maximè frax. Quinetiam frequens pro- uenit in Romano agro Tyrrheni maris contermino, præsertim apud Centumcellas, & in uniuersis Hetruriæ maritimis. E qui- bus prima tantum germinatione corculum quoddam pastores exi- munt oui luteum induratum referēs, quod sub cineribus assatum, prius tamen charta, aut linteo madefactis conuolutum, mox pi- pere, & sale conspersum, non modò gustui gratissimus est cibus; sed etiam ad excitandam uenerem ualentissimus. De Ferulis la- tius differuit Theophrastus libro VI. cap. II. de plantarum hi- storia ubi ita scribit. Ferulaceum genus in plures spargitur spe- cies. Sed primum de eo, quod commune omnium constat, dicen- dum est, scilicet de Ferula, atq; Ferulagine: seu idem genus am- babus, differens magnitudine tantum: seu etiam alterum sit, ut nonnulli putarunt. Ergo natura earum, quæ conspici possit, con- similis certè sentitur, præterquam ratione magnitudinis. Ferula enim grandis admodum surgit, Ferulago autem humilis. sed uni- caules ambæ, & geniculatæ sunt. Folia, & cauliculi quidam, geniculis erumpunt, ac alternatim exeunt folia: alternatim in- permutatim, caulem magna ex parte amplexa, sicuti arundinea- quam, quod non ex eadem parte geniculorum, sed proueniunt, nisi quod deflexa hæc magis, mollitiæ, magnitudinisq; causa. Folium enim grande, molle, multifidum, ut capillamenti modo ferè inspicitur: maxima, quæ terræ proxima sunt, & reliqua subinde ad portionem. Flos meli- us: semen obscurum, anetho simile, sed maius. Finditur cacumine, & instipites quosdam haud magnos dispergitur; stat, & germinatio in uere primum foliorum, tum caulis, ut etiam in cæteris fieri solet. Radice altè descendit, ea- demq; singulari inuitur. Talis Ferula est. hæc Theophrastus. Porro Ferula (ut Plinius est auctor lib. XXIII. cap. primo) æsinis gratissima sunt in pabulo, cæteris uero iumentis præsentaneo ueneno. qua de causa id animal Li- bero patri assignatur, cui & ferula. Natura Ferularum (ut idem Plinius libro XX. cap. XXIII. testatur) mure- tum amplitudinem grandescere, scripsere quidam. In insula quadam ex fortunatis nomine Morion, si ferulas in arbo- rantur. Ferula meminit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquires. Ferula semen ex calfa- cia, & attenuat. At interna eius pars recentis adhuc, quod medullam uocant, adstringentem qualitatem partici- pat. Cuius nomine sanguinem stentibus, & cæliaci conuenit. Νάρθηξ Græcis, ex planta uocatur, quæ Latinis Ferula: Itali, Ferola: Hispanis, Cananheia.


Ferulæ histo-  
ria.Ferulæ uires  
ex Gal.

Nomina.



## Peucedanum.

## Cap. LXXVII.



rapurgat, & vetera cicatrice obducit: squamas ossium exatrahit. In cerata, & calfacientia malagma additur. Radix eligi debet recens, quæ cariem non senserit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amaris amygdalis, aut ruta, aut pane calido, aut anetho resoluitur.

Peucedani  
consid.

QUONIAM nullis prorsus foliorum, ac seminis, & paucis admodum floris notis Peucedanum representavit Dioscorides, utpote plantam, quæ omnibus fortasse suo tempore notior erat, quàm ut longiore descriptionem posset laret: idcirco nobis quidem perdifficile esse iudico, discernere quòdnam genus herbe hodie in medium afferri possit, quæ legitimum Peucedanum referat: præsertim cum Theophrastus, Plinius, Apuleius, ac antiquorum alij, qui simplicium historiam descripserunt, plura, quod legerim, de Peucedano memorie non prodiderint. Veruntamen cum scribat Dioscorides, Peucedanum nasci coma statim à terra copiosa, ac spissa, hinc planè coniectandum videtur, Dioscoridem ipsum innere, quòd Peucedanum constet multis folijs, capillaribus; tenuibus, ac longis, fœniculi, aut anethi effigie. Huic coniecturæ illud etiam accedit, quòd cum Peucedanum, Dioscoridis testimonio, florem proferat melissæ, siue luteum, non temerè credendum arbitror, hunc non in alio, quàm in umbella sustineri, cum omnes ferulaceæ stirpes, & quæ fœniculo, & anetho similes habentur, cuiusmodi sunt, quæ hoc in loco à Dioscoride recensentur, ubi bellas in caulium cacuminibus gignere conspiciantur, è quibus semen prodit fœniculi modo. Quòd si ita se res habet (ut equidem existimo) asserere non dubitauerim, ne sepe numero Peucedanum uidisse in Ananienfibus montibus, ubi huiusmodi plantæ frequentissimæ proveniunt, quæ non solum prædictis notis Peucedano ad stipulantur; sed etiam radice, quam habent nigram, crassam, succi plenam, graviterq; olentem. In hac itaq; sententia persistam, ut hanc herbam, quam etiam pictam damus, verum Peucedanum putem, donec aliam nactus ero, quæ certioribus notis illud exprimat. Ceterum radices, quibus pro Peucedani radicibus vulgò officine utuntur, legitimas eminentur, nam præter id quòd exteriore parte non nigricent, nulla graueolentia, nullaq; acris facilitate sunt præditæ. Cuius verò plantæ hæc sint radices, ego quidem proferre non possum: eas siquidem hætenus non nisi siccas, & sine caule, ac folijs mihi videre licuit. Prætulit Dioscorides Sardonium Peucedanum, quòd non magno quidem negotio ad nos adduci posset, cum frequens, nec longa sit mercatoribus in Sardiniam navigatio. Vnde seplastarijs, si rerum legitimarum studio caperentur, facillè Peucedani radices conuherentur. Peucedani meminit Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum, ubi de eius viribus differt in hunc modum. Peucedani radice quidem maximè, sed tamen etiam succo, & liquo utuntur. Sunt autem hæc omnia eiusdem specie facultatis: sed ualentior succus, admodum exaltescens, & digerens. Quare affectibus omnibus circa nervos consistentibus conuenire creditur, tum morbis in pulmone, & thorace ex crassitudine, & viscositate humorum provenientibus. Atque intrò quidem in corpus sumptus, sed tamen etiam

Peucedani vires  
ex Gal.



etiam olfactu prodest. Porro quod incidat, & extenuet, sæpe etiam dentium perforatorum dolores cavitati inpositus protinus sedauit, quia uidelicet tenuium est partium, & excalfactorius. Quinetiam lienes induratos iuuat, nempe incidendo, digerendo, atque extenuando crassos humores. Sed & radice ad hæc uti licebit: quæ & squamas ceteris remedium est optimum arida illita: ipsa enim expurgat, carnem gignit, & ad cicatricem perducit. Excalfacit quidem ordine secundo iam completo: desiccatur uero tertio iam incipiente. Planta, quæ πευκεδάριος Græcè, *Peucedanum* Latine dicitur: Arabicè, *Harbatum*: Italicè, *Peucedano*.


Nomina.

## MELANTHIVM SATIVVM.



Gith, seu Melanthium.

## MELANTHIVM SYLVESTRE.



Cap. LXXVIII.

**GITH** exilibus furculis fruticat, sæpe binos dodrantes excedens: folijs, ut senecionis minutis, sed multo tenuioribus: capitulo in cacumine tenui, paruo, ceu papaueris, oblongo, intercurfantibus intus membranis: quibus semen includitur nigrum, acre, odoratum, quod panibus inspargitur. Capitulis doloribus illitum fronti, subuenit. discutit recentes oculorum suffusiones, tritum extitum, & infusum naribus: tollit lepras, lentigines, duritias, tumoresque vetustos, cum aceto illito, & teda decoctum, & collutum prodest. teretes ventris tineas expellit, peruncto ex aqua umbilico. destillatione laborantes adiuuat, tritum in linteo, & olfactum. Vrinam, & menstrua ciet, multo diebus sumptum, & lac extrahit: difficultatem spirandi cum vino potum, leuat: phalangiorum moribus ex aqua, drachmæ pondere, haustum auxiliatur. Incenso serpentes fugantur. Tradunt largius epotum enecare.

**GITH**, quod Græci Melanthium appellant, officinis *Nigella* uocatur. Legitimum folijs est minutim incisis, ramulis tenuibus, capitulis in summitate oblongis: in quibus semen includitur nigrum, intercurfantibus membranis distinctum, acre, ac odoratum. Seritur in hortis, & uiridarijs, atque etiam in alijs locis satum provenit. Quod cum antea nos probè animaduertissent *Hermolaus*, & *Ruellius*, assenserunt omnino hallucinari eos, qui putant eam stirpem legitimum Melanthium esse, quæ inter segetes in aruis passim nascitur, folijs ferè porri: caule prælongo, hirsutoque. flore purpureo, rosæ parue effigie. Et rectè mea quidem sententia, iudicarunt: siquidem herba illa cum *Dioscoridis* historia quàm maxime pugnat, utpote quæ folijs, caule, ac floribus, nulla ex parte Melanthium referat, sicuti neque etiam semine. quod etsi nigram Melanthij modo gignatur; non tamen gustui aliud representat, quàm amaritudinem

Melanthij cōsideratio.



Brasauoli er-  
ratum.

Melanthium  
sylvestre.  
Pseudome-  
lanthium.

Melanthij ui-  
res ex Gal.



Nomina.

factione est opus; præstantissimum id remedium est. Melanthium quoque & Gith Latini dicunt: Mauritani, Xamin, Sunis, seu Sunizi: Itali, Melanthio: Germani, Schuuartz roemisch, & Schuuartz conriander: Hispani, Neguillia, & Alipiure: Galli, Pourelle, & Nielle.

## Laserpitium.

## Cap. LXXTIII.

**LASERPITIVM** in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur: caule ferulaceo, quem mar-  
spetum uocant: folijs apio similibus: lato semine. Radix excalfacit, in cibis agrè concoquitur,  
ueticæ noxia. Sugillatis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum cerato, medetur: ischiadicis  
conuenit cum irino, aut cyprino cerato: excrescentibus circa sedem tollendis illinitur, cum puta-  
mine mali punici, & aceto decocta. Venenis pota resistit: os commendat, cibis, aut sali permista.  
Laser è radice, atque caule scarificatis colligitur. Præfertur autem rufum, translucens, myrrhæ a-  
mulum, non porraceum, odore ualens, suauis gustu, quod dilutum faciliè albescit. Cyrenaicum si quis  
de gustauerit, humorem toto corpore ciet: blandissimo odore, aded ut ne os quidem gustanti nisi pau-  
lulum spiraret. Medicum, & Syriacum minus viribus valent, & magis uirosum reddunt odorem. La-  
ser omne antequàm siccet, adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento. quod maleficium deprehen-  
ditur gustu, odore, uisu, & dilutione. Caulem aliqui silphion, radicem magudarin, & folia inaspe-  
ton uocauere. Efficacissimum laser, mox folia, postremò caulis. Acrem uim habet, inflationes fa-  
cit:



cit: perunctas cum aceto, pipere, & uino alopecias sanat. oculorum aciem exacuit: & incipientes suffusiones, illitum cum melle, dissipat: cauernis dentium in dolore inditur, aut cum thure in linteo circumligatur, aut cum hyssopo, & ficis coctis in posca, os colluitur. ijs prodest, quos bestia in rabiem efferata momorderit, vulneribus immisum. Valet aduersus venena telorum, & animalia omnia, quæ uirus eiuculantur, potum, aut illitum: scorpionum plagis olco dilutum circumlinitur. gangranis ptæcoercitis immittitur: & cum ruta, nitro, & melle, vel per se carbunculis. Clauos, callosque prius circumrasos uellit, cerato, aut aridorum ficuum carne præmollium. Recentes lichenas ex aceto sanat: & exfrescentia in carne, polyposque, si aliquot diebus cum atramento sutorio, aut ærugine illinatur. exuberantia cum forfice extrahit. Veteribus faucium scabritijs opitulatur: grauem, subitoque irrauescentem uocem, dilutum aqua, sorbitione confestim expedit: uiam illitum cum melle reprimic: anginis ex aqua mulsâ vtilissimè gargarizatur. Vescentes lætiore colore mangonizat: tussi comòdè in sorbili ouo datur, & pleuriticis in sorbitionibus: in fellis suffusione, & aqua inter cutem, cum aridis ficis. Horrores discutit cum uino, pipere, & thure potum. neruorum contractionibus, opisthotonicisque datur oboli pondere deuorandum. hærentes gulæ hirudines, gargarizatum cum aceto decurrit. Ad lac inrus coagulatum bibitur: comitialibus ex aceto mulso proficit: menses ciet, cum pipere, & myrrha potum: celiacos adiuuat, in acino uix sumptum: cum lixiuio autem potui datum, re-pentè conuulsis, ruptisque prodest. ad potiones resoluitur amygdalis amaris, aut ruta, aut calido pane. Foliorum succo eadem præstantur, sed multò inefficacius. Cum aceto mulso manditur, ad expediendam arteriam, maximè cum uox retunditur. Eo cum lactucis utuntur, exitque in uicem erucae. Fertur & altera magudaris in Libya nasci, radix laserpitio similis, sed minus crassa, acris, & fungosa, ex qua non profluit succus. Eiusdem cum laserpitio facultatis.

CREDIDIMVS laudandum Laserpitij lacrymam nihil aliud esse, quàm illud iucundi ac suauis odoris gummi, quod pharmacopœis atque unguentarijs Belzoinum nominatur. Neque certè hætenus præter rationem in ea per-sistimus opinione. nam cum id mihi deprehenderetur odoratum, rursus foris, intus candidum, translucens, & quod dilu-tum albesceret, non poteram non adduci, ut crederem hoc esse legitimum Laser. Huc illud quoque accedebat, quòd complures erant uiri docti & rei medicæ studiosi, qui idem mecum sentiebant. Verùm cum postea cœpisssem Laserpiti-jac Laseris historiam diligentius examinare, atque plura ex Strabone, Theophrasto, Dioscoride, Galeno, & Plinio collegisssem, quæ priori nostræ opinioni aperte aduersari uidebantur, faciliè in aliam deductus sum sententiam. etenim ac animum induxi meum, ut malim ueritati cedere, quàm pertinaciter (quod multi faciunt) falsa tueri. Strabo itaque libro ultimo Geographiæ testatur, Silphium suo usque tẽpore Cyrenis defecisse, his uerbis. Cyrenis finitima est regio, quæ silphium gignit, & Cyrenaicum succum, quem Silphium posterius effert. Id propemodum defecit, cum aliquan-do barbari odio quodam ingruissent, ac radices eius penè omnes eruiissent. Fuernnt hi Nomades uiri. hæc ille. At Plinius Cyrenai succi defectum non in barbaros ut Strabo, sed in publicanos quosdam refert lib. xix. cap. iiii. ubi de eo ita scribit. Ab his proximum dicitur auctoritate clarissimum Laserpitium, quod Græci silphion uocant, in Cyre-naica provincia repertum: cuius succum uocant Laser, magnificum in usu, medicamentisq; & ad pondus argenti de-narij pensum. Multis iam annis in ea terra non inuenitur, quoniam publicani, qui pascua conducunt, maius ita lucrum sentientes depopulantur pecorum pabulo. Vnus autem caulis nostra repertus memoria, Neroni principi missus est. hætenus Plinius. Huic uerò cum Theophrasto fermè conuenit, quòd hic scribat pecus silphio purgari, pinguescereq; uehementer, & carnes mirabilem in modum suauis reddi. Cum igitur Strabonis & Plinij testimonio constet, Silphium Cyrenis eorum usque ætate defecisse, neque inibi inueniri, nil mirum uideri debet, si nostra etiam tempestate defecerit, atque nullum iam ad nos aduehatur, quod legitimum dici possit. Quare id gummi, quod seplasse Belzoinum dicunt, meo quidem iudicio, uerum silphij liquorem mentietur potius quàm sit. Sed his illud quoque addamus, quòd Strabo au-tor est, Silphium adeo Cyrenensibus olim custodibus fuisse asseruatum, ut inde aliò deferri non potuisset, nisi clam à mercatoribus, qui uinum asportabant. Plinius item Silphium ad pondus argenti pendi solitum tradit. quin & tanti fa-ctum fuisse à Cesare, ut illud inter aurum argentumq; protulerit ex ærario. Ex quibus omnibus haud infirmum argu-mentum sumi potest, quòd Belzoinum nostrum non sit Silphij liquor. quandoquidem id quotidie copiosum importatur non solum in Italiam, sed in uniuersam ferè Europam. Ad hæc cum Dioscorides Cyrenaiico succo uim acrem tribuat, atque Galenus eundem & calidissimum, & maximè tenuium partium faciat, non equidè uideo, quomodo uulgare Bel-zoinum possit legitimum Laser exprimere: quoniam illud nullam prorsus gustantibus acrimoniam relinquit. Præte-rea ualidi cortices, qui plerumq; Belzoimo implicati reperiuntur, arguunt id arboris magnæ potius, quàm serulacæ plantæ lacrymam esse. Quod etiam nuper retulit mihi quidam medicus Cyprius, qui Belzoinum nostrum in Cypro ex arbore satis procera manare affirmauit: ubi tamè Silphium nasci qui memoriæ prodiderit, hætenus inueni neminem. quemadmodum neque in Ionia, neque in Peloponneso id gigni, sed prope Cyrenas tantum, literis mandauit Hippocra-tes. Atqui illud nobis obijciat aliquis, quòd Laserpitium non modò in Cyrenensium agro quondam prouenerit: sed etiam ad nos aduehi possit. Nos huic ita faciliè respondebimus, quòd Silphij illius liquor ad nos adferatur quidem, sed qui fetidus sit, uirosq; odoris: atque eum esse dixerim, quem officinæ medicorum Assam fetidam uocant. Namq; Laser (ut Dioscorides testatur) Medicum, & Syriacum minus uiribus ualet, & magis uirosam reddit odorem. quinetiam, eodem teste, Laser omne antequàm stecescat, adulteratur sagapeno, aut fabæ lomèto. id quod post ipsum scriptis tra-didit Plinius libro superius citato. Quocirca mihi quidem uidetur non temerè colligendum esse, quòd præstantissimū Laser,

Laserpitij seu  
Laseris con-  
sideratio.



Opinio quo  
rundam ex-  
plosa.

Laserpitij hi-  
stor. ex Theo-  
phasto.

Laserpitij ui-  
tes ex Gal

Nomina.

Laser, quale Cyrenaicum habebatur, à nobis omnino desideretur. Caterum quid ueteribus fuerit gummi illud ele-  
gantissimum, quod Belzoium appellant, mihi haecenus incompertum est. In qua certe re non possum eorum opinio-  
ni subscribere, qui id in putant esse probatissimam myrrham. Hæc siquidem, quæ optima sit (ut Dioscorides inquit) præ-  
ter alias notas esse debet undique concolor, quæ confectas uenas unguini modo candidas & lenes ostendat, minutis  
glebis, amara, & acris. quas tamen notas in Belzoio haudquaquam reperies. Nam etsi undique maculis confersa  
tur, tamen fractas amygdalas repræsentat magis, quàm unguini quorumuis imaginem. Qui & maculæ ille tam in-  
teriores, quàm exteriores partes obsident, adeo ut Belzoio gleba nihil aliud referat, quàm delibratarum amygdala-  
rum aceruum, copioso melle exceptum. Adde insuper, quod nusquam, quantum equidem inuenerim, memorie pro-  
ditum est, myrrham in Cypro & Syria suis à plantis emanasse, sed in Arabia duntaxat (ut perhibent Theophrastus,  
Dioscorides, & Plinius) in syluis, in quibus thus etiam prouenit. quanquam Plinius myrrham quandam ex India  
adferri tradit, quæ omnibus myrrhæ generibus deterior est. Sed quoniam non inuincendam, quauis longam, de La-  
serpitio historiæ tradidit Theophrastus lib. VI. cap. III. de plantarum historia ideo eius uerba hic subijciam. De La-  
serpitio, inquit, nunc indicandum est. Laserpitio radix multa, crassaq; : caulis quantus ferule, & crassitudine feræ  
proximus : folium, quod maspetum uocant, apio simile est : semen latum, foliaceum, quale quod folium appellatur : cane-  
lis annuus, sicut ferule. Ergo uere incunte maspetum hoc exit, & pecus eo purgatur, pinguescitq; uehementer, &  
carnes mirabilem in modum suaves redduntur. Posthac caulem edit hominum cibo idoneum omnibus modis, elixum,  
assumq; : corpora eo quoque purgari ferunt, quadraginta diebus. Succus capitur duplex, alter ex caule, alter ex ra-  
dice : qua de causa alterum scaparium, alterum radicarium uocant. Radix nigro cortice tegitur, eumq; decubere so-  
lent. Suaueluti certæ mensuræ cadendæ radicis, quibus quantum conferre putetur ad futuram cæsura referantur  
tes, reliquum abscindunt. Nec enim deuic, neq; plus constituto cadere licet : corrumpitur enim, putrescitq; : si diu  
mansit. Preparant id, conficiuntq; in Pyræum portum aduectum hoc modo. Cùm in uasis coniecerint, perdur-  
admisuerint, quantant longo spatio temporis : hinc etiam colorem capessit, & conditum iam incorruptum mittit in  
Preparatio, cæsuraq; ita se habet. Locum Aphricæ amplum occupat, ampliorem, quàm quatuor stadiorum milita in  
hortis Hesperidum ferunt. Sed maiorem partem colligi apud Syrtis. Peculiare huius culta fugere loca prodit  
quamobrem, si colatur mitescatq; : solam, deniat, atque omnino degenerat : utpote natura culturæ asperans, ferocis-  
tatisq; constans uernaculum. Cyrenenses annis septem prius, quàm ipsi urbem habitarent, Laserpitium existisse as-  
firmant. Habitant uerò annos maxime trecentos usque ad Simonidæ Athenis magistratum. Illi sic referunt. Alij  
radicem Laserpitij cubitalem fieri tradunt, aut paulo maiorem. Hanc in medio extuberare in caput, quod sublime po-  
nitur extat, ut ferè super terram esse appareat. Vnde primum quod lac appellant, erumpit : dein caulis assurgit, ex  
quo magydaris, & quod folium dicitur, exeunt. Folium id semen est, quod cùm auster ingenuè post caniculam flauere  
rit, discutitur : atque ita Laserpitium nascitur, eodemq; anno radix consummatur, & caulis. Sed hoc haud quicquam  
peculiare notetur : nam alijs quoque idem tribuitur. ni dixeris, quod discussum id protinus nasci potest, ortum pecus  
liarem sortiri, supradictisq; propterea diuersum accipi posse. Ad hæc circumscribendum id annum censent. Nam si  
relinquatur semen omne, caulemq; totum proferri, & deteriora tam hæc, quàm radicem reddi existimant : decessu au-  
tem fieri meliora, scilicet solo subactis, beneq; glorio. Sed huius contrarium illi uolunt, qui culta recisare id inquit.  
Mandi quoque radices in aceto recens decisas referunt. Folium colore aurum amulatur. Contrarium etiam, quod pe-  
cora filio editato purgari minime indicant. Nam & uere, & hyeme, pecus ad montem dimitti affirmant : eibus non  
solum hoc : sed etiam altero quodam abrotono simili administratur. Vim ambo calefactoriam sortiri plane uidentur,  
& purgare quidem nequaquam ualere : exiccare autem, & concoquere unice posse. Quod si qua pecus & gregescent,  
aut alias minus bene se habens ingressa sit, mox eam sauari, aut emori aiunt, sed magna ex parte posse seruari. Hæc  
igitur utro tandem sint modo, querendum. Quod uerò Magydarium uocant, uimurum à Laserpitio differt : tenerius  
enim, minusq; uehemens, & sine Lasere est. necnon & aspectu manifesta experto homini constat. Nascitur in Sy-  
ria : nam apud Cyrenam, & monte Parnaso largè prouenire eandem affirmant. Sed quidam Laserpitium id appella-  
lant : An culta id quoq; modo Laserpitij fugiat, querendum. Quin & si quid simile, aut proximum habeat, ad folij  
caulisq; rationem, & si quam ullo pacto emittat lacrymam, id inuestigandum. Ergo naturam ferulaceam, hisce con-  
templari oportet. hæc Theophrastus. Meminit Galenus Laserpitij libro VIII. simplicium medicamentorum, &  
inquiens. Laserpitij succus calidissimus est. Verum eniuuero & folia, & caulis, & radix sat strenuè excoalsciunt.  
Sed omnia flatulenta magis essentie sunt, ac proinde concoctu difficilia. Foris tamen imposita corpori efficaciora  
quandam uim quandam propter prædictam eius temperiem obtinet. Laseris quoque mentionem fecit, idem Galenus li-  
bro citato, sed antea seorsum, & sub absoluto ὀνόματι, hoc est, succi titulo, ita scribens. Opus, siue succus Cyrenæicus  
quidem omnium & calidissimus, & maxime tenuium partium est : ac proinde omnium maxime discutit. quanquam sa-  
ne & reliqui admodum calidi sunt, & spirituos : siquidem plurima eorum pars essentie aeris est, & ignis. Porro  
complures habentur succi : quauis namque radice incisa, aut caule, quod ex sectione crassum, ac lentum effluit, suc-  
cus est. Caterum specialius, & uelut per excellentiam quandam Cyrenaicum ita nuncupant, & Medicum, & Laserpitio-  
cum. Planta, quæ Grecis λάρπιον, Latinis Laserpitium appellatur : Mauritanis, Silfion : Italis, Laserpitio-  
Eius caulis μάσπετον Grecis dicitur : Arabibus, Mascastes. Folia uerò quandoque μάσπετα, Grecè dicuntur :  
Arabice, Aniden, & Mascasten. Liqueur seu lacryma Grecis λάρσπος, Latinis Laser nominatur. Radix μαγδα-  
ρίσις Grecis uocatur.



## Sagapenum.

## Cap. LXXIX.

**SAGAPENVM** ferulaceæ herbæ succus est, quæ in Media nascitur. Optimum est translucens, saluo forinfecus colore, & intus albo, nescio quid inter laser, & galbanum redolens, gustu acris. Prodest laterum, & pectoris doloribus, tussibus uetustis, conuulsis, & ruptis. crassam pulmonis pituitam expurgat. Datur comitialibus, opisthotonicis, lienosis: item contra neruorum resolutionem, perfrictiones, & febrium circuitus in potu. In unguenta probè admittitur. menses pellit, sed sætum exanimat, cum hydromelite potum. Prodest ex uino haustum, serpentium ictibus. olfactum ex aceto uuluarum strangulatus excirat: oculorum cicatrices, offusam caliginem, hebetudines, suffusionesq; detergit. Resoluitur ut laser, ruta, aqua, & amaris amygdalis, aut melle, aut calido pane.

**SAGAPENVM** officinæ interpolato uocabulo Serapinum appellant. Cæterum etsi eius adulterati frequentior, & communis ferè sit usus: tamen Venetijs præstantissimum quoq; uenditur, idq; illi præcipue comparant seplastarijs, qui honorem diuitijs anteponunt. Ferulaceas plantas, è quibus Sagapeni lacryma emanat, etiam in Apuliana sci auctor est Musa Ferrariensis. Id quod equidem hactenus compertum non habeo. Ex orientalibus siquidem regionibus allatum, ut constat, cæteris præstat. Arabica familie auctores inter deiectoria medicamenta Sagapenum referunt: quanquam ea Sagapeni facultas, quantum extat, à Græcis silentio prætermissa est. Sagapenum itaque (ut Mesues tradit) crassos, lentosq; humores deiecit, crassamq; pituitam, & aquam intercutem educit. Porro facultate quidem propria cerebrum mundificat, ac neruos, crassaq; ab his excrementa detrahit. Confert item eorum morbis frigidis, nempe doloribus capitis diuturnis, hemicranijs, comitialibus, uertigini, paralyti, orisq; distentioni. Pectus ualentissimè expurgat, eiusq; ac etiam lateris dolores tollit, præsertim si bibatur ex helenij, aut rutæ decocto. Foris emplatri modo impositum, aut intus assumptum tussi diuturna uexatis, ac difficulter spirantibus, opem maximam fert. Aqua intercute laborantibus singulare remedium est, si tamen flauis myrobalanis duplicato pondere additis exhibetur. Discutit compaginum duritiem emplatri modo impositum, addito aceto, & capparum succo. Rutæ succo, et auium rapacium felle diutius maceratum, & in collurijs additum oculorum caligines disijcit, aquamq; in eos defluentem cohibet. Palpebrarum item hordeolos uocatos sanat, si cum aceto superponatur. Articulorū compaginibus quomodolibet admotum, dolores eorum mirificè sedat: quippe quoniam ualentissimè humorum lentores in his cruciatus excitantes radicitus euellit, etiam si in coxendicum aliarumq; partium remotis, profundisq; locis ij delitescant. Potum, aut clysteribus iuditum coli doloribus à frigiditate, ac flatibus prouenientibus maximè auxiliatur. Menses cit, sed sætum interficit, tam haustum, quam suppositum: contra uteri dolores, strangulatusq; prodest. Ventriculo tamen officit: uerum noxa corrigitur lentiscina resina, & Indica nardo. Sagapeni meminit Galenus lib. viii. simplicium medicamentorum, ubi de eius uiribus disserit ijs uerbis. Sagapenum liquor est calidus, et tenuium partium, siue & alij liquores. Sed & abstersionem quandam possidet, qua oculorum cicatrices expurgat, atq; extenuat. Quin & suffusionibus, & hebetudinibus oculorum, quæ ob humorum proueniunt crassitiem, non malum est medicamentum. Porro planta ipsa, ex qua prouenit, ferulæ assimilis, imbecilla, & inutilis est. Sanè ipsa priuim Sagapenum appellatur. At liquor eius abusiue hoc nomen obtinet, eeu alia quoq; multa ex nominis defectu per abusum nuncupamus. Per hæc namque foret ipsum cognominare non Sagapenum, sed Sagapeni succum. Id σαγαπεννον Græcis dicitur, quod Latinis etiam Sagapenum: Arabibus, Sachabenigi, siue Sechbinegi: Seplastarijs, pariter & Hispanis, Serapino: Italis, Sagapeno.

Sagapeni cōsideratio.

Sagapeni uires ex Mesue

Sagapeni uires ex Gal.

Nomina.

## Euphorbium.

## Cap. LXXX.

**EUPHORBIVM** Libya arbor est, ferulæ speciem habens, quæ in Tmolo iuxta Mauritaniam inuenitur. Ea acerrimo succo turget. Cuius eximium feruorem expauescentes incolæ, ouillos uentres elutos, arbori circumligant, & minus caulem contis incidunt, confestimq; è plaga, perinde atque uase quodam, in uentriculos copiosus lactis humor effluit, præter id quod humi sparsum, uulnus cicculatur. Duo succi genera: vnum orobi magnitudine, sarcocollæ modo emicat: alterum in uentriculis concreuit, atque uitreum spectatur. Eligendum est translucens, & acre. Euphorbium adulteratur sarcocollæ, & glutini mistione. Sed difficile quidem experimentum: quippe cum leui gustu, os accensum diu detineat, aded ut quicquid ori obijciatur, planè Euphorbium resipiat. Eius inuentio tempore Iubæ regis Libya cognita extitit. Succus illitu suffusiones discutit. potus tota die exurit: quare melli, collurijsq; pro acrimoniæ ratione admisceri debet. Coxarum doloribus prodest in odorifera potione haustus. squamas ofsium eadem die eximit: uerum eo utentes, necesse est linamentis, aut ceratis communire corpus, quo ossa conuestiuntur. Aliqui memoriæ prodiderunt, percussos à serpente nihil molesti passuros, si incisa osse tenus capitis cute, intritus succus infundatur, uulnusq; postea consuatur.

NON equidem dubitandum censeo, quin illud legitimum sit Euphorbium, quo passim officinæ utuntur, cum tam gustu, quam olfactu acerrimum deprehendatur: ob cuius uolentissimam acrimoniam nunquam, nisi inuito animo, à seplastarijs

Euphorbij cōsideratio.

N



Euphorbij vi  
res ex Aetio,  
& Actuatio.

Euphorbij vi  
res ex Mesue.

Ex Galeno.

Nomina.

plastris tunditur. Quandoquidem tametsi sibi uares, & os omni prorsus iugenio gossipio, & linteis aqua rosaria madefactis muniant; tanta tamen est acrimonia uis tenuissima, ut omnibus una cum aere penetratis munimentis, in eorum tandem perueniat nares, ubi molestissimum excitat ardorem, qui non facile tollitur: quanquam etiam medicamentis admodum refrigerantibus succurratur. Quo fit, ut solertissimi pharmacopole baulis, ac alijs uictum quareuibus hominibus id inueneris obeundum tradant: interim tamen certo sciunt, non absque conuitijs, & maledictis opus hoc ab illis peragi posse. Quamobrem mirum sane non fuerit, si qui ab arbore recentem colligunt; eximium acrimoniae feruorem expauescentes, & longinquo corticem feriant. Hanc plantam (ut Plinius quoque testis est) adinuenit primum Iuba Libyae rex in monte Atlante ultra Herculis columnas appellauitque; Euphorbiam medici sui nomine, & fratris Musesa quoque diuus Augustus fuit conseruatus. Euphorbio deiectoria inest facultas. cuius uisquam, quod equidem inueniuerim, inuenire Dioscorides, & Galenus: tametsi eam uinime silentio inuoluerint Aetius, & Actuarius, qui cordes de eo his uerbis differuerunt. Euphorbium non modo pituitam trahit; sed etiam aquam, hancque ualidius educit. Est autem acerrimum omnium, quae ego nouerim, ardentissimumque: propterea colicis, & uentrem frigidiores habentibus datur. ceteros uehementer conturbat: sitim maxime cit. Nihil ex odoratis seminibus ei est commiscendum. Modus triobolaris, ex aqua mulsae. Praestat tamen cum melle cocto ipsum in catapotia redigere. Id quod etiam Paulus annotauit libro septimo, ubi inter ea Euphorbium recensuit, quae aquam, et pituitam deiciunt. Verum in simplici censu, Dioscoridem, Galenumque secutus, de hac deiectoria facultate ipse quoque nihil memoriae prodidit. Ceterum inter Arabes Mesues fufius Euphorbij uires tradidit in soluentium medicinarum mentione, ubi ita, ad sensum saltem scribit. Euphorbium gummi est, quod usque adeo excofacit, extenuatque, ut in hoc cetera gummi genera praecellat. Excofacit enim ordine quarto: quo fit, ut exulceret, ruborem, inflammationemque inferat, penetret, & uiolenter abstergat. Euphorbium noxium admodum est medicamentum, ita ut non sine labore, animi despectu, ac sudore frigido alium deiciat. Iecineri ob id, uentriculoque sua ingenti acrimonia magnam infert uoxiam. Quapropter exhiberi minime debet, nisi prius ijs commisceatur medicamentis, quae acerrimam eius uim retundere ualeant. Extrahit potum a profundis corporis partibus tum crassam, tum lentam pituitam, mundatque compaginum cavitates a crasis contumacibus excrementis, quae in re omnium ualentissimum est medicamentum. Neros expurgat ab infarctis iandiu habitantibus. Proficat ad haec resolutis, conuulsis, stupidis, tremulis, orisque distentionibus, & ceteris neruorum morbis a frigore obortis, si ex leucoij oleo leuigatum exterius inungatur. Iocineri, lienique inunctum, mirifice eorum dolores tollit a frigore, & flatu prouenientes. Sternutamenta ualentissime cit. Occipiti autem confricatum, ueternosos, obliuiososque inuat. Aquam intercutem facillime extrahit duorum obolorum pondere potum. Sed drachmarum trium pondere haustum (ut Serapio, & Auicenna scriptum reliquerunt) potantem interficit, trium dierum spatio erosus ab eo intestinis, & uentriculo. Euphorbium, teste Mesue, quatuor edurat annis: neque eo prius utendum est, quam annus integrum consenuerit. namque recens ob ingentem acrimoniam reprobatur. Seruatur commodè milio, aut fabis, aut lentibus sepultum. Euphorbij facultates paucis perstrinxit Galenus lib. vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Euphorbium caustice, sive urantis, & tenuium partium facultatis est, alijs succis similiter. Et lib. ii. de compositione med. localium, cap. i. tradens curam hemicraniae, idem de Euphorbio ita scribit. Porro de euphorbij facultate iam mihi relatum est, quod cito exoluatur. quare in eiusmodi pharmaca non uetus conijcere oportet. Dicitur etiam recens albidius esse: quod uero inueteratum est, flauioris aut pallidioris coloris reddi. Planta, quae Graecis *Ἐφροβίον*, Latinis item Euphorbium nominatur, quemadmodum succus eius: Mauritanis, Euforbion, seu Farbium. Italics, Euphorbio: Hispanis, Alforuiam, Alforfion, & Eufornio: Gallis, Euphorbe.

## Galbanum.

## Cap. LXXXI.

GALBANVM succus est nascentis in Syria ferulae, quod nonnulli metopium uocant. Maxime laudatur cartilaginofum, metum, thuris effigiem praebens, pingue, minime lignosum, retinens nonnihil adiecti seminis, & ferulae, graui odore, neque ualde humidum, neque nimis aridum. Adulteratur faba fresa, resina, & ammoniaco. Galbanum excofacit, urit, extrahit, discutit: menses, ac partus trahit appositum, uel suffitum. Lentigines aceto, & nitro perunctas tollit. Deuoratur ad tussim ueterem, disticultatem spirandi, suspiria, rupta, conuulsa. Aduersatur toxicis, potum cum uino, & myrrha: simili modo sumptum mortuos partus extrahit. Imponitur lateris doloribus, & furunculis: comitiales, & uuluae strangulatus, & uertiginosos olfactu fuscitat. Si uratur, fugat nidore serpentes, & perunctos feriri non patitur. Serpentes cum oleo, & sphondylo circumpositum, necat: dentium dolorem oblitum, aut cauernis inditum, mitigat. urinae difficili prodesse existimatur. Resoluitur ad potiones amarissimas mygdalis, aqua, aut ruta, aut calido pane, mulsae uel alijs meconio, are usto, aut felle liquido. Si purgare Galbanum uoles, in feruentem aquam demittito. namque cum liquefactum fuerit, eius sordes fluitabunt: quas hoc modo facile separabis. Mundo linteis, raroque alligatum in fictili, aut area pyxide ita pendeat, ut imum uasis ne tangat: apertoque uase in feruidam aquam demittito: sic enim syncerum, ueluti per colum eliquescet, & lignosum in linteis remanebit.

Galbani consideratio.

QUANVIS legitimum, optimumque Galbanum in pluribus Italiae locis, praesertimque Venetiis uenale reperitur; id tamen quo passim officinae utuntur, nihil, uel sane parum Galbanum refert, quod in laudatissimi generis a Dioscoride representatur. Siquidem illud non modo ab impostoribus adulteratum est; sed etiam lignorum ferularumque ramentis, lapidibus, ac alijs compluribus excrementis uitiatum. Querant itaque probi seplastrarii, quod optimum est: alii



alijs uero, qui parsimonie, ne dicam auaritie student magis, quam honori, ut qui probatissimum uix nunquam assequi possint, id saltem, quod impurum est, purgare deberent à Dioscoride edocti. quippe quod ea ratione, facile ab aduentitijs sordibus expurgari possit. Galbani uires tradidit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Galbanum succus est plantæ ferulaceæ, molliendi, & digerendi ui. Fueritq; sanè ex tertio ordine excalfacientium incipiente, aut secundo completo: in desiccando uero ex secundo incipiente. Id Græci γαλβανόν, Latine Chalbani, & Galbanum appellatur: Arabicè, Chene, & Bezard: Italicè, pariter & Hispanice, Galbano.

Galbani uires  
ex Galeno.  
Nomina.

## Ammoniacum.

## Cap. LXXXII.

AMMONIACVM ferulæ succus est, quam iuxta Cyrenen Aphrica gignit: cuius fruticem cum radice agasyllim uocant. Probatur bene coloratum, ligni & calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. Hoc genus thrausma, id est, friaturam appellant: quod uero terram, & calculos collegit, phryama. Gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulaceæ arbore. Mollit, extrahit, calcit: tubercula, duritiasq; discutit. potum aluum soluit, partus extrahit: lienem consumit, drachmæ pondere hauustum: articularum, coxendicumq; doloribus liberat. Auxilio est anhelarioribus, orthopnoicis, comitialibus: item quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum pti- sanæ succo forbeat. Cruentam urinam pellit, albugines oculorum absterget, genarum scabritiam absumit: tritum autem cum aceto, & impositum, iecineris, lienisq; duritias sedat. discutit tophos, qui in artubus concalluerunt, cum melle, aut cum pice illitum. Lasitudines, & coxendicum dolores eo perungi utile est, cum nitro, & cyprino oleo, uice acopi.

AMMONIACI lacrymam officine, mutata una litera, Armoniacum uocant. Cuius tamen syncerissimæ partem ad nos conuehant, qui ex Alexandria Aegypti cum mercimonijs Venetias redeunt. Quandoquidem rarissimum Ammoniacum uisitur, quod suis minutis glebis thus referat. Nam omne ferè, quo officine utuntur, piceæ resinæ modo in massam compactum cernitur, impurum, ac quàm plurimis impostorum adulterijs uitiatum. Ut hinc facile dici possit putauerim, hoc uel illegitimum, uel saltem deterius esse, idq; fortasse, quod Dioscoridi phryama nuncupatur. Cuius etiam meminit Plinius lib. XII. cap. XXIII. ubi de Ammoniaco ita scribit. Ergo Aethiopiæ subiecta Aphrica Ammoniaci lacrymam stillat in arenis suis. Inde etiam nomen ab Ammonis oraculo, iuxta quod gignitur arbor, quam Metropon uocat, resinæ modo, aut gummi. Genera eius duo, thrauston masculi thuris similitudine, quod maxime probatur: alterum pingue, & resinofum, quod phryama appellant. hæc Plinius. Caterum Ammoniaco usi sunt antiqui (ut Paulus est auctor) in sacrificiorum odoramentis, ac suffimentis. In quem sanè usum illud ab ijs receptum fuisse consuevit, quod electissimum, & thuri persimile extitit. Huius rei illud maximo est argumentum, quod ab ipso Paulo, itemq; Aetio in suis medicamentis Ammoniacum thymiama, hoc est, suffimentum cognominatur, quasi Ammoniacum præstantissimum ita intelligere uoluerint. Ammoniaci meminit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Ammoniacum liquor est ferulæ cuiusdam. Hoc habet emolliendi facultatem intensam, adeo ut et articularum tophos dissoluat, & lienes induratos sanet, & choëradas discutiat. Quod Græci ἀμμωνιακόν, Latini item Ammoniacum dicunt: Mauritanii, Raxach, siue Assach: Itali, Ammoniaco, & Armoniaco: Hispani, Ammoniacum, & Armoniaque.

Ammoniaci  
consideratio.

Ammoniaci  
vires ex Gal.  
Nomina.

## Sarcocolla.

## Cap. LXXXIII.

SARCOCOLLA lacryma est arboris in Perside nascentis, pollini thuris similis, rufa, gustu amara. Vulnere glutinat, oculorum fluxiones inhibet. emplastris inferitur. Adulteratur admisto gummi.

LACRYMA hanc Sarcocollam dixere Græci, quoniam scuti glutinum lignum, ita hæc faciat, exulcerat, & ratamque corporis carnem agglutinet. Quæ autem ad nos aduehitur, non omnis legitima est: quippe quod ea plerumq; (ut de alijs quoq; pluribus lacrymis, resinis, & liquoribus fieri superius diximus) gummi, & alterius generis lacrymis adulterata referatur, & talis in officinis inueniatur. Verum fraus gustu facile deprehenditur. quandoquidè quæ amara non est, adulterium sensit. Plinius lib. XIII. cap. XI. albam cateris prætulit, sic inquit. Fit & ex Sarcocolla (ita uocatur arbor) gummi utilissimum pictoribus, ac medicis, simile pollini thuris: & ideo candidum, quam rufum melius. Et lib. XXIII. cap. XIII. idem ita scribit. Sunt qui & Sarcocollæ spinæ lacrymam putent, pollini thuris similem, cum quadam acrimonia dulcem. Cum uino tusa sistit fluxiones: illinitur infantibus. Vetustate & hæc maxime nigrescit, melior quo candidior. hæc Plinius. Qui tamen in Sarcocollæ historia à Dioscoride, & Galeno maxime dissentit, cum hi Sarcocollam gustantibus amaritudinem relinquere asserant, ille uero contra dulcedinem. Sarcocolla Mauritanis pituitosas cruditates, ac crassos, & glutinosos deiecit humores, præsertim qui in compaginat, & coxendicum cavitatibus delitescunt. Cerebrum mundat, item neruos, & pulmones: proinde tussientibus, & difficulter spirantibus auxiliatur. Est etiam ex medicamentis, quæ senes iuuant, præcipue pituitosos. Caluescenti tamen, qui frequentius ea utuntur. Præstat mirum in modum ad oculorum albugines, nubeculas, cicatrices, & id genus impedimenta.

Sarcocollæ  
consideratio

Sarcocollæ  
vires ex Ara-  
bibus.



impedimenta, si in cratere uitreo afinino lacte maceretur quinq; diebus: interea tamen nouum lac quotidie est infundendum, priore effuso. Vulneraria præterea penicilla hydromelite prius madefacta, ac inde Sarcocollæ puluere circumlita auribus exulceratis utiliter imponuntur. Cruentis uulneribus, ac diuturnis ulceribus mirifice medetur: quippe quæ proprio suo munere ea à sordibus mundet, carne repleat, cicatriceq; obducatur. Aluū tardè deijcit, perturbatq; eos, quorum uenter uile redundat: quare cauendum est, ne ijs exhibeatur. Roboratur eius deiectionis facultas, quæ gignere, & cardamomo additis. Hæc ex Arabibus deprompsimus. quæ sanè tam antiquis, quàm recentioribus incognita fuerunt, utpote qui ea nusquam, quod equidè legerim, scriptis tradiderunt. Sarcocolla uires retulit Galenus lib. viii. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. Sarcocolla lacryma est arboris Persicæ. mistam uim habet ex emplastica quadam substantia, & paucula amara. Itaq; citra morsum desiccatur, ac proinde glutinare uulnera ualet. Lacryma, quæ *σαρκόκολλα* Græcis, Sarcocolla item Latinis, & Italis appellatur: Arabibus, *انجاز* rot, Anazaron, seu Auzurut: Hispanis, *Lancarotes*: Gallis, *Sarcocolle*.

Ex Galeno.

Nomina.

## Glaucium.

## Cap. LXXXIII.

GLAUCIUM succus est herbæ, quæ ad Hierapolim Syriæ nascitur, folijs ferè corniculati papaueris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris tætri, gustus amari. tota croceo succo madet. Folia in ossa fictili semifrigridis clibanis calcaciunt indigenæ, usque dum flaccescant: deinde contusis succum exprimunt. Cuius est usus ad oculorum medicamenta, utpote cum inter initia refrigeret.

Glaucij consideratio.

GLAUCIUM medicorum, & officinarum uulgo, qui barbarorum, & Arabum nomina usurpare solet, Serapionis, & Auicennæ modo, Memithe dicitur. Id autem, quo passim seplastarij utuntur, in eo quidem iudicio, uerum sincerumq; Glaucium est. Quippe quod omnibus ferè notis, & facultatibus legitimo respondeat. Præter id enim quod facto periculo, oculorum utriusq; opitulatur; forinsecus rufescit, intus uerò croceo colore spectatur, et gustu amaro sentitur cum quadam graueolentia. tametsi pharmacopolas nonnullos quandoq; deprehenderim, qui è maioris chelidonij succo Glaucium conficiunt. Sed auinaduertendum est, quod in Serapionis codice, præter proprium Memithe caput, quod Dioscoridis est Glaucium, legitur etiam in capite de Curcuma (nisi fortasse interpretis fuerit lapsus) Chelidonium minus uocari Memithe. Quod in Serapione uel interpretis, uel alterius culpa, mendum subsit, inde mihi quidem orta est suspicio maxima, quod Dioscorides, cuius uerba ad unguem refert Serapio, Glaucij non meminisse Chelidonijs. Quo factum est, ut illi seplastarij deprauata Serapionis lectione decepti, in hunc & alterum errorem inciderint: quod non solum ex chelidonij suum Glaucium eliciant; sed etiam maius chelidonium minoris loco sumant, quandoquidem illud succum croceum mittat Glaucio similem. Glaucij facultates memoriæ prodidit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, sic inquires. Glaucium adstringit cum quodam fastidio. Tum adeo manifestè refrigerat, ut solum sepe erysipelata, utiq; si ualentia non fuerint, curare possit. Mistura eius composita est ex aqua terreaq; substantia: utraque sanè frigida, uerum non summè, sed ceu aqua fontana. *Γλαύκιον* sic Græcè, ut etiam Glaucium Latine dicitur: Arabice, Memithe.

Glaucij uires ex Galeno.

Nomina.

## Glutinum.

## Cap. LXXXV.

GLUTINUM, quod xylocollan, alij taurocollan uocant, præstantissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis corijs conficitur. Id candidum est, & translucens. Nigrum uerò minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines, leprasque cutis delet: ambustis igni ex aqua calida dilutum, illutumque pustulas erumpere non patitur. Vulneribus prodest melle, aut aceto madefactum.

## Piscium Glutinum.

## Cap. LXXXVI.

PISCIVM gluten, uenter est piscis cetacei. Prestat candicans, natione Ponticum, subasperum, minimè scabrum, & quod celerrimè liquefcit. Vtile emplastris capitis, & leprarum medicaminibus, & tetanothris, quæ cutem faciei erugant, & extendunt.

Glutini consideratio.

NEMO est, qui taurinum, & piscium Glutinum non cognoscat: quare hac in re non pluribus uerbis opus est. Verum sciendum, quod Glutinum taurinum hac ætate non modò è taurinis corijs conficitur; sed ex omnium quadripedum pellibus. Huius, neq; alterius non reperio meminisse Galenum in simplicium censu. quauquam inibi libro vi. illius glutinis librarij mentionem fecerit, quod ex polline farinæ, & muria paratur, sic scribens. Gluten, quod ad libros præparant ex similagine, & garo, emplastica, concoctoriaq; facultatis est, quibuscunque ipsum partibus illinas. Ceterum illud gluten, quod è piscibus fit, inter cætera simplicia Paulus quidem retulit, sed ea tantum ferè de eo scribit, quæ Dioscoridi accepta referri possunt. Id Græcis *κόλλα*, *ἐλκικόλλα*, & *ταυροκόλλα* uocatur, quod Latinis Gluten & Glutinum: Italis, Colla di carniccio: Hispanis, Colla, & Grudel. Quæ uerò Græcè *ἰχθυόκολλα*, Piscium glutinum Latine dicitur: Italicè, quemadmodum & Hispanicè, Colla di pesce: Arabicè utrunque gluten Zire, seu Gara nominatur: Germanicè, Leim: Gallicè, Colla.

Nomina.



## Viscum.

## Cap. LXXXVII.

**VISCUM** optimum est recens, intus porraceum, extrà fulvum, quod asperi nihil, aut fursuro-  
si conceperit. Fit t̄ acinis in quercu nascentibus, buxœ fruticis folio. Contusum acinum lauant, &  
postea in aqua decoquunt. Sunt qui commanducando ipsum efficiant. Gignitur quoque in malo,  
pyro, & plerisque alijs arboribus. quinetiam inuenitur in quorundam fruticum radicibus. Emol-  
lit, discutit, extrahit. parotidas, tubercula, cæterasque collectiones ad maturitatem perducit, cum re-  
sina & pari cera mistum: epinyctidas in splenio sanat: uetera ulcera, abscessusque, quos cacoethes uo-  
cant, ex thure mollit. Lienem cum calce, gagate, aut Asio lapide coctum, & impositum absmit: cum  
sandaracha, aut auripigmento illitum, ungues extrahit. mistum cum calce, & uini fæce, suam uim  
intendit.



**VISCUM** fit pluribus, ac diuersis modis. Verùm omnium præstantissimum est, quod e' grauis in quercu nascen-  
tibus conficitur. Huius præter id, quod inualidum in pyris, malisq; nascitur, ingens in Hetruria prouentus. Siqui-  
dem inibi non modo in quercu laudatissimum prouenit, sed etiam in cerro, ilice, & castanea, in nostris præsertim  
maritimis Senensibus, ubi uastissimæ assurgunt syluæ, quæ non paruo pretio ijs locantur, qui uiscum efficiunt. Scan-  
dunt autem illi arbores immensas, non sine magno uitæ suæ periculo, sepiusq; funibus adalligati id muneris in aere pẽ-  
dentes obcunt. Grana, quæ legerunt, in aqua decoquunt, donec disrumpantur: postea contundunt, & tandiu la-  
uant in aqua, quousq; fursuracea excrementa eximant. Refert Plinius, nasci Viscum in quercu tantum, robore, ili-  
ce, syluestri pruno, terebintho, pinu, & abiete. At in Hetruria gignitur etiam in castanea, quod optimum est, in alo,  
& pyro, non tantum syluestri, sed etiam domestico, quanuis penitus inutile. Visci maxima Hetruscis utilitas est:  
nam præter eius usum in aucupijs, quibus mirum in modum delectantur ob ingentem turdorum copiam, qui autumni  
tempore, in syluis quibusdam ex iuniperis arte constructis, eo capiuntur, id etiam in primis utile est uitibus munien-  
dis, ne prima germinatione ab erucis, quibus omnia scatent, gemmæ deuorentur. Siquidem agricolæ Visco uites om-  
nes circumdant, quo postea erodentes uermiculi, qui tam præstantissimo latici insidiantur, e terra sursum petentes,  
merito implicantur. Quod cum perspexisset natura omnium rerum parens, uisci multum Hetruriæ largita est, ne hæc  
ob pestem uino destitueretur. Visci fructu uescuntur turdi, præcipue magni, quos nostri uulgò turdellas appel-  
lant. Quorum stercore uisci semine pleno inficiuntur, & seruntur arbores, in quibus pernoctant, & uiscitant: e  
quo tandem semine nascitur planta, quæ uiscum creat. Vnde scitè à Plauto dictum est. Turdus exitium sibi cacat.  
Ceterum Viscum per se non est arbor, sed in arboribus uiuit, fronde plerunque perpetua. Id quod etiam testatur  
Virgilius lib. vi. Aeneidis, cum inquit.

Visci consi-  
deratio.

Visci utilitas  
in Hetruria.

Quale solet syluis brumali frigore Viscum  
Fronde uirere noua, quod non sua seminat arbor.  
Proinde Plinius lib. xvi. cap. ultimo ita scriptum reliquit. Quædam enim in terra gigni non possunt, & in arbori-  
bus nascuntur. Nanque cum suam sedem non habeant, in aliena uiuunt, sicut Viscum. Omnino enim satum nullo  
modo nascitur. nec nisi per alium auium redditum, maxime palumbis, & turdis. Hæc est natura, ut nisi matura-  
tam in ventre auium non proueniat. hæc Plinius. Quæ ante ipsum memoriæ prodidit Theophrastus libro ii. cap.  
xxi. de plantarum causis, unde illa mutuatus est Plinius. Porro id, quod in pinu, & abiete nascitur, quod  
(ut Plinius inquit) stelin Eubœa dicit, hiphear Arcadia, frequentissimum in Tridentino agro in uallis Ananiæ syl-  
uis conficitur, ubi ingens turdellarum copia uiscitat. Sed hoc ad aucupia prorsus inutile est: decoctum enim, & de-  
inde elotum omnem amittit lentorem. Quod autem in pinu, abiete, amygdalo, malo, pyroq; prouenit, perpetua fronde  
uiuit. Id uero contrà, quod quercui, robori, & castanæ innascitur, utpote cui appetente hyeme omnia folia deci-  
dant. Huius rei causam reddere tentauit Theophrastus loco paulò antè citato, cum ita scribit. Viscum aliud folio esse  
perpetuo,



Theophrasti  
sententia nō  
accepta.

perpetuo, aliud deciduo, haudquaquam absurdum est. Siquidem aliud uirentibus semper arboribus, aliud frondem amittentibus insidet. sit enim, ut in his careat alimento, in illis habeat, quantum abunde sit. Causa enim perpetuae deciduæ frondis hæc est, quemadmodum diximus. hætenus Theophrastus. Verum enimvero hæc Theophrasti sententia non omni ex parte probanda uidetur. quippe quoniam uniuersum Viscum, quod in amygdalo, pyro, malisq; in Italia prouenit, tam æstate, quam hyeme fronde perpetua uiret, cum tamen hæc arbores hyeme frondibus destituantur. Quo fit, ut aliunde huius rei causam petendam existinem. Fit præterea Viscum auiculis tantum capiendis commendatum, in Syria ex myxis, quæ Aphris Sebestena dicuntur, ut libro primo in prunorum mentione de his differentes retulimus. Utuntur hoc Insulares suis in aucupijs, quod arboreo uisco careant, illudq; è Venetijs deferunt, quod primum ex Damasco Syriæ aduehitur: unde Damascenum uocatur. Sed id quæuo bonitate cedit. Fit quoque Viscum è quatrundam arborum radicibus, agrifolij præsertim, & uiburni, quarum etiam arborum historiam libro primo paliuri, & rhois commentarijs inseruimus. Qui autem ex huiusmodi arboribus uiscum conficiunt, cortices radicum sumunt, effossaq; scrobe inter suarum arborum frondes humido solo sepeliunt, ibiq; tanto tempore dimittunt, quoad computrescant: mox eximunt, & tandiu in pila contundunt, donec lentorem concipiant. Sunt inde aqua calida lauant, & manibus commiscunt. Hac etiam ratione quibusdam in locis fit ex ibisci radicibus. Sunt qui querni uisci lignum in tenuissimum puluerem redigant, & comitalibus hauriendum præbeant. quo tantum medicamento multos fuisse sanatos pro certo affirmant. Sed noui ego complures, morbi, & medicamenti propterea ignaros, qui ligni loco Viscum ipsum in catapotijs deuorandum dederunt. Visci meminit Galenus lib. vi. simpliciū medicamentorū, ubi de eius uiribus differit ijs uerbis. Viscum ex plurima aerea, & aquea calida, purissima terrena substantia constat. Nam acrimonia in eo amaritudinem excellit. Itaque etiam affectus subtilissimæ respondent. Siquidem ualenter ex alto humores extrahit, nec eos tantum tenues, sed & crassiores, eosque diffundit, ac digerit. Est autem ex eorum genere, quæ non protinus post primam appositionem excoalscunt, sed quæ tempus requirunt, uelut thapsia. Sed & supra commonuimus, inesse calidis facultate medicamentis, ubi largum continent humorem recrementitium. Nomen illi Græcum, ἰζὺς: Latinum, Viscum: Arabicum, Dabach, seu Dibach: Italicum, Vischio, & Pania: Germanicum, Vogel licim: Hispanicum, Visco.

† Nulla hic in Græcis codicibus fit acinorum mentio, sed hæc tantum leguntur. γίεται ἔκ τινος κερὰς περὶ σφῆς. hoc est. Fit ex quodam fructu rotundo. Cui etiam lectioni adstipulatur Serapio. Sed interpres uidetur secutus Plinium, qui lib. xvi. cap. ultimo sic inquit. Viscum fit ex acinis, qui colliguntur messium tempore immaturi.

Visci uires ex  
Galeo.

Nomina.

## Aparine.

## Cap. LXXXVIII.



Aparines cō-  
sideratio.

Aparines vi-  
nes ex Gal.

Nomina.

APARINE ramis multis, & paruis fruticat, asperis, quadrangulis, per interualla orbiculato foliorum ambitu, ut in rubia: flos albus: semen durum, rotundum, concavum, album, umbilici figura, asperitate uestium renaci. Ea pastores coli uice utuntur ad eximendos è lacte pilos. Seminis, caulium, ac foliorum succus, potu contra viperarum, phalangiorumque morsus auxiliatur: infusu aurium dolori medetur. Herba cum axungia trita, strumas discutit.

APARINE nusquam non prouenit, sed præsertim (ut Theophrastus inquit) inter lentes. Itali hanc uulgo uocant Sparonella, quod folia circa caulem ad calcarium stimuli modum asperisci instar proferat. Tactu hæc asperissima est, quapropter cum adoleuerit, attingentium uestibus pertinaciter heret. Huius succum magnificiunt quidam ad recentia uulnera gluinenda, et ad papillarum rimas. Aparines meminit Galenus lib. vi. simpliciū medic. ubi sic breuiter inquit. Aparine, quidam philanthropon, alij omphacocarpum cognominant, modice extergit, et deficcum habetq; nonnihil subtilium partiū. Herba hæc Græcis Sparonella uocatur: Latinis similiter Aparine: Italis, Aparine, et Sparonella: Germanis, Klebkraut: Hispanis, Presera: Gallis, Grateron.

## Alyssum.

## Cap. LXXXIX.

ALYSSON exiguus frutex est, unicaulis, subasperis, rotundis folijs: fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semen quadantenus latum. In montibus, & in asperis locis emicat. Eius decoctum singultus sine febri potum



potu discutit: idem efficit, si quis eam aut teneat, aut odoretur. cum melle trita vitia cutis in facie, & lentigines emendat. Contusa in edulio rabiei canis mederi putatur. domibus appensa salutaris esse creditur, & hominibus, atque brutis fascini amuletum. Purpureo linteo circumligata, pecorum morbos abigit.

**ALYSSI** uaria est apud auctores historia. Nam si Plinio est adhibenda fides, Alyssum ea plane fuerit herba, quam Rubiam minorem uocamus: quæ quidem, præterquam quod folia ferat longè minora, prorsus Rubia similis esset. Quod autem Plinio hæc Alysson sit, eius uerba declarant lib. XXI. cap. XI. ubi de erythrodano ita scribit. Erythrodanus, quam aliqui ereuthodanum uocant, uos Rubiam, qua tinguntur lanæ, pellesq; perficiuntur, in medicina urinam ciet. Morbum regium sanat ex aqua mulsa: & lichenas, ex aceto illita: & ischiadicos, & paralyticos, ita ut bibentes lauentur quotidie. Radix, semenq; trahunt menses, aluum sistunt, & collectiones discutunt. Contra serpentes rami cum folijs imponuntur. Folia & capillum tingunt. Inuenio apud quosdam morbum regium sanari hoc frutice, etiam si adalligatus spectetur tantum. Distat ab eo, qui Alysson uocatur, folijs tantum, & ramis minoribus. Quippe nomen accepit, quod à cane emorsos rabiem sentire non patitur, potus ex aceto, adalligatusq; . hætenus Plinius. Quem facile quis suspicari posset, Dioscoridis Alyssum reddidisse, eo ductus argumento, quod is statim post aprinam, quam rubia similem fecit, Alyssum descripsit: nisi omnibus ferè notis hoc à rubia minore differre perspicuum esset. Siquidem Dioscoridi Alyssum folijs est rotundis, fructu duplicium scutorum effigie, in quo semen quadantenus latum. in montibus, & asperis locis nascitur. Quæ sane omnia in minori Rubia desiderantur. Quod præterea Dioscoridi, ut Plinio, Rubia minor non sit Alyssum, ex eo aperte cognoscitur, quod is infra de maiori, & minori Rubia, eodem capite tractauerit. Id quod minime quidem fecisset, si nullam iudicasset inter minorem rubiam, & Alyssum intercedere differentiam. Quare uel Plinium hac in re hallucinatum, uel diuersum à Dioscoride Alyssum accepisse crediderim. Porro magis adhuc Alyssi historiam ea confundere mihi uidentur, quæ de eo posteritatis memorie prodiderunt. Aetius, cum inquit. Alyssum eam herbam esse aiunt, quam Heracleam sideritim uocant, quæ propter uias ubique nascitur, purpureo flore, folijs crassioribus. Nomen traxit, quod à cane rabido emorsus uirum in modum opituletur. His uerbis Aetius non solum non refertur Dioscoridis Alyssum deprehenditur; sed neq; etiam satis exprimere, quam sideritim pro Alyssio intelligat. Nam cum tres sint siderites à Dioscoride monstratæ, quarum duæ, prima scilicet, & ultima, heracleæ uocantur, non equidem scire possum, an primam, uel ultimam in summi Alyssum receperit Aetius. Florem siquidem purpureum habet sideritis Dioscoridi postrema, in uineis, & macerijs nascens; folium tamen non crassum, sed tenuem, coriandri modo, in ambitu laciniatum, ut eam plane refrat plantam, quam uulgo herba iorum, & Rubertam appellat. Huic postremo, ut alijs quoq; , non consentiunt quæ de Alyssio retulit Galenus lib. II. de antidotis, ubi nonnulla Asclepiadis medicamenta ad rabidi canis morsus commemorat. Alyssum, inquit, herba est marrubio adsimilis, asperior tamen, & magis aculeata circa orbiculos: florem ad cæruleum uergentem profert. Hanc sub cænicula æstu colligere oportet, exiccata contundi, cribrari, & seruari debet, ne diffletur. Ex his Galeni uerbis patet, Alyssum ab eo ex Asclepiade descriptum, potius primam, quam ultimam sideritim referre. Cum igitur uaria admodum sit de Alyssio auctorum sententia, cumq; eius historia tam uaria, incertaq; habeatur, difficile quidem fuerit asserere, quenam planta Alyssum legitime uocari possit. Ruellius tamen eam plantam, quam herbarij (ut ipse ait) bluestrem cannabim uocant, putat esse Dioscoridis Alyssum, uel ad ipsum propius accedere. Quod, ne semper aliorum errata corrigere uidear, ijs diiudicandum relinquo, qui in simplicium historia etiam mediocriter uersati, hæc & maiora diiudicare possunt. Caterum Alyssum à Galeno ex Asclepiade representatum, in Italia prouenire non equidem inficiar, neq; illud similiter, cuius meminit Aetius. Sed quod horum in usu medico probandum, uel reprobandum sit, non facile decernere ausim. quanquam à Galeno nunquam discedendum putauerim. Qui præterea Alyssi facultates tradidit lib. VI. simplicium medicamentorum, his uerbis. Nuncupata est hæc herba Alysson, quod nigrificet inueteremorsos à cane rabido. Sed & rabienti quoque data, sæpe in totum sanauit: atq; hoc ex totius substantie similitudine efficit. Dictumq; prius est talem facultatem ex sola percipi experientia, & plauè nulla constare methodo. Quod si quis ad multa experiatur, cognoscat facultatem habere mediocriter siccificam, & digerentem, cum hoc ut absterforum nonnihil etiam obtineat. Hac ratione & utiliginem, & maculas faciei à sole prognatas expurgat. Herba, quæ ἀλυσσον Græcè, Alyssum quoq; Latine dicitur: Italice, Alisso.

Alyssi consideratio.

Variæ de Alyssio sententia.

Ruellij error

Alyssi uires ex Gal.

Nomina.

## Asclepias.

## Cap. XC.

**ASCLEPIAS**, ramos emittit longos: folia hederæ, longa: radices numerosas, tenues, odoratas: floris uirus graue: semen securidacæ. nascitur in montibus. Radices ex uino potæ torminibus auxiliantur, & contra serpentium ictus. Folia aduersus uulnæ, mammarumque ulcera, quæ cacœthe uocant, illinuntur.

**FALLUNTUR**, mea quidem sententia, qui Asclepiadis uice, quam in montibus nasci tradidit Dioscorides, necnon etiam Plinius, eam herbam accipiunt, quam uulgares quidam chirurgici Hederam terrestrem nominant: quæ plerumq; secus uias nascitur, & perpetuo humi serpit folijs rotundis, asperis, per ambitum quadantenus serratis, longotenuiq; funiculo appensis: floribus exiguis, in purpura albicantibus: radicibus tenuissimis. Siquidem præterquam quod Dioscorides scriptum non reliquit Asclepiada in uijs publicis nasci, nusquam etiam, quod legerim, prodidit eandem tam longo repere tractu, & folia rotunda proferre. Nec minus etiam, ut equidem arbitror, hallucinantur ij

Asclepia disconfid. Quorundam lapsus.



**Euch. error.** (pace tamen Euchsij eruditissimi dixerim, quem constat ex suis commentarijs hanc habuisse sententiam) qui putant Asclepiada eam esse plantam, quam uulgius herbariorum Vincetoxicum uocat. quæ frequenter in saxosis, & asperis locis provenit, leni admodum caule: folijs lauro acutioribus: flore albo, muscoso: corniculis tenuibus, oblongis, raris dicibus innumeris, albicantibus. Quandoquidem huius cum folia, tum radices nullo odore commendantur: flores utriusque aliquod non redolent: semen non est securidaceæ simile. Adde etiam, quod ex Oribasij lectione Asclepias non profert folia longa. cui subscripsit Marcellus interpres, fretus fortasse, ut solet, probatissimis exemplaribus. Præterea antiquissimus codex manu scriptus de radicibus non legit *ωλλας*, hoc est, multas, sed tantum *ωττας*, *ωσδες*, id est, est, tenues, odoratas. Sunt tamen qui Vincetoxicum hoc uenenis maxime aduersari scribant, quin et fractis, & ab alto deuolutis auxiliari, si contrita in puluerem radices ex uino sumantur. Has præterea laudibus efferunt ad mammæ à partu turgentes, præsertim ubi lac in eis coierit: in quorum usu radices ipsas decoquunt, quas deinde cum po- lenta mammis illiunt. Sed perperam, quod hoc Asclepiadis sit proprium. Ceterum non desunt, qui illam humi repentem herbam, de qua antea diximus, pluribus celebrent facultatibus, præsertim ad thoracis, & intestinorum uicem. quamobrem potiones ex ea magna opinione faciunt, & succum eius in unguentis admiscunt: namque uulneraria est, & glutinatoria. Asclepiadis meminit quidem Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sed nihil de eius uiribus differens, sic tantum inquit. In tertio Dioscorides de hac herba conscripsit. at nos eius nondum periculum fecimus. Ea Græcè *ασκληπιως*, ut etiam Latine Asclepias nominatur: Italice, Asclepiade.

**Nomina.**

## Atractylis.

## Cap. XCI.

**ATRACYLIS**, spina est cnico similis, folia multò longiora ferens in summis uirgis, magna parte nuda, aspera quæ, quæ scemina pro fusis utuntur. capitula in cacumine spinis horrent: flos luteus, quibusdam in locis purpureus inuenitur: radix tenuis, superuacua. Coma, semen, & folia cum pipere, & uino teruntur utilissimè contra scorpionum ictus. Percussos tradunt, quandiu ea teneantur herba, nullum experiri dolorem, ipsumque depolita statim recrudescere.

**Atractylidis confid.**

**Ruel. & Hermolai error.**

**ERRANT** haud dubie, ut mea quidem fert opinio, Ruellius, & Hermolaus: quippe qui existimauerint Atractylida esse Cnicum sylvestrem, cuius primo loco meminit Theophrastus lib. VI. cap. IIII. de plantarum historia. Si quidem magnam ego inter sylvestrem Cnicum, & Atractylida inuenio apud Theophrastum esse differentiam. Quod ut omnibus perspicuum esse possit, ijs præsertim, qui aliter sentiunt, hic Theophrasti uerba de Cnico, Acarna, & Atractylide subiiciam. Cnicum, inquit, sylvestri, urbanoque discernitur. Sylvestris generis duo notantur, alterum urbanum admodum simile, recticaule tamen: quamobrem eo mulierum priscarum nonnullæ pro colu utebantur. fructum nigrum, maiusculum, amarumque parit. Alterum genus densum constat, caulesque sonchos profert, quod ammodo huiusmodi caule fit: nam propter foliorum mollitiem declinatur, procumbitque ad arua. fructum anarum, frequentem, hirsutumque modo hirsutum gignit. Sunt ambo seminosa, uerum sylvestre copiosius fert. Eius peculiare præ alijs sylvestribus est, quod illa duriora, spinosioraque, urbanis proueniunt: hoc autem mollius, ac leuius constat. Acarna quoad simplicem rationem exprimi licet, aspectu cnico urbano similis est, colore flauicans, succo pinguis. Fusus agrestis (sic enim Atractylida Latini nominarunt) his candidior est: habetque peculiare. quod in folijs euenit. decerpta enim, curmque, alata, succum sanguineum effundunt: qua de causa phos, id est, cruor à quibusdam spina hæc est nominata. grauius est tamen odore, cruoreque representans. Serò perficit fructum, autumnus enim. & quidem in totum (ut summum pro- ponam) uniuersa spinaceorum natura fructus serotina existit. hæc Theophrastus. Ex quibus uerbis facile cognosci potest, in Atractylidis historia aperte aberrasse Ruellianum, cum in tertio suo de natura stirpium libro asserit, Fusum agrestem, hoc est Atractylida, nil aliud esse Theophrasto, quam primum Cnici sylvestris genus. utpote qui non animaduertit, quod Atractylis Theophrasto alia est à Cnico sylvestri planta: quanquam illi fortasse non absimilis, & cui ea tantum inest proprietas, ut folijs succum sanguineum fundat: id quod nullo Cnici generi tribuitur. Errandi occasione, meo quidem iudicio, præbuit Plinius, quod lib. XXI. cap. XV. sylvestrem Cnicum à quibusdam Atractylida uocari tradiderit. Vbi postquam commemorasset nonnullas spinosas plantas, quibus Aegyptij in cibis utantur, de Cnico tandem in hunc modum differuit. Multas præterea, inquit, ignobiles habent plantas. Sed maxime celebrantur & satiuæ. Sylvestrium due species, una mitior est, simili caule, tamen rigido, exilis. Itaque pro colu antiquæ mulieres utebantur. quam quidam atractylida uocant. Semen eius candidum, & grande, amarum. Altera hirsutior, pruri- rosiore caule, & qui pene humi serpat, minuto semine. hæc Plinij uerba. Quæ etsi quidem certam fidem faciunt, primum sylvestris Cnici genus à quibusdam Atractylida fuisse uocatum; non tamen propterea affirmant, Atractylidem esse Cnicum sylvestrem. Atractylidis deinceps speciatim meminit ipse Plinius cap. XVI. eiusdem libri, cum inquit. Acarna colore tantum rufo (à scolymis scilicet) distinguitur, & pinguiore succo. Idem erat Atractylis quoque, nisi caule didior esset, & nisi sanguineum succum funderet. qua de causa phos uocatur à quibusdam. Odore etiam grauius, serò maturescens sentine, nec ante autumnum: quanquam id de omnibus spinosis dici possit. hæc Plinius. Ex ijs igitur omnibus merito colligendum esse putauerim, legitimam Atractylidem nullum esse sylvestris Cnici genus, sed suam per se plantam, nempe illam, qua pro fusis priscæ utebantur mulieres. Quod sanè animaduertens Theodorus sui Græci idiomatis peritissimus in Theophrasti uersione, Atractylida fusum agrestem interpretatur, non autem colu, ut primum agrestis Cnici genus uertendo, ex antiquo ad colos usu, id Colu agrestem rectè cognominari posse monstrauit. Qua in re is plane declarasse uidetur, priscas mulieres agresti Cnico coli uice fuisse usas, fusorum uero loco



loco ipsa tantum Atractyli. Ceterum hactenus in Italia, ut ingenue fatear, Atractylida non inueni, neq; eam ab ali-  
 quo repertam esse scio. quanuis non iuero inficias, quin ea possit etiam in Italia nasci. Equidem plures uidi plantas  
 aculeis horrentes, quæ illius notis pulchre respondebant: attamen ex ijs nullam unquam nactus sum, quæ folijs carni  
 adhibitis sanguineum succum funderet. Credidit Ruellius alteram Cnici sylvestris speciem eam nimirum esse stirpem,  
 quam herbariorum uulgo Carduum benedictum, uel sanctum appellat. Quam profecto opinionem haudquaquam im-  
 probandam puto. quandoquidem Carduus benedictus uocatus solo procumbit densa foliorum coma, & quodammodo  
 humiculis cernitur. quinctiam fructum gignit amarum, barbaq; modo hirsutum: & caules profert sonchi modo ru-  
 bentes. Vt ex ijs notis accuratius expensis, quibus prorsus comenit Carduo benedicto cum altero Cnici sylvestris ge-  
 nere, nil mirum si cogor mutare sententiam, & hoc quod alijs negaueram, nunc plane asserere non dubitem. Sed Ruel. lapsus.  
 certe Ruellium mirari subit, quod tam facile asseruerit Carduum benedictum uocatum sanguinem ex se fundere. Nā  
 est ego nullius periculum fecerim; nunquam tamen euulso folio, uel ramulo sanguinem e uulnere profluere comperi.  
 Præterea si concedamus, quod Ruellius uera referat, id maxime ipsius repugnabit sententiæ, cum tam Theophrasto,  
 quam Plinio nullum Cnici genus sanguinem fundat, quoniam id Atractylidis est proprium. Hinc itaq; palam fieri ar-  
 bitror, Ruellium, alioqui doctissimum, turpiter confudisse Atractylidis historiam. Quippe si, ut suam tueretur sentē-  
 tiam, asserere uoluisset, Atractylida esse primum sylvestris Cnici genus, illud quidem succum fundere sanguinis instar  
 scribere debuisset, non autem hoc, quod Carduum benedictum esse censemus. Neque etiam mihi, ut liberè liceat  
 quod quisq; sentit dicere, placet Fuchsij opinio. qui libro primo de compositione medicamentorum, & in suis de plan-  
 tarum historia commentarijs, Carduum benedictum uulgo nominatum Atractylidem hirsutiorē esse existimat. hirsu-  
 tiorē dixi, quoniam is duas esse constituit Atractylidis species, nempe mitiorem alteram, alteram hirsutiorē: ta-  
 men si cum Dioscoridi, tum Theophrasto Atractylis unum duntaxat sit genus. quod, quantum reor, Carduus benedi-  
 ctus non est. Siquidem hic nec sanguineum succum fundit, nec in imis uirgis unquam uisitur nudus: quinimò uirgas nō  
 profert, sed caules lentos, quibus humi ferè reptat, uel potius solo procumbit. Sed postquam in hac nostra Atra-  
 ctylidis, & Cnicorum sylvestrium disquisitione, sermo incidit de Carduo benedicto, non ab re hic de miris eius atque  
 excellentibus dotibus nobis differendum est. Est igitur CAR-  
 D V V S Benedictus ita uulgo nuncupatus, planta nullis hoc tē-  
 pore non cognita. Seritur passim in hortis, sapore admodum ama-  
 ro, quò terreis constet partibus calore quodam attenuatis. Ma-  
 gni nominis, magnæq; existimationis plāta est non modò apud Ita-  
 los; sed etiam apud exterarum nationes, præsertim contra pestilen-  
 tiam: item aduersus uenena lethalia, tam interius sumpta, quam  
 nenenosorum animalium ictibus, aut moribus imposita. Sanantur  
 hac herba quartana laborantes, aut alijs febribus detenti, quarum  
 accessiones cum frigore adueniunt. Id enim præstat hausto eius  
 decocto, aut stillatitia aqua, aut pulueris drachma pota. Præstat  
 eadem comitialibus infantibus eodem modo bibita. Herbe deco-  
 ctum ex uino sumptum ilium, & renum dolores mulcat, & cæte-  
 ra uentris tormina sedat: sudorem cit, alui tineas necat, & uteri  
 uitij auxiliatur. Herba ipsa tam recens, quam sicca & pota, &  
 exterius adnota, contumacia ulcera, & quæ cacoethe nocantur,  
 sanat, cuteq; obducit. Quamobrem decoctis miscetur, quæ è li-  
 gno Guaiaco ex uino, & aqua ijs parantur, quos lues Galliea cor-  
 ripuit. Planta, quæ Græcis ἀτράκτυλος, Latinis item Atra-  
 ctylis, & Fusus agrestis appellatur: Italis, Atrattile.

Cardui bene-  
dicti uires.

Nomina.

### CARDVVS BENEDICTVS.



### Polycnemum.

### Cap. XCII.

POLYCNEMON, frutex, est surculosus, folijs ori-  
 gani: caule, ut pulegii, geniculis multis intercepto, sine  
 umbella, tenui tamen in cacumine corymbo, boni odo-  
 ris, & acris. Vulneribus agglutinandis recens, aut ari-  
 dum, cum aqua efficaciter illinitur: sed quinto die solui  
 debet. ad urinæ stillicidia, ruptaque cum uino bibitur.

POLYCNEMON hactenus, quod ego quidem ipsum co-  
 eo ostendantur plantæ, quæ aliquibus notis Polycnemum quadantenus referre uidentur; cum tamen plura etiam ijs  
 re ausim. Vnde satius ipsum inter alias ignotas plantas collocandum esse duxerim, donec aliud certius compertum fue-  
 rit. Sed si quis interim Polycnemi uires ex Galeno quoq; scire desiderat, is lib. VII. simpl. medic. illas ita paucis  
 retulit. Polycnemum desiccatur, & excalescit secundo excessu. Itaq; & ob id uulnera glutinat. Huic plantæ no-  
 men, Græcum πολύκνημον; Latinum similiter Polycnemum: Italicum, Policnemo.

Polycnemi  
confid.

Vires ex Ga-  
leno.  
Nomina.

Clinopodium




## CLINOPODIUM.

## CLINOPODIUM ALTERVM.



Clinopodium.



Cap. XCIII.

CLINOPODIUM frutex est foliis serpyllo similis, furculosus, duum dodrantum altitudine. Nascitur in petrosis. Flores, marrubii modo, ex interuallis distincti speciem lecti pedum præbent. Bibitur herba, & succi eius decoctum, ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus: menses, & partus pellit: & pensiles uerrucas, quas acrochordonas uocant, eijcit, aliquot diebus potum. Alui, si sitit decoctum ad tertias, potumque, si febrim sentiunt, ex aqua; alioquin, ex uino.

Clinopodii  
confid.

Clinopodij  
facultas ex  
Galeno.

Nomina.

CLINOPODIUM nil aliud nobis designat, quam lectica pedem, quod circinata florum figura, qui intercedentibus interstitijs caulem circumplectuntur, basim lectica pedum referat. Nascitur ubique frequens, folijs non modo serpyllo proximis; sed etiam montana calamintha, quam maxime representat. Huius meminit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Clinopodium excalfaciendi uim obtinet, sed nondum adurendi: est uero etiam essentia tenuium partium: ponatq; ipsum quispiam in tertio ordine tum excalfaciendum, tum resiccantium. Κλινopόδιον sic Græci, ut Latine pariter Clinopodium uocatur: Italice, Clinopodio.

## Leontopetalum.

## Cap. XCIIII.

LEONTOPETALON, caulem emittit dodrantalem, aut altiore, plurimis alis concuum, & in cacumine semina parua duo, aut tria, in siliquis, ciceris modo: flores anemonæ similes, punice coloris: folia brassicæ, sed papaueris diuisura, radicibus nigris, rapæ similibus, strumosis. Nascitur in aruis, & segetibus. Radix auxiliatur serpentium ictibus, ex uino pota: nec alia res celerius dolorem finit. miscetur ischiadicorum clysteribus.

Leontopetali  
confid.


LEONTOPETALVM, eiusq; nigram, extuberantemq; radicem, rapi instar magnitudine, non modo Venetijs, & Patauij in quibusdam hortis uidimus; uerum etiam in Hetruriæ aruis, alijsq; Italiae locis. Nascitur frequens in Apulia. Leontopetali meminit Plinius libro XXVII. cap. XI. ubi ipsum ijs depingit uerbis. Leontopetalon, alij rhapecion uocant, folio brassicæ, caule semipedali, ale multe, semen in cacumine in siliquis ciceris modo.



## LEONTOPETALVM.



TEVCRIVM.



do. radix rapæ similis, grandis, nigra nascitur in aruis. Leontopetali facultates paucis perstrinxit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Leontopetali radice maxime utimur. Digerendi facultatem, & exiccandi, & excalfaciendi; in tertio ordine possidet. Λεοντοπέταλον quod Græci, Leontopetalum quoq; Latini dicunt: Leontopelo, Itali, Leontopetali uires ex Gal.

Nomina.

## Teucrium.

## Cap. XCV.

TEVCRIVM, siue, ut aliis placet, teneris, herba est uirgæ referens effigiem, triflaginis similitudine, tenui folio, non multum à cicere alieno. Hæc in Cilicia iuxta Gentiadem, Cissadenique ubertim prouenit. Recens cum posca, aut aridæ feruifactæ ius potu lienem potenter absumit. Lienosis cum aceto, & fisis illinitur: ite serpentium moribus ex aceto solo sine fisis.

HERBA quædam nascitur pluribus in locis, folijs quidem ciceris, sed caule, & facie triflagini adeo similia, ut sepe ex tempore uisa oculos decipiat. Hanc esse uerum Teucrium mecum semper existimari, quod ea mihi planè notis respondere uideatur, quas Dioscorides Teucrio reddidit. Qui tamen si scribat ubertim nasci Teucrium in Cilicia iuxta Gentiadem, & Cissadem; id tamen nihil impedit, quin & in Italia prouenire queat. Plinio duo Teucrij produntur genera libro XXV. cap. V. ubi ita scriptum reliquit. Inuenit & Teucer eadem ætate Teucrion, quam quidam hermion uocant, spargentem iuncos tenues, folia parua asperis nascentem, austero sapore, nunquam florentem. neque semen gignit. Medetur lienibus. Constatq; sic inuentam. Cum exta super eam proiecta essent, fertur adhæsisse lien, cumq; exinanisse. ob id à quibusdam splenion uocatur. Narrant sues, qui radicem eius edunt, sine splene inueniri. Quidam ramis hyssopi plantam, surculosam, folio fabæ, eodem nomine appellant. Et colligi florentem adhuc iubent, adeo florere non dubitant, næ ximeq; ex Cilicijs, & Pisidiæ montibus laudant. hæc Plinius. Ceterum non desunt, qui putent alterum Plinio Teucrium eam esse plantam, quæ Italis uulgaris sermone uocatur Fæua grassa. quamquam hanc alij falso, ut opinor, Telephium esse contendunt.

Teucrii consideratio.

Teucrij uires descripsit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Teucrium incidentis, & tenuium partium facultatis est: quare lienes sanat. Ponatq; ipsum quispiam in tertio exiccantium, secundo uero excalfacientium ordine.

Teucrii uires ex Gal.

Hanc herbam Græci τεύκριον, Latini item Teucrium nominant: Itali, Teucrio.

Nomina.

## Triffago.

## Cap. XCVI.

CHAMAEDRYS Græcis, alijs chamædrops, Latinis truffago dicitur. Sunt qui eam teucrion appellauere, propter eam quam cum teucrio seruat similitudinē. Nascitur in petrosis, & asperis. Frutex est dodrantalis, folia habes exigua, amara, effigie & diuisura quercus: flore paruo, penè purpureo. Carpitur semine prægnans. Recens in aqua decocta, potu tussibus, indurato lien, urinæ difficultati, incipientibus hydropicis, auxiliatur: cit menses, partus extrahit: lienem ex aceto pota consumit: aduersus serpentium uenena ex uino, potu, illituq; efficacissima. Trita digeritur in pastillos, ad supradicta. purgat uetera ulcera, cum melle: cum oleo illita, caliginem oculorum discutit. natura eius est calfacere.

CHAMAE



Chamædryos  
confid.

## TRISSAGO.



Chamædryos  
uires ex Gal.

Nomina.

ταχαλιδρυς Græcè uocatur: Latine, Chamædryos, & Trissago: Arabicè, Damederios, Chamadrins, seu Kemas-  
drius: Italicè, Chamedrio, & Querciola: Germanicè, Gamanderle, & Bathengel: Hispanicè, Chamedreos: Gala-  
licè, Germandree.

## Leucas.

## Cap. XCVII.

LEUCAS montana, latioribus quàm urbana foliis, semine acriore, amariore, ori ingrato, ef-  
ficacior tamen quàm satiuu habetur. Vtraque ex uino contra animalium uenena, præcipue marino-  
rum, opitulatur.

Leucadis cō  
sideratio.

TAMETSI Hermolaus, & Ruellius contendant scriptis testatum relinquere, herbam quandam in uinetis  
nascentem mercuriali congenerem, esse Leucada; ego tamen eam mercuriali consimilem facere profecto non ausim,  
cū nullum hactenus ex rei herbariæ auctoribus inuenorim, qui eius faciem representet, pluraq; de eius notis tradat,  
quàm fecerit Dioscorides: qui certè, quantum extat, nullis prorsus notis ipsam descripsit. Ceterum rectè meo quæ-  
dam iudicio, putat Marcellus Florentinus huic Leucadis capiti decurtatum esse principium. Id quod nobis indicare  
uidetur ipsius Dioscoridis sermo: nam cū statim ab ipso capitis initio montanam Leucada urbane comparauerit,  
nimirum ostendit à se prius urbanam fuisse descriptam. Neque hac de causa tantum adducor, ut Marcello adscrip-  
ser; sed quia etiam se habuisse testatur Letinum Dioscoridis codicem uetustissimum, in quo initium huius capitis ita  
legebatur. Leuca duo sunt genera, una est montana, & altera hortiua. Montana latiore quàm satiuu folio est &c.  
Quæ omnia maximo sunt argumento, quod hoc in loco Dioscoridis codices sint deprauati, quodq; in ijs plura adhuc  
desiderentur, quæ faciunt ad perfectam huius plantæ historiam. Leucas herba ssc Græcis, Leucas item Latio  
uis appellatur.

Nomina.

## Lychnis.

## Cap. XCVIII.

LYCHNIS coronaria, florè est albæ uiolæ simili, sed purpureo. quo corollæ factitantur. Con-  
tra scorpionum ictus semen in uino potum auxiliatur. Lychnis syluestris, omnia urbanæ similis.  
Bilem per aluum detrahit, semine duabus drachmis potu. ictis à scorpione subuenit. Aiunt huius her-  
bæ appositu scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.



## LYCHNIS.



LILIVM.



QV ANQVAM non facile est hac ætate plantas in Italia ostendere, quæ legitimè referant utraq; Lychnidem, hortensem scilicet, & sylvestrem, cum earum folia, & caules tam à Dioscoride, quàm ab alijs rei herbariæ scriptoribus, quod inuenerim, nullis prorsus represententur notis, utpote plantarum, quæ fortasse olim omnibus erāt notissimæ ob frequentē earum usum tum ad lucernarum lumina, tum etiam ad coronas contexendas; attamen in Tridentino, & Goritienſi agro planta quædam in hortis, ac fictilibus seritur, coronis nestendis accommodata, quam equidem non dubitauerim pro legitima Lychnide in medium asserre. Siquidem flore exit purpureo, albæ uiolæ simili: folijs longis, tomentosis, albicantibusq;: caule lanuginoso, cubito maiore, in cuius cacumine flos emicat, ut dixi, purpureus, inodorus tamen. Quod præterea planta hæc uera sit Lychnis coronaria, illud mihi fidem auget, facitq;: ut in hoc uibil ferè addubitem, quòd alteram eiusdē generis frequentissimam apud Ananienses sylvestrem repperim, illi sati uæ adeò per omnia similem, ut cum natalis duntaxat discrimen intercedat hæc meritò Lychnis sylvestris appellari queat. His accedūt tomentosa earū folia, quæ ad lucernarū usum pro ellychnio commodè usurpari possunt. Vnde apud ueteres Lychnidis sibi nomen asciuit. quippe lucerna Græcis λυχνον dicitur, quemadmodum & ἐλλυχνιον funiculus, qui è gossipio nobis hoc æuo paratur, lucernisq; inseritur ad lumen edendum, flammamq; nutriendam. Quare cum gossipio, ut puto, carerent antiqui, tomentosis herbarum quarundam folijs ad hoc munus obeundum utebantur, nempe lychnidis, uerbasci, aliarumq;: nonnullis. Illud deniq; addiderim, ut nostra melius firmetur opinio, quòd flos plātaram, quas Lychnides esse opinor, mirum in modum ruralibus, urbanisq; uirginibus expetitur ad coronas faciendas: qua in re priscam imitantur ætatem. Ceterum Plinius lib. XXI, cap. III. Lychnidē inter rosas retulit, sic inquires. Est & rosa, quæ Græca appellatur à nostris, à Græcis uerò Lychnis, non nisi in humidis locis proueniens, nec unquā excedens quinq; folia, uiolæ magnitudine, odore nullo. Lychnidis coronariæ semen, ut Galenus est auctor lib. VII. simplicium medicamentorum, calidum est secundo quodammodo ordine, aut iam etiam tertio: siccum janè eodem quoq; modo. Quæ herba Græcis λυχνὶς Lychnis quoq; Latinis dicitur: Italij, Lichnide.

Lychnidis cōsideratio.

Lychnidis facultas ex Gal.

Nomina.

## Lilium.

## Cap. XCIX.

LILIA coronamentis se dedunt, Liria à quibusdam vocata. E quibus vnguentum temperatur, quod aliqui lirinum, alij susinum appellant, neruos, & priuatim uulnū duritias emolliens. Folia herbæ illita, contra serpentium ictus auxiliantur: feruefacta ambustis proficiunt: aceto condita vulneribus opitulantur. Succus adiecto melle, aut aceto in æreo vase coquitur conuenienti medicamento vetustati vlcerum, & ad recentia vulnera. Inassata radix, & ex rosaceo trita, igni ambusta sanat, uulnam emollit, menses ciēt, vlcera cicatricē obducit. Cum melle detrita neruis præcis, luxatisq; medetur: vitiligines, furfures, & lepras emendat: vlceraq; in capite manantia expurgat: abstergit faciem, & erugat. teritur in aceto cum hyoscyami folijs, & farina tritici mulcendis testium inflammationibus. Semen potum morsibus serpentium aduersatur. Ignibus sacris semen, & folia cum vino illinuntur. Tradunt & purpurea esse lilia In Syria autem, & Pisidia Pamphiliæ efficacissima vnguentis nascuntur.



Liliorum cō-  
sideratio.

Liliorum hi-  
storia ex Pli.

Martagon, &  
eius delineatio.

Liliorum vi-  
res ex Gal.

**LILIA** Italica notissima sunt, atque adeo omnibus, ut planè superuacaneum esse putem, exemplo Dioscoridis adductus, uel ex nobis eorum faciem representare, uel alterius historiam referre. Sed tamen quoniam ijs quandoque mos gerendus est, qui semper hortis nouis ac uarijs floribus refertis delectantur; idcirco silentio præterire non potui, quin hic infererem, quæ ratione, quouè mangonio alba lilia (si tanta fides præcis rei herbariæ auctoribus adhiberi potest) purpurea fieri possint. Quod cum Plinius docuerit lib. XXI. cap. V. ubi de Lilijs latius differt, ideo eius uerba subiiciemus. Liliū, inquit, rosæ nobilitate proximum est, & quadam cognatione unguenti, olei; quod lirinon appellatur. Et impositum etiam maximè rosas decet, medio prouentu earum incipiens. Nec ulli florum excelsitas maior, interdum cubitorum trium, languido semper collo, & non sufficiente capitis oneri. Candor eius eximius, folijs foris striatis, & ab angustijs in latitudinem paulatim sese laxantibus, effigie calathi, resupinis per ambitum labris, tenuiq; filo, & semine stantibus in medio crocis. Ita odor, colorq; duplex, ut alius calycis, alius staminis: differentia angusta. In unguenti uerò, olei; usu folia non spernuntur. Est flos non dissimilis illi in herba, quam conuoluulū uocant, nascens per fruteta, nullo odore, nec crocis intus, candorem tantum referens, ac ueluti naturæ rudimentum lilia facere condiscens. Alba lilia iisdem omnibus modis feruntur, quibus rosæ; & hoc amplius lacryma sua, ut hipposelinum, nihilq; est fecundius, una radice quinquagenos sepe emittente bulbos. Est & rubens liliū, quod Græci crinon uocant. Alij florem eius cynorrhodon. Laudatissimum in Asiatichia, & Laodicea Syriæ, mox in Phaselide, quartum locum obtinet in Italia nascens. Sunt & purpurea lilia aliquando gemino caule, carnosiore tantum radice, maiorisq; bulbi, sed unius. Narcissum uocant. Huius alterum genus, flore candido, calyce purpureo. Differentia à lilijs est & hæc, quod narcissus filia in radice sunt, præbatiſsimis in Lyciæ montibus. Tertio generi cetera eadem. Calyx herbaceus, omnes serotini: post æstiuum enim florent, ac per æquinoctium autumnum. Inuenta est & in his ratio inferendi monstrosifici hominum ingens. Colliguntur namque mense Iulio scapi arescentes, liliaq; suspenduntur in fumo. Dein mundantibus se nodulis, in facie nigri uini, uel Græci mense martio macerantur, ut colorem accipiant, atque ita in scrobiculis seruntur, beaminis facis circumsusis. Sic fiunt purpurea lilia, mirumq; ita tingi aliquid, ut nascatur infectum, hæc Plinius. Lilia (ut Anatolius testatum reliquit) totum annum uiridia durabunt, si eum oclusa silent, necdum patentiæ dehiscunt, decerpta, nouis fistilibus non picatis indito diligenter operculo reconduntur. Sic enim clausa perpetuum annum uegeta manebunt. Sed ut intermedio tempore ad usum promuntur, statim ad solem producta, cum senserint eius calorem, aperta panduntur. Porro ut uicissim, & uarijs temporibus flores pariant lilia, bulbi ita feruntur, ut aliqui duodecim digitorum altitudine obruantur, alij octo tantum, alij quatuor duntaxat profunditate mergantur, sic diuersis diebus dabunt lilia: quod & in alijs floribus fieri pollicetur. Ceterum & illud inter lilia merito annu-

merari potest, quod MARTAGON chymistæ appellant. Hoc enim radice, etsi croceo colore infecta sit, à lilio

#### MARTAGON.



candido non disidet, sicut nec eaule. Folijs uulgarem saponariam imitatur, quæ in stellæ, uel rosæ modum intercedente spatio caulem ambiunt: in cuius cacumine tenui pediculo appensi flores emicant liliorum effigie, minores tamen: quorum folia etiam reflexa cernuntur, colore purpureo, punctis quibusdam rubentibus reaspersa, & ipsi odorati sunt, aspectuq; iucundi. Lilijs genus hoc in suis de stirpium historia commentarijs Euchsus, asthodelum semina putauerat esse, pro eoq; depinxerat. Sed quia sui erroris conscius factus, hanc ipse suam mutauit sententiam, non est cur iam nos eam pluribus resellamus. Liliorum facultates posterioris memorie prodidit Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum sic inquit. Lilijs flos temperaturam inistam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, ex qua utiq; in gustu amaritudinem habet, partim ex aquea, eaq; temperata. Itaque etiam quod ex eo conficitur oleum, & unguentum, citra morsum digerendi, simulq; emolliendi facultatem obtinet. unde fit, ut uteri durities sit aptissimum. Porro radix, foliaq; per se trita desiccant, & abstergunt, & digerunt moderatè. Proinde quoque ambustis contpetunt: siquidem hæc quoq; moderatè desiccantem, extergentemq; facultatem postulat. Radicem ergo tostam, ac deinde cum rosaceo contritam ambustis, quoad obducatur cicatrix, imponunt. quippe cum alioqui & aliorum ulcerum omnium bonum sit inducende cicatrici remedium. Quinetiam uteros emollit, mensesq; prouocat. Folia uerò præcoquentes, & ipse ad obductam usque cicatricem imponunt, non in ambustionibus duntaxat; sed alijs quoque uulneribus. Sed sunt etiam, qui aceto ea condientes ad uulnera in radice, pore utantur. Plus tamen inest abstergentis facultatis in radice, quam in folijs: quanquam tamen nec in ea ipsa multum inest. prædiximus: nam primi ordinis abstergentium est medicamentum. Itaque cum aut uiligines, aut psoriam, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id genus extergere uolumus, commiscemus illi aliquid aliorum



aliorum medicamentorum ualidiùs extergentium, cuiusmodi est mel. Caterùm si id moderatè illi, ac conuenienter admisceatur, & ad neruorum diuisiones competit, & ad alia uniuersa, quæ ualenter exiccar i postulant absq; morfu. Imposuimus uerò etiam quandoq; & foliorum succum cum aceto, & melle coctum. Quintuplus autem erat succus ad urunq; : atq; insigne medicamen fuit ad omnia ea, quæ exiccare postulant absq; morfu, ceu uulnera omnia ingentia, et maximè quæ in capitibus muscutorum eueniunt, & quæcunque ulcera humida flaccidæ, & diuturna sunt, quæq; egrè ad cicatricem perducuntur. Sed hæc iam ad medicamentorum componendorum institutum attinent, à quo quantum licet abstinere in præsentia adiutor. cæterùm rerum ipsarum natura sæpenumero ut attingā adigit, celeriter uerò relinquenda sunt, atq; ad propositum reuertendum. Planta, quam Græci *κρίνον*, & *λεῖπον* dicunt, Liliū Nomina. Latinis nominatur : Mauritaniis, Sufen : Italis, Giglio : Germanis, Lilgen, & Gilgen : Hispanis, Azucena, & Lirio blanco : Gallis, Lis.

## Ballote.

## Cap. C.

**BALLOTEN**, nomine alio nigrum marrubium uocant. Caules edit quadrangulos, nigros, subhirsutos, conplures ex vna radice : folijs maioribus, quàm marrubij, hispids, per interualla in caule dispositis, subrotundis, † graucolentibus, apiastro proximis : unde aliqui apiastrum eam uocauerunt. candidi flores uniuersi uerticillato ambitu caulem coronant. Vis eius efficax aduersus canis morsus, folijs ex sale illitis. Feruenti cinere flaccescunt folia, ut condylomata reprimant : purgant & fordidula ulcera cum melle.

**BALLOTE**, siue Marrubium nigrum, quod etiam ob odoris grauitatem à quibusdam Marrubium foetidum cognominatur, frequens in agrorum marginibus nascitur, & passim secus uias. Est autem hoc apiastro adeò simile, quòd facillè legentes falleret, nisi nares consulerentur : ita enim sua graueolentia citò innotescit. In Italia nullis non cognitum est, appellaturq; ab aliquibus Marrubiastrum, ab alijs Marrubium spurium. Huius meminit Paulus (etsi uires eius silentio præterierit Galenus) lib. vii. sic inueniens. Ballote, quod alij marrubium nigrum dicunt, acris est & absterforiæ facultatis. Illitum cum sale canum moribus medetur. Huic plantæ nomen Græcum, *βαλλοτή*, & *μέλας πράσιον* : Latinum, Marrubium nigrum, & Marrubiastrum. Italicum, Marrobiastro, & Marrobio bastardo : Germanicum, Schuuartz andorn : Hispanicum, Marroio negro : Gallicum, Marrubin noir.

† In Oribasij codice manu scripto hic interiectum legitur uerbum *μέλας*, quod folia quoq; Ballotæ nigra reddit. Nec temerè fortassis illud quis adijciendum putabit, quòd pulchrè alteri eius

## Apiastrum.

## Cap. CI.

**MELISSOPHYLLON**, siue melittæna, id est, apiastrum, id sibi nomen usurpauit, quoniam apes ipsa herba delectantur. Cauliculi, & folia ballotæ, de qua paulò antè diximus, similia essent, nisi maiora, tenuioraq; nec ita hirsuta spectarentur : citreū malum olent. Folia cum uino pota, aut illita profant, contra ictus phalangiorum, scorpionumq; : item aduersus canis morsum. Decocto eorundem gratia, foueri prodest : desessioibus scæminarum ad ciundos menses conuenit : dentes eodem indolore colluuntur. dysentericis infunditur. Fungorum strangulationibus folia, addito nitro, potu auxiliantur : torminibus, & orthopnoicis delinctu. Illita cum sale strumas discutiunt, ulcera purgant : articulares dolores illita sedant.

**MELISSOPHYLLON**, quod Latinis Apiastrum, & Citrago dicitur, Hetrusci ab odore citri uulgò uocant Cedronella, itemq; Melissa, sicut etiam Insuæ. Herba est uulgaris æquè notitiæ, atque odorata. Duo eius habentur genera, unum satiuum, alterum syluestre. Fuchsius tamen medicus clarissimus, Melissophyllum in tria genera digessit libro illo de compositione medicamentorum, quem imper auctum excudit. Sed curijs duo prima genera

Apiastri consideratio.



## APIASTRUM.

Apiastri vires  
ex arabibus.



Ex Galeno.

## MARRUBIUM.

Nomina.



quæ ( ut scribit ) grauiter odorata sunt, & cimices uerius quam citrum redolent, inter melissophylli genera connumerauerit, ego nescio, ipse dicat. Mihi quidem ( ut dicam ingenuè quod sentio ) planè absurdum uidetur, quod melissophyllum odore suo aliud referat, quam citreum malum, cuius tantum odorem spirare Dioscorides memoria prodidit. Melissophyllum, ad cuius facultates iam nostra progreditur oratio, in cordis affectibus, sicut ritani miris laudibus efferunt, tametsi id Græci, quod extet, siletio præterierunt. Proinde hæc Serapio retulit. Melissophylli, inquit, proprium est animum hilarem reddere: humenti, ac frigido uentriculo auxiliari, concoctionem adiuuare, cerebri obstructions referare, deficientem animum reuocare, cordis inbecillitatem roborare, eamq; præsertim, qua somnus frequentius nocte intercipi solet, quin & eius pulsus reprimere, animi solitudines fugare, ac sollicitas imaginationes tollere, quæ tum ab atra bile, tum ab exusta pituita gignuntur. His præterea facultatibus pollere Melissophyllum, comprobatur Auicennæ quoque testimonio, qui libro medicinis, quæ cordi conueniunt, dicitur ita de eo scribit. Melissophylli excalfacit, siccitatq; ordine secundo. Cor exhilarat, uitalesq; facultates roborat, odoris fragrantia, saporis austeritate, partiumq; tenuitate. Quibus facultatibus cæteris etiam uisceribus cõpetit. Vires deiectionis posidet, nec adeo imbecilles, quin atrabiliarios uapores à spiribus, & à sanguine, qui cordi, & arterijs inest, educere queat: quod in cæteris corporis partibus, ac etiam in toto corpore efficere nequit. Melissophylli meminit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, his uerbis. Melissophyllum marrubio simile est facultate, sed plurimum ab eo uincitur: quoniam nobrem nec uita tur eo quispiam. Superuacaneum siquidem foret præsentem marrubio, cuius tantus est ubiq; terrarum proventus, uelle uti melissophyllo. Cæterum si cui fortè ad manum quandoq; marrubium non fuerit, illo uti licebit ad eadem, modò quando ab hoc exuperetur, cognitum habuerit. hæc Galenus. Apiastrum, Plinio libro XX. cap. XI. auctore, in confessa damnatione est uenenatum in Sardinia. Ea planta Græcis μελισσόφυλλον dicitur, quæ Latinis Melissophyllum, & Apiastrum: Arabibus, Bederangis, Bedarungi, Bederenzegum, Turungen, seu Trungian, & Marmaacor. Italis, Melissa, et Cedronella: Germanis, Melissen, et Bienenkraut: Hispanis, Torongil, & Hierua cidrera. Gallis, Melisse, & Pomcirade.

## Marrubium.

## Cap. CII.

MARRUBIUM, frutex est ab radice ramosus, candidans, subhirsutus, quadrangularibus ramis: foliū pollicem æquat, subrotundum, hispidum, rugosum, guttularum: semen in caulibus, & ex interuallis: flores uerticillato ambitu, asperi. Nascitur propter ædificia, ruinas, & rudera. Huius folia sicca cū semine decocta in aqua, aut uiridium succus datur cum melle suspiriosis, tussienti, & ad tabitudinem redactis. Crassam è pectore purgat tam cum sicca Iri eicit. mulieribus à partu non purgat datur, ut menstrua, & secundas extrahat, item in difficili partu, & his qui uenena hauserunt, aut à serpentibus morsu sunt. uesicam, renesq; lædit. Folia cum melle illisuntur sordidis ulceribus purgandis: pterygia, nomasq; expressus, & sole coactus, ad eadem pollet: cum uino, & melle illitus oculorum claritatem adiuuat: naribus regium morbum expurgat. aurium doloribus conuenienter instillatur per se, aut cum rosaceo.

MARRUBIUM



**MARRUBIVM** vulgaris est planta, notiorq; omnibus in Italia, quàm ut pluribus indicanda sit. Eius duo genera constituit Theophrastus lib. VI. cap. II. de plantarum historia, ubi ita scribit. Sunt & Marrubij duo genera. Aliud enim folio herbido, serratori, incisurisq; profundioribus, & proinde conspectioribus discreto constat, quo unguentarij uti ad nonnulla consuevere. Alterum rotundius, squalesq; uehementer, sicut spbaceli, incisuras habens obscuriores, minusq; serratum. hæc Theophrasto. Ex quibus utique constare potest, Theophrasto alterum marrubium non aliud esse, quàm Dioscoridi balloten. Marrubij uires tradidit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Marrubium ut gustu amarum est, ita si quis utatur, consentientem huic saporis actionem possidet, iecur, ac lienem obstructione liberans, & thoracem, pulmonemq; expurgans, ac menses promouens. Sed & illitum detergit, ac digerit. Ponatq; ipsum quispiam in caliditate quidem secundi ordinis iam completi: in siccitate uero tertij medij, aut completi. Succo eius cum melle ad uisus acumen utuntur. Quinetiam & per nares morbum regium purgant, & ad aurium dolores inueteratos adhibent, in quibus sanè obstructions disicere, meatumq; ipsum, & ramos membrarum expurgare est usus. Id Græci *μαρρύριον* quod Latini Marrubium uocant: Mauritanij, Farasio, siue Frasium: Itali, Marrobio: Germani, Andorn, & Lungen kraut: Hispani, Marroio: Galli, Marrubin.

Marrubij cōsideratio.

Marrubij uires ex Gal.

Nomina.

## Stachys,

## Cap. CIII.

**STACHYS**, frutex est marrubio similis, sed longior, folia ferens numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucundi: & cōplures uirgas ab una radice exeuntes, marrubio candidiores. Nascitur in montibus, & asperis. Vim habet excalfactoriam, & acrem. Foliorum decoctum potu pellit menstrua, & secundas.

**STACHYS** frequentissima in Italia nascitur. assurgit enim uirgis compluribus, angulosis, ab una tantum radice exeuntibus, hirsutis, in marrubio tum longioribus, tum candidioribus: folijs numerosis, incanis, hirsutis, oblongis, præduris, odorisq; iucundi. Flores gerit in purpura albicantes, qui per interualla uerticillato ambitu caulem circundant marrubij modo. Ex quibus sanè notis satis constare arbitror, hanc herbam, quam pictam exhibemus, esse ueram Stachyn. Quibus etiam accedit, quod ea (ut Galenus testatur) amara sit, et gustu acris. Plinius lib. XXIIII. cap. XV. Stachyn porri similitudinem habere tradidit, Græcarum uocum affinitate deceptus, prason pro prasion legens. Siquidem *πράσον* porrum significat, *μαρρύριον* uero marrubium, cui Stachys est similis. Stachyos meminit Galenus lib. VII. simpl. medic. sic inquit, Stachys frutex est marrubio similis, gustu acris, et amaro, tertij est ordinis excalfacientium. Quamobrem rationabiliter nō solum menses mouet; sed & abortum affert, & secundas ei cit. *Στάχης* ut Græcè, ita etiam Stachys Latine uocatur: Italicè, Stachi.

Stachyos cōsideratio.

Plinij lapsus.

Stachyos uires ex Gal.

Nomina.

## Phyllitis.

## Cap. CIIII.

**PHYLLITIS** folia promit rumici similia, longiora, & uiridiora, fena, aut septena, recta, quæ parte anteriore læuia cernuntur, à tergo autem pensiles quasi uermiculos tenues ostendunt. In umbrosis, & opacis hortorum locis emicat. gustu acerbo. Neque caulem, neque florem, neque semen profert. Folia in uino pota serpentium morsibus aduersantur. quadrupedibus per os infusa auxilio sunt: & si dysenteria, aut resoluta aluus exercet, potui datur.

**QVI** notas omnes, quæ Phyllitidi à Dioscoride tribuuntur, diligentissimè expendere uoluerit, haud difficile qui dem fateri cogetur, Phyllitim esse eam herbam, quam aliqui Linguam ceruinam, nonnulli uero Scolopendriam perperam appellant: Perperam dico, quod legitimum Scolopendrium (ut infra suo loco dicitur) illa uimrum sit herba, quæ Græcis *Αβλένος*, Mauritanis uero ceterach dicitur. Quod autem ita se res habeat, hinc in primis ad credendū in pellor, quod umbrosi, opaci, humentibusq; locis proueniat: quodq; folijs sit rumici maioribus, longioribus, ac uiridioribus, rectis, anteriore parte læuib, à tergo autem eminentijs quibusdā transuersim per interualla signatis, sub rubentibus, quæ (ut Dioscorides inquit) pensiles uermiculos referunt. Opinione deinde auget acerbus sapor, qui gustu percipitur. Huc postremo accedit, quod caule, flore, & semine uacet: tametsi non desint, qui credant, eius semen pensilibus illis uermiculis prodire. Neque illud sententiæ nostræ quicquam obstare crediderim, quod huius her

Phyllitidis consideratio.




## PHYLLITIS.

Manardi,  
Leonice. Ruel-  
lij, & Fuch-  
sianus.

Phyllitidis  
uires ex Gal.

Nomina.



ba complures reperiantur plantæ, quæ præter Dioscoridis au-  
thoritatem uel quinquaginta emittant folia. Quippe (ut experien-  
tia compertum habeo) effodientibus nobis è terra hanc herbam  
nunquam ab una tantum radice tot folia erumpere uisa sunt, sed à  
quàm plurimis se simul tangentibus, ita tamen ut una ab altera  
separari posset. Vnde facillè cognoui, quòd si singulæ radices ab-  
inuiem distinctæ considerentur, non pluribus, quàm senis, aut  
septenis folijs refertæ inueniuntur. His itaque rationibus, mea  
quidem sententia, hac in re planè hallucinati deprehenduntur Ma-  
nardus, Leoniceus, Ruellius, & Fuchsianus, omnes alioqui cla-  
rissimi nominis uiri, quòd tam facillè crediderint, Linguam cer-  
uinam uocatam Phyllitim nequaquam referre, sed Hemionitim.  
Nam etsi Hemionitis caule, flore, & semine uidua sit; non ta-  
men folijs constat rumicis, sed dracunculi, curuis, nouæ hinc in-  
star. Illud insuper addiderim, quòd iam reperta sit Hemionitis,  
quæ omnibus prorsus notis legitimam refert. Sed ijs fortasse era-  
randi occasionem præbuit uulgi opinio, qui Linguam ceruinam  
non magno quidem negotio ad omnes lienis affectus assimere sua-  
det. quòd tamen Hemionitidis est proprium. Cuius fortè uulgi  
opinionem ij potius secuti, quàm quòd Phyllitidis lineamenta,  
notasq; diligentius perpenderint, in hunc facillè lapsum incid-  
runt. Phyllitidis meminit Galenus lib. VIII. simplicium medi-  
camentorum, sic inquit. Phyllitis cum qualitatibus sit acerbæ, nò  
absurdè diarrhœas, siue profluvia, & dysenterias potè uiuat.  
Planta, quæ *φυλλίτις* Græcis, Phyllitis item Latinis appellat-  
tur: Italis, Phyllite; Germanis, Hirtz Zungen; Hispanis, Lengoa  
ceruina; Gallis, Lang de cerf.

## Phalangium.

## Cap. CV.

leucacantha uocatur. Ramuli sunt ei duo, aut tres, pluresue, in diuersa tendentes; flos candidus, lilio  
similis, multas incisuras habens: semine nigro, † lato, ad lenticulæ dimidiatæ figuram, multò tenuiore:  
radice parua, tenui, herbacei coloris, dum à terra eruitur. prouenit in collibus. Huius folia, semen,  
flos cum uino pota, auxiliantur contra scorpionum, phalangiorumque ictus: tormina quoque  
discutiunt.

Phalangij eo  
sideratio.

E ADEM ferè, quæ hic de Phalangio posteritatis memoriæ prodidit Dioscorides, retulit Plinius lib. XXVII.  
cap. XII. ubi ita scribit. Phalangites à quibusdam phalangion uocatur, ab alijs leucanthemon, uel, ut in quibusdam  
exemplaribus inuenio, leucacantha. Ramuli sunt ei nunquam pauciores duobus, in diuersa tendentes. Flos candi-  
dus, libro rubro similis: semine nigro, lato, ad lenticulæ dimidiæ figuram, multò tenuiore: radice herbacei coloris.  
Huius folio, uel flore, uel semine auxiliantur contra scorpionum, phalangiorumq; & serpentium ictus: item contra  
tormina. Hæc Plinius. quæ omnia ferè, si conferantur, Dioscoridi accepta referri poterunt. Ceterum etsi non des-  
sint hodie herbarij, qui in Phalangij, ut in pluriū aliarum quoq; incognitarum plantarum locum herbas quasdam quales  
quales sint, substituant, atque rei herbariæ parum gnaris pro legitimis sepe ostendant; ipse tamen haud minus, ut in  
geniue fatear, uerum Phalangium non uidi in Italia, neq; ab alijs inuentum scio. quanquam non equidem negauerim,  
ipsum inibi nasci. Phalangij uires tradidit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Pha-  
langites sic appellata est, quòd morsis à phalangijs auxiliatur. Est autem facultatis tenuium partium, desiccantis.  
quamobrem & tormina patientibus succurit. Quod *φαλαγγιον* Græci, Phalangium quoque Latini dicunt:  
Phalangio, Itali.

Phalangij ui-  
res ex Gal.

Nomina.

† Si quis Græca Dioscoridis exemplaria consulat, hic non πλατύ, hoc est latum, sed παχύ, quod est crassum,  
scriptum reperiet. Quòd si præterea ea legat, quæ ex Plinio in commentario retulimus, deprehendet Ruellium in uer-  
tendo secutum fuisse Plinium, ex eoq; uocem illam reddidisse.

## Trifolium.



## Cap. CVI.

TRIFOLIUM, Græci triphyllon, alij oxytriphyllon, alij menyantes, alij asphaltion, uocant.  
Frutex supra cubiti altitudinem attollitur, uirgas habens tenues, iunceas, & nigras, unde ramulares e-  
nascuntur appendiculæ, in quibus terna singulis germinationibus exeunt folia, loto herbæ similis.  
ijs recenter enatis rutæ odor inest, ubi autem adoleuerunt, bitumen olent. Florem edit purpureum:  
semen




TRIFOLIUM ASPHALTITIS.

TRIFOLIUM PRATENSE.



TRIFOL. PRAT. ALTERVM.



semen quadantenus latum, subhirsutum, ex altera extremitate exertum, antennæ modo corniculum gerens. radix tenuis, longa, ualida. Semen, & folia in aqua pota pleuriticis, urinæ difficultati, comitialibus, & ijs qui aquæ inter cutem principia sentiunt, fœminis quoq; uul- uæ uitijis opportunis, auxiliantur: menses ciunt. ternæ drachmæ è semine dari debent, è folijs uerò quaternæ. Contra serpentium ictus trita folia, & ex aceto mulso po- ta, præsidio sunt. Tradunt aliqui, totius fruticis, radi- cis, foliorumque decoctum fotu dolores eorum finire, quos serpentes percusserint. qua autem aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui ulcus habuerit, perinde afficitur, ut à serpente demorsus. Quidam terna folia, aut semina in tertianis, cum uino potui dedere: & in quartanis quaterna, ut quæ februm circuitus discus- terent. Radix antidotis inseritur.

TAMETSI plura in Italia passim in pratis, ac uiridarijs Trifolij inueniantur genera omnibus planè nota; non tamen de his tradidit hoc capite Dioscorides, sed de eo tantum genera, quod è bituminis odore Asphaltitis dicitur, de quo etiam scribit Gale- nus. Verùm non ob id putandum, Trifolium pratense omne ge- nus Dioscoridi fuisse ignotum: siquidem eius meminit libro quar- to in sylvestris loti capite, dum ita scribit. Sylvestris lotus pluri- mum in Libya gignitur, caule bicubitali, & sæpe maiore, alis multis, folijs trifolij pratensis. Ex quibus utiq; Dioscoridis uer- bis liquet, eos maxime hallucinari, qui recenter contendunt Tri- folium pratense esse lotum sylvestrem, uel urbanam. Plinius lib. XXI. cap. IX. de tribus trifolij generibus, differuit in hunc mo- dum. Folio coronat & trifolium. Tria eius genera. meny.anthes

Trifolij con- sideratio.



Trifolium acetosum.


uocant Græci, alij asphaltion, maiore folio, quo utuntur coronarij. Alterum acuto, oxytriphylon cognominatum. Tertium ex omnibus minutissimum. hætenus Plinius. Trifolij acuti meminit quoque Scribonius Largus, qui ita scriptum reliquit. Trifolium acutum, quod oxytriphylon appellant, nascitur in Sicilia plurimum, nam in Italia regionibus nusquam eam uidi herbam, nisi in Lune portu, cum in Britanniam peterem cum Claudio Cæsare. Est autem folijs, et specie communi trifolio similis, nisi quod plura niora sunt folia, et quasi læuginem quandam super se habent, et odorem in extrema parte uelut eminentem aculeum. Sed si utex huius diuinum pedum, interdum altior conspicitur, et odorem grauem emittit, quorum nihil circa pratense trifolium inuenitur. hæc ille. Est et illud trifolij genus sapore acetoso, folijs subpallidis, tenuibus, cordis effigie: quod à quibusdam Panis cuculus, ab alijs Trifolium ACETOSVM, et Alleluja uocatur. Plinius (ut quidam putant) hoc oxyn nominat libro XXVII. cap. XI ubi sic inquit. Oxys folia terna habet. Datur ad stomachi dissolutum. Edunt et qui enterocelen habet. Nec plura de hac herba Plinius.

### TRIFOLIUM ACETOSVM.



Trifolium odoratum.

### TRIFOLIUM ODORATVM.



Trinitatis herbæ mērio.

Quorundam error.

Porro huic illud quoque Trifolium addere possumus, quod nonnulli Trifolium ODORATVM ideo cognominant, quoniam eius tum folia, tum flores non inuicundum spirant odorem. Romani ac Hetrusci pariter id uulgò uocant Tribulo: atque stillatitiam ex eo aquam eliciunt, odoris tantum gratia. Hanc plantam equi auarissime in pabulum suum sequuntur. unde factum est, ut quidam eam Trifolium equinum appellauerint. Planta est fruticosa, quæ ad trium cubitorum altitudinem attollitur, folijs trifolij pratensis, caule lignoso, ramulis pluribus referto. Florem edit muscosum, album, atq; etiam alicubi luteum. Radicibus nititur multis, albis, quæ per summa cespitum diuisaguntur. hæc de trifolio odorato, de quo etiam aliquid dicemus libro sequenti in Cytisi commentatione. Ceterum Trifolium pratense in Italia trium est generum. Primum folijs exit rotundis, et amplis: secundum longiusculis: tertium ut primum circinatis, sed breuioribus. Distant et florum colore, quod in uno flores albicent, in altero rubescant, in tertio lutei spectentur. Pratense trifolium tempestates prænuñciat. nam (ut Plinius est auctor) inborrescit, et folia contra tempestatem subrigit. Habetur præterea herba, de qua ideo hic inter trifolij genera differendum duximus, quod folio exeat triplici cornu diuiso: unde etiam apud quosdam herbarios sibi Trinitatis nomen comparant. Hæc itaque herba TRINITAS uulgò uocata, in locis prouenit uliginosis, et inter fruteta: gaudet enim opacis. Folia sunt triquetra, longis pediculis appensa, quæ auersa parte cyclamini modo subpurpureascent, superiore uero albis quibusdam maculis resperguntur. Caulem habet tenuem, in cuius cacumine primo statim uere flos emicat cæruleus. Radicibus nititur numerosis, tenuibus, subrubentibusq;. Huiusce meminisse Græcos, nec pariter Mauritanos, hæc genus compertum non habeo. Probatum maxime recentioribus medicis ad uulnera glutinanda, tam exterius illita, quam interius sumpta. quinetiam et ad enterocelas: in quem usum puluerem dimidij cochlearis mensura ex uino aut stero propinant. Sed ut ad trifolium nostra redeat oratio, eos in apertissimo errore uersari existimaui, qui An-



## TRINITAS.



dacocam Aphris uocatam, ad quamuis trifolij speciem referunt. Quandoquidem Andacoca (ut testatur Serapio) nil aliud est, quam Dioscoridis Aegyptia lotus. E' cuius semine, quod papauerum modo capitibus quibusdam includitur, Arabes sibi oleum conficiunt; quod miris laudibus efferunt in neruorum morbis, praesertimq; tremoribus: illudq; oleum de Andacoca appellant. Id enim non desunt, qui credant e' uulgari trifolij semine fieri. sed quam aperte decipiantur, uel ipsi uideant, uel alij iudicent. Trifolium scriptis tradidit Galeus lib. viii. simpliciu medicamentorum, sic inueniens. Triphyllum, quidam aspalion, quidam oxyphyllon, nonnulli miryantes, sunt & qui ciucium uocent. Prima quidem tria ab accidentibus frutici, reliqua duo nomina haud scio uide. Vis plantae est calida, & sicca ut bitumen, cui odore est similis, utrinque tertio ordine. Proinde pota laterum dolores ab obstructione natos inuat, & urinam, mensesq; prouocat. haec Galenus. Sed animaduertendum est, an Galenus ipse in Trifolij facultatibus recte perceperit Dioscoridis sententiam. Quippe is in libro de theriaca ad Pisonem, ubi plurimum medicamentorum facit mentionem, quibus contrariae insunt facultates, haec de eo memoriae prodidit. Trifolium herba, quae hyacintho similis est, cum uere parturit, & semen agresti cnico persimile obtinet, decocta admodum, deinde morsibus aranei, uel uiperæ quoq; ex aquae fœtu adhibita ipsis medetur, & dolores statim sedat. Sin autem in alio non conuorso sanum locum eodem fœtu circundederis, similem sensum, similesq; dolores ijs, quos morsus inuehit, omnes efficit. Vt re uera miraculum dignum opus esse uideatur, uidelicet herbam & morsum sanare, & ferarum modo sanam partem prauè afficere. haec Galenus. Verum id, si Dioscoridis uerba recte expendantur, nullo miraculo fieri facile constabit, sed potius secundum ipsius naturæ ordinem. Siquidem (ut Dioscorides scribit) non omne trifolij decoctum illud efficere potest, sed tantum id, cuius fœtus

Trifolij uites  
ex Galeno.

Galenus sententia  
damnata.

quispiam a ferarum morsibus liber euaserit, si eo alterius locus ulcera affectus persundatur. Id quod aperte Dioscorides uerba declarant, cum inquit. Tradunt aliqui totius fruticis, radices, foliorumq; decoctum fœtu dolores eorum fieri, quos serpentes percusserint. Qua autem aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui ulcus habuerit, perinde afficitur, ut a serpente demorsus. Ex ijs Dioscoridis uerbis clarum fieri puto, hanc rem in se nihil admirationis habere. Nam cum Trifolij ipsius decoctum, quo demorsus fouetur, uenenum a uulnere extrahat, eiq; permisceatur, haud dubie id uenenosum redditur. Quamobrem minime quidem mirum uideri debet, si idem decoctum, quo quispiam non demorsus foueatur, ubi per fœse partes aliquo ulcere laborauerint, ueneno per ulceris poros ingredientem, ac sanguini se commiscente, ea omnia excitet mala, quibus demorsi uexantur. idem enim uenenum cum sit, eosdem quoque præbeat effectus necesse est. Vnde liquido colligi potest, quod uirus a Trifolij decocto euocatum, non autem Trifolium, sit illud, quod similem sensum, similesq; dolores faciat. Quod autem uenenum exuctum a ferarum morsibus ulceratis particulis contactum necem asferre possit, complures tam Graeci, quam Arabes auctores, manifestè demonstrant. Quandoquidem scribentes ore demorsos sugere præstantissimum esse remedium, serio nos admonent, ne id ore ulceribus affecto fiat: quoniam si uenenum illud ulcus inficeret, sugentem in mortis discrimen duceret. Haec itaque sunt, quæ me maximè mouent, ut credam Galenum hac in re Dioscoridis mentem non accepisse, atque etiam, si licet dicere, cecutiuisse. Cæterum non desunt, qui uelint, ut Galenum tueantur, librum de theriaca ad Pisonem non esse legitimum, idq; pluribus rationibus comprobant. Quibus an assentiendum sit, iudicent ij, qui Graecam Galeni phrasin proficiuntur, quiq; eius uolumina diutius euoluerunt. Ego certè, ut dicam quod sentio, non possum non illis subscribere, qui librum illum spurium esse censent. Inter quos hic mihi honoris gratia nominandus uenit Iulius Alexandrinus Tridentinus uir quidem singularis ingenij & eruditionis, ac propterea maxime existimationis medicus apud Sereniss. Ferdinandum Rom. Regem. Huius ergo uiri iudicium, ut quod multis & ijs quidem firmis argumentis nitatur, & laudamus libenter, & probamus. Τρίφυλλον id Graeci uocant, quod Latini Trifolium: Itali, Trifoglio: Germani, Vuysenklee: Hispani, Trenol.

Nomina.

## Polium.

## Cap. CVII.

Duo genera polij. Montanum, cui teuthrio nomen est, & cuius est usus. tenuis frutex est, candidus, dodrantalis, semine refertus: capitulo in cacumine quandam corymborum speciem præferente, paruo, cano hominis capillo simili, grauitè olente, non sine quadam suauitate. Alterum fruticosius, non usqueadè ualens odore, & uiribus infirmius. Potum feruēfacti ius auxiliatur serpentium ictibus, hydropicis, & morbo regio: & lienosis ex aceto: stomachum malè habet, caput




put doloribus afficit : aluum, & menses ciet. substratum, suffitum ue serpentes abigit : illitum uulnera conglutinat.

## POLIVM.



## POLIVM ALTERVM.



Polij confideratio.

Plinij lapsus.

Polij uires ex Galeno.

Nomina.

SEPLASIARIJ illi, qui pro Polio herbam quandam usurpant, quæ numerosos profert cauliculos, tenues, rectos, rotundo quodam semine undique refertos, euidentius, meo quidem iudicio, errant, quam ut eorum erratum explodi mereatur. quandoquidem herba hæc nullis prorsus notis Polium representat. Porro utrumque Polij genus, quod nulla reclamante nota legitimo respondeat, in pluribus Italiae locis prouenit. Primum uulgius herbariorum Iuam muscatam appellat, à quo secundum effigie non longè distat, quanuis non adeò sit odoratum. Secundi generis Polium, cuius etiam picturam adiecinus, uiret Venetijs in horto Maphæi excellentissimi medici. Polij meminit Plinius lib. XXI. cap. VII. ubi ita scriptum reliquit. Apud Græcos Polion herba inelyta Musæi, & Hesiodi laudibus, ad omnia utilem prædicantium, superq; cætera ad famam etiam dignitatis: prorsusq; miram, si modò (ut tradunt) folia eius mane candida, meridie purpurea, sole occidente cærulea aspicuntur. Duo genera eius, campestre maius, syluestre quod minus est: quidam teuthrion uocant. folia canis hominis similia, à radice protinus, nunquam palmo altiora. hæc Plinius, quorum plura à Theophrasto mutuatus est. Ceterum in ijs Plinius apertè hallucinatus deprehenditur, quòd turpiter Polium cum tripolio confuderit, cuius historiam libro quarto pertractat Dioscorides. Siquidem Tripolij proprium est, non autem Polij, teste Dioscoride, ut colores ter in die mutet: neque id quidem à Dioscoride, ut à Plinio folijs, sed floribus adscribitur. Præterea capitulum Polio inesse cano hominis capillo simile scribit Dioscorides, non autem folia, ut ipse Plinius tradit. Polij uires memoria prodidit Galeus libro VIII. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Polium amarum est gustantibus, & modicè acre. Itaq; uiscera omnia obstructione liberat: urinamq; & menses ciet. Ac uiride etiamnum magna uulnera glutinat, maxime species eius fruticosa. Aridum cum fuerit maligna ulcera sanat illitum: & magis hoc præstat quod minus est. Polium minus, quo etià utimur ad antitidota, & acrius, & amarius est, quàm maius, adeò ut ex tertio sit ordine desiccantium, ex secundo autem completo excalescentium. Planta Græcis πόλιον, Latinis item Polium appellatur: Mauritanis, Cahade, Iahade, seu Giade: Italis, Polio.


## Scordium.

## Cap. CVIII.

SCORDIVM in montibus, & palustribus nascitur, folijs triflaginis, maioribus, non sic in ambitu diuisis, aliquantum allia redolentibus, gustu amaris, & adstringentibus: quadrangulis caulibus? subrubris flore. Herba uim excalescentiam habet: urinam cit. Cocta recens, arida ue cum uino, aduersus uenenatos serpentum morsus bibitur: ad stomachi quoque rosiones, dysenteriam, & urinæ difficultatem, binis drachmis cum hydromelite: crassamen purulentum pectore expellit. Facit arida farina



## SCORDIVM.



ALLIARIA.



farina ad uetrem tussim, rupta, conuulsa, si cum nasturtio, melle, & resina misceatur in eclegmate. Inflammata modicè præcordia, cerato excepta, recreat: cum aceto acri, aut aqua, podagris conuenienter illinitur: menses imposita mouet, uulnera conglutinat, uetera ulcera purgat, & ex melle cicatricem perducit. Sicca excrecentias in carne cohibet. Succus ad eadem uitia bibitur. Inter prima efficax Ponticum natione, Creticumque.

SCORDIVM non ita pridem inueniri, & cognosci cepit in Italia. Siquidem præterita uuper ætate omnes iun medicum seplasiarum Mauritanorum monumentis decepti, syluestri tantum alio, quod à Dioscoride ophioscorodon uocatur, pro legitimo Scordio utebantur. Neque ijs solum rerum imperitia, sed etiam uocabulorum uicinitas imposuerat, ut in Scordium à Scorodo, quod Græcis allium significat, distinguere nescierint, pro unoque acceperint. Sed illis potissimum errandi occasionem dederat Auicenna, uel eius interpres, quod in alteram theriacæ compositionem Scordium, in alteram uero syluestre allium addiderit. Quod cum uidissent superioris ætatis medici nonnulli rei, & prioris uocis ignari hanc ex altera exposuerunt, & Auicennam in hac re sui ipsius interpretem fecerunt. Vnde adducti sunt, ut cerato crediderint syluestre allium, & Scordium nihil inter se differre, atque unam & eandem plantam esse. Quo postmodum factum est, ut syluestre allium apud omnes in Scordij locum illegitimè successerit. Verum enim uero in hunc nunquam fortasse incidissent errorem, si Dioscoridis, & Galeui scripta diligenter perlegissent. Porro uerum legitimumque Scordium, triffagini adeo simile, ut Triffago palustris merito dici queat, humentibus ac palustribus locis proueniens, alij odore præditum, recentiorum diligentia iam omnibus magis innotuit, quam ut sit à nobis longiori historia representandum. Prætulit Galenus libro primo de antidotis Scordium, quod ex Creta aduehitur, ijs uerbis. Scordium optimum ex Creta defertur: quanquam non sit improbandum quod in alijs quoque nationibus reperitur. Scriptum autem est à quibusdam uiris grauissimis, cum in bello interemptorum cadauera multos dies insepulta iacissent, quæcumque supra Scordium forte fortuna ceciderant, multo minus alijs putruisse, ea præsertim ex parte, qua herbam contigerant. Ob quam rem sanè omnibus persuasum est, tam putrefacientibus animalium uenenis, quam medicamentorum deleterijs Scordium aduersari. Præterea Scordij meminit idem Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, ubi de eius uiribus ita scribit. Scordium ex multiformibus id tum saporibus, tum facultatibus constat. nam & amarum quid obtinet, & acerbum, & acre, & maxime scorodo, hoc est, alio ad similes eius est acrimonia: unde sanè, mea sententia, nomenclaturam sortitum est. Expurgat igitur, sinulque excoctum uiscera, tum menses, urinamque mouet. Præterea conuulsaruptaque, & laterum dolores ab obstructione, & frigore natos sanat epotum. Denique uiride quidem illitum magna uulnera conglutinat: sed sordida purgat, & maligna ad cicatricem perducit, illitum aridum. hæcenus Galenus. Ceterum herba quædam iuxta sepes, & in agrorum marginibus nascitur, quæ & odore, & sapore ita abunde allium refert, ut non temerè uulgo ALLIARIS sine Alliaria uocetur. Huius folia cum primum erumpunt, ferè rotunda spectantur uiolæ similitudine, postquam uero adoleuerint, per ambitum in serræ modum laciniata uisuntur, ut quadantenus mellissophylli effigiem representent, lauiora tamen sunt, nec adeo rugosa, & prope caulem latiora: quæ digitorum attritu, gustatuque alij odorem, & saporem reddunt. Caulem profert bicubitalem, rotundumque: flores albos, & semen nigrum,

Scordij consideratio.

Scordij uires ex Galeno.

Alliariæ herba mentio.



Nomina.

grum, minutumq; irionis modo tenuibus siliquis inclusum. Radix, quæ longiuscula est, eundem cum folijs odorem retinet. Vis plantæ huic calfactoria, & desiccatoria, uerum non adeo uehemens est, ut in allio. Attamen hinc certo colligi potest, quod ea crassos humores extenuare, & lentos incidere ualeat. Semen emplastri modo impositum, uulnæq; adnotum, mulieres uteri strangulatu oppressas liberat, & excitat. Quæ planta *σκόρδιον* Græcè, Scordium similiter, & Trissago palustris Latine uocatur: Arabicè, Scordeon, seu Scordeum: Italicè, Scordio: Germanicè, Vuasser batenig, & Knoblochs kraut: Hispanicè, Scordio: Gallicè, Chamaraz.

## Tussilago.

## Cap. CIX.



Tussilaginis, consider.

TVSSILAGINI folia sunt maiuscula, quam hederæ, sex aut septem à radice, subalbida à terra, supernè uirentia, in plures angulos exeuntia. Caulis palmum altus: flos luteus, uere prodit, quo unà cum caule confestim exiit: inde nonnulli his uacare existimarunt. Radix tenuis est, † & superuacua. nascitur in amœnis & riguis. Folia ex melle trita igni sacro, & omnibus inflammationibus illitu medentur. Arida suffitu, ita ut fumus per infundibulum hianti ore rapiatur, hos sanant, qui sicca tussi, atque orthopnoea infestantur: pectoris uomicas rumpunt. Eundem effectum præbet suffita radix. decocta in hydromelite, & pota, emortuos partus eijcit.

TVSSILAGO Hetruscis uulgò dicitur Farfara, & Farfarella, nomine à Romanis fortasse deducto: hanc enim ab ijs Farfariam uocatam fuisse testantur nomina Dioscoridi falso adscripta. Officinæ hos, uel illos secuta eam Farfaram appellant, nec non etiam Ungulam caballinam. Herba est uulgaris notitiæ. Causa le, & flore exit adeo fugacissimis, ut Plinius, qui eorum tam subitam iacturam nō animaduertat, deceptus Tussilaginem sine caulibus, & sine flore nasci memorie prodiderit: cum tamē ea uere prius mo & caulem, & florem proferat, sed qui enati breui admodum tempore durent, quo non nisi etiam à peritis, uel ab ijs, qui tunc sese fortè fortuna tulerint, obuiam, conspici possint, eoq; magis, quod iidem caulibus, & flos prodeant, priusquam folia emicent. Quare scite scripsit Dioscorides, Tussilaginem confestim exiit tum flore, tum caule, atque inde nonnullos his uacare existimasse. Sed certè uel hæc non legit, uel illa non obseruauit Plinius, quod Tussilaginē aperto errore, & caule, & flore uiduam fecerit. Is Plinij error deprehenditur lib. xxvi. cap. vi. ubi ipse de Tussilagine differit ijs uerbis. Tussim sedat Bechion, quæ & Tussilago dicitur. Duo eius genera. Sylvestris ubi nascitur, subesse aquas credunt, & hoc habent signum aquileges. Folia sunt maiuscula, quam hederæ, quinq; aut sex ptem, subalbida à terra, supernè pallida: sine caule, sine flore, sine semine: radice tenui. Quidā eandem esse bechionem, & alio nomine chanaleucem putant, Huius aridæ cum radice fumus per arundinem haustus, aut deuoratus, ueterem tussim sanare dicitur: sed in singulos haustus passum gustandum est. Altera à quibusdā saluia appellatur, similis uerbascio. hæc Plinius. Verum altera Tussilago, cuius nulla fit mentio à Dioscoride, utpote qui uno tantum eius genere contentus fuerit, mihi hætenus incomperta est: nisi ea fortasse sit, quam aliqui herbariorum Centrum galli uocant. Porro nascitur in Tussilaginis radice quædam subalbida lanugo, quæ à radicum segmentis prius repurgata, & deinceps de linteolis inuoluta, & in lixiuio parum decocta, addito salis nitri aliquatulo, ac demū sole siccata omnium optimis fomes ad ignem c silice excussum excipiendum. Quippe adeo ignis est rapax, ut statim primo tantum galli uocant. cussu accendatur. Tussilaginis facultates posteritatis memorie tradidit Galenus lib. vi. simpl. medic. sic inquit. Bechium ideo sic nuncupatum est, quod βήχας, hoc est, tusses, & orthopnoas iuuare creditum sit, si quis uidelicet folia arida sumens, aut radicem in prunis accendens, ascendentem inde fumum inspiratu attrahat. Est autem modice acris, ut sine molestia noxæ omnes thoracis abscessus credita sit rumpere. Sanè folia uirentia partes crudæ inflammatione obsessas, illitu extrinsecus adiuuant, propter aqueæ humiditatis admisionē: qua omnia uiridia, teneraq; participant alia plus, alia minus. Nā sicca Bechij folia acriora sunt, quam ut partibus inflammatione laborantibus cōueniant. Quæ planta βήχων Græcis, Tussilago Latinis uocatur: Officinis, Farfara, & Ungula equina: Italis, Farfara, Farfarella, & Vngbia di cauallo: Germanis, Rosshuob, & Brantlattich: Hispanis, Vnha de asno: Gallis, Pas de asne.

Fomes ignis ex tussilag.

Tussilaginis ueres ex Gal.

Nomina.

† Nulli dubium est, quin hoc loco in Dioscoride mendum subsit. Quomodo enim radicem hunc à nemine inter pretum, quod sciam, animaduersum, uidit Manardus, uidit item Fuchsius, sed uterq; tamen locum inemendatum reliquit. Equidem, ut dicam quod sentio, uerbum illud ut adscititium delendum esse puto, Oribasij testimonio nixus, in cuius codice manu scripto illa dictio non legitur.



## Artemisia.

## Cap. CX.



ARTEMISIA magna ex parte in maritimis nascitur, absinthij modo fruticosa, maioribus, & pinguioribus folijs, ramisque. Huius quidem genera duo. Vnum latius, habitiusque, folijs, uirgisque latioribus. Alterum tenuius, flore paruo, tenui, candido, graeolente. æstate floret. Sunt qui in mediterraneis unicaulis nomine appellant tenuem herbulam, simplici caule, & minuto, floribus scatente tenuibus, flauo colore. hæc iucundiolem, quam præcedens efflat odorem. Vtraque excalfacit, extenuat, feruefactæ conuenienter in muliebres desessus adijciuntur, ad detrahendos menses, partus, secundasque: item ad præclusiones uulvæ & eiusdem inflammationes: calculos comminuunt, remorata urinam cient. menses pellunt pubi illitæ. Succus vulvæ inditus ex myrrha eadem, quæ infectio trahit. Coma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur.

## Artemisia tenuifolia.

## Cap. CXI.

ARTEMISIA tenuifolia in sepibus, & cultis iuxta aquarum ductus nascitur. Eius flores, & folia contrita sampluchi odorem reddunt. Si quis stomacho laborans, herbam cum amygdalino oleo bene contundat in malagmatis lentorem, & stomacho imponat, sanitati restituetur. Qui neruorum quoque dolore cruciatur, si succum eius cum oleo rosaceo miscens illinat, sanatur.

TRIA à Dioscoride recensentur Artemisise genera. Verum

Artemisise cōsideratio.

priora nullis inter se notis certant, nisi quod in uniuersum altera maior est, altera uerò minor. quæ priuatim florent. Genit candidum, paruum, tenuem, ac grauitèr olentem. Quæ autem tertio generi adscribitur, herbula est simplici, tenuisq; caule, floribus plurimis referto, flauo colore. Id quod etiam confirmat Plinius lib. x xv. cap. vii. sic inquit. Artemisia absinthij modo fruticosa est, maioribus folijs, pinguiusq;. Ipsius duo genera: altera latioribus folijs: altera tenera, tenuioribus, & non nisi in maritimis nascens. Sunt qui in mediterraneis eodem nomine appellant herbam simplici caule, minimis folijs: flores copiose erumpentes, cum uia maturefcit, odore non iniucundo, quam quidam botryon, alij ambrosiam uocant. Talis in Cappadocia nascitur. hæc Plinius. Qui tametsi in prioribus Artemisise generibus, nihil à Dioscoride dissentiat; dissidet tamen, & errat in tertio, quod in eius locum ambrosiam sequebat. Quæ autem ab ipso Dioscoride descriptam subiecerit, credideritq; deceptus hic ambrosiam, & tertium Artemisise genus, uiam & eandem esse plantam. Ceterum prima duo Artemisise genera Hetruscis frequentissima sunt, neque in alio inter se distant, quam quod in maiori omnes partes maiores spectentur, in minori uerò minores: alijs facie; & formâ similia constant, quinetiam idem sapor, & odor, eademq; facultas utrique iuest. Quare equidem nescio, quæ ratione ductus Brasauolus Ferrariensis in suo simplicium examine pro certo crediderit, eam herbam minorem esse Artemisiam, quæ in Hetruria officinis Matricaria, & uulgò mulieribus Amarella uocatur. Sed cō magis mirum facit aliqui celebrem admirari subit, quod scriptis tradiderit duas alias esse Ferrariæ Artemisise species nullis prioribus notis distinctas, præterquam quod alteri unus tantum sit ramus, alteri uerò plures. Eius uerba subijcere lubet: Non dubito, inquit, ut nonnulli fecere, eam quæ apud nos corrupto uocabulo Arcemise dicitur, ac si Artemisia dicam sit, ueram Artemisiam esse, quæ folia absinthio similia habet, ut Dioscorides inquit, & eius duo genera facit Monoclonon, & Polyclonon, id est, unum ramum, & plures ramos habentem. Ambas species Ferrariense uulgus nouit, si aptè distinguere sciret, quoniam & ipsis indiscriminatim utitur. Quam nos Matricariam, & Marellam uocamus, Artemisise species est, illa scilicet, quæ malè olet. Nec obstat, quod Ferrariæ duæ species Artemisise sint per unum, & plures ramos distinctæ, quoniam & hæc in specie est, quæ plures habet ramos. hæc Brasauolus. In quibus sanè uerbis eius plura, meo iudicio, deprehenduntur errata. Quorum primum illud est, quod non scripsit Dioscorides, alteram primi generis Artemisiam multiplici constare caule: alteram uerò simplici tantum confingere, ut Brasauolus suo modo interpretari uidetur. Sed auctor is duntaxat tradidit (ut etiam Plinius refert) quod aliqui reperiuntur, qui in mediterraneis unicaulis nomine appellant tenuem herbulam, simplici caule, & minuto, floribus scatente tenuibus, flauo colore. Verum hæc tertio Artemisise generi assignantur, non autem secundo, uel primo, ut Brasauolus existinat. Altero deinde errore notatur, quod asserat Matricariam, siue Marellam, quam legitimum Dioscoridis parthenium censemus, esse graeolentem Artemisiam. Quandoquidem minor illa,

Plinij lapsus.

Plura Brasauoli errata.



quæ Dioscoridi secundo loco redditur, grauiter olens, non quidem florem profert in medio luteum, & per ambitum albis foliolis cinctum Matricariæ, uel amarelle modo: sed candidum, paruum, ac tenuem. Tertius his accedit error, quod non assentire uideatur, duo illa Artemisiæ genera, quæ Ferrariæ persimiles habentur, ea esse, quæ à Dioscoride primo loco representata sunt, magnitudine tantum, ac paruitate differentia. Sed cum porro seipsum hæc in re deceptum deprehendisset Brasauolus (ut legitur in suo ultimo uolumine Venetijs impresso) dum longa oratione contendit Amarellam, seu Matricariam inter Artemisiæ genera reponendam esse, Cotulam uero foetidam Ferrariensibus Brusciaculo uulgo uocatam esse legitimum parthenium, adeo seipsum (pace eius dixerim) & sua scripta confutauit, ut nullo pacto (dicam liberè quod sentio, alijs tamen iudicandum relinquo) quid is tandem decernat, percipi possit. Nam cum asserit Amarellæ, siue Matricariæ succum unciarum quatuor pondere haustum utranque bilem, ac pituitam deijcere, apertè quidem fatetur hanc esse Parthenium, cui priuatim ea uis inest. Attamen paulo post eorum sortè oblitus, argumentis quibusdam satis, nequa quidem sententia, leuibus contrà assenerat, nil aliud esse Parthenium, quàm suū Brusciaculum. Ruellius præterea quauis in primis Artemisiæ generibus planè Dioscoridi subscribat; in tertio tamen hallucinatus deprehenditur, quod tertij generis Artemisiam eam esse putet, quam alij Athanasiam, alij Tanacetum appellant. Siquidem Tanacetum nostrum stolonibus compluribus ab ima tantum cacumine gregatilis, crassis, altis, ac firmis: folijs longis, amplis, crebris diuisuris dissectis: floribus luteis, in caulium cacumine gregatim emicantibus. Porro Artemisia, quæ tertio adscribitur generi, tenuis herbula est, uno duntaxat caule, ipsius minutò consurgens. Hanc equidem (ut ingenuè fatear) hæcenus in Italia non inueni, neq; ab aliquo inuentam uidi. Quin potius eam inuentu difficillimam duxerim. quippe cum tam Dioscorides, quàm Plinius satis obscurè, perplexèq; de ea scripserint, & caulibus, foliorum, florum, seminis, & radicis notas silentio inuoluerint, non modò difficillimum uideretur, sed uix etiam fieri posse putauerim, ut quis unquam hanc Artemisiam legitime demonstraret. Neq; tamen in hoc audacius est Plinius, qui (ut supra diximus) hanc esse Ambrosiam falsò memoria prodidit. Nam præterquam quòd ratione consentaneum non est, quòd Dioscorides duobus tam propinquis capitibus unius et eiusdem plantæ historiam tractauerit, euidentissimum est, Ambrosiam sequenti capite descriptam huius tertie Artemisiæ descriptioni haudquaquam respondere. Ad hæc non in minori, quàm Brasauolus, & Ruellius, uersantur errore Monachi illi reuerendi, qui Matricariam suam commentati sunt. quippe qui & hunc, & illum secuti duplici hallucinatione scriptis tradiderint, Matricariam uulgo uocatam omnino esse minorem Artemisiam, Tanacetum uero eam, quæ unicaulis dicitur. In horum denique opinionibus, uel potius erroribus ipse quoq; Fuchsius implicatur, uir aliqui ingenio, et eruditione præclarus, Artemisiam etiam nemini dubitandum esse censeat in suis de stirpium historia commentarijs, quin Matricaria sit alterum Artemisiæ genus, Tanacetum uero tertium. qua in re is fortasse fuit, qui maluerit cum alijs errare, quàm solus rectè sentire. Cæterum facillè credere nonnulli diligentissimi simplicium medicamentorum inquisitores, ac etiam Dioscoridis discipuli, qui sanè nulli unquam labori pepercerunt, ut hanc medicinæ partem superiori ætati obscuram nostræ illustrem redderent, tertium Artemisiæ genus in Dioscoride ascititium esse. Quòd in huius capituli initio nò tria, sed duo tantum esse Artemisiæ genera scribat Dioscorides. Quòd præterea reperiantur huius auctoris codices antiquissimi, in quibus illa de tertio Artemisiæ genere non leguntur. quemadmodum etiam in nostro ex impressis libro, in quem castigationes ex uetustorum exemplarium manuscriptorum Dioscoridis, & Oribasij collatione excerptas collegimus, quis accèptas refero Gabrieli Falloppio Mutinensi medico clarissimo, nunc Patanijs summa cum omnium laude, & admiratione, corporis humani, & rei medicæ materiam profitenti. Cui certè ob eius singularem in me amorem ac liberalitatem, atq; etiam in omnes humanitatem, me plus debere scio, quàm aut re, aut uerbis respondere possim. Cum itaq; (ut eo redeam, unde obiter digressus sum) in Dioscoride suspecta sit tertia Artemisia, nil mirum uideri debet, si in eius historia cæcutiuit Plinius. Neq; item mirandum est, si eius non meminerunt Galenus, & Paulus: qui tamen aliqui in simplicium censu Dioscoridis scripta bona fide referre solent. Non desunt insuper doctissimi uiri, et in plantarum historia diutius uersati, qui Artemisiæ tenuifoliæ caput Dioscoridi accreuisse, atq; adulterinum esse censeant, hoc ducti æquamento, quòd cum superiore capite de omni Artemisiæ genere differuisset Dioscorides, absurdum quippe esset, quòd seorsum Artemisiæ genus aliud subiungeret. Addunt etiam, quòd huius Artemisiæ inter simplicia usquam meminerint Paulus, Oribasius, & Serapio: qui tamen (ut paulò antè dixi) illa ex Dioscoride transcribunt. Horum sententia est planè probandam existimem; cum tamen uulgati Græci codices hoc loco Artemisiæ tenuifoliæ caput habeant, illudq; à quibusdam reddatur, nobis quoq; adiiciendum, eiusq; aliquam saltem mentionem faciendam duxi: præsertim quòd nò desint, qui id Artemisiæ genus inueniri tradant. Siquidem Ruellius est auctor, ipsum in Gallia nasci circa riuulos aggeresq; item in frumentaceis agris, atq; inibi uulgo diui Ioannis herbam nominari. Verùm cum difficillimum esse putem, ut hæc planta ab aliquo cognoscatur, & legitime demonstretur, quòd nullis prorsus notis depingatur, nescio quidem quomodo Ruellio uiro aliqui fide digno in hoc quis rectè adstipulari debeat, aut meritò possit. Diuinitatem geuerum Artemisiam fecit, eorumq; uires reddidit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, his uerbis. Duplex quidem est herba Artemisia. Vtraq; exalfacit, & modicè desiccatur: & sunt, quòd ad calfactionem attinet, ex cessus secundi: quòd uero ad ressecationem, aut primi intensi, aut secundi incipientis. Sunt autem & modicè tenuium partium. Itaq; ad renum calculos mediocriter commoda sunt, & ad fomentationes uteri. Herba quæ Hispanis Græcis, Artemisia item Latinis, pariter & Italis dicitur: Germanis, Beyfuos, & Sant Iohans gurtel: Hispanis, Artemisia: Gallis, Armoise.

Ruellij hallucinatio.

Monachorum & Fuchsi error.

Artemisiæ uires ex Gal.

Nomina.



## Ambrosia.

## Cap. CXII.



BOTRYS.



AMBROSIA pusillus frutex est, ramosus, trium palmorum altitudine: folijs rutæ, circa imum caulem exiguis: cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi, qui nunquam florem pariunt, odore uinoso, suaui: radice tenui sesquipedali. Coronantur ea Cappadoces. Vis eius reprimere, ac repellere, & illitu adstringere humores, qui in aliquam partem incumbunt.

ET SI in nostris illis commentarijs, quos primùm superioribus annis Italica lingua conscriptos edideram, ingenuè cōfessus essem, me nunquam uidisse Ambrosiam in Italia; postea tamen ea uarijs in locis se mihi obtulit inspicieda, præsertimq; secus mœnia arcis Vipaci (locus enim is distat à Goritia circiter uiginti millia passuum) inter durissimos lapides orta. Cui cū inibi ex tempore obuiā factus essem, eamq; conspexissem, botrys modo, racemoso semine refertam, statim inclinauit animus, ut certò ducere hanc esse Ambrosiā. Ea quanuis à Dioscoride, & Galeno non alijs representetur uiribus, quàm ut reprimere, repellere, et illitu adstringere ualeat humores, qui in aliquā partem decumbunt; dixere tamen non poetæ solum, sed plantarum quoq; scriptores non contemnendi, nulla alia de causa præstantissimam hanc plantam à ueteribus Ambrosiam fuisse uocatam, quàm quòd suo in cibis usu longeuos faciat homines, quemadmodum Ambrosiam illam, quæ Deorum fertur cibus, Deos immortales, perpetuosq; conseruare fabulantur. Ambrosiæ meminit Plinius libro XXVII. cap. IIII. ubi eam ijs uerbis depinxit. Ambrosia uagi nominis est, & circa alias herbas fluctuans, fruticem unum habens deusum, ramosum, tenuem, trium ferè palmorum, tertia parte radice breuiore, folijs rutæ circa imum caulem. In ramulis semen est uuis dependentibus, odore uinoso, qua de causa botrys à quibusdā uocatur, ab alijs artemisia. Coronantur illa Cappadoces. Vñs eius ad ea, quæ discuti opus sit. hæc Plinius. Ambrosiæ quoq; facultates, sed quàm breuissimè, tradidit Galenus lib. V. I. simplicium medicamentorum, sic inquit. Ambrosia cataplasmate imposita uim habet adstringentem, ac repellentem. Ea ut Græcè ἀμβροσία, ita etiam Latine, & Italice Ambrosia nominatur.

Ambrosiæ cōsideratio.

Ambrosiæ uires ex Gal.

Nomina.

## Botrys.

## Cap. CXIII.

BOTRYS fruticosa herba est, lutea tota, & in multis alas sparsa: semen circa totos ramulos provenit: folia cichorio similia. tota suauem odorem spirat, qua re uestimentis interponitur. Inuenitur in torrentium ripis, & conuallibus. Pota orthopnceas mulcet. Hanc Cappadoces Ambrosiam uocant, alij Artemisiam.

LEGITIMA, & uera Botrys sabulosis, & aridis gaudet, quin & glareosis fluuiorum alueis. Ideoq; Tridenti frequentissima nascitur secus Fersinam, & Lauisium rapidissimos torrentes, & in alijs quàm plurimis locis. Goritiæ mulieres Botryn in hortis serunt, quòd eam uteri affectibus opitulari existiment. Fruticat hæc folijs cichorij, laciniatis, sinuosisq; quercuum foliorum similitudine: ramis numerosis, tenuibus, semine copiosissimo, racemosoq; refertis. Plauta tota succo quodam resinoso madet, adeo ut comprehensa resinæ modo manibus hæreat. Odorem quidem acrem spirat, & qui nares quodammodo feriat, sed tamen is suauitatem retinet. Plinius uidetur ex Dioscoride Botryn reddidisse lib. XXVII. cap. VIII. ubi eam in hunc modum descripsit. Botrys fruticosa herba est, luteis ramulis: semen

Botryes cōsideratio.



Botrys vi-  
res ex Paulo.  
Nomina.

circa totam nascitur: folia cichorio similia. Inuenitur in torrentium ripis. Medetur orthopnoicis. hactenus Plinius. Ceterum huius herbe, quod equidem legerim, non meminit Galenus in simplicium uicamentorum censu. Eius tamen facultates ex Dioscoride retulit Paulus lib. VII. ubi sic inquit. Botrys, quam aliqui ambrosiam, alij artemisiam uocant, planta est admodum odorata. Hæc cum uino pota non nisi recta ceruice spirantibus, quos orthopnoicis appellat, auxiliatur. Ea Græcis βότρυς, Latinis item Botrys dicitur: Italis, Botri: Germanis, Traben kraut, & Krotten kraut: Gallis, Pijmen.

## GERANIVM PRIMVM.



Geranium.

## GERANIVM ALTERVM.



Cap. CXIII.

GERANION folijs anemones, diuisuris longioribus: radice subrotunda, cum estur dulci. Quæ arachmæ pondere in uino pota uulvæ inflationes discutit. Geranium alterum caulibus minutis, & pilosis, sesquipedalibus: folijs malvæ. in summis alis sursum spectantia gruum capitula insunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina usus.

Geranij con-  
fatio.

D V O tantum Geranij genera à Dioscoride traduntur. Verum Latini, Plinio auctore, tertium genus addere uidentur, quod alterum quidem eorum à Græcorum descriptione differat. Id quod ipse Plinius aperte testatur libro XXVI. cap. XI. ubi de Geranijs differit ijs uerbis. Geranion aliqui myrrhin, alij myrthida appellant. Similis est cicutæ, folijs minutioribus, & caule breuiori, rotundo, saporis, & odoris iucundi. Nostri sic eam tradunt. Græci folijs candidioribus, paulo quam malvæ minoribus: caulibus tenuioribus, pilosis, ramosam ex intervallis, diuisuris longioribus, & in ijs folijs, inter quæ in cacuminibus capitula sunt gruum. Alterum genus folijs anemones, diuisuris longioribus: radice mali modo rotunda, dulci. hæc Plinius. Ex quibus facile colligi potest, tria esse Geranij genera, Romanis unum, Græcis uero duo. Quæ omnia hodie passim fere uisuntur in campestribus, secus uias, & iuxta scopos. Porro non desunt, qui putent eam herbam, quam scribit Plinius Geranium à Latinis uocari, à Dioscoridis myrthide non differre. Ipse tamen non dubitandum existimo, quin hæc illa sit herba, quam quidam Rostrum tum grui, tum ciconiæ appellant, quidam uero Acum muscatam, eo quod (ut Plinius inquit) odorem iucundum spiret. Namque assurgit hæc folijs cicutæ, minoribus tamen diuisuris: caule breui, ac rotundo: semine gruum capitulis conferto, à quibus Geranij nomen omnibus inditum est. Ceterum Geraniū, quod Dioscoridi secundo loco proditur, caulibus minutis, pilosis, sesquipedalibus, folijs malvæ, in summis alis gruum capitula gerens sursum spectantia cum suis rostris, nunquam dubitauerim eam esse herbam, quæ pes columbinus uulgò nominatur, quod nullis prorsus reclamantibus notis hæc illi respondet. Alterum uero, primo scilicet loco descriptum, & in Anania uallis agro, & ubique fere locorum passim



## GERANIUM TERTIVM.



provenit, folijs anemones modo laciniatis; floribus in purpura al-  
bicantibus, e quibus gruum capitula prodeunt: radice alba, fere  
rotunda, ac dulci. Quapropter Ruellium hallucinatum credi-  
derim, quod Acum muscatam dictam, quam ipse herbarijs etiam  
Acum pastoris appellari ait, primi generis Geranium Dioscoridi  
esse opinetur. Quandoquidem Acus muscata radice non nititur ro-  
tunda, ac dulci, nec folijs uisitur anemones æmulis: sed cam pla-  
ne representat, quam Plinij testimonio, Latini Geranium uocat.  
Præterea aduersus Hermolaum eos reprehendit Ruellius, qui pu-  
tant secundum Dioscoridis Geranium eam esse herban, quam qui-  
dam à rubro foliorum colore Rubertam appellant. Sed ipse mihi  
magis reprehendendus uidetur, quod crediderit Rubertam esse le-  
gitimam Myrrhim. De Ruberta autem, ut dicam quod sentio, eā  
quidem illius Geranij genus esse arbitror, quod Plinius ad Latinos  
retulit, cum ipsa tota illi sit similis, odorem iucundum reddat, flo-  
res proferat subpurpureos, & gruinis capitulis scateat, reliquo-  
rum Geraniorum more. Verum hanc non ita Myrrhidem referre  
comperio, ut Ruellius existimat. Siquidem Myrrhim folijs admo-  
dum rubentibus, & gruino capite nasci, nec Dioscorides, nec alij  
quod legerim, memoria prodiderunt. Myrrhis enim folijs est ci-  
cutæ: radice rotunda, molli, cibis non insuau. at his omnibus Ru-  
berta caret, ut libro quarto clarius patebit. Porro tamen Her-  
molaus ab errore, quantum reor, uindicari non potest, quod scripse-  
rit, Geranium id esse Latinis, quod Dioscoridi myrrhis, Plinij for-  
tasse lectione deceptus, qui loco supra citato Latinis uocatū Ge-  
ranium à quibusdam Myrrhim appellari scriptum reliquit: quan-  
quam legitime Myrrhidis historiam tradidit libro XXI. cap.  
xvi. Nec sanè mirum est, Plinium scripsisse Geranium aliquibus  
uocari Myrrhim, cum etiam e Græcis fuerint, qui Geranium, quod  
secundo generi adscribitur, Myrrhim appellauerint, ut uidere est in  
ijs Dioscoridis exemplaribus, in quibus cuiusq; capituli initio in-

Ruellij erra-  
tum.

Hermolai la-  
psus.

Brauaoli er-  
ror.

Momordica.

Nomina.

numera plantarum nomina leguntur. Fallitur quoque hac in historia Brauaolus, asserens nullo modo ijs esse adsti-  
pullandum, qui Pedem columbinum uocatum Geranium esse contendunt, quod Geranium folijs exeat maioribus ane-  
mones incisuris. Sed is, meo quidem iudicio, ignorasse uidetur, quod secundum Geranij genus, non autem primo  
generi à Dioscoride assignatum, est illud, quod Pes columbinus censetur. Vel fortasse dum hæc scriberet, alterum Ge-  
ranij genus non animaduertit in Dioscoride, quod tunc lectionis impatiens, totum illius caput non perlegerit. Aliam  
ab illi Geranij plantam uidimus in pluribus hortis, ac uiridarijs satam, folijs rotundis, secundi Geranij modo per ambi-  
tatem laciniatis, maluam magnitudine æquantibus, fructu gruinis capitulis simili. Hanc herbariorum nonnulli Momor-  
dica nuncupant, quemadmodum & Balsaminam alij eodem nomine uocant: eamq; cæteris præferunt in potionibus  
ad interna uulnera glutinanda. Hæc, mea quidem sententia, magis respondet alteri Dioscoridis Geranio, ut quæ folijs  
ad maluam propius accedat. Quare & hæc magis eandem esse cum illo putauerim. Veruntamen haud eam inficias,  
quod Pes columbinus dictus idem sit Geranium: sed cū quis rectius forte Geranium minus dixerit. Primi Geranij ra-  
dix (ut Plinius est auctor) rescipientibus se ab imbecillitate utilissima est. Bibitur contra phthisim drachma in uini cya-  
this tribus bis die; item contra inflationes, quæ et cruda idem præstat. Succus radices auribus medetur. Opisthoto-  
mici semen drachmis quatuor cum pipere, et myrrha potum. Secundū uero Geranium etsi nullius esse in medicina usus  
scriptis tradiderit Dioscorides; non desunt tamen hodie herbarij, qui in internis uulneribus glutinadis, et fistulis sanan-  
dis præsum in potionibus sumptum, mirificè commendent. Sed equidem uereor, ne & hi decipiantur, Serapionis inter-  
pretum secuti, qui Amomum Pedem columbinum appellauit, quippe quoniam propria sit Amomi facultas internis cor-  
porum uulneribus mederi. Geranij non reperio meminisse Galenum in simplicium medicamentorum libris. Eius qui-  
dem meminisse Paulus, sed ea tantum de Geranij posteritatis memoriæ mandauit, quæ ex ipso Dioscoride sumpsit.  
Quod Græci γεράνιον, Latini similiter Geranium uocant: Itali, Geranio: Germani, Storcken scnabel: Hispani,  
Pico de cingeha: Galli, Rostro de cicongie.

## Gnaphalium.


## Cap. CXV.

Gnaphalii folijs albis, mollibusq; aliqui pro tomento utuntur. Bibuntur efficaciter folia  
in uino austero ad dysenteriam.  
Gnaphalii historiam adeo paucis perstrinxit Dioscorides, ut nobis non modo difficile, sed etiam impossi-  
bile uideatur, ut quisquam conijcere, ac decernere possit, quænam planta sit, quæ uerum Gnaphalium representet:  
præsertim cum antiquorum hætenus repererim uenienem, qui Gnaphalii faciem longiori historia expresserit. Ete-  
nim Plinius eadem, quæ Dioscorides, breuitate usus, Gnaphalii notas reddidit lib. x. cap. x. Fuchsius tamen in  
suis clarissimis de stirpium historia commentarijs herbam quandam pro Gnaphalio ostendit, quam ideo fortasse Gna-  
phalium



## GOSSIPIVM.

Impia herba  
Plinij.




Xyli historia  
& vires.

## TYPHA.

Gnaphalij vi-  
res ex Gal.

Nomina.

Typha con-  
sideratio.



phalium existimauit, quod incana, tomentosaq; conspiciatur. Sed mihi plane eam Euchsus pro Gnaphalio depinxisse uidetur, quam Plinius lib. XXI. cap. XIX. Herbam impiam vocat, tradit: quae merito IMPIA Plinij dici posset, quod eius e nece- ribus nemo, quantum equidem legerim, praeter ipsum meminisset. quae is differens loco modo citato, ea ijs notis, et viribus descripsi- sit, atq; capitata. Inde alij ramuli assurgunt, sua capitella ger- tes. Ob id impiam appellauere, quoniam liberi super parente excel- lant. Alij potius ita appellatam, quod nullum animal eam attingat, existimauere. Hec inter duos lapides trita feruet, praeci- pua aduersus anginas succo lacte & uino admisto. Mirumq; tra- ditur, nunquam ab eo morbo tentari, qui gustauerint. Itaque & suis dari, quaeq; id medicamentum noluerint haurire, eo mor- bo interire. Sunt qui et in anum nidis inferi aliquid ex ea putent, atque ita non strangulari pullos audius deuorantes. haec tenus de Impia Plinius. Ceterum quoniam Gnaphalium ob eius tomen- tum, illud candidissimum uellus, quod uulgo nos appellamus Ba- bagia, & alij Corone, Latini uero XYLON, & Gossipium, mihi in mentem redegit, a ueteribus Graecis misquam, quod sciam, descriptum; ideo hic de eius historia, ac uiribus latius differens duxi, quam si cerin in lini mentione, ubi eius quoque memi- ni. De hoc itaq; Plinius lib. XIX. cap. I. sic loquitur. Superior inquit, pars Aegypti in Arabiam uergens gignit fruticem, quem aliqui Gossipion uocant, plures Xylon, & ideo lini inde sili- xylina. Paruulus est, similisq; barbata ruci desert fruticis: cuius ex interiore bombice lanugo netur. Nec ulla sunt ei in cura- dore, mollitieque praeferenda. Vestes inde sacerdotibus Aegypti gratissima: haec Plinius. Hac etate Xylon feritur etiam in Cy- pro, Creta, & Sicilia insulis, ubi copiosissimum prouenit: quoniam & in Apulia, alijsq; regionibus nascitur. Huius lanugo manu ex- calfacit, ac siccatur. quae si comburatur, mirum in modum ma- nentem e uulneribus sanguinem sistit. Seminis medulla tussi, & difficulter spirantibus auxiliatur: genitale semen procreat: proinde uenerem stimulat. Oleum ex ea exprimitur, quo tunc lentig- nes in facie, tum etiam ceterae cutis maculae optime deleuntur.

Sed ut iam Gnaphalio suas ex Galeno reddamus vires, eas ipse lib. VI. simplicium medicamentorum, his uerbis retulit. Gna- phalium ideo sic nominatum est, quod folijs eius mollicibus & yvapálov, hoc est, pro tomentis utantur. Sunt autem candida, & mediocriter adstringunt: ac proinde quidam id exhibent, ex austerorum uinorum quopiam, dysentericis. Herba Graecis yvapάλιον, Latinis etiam Gnaphalium appellatur.

## Typha. CXVI.

TYPHA folium edit cyperidi simile: caulem al- bum, laeuem, aquabilem: flore in cacumine ambien- tem, densum, qui in pappos soluitur, quod paniculum aliqui nominant. Huius herbae flos suillo adipe cloro exceptus, ambustis medetur. Gignitur in palustribus, & aquis stagnantibus:

TYPHA planta est in Italia uulgaris, notiorq; omnibus, quam ut eius effigies explicari debeat. Ea in paludibus, stagnis, & lacubus frequentissima prouenit, ita ut rari admodum sint stagnantes aquae, quae Typha non scateant. Claus, quam in le- uissimo caule gerit, a nostris Hetruseis Mazza sorda uulgo dicitur, quod eius lanugo, si in eures decidat, surditatem pluma- rum uice ad grabatos faciendos. Foliorum uero usus ad conue- stienda uitrea uasa, & ad muliebres cathedras texendas: quin & ad tegetes parandas. Typhae pappi, additis betonica folijs,



et gladioli, ac bippoglossi radicibus, omnibus in puluerem tenuissimum reductis, et assatis oxorum luteis exceptis, utuntur quidam feliciter ad enterocelas. Id autem medicamentum exhibent quot idie ieiunis drachma pondere triginta dierum spatio: eoq; non modo pueros, adolescentesq; sanari pollicentur; sed etiam iuvenes iam etate consistentes: si tamen interim praestanti ligatura, ac emplastris glutinantibus inna pubis pars probe muniatur. Typhae nomen nisse Galenum in simplicium medicamentorum censu, non inuenio. Eius tamen meminit Theophrastus libro primo cap. XIII. de plantarum historia, ubi inter enodes palustrum locorum plantas Typham quoque recensuit. Ei nomen Graecum est τύφη: Latini item Typha: Italicum, Mazza sorda: Germanicum, Moßkolben, et Narenkolben: Hispanicum, Bobordo, et Inco amacorocado: Gallicum, Maché, et Masse.

Nomina.

## Circea.

## Cap. CXVII.

CIRCEA, quam & dirceam aliqui uocant, foliis est hortensis solani, agnatis crebris: flore nigro, pusillo, copioso: semine milij, nascente in quibusdam ueluti corniculis: dodrantali radice, triplici ferme, aut quadruplici, candida, odorata, excafaciente. Nasctur in apricis, saxis, & uento perflatis. Radicis tuse pondo quatuor, in sextarijs tribus uini dulcis per diem, & noctem macerantur, potuque triuò uulvas expurgant. Semen in sorbitionibus datum lacte mammas nutricum explet.

HABD equidem ausim affirmare, an Circea hodie inueniri possit in Italia: quamvis ea antiquis fortasse notissima fuerit. Si quidem nulla haecenus se mihi obtulit planta, neq; alijs, quod sciam, quae Circeam representaret. Ceterum credidere nonnulli hanc sibi Circae nomen comparasse, quod Circe uenefica in suis ea uteretur ueneficijs, uel quod fortassis eius fuerit inuentrix, à Sole patre plantarum omnium genitore edocta. Quod etsi numnullis uerisimile putetur; cum tamen à nemine Circae uerbis pollere uiribus proditum sit, aliunde potius id nominis sibi uendicasse existimandum. Meminit Circae Plinius lib. XXVII. cap. VIII. ubi eam his notis, ac uiribus depinxit. Circea stricno hoc est, solano satiuo similis est: flore nigro, pusillo: paruo semine, ut milij, nascente in quibusdam corniculis: radice semipedali, triplici ferme, aut quadruplici, alba, odorata, gustus calidi. Nasctur in apricis saxis. Diluitur in uino, bibiturq; ad dolorem uulvae, et uulua. Macerari oportet in sextarijs tribus quadrantem radicis tuse per noctem, et diem. Trahit eadem potio secundas. Semine lac minuit in uino, aut malsa aqua pota. Hec Plinius, qui illa omnia ferè ab ipso Dioscoride mutuatus est. Etsi ab eo in hoc magno, ut puto, errore dissentiat, quod Circae semen in uino, aut malsa aqua potum lac minuere tradat, cum potius, teste Dioscoride, ipsum eliciat. Quae in re Plinius non modo Dioscoridi refragatur, sed ipsi quoq; Galeno, qui de Circae uiribus differens lib. VII. simpl. medic. sic inquit. Circae uires ex Gal.

Circae consideratio.

Plinii lasus

Circae uires ex Gal.

## FILIPENDULA.

Semen autem eius in sorbitione exhibitum, ad lactis generationem conducit. Quae Graece νιφάνη, Latine similiter Circea, et Italice Circea uocatur.

Nomina.

## Oenanthæ.

## Cap. CXVIII.

OENANTHE folia habet pastinacæ: florem candidum, caulē crassum, palmi altitudine: semen atriplicis: radicem magnā: in multa rotunda capitula extuberantem. nascitur in perris. Huius semen, caulis, & folia cum mulsu uino pota, secundas eijciunt. Radix è uino urinae stillicidio conuenit.

OENANTHEN, cuius hic Dioscorides meminit, Theophrastus libro VI. cap. VII. de plantarum historia, et Plinius lib. XXI. cap. XXIII. non equidem haecenus reperi, ac uidi in Italia, etsi in ea indaganda non parum laboris insumpserim. Fuchsius, et recentiorum herbariorum pleriq; Oenanthem eam esse herbam existimant, quae hodie passim FILIPENDULA uocatur. Quorum certe sententia, quamvis uirorum magne apud me auctoritatis, nunquam potui subscribere. quod Filipendula haec magna nusquam, quod inuenerim, radice nitatur, quae rotundis extuberet capitibus: quod semen non ferat atriplicis: quod denique non in petris, sed in pratis, et lato ubique solo proueniat. Quibus sanè rationibus non potui non adduci, ut apud Dioscoridem aliam omnino à Filipendula Oenanthem semper esse crediderim. Oenanthes uires, quas descripsit Galenus in simplicium censu, non licuit mihi reperire. Ceterum Filipendulam non uulgaribus pollere uiribus, testantur recentiores. Ea enim urine remoratur, eiusq; stillicidio auxiliatur: item renum tum calculis, tum doloribus. Eadē stomachi inflationes discutit. Medetur suspiriosis, et anhelantibus, omnibusq; in uniuersum morbis, quos causa frigida excitauerit. Prodest comitialibus insperso cibus radicum puluere. Planta, quae Graecis νιφάνη, Latine etiam Oenanthæ appellatur: Italis, Euanthæ.

Oenanthæ confid.

Filipendula uires.

Nomina.





CONYZA MAIOR.



CONYZA MINOR.



CONYZA MEDIA.



Conyza con-  
sideratio.

## Conyza.

## Cap. CXIX.

CONYZAE duo genera. quæ parua uocatur, odore præstantior est: maior uerò frutice altior & foliis latioribus, graui odore. Vtriusque folia oliuæ similia, hirsuta, pingua, in maiore caulis binum cubitorum altitudine attollitur, in minore pedem æquat. flos fragilis. lutei coloris, qui in pappum abit. radices superuacua. Suffitu, substratuque frutex totus serpentes fugat, culices abigit, & pulices necat. Folia conuenienter illinuntur serpentium plagis, & tuberculis, ac uulneribus. Flores, & folia cum uino ad menses, partusque eiiciens bibuntur: item contra urinæ stillicidia, arquatam morbum, & tormina: conitiales pota ex aceto adiuuant. Decoctum in desefsionibus medetur uulua malis. Impositus succus abortum facit. Herba ex oleo efficaciter horroribus oblinitur. Capitis dolores tenuis illita sanat. Est & tertium conyzae genus, caule crassiore, ac molliore: foliis mediæ inter maiorem, & minorem amplitudinis: minimè pinguis, multò tamen grauioris odoris, & iniucundioris, sed inefficacior. Prouenit locis humentibus.

CONYZAE omne genus non in Hetruria solum, sed alibi quoque passim ferè prouenit, nullis prorsus reclamantibus notis, quæ earum singulis à Dioscoride tribuuntur. Conyza maior uulgo Pulicaria dicitur, quia substrata (ut Dioscorides inquit) pulices necat. Qua fortasse ratione adductus Theodorus in Theophrasto Conyzae Pulicariam interpretatur. Meminit autè Conyzae Theophrastus lib. VI. cap. II. de platarum historia, ubi de eius generibus distulserit his uerbis. Conyza mascula, & foemina constat. Distant quæ admodum cætera, quæ sic discerni desiderant. Foemina enim tenuiori



maior uestitur folio, & compressior est, atq; in totum minor. Mas amplior, crassiori; caule, atque ramosior, & folium amplius, pinguiusq; habens: necnon & flore splendidior est. Ambo fructifera sunt, in totum serotina germinare, flore; constat: quippe cum circa arcturum, & post arcturum incipiunt. Mari grauior odor: sceminis acrior, ideoq; contra bestiarum morsus commodior est. hæc Theophrastus de duplici tantum Conyze genere. Cæterum tertia eius species, cuius à Dioscoride fit mentio, inter marem, & sceminā media est. Nascitur hæc in Ananæ uallis agro, & in Goritiensi comitatu copiosissima, humentibus præsertim locis, & secus uias, ubi ex agrorum marginibus aqueus humor stillicidio quodam in proximos defluit canales. Conyze uires posteritatis memoriæ prodidit Galenus libro vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Conyza & maior, & minor adsimilis sunt tum temperaturæ, tum facultatis: gustui amaræ, & acres apparent. Excalfaciuntq; admodum luculenter, siue quis folia lenigata cum teneris ramulis (est enim fruticosa planta) parti cuiuspiam illinat, siue ubi in oleo coxerit, eo utatur. Siquidem concussiones, siue rigores per circuitum redeunt, tale sanare oleum nidetur. Flores quoq; eorum adsimilis sunt facultatis. Itaque quidam, & ipsos cum folijs tritos in uino bibendos exhibent ad menses fortiter ducendos, ciendumq; scetum. Est & tertium Conyze genus, in locis humidioribus proueniens, utrisq; illis tum graucolentius, tum imbecillius. Sed primæ memoratæ tertij sunt ordinis in excalfaciendo, & exiccando. Κόνυζα sic Græcè, ut etiam Conyza Latine dicitur: Italicè, Coniza, & Pulicaria: Germanicè, Gecele uuntz, & Durrurtz: Hispanicè, Attadegua.

Conyze uires ex Gal.

Nomina.

## HEMEROCALLIS.

## HEMEROCALLIS ALTERA.



Hemerocalis.



Cap. CXX.

HEMEROCALLIS folium, & caulem habet lilii, herbacei coloris ut porrum: flores in caule per singulos exortus, terni aut quaterni erumpunt, lilii diuifura, quoties dehiscere cœperunt, colore perquam pallido: radix magna est, atque bubosa. Quæ pota, aut cum melle, & lana in pecto apposita, aquam educit, & sanguinem. Folia trita mammarum inflammationes à partu contractas, oculorumque collectiones mitigant. Radix, & folia igni ambustis utilissimè illinuntur.

HEMEROCALLIS uisquam non prouenit in Italia. quandoquidem circa messem in aruis inter segetes, in pratis, in montibus, & in uallibus aureo colore emicat. Vulgus Liliū syluestre nominat. Radice nititur bulbosa, hortensī lilio persimili, sed colore diuersa. Flores, cum suo tempore dehiscunt, colore perquam pallido (ut Dioscorides ait) conspiciuntur, adeo ut fulgentis auri modo rutilent. Hemerocallis genus & illud esse non diffiteor, quod ego inueni in montibus Iapidie. id namq; facie alterum æmulatur, sed radicem habet, quæ pluribus & paruis coagmentatur bulbis: quinetiam flores profert aliam sortitos diuifuram, ut eius effigies, quam hic adicimus, apertè demonstrat.

Hemerocalis consi.



Quorundam  
error.

## LILIVM CONVALLIVM.

Lilij conuallij  
mentio, &  
uires.



Hemerocallis  
uires ex  
Galeno.

Nomina.



strat. Hinc itaque eorum error, ut arbitror, euidentiſſimè deprehenditur, qui Lilium conuallium uulgò dictum Hemerocallum eſſe exiſtimant. Nauq; illud ſolijs conſtat ſerè plantaginibus, tenuioribus tamen, minusq; ſtriatis. cauliculis iunceis, tenuibus, ac mollibus: in quibus cacumen uerſus plures prodeunt flores albicantes balauſtij, et arbuti ſloris effigie, odore perquam iucundo. Radices demittit laxas, longas, fibris, capillamentisq; reſertas, nullis adiacentibus bulbis. Hemerocallis uerò, Dioſcoride teſte, ſolia, et caulem proſert lilio ſimilia, flores colore admodum pallido: radicem magnam, bulbosamq;. Quæ ſanè notæ, ſi diligenter conſerantur, maniſeſtiſſimè indicabunt, eos hallucinari, qui Lilium conuallium Hemerocallum eſſe contendunt. LILII conuallij magnus apud Germanos in medicamentis eſt uſus (abundat enim eo maxime Germania) ad uarios corporis morbos. Aiunt eo roborari cor, cerebrum, et omnes principes facultates. Idcirco reſolutis, comitialibus, conuulſis, uertiginosis, animi deliquio correptis, et cordis pulſatione concuſſis, ipſum exhibent. Quin et ictis, ſeu commorſis à uenenoſis animalibus præbent. Item agri parturientibus, oculorumq; inflammationibus maximo eſſe auxilio prædicant. Conſciunt autem ex floribus per æſtatem ſecatis, quo uinum uindemiarum tempore, ipſos calcatis uuis admiſcentes, quo poſtea utuntur ad prædicta. Sicut et qui recentes flores uetere uino macerent, et in uitreo uaſe diu inſolent, admiſtis lauendula uocatis, et roris marini floribus, additisq; odoramentis nonnullis: deinde ex ijs ſtillatitiam aquam in calentis aquæ balneo uitreis organis eliciunt, eamq; aureis, argenteisq; uafculis reponunt. Hanc aquam auream appellant: qua utitur ad omnes prædictos corporis affectus. Quinimò cam iamiam animam expirantis ori inferunt, rati ex eius aſſumptione homines morientes in uitâ retineri poſſe per pluſculum temporis ſpatium. Sed quàm uana iſti ſerantur opinione, niki quidem ſepenumero experimento deprehenſum eſt. Quod etſi ijs quoq; irritum comperitur; ea tamen eſt huiusce aquæ apud omnes auctoritas, ut plerique ab eius exhibitione abſtinere nequeant, etiam in morbis calidiſſimis. Ceterum non ſine errore Fuchſius, uir alioqui doctiſſimus, putat Lilium conuallium eſſe Ephemerum, de quo Dioſcorides agit libro ſequenti. Sed quàm is aperte decipiatur, nos ſuo loco dicemus.

Hemerocallis meminit Galenus lib. vi. ſimplicium medicamentorum, ſic inquit. Hemerocalles radicem habet lilij radici ſimilem, non figura tantum, ſed et uiribus, Prodeſt non ſecus atq; illi, igni ambuſtis: quippe quæ leuiter digerentem facultatem habeat, et cum hoc repulſoriū quiddam. Quæ Græcis ημεροκαλλίς, Latinis quoq; Hemerocallis, et Lilium ſylueſtre uocatur: Italis, Hemerocalle, et Giglio ſaluatico: Germanis, Heydnijeb lilien: Hiſpanis, Lirio amarillo: Gallis, Lis gaulne.

Leucoium, ſiue alba uiola.

Cap. CXXI.

LEVCOION uulgaris eſt notiſſimæ. ſed in floribus differentia quædam: nanque aut cœrulei, aut albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Luteum uerò præcipui in medicina uſus. Huius aridi flores ſeruſaſti in deſeſſionibus, ualent contra uuluz inflammationes, et menſtrua expellunt: ſanant oris ulcera, cum melle: cum cerato, rimas ſedis. Semen duum drachmarum pondere ex uino potum, aut cum melle inditum, menſes, ſecundas, et partus extrahit. Radices cum aceto illitæ, lienem reprimunt, et podagricos iuuant.

LEVCOION



**LEUCOION** etsi Latinis albam tantum uiolam ipso nomine significat; tamen à rei herbariæ auctoribus & pro cæteris niolarum generibus, luteo scilicet, purpureo, cæruleoq; colore distinctis, sæpe usurpari solet. Id hodie officinis, atq; etiam medicis ijs, qui Arabum factionem sequuntur, eorum uoce Cheiri nuncupatur. Leucium omne ferè genus in Italia in hortis, ac uiridarijs, in ædium fenestris, parietibusq; frequentissimum uisitur, ubi illud in signis ac ligneis uisus mulieres studiosè colunt, ac fouent. Namq; eius flores cum coloris uarietate, tum odoris suauitate tantum oculis, & uiribus ineunt gratiam, ut in coronamenta frequentissimè addantur. Porro non tenerè omne ferè genus Leucoij in Italia nasci modò diximus, quandoquidem cæruleum inibi, quod sciam, non prouenit. Quam obrem Marcello Dioscoridis interpreti subscribendum puto, qui Leucoion cæruleum hoc loco accreuisse suspicatur, uetustissimi Latini Dioscoridis Longobardis literis scripti testimonio nixus, in quo nullum planè de cæruleo Leucoij colore uerbum legebatur. Suspicionem hanc augent, itaq; esse comprobant Oribasius, & Serapio, quos item id uerbum hoc loco non habere comperio in simplicium censu, cum alioquin reliqua Dioscoridis referant. Ceterum ex Leucoion, siue ex albis uiolæ floribus, utpote qui cæteros odore præcellant, Persæ odoratum illud unguentum parant, quod Iasminum appellant, ut primo libro in ipsius Iasmini unguenti mentione ostendimus, ubi eorum sententiam refutauimus, qui è floribus Gelsimini uulgò uocati id fieri contendunt. Leucoij uires tradidit Galenus lib. vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Leucoij frutex uniuersus extergentem facultatem possidet, ac tenuium partium est: plus tamen flores, & inter hos qui sunt sicciore, magis etiam quam uirides, adeo ut & oculorum cicatrices crassas extenuent. Tum menses quoq; decoctum eorum mouet, & secundas, foetumq; emortuum elicit: & si bibatur, foetum uiuum perimens, & abigens est medicamentum: est enim id, ut si quod aliud, amarum. Quod si quis uirum eius uehementiam multa aqua admixta retundat, ac mitiget, aut certè id genus aliquo, habebit & ad phlegmonè bonum medicamentum. Sic decoctum eius si non merum fuerit, uteri phlegmonas identidem persusum sanat, potissimum quæ diutino tempore ad scirrbi modum induruerit. Sic cum cerato ulcera ægrè ad cicatricem peruenientia curant. Sunt uerò etiam, qui cum melle ad oris ulcera adhibeant. Semen eum eiusdem sit facultatis, aptissimum est durum drachmarum mensura potum: tum mensibus ciendis appositum cum melle, conuenire creditur, foetumq; uiuentem interficere, ac mortuum eicere. Radices similis quoque facultatis, nisi quatenus crassioris sunt essentia, & magis terrene, cum aceto lienes induratos sanant. Nonnulli uerò & phlegmonas in articulis induratas ijs curant. Id Græcis dicitur, quod Latinis Viola alba, (quanquam eo nomine Græci & luteam, & purpuream uiolam comprehendunt;) Mauritanis, Keiri, Cheiri, siue Alcheiri: Italis Viola bianca: Germanis, Gelb uiolein, & Vuys weil, Hispanis, Violetas amarillas, & Violetas blancas: Gallis, Violettes, & Giroflees.

Leucoii consideretio.

Dioscoridis locus suspectus.

Leucoii uires ex Gal.

Nomina.

## Cratægonum.

## Cap. CXXII.

**CRATÆGONVM**, siue, ut aliis placet, cratænon, foliis melampyro simile est, multis calamis ex una radice emicantibus, multorumque geniculorum: semine milii. Nascitur in opacis, & fructuosis parte plurima: summo opere acre. Traditum est à quibusdam, hoc si bibat ieiuno ore, ter die post menses purgatos, tribus obolis, in cyathis aquæ duobus mulier, ante conceptum quadraginta diebus; & uir modo consimili, totidem diebus ante coitum hauriat, uirilis sexus partum futurum.

**QUANVIS** putent nonnulli Cratægonum esse quandam Persicariæ uocatæ speciem; ego tamen eorum sententia non ausim subscribere, quod Persicaria nullis ferè notis Cratægonum æmulari mihi uideatur. Neq; uerò aliam herbam, quæ Cratægoni effigiem repræsentaret, hactenus reperi, aut repertam uidi in Italia; ubi tamen ipsum nasci non negauerim. Sed certè id inuentu difficile suspicor, quoniam eius descriptio, quemadmodum & sequentis, ab omnibus, qui extant, rei herbariæ auctoribus obscura satis, & confusa traditur. Κραταγόρον sic Græcè, ut Cratægonum item Latine uocatur: Cratægon, Italicè.

Cratægoni confid.

Nomina.

## Phyllon.

## Cap. CXXIII.

**PHYLLVM**, quod clæophyllon uocatur, in saxosis nascitur. duum generum est. Quod autem thelygonum appellant, prouenit musei modo, folio olæ, sed colore magis herbaceo: caule tenui, breui: radice exili. florem album profert: sed papaueris, maiusculum. Sed arrhenogonum cetera huic simile, solo fructu distat: habet enim racemosum quiddam deflorentibus oleis non dissimile. Arrhenogonon potius, masculi sexus facere partus, ut thelygonon foeminei, proditur. Horum Cratægonas auctor est. Sed huiusmodi historiatus mihi produxisse uisum est.

**LEGITIMVM** Phyllum nondum hac ætate, quod sciam, in Italia compertum est: quanquam uidetur Ruelius existimasse, Persicariam, quam maiorem cognominant, esse Phyllon. Quia in re is, meo quidem iudicio, aperte fallitur: siquidem Persicaria illa humentibus, ac uliginosis locis prouenit; Phyllum uerò in saxosis nascitur, ut Dioscorides testatur. Qui tamen, si eius uerba accuratè expenduntur, nullam huius herbe cognitionem habuisse deprehenditur, nisi eam, quam ex Cratægoni herbarij historia habere potuit, unde fortè ea omnia sumpsit. Quo fit, ut mirari non liceat, si nobis quoq; Phyllum cognitu sit difficile. De quo nihil à Galeno, & Paulo proditum inuenio: id quod haud dubiam fidè facere potest, non secus illis, ac nobis Phyllum fuisse incognitum. Ceterum non desunt qui uelint Phyllum à Ligonosti, hoc est, Mercuriali non differre, quod pluribus tum notis, tum facultatibus sibi inuicem respondent.

Phylli consideratio.

Opinio quorundam.



deant. Verum quod cum ijs non possim liberè consentire, hæc me maximè animo suspensum detinent, quoniam Mercurialis folia habet ocimi, helxinæ cognata, non autem oliuæ: florem herbaceum, non album. quod præterea Mercurialis nascatur passim in hortis, & uineis, non in saxosis tantum. quod de his deniq; seorsum diuersisq; capitibus scripserint Dioscorides, & Plinius, utpote de rebus inter se differentibus. Equidem hoc anno plantam inueni inter saxa in Saluatino monte non longè à Goritia, folio mercuriali crassiore, breuiore, aliquantum in ambitu serrato: semine iam deflorentis oliuæ simili. Quibus utique notis ea mihi uisa est satis Arrhenogono suffragari. Sed an uerum fuerit

Phylli mētio  
ex Theophr.

Arrhenogonum pro certo affirmare non ausim. Phylli meminit Theophrastus lib. IX. cap. XIX. de plantarum historia, ubi ita scriptum reliquit. Quædam ad procreandum marem, aut foeminam ualere traduntur. Quamobrem Phyllon tum arrhenogonon, hoc est, marificum, tum thelygonon, id est, foeminificum uocant. Ambo inter se similia sunt, & ocimi speciem referunt. Fructus thelygoni modo musci oleaginei, uerum pallidior: arrhenogoni uero sicut oliua, cum primum ex muscoso flore emergit: geminus modo testiculi hominis. hæc Theophrastus. Ex cuius nominum uerbis colligi potest, Dioscoridis codicem hoc in loco deprauatum esse. quandoquidem Theophrasto thelygonum non nascitur musci modo, neq; folium habet oleæ uiridius, ut in Dioscoride scriptum legitur: sed fructum quidem fert in modum musci oleæ, pallidiorem tamen. Quæ certè thelygoni notarum diuersitas facit, ut planè suspicer in Dioscoridis potius, quàm in Theophrasti uerbis mendum aliquod subesse. Atque adeò sit, ut quasi iam non dubitem asserere eam plantam, quam ego reperi (ut antè dixi) in Saluatino monte, uerum Arrhenogonum esse: non solum quod descriptioni pulchre respondeat; sed etiam quod in notis ferè non dissentiant auctores illi grauiissimi. Herba, quæ Græcis φύλλον, Latinis & Phyllum, & Folium appellatur: Italis, Phillo, & Folio.

Nomina.

### Testiculus.

### Cap. CXXIII.

TESTICVLVS, quem Græci cynosorchin uocant, foliis circa caulem, & ima eius parte in terrastratis, oleæ molli similibus, longioribus, angustioribus, læuibus: caule dodrantali: floribus purpureis: radice bulbosa, oblonga, oliuæ modo angusta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est: inferiore, quæ mollior, ac rugosior. Eduntur radices coctæ, ut bulbi. Ex quibus si maiorem edant uiri, mares generari dicuntur: si minorem foeminæ, alterum sexum. Addunt, in Thessalia mollem mulieres in lacte caprino bibere, ad stimulandos coitus: aridam uerò ad inhibendos. & alterum aliter potu resolui. Nascitur in petrosis, & sabuletis.

#### TESTICVLI SPECIES.

#### TESTICVLI SPECIES.





## TESTICVLVS.

## TESTICVLVS.



Testiculus alter.



Cap. CXXV.

**TESTICVLVS** alter alio nomine serapias, Andrea auctore uocatur: quoniam radix ad multa utilis sit. Folijs est porri, latioribus, oblongis, pinguibus, ex alarum sinu inflexis: caule palmeo: floribus penè purpureis: radice testiculis simili. Quæ illita tumores discutit, ulcera purgat, & serpente eadem non patitur: abolet fistulas, & illitu inflammationes lenit. Aridæ radices nomas inhihent: sanantque putredines, & oris ulcera cacoethe: aluum sistunt è uino potæ. De hac, eadem quæ de testiculo canis, produntur.

## Satyrium.

## Cap. CXXVI.

**SATYRIUM** aliqui trifolium uocant, quoniam tria fert folia, ad terram infracta, rumici, aut lilio similia, minora tamen, ac rubra: caulem cubitalem, nudum: florem lilij effigiem, candidum: radicem bulbosam, mâli magnitudine, fuluam; intus ut ouum candidam, gustanti dulcem, & ori non ingrati. Quam in uino nigro austero bibere conuenit, contra opisthotonum. Utendum ea dum concumbendi incessit cupiditas: siquidem ea prouiores ad uenerem fieri affirmant.

## Satyrium erythronium.

## Cap. CXXVII.

**EST ET** alterum Satyrium erythronium, siue erythraicon, id est rubrum, semine lini, maiore, duro, leui, splendente. quod fertur non secus atque scincus, libidinem excitare. Cortice radice gracili, rufo. intus autem album includitur, sapore dulci, non ingrato ori. In montosis, & apricis enascitur. Venerem, ut produnt, si omnino manu teneatur radix stimulat: eoque magis, si bibatur in uino.

**ERRANT**, mea quidè sententia, omnes ferè huius ætatis medici, ac seplasiarj: quippe quod Canis testiculis leuissimi Satyrij uice passim in medicamentis utantur. Nam hæ plantæ (si Dioscoridi credimus) notis, ac facie maximè inter se distant, quamuis uiribus, & facultate non longè sint dissimiles. Testiculorum enim radices, præter id quod animalium testes representant, oblongæ sunt, binæ, utrinque pendentes: superior tamen altera, quæ plenior est: inferior rior

Satyrij, & Testiculi consideratio.

Multorum error.



rrior altera, quæ mollior, & rugosior. Satyrii uero radix bulbosa, maliq; modo extuberans describitur, colore exterius fulua, interius ut ouum candida, gustanti dulcis, & ori non ingrata. Caterum uerum Satyrium, ut ingenue fatear, hactenus in Italia uidere mihi non licuit. Testiculorum porro in Ananienfibus montibus, alijsq; compluribus locis non modò duo inueniuntur genera; sed alia quoq; longè plura. quibus & illud addendum esse existimauerim, cuius radix humanæ manus similitudinem refert. Vulgus à prædicta radice figura id Palmam Christi appellat. Auicenna hæc radices Digitos citrinos nuncupat. et si eas Digitos citrinos esse perperam, nullaq; quod in

## PALMA CHRISTI.

Palmæ Christi  
sti genera.



Fuch. errata

Monachoru  
lapsus.

Canis testicu  
li uires ex Ga  
leno.

commentati sunt. quippe qui malè sibi persuaserint, tot esse Satyrii radices, quot Canis testiculos. Verum si Dioscoridem consulant, & hinc quàm aperte decipiantur, intelligent. Sed his facile errandi occasionem potuit dedisse Plinius, quem lib. xxi. cap. x. Orchin, id est, testiculum, cum Satyrio turpiter confudisse constat. Caterum quoniam legitimo Satyrio deficiamus, officinæ, ac medici eius uice Testiculi radices suppeditant, infelici tamen, nec parif successu. Nam etsi ad prolem gignendam testiculi radices prætulit Dioscorides, quod maior à uiro denotata uenerunt gignat, minor uero à femina sceminat: deturq; mollis sceminis bibenda in lacte caprino ad stimulantem uenerem, arida uero ad inhibendam; non tamen ob id unquam comperi queuimus, qui ex earum largiore esu referret, se magis ad uenerem fuisse excitatum quàm esset, priusquàm eas comedisset. Sed id fortè fortuna illis accidit, quod utrasque simul radices ederint medicorum imperitia. quo factum sit, ut altera alterius uim destruxerit, cuius uis insit, ut uenerem stimulet, alteri uero ut eandem inhibeat. Id quod fortasse ijs non eueniret, si legitimum haberemus Satyrium: uel si herba illa inueniri posset, quæ homines salacissimos reddit. Cuius Theophrastus meminit lib. xi. cap. xx. de plantarum historia, ubi ita scribit. Ad rem autem uenerem mirum in modum herba pollebat, quam Indus attulerat. Non enim solum edentibus, sed etiam tangentibus tantum genitalibus uim dixere uehementem adeo fieri, ut quoties uellent, coire ualerent. Et quidem qui usi fuerunt, duodecies egisse dixerunt. Indum autem ipsius qui uel magno, atque robusto corpore erat, septuagesies aliquando couisse fatentem licuit audire. uerum emissionem seminis guttatim fuisse, demuniq; in sanguinem deuenisse. Mulieribus uero uehementius etiam citari libidinem, cum eo medicamine usa fuerint, dicebatur. hactenus Theophrastus. Canini testiculi uires posteritatis memorie causa dedit Galenus lib. viii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Orchis, uincupatur & Cynos orchis maior herba. Radiei eius bulbosa, ac gemina uis inest humida, & calida, ac gustantibus dulcior apparet. Caterum maior radix multam uidetur habere humiditatem excrementitiam, & flatuosam: quapropter epota uenerem excitat. Altera uero, minor uidelicet, contra admodum elaborata est, ita ut eius temperamentum ad calidius, & siccius uergat. Unde hæc radix non modò non stimulat ad coitum; sed etiam planè contra cohibet, ac reprimat. Eduntur tamen horum morum. Orchis uero, quem & Serapiada nuncupant, sicciorum facultatem obtinet, quàm ut primi ordinis purgari mereatur: quocirca ad uenerem non similiter accommodus est. Oedemata illitus discutit, & ulcera sordida purgat.

libro suo legerim, ratione ducti negent Monachi illi, qui in huius suum commentarios ediderunt. Huius duo in Ananie uallis montibus habentur genera. Vnum maius, quod folia ferè lilij habet, leuia, patula, maculis quibusdam nigris respersa: caulem rotundum, leuem: florem spicatum, uarium, in purpurea albicans: tem, odore non ingrato: radices duas, quæ sanè testiculos caninos referrent, nisi ramis quibusdam quasi digitis, humanam manum exprimere uiderentur. Alterum minus, quod folijs constat croci: canle dodrantali, inuiceo, leuiq; in cuius cacumine quam emicat purpureus, amaranti æmulus, qui recens odorem quam suauissimum reddit. Huius exiccati puluis ex aqua ignitæ chalybem experta, epotus (ut perhibent ijs, qui ita esse experiri comprobant) dysentericis maxime prodest. Idem aquam præstare aiunt, quæ per uitrea organa ex ijs elicitur. Radices huius similes, sed quæ alteri magnitudine cedunt. Excalciant utraq; (ut auctor est Auicenna) siccantq; secundo recessu. Crassa corporis excrementa pellunt, faciemq; deterunt. Dantur manicis magno iuuamento: quin & in neruorum affectibus. Seminis puluis drachmæ pondere ex uino potus, comitialibus subuenit. Item radice decoctum uino diutius commistum, quod bibendum paratur tam in prandio, quàm in cœna. Radices, Nicoli Florentini testimonio, febrem quartanam fugant: is namque earum tantum usu Biliotum quendam curatum retulit. Fuchsius Palmam Christi non rectè, pace eius dixerim, inter Satyrii genera depinxit: siquidem ea potius, meo iudicio, inter Canis testiculos erat representanda. Quinetiam in eo mihi planè errasse uidetur, quod Satyrium triphyllon, perinde atq; canis testiculos, cum duabus radicibus pictura expresse contra Dioscoridis delineationem: qui unam tantum radicem Satyrio mali magnitudine reddidit. Nisi fortasse is potius fuerit pictoris lapsus. Hallucinantur præterea uia cum Mesue Patres illi reuerendi, qui eius antidotarium



gat, & herpes sanat. Siccatus multò etiam magis desiccatur, adeò ut & putrescentia, contumaciâq; ulcera sanat. Habet etiam quidpiam subadstringens, ac proinde uentrem ex uino potus sistit. Meminit item Satyrii Galenus eos Satyrii uires ex Galeno. dem libro. Satyrium, inquit, aut Triphyllum humidum, & calidum temperatura est: quàm obrem gustu quoq; appet dulce. Attamen recrementitiam, & flatuosam humiditatem possidet: quocirca ad uenerem incitat. Hæc uerò & herbe ipsius radix præstare potest. Porro, ut quidam scribunt, ex uino nigro austero potum sanat opisthotonon. Planta, quæ Græcis ὄπρις, & κυνὸς ὄπρις, Latinis Testiculus, & Testiculus canis nominatur: Arabibus, Chast alkeb, seu Chast alchela: Italis, Testiculo di cane: Germanis, Kuaben kraut: Hispanis, Coyon de perro: Gallis, Coullon de chien. Quæ uerò planta σατύριον Græcè, Satyrium quoq; Latine dicitur: Arabicè, Gasi Nomina. alchaleb, Chast altraleb, siue Tatarich: Italicè, Satirio, & Satirione: Germanicè, Stendeluurtz: Hispanicè, Satyrion, & Supinos de Raposa: Gallicè, Satirion.

## Horminum.

## Cap. CXXVIII.

HORMINVM satium herba est folijs marrubio similis: caule semicubitali, quadrangulo, circumquem eminentiæ siliquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semen recluditur. Siquidem in syluestri rotundum, fuscumque inuenitur: in altero nigrum, & oblongum, cuius est usus. Ad uenerem stimulam, cum uino bibi uolunt. Purgat cum melle argemas, albuginesque: illitum ex aqua tumores discutit: eo etiam extrahuntur aculei ex corpore. Idem effectus est illitæ herbæ. Syluestre magis uiribus pollet: quare unguentis, præsertim gleucino, permiscetur.

HORMINVM.



SCLAREA.



RUCELLIVS, & hunc, ut arbitror, secutus Fuchsius in suis quisq; de stirpium historia clarissimis commentarijs, certò credunt Horminum satium eam perquam odoratam herbam esse, quæ uulgò aliquibus Sclarea, quibusdam Matrisalua, & nonnullis Herba sancti Ioannis appellatur. Syluestre uerò horminum illam esse censent, quæ passim in pratis nascitur, quam officinæ Galliticum, & Centrum galli nominant. Sed certè horum, licet doctissima uirorum, sententiam ut minus probem, multa mihi occurrunt. Primum quòd contrà Hormini utriusq; descriptionem illæ plantæ còstent caule plerumq; bicubitali, folijs marrubio quàm longè maioribus, & calyculis, in quibus semen recluditur, sursum spectantibus. Deinde quòd in utrisq; illis plantis rotundum semen inueniatur, non autem in uno oblongum, in altero rotundum. Illud præterea addiderim, quòd Dioscorides nunquam, meo iudicio, Hormini odorem prætermisisset, si ei Sclarea dicta Horminum satium fuisset, ut illi existimant: ea enim adeò odorata est,

Hormini còsideratio.

Ruellij, & Fuchsij opin. reprobata.



Plinij lapsus.

Horminū fru-  
gis genus.

Nomina.

Hedysari cō-  
sideratio.

Plinij lapsus.

Hedysari ui-  
res ex Gal.

Nomina.

Onosmatis  
confid.


est, ut eius odor insignis sine uitio præteriri nō possit. Huc deniq; illud accedat, & eos plane, ut puto, reflexet, qui se-  
cus opinantur, quod nuper plantā, cuius hic effigiē damus, Pisis ad me misit Lucas Gbinus medicus clarissimus, & rei  
herbarie peritissimus; quæ adamussim Horminum satium representat, ut pictura affabrè demonstrat. Hormi-  
ni utriusque meminit Plinius libro XXII. cap. ultimo. ubi in eum errorem lapsus deprehenditur, in quem & in  
stachye eundem incidisse superius ostendimus. Nam ubi Horminum folijs marrubio similibus depinxisse opus erat,  
ei folia porri tradidit, nimirum Græcorum nominum uicinitate deceptus: πέρσιον enim marrubium significat,  
πέρσιον uero porrum, quod Plinius legisse uidetur. Est & Hormini genus à Theophrasto, Galeno, & Plinio  
inter fruges annumeratum: quod (ut Galenus auctor est libro I. de alimentorum facultatibus) inter erysimū, & eu-  
minum mediam uaturam obtinet. Ceterum Hormini, de quo hic  
nobis est sermo, meminisse Galenum in libris simplicium medica-  
mentorū, non reperiō. quanuis eius mentionem fecerit Paulus,  
qui tamen illa tantum refert, quæ à Dioscoride mutuatus est.

Græci eam plantam ἡδύσαρον uocant, ut etiam Horminum La-  
tini: Itali, Hormino.

## HEDYSARVM.



ONOSMA.



## Hedysarum. Cap. CXXIX.

HEDYSARON, quod unguentarij pelecium, id  
est, securidacam uocant, frutex est, folijs ciceris: semen  
rufum in siliquis fert, corniculorum modo aduncis; quod  
incipitem securim æmulatur, unde nomen accepit: ama-  
rum gustu. Stomacho utile in potu. Additur in acido-  
rum. Cum melle ante coitum subditum, concipiendi spem  
adimit. Nascitur in segetibus, & hordeis.

QUANQVAM Securidaca inter triticum, & hordeum  
quandoq; proueniat; frequentior tamen inter aphacā nasci cer-  
nitur. Id quod etiam testatur Theophrastus lib. & cap. VII.  
de plantarum historia, ubi Securidacam in aphacis gigni, cap.  
aphacen necari prodidit. Plinius similitudine uocabulorū dece-  
pit lib. XVIII. cap. XVII. Securidaca lentem complexu strans-  
gulari scirbit. in eo autē error deprehenditur, quod phacon pro  
aphace legeretur, & uerterit: nam Græcis lens φακός, uocatur,  
non ἀφάκην, quæ uiciā genus est. Sed re quoq; Plinio res agatur  
Theophrastus, qui loco citato aracum, non autem securidaca len-  
ti innasci, & inimicari tradidit. Hedysari meminit Galenus lib.  
VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Hedysarum, aut  
pelecium. Huius fruticis semen colore rufum est, utrinq; anceps,  
uti secures. Amarum, & subacerbum apparet. quamobrem po-  
tum gratum est stomacho, & uiscerum obstructions expurgat.  
Idem præstant totius fruticis ramuli. Plāta, quæ Græcis ὄσος  
σαρον, Latinis Hedysarum, & Securidaca nominatur: Italici si-  
militer Hedysaro, & Securidaca.

## Onosma. Cap. CXXX.

ONOSMA oblonga folia habet, ad similitudinem  
anchusæ, longitudine quatuor digitorum, & unius lati-  
tudine, mollia, in terra iacentia, sine caule, sine semine,  
sine flore: radice nititur oblonga, tenui, infirma, rubes-  
cente. gignitur in asperis. Folia in uino pota, paruis  
extrahunt. Prægnans, si eam supergrediatur, abore-  
tum facere dicitur.

PLANTA quedam ex collibus, quos uarijs herbis refert  
tos circa Goritiam natura collocauit, in asperis nata iam pridem  
ad me allata est, quæ folia habet minoris anchusæ: radices uero  
eius ita rubescunt, aut quasi rubiæ uideantur. Ex ijs notis, quæ  
quidem pulchrè Onosmati respondet, non potui non adduci, ut  
eam uerum Onosma putarem. Vnde etiam eius picturam addere  
dam



data diligenter curavi, ut de ea aliorum quoque sit iudicium. Sed certè, ut uerum fatear, mihi adhuc incom-  
pertum est, an hæc caulem, flores, & semen proferat: siquidem eam hætenus non nisi caule, & reliquis uiduam  
uidere mihi licuit. Onosmatis uires tradidit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit.  
Onosma, uel onosmas, uel phlonitis, uel ononis, ex acris, & amara constat substantia: proinde quoque creditur  
sæpius necare, & eiicere, folijs eius in uino potis. Vt Græcè ὄνοσμα, ita etiam Latine, pariter & Italice, On-  
nosma uocatur.

Onosmatis vi-  
res ex Gal.

Nomina.

## Nymphæa.

## Cap. CXXXI.

NYMPHÆA nascitur in paludibus, & stagnantibus aquis, folijs fabæ Aegyptiæ, minoribus, &  
longioribus, alijs in summa aqua, alijs demersis, pluribus ex radice eadem prodeuntibus: flore lilio  
simili, albo, & in medio crocos habente. cum defloruerit, ut rotundum malum, aut papaueris caput,  
exuberat: nigro semine, denso, & lato, lenti gustus. Caulis est læuis, niger, minimè crassus, Aegyptiæ  
fabæ cognatus: radix nigra, scabra, clauæ similis, quæ autumnò secatur. Sicca cum uino pota cœlia-  
cis, dysentericisque auxiliatur, & lienem absumit. Radix stomachi, ac uesicæ doloribus illinitur: ui-  
tiligines ex aqua emendat: imposita cum pice, alopecij medetur. eadem contra ueneris insomnia bi-  
bitur: siquidem ea prorsus adimit. pota assiduè aliquot diebus, genitale infirmat. Idem semen po-  
tum efficit. Nymphæa nomen sibi uendicasse uidetur, quoniam aquosa amet. Plurima inuenitur in  
Elide, in Anigro amne, & in Bœotia Aliarto.

## Nymphæa altera.

## Cap. CXXXII.

EST ET altera nymphæa, cuius flos blephara dicitur, folijs antedictæ: radice alba, scabra: flore  
luceo, nitente, rosæ simili. Huius semen, & radix contra fœminarum profluvia efficaciter ex uino ni-  
gro bibuntur. Nascitur in Thessalia, amne Peneo.



NYMPHÆA utraq; seplasijs Mauritano nomine Nenuphar appellatur. Nascitur ubiq; frequentissima in  
paludibus, lacubus, & aquis stagnantibus. Vnde non mirum, si ea sit vulgaris admodum planta, & omnibus notior,  
quam ut indicari deceat. Veruntamen Fuchsius medicus ætatis nostræ clarissimus in libro illo de compositione me-  
dicamentorum, quem nuper ductum edidit, putat alias esse Græcorum Nymphæas, alias Arabum, ut eius uerba, quæ  
hic subiiciam, aperte satis declarant. Nymphæa, inquit, seplasijs Nenupharis. Facultatis tamen florum eius Dio-  
scorides & Galenus non meminerunt. De illorum itaq; sententia semine potius & radice medicis utendum erit, quæ,  
ut ydem testantur, refrigerandi & exiccandi potestatem obtinēt. Arabes contra floribus esse utendum præcipiunt,  
nupharis producit. quandoquidem illi præter binas, quas Græci commemorant, duas alias recensent. Vt hinc con-  
stet, eam Nymphæam, cuius flores humectare Arabes memoriæ prodiderunt, hodie esse omnibus incognitam. Qua-  
propter toto cœlo errant nostri temporis medici, quod suis Nymphæis, quæ sunt Græcorum, humectandi etiam fa-  
cultatem assignant. Ita Arabum scripta sæpenumero errandi occasionem medicis præbent. Et mirum planè est, Sc-  
reptionem etiam inter Nymphæas numerare, quam calidam esse & tenuium partium scribit. Adeo nihil est in uniuersa  
hac in re subscribere uelim, ut potius cogar ipsum refellere, atq; Arabum doctrinam tueri: utpote qui Græcorum scri-  
pta bona fide referant, atq; ijs etiam addant si quid boni habent sua industria & experientia compertum. Id quod  
uel hic fiet perspicuum omnibus, qui æquo animo rem iudicabunt, Quod igitur Arabum nymphææ, etsi eas humecta-  
re tradant, ubi de earum floribus mentionem faciunt, eadem sint cum nymphæis Græcorum, qui uim illam intactam  
reliquerunt.

Nymphææ  
confid.Fuch. opinio  
reprobata.



reliquerunt, facile probari potest Serapionis, ac Auicennæ testimonio. Hi namque, ut omittam quod omnia ferè ex Dioscoride transcribunt, non solum utuntur floribus, ubi humectandum sit, sed etiam semine & radice; temperamentum adscribant, quando sic illis, ut etiam nobis, experimento compertum est, illarum flores humectare & refrigerare. Atque adeo hoc mihi non uidetur Græcorum sententiæ aduersari. quippe Græci scribunt nymphæas exiccandi & reuigilandi & refrigerandi uim habere, sed de semine & radice intelligunt. Arabes uero nymphæis humectandi & refrigerandi facultatem tribuunt, quau tamen flores sortitos esse uolunt, ut clarissime scribit Auicenna. Illud addam, quod uihil prorsus sit alienum à ratione, ut una eademque planta suum uariet temperamentum pro diuersa uniuscuiusque partis natura. Huius rei Galenus testis esse potest in mandragoræ mentione, ubi scriptum reliquit eam rationem refrigerare & exiccare, fructu uero refrigerare & humectare. Quare, in eo quidem iudicio, Arabes erunt in hoc laudandi potius, quam odiosæ (quod uidetur facere Euchsus) exprobrandi: ut qui non sine magna mortaliū utilitate Nymphææ flores in usum medicum asseruerint. quod à ueteribus Græcis, quantum nobis constat, prætermisum est. Porro uerisimile non est, quod Arabes ignorauerint, quæ in nymphæis fuerint seminis & radicis facultates. Nam si Auicenna existimasset earum semen & radicem eiusdem esse cum floribus temperamenti, illis utique non fuisset usus ad dysentericos, ad ueneris insomnia, ad muliebrem profluuium, & ad alios morbos, qui frigida siccaque requirunt medicamenta. Sed illud nobis obijcietur, ut contendat non eas esse Arabum, quæ Græcorum nymphæas, quod Serapio ex auctoritate Albasaris inter nymphæas recenset plantam, quæ tenuium partium est, & calidam naturam habet. Nos id nihil esse dicimus, neque hoc nobis ita ut Euchsio mirum uidetur. Vi autem non miremur Arabibus traditam esse nymphæam, cui uis insit calida, facit tertij semperuiui exemplum in Dioscoride. etenim is tertium sedi genus depinxit, ei que uim excofactoriam, acrem & exulcerantem reddidit: tamen si reliqua duo sedi genera eidem Dioscoridi refrigerent, atque iisdem Galenus tertiam refrigerandi sedem assignet. Cæterum in quibusdam Bohemiarum lacubus Nymphæa parua nascitur, folio quidem nymphææ, sed brasicæ marinae plantæ maiore: flore candido: capitibus exiguis, ut in cappari: semine intus papaueris magnitudine. Nymphææ facultates retulit Galenus hætenus, quod meminere, mihi non licuit alibi uidere, quam in Bohemia. Nymphææ facultates retulit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, his uerbis. Nymphæa tum radix, tum semen desiccandi uim habet contra morsum. Itaque uentris profluvia cohibet, semenque siue per insomnia, siue alio pacto immodice profluens retinet. Iuuat porro etiam dysentericos. Cæterum Nymphæa, quæ candidam radicem habet, potentior est facultatis, ut & muliebri profluo medeat. Verum & hæc, & ea quoque, quæ atram habet radicem, ex uino nigro austero bibitur. Porro nonnullam etiam abstergendi uim obtinet, ita ut & alphas sanent, & alopecias, sicut ad alia, cuius alba. Nymphæa Græcis, Nymphæa item Latinis appellatur: Mauritanis, Nilofar, Ninofar, seu Nilufar: Italis, Nimphea: Germanis, Gelb, Vucisz scebluomen, & Haruurtz: Hispanis, Escudetes del rio, & Higos del rio: Gallis, Blanc de eau, Launet de eau, & Lis de sang.


Vires ex Galieno.

Nomina.

## Androsaces.

## Cap. CXXXIII.

ANDROSACES herba est amara, † tenues spargens iuncos, sine folijs, folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur. Gignitur in Syria maritimis. Ea drachmis duabus in uino pota, copiosam hydropicis urinam ciet. Idem effectus est semini pota, & herbæ decocto: podagris utiliter illinitur.



ANDROSACES



**ANDROSACES** ex Syria, quod sciam, non defertur in Italiam. Verum, quia eam herbam inibi etiam nasei posse nihil prohibeat, quoddam plantæ genus nuper inuentum est in Hetruriae maritimis, cuius hic picturam ideo exhibere libuit, quod id à quibusdam Androsaces existimetur. Id ipsum ad me misit hoc anno Pisis Lucas Ghinus medicus clarissimus, & rei herbariæ peritissimus: à quo (si is illi opinioni subscriberet, & Androsaces in Italia nasceretur) non mihi ex eo diffentiendum esset, quod præter alias notas hæc planta (ut Oribasius ex Dioscoride transcribens habet) tota candida spectatur. Androsacis meminit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Androsaces humida, & acris herba est. Potest autem resiccata, exhibitaq; tum ipsa, tum fructus eius magnopere urinam mouere, & nimirum discutere, & desiccare. Hæc planta ut Græcis ἀνδρόσακες, ita Latinis Androsaces dicitur: Italis, Androsace.


Androsacis  
consider.

Androsacis  
uires ex Gal.  
Nomina.

† In vulgatis exemplaribus hoc loco scriptum reperitur λεπτή, hoc est tenuis: quam uocem, ut superuacaneam, omisit Ruellius. In Oribasio uero λεπνὴ est, alba legitur: & hæc ex aliquo fortè antiquo codice uertit Marcellus. Ceterum non desunt, qui ubi paulò post ἀφυλλος, hoc est, sine folijs legitur, ἐφυλλος, hoc est, cum folijs legendum putent.

## Asplenium.

## Cap. CXXXIII.



**ASPLENVM** aliqui scolopendrium vocant, alij splemion, alij hemionium: folijs est multis, scolopendræ animalis similibus, ab radice una prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxisque siliceis, & opacis: nec caulem, nec florem, nec semen habet. Folia polypodij modo diuiduntur, subter flauescencia hirsutaque, supernè uiridia.

Vim hanc habent folia in aceto seruefacta, ut per dies quadraginta pota lienem absument: quibus etiam contritis lienem ex uiuo illini oportet. Stranguriæ, & regio morbo prodest, singultum sedat, calculos in uesica comminuit. Conceptum adimere creditur, per sese, aut cum muli liene appensa. Tradunt noctu, silente luna, huius rei gratia effodiendam.

**ASPLENVM**, siue Scolopendrium tam à medicis, quam pharmacopolis, qui planè Mauritanorum scripta sequuntur, Cetrach barbara uoce uocatur. Nec diu est, quod nouere rei herbariæ periti Arabum Ceterach esse legitimum Scolopendrium. Quandoquidem antea uniuersa herbariorum schola Aspleni loco phyllitum, quam etiam uulgò Linguam ceruinam appellant, suis immiscebant medicamentis. Verum enimvero quanquam hoc adeò clarum est, ut nullus amplius dubitandi locus relinquatur; adhuc tamen inueniuntur è ueteribus nostris seplastiarijs, qui ut suam potius pertinaciam, quam ueritatem ipsam tueantur, nullo pacto sibi persuasum esse uolunt, phyllitum nõ esse legitimum Scolopendrium: eo tantum argumento pertinaciter innixi, quod sui maiores phyllitum Scolopendrium appellauerint, quodq; eam splemion in re prorsus aberrant, ut ex Asplenij notis facile ab omnibus intelligi potest: ex quibus apertissime cognoscitur, nil aliud esse Asplenium, quam ipsum Cetrach uocatum. Nec desunt præterea, qui obnixè contendunt, Cetrach non esse Asplenium, quod scripserit Dioscorides nasci Asplenium folijs polypodij, siue filiculæ, quibus tamen ipsius Ceterach folia non undequaq; respondere uidentur. Verum si ij, qui ita obijciunt, eam uidissent filiculam, quæ in montibus prouenit in itinere, quo Goritia per montes in Carniolam itur, folijs angustioribus, & admodum uirentibus, ijs in posterum, quantum equidem reor, omnis dubitandi occasio sublata esset. Siquidem filicula hæc folio exit Ceteracho perquam simili, quanquam paulò ampliore. Tantaq; est similitudo, ut mihi primum hanc herbam inspicienti ea sermè uisa sit uerum Asplenium: quæ tamen è fossa radice statim pro filiculæ agnoscitur. Præstantissimum asplenium in Creta nascitur, ubi repertum Vitruuius affirmat circa Potereum amnem, qui duas urbes Gnoson, & Cortynam interlabitur: parte quæ ad Cortynam spectat, pecoribus siue liene inuentis, quia herbam hanc roderent: altera uerò parte, quæ ad Gnoson est, lienem habentibus, quia ibi herba illa non appareat. Aspleni uires paucis perstrinxit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Asplenium tenuium quidem partium, non tamen calida herba est. Hac utiq; ratione & lapides fraugit, & lienes liquat. hæc Galenus. Ceterum sunt qui existimant Asplenium, & Scolopendrium Græcis non idem, sed diuersas omnino plantas representare, Galeni auctoritate freti. Quippe qui libro V. cap. XII. simplicium medicamentorum de his differens, quæ obstructo lieni conferunt, Scolopendrium ab Aspleno segregasse manifestè uideatur, cum inquit. Maiores lienis obstructions uehementiora desiderant medicamenta, nempe capparis corticem, tamaricis radices, scolopendrium,

Aspleni con-  
sideratio.

Quorundam  
error.

Aspleni uires  
ex Galeno.



Gleni locus  
suspectus.

Nomina.


scillam, & eam, quæ id ipsum nomine representat asplenos appellata. Hæc certè verba differentiam fieri aperte declarant. Sed, meo quidem iudicio, credendum esse suspicor, quòd hoc in loco præter Galeni sententiam accreuerit Scolopendrium, deprauataq; in eo sit scriptura uel librariorum incuria, uel nimia alicuius scioli diligentia: quòd in sequentibus libris, in quibus de simplicium omnium, quorum cognitionem habuit, facultatibus sigillatim differt Galenus, nusquam, quod inuenerim, Scolopendrij meminerit, sed tantum Aspleni, cuius etiam uires (ut supra retulimus) sanè quàm paucis perstrinxit. Aut rectius fortè crediderim, quòd eo in loco per Scolopendrium, uel per Asplenum hemionitum intellexerit Galenus, de qua in sequenti conmentatione dicemus. quandoquidem hemionitis (ut ipsa se Galenus scribit lib. IX. cap. II. de comp. medic. secundum locos, ubi ea pharnaca ab Audromacho conscripta recenset, quæ epota splenicis sine lienosis opem ferunt) ab aliquibus ex antiquis Asplenum, ab alijs Scolopendrium appellata est. Quare non esset mirum, si loco prædicto Galenus acceperit asplenum pro hemionitide. præsertim quòd hæc herba quoque eam uim sortita est, qualienem absumere potest. Illa planta, quæ Græcis ἄσπληνον, Latinis quoque Asplenum, & Scolopendrium appellatur: Mauritanis, Scolofendriion, seu Sculufendrium: officinis, Cetrach: Italis, Aspleno, Scolopendria, & Herba indorata: Hispanis, Doradilha: Gallis, Ceterach.

## Hemionitis.

## Cap. CXXXV.

HEMIONITIS, quam aliqui splenion uocant, folium emittit dracunculi, lunatum: radicibus coherent multis, tenuibus: nunquam flores, neque semen, neque caulem gignit: in petrosis nascitur, austero sapore. Ea ex aceto pota lienem absumit.

Hemionitidis  
confider.




FALLUNTUR procul dubio (ut in Phyllitidis conmentatione superius diximus) Leoniceus, Ruellius, & Manardus: quippe qui sibi certò persuaserint, Hemionitida eam esse plantam, quam seplastriorum uulgius Linguam ceruinā, perperamq; Scolopendrian nominat. Sed quoniam in prædicto loco errare ros aliqui doctissimos, & Euchsium pariter eos secutum euentissimis, ut puto, argumentis ostendimus: idcirco superius caneam esse duximus hic eadem repetere, præsertim quòd neminem futurum sperem, qui eò se conferre grauetur, si cupiat nostras contra uiros tam celebres rationes audire. Porro non modo iam nobis compertum est ueram Hemionitida, quæ à Dioscoridis historia nihil prorsus disidet, Romæ nasci in quibusdam rudibus, ædificiorumq; ruinis prope magnum Amphitheatrum, unde quidam rei herbariæ studiose eam in suos transtulerunt hortos; sed nos quoque hoc anno eam accepinus ab Aloyisio Plantario Romano rei herbariæ peritissimo, qui Hemionitidis plantam, cuius picturā damus, ad nos Patauio misit. Equidem credidimus iam dudum unā cum Hermolao, & Ruellio teucricum, & hemionitida unam tantum Plinio Plantam esse, deprauatis eius exemplaribus decepti, quæ lib. XXV. cap. V. ita scriptum habebant.

Inuenit & Teucer eadem ætate taucricon, quam quidam hemionion uocant. Veruntamen cum postea tractu temporis Plinij codex mendis quàm plurimis expurgatus ad manus esset, non hemionion legendum fuisse comperi, sed hermion. Quo factum est, ut omnino fuerim coactus in hoc mutare sententiam, contraq; asserere teucricum à Plinio descriptum à Dioscoridis teucricio nullis notis differre. Caterum inter hemionium, & asplenum Plinio nulla intercedit differentia, quòd scripserit libro XXVII. cap. V. Asplenum sunt, qui hemionion uocant. Sed equidem uereor, ne & ipse in errore uersetur. quandoquidem Dioscorides non modò utriusque historiam diuersis capitibus descripsit, sed etiam asplenum nusquam, quod sciam, hemionitida appellari ait: tametsi contra Hemionitida non asplenum, sed splenion à quibusdam uocari tradiderit. Sed posteaquàm Hemionitidis lunata folia mihi ad memoriam reuocauerunt herbam illam, quæ à chymistis LUNARIA minor, & ab alijs ob semen racemosum Lunaria botrytis cognominatur, cum & ipsa miris in medicamentis polleat uiribus, non prætereundum duxi, quin hic de ea aliquid differere. Hæc itaque breuis est planta, dodrantali ferè altitudine. Caule constat simplici, rotundo, lento, ac gracili: è cuius medio in latus exit ramusculus, costæ effigie: cui folia sunt utrinque septem annexa, lunata, crassa, firmaq; bracteis marine modo. Flores profert in summitate caulis; oxalidis minoris instar: semine rufò, rotundo, minutòq; in racemum modum racematim coherente. Vis totius plantæ mirè efficax uulneribus glutinandis, itemq; intrinsecis, atque extrinsecis corporis fracturis sanandis: quare miris celebratur laudibus ad puerorum enterocelas. Datur utiliter, commotòq; dysentericis, planta tota in puluerem contrita. Albas uteri fluxiones suppressit, quemadmodum & rubentes. Ferunt equos, qui in montibus herbas depascuntur, ubi hæc copiosa prouenit, auulsis ab ea clauis, suos ferreos calceatus amittere, & ob id uulgò à nonnullis serra cauallò appellari. Sed perperam, meo quidem iudicio, quòd alia sit planta, quæ uel ab ipso effectu legitime sic fuerit appellata, uel quòd semen proferat ferreis equorum calceis simile. Magnificiunt

Lunariæ minoris  
descriptio, & uires.



## LUNARIA MINOR.



Magnificiunt hanc quidam, præsertim chymici, eamq; pluris ferme æstinant, quàm aurum. Sed quàm isti in suis uanis opinionibus deludantur, ipsi magno sæpe suo danno experiuntur. Est et alia herba, quam aliqui similiter Lunariam minorem nominat, quæ in scrobium ripis, et aggeribus uligine madentibus, secus uias plerumq; nascitur. Serpit hæc humi iuncea cauliculis, cubito longioribus, clematidi illi similibus, quæ Vinca peruiuca uulgo uocatur, in quibus à radice ad summum ex utroque latere breuibus interstitijs folia exeunt crassiuscula, rotunda, paruorum nummularum speciem referentia: unde à nonnullis Nummularia dicta est. Sunt qui existiment, hanc esse Elatinem. Verùm quia Nummularia dictæ folia pilosa non sunt, sed leuia: quia præterea non nascitur in segetibus et cultis, sed in scrobium aggeribus et uliginosis locis; ideo ijs non possum adstipulari. Hæc quoq; glutinandi, et cohibendi facultate prædita est. Sed iam, ut nostri moris est, Hemionitidis suæ reddantur uires ex Galeno, qui eas retulit libro VI. simplicium medicamentorum, his paucis uerbis. Hemionitis simul et adstrictionem, et amaritudinem possidet: quamobrem cum aceto pota lienosis auxilio est. Ea ut Græcis ημωνιτις, ita etiã Hemionitis Latinis, et Hemionite Italis uocatur.

Lunaria minor alia.

Hemionitidis uires ex Gal.

Nomina.

## Anthyllis. Cap. CXXXVI.

ANTHYLLIS duplex est. quædam enim lenti simillima, folijs mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine: radice parua, tenui. Nascitur in falsis terris, et à sole illustratis, non insulso gustu. Altera est folijs, ramulisque aiugæ similis, hirsutioribus tamen, breuioribus, et asperioribus: flore purpureo, odoris admodum grauis: radice cichorij. Pota drachmis quatuor, uirine difficultati, renibusque plurimum prodest. Tritæ, uuluitudinem refert, præter alia pota cum aceto mulso, comitiales sanat.

PRIMAM, aut alteram Anthyllida, quæ Dioscoridis historiæ respondeat, non equidem hætenus in Italia reperiri, aut repertam uidi: quanquam non negauerim, quin ea inibi proveniat. Ruellius hanc posteritati Salsolan uocatum fuisse tradit quod ex ea salem fieri memoriæ proditum sit. Fuchsius uerò in libro illo de componendis medicamentis, quem locupletatum nuper excudit, putat eam herbam, quæ Kali Mauritanis dicitur, de qua nos differuimus libro superiore in Atriplicis commentatione, Anthyllidem esse. nam ubi Aluminium genera expendit in fine ferme sic inquit. Alumen, quod Catine appellant, ex herba combusta conficitur, Cali Mauritanis dicta, Græcis Anthyllida et Tragum. Sed, meo quidem iudicio, in hoc aperte hallucinatur Fuchsius una cum Amato Lusitano, à quo illum hanc uanam opinionem accepisse facile suspicor. In primis nanque non uideo ego, quomodo fieri possit, ut Cali Mauritanorum duas possit legitime Græcorum plantas representare, Anthyllida et Tragum. quæ quidem genere, formam, notis ac uiribus inter se maxime differunt, ut in ea Apologia, quam in illum Lusitanum scripsimus, latius ostendimus. Deinde nobis planè subit mirari Fuchsum, uirum alioqui doctissimum et in re medica adeò clarum, ut primas ferat in Germania, quod Lusitani illius ineptias tam religiosè sit secutus, ut hinc contentus protulisse Anthyllidem esse herbam Cali, neglexerit præterea Anthyllidis genera, quæ Dioscoridi duo sunt, expendere: atque genus explicare, quod Cali esse putabat. At re uera Cali (quantum ego sentio) nec primam, nec alteram Anthyllidem exprimit, necque etiam Tragum. Etenim hoc sine folijs nascitur, sed eorum uicem explent aculei, adeò ut tota planta spinis horrida spectetur. Illa uerò Anthyllis, quam primo generi adscribit Dioscorides, lenti simillima est. Porro alterum eius genus (teste Dioscoride) folijs ramulisq; aiugam æmulatur, hirsutioribus tamen, breuioribus et asperioribus: flore purpureo, odoris admodum grauis. Quæ nimirum notæ in herba Cali, gustanti salsa, prorsus desiderantur, Vtrinsecus Anthyllidis meminit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Anthyllis duplex est, sed utraque modicè desiccata, ut et ulcera glutinet. Ceterum altera, ea scilicet quæ chamæpityi adsimilis est, quadantenus subtiliorum est partium, quàm altera, adeò ut et comitalibus competat. Quin et ipsa magis quàm altera exterge-re potest. Quæ herba Græcè ἀνθύλλις, Anthyllis item Latinè, et Anthyllide Italicè nominatur.

Anthyllidis consideratio.

Fuchsi opin. damnata.

Vires ex Gal

Nomina.



## Anthemis.

## CXXXVII.

Anthemidis.  
consideratio.Anthemidis  
vires ex Gal.

Nomina.

ANTHEMIDIS genera tria, tantum flore distantia: rami dodrantes, fruticosi, alis multis concavi: tenuibus foliolis, parvis, numerosis: rotundis capitulis: floribus in medio aureis, forinsecus orbiculato ambitu candidis, melinis, aut purpureis, magnitudine foliorum rutæ. Nascitur in asperis, & iuxta semitas. colligitur uere. Vim habent radices, flores, & herba excalfaciendi, extenuandique. Potu, & infusione, pellunt menstrua, partus, urinam, calculosque: aduersus inflationes, & ilei tormenta bibuntur: bilem suffusam expurgant, iecinerum uitia sanant. Decocto calculum vesicæ fouentur. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est. Hanc propriè herantheumon uocant. Ea cui leucantheumon nomen est, item quæ chrysanthemon dicitur, uehementius urinam ciunt. Achilopijs illitæ medentur: commanducata ulcerum eruptiones in ore sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo vtuntur, terunturque in farinam, ad abigendos febrium circuitus. Flores, & folia recondi debent, & priuatim tussa, in pastillos digeri: radix quoque siccari, dumque ingruit necessitas, binæ partes herbæ, dari, modò floris aut radicis pars una, modò contrà floris partes duæ, & herbæ una, permutatim duplicato pondere, alternis diebus: bibere autem oportet in uino mulso diluto.

ANTHEMIS, quæ & Chamæmelon ab odore mali Græcis dicta est, officinis, & uulgo corrupta uoce Camomilla uocatur. Verum quauis tres Anthemidis species florum colore tantum differentes, memoriæ prodiderit Dioscorides, eamque cæteris ad calculos præstare tradiderit, cui flores in medio aurei, per ambitum uerò purpurei bubonij modo insunt; pharmacopola tamen in Italia illam duntaxat sibi comparant, quæ floribus constat intus aureis, foris foliis albicantibus circumseptis: quod hæc cæteris frequentior, copiosiorque inter segetes in campis proueniat, oleatque suauiter. Quandoquidem cætera eius genera, à paucis sanè cognita, in raris Italiæ locis reperiuntur. Vidimus tamen nos utrasque pluries in Italia. Anthemidis meminit Galenus lib.

III. simplicium medicamentorum, sic scribens. Chamæmelum tenuitate quidem rosæ persimile est, calore uerò ad olei facultates magis accedens, animali tum familiares, tum temperatas. Quapropter lassitudinibus, ut si quid aliud confert, doloresque sedat, mitigatque. Præterea tensa remittit, & laxat, quæque mediocriter dura sunt emoluit, quæque constipata rarefacit. Ad hæc febres, quæ citra uisceris alicuius inflammationes infestant, discutit, ac dissoluit, ac præsertim quæ ex humoribus biliosis, aut cutis densitate proueniunt. Quæ de re & ab Aegyptiorum sapientibus solis consecratum est, febriumque omnium remedium putatur. Verum hæc quidem in re à ueritate aberrant: solas enim, quas dixi febres sanare potest, easque quæ iam concoctæ sunt. Iuuat tamen pulchrè reliquas etiam omnes, quæ melancholicæ sunt, aut pituitosæ, aut ex uiscerum inflammatione prognatæ. Nam & harum remedium chamæmelum uel streptuissimum est, ubi iam concoctis adhibetur: quapropter & hypochondriis, ut si quid aliud, gratum existit. Meminit etiamnum libro VI. eorundem simplicium medicamentorum, sic inquit. Dictum quidem in tertio libro de hac herba copiosius est, diciturque nunc summam, quod calefacit, & desiccant in primo ordine. Est & tenuium partium, ac proinde digerendi, rarefaciendi, & laxandi facultatem obtinet. Planta, quæ Græcis ἀνθεμίδις, & χαμαίμελον, Latinis pariter Anthemis, & Chamæmelum appellatur: Arabibus, Debonigi, seu Babunegi: Italis, Camamilla: Germanis, Camillen: Hispanis, Mauzanilla: Gallis, Camemina, & Camomille,

## Parthenium.

## Cap. CXXXVIII.

PARTHENIUM, aliqui amaracon uocant, folijs est coriandri, tenuibus: flore per ambitum albo, intus melino, odore subuiroso, sapore amaro. Siccatur, cum aceto mulso, aut sale pocum, non secus atque epithimum, & bilem, & pituitam detrahit: suspiriosis prodest, & melancholicis. Herba sine flore à calculosis, & anhelatoribus magna utilitate bibitur. Valet decoctum ad insidendum in duritia vuluarum, & inflammationibus. Illinitur sacro igni, & collectionibus cum flore.



## PARTHENIVM.



## TANACETVM.



SERITVR Parthenium in Italia in hortis ferè omnibus, neque modò in ijs satum; sed in alijs quoq; locis sponte provenit. Folio est coriandri, amaro sapore, odore graui: floribus per ambitum albis, intus melinis. Hetrusci Matricariam, & ab amaro sapore, Amarellam uocant. Caterùm hallucinantur, mea quidem sententia, in Parthenij historia Brasauolus, et Fuchsius, uiri alioqui doctissimi: quin & Monachi illi reuerendi, qui in Mesuem commentarios ediderunt, quòd concordēs sibi persuasērint (ut superius in Artemisīe commentario, eorum errorem explodendo, diximus) Matricariam, siue Amarellam uulgò uocatam esse illud Artemisīe genus, quod secundo loco à Dioscoride repræsentatur: utpote qui non rectè expenderit hanc esse legitimum Parthenium. Porro contendunt Brasauolus, & Fuchsius eam omnino plantam uerum referre Parthenium, quam herbariorum uulgus Cotulam foetidam appellat. Sed quàm isti clarissimi medici magno in errore uersentur, iudicent ij, qui probè sciunt Cotulam foetidam folio esse foeniculi, aut anthemidis potius, quam coriandri: neque sapore usque adeò amaro, ut in Parthenio requiritur. Sunt præterea antiquorum nonnulli, qui Helxinem quoq; Parthenium uocauere, illam scilicet, quæ in parietibus nascitur detegendis uitreis uasis aptissima, ut Galenus ipse testatur lib. VI. simplicium medicamentorum, & Plinius libro XXI. cap. XVII. naturalis historię. Nec desunt, etiam, qui uelint mas Partheniū appellare Athanasiam, quam & TANACETVM uocant seplasiarij, cuius etiam superius de Artemisīa differentes mentionem fecimus, & hic modò effigiem damus. Quorum equidem sententiam magis probandam censerem, quàm eorum, qui tertium Artemisīe genus Tanacetum esse contendunt. Utuntur Tanaceto recentiores ad uentriculi, & alui flatus discutiendos, item ad lunaticos ex uentræ pellendos. Utuntur et ad frangendos renum calculos, & ad ciendam urinam. Sed id uiris magis, quàm mulieribus commendat: contra uerò Matricariam dictam foeminis tantum exhibendam præcipiunt. Parthenij in simplicium medicamentorum censu Galenum meminisse non reperio. Eius nomen Græcum est παρθένιον, Latini similiter Parthenium: Arabicum, Achuen, Vchuen, Achuan, siue Alachuan: Italicum, Parthenio, Matricaria, & Amarella: Germanicum, Muotter kraut, & Mettran: Gallicum, Matricaire.

Tanacetum  
& eius  
medicinz.

Nomina.

## Bupthalmum. Cap. CXXXIX.

BUPHTHALMON, quidam cachlam uocant, caules emittit tenues, mollesque: folia foeniculi: luteum florem, anthemide maiorem, oculi similitudine, unde nomen traxit. Circa oppida nascitur, & incampestribus. Flores cum cerato triti, tumores, duritiasq; discutiunt. Aiunt epotam post exitum à balneis, regio morbo correptis. colorem tractu temporis reddere.

NON parum profectò inter se uariant de Bupthalamo recentiorum sententiæ, ut herbam, quæ ipsum legitime representet, decernant, & ostendant. Nam aliqui putant, herbam quandam cubito altiore, in pratis, & agrorum marginibus nascentem, quæ (ut equidem opinor) Bellis maior est, folio nonnihil in ambitu serrato, flore intus melino, extrà uerò candidissimis foliolis undiq; circumdato, anthemide maiore, esse legitimum Bupthalmum. Alii uerò, quibus ad stipulatur Fuchsius, aliam ab hac herbam uerum Bupthalmum esse contendunt, uulgaris anthemidis cognatam, quam officinæ Cotulam non foetidam uocant. Sed cur horum sententias comprobem, sanè non habeo. quippe quanuis Cotula non foetida dicta foliorum faciem quadantenus Bupthalmum

Bupthalmi  
consider.



## EUPHTHALMUM.

Buphtalmi  
uires ex Gal.Bellidis histo-  
ria, & uires.

NOMINA.

phthalmum referat; flores tamen in medio melini, & in ambitu  
anthenidis modo candidi, Dioscoridis picturæ non utiq; respo-  
dent. Quemadmodum & hinc perspicuum est alteram plantam,  
cuius primo loco meminimus, non esse Buphtalmum. Siquidem  
cum diligentissime scripserit Dioscorides vulgaris anthenidis,  
tum etiam parthenij flores intus aureo micare colore, per amb-  
tum uerò candido, dubitandum quidem non est, quin & ead-  
fuerit usus diligentia in describendo Buphtalmi flore, quem ta-  
men luteum in uniuersum facit, non autem in ambitu candidum,  
qualis in vulgari parthenio conficitur. Cum itaq; Buphtalmi  
quidem iudicio, qui pro Buphtalmo prædictas, aut similes plan-  
tas accipiunt. Ceterum legitimum, ni fallor, Buphtalmum ad  
me attulit hoc anno Patavio Ioannes Odoricus Mel. briorius Tri-  
dentinus, iuuenis spectatæ in philosophia, ac medicina eruditio-  
nis, mihiq; perinde ac filius charissimus, quod in nullis præfatus no-  
tis à Dioscoridis descriptione disidet, ut eius effigies, quam hic  
damus, abunde demonstrat. Buphtalmi uires retulit Galenus  
lib. vi. simplicium medic. ijs uerbis. Buphtalmum, inquit, sic ap-  
pellatum est à floribus, qui figura quidem boum oculis uideantur  
ad similes, colore autem anthenidis floribus simillimi sunt, sed mul-  
tò illis tum maiores, tum acriores. Proinde & uabementis dis-  
cutiunt, adeo ut duritias sanent cerato misti. hæc Galenus. Vbi  
ne quid nobis obstet, animaduertendum est, quod Galenus, qui Bu-  
phthalmi flores anthenidis floribus simillimos reddidit, de ea tamen  
anthenide intelligit, quæ luteos flores profert. Sed quoniam de  
Buphtalmi flore disseret mihi **BELLIS** sic à Plinio uocata oc-  
currit, cuius etiam initio commentarij memini, non alienum esse  
dux, hoc in loco eius historiam, & uires recensere. Bellis igitur  
in Italia trium est generum. Primum in hortis feritur: cetera in  
pratibus, & campestribus nascuntur. Hortense herbula est folijs  
longiusculis, in cacumine subrotundis, solo procumbentibus, et in  
rotæ modum radiantibus, crassiusculis, per ambitum minutim fer-  
ratis: è quorū medio cauliculi prodeunt uillosi, flexibilesq; in  
quorum cacuminibus anno ferè toto flores emicant, centro tenui  
aurei, per ambitum uerò foliis duplicibus in purpuram rubenti-  
bus circumdati, coronis texendis aptissimi. Alterum in pratibus ple-  
runq; nascens, folijs, & cauliculis constat hortensi similibus, quo-  
iusculis tamen: sed flore intus melino, circum uerò candido, anthe-  
midis modo. Hoc, quod primo statim uere floreat, Hetrusci appel-  
lant uulgo Primo flore, & Fiore di primavera. Tertium ceteris  
maius assurgit, flore prædicto non dissimilis, sed maiore: folijs et-  
iam maioribus, magisq; serratis, caulibus lignosis, interdum cra-  
bito altioribus, non nisi æstate florentibus. Faculas omnibus es-  
dem: nam (ut recentiores perhibent) ualent in strumis, et capitis  
fracturis: quinetiam in uulneribus thoracis, quæ in pectoris cari-  
tatem usq; penetrarunt, in quem usum Bellini potionibus inferunt.  
Sunt & qui Bellidis genera laudent ad ischiada, & paralysin.  
Βούδαλλον sic Græcè, Latine uerò Buphtalmum, & Oculi  
luis bouis dicitur: Arabicè, Eihar: Italice, Buphtalmum, & Oculi  
chio di bue.


## Pæonia.

## Cap. CXL.

**PAEONIA**, siue glycytide, Græcis aliquibus pæo-  
toboron dicitur: sunt qui Idæos dactylos radicem pæo-  
niam uocant. Caulis altitudine sesquipedis adolescit,  
comitantibus multis stolonibus. Huius duo genera:  
mas folia iuglandis habet: in fœmina uerò smyrnij mo-  
re diuiduntur. Summo caule siliquas emittit amygd-  
alis similes: in quibus, cum dehiscunt, multa grana, exi-  
gua, rubra, acinis puniceorum similia inueniuntur, & in  
medio



## P A E O N I A.



medio nigra, purpurea quinque aut sex. Radix maris digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu adstringens, alba. foeminae radicibus ceu glandes circiter septem aut octo inhaerent, ut in hastula regia. Foeminis à partu non purgatis sicca radix datur: ciet menses amygdalæ magnitudine pota: uentris doloribus cum uino pota auxiliatur. ualeat contra regium morbum, & renum, ac uesicæ dolores. decocta in uino alium sistit. Rubra grana rubentes menses sistunt, decem uel duodecim pota in uino austero, & nigro: stomachicis, & erosionibus ea esse prodest: à pueris pota initia calculorum eximunt. Grana nigra auxiliantur suppressionibus nocturnis, vuluæ strangulationibus, & matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua mulsâ, aut uino. Nascitur in altissimis montibus, & præruptis.

Nomina.

P A E O N I A foemina planta est uulgaris notitiæ: mas uerò contrâ, quod paucis in Italia locis proueniat. Hanc Pissus ad me Goritiam misit hoc anno Lucas Ghinus Forocorneliensis, uir & doctrina, & rei medicæ cognitione præclarus. Sed & eam antea è Germania allatam uidimus. Pæoniæ uires posteritatis memoria tradidit Galenus lib. VI. simpl. med. ubi ita scriptum reliquit. Glycyfida, quam pentorobon, & pæoniam nuncupant, radicem habet leuiter adstringentem cum quadam dulcedine: etsi plusculum dentibus mandas, acrimoniam item quampiam subamaram subesse percipies. Proinde menses ciet ex melicrato amygdalæ pota quâtitate. Sanè tundere eam oportet, ac cribrare, & sic inspergere. Expurgat porrò etiam iecur obstructum, & renes. Sed hæc efficere uata est, quâ acris, et subamara est: qua uerò quiddam etiam adstrictorium obtinet, uentris fluxiones sistere potest. Verum eâ tunc in austerorum uinorum quopiam decoctam bibere conuenit.

Pæoniæ consideratio.

Vires ex Gal.

Galenii historia.

Est autem facultate omnino resiccatoria uehementer, ita ut non desperauerim eam etiam ad alligatam, quod merito creditum est, puerorum epilepsias sanare. Equidem uidi puellum quandoq; octo totis mensibus morbo comitali libere, ex eo quo gestabat radicem tempore: ubi uerò fortè fortuna quod à collo suspensum erat decidisset, protinus morbo correptus est. rursusq; suspensio in locum illius alio, inculpate postea se habuit. Porro uisum est mihi satius esse de his radicibus certioris experientie gratia. Id cum fecissem, ac puer iterum esset conuulsus, magnam recentis radicis partem ex collo eius suspendimus: ac deinceps prorsum sanus effectus est puer, nec postea conuulsus est. Rationabile itaq; erat aut partes quæpiam à radice defluentes, ac deinde per inspirationem attractas, ita affectos locos curare, aut aerem à radice assidue mutari, & alterari. Nam hoc pacto succus Cyrenæicus columellam phlegmonem affectam iuuat, & melanthium frictum palam destillationes, & grauedines desiccant, si quis id in calidum linum rarum liget, assidueq; calorem ex eo per inspirationem, quæ per nares fit, attrahat. Quinetiam si compluribus linis, & maxime marinæ purpureæ, collo uiperæ iniectis, illis uiperam præfoces: eaq; postea cuiuspiam collo obuincias, mirifice profuerit tum tonsillis, tum omnibus istis, quæ in collo expullulant. Sed de talibus priuatim aliquando fortè conscribam. Nunc uerò sciendum est Pæoniæ temperamentum tenuium esse partium, & exiccatorium, haud tamen insigniter calidum, sed aut symmetrum, aut paulo calidius. Hæc planta Græcis *παιωνία*, & *παιονία*, Nomina. Latini item Pæonia nuncupatur: Arabibus, Peonia: Italis, Peonia: Germanis, Peonien: Hispanis, Rosa del monte, & Rosa albardeira: Gallis, Penoesne, & Pinoine.

## Lithospermum.

## Cap. CXLI.

LITHOSPERMON à seminis duritia nomen accepit. Folij est oleæ longioribus, & latioribus, mollioribus, iacent humi, quæ ab radice exiliunt: ramulis rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acui iunci, lignosis: in quorum cacumine bifidi exortus cauliculorum speciem exhibent: folijs longis, inter quæ paruum semen, rotundum, erui magnitudine, duritia lapidea. Nascitur in asperis, & edilibus locis. Vim hanc habet, ut semine cum uino albo poto calculos frangat, pellatq; urinam.

## Phalaris.

## Cap. CXLII.


PHALARIS cauliculos emittit zeæ culmis similes, à minutis, ac nullius usus radicibus, multos, dum palmorum geniculis cinctos, graciliores tamen, ac dulces: semen candidum, oblongum, milij magnitudine. Tunditur, & in aqua aut uino succus ad uesicæ cruciatus utilissimè bibitur. Semen cochlearis mensura potum, ad eadem efficax est.



## LITHOSPERMUM MAIUS.

## LITHOSPERMUM MINUS.

Nomina.

Lithospermi  
consideratio.

**LITHOSPERMON** hodie seplastarij, & omnes fere medici Barbaros secuti Milium solis nominant. Licet rectius fortasse Mauritanorum quoque imitatione ab illis Milium Soler uocaretur. Quandoquidem hæc planta (ut scribit Serapio testimonio Aben Iuliel) frequens nascitur in montibus Soler: unde illi aptius forte à loco, quam à sole cognomentum imponeretur. Huius milij, utcumque cognominetur, duo ostenduntur genera. maius, quod legitimum est Lithospermon, quodue Hetruria satis referta est. minus, quod longe frequentius ubique in Italia gignitur. Hoc utique temere existimare nonnulli esse Phalarida, quod semen proferat milio persimile, subcandidum, & oblongum. Quibus facile subscribi posset, si planta hæc culmis geniculatis, ac etiam folijs zææ similis spectaretur, quod Oribasio Phalaris non modò culmos fundat zææ similes; sed etiam folia. Ex ijs equidem notis, quæ planè in Milio solis minore desiderantur, cogor illis non adstipulari. Quin potius adducor, ut certò credam Phalarim esse plantam ab illa diversam: eamque fortasse, cuius aliquando picturam dabimus, quæ in sylvestrium frugum genere, à quibusdam recensetur, adeò ut non desint etiam qui hanc appellant Sylvestre milium. Est enim culmo, & folio zææ, & semine candido & oblongo, milij fere magnitudine. Ceterum Fuchsiū, uirum alioqui doctissimum, Lithospermum Dioscoridis omnibus prope nunc compertum, non cognouisse arbitror, quod in suis clarissimis de stirpium historia commentarijs pro uero Lithospermo, illud quod officinis Milium solis minus appellatur, depinxerit. Idem nihil minus deinde mihi quidem uidetur errasse in libro de compositione medicamentorum, quem imper auctum edidit: ubi scriptis tradidit Lithospermi genus esse plantam illam harundinaceam, ex cuius seminibus, quæ nos Lacrymas uocamus, fiunt orbiculi, quibus filo tractatis utuntur mulieres ad suas preces numerandas. Hanc autem opinionem quoniam confutauimus in Apologia, quam aduersus Amatum Lusitanum, quem fortè secutus est Fuchsius, scripsimus, hic ut satis alibi explosam relinquimus. Lithospermon, ut herbam summa admiratione dignam, eleganter descripsit Plinius lib. xxvii. cap. xi. cuius hic uerba subiiciam. Inter omnes herbas, inquit, Lithospermo nihil est mirabilius. Aliqui egouychon uocant, alij diospyron, alij heracleon. Herba quincuncialis fere, folijs duplo maioribus, quam rutæ, ramulis surculosis, crassitudine iunci, iuxta folia singulas ueluti barbularum, et earum in cacuminibus lapillos candore, & rotunditate margaritarum, magnitudine ciceris, duritia uerò lapidea. Ipsi, quæ pediculis adhæreant, cauernulas habent, & intus semen. Nascentur et in Italia, sed laudatissimum in Creta. Nec quicquam inter herbas maiore quidem miraculo conspexi. Tantus est decor, uelut aurificum arte alternis inter folia candicantibus margaritis, tam exquisita difficultas lapidis ex herba nascens. Iacere, atque humi serpere auctores tradunt. Ego uulsam, non hærentem uidi. hætenus Plinius. Lithospermi in simplicium medicamentorum libris, Galenum meminisse non inuenio. Verum Phalaridis, quam phalerim nuncupat, uires reddidit libro viii. eorundem, sic inquit. Phalaridis herbe tum succus, tum semen, tum folia potu auxiliari creduntur uesticæ doloribus, ceu in sese habeant quidpiam tenuium partium, & calidum. Quod Greci λιθόσπερον, Latini quoque Lithospermum uocant: Mauritani, Kulb, Calt, seu Calab; Itali, Lithospermo, & Milium solis: Germani, Meerhirs, & Steinsamen: Galli, Gremil, & Herbe aux perles.

Fuch.error.

Lithospermi  
hist. ex Plin.Phalaridis vires  
ex Gal.


Nomina.

RVBIA




RVBIA SATIVA.

RVBIA SYLVESTRIS.



Rubia.



Cap. CXLIII.

**ERYTHRODANVM** radix rubra est, qua tinguntur lanæ. Vna sponte provenit: altera fertur, ut in Thebana Gallix, & Rauenna Italix: in Caria inter oleas, ut in aruis, solo creditur. Hanc non sine quæstu serunt: nanque maximum ex ea sentiunt prouentum. Asperi caules, & quadranguli, longi, aparinæ non dissimiles, robustiores, & multò prorsus maiores: folijs per interualla circumarticulos, stellatim decussatis. Semen eius rotundum, inter initia uiride, mox rubrum, postea cum maturuit, nigrum: radix tenuis, longa, rubra. Vrinam ciet: qua de causa regio morbo opitulatur, pota cum aqua mulsa: item ischiadicis, & resolutis. Crassam, copiosamque urinam pellit, nonnuncquam & sanguinem: bibentes tamen quotidie lauari oportet, & excrementorum quæ redduntur differentiam spectare. Aduersus serpentium morsus, ramulos cum folijs uino bibere prodest. Semen ex aceto potum, lienem absumit. Imposita radix trahit partus, menses, secundasq;: albæ utiligini illita ex aceto medetur.

**RVBIA**, quam Græci Erythrodanum dicunt, Hetruscis nullis non cognita: neque medicis solum, ac seplasia-  
ris cognoscitur: sed etiam mulierculis, ac rusticis, ijs præsertim, qui in locis habitant, ubi lanificio opera impenditur.  
quandoquidem inficiendis tingendisq; lauis aptissima est. Quapropter rustici, & agrestes mulieres, quod lanarum in-  
fectores Rubie quotannis plurimum emant, huius radices effodiunt, & uendunt, unde tantum quæstus faciunt, ut sibi  
fæsq; uictum suppeditent. Mittit hanc abunde Hetruria, præcipue Senensis ager. Expetuntur folia nostratibus mu-  
liaribus, quod asperissima sint, ad stagnæ nasa detergenda: siquidem mirum dictu quam pulcherrime nitescant, quæ  
Rubiam fuerint experta. Rubie meminit Galeus libro VI simplicium medicamentorum, ubi sic scribit. Est au-  
tem Rubia tinctorum radix acerba, & gustu amara. Itaq; quæcunq; agere dictum est superiore libro, ubi in unum  
eiusmodi coiuerint facultates, ea omnia in hac radice luculenter conspicias. Quippe cum & lienem, & iecur expur-  
get, & urinas crassas, multasq; ac nonnunquam etiam sanguinolentas uacuet. Quin & menses ciet, ac mediocriter  
que extersionem postulant, extergit: proinde utiligines albas cum aceto illita iuuat. Sunt qui eam ischiadicis, hoc  
est, excoquendum doloribus afflictis, & resolutis, in potu cum melicrato exhibeant. Id ἐρυθρόδανον Græcè dicitur, Nomina.  
quod Erythrodanum, & Rubia Latine: Paue, Fue alsabagin, Arabicè: Erithrodano, & Rubbia, Italice: Ferber  
roet, Germanicè: Ruwia, Hispanicè: Garance, Gallicè.

Rubix confi-  
deratio.Rubix vires  
ex Galeo.



## LONCHITIS ALTERA.

## Lonchitis.

## Cap. CXLIII.



ALTAEA.

Lonchitidis  
consideratio.

LONCHITIS folia habet porri, latiora, rubentia plurima, ad radicem circumfracta, ueluti in terram procumbentia, pauca in caule: in quo flores, ceu gale-riculi, hiantibus comicis personis similes, nigri, & è ri-ctu albam exerentes uelut linguam, quæ ad labrum in-ferius spectet. Semen inuolucris, clausum lanceæ simile, triangulum: unde sibi cognomentum arrogauit. radix dauci. Nasctur in sitientibus, & asperis. Radix ex ui-  
no pota urinam ciet.

## Lonchitis altera. Cap. CXLV.

ALTERA est Lonchitis, quam aliqui asperam lon-chitidis dicunt: folia scolopendrij emittit, sed asperiora, maioraq; , ac multò magis diuisa. Vulneribus mirum in modum prodest, in eisq; inflammationes excitari non patitur. Pota ex aceto lienem absomit.

ETSI in compluribus Italiae, ac Germania montibus, alijsq; asperis, & aridis locis diu multumq; perquisierim primū Lon-chitidis genus: ipsum tamen haftenus mihi non licuit reperire, neq; etiam ab alijs inuentum uidere. Ceterum Lonchitidis alteram lampidem uidimus studio, ac liberalitate Luce Ghini medi-ci clarissimi, qui eam Pisis ad nos misit. Hec folia habet scolopendrij, asperiora, maiora, magisq; diuisa, ut eius pictura, quam exhibemus, probè ostendit. De prima Lonchitide differuit Plinius lib. xxv. cap. xi. ubi sic inquit. Lonchitis non, ut plerūque existimauerunt, eadem est, quæ xyphion, aut phasgion, quanquam cuspidi similis semine. Habet enim folia porri rubentia ad radicem, & plura quàm in caule, capitula personis comicis similia, paruam exerentibus linguam, radicibus prælongis nascitur in sitientibus. Haftenus Plinius, qui horum plerumq; à Dioscoride mutuatus est. Lonchitidis utriusq; meminit Gale-nus lib. vii. simplicium medicamentorum, ubi de earum uirtutibus ita scribit. Lonchitis, eius uidelicet, quæ semen habet triangulare, figura lanceæ simile, radix potissimum quodammodo similis est radici dauci: proinde urinam ciet. Porro eius, quæ scolopendriae similia habet folia, ea ad glutinanda uulnera idonea sunt uis-ridia: sed sicca cum aceto pota, lienes induratos sanant. Apy-ritis ut Græcis, ita etiam Lonchitis Latinis, & Lonchite Italis uocatur.

Lonchitidis  
uirtutes ex Gal.

Nomina.



## Althæa. Cap. CXLVI.

ALTHAEA, quam alij Ibisum uocant, in syl-uestrium maluarum genere est, cui folia ut cyclami-no rotunda, lanugine canescunt: flore rosaceo: bicu-bitali caule: radice lenta, intus alba. Althæa appellatur, quod inter primas sit utilis, & pluribus polleat reme-dijs. Decocta enim in uino aut aqua mulsæ, & per se cum imponitur tusa, efficax est contra uulnera: item ad strumas, parotidas, abscessus, mammarum inflam-mationes, fracta sedis, inflationes, nervorum rigores: siquidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicatri-cem perducit. Cocta, ut dictum est, adiecto suillo len-pe, aut anserino, terebinthinæ, ut malagmaticis, tor fiat, facit ad uulnæ inflammationes, præclusiones-que, in pectus subdita. Decoctum eodem fungitur mu-  
nere: onera uulnæ, reliquiasque à partu extrahit. De-cocta



coctæ radicis succus ex uino potus, succurrit urinæ difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis. dentium mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen siccumq; tritum, vitiliginis in sole cum aceto perunctas emendat. Eodem cum olco & aceto peruncti, à venenatis non feriuntur. ualet contra dysenteriam, & sanguinis reiectiones, aluique profluuium. In posca, aut uino decoctum bibitur, contra omnes uesprium, apum, similiunq; aculeatos ictus. Folia cum olei momento, moribus, & igni ambustis illinuntur. Constat aquam, trita radice addita, sub diuo addensari.

**ALTHAEA** à Latinis posset Medica simpliciter dici, quoniam ab ἀλθαία, quod Græcis mederi significat, Althææ consideratio. etymon habere uidetur. Quocirca merito scriptum reliquit Dioscorides, Althæam id nomen traxisse à multitudine remediorum, & frequenti eius usu. Ea uulgaris herba est, nullisq; non cognita. Latini hanc Ibiscum nominant. Italici uerò, corrupta à Latinis appellatione, & præposita malua, quod cum ea quandam habeat cognationem, composito nomine Maluauisco uulgo uocatur. Althæam memorie prodidit Theophrastus lib. 1x. cap. x 1x. de plantarum historia, ubi de ea differit ijs uerbis. Et radicem Ibisci aquam posse addensare aiunt, si tritam inieceris, sub diuoq; humorem posueris. Cōstat Ibiscus folio maluæ maiori, pilosiori; caule molli: flore luteo: radice neruosa, alba: fructu maluæ. caulis quoque gustu maluam reddit. Vfus eius ad rupta, & tusses è uino dulci, & ad ulcera in oleo. Aliam quandam si caribus concoquas, in idem aggregare, ac ueluti conglutinare posse affirmant: alias uim attractoriam possidere, modo magnetis lapidis, atque succini. hæc in inanimatis. hætenus Theophrastus. Meminit Ibisci Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, ubi eius uires ita descripsit. Ebiscus, siue althæa (est autem malua agrestis) facultatem habet digerendi, laxandi, phlegmone leuandi, mitigandi, concoquendi difficilia coctu tuberculorum, ad hæc magis extensoriam quam illa facultatem ostendunt, ut & vitiliginis detergant, & semen reape cum calculos confringat. Radicis uerò decoctum dysentericæ, alui profluuii, & sanguinis reiectioni utile est, nempe Althæa, Ibiscus, seu Ebiscus nominatur: Mauritanis, Chitini, Chathmi, siue Chathmie, & Rosazaueni: Italici, Maluauisco; Germanis, Ibisch, & Heyluurtz: Hispanis, Hierua cannamera, & Marmale; Gallis, Guimaues.

Althææ uires ex Galeno.

Nomina.

## Alcea.


## Cap. CXLVII.

**ALCEA** syluestrium maluarum generi assignatur. folia habet diuisa, uerbenacæ proxima: caules tres aut quatuor, cortice cannabino uestitos: florem rosæ, paruum: radices albas, latas, quinque aut sex, cum plurimum cubitales. Quæ cum uino, aut aqua potæ, dysentericis, ruptisque medentur.

**ALCEAM** hodie passim ferè in Italia aliqui Bismaluum, Alceæ consideratio. alij Maluum syluestrem, nonnulli etiam Maluauiscum agreste nominant. Herba est caule, floribus, ac semine hortensi maluæ perquam similis, sed folijs longiori incisura laciniatis, ranunculi modo. Nascitur in incultis, campestribus, & agrorum, serobiumq; marginibus, iuxta sepes, uias, ac semitas. Alceæ radicibus non desunt, qui althææ loco utantur, cum huius copiam non habeant, ad tumores tum soluendos, tum emolliendos. Porro Alceæ peculiari capite meminisse Galeum non reperio, nisi hanc syluestre maluum appellauerit, dum maluæ facultates libro vii. simplicium medicamentorum describit, his uerbis. Malua sylvestris quidem digerentis paululum, & emollientis leuiter est facultatis. Hortensis uerò quanto plus habet aqueæ humiditatis, tanto facultate imbecillior est. Fructus eius tanto ualidior est, quanto & siccior. hæc Galenus. Caterum Paulus seorsum Alceam retulit lib. vii. ubi sic inquit. Alcea sylvestris maluæ genus est. In uino pota dysentericæ, & erosionibus medetur, potissimum eius radix. Huic herbe nomen Græcum, ἀλκία: Latinum, Alcea: Italicum, Bismalua, Malua saluatica, & Buonuischio: Germanicum, Sigmar's kraut: Hispanicum, Malua de Vngria, & Malua montesina: Gallicum, Bimauue.

Alceæ vires ex Paulo.

Nomina.





## Cannabis.

## Cap. CXLVIII.

Cannabis cō-  
sideratio.Cannabis vi-  
res ex Gal.Mulierum er-  
ror.

Nomina.

CANNABIS sativa planta magni in vita usus ad robustissimos funes facitandos: folijs fraxini, graui odore: caulibus proceris, inanibus: semine rotundo. quod largiore cibo genituram extinguit. Succus ex ea recente conuenienter aurium doloribus instillatur. Sylvestris Cannabis uirgas fert althææ similes, minores, nigriores, & asperiores, cubiti altitudinē æquantes: folio sativæ, nigriore, & asperiore: flore lychnidis, subrubro: semine, & radice althææ. Decocta radix, illitu inflammationes mulcet, tumores discutit, tofos articularum dissipat. Huius cortex torquendis funibus accommodatus.

CANNABIS sativa planta est adeo vulgaris notitiæ apud omnes Europæ nationes, ut omnino superuacuum sit eius faciem uerbis repræsentare. Sylvestris autem quanquam in multis Italia locis proueniat cum syluosis, tum etiam campestribus; paucos tamen esse puto, qui legitimam ostendant. Ceterum sativæ semen incibus sumptum planè contrarium efficit in Gallinis, & in nobis: siquidem largius commanducatum nobis genituram extinguit: gallinas uerò ouistraciores reddit. Experientia enim compertum habeo, gallinas, quæ hyeme, quo tempore algoris seuitia raro enas parere solent, Cannabis semine uescuntur, numerosiore ouorum partu gaudere: id quod frequenti cantu suo declarant. Illud prætere a mihi non abierit inditum, quod Cannabis recentis decoctum expressa deinde fortiter herba, terrestrium lumbricorum cauermæ lispersum, statim eos euocat. Quod piscatoribus acceptum res ferendum est, qui hoc ingenio uermiculos capiunt suis hamis infingendos. Verum non modò terrenos uermes euocat Cannabis decoctum, & succus eius expressus, sed etiam (ut Plinius lib. xx. cap. xxi. auctor est) uermiculos, & quodcumque animal in auem intrauerit, eiecit. Hinc itaque quispiam conijcere potest, eius facultatem ad interaneorum uermes haud inbecillam fore. Cannabis meninit Galenus lib. vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Cannabis semen status discit, adeoq; desiccatur, ut si plusculum edatur, genituram exiccet. Sunt qui ex eo uiridi succum exprimentes ad aurium dolores ab obstructione, ut mihi uidetur, natos utantur. Et libro primo de alimentorum facultatibus, idem de Cannabi ita scribit. Non quemadmodum planta ipsa cannabis uitici quodanumodo est similis, ita semen seminis facultate est simile: sed plurimum ab eo disidet, ut quod concoctu est difficile, stomachoq; ac capiti noceat, præuigilantia sit succi. Sunt tamen qui eo quoque friso cum alijs tragematibus uescantur. Traginata autem uoco ea, quæ post cœnam, uoluptatis inter bibendum excitandæ gratia manduntur. Multum autem calefacit: ideoq; sumptum paulo largius caput ferit, uaporem sursum ad ipsum mittens, calidum simul ac medicamento sumi. hæc Galenus. Ex quibus liquido apparet, quàm grauiter errent mulieres, quæ pueris comitiali morbo laborantibus Cannabini seminis decoctum exhibent. quo tantum abest, ut morbum curent, ut etiam eius augendi occasionem præbeant. Quæ planta κάναβις Græcè, Cannabis item Latine dicitur: Arabicè, Scchedenegi, & Canab: Italicè, Canape: Germanicè, Zamer hanff: Hispanicè, Canhamo: Gallicè, Chanure.

intrauerit, eiecit. Hinc itaque quispiam conijcere potest, eius facultatem ad interaneorum uermes haud inbecillam fore. Cannabis meninit Galenus lib. vii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Cannabis semen status discit, adeoq; desiccatur, ut si plusculum edatur, genituram exiccet. Sunt qui ex eo uiridi succum exprimentes ad aurium dolores ab obstructione, ut mihi uidetur, natos utantur. Et libro primo de alimentorum facultatibus, idem de Cannabi ita scribit. Non quemadmodum planta ipsa cannabis uitici quodanumodo est similis, ita semen seminis facultate est simile: sed plurimum ab eo disidet, ut quod concoctu est difficile, stomachoq; ac capiti noceat, præuigilantia sit succi. Sunt tamen qui eo quoque friso cum alijs tragematibus uescantur. Traginata autem uoco ea, quæ post cœnam, uoluptatis inter bibendum excitandæ gratia manduntur. Multum autem calefacit: ideoq; sumptum paulo largius caput ferit, uaporem sursum ad ipsum mittens, calidum simul ac medicamento sumi. hæc Galenus. Ex quibus liquido apparet, quàm grauiter errent mulieres, quæ pueris comitiali morbo laborantibus Cannabini seminis decoctum exhibent. quo tantum abest, ut morbum curent, ut etiam eius augendi occasionem præbeant. Quæ planta κάναβις Græcè, Cannabis item Latine dicitur: Arabicè, Scchedenegi, & Canab: Italicè, Canape: Germanicè, Zamer hanff: Hispanicè, Canhamo: Gallicè, Chanure.

## Anagiris.

## Cap. CXLIX.

ANAGIRIS frutex est arboris instar, perquam grauis odore: folijs uiticis, uirgisque: flore brassicæ: semen in corniculis non breuibis gignit, subrotundum, firmum, uersicolori facie, simile renibus, quod durefcit uua maturescence. Tenera folia trita tumores illitu reprimunt: si parum hæreat, & secundæ, mensesque morentur, drachmæ pondere bibuntur in passo: sic & suspiriosis dantur, & contra capitis dolores in uino. difficulter parientibus adalligantur, ita ut à partu statim auferantur. Radicis cortex concoquendis, discutiendisq; adhibetur. Semen commanducatum uomitiones uehementer ciet.

Anagiris cō-  
sideratio.

QVAVNIS ueteres unius tantum Anagiris meminere: duo tamen in Italia uisuntur genera. Maius in Apulia frequentissimum nascitur, et eo Campaniæ tractu, quo Terracina itur Fundum ad Tyrrheni litus: folijs uiticis proximis: flore brassicæ racemoso: fructu hortensi similis simili, amplioribus tamen, & breuioribus paulo cluso, colore purpurascence, usque adeo duro, ut aqua macerato, sua in pertinaci duritie consistat. Minus, quod rursus in Tri-



## ANAGYRIS.

## ANAGYRIS ALTERA.



Tridentina vulgò vocant Eghelo, maio & iunio mensibus grato in montibus spectaculo floret. Micat enim aureo flore, alteri omnino simili, odore tamen ingrato. Hinc cornicula prodeunt genistæ æmula: in quibus semen cōtinetur eiusdem genistæ magnitudine, sed oblongum, phaseoli modo, colore subnigro. Quod comedentes quandoq; ignari passim ueluti legumina, crebris adeo uomitionibus afficiuntur, ut nonnunquam uiderim ego quosdam, qui sanguinem usque euomuerunt. Materies ligni durissima, quæ quasci modo exterius lutea est, interius uerò nigra. Incorrupta diu durat: proinde uinitores ex Anagryri palos faciunt sustinendis uitibus aptissimos, hosq; cæteris præferunt ex alijs arboribus factis. Quin & sagittarij ex ea ualidissimos arcus conficiunt. Hæc planta scætet uallis Anania, ac uersus Tridentinus ager. Cæterum non desunt & recentioribus herbarijs haud obscuri nominis (quorum opinionem tuetur Conradus Gesnerus Tigurinus uir magnæ lectionis in suo libro animalibus dicato) qui putant, ac potius pro certo affirmant, alterum Anagryris genus, quod in montibus Tridentinis uulgari formone Eghelo appellari supra diximus, eam sine controuersia arborem esse, quam Plinius lib. xvi. cap. xviii. Laburnum uocat, ubi ita scribit. A quas odore cupressi, iuglandes, castaneæ, laburnum. Alpina & hæc arbor, nec uulgò nota: dura ac candida mater: cuius florem cubitalem longitudine apes non attingunt. Ex ijs Plinij uerbis abunde, ni fallor, cognoscitur, quod ut falsa, reprobanda sit illorum opinio. Siquidem Laburni materies à Plinio candida describitur: non contrà medullis nigra, cortice tenui lutea, in modum Guaiaci, qualis Egheli uocata materies plane cernitur. Præterea eghelus arbor est omnibus ferè cognita, quod frequentissima in syluis reperitur: non ea quidem uulgò incognita, ut de Laburno refert Plinius. Ad hæc Egheli flores, qui in arbore racemorum instar pendent, palmi longitudinem non excedunt: quos tamen Laburno Plinius cubitales reddidit. Illud insuper experientia compertum habeo (etsi contrarium asserat Gesnerus) quod apes Egheli flores attingunt, nec eos aspernantur. Hæc nimirum sunt, quæ, meo quidem iudicio, refragantur tum Gesnero, tum omnibus ijs, qui cum eo hac in re sentiunt. quin etiam ostendunt, quam magna sit differentia inter Laburnum & Eghelum. Hanc tamen plantam idem Gesnerus montani cytisi genus esse censet, arguendo quod folia ferat terna ueluti cytisi, quodq; cytisi modo sit apibus ingrata. Sed is (pace uiri eruditi dixerim) in hoc maxime hallucinatus deprehenditur, Marci Varronis, Columellæ, & Plinij testimonio: ut qui inter cætera seri iubent iuxta aluearia cytisum, quod huius flore magnopere delectentur & alliciantur apes. Hoc similiter testatur Galenus libro primo de antidotis, ubi cytisi historiam & uires describit. Et miror certè, Gesnerum illa non uidisse, quæ tamen debuerat, si omnes, qui extant in Europa, libros perlegit, ut perlegisse conijcitur ex Bibliotheca, quam edidit. Quare equidem non possum non in ea perstare sententia, quam iam pridem habui de planta Eghelo uocata, cum nulla sit firma ratio, quæ me cogat illorum subscribere iudicio, qui eam Laburnum Plinij esse existimant. Quantum igitur ego sentio, Eghelus erit Anagryris minor, aut Anagryris montana, si ita nobis liceat eam nominare. Nanq; non solum folijs, floribus, corniculis, semine, & omnibus deniq; notis Anagryrim profus æmulatur, ut eius effigies,

Opinio reprobata.




## C E P A E A.

Anagiris uires ex Gal.

Nomina.

Cepææ consideratio.



## A L I S M A.

Cepææ uires ex Paulo.

Nomina.

Alismatis consideratio.



quam hic damus, pulchre demonstrat; sed etiam uiribus & odore, utpote qui in tota planta teter & gravis admodum sentitur.

Anagiris uires memoriae prodidit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, his uerbis. Anagyrus frutex est grauius oleus, & acris, digerentis, exalfacientisq; facultatis. Sed folia etiam uirentia, cum propter humiditatis admisionem minus sint acria, idcirco tumentia reprimunt. At siccata incidentis sunt, exiccantisq; ualenter facultatis. Similem fere facultatem habet radicis eius cortex. Semen autem magis subtilium est partium, sed & uomitum prouocat. Planta, quæ ἐνδύοις Græcis, Anagiri, Italis.

## Cepææ.

## Cap. CL.

C E P A E A portulacæ similis est, sed nigriora habet folia, & radicem tenuem. Folia in uino pota urinæ stillicidio, & uesicæ scabie laborantibus opitulatur. maxime id præstat, si cum decocto radicis asparagi eius, quæ myacanthon, hoc est, corrudam uocant, bibatur.

C E P A E A M, quam antea in nostris commentarijs Italica lingua conscriptis, ingenue confessus eram me nōdum comperisse, aut ab alijs compertam uidisse, hoc tempore Venetijs ad me misit Ioannes Odoricus Melchiorius Tridentinus medicus pro ciuitate sua non imperitus, rei q; herbarie non ignarus, mei adeo studiosus, ut si aliud non esset, hoc uomine tantum mihi plurimum diligerendus sit, atq; etiam in filium habendus. Ad Cepæam hanc respondere (id quod eius pictura, quam hic damus, graphicè ostendit) ut non dubitandum putem, quin hæc sit uera ac legitima Cepæa. Huius, quod equidem legerim, Galenus non meminit in simplicium censu. Verumtamen Paulus eius mentionem fecit libro vii. inter simplicia, ubi eam retulit his uerbis. Cepæa portulacæ similis est. Folia ipsius contra uesicæ scabies utiliter bibuntur. Radix cum asparago, quem myacanthinum, hoc est, corrudam appellant, pota, urinæ stillicidia, quæ ex obstructione fiunt, abigit. Κηταία ut Græcis, ita Cepæa Latinis, & Cepea Italiis appellatur.

## Alisma.

## Cap. CLI.

A L I S M A, alii Damasonion appellant: folia ei plantaginis, nisi angustiora essent, † laciniosa, conuexaque in terram: caule simplici, tenui, cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui, candido, pallecente: radicibus tenuibus, ut ueratri nigri, acris, odoratis, modicè pinguibus. aquosos amat tractus. Radix, si drachma una, aut altera bibatur, his conuenit, qui leporem marinum deuorauerunt, aut à rubetis ranis demorsi sunt, aut opiū hauserunt: torminibus, atque dysenteria, per se, aut cum pari modo seminis dauci, potui datur. conuulsis, & contra uitia uulvæ prodest. Herba sistit aluum, menstrua pellit, tumores illita mitigat.

Q U A N Q U A M affirmat Ruellius, cui etiam Cordus subscribere uidetur, Alisma sibi cognitum esse, uocariq; à nonnullis Pastorem fistulam, à quibusdam uerò Plantaginem aquaticam; tamen plantago hæc, quam etiam aliqui Barbam soluanam appellant, nullis uotis cum Alismate conuenire deprehenditur. Siquidem Alisma folia fert plantagini similia, sed angustiora, & inter ram reflexa: caulem mittit simplicem, ac tenuem. Plantago autem



tem aquatica folijs prodit plantagine maioribus, lancearum cuspidum instar acuminatis, sursumq; spectantibus: multiplici caule, adnatis pluribus referto. Cum itaq; ex ijs notis collatis constet, Alisma, & Barbam sylvanā inter se plurimū differre, non temere facere uideor, quod illorum sententiæ non ausim adstipulari. Porro plantam, quam hic pro Alismate depingi curauimus, mihi primum Præge ostendit Adamus Leonorus, iuuenis spectatæ doctrinæ, & rei herbariæ studiosus. Quod enim hæc omnibus, ni fallor, notis Alisma representet, merito fit, ut iam non dubitem assermare eam esse legitimum Alisma: aut saltem eius effigiem exhibere, ut aliorum quoq; de ea sit iudicium. Ceterum duo Alismatis genera Plinius constituit lib. xxv. cap. x. ubi de utroq; differit his uerbis. Alisma, inquit, alij damasonion, alij Hyron appellant. folia ei plantaginis, nisi angustiora essent, & magis laciniosa, conuexaq; in terram, aliās etiam uenosa similiter: caule simplici, & tenui, cubitali: capite thyrsti: radicibus densis, tenuibus, ut ueratri nigri, acerbis, odoratis, pinguibus. nascitur in aquis. Alterum genus eiusdem in syluis, nigrius, maioribus folijs. hæc Plinius. Alisma memoriæ prodidit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, sic de eius uiribus differens. Damasonium, aut Alisma. De hac herba in tertio libro tradit Dioscorides, quod radix eius epota dysenterias sanat, & aluum sistat, atq; oedemata mitiget. Sed nos ea quidem experti non sumus. Quod autem constitutos in renibus calculos aqua, in qua decocta fuerit, pota conuincuat, casu experti sumus. Ex quo liquet, quod absterforiam quandam facultatem obtinet. Huius herbe nomen Græcum ἀλίσμα: Latinum, pariter & Italicum, Alisma. Hæc uox non legitur in Græcis codicibus, neque ab Oribasio refertur, neque etiam à Marcello uertitur. Vnde planè suspicor, quod Ruellius ita uerbum hoc ex Plinio adiecit, ut reliqua etiam ex eodem reddidit.

Alismatis uires ex Gal.

Nomina.

## Onobrychis.

## Cap. CLII.

ONOBRYCHIS folia habet lentis, longiora paulò: caulem dodrantalem: florem puniceum radicem paruum. nascitur in uliginosis, & incultis. Herba suapte ui, si trita illinatur, tubercula dissipat: cum uino pota, strangurias sanat: illita ex oleo, sudores mouet.


NASCITVR Onobrychis, Plinio libro xxiii. cap. xvi. auctore, circa fontes. Folia habet lentis, paulò longiora: florem rubentem: radicem exiguam, & gracilem. Sunt qui Onobrychin uelint eam esse herbam, quam aliqui Rutam caprariam, alij Galegam uocant: nos uerò uulgò Lauanese. Verum hæc notis, quæ Onobrychi tribuuntur, haudquaquam respondere deprehenditur. quippe quæ folia ferat lentis quadruplo maiora, caulem plerumque bicubitalem, flores purpureos, & radicem non paruum. Vt hinc mihi planè uideatur, quod illorum opinioni uero res sit iniqua, aut debeat adstipulari. Onobrychidis uires tradidit Galenus libro viii. simplicium medicamentorum, cataplasmatibus tubercula discutit: arefactæ uerò, si cum uino bibantur, strangurias sanant. Quinetiam sudores elicit cum oleo inuncta. Quæ ὀνοβρυχίς Græcè, Onobrychis item Latine, & Onobrychi Italicè uocatur.

Onobrychis confid.

Vires ex Galeno.

Nomina.

## HYPERICVM.



## Hypericum.

## Cap. CLIII.

HYPERICVM alii androsæmon, alii corion, alii chamæpityn appellant, quoniam semen odore resinam imitatur: surculaceo frutice, dodrantali, rubescente: folio ruta: flore luteo, † leucoion simili, qui digitis attritus sanguineum succum remittit, qua ex causa androsæmon cognominatur: subhirsuta siliqua, & in rotundo oblonga, hordei magnitudine: semine intus nigro, resinosi odoris. gignitur in locis cultis, & asperis. Vrinam cit, menstrua pellit appositum: tertianis, quartanisq; cum uino potum liberat. Semen quadraginta diebus haustum, ischiadicis medetur. Folia cum semine illita, ambusta sanant.

## Ascyrum.

## Cap. CLIIII.

ASCYRON, siue ascyroides, hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosius, maiores habet ramos, furculosiores, rubentesq;: folia tenuia: flores luteos, & fructum resinofum, hyperico non absimilem: cuius attritu digiti ferè cruentantur, qua de causa androsæmon uocauere. Vfus seminis ad ischiadicos, potum in hydromelitis sextario: nam biliosa recrementa amplissimè detrahit. sed assidue dare oportet, donec sanitati restituantur: Illinitur & ambustis efficaciter.


ANDRO-



ASCYRUM.




CORIS.



Hyperici, &  
congenerum  
confid.

ANDROSAEMUM.



Androsæmon.

Cap. CLV.

ANDROSAEMON ab hyperico, ascyroque differt, quod fruticet ramulis surculosis, ac tenuibus: rubentibus uirgis, & foliis rutæ, triplo aut quadruplo maioribus, quæ trita uinoso succo manant. compluresque: circæ in cacumine, utrinque expansas, pinnatasque: papæa quas flores pusilli, lutei: & in calyculis semen papææ nigri, insignis lineis. Huius comæ trita resinosum odorem reddunt. Semen tritum drachmis duabus potum, biliosa alui excrementa pellit. ischiadicis maxime medetur: sed à purgatione aquam exorbere oportet. Herba ambustis illita medetur, & sanguinem cohibet.

Coris.

Cap. CLVI.

CORIS, quod aliqui hypericon uocant, frutex est folio ericæ, rubro, pinguiore, ac minore, non altior drante, suavis, odoratus, acris. Potum semen menses trahit, & urinas: contra phalangiorum morsus, ischiadicis, & opisthotonicos ex uino potum auxilio est: horum toribus ex pipere, sed opisthotonicis ex oleo, aptissime illinitur. Radix uino decocta potaque, defectis operari ferre creditur: sed laborantem inter potandum quam optime cooperiri licet: siquidem corpus totum desudabit, ex qua re pristinam agilitatem recuperabit.

HYPERICUM, Ascyrum, & Androsæmon, eiusdem planæ generis plantæ (ut Dioscorides inquit) esse uidentur. Verum in earum caulibus, & folijs aliqua notatur differentiam: hæc folia habet rubentiora, illa uiridiora, uni maiora insunt, alteri minora.



minoræ. Similis discriminis ratio in caulibus. Omnes hæc congeneres plantæ bodie ab omnibus uulgò cognoscuntur : eæ nanque iunio, & iulio mensibus, diuersis in locis aureis floribus ornatæ conspiciuntur, ijs adamussim distinctæ ac prædictæ notis, quæ singulis à Dioscoride tribuuntur. Cæterùm quæ Coris uocatur, non ita Hypericum refert, quemadmodum Androsæmum, & Ascyrum. quippe quæ non altior dodrantali altitudine assurgat : folijs cricæ, minoribus tamen, & subpinguibus : caulibus rufescentibus, odore suauis, ac grato. Hæc ad uie pluries allata est à nostris herbarijs. nascitur frequentissima in Italia. Hypericum à perforatis folijs à nostris uulgò Perforata uocatur : folia enim innumeris scatent foraminibus, ijsq; adeo minutis, ut uisum effugiant, nisi ipsa folia sole obiecta inspiciantur. id quod silentio uidetur inuoluisse Dioscorides : qui etiam Plinius, aliqui rerum omnium diligentissimus indagator. Qui tamen hæc in historia haud dubie falli deprehenditur, quod scripserit lib. xxvi. cap. viii. Hypericum nasci semine in siliqua, nigro, maturescente cum hordeo. Siquidem Dioscorides non tradit Hypericum cum hordeo maturescere, sed contineri eius nigrum semen siliqua subirsuta, & in rotundo oblonga, hordei magnitudine. Constat præterea annua experientia maturescere hordeum plerumque abeunte maio : uerùm Hyperici semen non perficitur, nisi iulio, & augusto mensibus. In hac quoq; Hyperici historia errat Brasauolus medicus licet clarissimus, quod uelit Hypericum ex Dioscoridis auctoritate florem album habere : eamq; ob causam, id quod circumfertur, cum flore sit melino, illegitimum esse putat ; imò non aliud, quàm Rutam syluestrem, pro qua pharmacopolani secum colloquentem, id ipsam asseruare admonet. Neque in his uno tantum, sed, quantum sentio, duplici uotatur errore. Primum quod Hypericum non album, sed luteum florem ferre scribat Dioscorides contra Brasauoli sententiam, cum sic in eo legatur ἀλβὸς ἔχον, hoc est, florem habens luteum : non autem album inquit, ut perperam Marcellus Florentinus interpretatur, cuius fortasse falsa interpretatione Brasauolus seductus est. Deinde quod legitimum Hypericum pro sylvestri ruta seruandum censuerit, cum tamen in calce seræ sui uoluminis prioris sententiæ oblitus, dum olei ex Hyperico parandi seniori myropole rationem explicat, communis usus Hypericum Ascyrum esse declarat. Nec secus quàm Brasauolus hallucinatio. luteum uelut in calce eorum dixerim, Monachi illi reuerendi, qui in Mesuem commentarios ediderunt, quod non recte cum illo sentiant, Hypericum, quo utimur, primum esse sylvestris rutæ genus. Quorum sententia cum fuerit à nobis superius in rutæ mentione rationibus & auctoritatibus abunde explosa, & improbata, supernacuum esset idem nunc repetere : eò enim accedet, qui plura horum errata cognoscere uolet. Hyperici uires memoriæ prodidit Galenus lib. viii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Hypericum calefacit, & desiccatur, tenuisq; substantia est, adeo ut & menses, & urinas prouocet. Sed ad hæc totus sumendus est fructus, non tantum semen. Porro cum folijs illius uiridis ad cicatricem ducit cum alia, tum etiam ambusta. Cæterùm si sicca contusa inspergas, sanabis humida, & putredinosa ulcera. Sunt & qui ischiadicis bibendum exhibeant. Idem lib. vi. de Androsæmo ita scribit. Androsæmum planta fruticosa, natura duplex : unum enim Ascyron, & Ascyroides nuncupatum est, species hyperici. Alterum uerò à quibusdam Dionysias appellatur. Est autem semen eorum purgatorium. Foliorum uerò facultas modice extergens & desiccans, ut & ambusta sanare credantur. Cæterùm in uino austero decocta, uinum ipsum magnorum uulnorum glutinatorium efficiunt. Sed quod de Cori mentionem fecerit Galenus in simplicium medicamentorum censu, mihi incompertum est. Planta, quæ Græcis ὑπερικόν, Latinis similiter Hypericum nominatur : Mauritania, Reiofricon, seu Reiofaricon : Italis, Hiperico, & Perforata : Germanis, Sant Iohans kraut : Hispanis, Coraion : cillo : Gallis, Millepertuis, & Trucheram. Quam uerò Græci ἀσχυρόν, Latini quoque Ascyrum dicunt : Arabes, Asbirach : Itali, Aseiro. Quæ deinde Græcis ἀνδρόσεμον, Androsæmum item Latinis appellatur : Arabibus, Androsæman, Androsion, siue Andresagian : Italis, Androsæmo. Quæ denique κόρις Græcè, Coris etiam Latinè, & Gori Italicè uocatur.

Plinii lapsus.

Brasauoli error.

Monachorū hallucinatio.

Hyperici uires ex Gal.

Nomina.

† Quoniam hoc loco in uulgatis exemplaribus Græcis nulla sit albæ uiolæ mentio ; idcirco sunt qui illorum testimonio freti, uerbum illud auferant ex interpretibus. Sed quomodo id rectè factum sit, non uideo : siquidem in Oribasio legitur, ἀλβὸς ἔχον μάλινον λευκοῖα ὅμοιον, hoc est, florem habens luteum leucoio similem. Adde etiam, quod Hypericum ita adamussim floris colore luteam uiolam representat, ut nihil melius. Nos autem uel sumus uoce Græcæ, ne ex albo, quod forte Marcello imposuit, aliqua possit oriri difficultas.

† Quæ hic sequuntur, in Græcis codicibus impressis non hoc loco, sed in fine inter notha, & Dioscoridi falsò adscripta leguntur, ut quæ adscititia sint habita. Nos uerò illa huc admisimus Ruellij : ut facinus, interpretationem scripsi : ne non etiam fidem codicis manu scripti.

## Aiuga.

## Cap. CLVII.


A I U G A herba in terra repens, subcurua : folijs semperuiui minoris, multò tenuioribus, hirsutis, & pinguioribus, circum ramos frequentibus, odore pinus : flore tenui, luteo, uel candido : radicibus cichorii. Folia septem diebus in uino pota regio morbo medentur : & quadraginta diebus ex hydromelite, ischiadicos sanant. Dantur peculiariter urinæ difficultatibus, iccinoris, & renum uitiiis : torminosos profunt. Ea apud Heracleam Ponticam, perinde atque antidoto, contra aconitum utuntur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum polenta iure decocti subacta. Trita in farinam, & cum fico in pilulis sumpta, aluum emollit : excepta melle, cum æris squama, & resina deiicit : apposita ex melle, uulnæ uitia extrahit : mammarum duritias discutit, uulnera glutinat : ulcera quæ serpunt, cum melle illita, cohibet. Alterum est genus aiugæ, cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruat, prætenuibus : coma supradictæ, flore candido, semine nigro. hæc etiam pinum redolet. Tertia mas nominatur, paruula, folijs exilibus, albis, scabris : caule aspero, candido : luteis flosculis, semine iuxta alas, resipit & hæc pinum. Hæc duæ uim superioris obtinent, sed non usque adeo efficacem.

A I U G A M



## CAMAEPITYS PRIMA,

## CAMAEPITYS ALTERA.



Aiugæ con-  
sideratio.

Cuiusdā Ger-  
mani error

Chamæpity-  
os uires ex  
Galeno.

Nomina.

AIUGAM, quam Græci Chamæpityn uocant, quoniam folijs, & odore pinum refert, herbariorum uulgus Iucam arthriticam appellat, quod ischiadicis, & alijs articularum doloribus opem ferat non obscuram. Vulgaris est notitie Aiuga, quæ primo generi adscribitur. Verum postrema, quam sæpius etiā uidimus, non adeo omnibus est nota, quæ admodum nec media, quam hætenus mihi quidem uidere non licuit. Caterum in aperto errore uersabatur Germanus ille pharmacopola, qui Brasauolum docuit Aiugam Germanica lingua uocari Vergiß mein nicht. Quandoquidem herba huius nominis mihi cum Germanis iandiu uersanti notissima est: quæ tamen nulla prorsus ex parte quāuis Aiugam representat. Chamæpityos meminit Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum, ubi de eius uiribus ita scriptum reliquit. Chamæpitys gustu quidem amarum saporem acri ualidiorem obtinet. Effectu uerò expurgat, abstergitq; uiscera plus quàm calfacit. Proinde regio morbo laborantibus, & omnino quibus facile iecur obstruitur bonum est medicamentum. Quin & menses ducit tum pota, tum apposta cum melle. Sed & urinæ mouende aptum est medicamen. Sunt autem qui etiā eam exhibent decoctam in melicrato ijs, qui coxendicis doloribus torquentur. Herba porro ipsa uiridis uulnera magna conglutinat, & ulcera putrescentia sanat. Præterea mammarum durities discutit. Est enim in stecando ordinis tertij, in calfaciendo uerò secundi. Quæ herba Græcis χαμαίπυτος, Latinitis Chamæpitys, Aiuga, & Abiga nuncupatur, Mauritanis, Hamefitheos, seu Chamafithius: Italis, Chamæpityo, & Iua: Germanis, Ye lenger ye lieber: Hispanis, Pinillo, & Yua artetica: Gallis, Iue muscate, aut arthétique.

LIBRI TERTII FINIS.



# PETRI ANDREAE MATTHIOLI MEDICI


## Senensis Commentarii,

IN LIB. QVARTVM PEDACII DIOSCORIDIS  
ANAZARBEI, DE MEDICA MATERIA.

**T**RIEVS ANTE libris, amantissime Aree, tradidimus odoramenta, olea, arbores, vnguenta, animalia, frumenta, olera, radices, succos, herbas, seminaque. In hoc autem quarto differemus de radicibus, & eis, quæ restant, herbis.

### Betonica.

### Cap. I.



**C**ESTRON psychotrophon uocitatur, quoniam frigidis locis inueniatur. Latini Betonicam appellant. Herba est caulem ferens tenuem cubiti altitudine, aut maiorem, quadratum: folia quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odorata, prope radicem maiora: in summis caulibus semen, ueluti satyreæ, spicatum est. Decerpta huius folia siccantur, plurimos ad usus. Radicibus nititur, ut ueratri, tenuibus. quæ ex hydromelite in potu, pituitosam uomitionem euocant. Folia dari debent ruptis, conuulsis, mulieribus vuluæ malo opportunis, & ad laxandos uteri strangulatus, denarij pondere cum hydromelite: tres in uini sextario drachmæ contra serpentium morsus ebibuntur. Herba magna utilitate illatis à serpente vulneribus illinitur. aduersus etiam uenena drachma ex uino pota conuenit: præsumpta ea, si uenenum hauriatur, nihil nocebit. uirinam ciet, aluum subducit. Medetur comitialibus, & insanis pota ex aqua: & iecinoris, lienisque uitij drachmæ pondere in aceto mulso. concoctionem adiuuat, si quis fabæ magnitudine secundum cœnam cum melle cocto deuorauerit: modo consimili acida ructantibus propinatur. stomachicis eam manducare, & succum deuorare proderit, si postea dilutum uinum sorbeat. Datur sanguinem excreantibus, tribus obolis cum diluti uini cyatho: ischiadicis, renum, & uesicæ doloribus ex aqua. aquæ inter cutem binis drachmis ex hydromelite, si febricitant: sin aliter ex mulso. regio morbo laborantes recreat: menses pellit drachmæ pondere cum uino pota. aluum purgant drachmæ quatuordecem in hydromelitis decem cyathis. facit cum melle ad tabem, & purulentam excreationem. Folia sicca, tritaque fictili uase reconduntur.

**B**ETONICA herba est nullis non cognita, & innumeris prædita uiribus. Vnde Itali, cum aliquem laudibus familiariter extollere uolunt, uulgari prouerbio dicunt. Tu hai piu uirtu, che non ha la Betonica, id est, Tu pluribus præditus es uirtutibus, quam Betonica. Scripsit de Betonica uiribus propriū libellum Antonius Musa clarissimus Augusti Cæsaris medicus, in quo hæc de ea memorie prodidit. Herba Betonica nascitur in pratis, & montibus multis, & opacis, circa frutices. Animas hominum, & corpora custodit: & nocturnas ambulationes à maleficijs, & peccatis. Loca quinetiam sacra, & busta à uisibus metuendis tuetur, ac defendit: & in omni deniq; res sancta est. Cæ

Betonice cōsideratio.

Vires ex Antonio Musa.



stron uocatur, & synchotrophon: siquidem frigidis reperitur in locis, radicibus tenuibus, thyrso pariter tenui, cubiti altitudinem excedente, quadrangulo. Folia profert quercus, odorata: semen in summitate thyrsi spicatur, thymbræ modo. Pollet uniuersa planta dotibus fere innumeris, quandoquidem tusa capitisq; uulneribus illita, ea mira celeritate conglutinat. Præstat id tamen efficacius, si tertio quoq; die iterum, atq; iterum imponatur. Aium præterea tam ualentioris esse facultatis, ut ossa quoq; fracta extrahat. Radicum ex aqua decoctum ad teritas foci oculorum doloribus medetur. quod item præstant contrita folia, & fronti superimposita. Succus à folijs per se trijs expressus, aut prius aqua maceratis, aurium dolores mulcet, si tamen addito rosaceo in aures egelidus instilletur. Idem drachmæ pondere haustus in aquæ calidæ cyathis quatuor, sanguinem illum per inferna trahit, cuius redundantia caligines oculis offundit. quo fit, ut etiam uisum acuant comesta folia. Eadem cum salis momento contusa, naribusq; immissa sanguinem inde fluentem sistit. Betonica decoctum ex uetere uino, aut ex aceto dentium dolores finit, si eo sepius colluatur. Herba ipsa ex tepenti aqua pota suspiriosis, & anhelosis maxime proficit. Folia melle excepta tabidos iuuuant, præsertim qui purulenta extulsiunt. Eadem tribus continuis diebus deuorata drachmarum quatuor pondere, aut ex frigida aquæ cyathis quatuor ebibita, uentriculi dolores mulcet, iecinoris uero, si ex calida hauriatur. Ex uino decocta lienis uitijs medetur. Sanat & renum uitia ex mulso bibita, duarum drachmarum pondere: ex uino autem ueteri trium drachmarum pondere, additis piperis granis septem & uiginti, ad lateris, lumborumq; dolores utilissime bibitur. In duobus aquæ calidæ cyathis sumpta, alui & intestinorum tormina remouet, si tamen à crudis non fiant succis. Foliorum quatuor drachmis in aquæ mulsæ cyathis octo epotis, comode citatur alui: sananturq; ijs ex uino sumptis coli inflammatione uexati. Betonica in eclegmate ex melle sumpta nouem diebus, tussim sedat. Potum aquæ calidæ cyathis quatuor duarum drachmarum pondere, addita plantaginis drachma, febres quotidianas expellit, quod tamen in accessionibus tantum fieri debet. Idem præstat etiam in tertianis, si cum pari pulegio assumatur. Sanat ipso quoq; ordine etiam quartanas in tribus aquæ calidæ cyathis hausta, trium drachmarum pondere, addita mellis uncia: calculi franguntur. Betonica ex tepenti aqua feliciter bibitur hydropicis. Partendi celeritatem affert, ueteris cruciatus à frigiditate conceptos mulcet, si ex calida aqua, aut mulso duarum drachmarum pondere propinetur. Contrita folia & illita, præcisos glutinant nervos, & resolutos iuuant. Eadem trium drachmarum pondere ex caprillo lacte sumpta tribus diebus, sanguinem ore relictum cohibent: & ex pari uini ueteris mensura, medetur rupis, & ab alto deuolutis. Præsumpta ebrietatem arect. Ex uino frequenter hausta, ictericos sanat: & suillo adipe admixta, uesicunculos curat. Potu ex aceto mulso unius drachmæ pondere, uiatoribus longo itinere defatigatis uires mirifice refect, Fastidia abstergit, & stomachicos recreat. Aduersatur uenenis, & serpentium, & uenenosorum rabidorumq; quorumcumq; animalium morsibus non modo intus sumpta, sed etiam extrà emplastri modo inposita. Cuniculosa, sinuosaq; sanat ulcera cum sale indita. Ex uino hausta menses ciet. Potu dolores podagricos lenit, præsertim radicem decoctum potum. idemq; præstant contrita folia inposita. Betonica uires memoriæ prodidit Galenus lib. vi. i. sinuaplicium medicamentorum, sic inquit. Cestron, aut Psychotrophon, Romanè uero Betonica, uim habet incidendi, gustus indicat. Amarior enim est, & subacris ipsa herba: id quod & particulatim edita actio ostendit. Nam consteutes in renibus calculos diuidit, & pulmonem, & thoracem, & iecur expurgat, abstergitq; menses quoq; ciet, & comitialibus prodest: tum rupta, conuulsaq; curat, & omnibus bestiarum morsibus ulceri illita auxiliatur. Postrremo acidum ructantibus, & ischiadicis bibita, auxilio est. Planta, quæ κέσπον, & Λυχότροπον Græcis, Betonica, & Vetonica Latinis dicitur: Arabibus, Chastara: Italis, Betonica: Germanis, Betonien: Hispanis, Bretonica: Gallis, Betoesne, & Betoine.

Betonice uires ex Gal.

Nomina.

## Britanica.

## Cap. II.

BRITANICA, aut Vetonica, folia habet syluestris lapathi, sed nigriora, & pilosiora, gustu adstringentia: radicem tenuem, & breuem: caulem paruum emittit. Folijs exprimitur succus, qui igni aut sole cogitur. Vim habet adstringentem, priuatim depascentibus oris, & tonsillarum ulceribus accommodatam. Valet etiam ad reliqua, quibus adstrictione est opus.

Britanice cōsideratio.

QUANQUAM tradit Ruellius Britanicam esse plantam Italiæ cognitam, atq; ibi uulgo appellari Piatamæ, no; mihi tamen hæc nomen illud incompertum est, sed nullum etiam inuenire obtigit, qui Britanicam ostenderet. Hanc autem scriptis celebrauit Plinius libro xxv. cap. l. i. hisce uerbis. In Germania trans Renum castris à Germanico Casare promotis, maritimo tractu fons erat aquæ dulcis solus, qua pota dentes intra biennium deciderent, compagesq; in genibus soluerentur. Stomacacem medici uocabant, & sceletyben ea mala. Reperta auxilio est herba, quæ uocatur Britanica, noui ueris modò & oris malis salutaris; sed contra anginas quoque, & serpentes. Folia habet oblonga, nigra: radicem etiam nigram. Flos ei, qui (ut certò proditur) colatus lectus priusquam tonitrua audiantur, & deuoratus securos in totum reddit homines. Frisij, quæ castra erant, non stris demonstrare illam. hæc Plinius. Caterum non desunt, qui Britanicam censeant eam esse stirpem, quam herbariorum uulgus ideo BISTORTAM appellat, quod radice contorta nitatur. Sed eorum planè error facile deprehenditur. quandoquidem etsi Bistorta runcis constat folijs; non tamè ea nigra sunt, neq; pilosa: breuiusq; Bistorta uerò crassa, serpentis iacentis modo contracta, & intorta, colore rubro, non (ut Plinius inquit) nigro. Sed præterea non desunt etiam, qui Tormentillam sic officinis, & uulgo uocatam Bistortæ generi adscribant, quod non facie, sed stirpe uiribus illi respondeat. Quæ quoniam hic nobis occurrit, & quam plurimis effertur laudibus, ideo hic

Bistortæ mētio.



BISTORTA.

TORMENTILLA.



hic locus exposcere uisus est, ut de ea aliquid differamus. Est itaq; **TORMENTILLA** folio pentaphyllo minore, septenis incisuris diuiso: radice breui, nodosa, compacta, rubeo colore, sapore adstringenti: caulibus tenuibus, subrubentibus: flore melino, adeo ut in pentaphylli genere sit reponenda. Sunt qui à septenis foliorum diuisuris Heptaphyllon hanc uocent. Herbarij compertum habent, hanc iisdem pollere facultatibus, quibus Bistorta praedita est. Quamobrè utræq; abortum prohibent bibita, ac uentri renibusq; ex aceto illita: urinae incōstentiam supprimunt, cum succo plantaginis potæ: sistunt menses, si in earum decocto ad umbilicum usq; confederint femine. Idem prestant (de radicibus tamen intellige) si trita, & ex melle atque spica subacta, uentri ac pubi illinantur. Sanguinem è uulneribus manantem cohibent, super asperso earum puluere. Qui item potius biliosas coarctat nominationes, si ouorum albo exceptus super fictili tegula inassetur, mox comedatur. Aqua, quæ ex his duplici organo elicatur, siue è radicibus decoctum, ueneiis omnibus remedio est. Ex quo tantum apud nonnullos Tormentilla inuoluitus, ut ex eius radicibus etiam medicamenta componant aduersus pestilentiam. Vtræque dysentericos sanant, & uulnera glutinant, praesertim quæ in intestinis, & uisceribus fuerint illata, non modò ipsis uulneribus illita, sed & in potionibus hausta. Rebella, contumaciaq; ulcera curant, & ea sistunt, quæ serpendo corpora erodunt. Sed ut iam ad Britanicae uires redeamus, eas scriptis tradidit Galeus lib. vi. simplicium medicamentorum, ubi se inquit. Britanicae herbae folia adstringentia sunt, & uulnerum glutinatoria, similia folijs poluestrum lapathorum, nisi quatenus atriora sunt, magisq; hirta. Sed & expressus ex illis succus perinde natus est adstringere, itaque crescentiam quidam reponunt, tanquam inter stomatica medicamenta efficacissimum. Videtur enim sanare iam etiam puber post Britanicam alterum per se de Betonica caput legitur. Quod quoniam pluribus indicijis in Dioscoride ascriptum esse constat, atque in hunc auctorem ex libello Antonij Musæ Augusti Caesaris medici fuisse translatum; idcirco nos illud abdicauimus, neq; alia commentatione idem dignum censuimus. Quæ planta Græcè *Βερταμίν*, Britanica Latine, pariter & Italice appellatur.

Tormentilla  
historia, & ui  
res.

Britanicae ui  
res ex Gal.

Lyfimachia.


Cap. III.

**LYSIMACHIA**, quam aliqui lytron appellant, caules emittit cubitales, altioresue, fruticosos, tenues: prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus: flore rufo, aut aureo. gignitur in aquosis, & palustribus. Foliorum succus adstringente sua ui, sanguinis reiectionem



## LYSIMACHIA.

## LYSIMACHIA ALIA.



reiectionem supprimit : dysentericis potui datur , aut infunditur : mensium abundantiam sistit , in  
 pello . sanguinis profluvio subuenit , si nares ea herba obturentur : vulnerum cruorem cohibet . Acer-  
 rimum nidorem suffita reddit : qua de causa serpentes fugat , & muscas interficit .

Lysimachia  
 confid.


Ruellij erra-  
 rum.

Ruellij alius  
 lapsus.

Lysimachia  
 vires ex Gal.

**LYSIMACHIA** à Lysimacho rege inuentore nomen accepit , ut Plinius est auctor libro xxv. cap. vii. ubi de ea ita scriptum reliquit. Inuenit Lysimachus herbam Lysimachiam, quæ ab eo nomen retinet, celebrata Erasmo strato. Folia habet salicis uiridia : florem purpureum : fruticosa est, ramulis erectis, odore graui . gignitur in aquo-  
 sis. Vis eius tanta est, ut iumentis discordantibus iugo imposita asperitatem cohibeat. hæc Plinius . Ruellius Lysimachiam eam herbam putat esse, cuius est usus apud insectores ad inficiendos uiridi colore pannos : ubi enim hos gla-  
 stotinxere, eam superinducentes uiridem colorem efficiunt . Hanc Hetrusci, qui lanificio dant operam, uulgò appella-  
 lant Cerretta, siue Braglia, Foroiulienses uerò Cosaria . Sed hac in re Ruellius, meo quidem iudicio, aperte fallitur :  
 siquidem Cerretta, quam ipse rusticis Corneolam uocari ait, caules profert, & folia lino maiora, non autem salicis :  
 florem luteum, semen folliculis genistæ effigie inclusum : nascitur in pratis, nullaq; est, quod gustu perceiverim, ade-  
 strictione prædita . Non desunt præterea alij, qui pro Lysimachia aliam plantam ostendant, quæ quadrato exit  
 caule, folijs salicis, flore in purpuram rubescente, spicato. uerum in hac quoq; nihil adstringens gustu deprehenditur.  
 Lysimachiam legitimam, ni fallor, Roma ad me Goritiam misit Vincentius Cætonus cocius meus, medicus eruditus, et  
 rei herbarie studiosus : quæ mihi planè singulis notis, quas Dioscorides Lysimachia tribuit, uidetur adstriplari. Nam  
 scitur hæc in Romano, & Senensi agro. Caterum quanuis Ruellius in mentione Lysimachia existimauerit (ut supra  
 diximus) Corneolam esse ueram Lysimachiam, in fine tamen eiusdem capituli quandam aliam herbam à rusticis sibi  
 demonstratam fuisse testatur, ad fugandæ pestilentia efficacissimam, buboni tantum adalligatam, quam etiam pro Lysimachia asseruit . Ex quo palam est, Ruellium duas pro Lysimachia plantas designasse, ea fortasse ratione adductus,  
 quod Dioscorides flore rufo, aut aurco constare Lysimachiam memorie tradiderit . Lysimachia meminit Galenus  
 lib. vii. simplicium medicamentorum, ubi de eius uiribus in hunc modum disseruit . Lysimachios superantem habet  
 qualitatem adstrictoriam : per quam & uulnera glutinat, erumpentemq; ex naribus sanguinem emplastri modo illita  
 compescit : quin & reliquas sanguinis eruptiones sistere potest cum ipsa, tum succus eius multo magis . Potè dysen-  
 terias, sanguinis reiectiones, ac muliebri profluvium sanat . Huic herbæ nomen Græcum est λυσιμαχίων, Latini-  
 cum : & Italicum Lysimachia.





Sanguinaria.



Cap. IIII.

POLYGONVM mas ramos habet teneros, & exiles, copiosos, geniculis cinctos, qui per terram, ut gramen repunt: folia rutæ, sed t̄ molliora, longioraque: semine sub omnibus folijs turgescens, unde marem appellari uolunt: flos ei candidus, aut puniceus. Vis epoti succi est, spissare, ac refrigerare. prodest cruentæ excreationi, cholera, alui fluxionibus, & urinæ stillicidio: nam urinam aperit ciet. Cum uino potus, contra serpentium morsus, auxiliatur: datur in febribus per horam ante significationes. fœminarum profluvia impositu sistit. Idem succus aurium doloribus, iisdemque purulentis instillatur. Facit eximie ad genitalium ulcera, cum uino adiecto melle decoctus. Stomachi feruori, sanguinis reiectionibus, ulceribus quæ serpunt, ignibus sacris, collectionibus, tumore, & recentibus uulneribus folia illinuntur. Sanguinaria fœmina fruticat uno caule, arundinis tenerez simili, densis geniculis, & in se tubarum modo fæctis: articulos in orbem cingunt apices, foliis piceæ similes: radicis nullus usus. nascitur in riguis. Huic quoque spissandi, refrigerandi; natura ad eadem ualens, sed inefficacior.

POLYGONON mas, quod ab Italis uulgò uocatur Correggiola, & Centinodia, in campis, edificiorum arboribus, & uis publicis frequens ubique nascitur. Fœmina uerò, quæ non adeò frequens est, & copiosa, in rigibus humentibusq; locis inuenitur. Mari polygono Proserpinacæ nomen tribuit Apuleius, quod humi cauliculis repat. Polygoni meminit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, ubi eius uires reddidit his uerbis. Polygonum, inquit, uti adstrictionem quandam obtinet, ita sanè uincit in eo aqueum frigidum, ut uidelicet secundum ordinis medicaminum refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio tertij. Proinde sanè quibus stomachus feruet aestu, foris frigidum illitum prodest: uelut etiam erysipelata, & calidas phlegmonas iuuat. Porro tale cum sit, & fluxiones repercutit, & hac ratione uidetur esse exiccatorium. Quare cum herpetum, tum ulcerum, aliorumq; bonum est remedium: efficacissimum autem inflammatione, & fluxione laborantium partium. Est & cruentorum uulnerum glutinatorium. Sed & aurium ulceribus prodest: & si uel plurimum sanguinis reiectiones, & undecunque aliunde immoderatiores impetus. Refert Dioscorides, quod & uinum prouocet exhibitum stillicidio seu stranguria affectis. non tamen affectum exactè discriminat, in quo ipsum dari expediat. Porro mas ad omnia dicta, quam fœmina, ualidioris est effectus. *Herba, quæ Græcis*

Polygoni cōsideratio.

Polygoni uires ex Gal.




Nomina.

cis πολυγονον ἄρβεν Latinis Polygonum mas uocatur : Arabibus , Basilarabagi : Italis , Poligono maschio , & Correggiola : Germanis , Vuegggrasz : Hispanis , Corriola : Gallis , Correggiola . Quæ uerò Græcè πολυγονον ἄρβεν , Latine Polygonum scemina dicitur : Italis , Poligono scemina : Germanis , Kantten kraut : Gallis , Pin aquatic .

† Impresi codices Græci tum Venetijs tum Basileæ hic male habent ἐπιμήκερα , hoc est, mitiora ; cùm legendum sit ἐπιμήκερα , id est longiora . Hoc præterea loco in ijs addendum est μαλακώτερα , hoc est, molliora . Hinc , & alteri lectioni adstipulatur Oribasius , quem secuti uidentur .

## Polygonatum .

## Cap. V.

Polygonati  
consideratio.Manardi erra-  
tum.

POLYGONATVM nascitur in montibus, frutice cubito altiore, folijs lauri, latioribus, & læuoribus, sapore mali cōtonci, aut punici, cum quadam adstrictione. Flores per singulos foliorum exortus promit, candidos, folijs numerosiores, incepta à radice supputatione. Radicem habet albam, mollem, longam, crebrò geniculatam, densam, græuolentem, digitum crassitudine æquantem. Quæ uulneribus efficaciter illinitur: quinetiam maculas in facie delet.

POLYGONATVM Hetruscis uulgò Frasinella nomenatur. Alij uerò Italiæ populi quasi à Græcis docti, id Ginocchietto uulgari sermone appellare didicerunt, ac si geniculatam radicem dicerent. Mulieres è Polygonati radicibus aquam stillantia studiosè faciunt, quæ ad faciem detergendam, poliendāq; pro fuco utuntur. Sunt præterea, qui Polygonatum sigillum sanctæ Mariæ, & qui sigillum Salomonis uocent. uerum ipse quidem harum nomenclationum causam adhuc assequi non potui. Nec desunt etiam, qui asserant, ueluti Manardus Ferrariensis, plantam Polygonatum esse, quam nomine Secacul describunt Mauritaui. Sed ij haud dubie, meo iudicio, falluntur: siquidem perspicuum est, Serapionem fidelem Dioscoridis interpretem, nullis suum Secacul representare notis, quæ à Dioscoride Polygonato tribuuntur. Huc accedit, quòd Serapio eo in loco nunquam Dioscoridem citat, ut sui moris est in alijs simplicibus medicamentis, quæ ipsi Dioscoridi refert accepta. Illud insuper, si particulatim libeat percurrere, Manardi errorem manifestè deprehendet, quòd Serapio non folia lauri suo reddidit Secacul, sed pisorum instar. Neque Polygonatum, & Secacul eisdem

uiribus pollere constat inter auctores: quandoquidem illud Græci commendant ad uulnera, & ad maculas in facie delendas. Hoc autem Arabibus laudatur ad prolifici seminis ubertatem, & ad uenerem conciliandam. Quæ in re nonnulli falsa Manardi opinione ducti, se delusos inuenerunt, qui Polygonati radices saccharo conditas ad uenerem excitandam auidiſſimè deuorant, nullo tamen rei successu. De Polygonati uiribus disseruit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, hunc in modum. Polygonatum mistam habet tum facultatem, tum quas litatem: habet enim adstrictionis pariter & acrimonie, & amaritudinis quippiam, & indicibilis cuiusdam insipientie. Quocirca nec admodum est usui, sed tantum quòd radicem eius quidam uulneribus illinunt. Sunt etiam qui ne uos maculasq; in facie illo detergant. Hæc planta ut Græcè πολυγόνατον, ita etiam Latine Polygonatum nominatur: Italicè, Frasinella, & Ginocchietto: Germanicè, Vueisz uurtz: Hispanicè, Frasinella: Gallicè, Genjculiere.

Polygonati  
uires ex Gal.

Nomina:

## Clematis .


## Cap. VI.

CLEMATIS humi serpit. læto, pinguique solo prouenit, uiticulas spargens crassitudine iunci, exiguas: folio lauri figura, & colore, & multò minora. Ea cum caulibus in uino pota alui profusa, & dysenterias sedant: subdita in pello cum lacte, & rosaceo, aut cyprino, cruciatibus vuluæ medentur: dolores dentium commanducata finit. imposita serpentium morſibus iuuamentum præstat. Fertur etiam contra aspidum ictus ex aceto pota opitulari. Gignitur in terrenis.



CLEMATIS.

CLEMATIS ALTERA.



Clematis altera.



Cap. VII.

EST & altera Clématis, quæ viticulosum emittit ramulum, rubescentem, lentum: folium gustu admodum acre, ac exulcerans. repit per arbores, ut smilax. Semen tritum pituitam, bilemque detrahit, in aqua aut hydromelite potum. Folia eius illita, lepras purgant. Cum lepidio conditur ad cibos.

CLEMATIS, quæ primo loco describitur, aliquibus Vinca peruinca dicitur, nobis uulgò appellatur Pro-  
 nena cuius fronde mulieres pueris, ac puellis uirginibus, funestas texunt corollas. In hac siquidem nullam reperi no-  
 tam, quæ Clematidi primi generis reclamare uideatur. Quamobrem eorum sententiam explodendam putauerim, qui  
 nostratem Peruinca chamædaphnem esse sibi persuadent, quam uulgò Laureolam appellamus. Nam hæc uirgas ca-  
 mittit cubitales, singulari stipite à radice exeuntes, rectas, tenues, læuesque: semen rotundum, rubens, inter folia re-  
 sidens, quæ facie laurina emulantur. Porro Clematis, quam secundo loco reddidit Dioscorides, nimirum à prima  
 quam maxime diffidet. Et sanè, ut ex quibusdam notis, quæ probè adstipulari uidentur, colligi potest, hæc nostris Vi-  
 talbis uulgò uocatis plurimum facie respondet. quandoquidem hæc viticulis exeunt rubentibus, ac lentis: folijs sunt  
 smilaci similibus, quæ si linguam consulas, & uehementer acris, & exulcerantia deprehendes. Ambiant hæc mirè in-  
 uoluenso sese sepes, repuntque per arbores non aliter, atque smilax. quin & earum semen aluum efficaciter deiecit.  
 Quo fit, ut mihi omnino persuaferim, nostratem Vitalbam esse Clematidem alteram contra eorum opinionem, qui a-  
 crem Clematidem eam plantam putant esse, quæ nascitur in sepibus, flores proferens candidos calathi effigie, quos  
 quidam rei herbariæ imperiti Ligustra falso uocant: falso inquam, quoniam Dioscoridi ligustrum arbuscula est, non  
 herba, ut superius libro primo monuimus. Fuchsius tamen medicus doctissimus nostratem Vitalbam uitem nigram  
 esse existimat. Sed errat, mea quidem sententia, ut infra suo loco dicemus. Floribus alterius Clematidis figuram non  
 representauit Dioscorides, tametsi Vitalba uocata florem album, & odoratum proferat, sitque alia huic similis, quæ  
 purpureum florem promit, facie tamen ab altero diuersum. Caterum herba, quam quidam FLAMMULAM  
 dicunt, folijs, floribus, ac semine nihil ab hac clematide differt, quemadmodum nec acerrimo gustu. Attamen neque  
 sepibus circumuoluitur, neque arbores scandit, cum recticaulis assurgat. Plures autem hæc ex se mittit caules bica-  
 bitales, subrubentes, & in his folia smilacis, quibus intolerabilis inest acrimonia, unde Flammule sibi nomen asciuit.  
 Ex hac ego sepius aquam eliciui, demisso uitreo organo in calentis aquæ balneo: quæ eadem, qua herba ipsa, poscebat  
 acrimonia. Hanc compertum est efficacissimam esse in morbis frigidissimis. Flammula (ut Platearius est auctor) re-  
 calscit, siccataque ordine tertio. Sed quod inposita carnem non secus exulceret, ac ignis, calidam ordine quarto re-


Clematidum  
consideratio.Quorundam  
error.

Fuch. error.

Flammule  
floria, & ui-  
res.



## FLAMMULA.

Clematidum  
vires ex Gal.

Nomina.

matide prima, & Prouenea: Germanis, Singrien: Hispanis, Peruinqua: Gallis, Lyseron. Secunda uero  
 τὴν ἐτῆρα Græcè: Clematis altera Latine: Lynen Germanicè uocatur.

Etius crediderim. Sunt qui Flammulam quartanarijs edendâ præbeant magno (ut ferunt) iuuamento. Alij eius oleum commentant ischiadicis, articulorum illiunq; doloribus, urinae angustijs, & renum calculis, in quibus morbis aut calidum illud inungunt, aut clysteribus infundunt. Id autem præparant hoc modo. Flammulae folia tenuissimè concisa in rosaceum imponunt, quod nitreus uas exceperit, ac inde per æstatem insolant obturato uase. Datur etiam in cibis hisce morbis affectis, trium drachmarum pondere. Sed ut iam ad Clematidum uires reuertamur, ea de his subiiciam, quæ Galenus lib. VII. simplicium medicamentorū adnotata reliquit. Clematidis folia, inquit, acrem & adurentem siue causticam facultatem obtinent, adeo ut & lepras excorient. Fuerit itaque in quarti ordinis excoalscentiū initio. Vocatur autem clematis & daphnoides, quod quidā myrsinoides, alij polygonoides appellant. Ceterum id nec exulceratorium est, nec acre, sicut quod antè dictum est, imò profluuijs, & dysenterijs cum uino potum prodest, dentiumq; dolores mansum mitiga: tum uteri quoq; doloribus in pello adnotum, usui est, tantum abest, ut perinde ueratur, ac ulceret, ceu illud superius. Sed summè nobis suspiciendus Pamphilus ille, sicuti in reliquis nugatur de ijs, quæ nunquam uisidit, literis ea mandans, sic hæc ambo in unum confudit. At Dioscorides utriusque in quarto meminit, & eius quæ simpliciter nomenclatur Clematoides, idq; in fine libri, & alterius, sed in principio. Quamobrem necesse non est, me etiam describere species ambas, sicut nec in alijs feci. hæc Galenus de utraque Clematide. Ex quibus palam est exulcerantis Clematidis caput ab aliquo curioso ex huius quarti libri calce, ubi commodè inter aliu deiecit ita medicamenta, sibi locum adiuuenerat, exemptum fuisse, & hic alteri Clematidi adiunctum ob eam, quam inuicem habent nominis conuenientiam. Prima clematis Græcis κληματὶς daphnoides 30 appellatur: Latinis, Clematis, & Vinca peruinca: Italis, Clematis 40

## Polemonia.

## Cap. VIII.

POLEMONIA, alij philetæriam, Cappadoces chiliodynamin appellant, ramis exilibus, utrinque pinnatis: folijs paulò quàm rutæ maioribus, ac longioribus, calaminthæ, aut sanguinarix, proximis: quibus in summis uelut corymbi dependent, nigro semine: radice cubitali, albicante, radiculæ simili. nascitur in montosis, & asperis. Bibitur in uino radix contra serpentes, & dysenteriam: & ex aqua aduersus urinæ difficultatem, & coxendicum cruciatus. datur ex aceto drachmæ pondere lenos. Eadem scorpionis plagæ alligatur. Tradunt eum, qui radicem gustauerit, à scorpione non feriri: cumque, si iustus sit, nihil molesti passurum. Dentium dolorem mansa mitiga.

Polemonia  
consider.

CRED O equidem me iam sæpe uidisse Polemoniam in altioribus, & asperioribus uallis Ananiæ montibus, tenui, & quadrangulâ caule, utrinque pinnato: folijs effigie nepetæ: corymbis quadantenus dependentibus, nigro semine refertis: radice prælonga, albicante. Hinc itaq; non facile adducor, ut credam, quemadmodum censet Brasauolus, eam esse Polemoniam, quam nostrum Hetruriæ uulgus appellat Lauanese: alij uerò Galegam, alij Rutiam caprar iam nominant. Quandoquidem hæc omnibus ferè notis scœnum græcum refert, in cuius ramorum summitatibus cornicula dependent, in quibus semen recluditur subrubeum, non autem corymbi. Radix illi inest breuis. Nascitur lato solo, & plerumque in scrobium margiuius, alijsq; uliginosis locis: non autem in montibus asperis, ubi nasci Polemoniam tradidit Dioscorides. Ceterum Fuchsio libro primo de compositione medicamentorum, eam Polemoniam putat esse, quam offeina Ben album uocant. Sed ab eo, pace uiri eruditissimi, planè dissentio, quod hoc ramulis non sit utrinque pinnatis: quod corymbos nullos proferat, sed siliquam, uel calycem ocimoidis modo: quod denique non solum in montibus, & asperis proueniat, sed ubique, præsertim in pratis. De Polemonio differens Galenus libro VIII. de simplicium medicamentorum facultatibus, sic inquit. Polemonium quidam philetærium, quidam (uelut Cappadoces) chiliodynamon: tenuium partium est, & desiccandi uim obtinet. Quamobrem quidam radicem eius cum uino ad ischiadicis, dysenteriam, lienemq; induratum potui exhibent. πολυμῶνιον sic Græcis, ut etiam Latinis Polemonium, & Polemonia nominatur.

Fuchsi opin.

Polemonij  
vires ex Gal.

Nomina.





Symphytum.



Cap. IX.

SYMPHYTON petræon nascitur in petris, ramis tenuibus, paruis, origano similibus: capitulis, & folijs thymi: lignosum totum, odoratum, gustu dulce, saluam ciens: longa radice, subrusta, digitali crassitudine. Decoctum in aqua multa & potum, pulmonis uitia purgat: sanguinem reijcientibus, & renum malis ex aqua datur: ad dysenteriam, rubraque foeminarum profluvia in vino decoctum: ad conuulsa uerò & rupta, ex aceto multo bibitur. Quin & commanducatum sitim sedat, faucibus asperis subuenit, vulnera recentia, enterocelasque conglutinat, & illitu cohibet. Carnes autem cum symphyto decoctæ coalescunt. Est & alterum symphyton, quod aliqui pecton vocant. Id caulem emittit bicubitalem, aut maiorem, crassum, leuemet, angulosum, ut sonchi inanem: circa quem breui interuacante spatio, folia exeunt angusta, buglosso proxima, oblonga, hirsuta: caule secundum angulos quosdam striato: folijs tenuibus, ex alarum sinu prodeuntibus: in quibus flores lutei, & circa caulem uelut verbasci semina emicant. Tam caulis, quam folia aspera lanugine horrent, tactuque pruritus concitant. Radices demittuntur foris nigrae; intus candidæ, uiscosæ. quarum est usus. Tritæ, & potæ cruentis excreationibus, ruptisque proficiunt: recentia vulnera illitæ conglutinant. carnes quoque si concoquantur, cogunt additæ. Inflammationibus præsertim sedis, cum senectutis folijs, utiliter illinuntur.

QVAVIS in nostris commentarijs, quos multo antè tempore Italicè conscriptos edidimus, ingenuè confessus essem, me non antea adinuenisse Symphytum primi generis petræon cognominatum; id tamen postea reperi mense Septembri suis floribus emicans, longè à Goritia circiter uiginti millia passuum, in latere magni montis Vipaci paulò supra arcem, ac deinde in alijs ipsius montis partibus, alijsq; Iapidie locis, præsertim eo tractu, qui uulgo Sclauis dicitur Gabernich, quin & in monte illo eiusdem tractus, quem uocant Sancti Urbani, nullis prorsus deficientibus notis, quæ illi à Dioscoride tribuuntur. Est profectò planta, præsertim ubi floruerit, usu iucundissima, ita ut maxima cum uoluptate ad se uidendum uiatorum oculos alliciat, argumento quidem quòd etiam uiribus polleat insignibus. Porro Symphytum alterum, quod secundo loco reddidit Dioscorides, nulli dubium est, quin ea sit herba, quæ hodie passim consolidam maiorem nominatur, quam etiam nonnulli herbariorum Alum falso appellant. Quippe quòd eius notæ singulæ à Dioscoridis historiæ ad unguè herere deprehendantur. Hæc frequentissima nascitur in pratis, floribus non modò luteis, ut Dioscorides inquit; sed & candidis, & purpureis, eadem sanè facie, ac forma. Ceterum hallucinantur,

Symphytorum  
consideratio.



Quorundam  
errores.

meo quidem iudicio, qui *Symphytum petraeum* putant eam esse plantam nullis non cognitam, quam officinae *CONSOLIDAM*, & *Solidaginem* minorem uocant. Siquidem eam nihil prorsus *Symphyti petraei* notis respondere, omnibus rei herbariae etiam mediocriter gnaris euidentius est, quam ut à me indicari deceat. Neq; etiam statuendum

## CONSOLIDA MINOR.

## CONSOLIDA MEDIA.



Solidaginis  
minoris, &  
mediae uires.

Saniculæ uni  
genus.

Saniculæ ali  
ud genus.

Solidago alia

certe idem *Symphytum* esse eam aliam herbam, cuius folia auersa parte purpurascunt, quæ ab herbarijs uulgò *CONSOLIDA* media nuncupatur, ab aliquibus uerò *Laurentina*, & à *Senensibus* *Morandola*. Harum modò dictarum stirpium est nusquam, quod hactenus inueuerim, meminerint *Græci*, aut *Mauritani*; eæ tamen mirum in modum prodesse existimantur disruptis, fractisq; internis, & externis corporis partibus. Idcirco utiliter dantur potandæ ab alto deuolutis, ac etiam ijs, qui interna, intestinae uulnera acceperint, nanque illa, sint uel exterius, uel interius sanguinis grumos in uentriculo, uel in alia corporis parte concretos disijcere, & dissoluere. Illita uerò folia, uel eorum succum efficax medicamentum esse prædicant ulceribus omnibus in ore manantibus, exedentibusq; ac etiam testium, pudendorumq; uirilium, & muliebrium: His omnibus facultatibus ea quoque prædita est, quam *Solidaginem* minorem uocant, ut quidam existimant. Etenim ubi uulnera glutinare, adstringere, & reprimere sit opus, minorem usurpant, quam etiam altera longè præstantiorem esse sæpenuero compertum est. Recensetur præterea *Germanis* inter *Symphyti* genera quædam ipsis uulgaris herba, quam *SANICVLAM* appellant. Exit hæc folijs pensatophylli maioribus: radice candida, tam miro naturæ ipsius artificio nodulis, ac lacinijs quibusdam elaborata, ut non parum admirentur, qui tantum naturæ opus diligenter intuentur. His utuntur in potionibus ad enterocelas, & ad interna uulnera, præsertim ad ea, quæ in thoracis cavitatem penetrauerint. Plura insuper *Saniculæ* ostendunt genera, quorum unum, quod aliquibus herbarijs *Auricula ursi* nominatur, folia fert plantaginis magnitudine, sed crassiora, ueluti fabariae uulgò uocata, lacinijs circum magno artificio factis à natura, colore in album flauescente. Id genus copiose nascitur in agro *Goritiensi* monte *Saluatino*. Hoc cæteris præferunt ad enterocelas, & thoracis uulnera, si quotidie in potu sumatur: quin & ad alia uulnera, tam intus sumptum, quam exterius illitum. His aliam denique annumerant *Solidaginem*, quam uulgo medicorum *Consolidam regalem*, & ipsi sua uulgaris lingua *Ritter* sporn uocant, quod sonat nobis *Sperone da caualiere*, & *Latinis* equitis calcar. Huic sunt caules cubiti altitudinis, folia oblonga, tenuia: flores planè purpurei, magnitudine uiolæ: e quorum basi corniculum eminet, antiqui calcaris effigie, unde illi à *Germanis* inditum est nomen. Laudantur flores ad rubentes, & inflammatos oculos triti, & aqua rosacea illiti. Herba auxiliatur ardoribus, tussi, inflammationibus, uenenis, uomitionibus, biliosis affectibus, suppressæ urinae, calculosis, ischiadicisq;: quin & aluum citat. Verum hoc *Solidaginis* genus magis, quantum equidem reor, *Cuminum sylvestre*, quod à *Dioscoride* secundo loco describitur, representat, quam aliam quamuis plantam, ut superius



## SANICVLAE GENVS.



rius in Cumini commentatione diximus. Meminit utriusq; Symphyti Galenus libro vii. de simplicium medicamentorum facultatibus, ubi ita scriptum reliquit. Symphytum petraeum ex contrarijs constat uiribus: habet enim incidendi uim quampiam, quae collectum in thorace, & pulmone pus expurgare potest. Habet etiam quandam contrahendi uim, quae eiectionibus sanguinis auxiliatur: & tertia ad eas inest humiditas quaedam non inmodicè calida, per quam gustantibus dulce apparet, & odoratu iucundum. Commanducatum sitim extinguit, & arteriae asperitates sanat. Porro secundum omnium dictarum uirium mixturem simul digerere abunde potest, simulq; corpora contrahere, & constringere. proinde enterocelis imponitur, & ad conuulsa, & rupta cum oxymelite bibitur. Porro qui ipsum in uino decoctum ad dysenteriam, & rubrum profluium exhibent, utuntur tanquam desiccante, & contrahente. Qui uero ad nephritin renūue dolorem, tanquam expurgante, & incidente. Symphytum uero alterum, puta magnum, similem dicto uim habet: non tamen gustantibus dulce est, nec odorantibus odoratum. Sed his sanè à modò scripto diuersum est. Ceterum quatenus uiscositatem quandam, & mordacitatem obtinet, scillae simile est. Utuntur eo ad omnia, ad quae iam dicto. Quod σύμφυτον πετράων Græci, pariter Latini Symphytum petraeum, & Itali Simphiro petreo uocant.

Quod uero σύμφυτον ἄλλων Græci, Symphytum alterum Latini appellant: Itali, Consolida maggiore: Germani, Vual uurtz: Hispani, Suelda maiore, & Consuelda maior: Galli, Oreylle d'asne.

† Ne quis commoueatur, quod nos hic folia adiecimus præter Ruellij, & Marcelli interpretationem. Id enim ea ratione fecimus, quoniam in Aldino codice hoc loco φύλλα, hoc est, folia habetur. Tum uero quia folia thymi pulchrè illi herbae quadrant, quam uerum Symphytum petraeum censemus.

† Illud præterea hoc in loco adnotandum est, quod ubi communis lectio habet πνεύλου σφοδρικόν, hoc est saluam prouocans, in Oribasio legitur συμπίλον, quod est adstringens.

## Holoostium.

## Cap. X.

**HOLOSTION** quadrantalibus herba est pusilla, tribus quatuorue digitis supereminens extra terram: folijs, uiticulisque coronopo, aut gramine proximis, gustu adstringentibus: radice alba, præterui usque in capillamenti speciem, longitudine quatuor digitorum. nascitur in collibus terrenis. Vitis eius adrupta in uino pota: nam & carnes coguntur decoctionibus addita.

**HOLOSTIVM** etsi à nemine, quod equidem sciam, cognoscatur in Italia; eam tamen plantam illi consimilem esse crediderim, quam libro secundo in Coronopi mentione à Goritiensibus ideo Serpentinam uulgò uocari diximus, quod mirum in modum serpentium moribus opituletur. Hæc siquidem herba est exigua, humi procumbens, quæ folijs, cauliculisque coronopi modo exit, gustu adstringentibus: radice tenui, lignosaque. Nascitur ipsa quoque in collibus, ac etiam sabulosis locis. Ex his utiq; quispiam facile posset hanc herbulam pro holoostio habere: quamuis hoc ego pro certo affirmare non ausim. Recensetur Holoostium inter symphyti genera. Sed hallucinatur haud dubie qui credunt eam herbam esse Holoostium, quam Pilosellam herbariorum uulguis appellat. nam quauquam Pilosella dicta frequens nascatur in collibus; folia tamen edit oleæ proxima, albicantibus pilis horrida, unde illi nomen. Iisdem ueniuntur pilis & caules, qui humi serpunt, ac reptant, è quibus postea prodeunt flores aureo colore. Radicibus niuntur breuibus, & tenuibus. Sed hæc eius delineatio nihil prorsus Holoostio competere uidetur. **PILOSELLAE** sunt plura sunt genera, quorum unum nascitur inter saxa Saluatino monte in comitatu Goritiensi: folijs in terram sparsis, longis, echij instar, pilis innumeris, lanugineque obductis: caule duum palmorum longitudine: flore cyani similitudine, maiore tamen. Præstat hæc planta ad uulnera glutinanda: quinetiam ad enterocelas, tam illita, quam pota. Hæc nobis Pilosellam maiorem liceat appellare, quando nondum constet, à ueteribus Græcis, aut Latinis cognita fuerit; à quibus nomen mutuari possumus. Tota Pilosella planta uehementer adstringit: quapropter huius rei non ignari pastores maxime cauent, ne ouium greges in illis pascuis immorentur, ubi huiusce plurimum gignitur. Quandoquidem dysentericis, & uteri profluijs: quin & uulnera glutinare tam scilicet exterius, quam interius illata, coeliacisq; maximo esse auxilio, & biliosis uomitionibus: cruentis item spuitis, enterocelis, & omnibus in uniuersum fracturis operi ferre, sed præcipue caluarie. Ceterum ut ad Holoostium nostra redeat oratio, ingennè fateor nullā hactenus plantam

Symphyti præteruique vires ex Galeno.

Nomina.

Holoostij consideratione.

Quorūdam error.

Pilosellæ descriptio, & uires.





Holestij uires  
ex Galeno.  
Nomina.

tam se mihi obtulisse, quæ magis Holestium referat, quàm ea, quæ Serpentina, ut diximus, à Goritiensibus uulgò uocatur. Holestium (auctor est Galenus libro VII. simplicium medicamentorum) desiccandi uim habet cum ad strictione: quamobrem ipsum ad rupta potui exhibent. Quod Græci ἑσίοβολα, Latini item Holestium, & Holestium dicunt: Itali, Holestio.

### Stoebe.

### Cap. XI.

STOEBE vulgaris est notitiæ. Cuius semen, & folia stringunt. quapropter decoctum dysentericis infunditur: auribus quoque purulentis instillatur: Illita folia oculis ab ictu cruentis prosunt, & erumpentis sanguinis impetus cohibent.

Stœbes consi-  
deratio.

STOEBEN Dioscoridis tempore omnibus uulgò cognitam fuisse, illud maximo argumento est, quòd eà nullis prorsus notis representauerit. Hinc certè uobis faceßitur negotium, quò minus scire possimus quænam sit illa inter tot plantas, cuius nomina, & facultates ignorantur. Plinius libro XXI. cap. XV. Stœben inter aculeatas herbas retulit (id quòd à Theophr. lib. VI. cap. IIII. de plantarum historia mutatus est) sic inquit. Quædã sunt herbe, quæ spinas in folio habent, et in caule, ut phleas, quòd aliqui Stœben appellauerunt. Idem lib. XXII. cap. XI. Stœbe, inquit, quam aliqui phleon uocant, decoctã in uino præcipuè auribus purulentis medetur: itè oculis ictu cruentis: hæmorrhoidi quoque, & dysentericis infusa hæc Plinius: Ex quibus equidem uerbis planè asserere ausim, Phleon, & Stœben eandem plantam esse. Hanc in Orchomeno lacu nasci Plinius lib. IIII. cap. XI. de plantarum historia. Hinc itaq; Matthæi Syluatici error manifestè deprehenditur, qui in suis pandectis Stœben herbã interpretatur, quam uulgus Scabiosam nominat. cuius, quòd sciam, nec Græci, nec Mauritanii meminerunt. Quamquam non desunt, qui Scabiosam eam esse contendunt, quæ ab Aëtio uocatur Psora: quam tamen is nomine tantum expressit, nulla adiecta descriptione, ex qua aliquid certi constitui possit. Ceterùm Scabiosam uocatam nò esse Stœben illud abundè ostendit, quòd hæc folijs constet laciniatis, subhirsutis: caulibus tenuibus, cubitali altitudine, atq; etiam maiore: in quorum cæminibus flores emicent in cæruleo albicantes: & in pratis, & campestribus proueniat. At Stœbe folia fert aculeata, & in lacubus, stagnis, paludibus, alijsq; locis aquis nãscitur. Vnde Aristophanes comicus rectè in comœdia ranas inter se loquentes adducit, quæ admodum letabantur, quòd totam consumpsissent diem inter cyperum, & phleum saltantes. Sed quoniam nusquam reperio uerba prætermissa in posterum deperdatur, hic eius facultates explicabo. Pollet in primis hæc aduersus scabiem, unde illi nomen: in quem usum non modò eius decoctum quotidie potandum præci-

### SCABIOSA.



Matthæi Syl-  
uatici error.

Scabiosæ mē-  
tio, & uires.



piunt : sed & herbæ ipsius succo, per se, aut in unguentis addito, scabiosa corpora illinunt . Prodest omnibus pectoreis, & respirationi inferuentibus organis : quippe quæ & eorum inflammationes purulentas disijciat, & omnia pectoris excrementa expurget . Anthracibus, siue carbunculis pestiferis utiliter illinitur : adeo ut illitahos lethales abscessus trium horarum spatium prorsus abolere existimetur . Sed iam ad Stæbes vires redeamus, de quibus Gale- nus lib. VII. simplicium medicamentorum, disseruit his uerbis . Stæbes fructus, & folia maximo sunt usui, adstringendi uim habentia mordacitatis expertem . Sed & desiccant euidenter in tertio ferè ordine incipiente . Quamobrem decoctum eorum dysentericis iniicitur, & auribus pure fluentibus, tum uulnera magna conglutinat . Euidetius hæc præstat cum uino atro austero : ualenter enim desiccant omnes præter naturam humiditates . Præterea folia uiridia, illinantur, uim habent erumpentis sanguinis suppressendi : denique & oculorum ex ictu suffusiones illita iuuant . Quæ planta σοῖβη Græcis, similiter Stæbe Latinis, & Stebe Italis appellatur .

Stæbes vires  
ex Galeno.

Nomina.

## Climenum.

## Cap. XII.

CLYMENVM caulem fert fabæ, quadratum : folia plantaginis : folliculis supra caulem sese inflexis, ut in polyporum cirris . Probatissimum est è montibus . E frutice toto cum radice succus exprimitur : qui ad sanguinis reiectiones, in potu efficax est : cœliacos, rubraque fœminarum profluvia, refrigerando infrænat : sanguinem naribus erumpentem suppressit . Trita folia, aut siliquæ recentibus vulneribus impositæ, ea ad cicatricem perducunt .

SI CAULES, itemq; flores herbæ, quæ Saponaria uulgo uocatur, Clymeni delineationi responderent, quemadmodum folia illi quadrare uidentur, quippe quæ plantagini prorsus referant imaginem, cum Ruellio utique sentirem, fateverq; Saponariam legitimum esse Clymenon . At certè neque caulis, quem rotundum profert, & per interualla geniculatum, neque flores illi quicquam ad stipulari deprehenduntur . Quamobrem quenam herbæ Clymenum in Italia hodie referat, hæcenus non satis compertum habeo . Hanc ( ut Plinius memoriæ prodidit libro XXV. cap. VII. ) inuenit rex Clymenus, unde & nomen herbæ . Quo in loco idem Plinius Clymeno perperam illa omnia reddidit, quæ Dioscorides periclymeno assignauit . Huius usquam, quod inuenerim, meminit Galenus, sicut nec post ipsum Paulus . Planta hæc κλύμενον Græcè, quemadmodum & Latine Clymenum dicitur .

Clymeni cō-  
sideratio.  
Ruellij, & Plinij lapsus.

Nomina.


## Periclymenum.

## Cap. XIII.

PERICLYMENON simplex fruticat, ex interuallis parua folia habens, ipsum amplectentia, subcandida, hederacea : inter folia furculi exeunt, in quibus baccæ hederæ similes : flos fabæ, candidus, aliquantum rotundus, & quasi in folium procumbens : semen durum, & quod difficilè euellatur : radice rotunda, crassa . Nascitur in aruis, ac sepibus, conuoluens se adminiculis propter assidentibus . Semen eius postquam ematuruit collectum, & in umbra siccatum, si drachmæ pondere detur in uino, quadragenis diebus, lienem absunt, lassitudinem discutit : sed urinam ciet, statim à sexto die cruentam . orthopnœæ, & singultui prodest : partum accelerat . Folia sunt eisdem uiribus prædita : quæ tricenis septenis diebus epota, sterilitatem facere produntur : perunctis ex oleo, febrium agores abigunt .

SUNT qui Periclymenum perperam Caprifolium appellant : officinæ Matrisyluam uocant : nos uero, quod propinquas uinciat plantas, uulgo appellamus Vincibosco . Cæterum id potissimum nos ad credendum impellit, uulgatam Matrisyluam esse Periclymenon, quod non solum omnes huiusce ætatis rei herbaria peritissimos in hanc sententiam deuenisse compererim, sed quod etiam ex notis, quas illi reddidit Dioscorides, ita esse cognouerim . Quandoquidem Matrisylua unico tantum caule fruticat, qui ex interuallis gemina tantum folia mittit, ipsum amplectentia, subcandida, hederaceaq; . Flos ei fabæ non dissimilis, candidus, cum adoleuerit, in folium procumbens . Semen hederaceum, prædurum, & quod difficilè euellitur, in furculis quibus-

Periclymeni  
consideratio.






Quorundam  
error.

Periclymeni  
vires ex Gal.

Nomina.


dam connexum, qui inter folia erumpunt. Constat præterea eius caulem; qui ab radice simplex assurgit, arbusculis, & fruticibus nire sese conuoluere, ubi in sepibus, & frutetis nascitur, adeo ut sepe tam pertinaciter inhaereat, ligetq; adminicula, ut in ea manifestum imprimat uestigium: unde à nobis merito Vincibosco dicitur. Porro plene mea quidem sententia, hallucinantur, qui Caprifolium, & Matrisyluam seu Periclymenum idem esse existimant: in quorum numero esse deprehenduntur Ruellius, & Fuchsius, alioqui uiri doctissimi. In hunc autem lapsum hos fortasse deduxit Matthæus Syluaticus pandectarum auctor. Siquidem is suum Caprifolium Matrisyluam nominat, cum tamen, ut subinde legitur, nil aliud Syluatico Caprifolium fuerit, quam Dioscoridi pyracantha seu lycium, non autem periclymenum, de quo seorsum sub titulo Matrisyluæ Syluaticæ ipse differuit. Quod fortè non animaduertentes ij, Caprifolium, & Periclymenum idem esse putarunt. Ceterum Matrisylua in eorum unguentorum usum uenit, quæ ad capitis uulnera parantur. Nauque hac in re efficacissimum est medicamentum. quanuis è ueteribus neminem hæcenus inuenerim, qui Periclymenon ea ui poliere, memoriæ prodiderit. Hanc etiam herbam commendauit Ioannes de Vigo clarissimus chirurgicus, ad crurum ulcera, quod eam ad hoc (ut ipse inquit) utilem esse tradiderit Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum. Veruntamen id non legitur in meo Galeno: nam loco citato Galenus de Periclymeno ita scriptum reliquit. Periclymeni tum fructus utilis est, tum folia, adeo uehementer incidentis, simul & excofacientis facultatis, ut si plusculum bibantur, urinam sanguinolentam efficiant: principio quidem urinam tantum mouent: porro fors cum oleo illita excofaciunt. Iuuant & lienosos, & difficulter spirantes. Competens potionis mensura est, drachmæ unius pondus cum uino: Porro desiccatur quoque sexum numerum ad talem potionem præfiniunt, ut Dioscorides, qui septem & triginta eos tradi refert. Hic etiam urinam cruentam reddi à sexto die memorat. Planta, quæ Grecis περικλυμενον, Latinis quoque Periclymenum dicitur: Italis, Matriselua; Germanis, Geißblatt: Hispanis, Madresylua: Gallis, Vincibosco.

### TRIBVLVS TERRESTRIS.



Tribulus.

### TRIBVLVS AQUATICVS.



Cap. XIII.

TRIBVLVS genus unum terrestre, folijs ad effigiem portulacæ, tenuioribus: viticulis† in terra stratis: spinis secundum folia rigidis, præduris. iuxta amnes, & rudera nascitur. Est & alterum genus, aquis familiare, quod in fluminibus natum comam exerit, aculeos condens: folijs latis, & pediculo longo: caule parte summa, quam ima crassiori: adsunt ei & capillamenta quædam spicæ: cca: semen durum, ab altero non abhorrens. Vterque refrigerantis, & inspissantis est nature: ideo



ideo inflammationes omnes cataplasmate adiuuat. ulcera in ore erumpentia, putredines, gingivas, tonsillasque per sanat. Succus ex his colligitur ad oculorum medicinas. Semen dum recens bibitur, calculosis iuuamentum affert. Drachma terrestris tribuli pota, illitæue, ictos à uipera recreat: contra uenena cum uino aptissimè bibitur. decoctum eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad Strymonam neminem habitant, uirenti tribulo equos saginant: & è dulci semine & esculento panem, quo vescuntur faciunt.

ET SI unum duntaxat, Tribuli terrestris genus descripserit Dioscorides; duo tamen eius genera à Theophrasto redduntur lib. VI. cap. V. de plantarum historia, his uerbis. Tribulo peculiare est, ut fructum gerat aculeatum. Eius duo sunt genera: uni folium est ciceris, alteri aculeatum. Vtrunque terrestre, & surculosum: serius germinat, cui in folijs sunt aculei, magisq; hoc apud septa uillarum erumpit. Semen præcoci sesamæ figura cernitur: alteri, hoc est ferotino, rotundum, nigrum, siliquis inclusum. Hæc duo terrestris genera Theophrasto. Tribulum, cui folia rotunda, Dioscorides assignauit, nemini me uidisse Venetijs in maris litore prope diui Nicolai sacellum. At hunc, cuius sic figuram exprompsimus, Pisis misit ad me Lucas Ghinus Forocorneliensis medicus rei herbariæ peritissimus.

Tribuli consideratio.

Ruellius Tribulum aculeatum Theophrasti eam plantam esse arbitratur, quam Hetrusci uulgò uocant Cacatreppo: ea, ea fortasse ratione ductus, quod prope torrentium, & fluminum ripas proueniat. Verum cum lateat nos foliorum effigies, quæ à Theophrasto illi tribulo non redditur, atque etiam constet hanc plantam surculos non mittere, neque aliquam ferre, in qua intus claudatur semen, cogor omnino à Ruellio dissentire. Nostrates seplasiarij huius radices melle, & saccharo condiunt, eryngij eas esse existimantes. Qua in re haud dubiè illi falluntur, ut superiori libro in eryngio ostendimus. Sed ad tribulos redeamus. Aquaticum genus in plerisq; Italiae fluminibus, & lacubus prouenit, præsertim in agro Mantuano, & Ferrariensi: neq; solum in dulcibus aquis gignitur; sed etiam in mari. Hos tribulos Venetijs in foro uendunt, quos marinos appellant, ut qui in lacunis illis uicinis enati inueniantur. Ex his porro qui peregrè proficiscuntur, uerticillos faciunt, quibus suas preces enumerant, colloq; gestant, ut maiorem præ se ferant religionem, ne dicam hypocrisim. Nonnulli fructu, qui castaneis refert similitudinem, sub cineribus calidis cocto, non secus, atque illis pro bellarijs uscuntur. Tribuli utriusq; facultates perstrinxit Galenus lib. VII. simpliciū medicamentorum, ubi sic inquit. Tribulus ex humida essentia modicè frigida, & sicca non mediocriter & frigida componitur. In terrestri tamen superat terreum frigidum, quod & adstringens ostendimus: in aquatico propter utrumq; itaq; & contra phlegmonarum generationes, & omnino contra omnes influxus conuenit. Porro terrestris fructus cum tenuium sit partium, potus lapides in renibus comminuit. Τριβυλος ὀνυχοειδής ὁ τῆς γῆς, Tribulus terrestris Latinis dicitur: Italis, Tribolo terrestre. Τριβυλος ὑδροειδής, Tribulus aquaticus Latinè uocatur: Italicè, Tribolo acquatico. Arabice simpliciter Tribulus Hasach, seu Haserk appellatur: Hispanicè, Abroyos, & abrolhos.

Ruel. error.

Tribuli vires ex Galeno.

Nomina.

## SAXIFRAGA.


### Saxifraga.

### Cap. XV.

† SAXIPHACON aliqui saxiphragon, alij empetron, Romani saxifragam vocant. frutex est surculosus, in petris, & asperis locis nascens, epithymo similis. Coctus in uino, mox potus, febricitantibus opitulatur; stranguriæ prodest, singultum sedat, calculos vesicæ frangit, & urinam ciet.

LICET omnibus huius ætatis rei herbariæ peritis satis superq; persuasum esse non ignorem, hoc Saxifragæ caput Dioscoridi illegitimum esse, quod Latina nomenclatura contra scriptoris more Græcè proferatur; tamen cum in omnibus fere Græcis exemplaribus habeatur, id mihi quoq; dissimulandum non putauit: eaq; maxime ratione, quod eam plantam habet, nouitq; Italia. cuius usus præcipuè expetitur ad renem, & uesicæ calculos comminuendos, & ad urinam remorata ciciendam. Ea in Hetruria pluribus locis è durissimis erumpit saxi, folijs capillaribus, epithymo non dissimilibus, præsertim Argentario promontorio in maritimis nostris. Inuenitur quinetiam in agro Gori-tienfi quibusdam saxi enascens, iuxta Sontij fluminis ripam, qua Salicano rure itur Canalem. Sed aliquis fortasse obijciat, hanc plantam

Saxifragæ consideratio.





plantam non esse legitimum Saxiphragon hoc loco descriptum, quod ea nullis ferè notis epithymon representet. Nec  
 que id quidem temere obijcietur: etenim non uideo ego, quomodo Saxifragon rectè epithymo assimilari possit, quod  
 illud frutex sit furculosus, hoc autem tantum absit à frutice furculoso, ut uideatur potius esse quoddam capillamen-  
 tum. Idcirco facile adductus sum, ut suspicer codicem hoc in loco deprauatum esse: aut Saxiphragon frutex erit, qui  
 folijs duntaxat epithymum æmuletur, ut illa folia satis ostendunt, quæ in hac planta, cuius imaginem hic expressimus,  
 capillorum instar tenuissima conspiciuntur. Ceterum sunt & alia herbarum genera, quæ sub Saxifragæ nomine  
 clatione uulgaribus demonstrantur, nempe Trichomanes, Adiantum, Asplenium, Filipendula, Massiliense seseli,  
 Pimpinella quæ hircum redolet, & alie plures herbe: quæ ideo Saxifragæ nomine insigniuntur, quod omnes urinæ  
 cieant, & calculos frangant pellantq;. Est porro alia quoq; planta Germanis herbarijs notissima, quam Saxifra-  
 gam albam cognominant. Prouenit hæc mense Maio saxosis, arenosis, asperis, sitientibusq; locis: folijs humi pro-  
 cumbentibus, exiguis, rotundis, in ambitu serratis, uulgaris terrestris hederæ modo; pinguioribus tamen, & mola-  
 lioribus. Caulem profert tenuem, iunci modo, hirsutum, cubitalem: in cuius cacumine flores prodeunt albi, candidi  
 violis non abssimiles, qui mense Iunio absq; semine decidunt. Radix huic exilis, granulis quibusdam coherens, cori-  
 andri magnitudine, quæ partim albicant, partim uerò rufescunt, & pro semine seruntur, amaro gustu. Folis cum  
 radice in uino decocta urinam cieant, renum, & uesicæ calculos pellunt. Idem præstant & granula, quæ radicibus  
 adherent, si tusa deuorentur. Planta, quæ Græcis σαφίραγον, & σαφίραγον, Latinis Saxifraga, & Italis  
 Saxifragia nominatur.

† Qui postremò impressi sunt Græci Dioscoridis codices non hîc, sed in fine separatim scriptum habent hoc caput  
 de Saxifraga, inter ea relatum, quæ in hoc auctore adscititia censentur. Hoc dictum sit, ut omnibus constet, illud nō  
 solum Latine, sed etiam Græcè scriptum reperiri.

## LIMONIUM.

## LIMONIUM ALIUD.



Limonium.



Cap. XVI.

LIMONIUM folia habet betæ, tenuiora, & longiora, decem, & sæpe plura: caulem tenuem, re-  
 ctum, lilio æqualem, seminibus rubris scatentem, quæ gustata adstringunt. Semen tritum, & ex  
 uino acetabuli mensura potum, dysentericis, coeliacisque prodest: rubra fœminarum profluvia si-  
 stit. Nasctur in pratis, & palustribus.

Limonij con-  
 sideratio.

PROVENIT Limonium, nullis prorsus reclamantibus notis, innumeris ferè plantis in paludibus, quæ Tri-  
 mani fontibus irrigantur, ac etiam Tergestino tractu. Hanc autem plantam seplasia falsò Beben rubrum appellant. 60  
 quam si quis diligenter expendere, cam, ni fallor, inueniet omnibus notis Limonio adstipulari: unde cogetur fateri  
 and



aut hanc uerum Limonium esse, aut saltem eius genus. Siquidem herba est (ut imagines duæ, quas hic damus, aperte demonstrant) folijs betæ, tenuioribus & longioribus, decem, sæpe pluribus: caulibus item tenuibus, in quibus semen rubrum, quod gustatum adstringit. Præterea in pratis, præsertim uliginosis, & palustribus prouenit. Addam etiam quod experimento compertum est, Beben hoc adulterinum praditum esse facultatibus & uiribus, quas Limonium reddiderunt Dioscorides & Galenus. Quare non tenere me facturum putauit, si pro uero Limonio hic eas plantas depictas exhiberem, quæ in officiniis Beben rubri nomen perperam acceperunt: quod iam mihi persuasum sit (ut in glandis unguentariæ commentatione dicitur) eas planè Beben illud ementiri, de quo à Mauritanis mentio facta est. Plinius libro XX. cap. VIII. Limonium syluestrem betam uocari tradit. Sed huic, ut in beta notauimus, refragatur Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus, ubi se nullam unquam syluestrem betam nouisse scribit: uis quis pro ea rumicem accipiat. Atq; adeo hinc colligamus licet, Limonium esse per se genus herbæ. Limonij uires memorie prodidit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Limonij semen utpote austerum, coeliaci, dysentericis, & sanguinem spuentibus cum uino exhibent. Iuuat & profluuium muliebre. Satis autem est acetabuli mensura. Quod Græci λειμώνιον, Latini item Limonium dicunt: Itali, Limonio.

Limonij uires ex Gal.

Nomina.

## Lagopus.

## Cap. XVII.

L A G O P V S herba sistit aluum in uino pota: aut in febris, ex aqua. Eadem inguini alligatur in inflammatione. Nascitur in segetibus.

S A N E tam paucis Lagopum perstrinxit Dioscorides, utpote qui ne ullam quidem eius imaginis notam designauit, ut arduum æque, atque difficile sit asserere, quinam statuendus sit in tam ingenti plantarum multitudine, quarum nulla apud homines extat cognitio. Ceterum Matthæus Syluaticus parum rectè, meo quidem iudicio, tradidit Lagopum eam esse herbam, quam herbariorum uulgus Caryophyllatam appellat: quandoquidem hæc non gignitur in segetibus, sed in montibus, & in uis iuxta septa. quod mirum in modum sepibus opacari gaudeat. De hac ueteres, quod sciam, nihil memoriæ prodiderunt. Nisi fortasse fuerit Geum à Plinio descriptum libro XXVI. cap. VII. cui radicales reddidit tenues, nigras, & bene olentes. Porro CARYOPHYLLATA planta est non uulgaris, neq; uiribus inefficax, argumento quod eius radices manifestum caryophylli spirent odorem. Ea recentiores utuntur pota ad thoracis interna uulnera. Quin & eius succum, admista ærugine, cuniculosis, contumacibusq; ulceribus utiliter iniiciunt. Eadem olfactu spiritus recreat, et frigidum roborat cerebrum. Epota prodest coeliaci, dysentericis, scæminarum profluuijs, & cruenta expuentibus. Tam intus sumpta, quam foris illita enterocelis auxilio est. Temperamentum ei excalfaciens, & exiccans, ut manifestum sunt indicio eius radices: quippe quæ gustu odorata, adstringentesq; deprehendantur. Quibus qualitatibus nō modo attenuare, discutere, & adstringere ualent; sed etiam roborare. Sed, ut ad nostrum institutum reuertamur, Germanorum uulgus Lagopus appellat herbam, quæ folia habet trifolio similia, oblonga: caulem tenuem, rotundum, hirsutumq;: semen in paniculis paruis, muscosis, lanuginosisq;: cui uon obscura adstringendi uis inest. Proinde sunt & Germanis, qui ea utantur ad detergendam sedem in dysenteria. Nascitur hæc quidem in segetibus. uerum an ea legitima sit Lagopus non ausim affirmare: nullus enim, quod sciam, Lagopi faciem representauit. Lagopi uires scriptas reliquit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, his paucissimis uerbis. Lagopus facultatis est desiccatis, adeo ut fluxus alui probe exiccet.

Lagopi confideratio.

Syluatici opinio explosa.

Caryophyllatæ uires.

Lagopi uires ex Galeno.

Nomina.

## CARYOPHYLLATA.

Huius plantæ nomen Græcum est λαρῶπος, pariter & Latinum Lagopus.

## Medium.

## Cap. XVIII.

M E D I O N in saxis, & opacis nascitur. folia habet iris: caulem tricubitalem, & in eo florem grandem, purpureum, rotundum: semine cnici, minuto: radicem dorantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quæ trita in farinam, & ex melle decocta, rubros menses scæminarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in uino potum, menstrua pellit.

Medij confideratio.

T 3 milia



M E D I O N in Media duntaxat nasci quibusdam proditum est. Quod si ita se res haberet, mirum profecto non esset, si non proueniret in Italia, ubi ipsum hæcenus fateor me non reperisse, aut uidisse. Sunt qui eius folia intubo si-



milia faciant, non autem iridi, ut communis habet lectio, quibus etiam Oribasius adstipulatur. Et certe facilis potuit esse librarium lapsus, ut qui uocabulorum affinitate decepti *ἱρίδι* pro *σάπιδι* in Dioscoride scripserint. Medij ficultates tradidit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Medij radicem contra atq; semen ipsum, temperatam esse contigit. nam illa quidem austera est, & fluxiones cohibet cum aliis, tum profluuium muliebre quod uocant. At semen tantum abest, ut tale quid efficiat, ut etiam menses cieat, utpote quod tenuium partium, & incidentis est facultatis. Vt Græci hanc plantam *μῆδιον*, ita etiam Latini Medium uocant.

Medij uires  
ex Galeno.

Nomina.

## Epimedium.

## Cap. XIX.

EPIMEDIUM, caulis est non magnus, hederæ folijs, denis atque duodenis, neque florem, neque fructum ferens: radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo. nascitur in humidis. Folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, mammas increscere non sinunt. Radix conceptum adimit. Folia trita quinis drachmis, post menstruas purgationes; quinque diebus in vino pota, præstant mulieribus, ne concipiant.

Epimedij cō-  
sideratio.


Opinio cuius-  
iusdam medi-  
ci explosa.

QUI Epimedium in Italia, quantum mihi perquirere licuit, hoc tēpore cognoscat, demonstretq; hæcenus reperti neminem. Quare putauerim alijs in regionibus hanc plantam prouenire: uel si fortasse nascatur in Italia, nondum ad nostram peruenisse cognitionem. Non tamen nos fugit medicum esse in Italia materiam medicam profitemem, cuius nunc nomen libet silentio dissimulare, qui Epimedium eam plantam esse censet, quæ à triquetra foliorum figura quibusdam recentioribus Trinitas appellatur: idq; illis constanter affirmat, & persuadet, qui maiorem forsitan ei fidem præstant, quàm ipsi Dioscoridi. Sed quod his apertè hallucinetur, et si unicuique mediocriter etiam in re herbaria uersato perspectum esse possit, pro alijs tamen iam uobis ostendendum est. Quod facillè constabit, si expendatur utriusq; plantæ descriptio: siquidem Epimedium, Dioscoridis testimonio, caulis est nō magnus: folia habet hederæ similia, dena aut duodena. Trinitas uerò nullo constat caule, sed folijs tantum modò uicenis, modò tricenis, modò quadrigenis, pluribusq; à radice cyclamini modo exeuntibus. Præterea Trinitas primo statim uere florem edit cæruleum, mox semen. Epimedium uerò, Dioscoride auctore, neq; florem, neq; semen profert. Adde quod Trinitas radice nititur nitida, odore non ingrato, & sapore adstringente. Radix uerò Epimedij tenuis describitur, graui odore, & insipido ac fatuo gustu. Ex quibus omnibus, ni fallor, harum plantarum discrimen luce clariùs ostenditur, & medicus illius opinio uana apertissimè exploditur. Caterum Plinius libro XXVII. cap. IX. Epimedij historiam ad uerbum ferme à Dioscoride mutuatus est: cui item Galenus suam acceptam referre potest libro VI. simplicium medicamentorum, ubi ita scribit. Epimedij uis est moderatè refrigeratoria cum aqua humiditate. quare nullam habet insignem qualitatem. Mammas cataplasmate impositum rectas seruare potest. Aiuunt uerò e potu concipiendi spem adimere. Planta, quæm Græci *ἐπιμήδιον*, Latinis similiter Epimedium appellatur.

Epimedij vi-  
res ex Gal.

## GLADIOLVS.

Nomina.



## Gladiolus.


## Cap. XX.

XIPHION, alij phasganon, alij machronion, Romani gladiolum uocant. nomē inde accepit, quod folium gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus, & angustius uideretur, & gladij modo mucronatum, neruosumque. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se distant: rotundo semine: radicibus geminis, una paruorum bulbosum modo, super alteram insidente, quarum inferior gracilis est, superna uberior. nascitur in aruis. Superior cum thure illita, admisto uino, spicula & aculeos corpore extrahit: panos cum lolij farina, & hydromelite discutit: qua de re huiusmodi emplastris inseri solent: menses imposita trahit. Superiori radice ex uino pota, uenerem stimulari, & inferiore sumpta sterilesce-re tradunt. Superiorem quoque utiliter infantium entereocelis, cum aqua potui dari præcipiunt.


NASCITUR Gladiolus, quem Græci xiphion uocant, frequens in Hetruria, & in comitatu Goritienfi, in pratis, & in aruis inter segetes: unde Segetalis plerisq; dicitur. huius flores nostri uulgo appellant Monacuccie. Folia ei iridis, breuiora tamen, & angustiora, lineis neruorum modo striata, mucronataq; caule attollitur cubitali, succoso: in quo flores emicant purpurei, paribus inter se spatijs distantes, qui etiam iridis flores



## SPARGANIVM.



XYRIS.



res forma effigieq; plurimum emulantur, quanquam Gladiolo minores sunt, & uno tantum colore constant. Prodit ex his semen (ut Dioscorides inquit) rotundum. Radicibus coheret geminis, rotundis, pressisq; uerticillorum modo, una super alteram insidente, albicantibus, bulbosisq;. Hæ obteguntur capillaceo inuolucro, in nigrum purpurascens, ueluti croci radices. Ceterum quæ uis tradiderit Dioscorides, quod superior radix magnitudine inferiore superat; plerumq; tamen contrarium uisitur. Plinius porro hac in historia à Dioscoride dissentit: siquidem Gladiolum, quem in aruis nasci scribit Dioscorides, in palustribus is & aquis inueniri existimat. Ex quo facile crediderim, Plinio illum uocari Gladiolum, quem passim officinæ Acorum nominant. Gladioli meminit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Xiphij radix, & maxime altera, quæ superior est, atrahentem, digerentem, & exiccantem scilicet facultatem etiam possidet. Hæc planta ξίρις Græcè uocatur: Latine, Gladiolus: Arabicè, Kafislow: Italicè, Gladiolo: Germanicè, Schuwer-tel: Gallicè, Glais, & Glaitel.

Plinius à Dioscoride dissentiens.

Gladioli uires ex Gal.

Nomina.

## Sparganium.

## Cap. XXI.

SPARGANION, aliqui xiphidion uocant. folia habet gladioli, sed arctiora, & in terram magis procumbentia: in summo caule ueluti pilulæ prominent, in quibus semen. Contra serpentis uenena, radix cum uino datur.

EXISTIMAT Ruellius eam plantam esse Sparganium, quæ in aquis locis provenit, quam herbariorum uulgus Spatulam foetidam appellat. Verum hæc, ut in proxima commentatione dicetur, nil aliud est, quam Dioscoridis xyris. Quare mihi plantæ refellenda uidetur in hoc Ruellij opinio. Siquidem herba hæc, quam ideo Spatulam foetidam cognominant, quod grænem exhalet odorem, folia quidem habet gladioli; se latiora, longioraq;, minime in terram procumbentia. Adde etiam quod illa in summo caule non pilulas, quæ semen contineant, sed folliculos, aut siliquas profert. Syluaticus Spatulam foetidam describens, eius historiam Paulo Aeginetæ perperam acceptam refert: id enim ipse in Paulo nusquam potui reperire. Sed ad Sparganium nostra redeat oratio. Vidimus hoc primum in agro Romano apud Tolpham propè aluminis fodinas ad pedem montis Ronconi, & deinde in alijs plerisq; locis, folijs gladioli, arctioribus: pilulis in caulis cæcumine platani proximis, herbaceo colore, in quibus semen continetur. Sanè quàm paucis de Sparganio disseruit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Sparganium & ipsum desiccatis est facultatis. Nomen Græcum habet plantæ hæc σπαργάνιον: Latium item, Sparganium: Arabicum, Sæfarhe ramon: Italicum, Sparganio.

Sparganij cōsideratio.

Syluatici erarum.

Sparganij facult. ex Gal.

Nomina.

## Xyris.

## Cap. XXII.

XYRIS folia habet iridis, latiora, & in cacumine mucronata: quorum medio caulis erumpit, satis crassus, cubitalis, ex quo siliquæ triangulares dependent: in quibus purpureus flos, in medio puniceus: semen in folliculis, simile fabis, rotundum, rubrum, acre: radix longa, geniculata, rufa. Contra capitis uulnera, fractaque efficax est: aculeos, & spicula omnia, citra molestiam extrahit, adiecta floris aris tertia parte, & radice centaury, ac mellis quinta: tumoribus, & collectionibus illita cum aceto medetur. Radix ex passo bibitur, ad conuul-



sa, rupta, coxendicum dolores, strangurias, & alui profluvia. Semen tribus obolis potum, urinam uehementius impellit: & cum aceto, lienem absumit.

Xiridis confi-  
deratio.

Xiridis uires  
ex Gal.

Nomina.

**X Y R I S** pluribus locis prouenit in Italia, præsertim in Hetruria, nullis deficientibus notis, quas ei tribuit Dioscorides. Eam uulgo *Spatulam foetidam* appellat, quod eius folia, si manibus atterantur, grauem & ingratum red-  
dant odorem. Sunt qui huiusce succo utantur ad scabiem, uiriliginem, & lichenas. Hanc memorie prodidit Ga-  
lenus libro VIII. simplicium medicamentorum, ubi de eius uiribus ita differit. Xyris tenuium partium, attractio-  
nis, digerendi, ac uimirum etiam desiccandi est facultatis, cum radix, tum multo etiam magis eius fructus: qui quie-  
dem & urinam ciet, & lienes induratos sanare potest. Planta Grecis *Ξυρίς*, Latinis quoque Xyris dicitur: Arabi-  
bus, Casoras: uulgo, *Spatula fetida*: Germanis, *Vuandtleusz*: Hispanis, *Lirio spadanal*: Gallis, *Glaieul Sauvage*.

### Anchusa.

### Cap. XXIII.

**A N C H V S A**, quæ alio nomine calyx, aut onoclea appellatur, folia habet lactucæ, in acumen fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, ab radice quoquo uersum humi sparsa, spinis horrida: radi-  
ci crassitudo digitalis, quæ ætate prouenit, & manus inficit sanguineo colore. læto solo nascitur. Radix adstringit: ad ambusta, & uetera ulcera, ex oleo & cera efficax est: igni sacro cum polenta me-  
detur: lepris, & uiriliginibus illinitur ex aceto: partus extrahit, uulnæ indita. Eius decoctum renum  
uitiis, lieni, & bile suffusus datur: & si febris sit, ex aqua mulsa. Sistunt aluum folia in uino pota. Ra-  
dice pigmentarij utuntur ad unguentorum spissamenta. Est & altera, quam aliqui alcibiadion, aut  
onochiles appellarunt. Hæc à priore distat, quod minora habeat folia, sed simili modo aspera: ramu-  
los exiles, in quibus flos purpureus in puniceum uergens conspicitur: radices habet rubras, prælon-  
gas, quæ mœsibus sanguineum succum fundunt. in sabulosis nascitur. Vis ei, foliisque inest, quæ con-  
tra uirus cum reliquorum serpentium, tum maximè uiperarum auxilietur, siue cibo, siue potu, siue  
alligatu: nam si quisquam mandens, in serpentis os inspuat, eum necabit. Est & alia huic haud dis-  
similis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuatur, eam in-  
terficiet. Radix acetabuli mensura cum hyssopo, & nasturtio pota, latas uentris tineas excutit.


ANCHVSA PRIMA.

ANCHVSA ALTERA.





## ANCHUSA TERTIA.



TRIA sunt Anchusæ genera, quæ hic à Dioscoride scribuntur: quauquam Plinio libro XXII. cap. XX. quartum quoque genus additur, quod pseudoanchusam ob id appellatam ait, quoniam primo aliarum generi quadantenus similis est, hirsutior tamen hæc, lanuginosior, et minus pinguis, folijs tenuioribus, et languidioribus. Sed hanc nusquam equidem uidi, cum tamen alias omnes locis compluribus in Italia inuenisse me certò sciam. Anchusæ omne genus in toto fere caule purpureos explicat flores à uulgaribus buglosso non longè dissimiles, quamuis Anchusis magis subrubentes, magisque expansi spectentur. Galenus inter Anchusas Lycopsis quoque recenset libro VI. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. Anchusæ quadruplex species est. Quarum onoclea quidem radicem habet admodum refrigerantem, et desiccantem, tum adstringentem, et subamaram, tum quæ sufficiat extenuandis, et extergendis humoribus biliosis, corporibusque condensandis. Ceterum folia habet imbecilliora quidem radice, adstringunt tamen et ipsa, et desiccant. Porro Lycopsis cognominata refrigerat, et desiccant, magisque radix eius, quam onoclea adstringit. At onochelos calidior est, et magis medicata. nam plusculum habet et gustu ipso protinus acrimonie. Hæc uero etiam calidior est parua, quæ et amarior, et magis etiam medicata est. Anchusæ non omnes easdem uires obtinent. Nam onoclea quam uocant, radicem habet simul adstringentem, et subamaram, corporibus condensandis, et modicè extenuandis idoneam: tum abstergendis quoque, et abluendis biliosis, et falsis succis. Dictum enim supra est, quod qualitas acerbæ mista amaritudini ea prestare queat. Sic sanè regio morbo, et lienosis, et renum affectibus est utilis. Sed et refrigerare idonea est. et sanè cum poleuta illita iuuat erysipelata, et abstergit non modo epota, sed et foris imposita. Proinde uutiligines, et lepras sanat cum aceto. At radice quidem hæc opera sunt, et operum facultates, quas diximus. At folia ipsius herbe radice quidem sunt imbecilliora, non tamen aliena sunt à resiccatione, et adstrictione. Itaque etiam profluuium sanant pota cum uino. Et quæ Lycopsis nominatur eodem modo erysipelatis congruit, et radicem habet quam onoclea magis adstringentem. At onochili, et alcibiadij cognominata uis magis est medicata. Nam et gustu protinus maiorem habet acrimoniam, et eos qui à uiperis morfi sunt, admodum iuuat tum illita, tum suspensa, tum esca. Reliqua uero, nempe quarta, quæ parua est, et fere nomine caret ex illis sola, alcibiadio quidem persimilis est, uerum et amarior, et magis medicaminosa: ac proinde ad latos lumbricos idonea, oxybaphi mensura cum hyssopo, et nasturtio epota. Quæ ἀρχουσα Græcè, Latine pariter et Italice Anchusa uocatur: Germanicè, Rodt ochsen zung; Hispanicè, Soagen; Gallicè, Orchanette.

Anchusarum confid.

Anchusarum uires ex Gal.

Nomina.

## Lycopsis.

## Cap. XXIII.

LYCOPSIS, quæ et anchusa à nonnullis uocatur, folijs est lactuæ, longioribus, asperioribus, latioribusque, crassis, ad radice caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis, multis, cubitalibus: flore in ijs paruo, purpurascens: radice rubra, et adstringente. nascitur in campestribus. Cum oleo radix illita, uulneribus medetur: et cum farina hordeacea, ignibus sacris: sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

Ego quoque unà cum Ruellio, et Fuchso uiris doctissimis, crederem Lycopsis eam esse plantam, quam officinæ legitimi Cynoglossi uice passim usurpant, uocantque Cynoglossam; si tamen hæc radice rubra, non autem candida niteretur: si folijs uiresceret asperis, non autem lauibis, ad terram recidentibus, non sursum spectantibus: si caule assurgeret scabro, non molli: si denique Plinius huic sententiæ non prorsus refragaretur. Porro cum Plinium uideam libro XXVII. cap. XI. de Lycopsis seorsum tractasse, et similiter de hoc Cynoglossi genere priuatim scripsisse lib. XXV. cap. VIII. cogor omnino, ut ingenuè dicam, ab illis dissentire. Potius enim adducor, ut credam, Lycopsis herbam esse anchusæ non ab similem: quam ideo non temerè Galenus, et Aetius eum secutus in anchusarum genere reuulerunt, ut superiori commentatione diximus. Lycopsis, quam ego legitimam esse existimo, uidi sæpius in campestribus, sitientibus, aridisque locis enatam, anchusæ adeo similem, ut uix ab ea discerni possit. Ceterum quoniam in huius libri quarti progressu, Deo iuuante, nobis de Cynoglossa differendum est suo proprio capite; idcirco disputatio quodnam uerum sit Cynoglossum, et nunquid illud esse possit, quo officinæ uulgò utuntur, in illud tempus commodius differatur: Lycopsis, ut Plinius est auctor loco citato, folijs est longioribus, quam lactuca, crassioribusque: caule longo, hirsutis adnatis, multis, cubitalibus: flore paruo, purpureo. nascitur in campestribus. Hæc herba Græcis ἀρχουσα, Latine item Lycopsis, et Italis Licopside appellatur.

Lycopsis confid.

Opinio reprobata.

Nomina.

Echium.



## Echium.

## Cap. XXV.



Echii confi-  
deratio.

ECHION folia habet prælonga, aspera, aliquantum tenuia, anchusæ proxima, minora tamen, subrubra, & pingua, spinulis tenuibus horridula: cauliculos exiles, numerosos: minutaq; utrouel latere folia, expansa, pin-nataque, nigra, in summo caule proportionem minora: flores secundum folia purpureos, in quibus semina capi-ti uiperarum similia insunt: radix nigricat, digito tenuior: Quæ non percussis modò à serpentibus ex uino prodest: sed eos qui antea biberint, feriri non patitur. Folia, & semen idem præstant munus. Lumborum dolores sedat: in uino, aut, aut sorbitione sumpta, lac extrahit.

ECHION à uiperis omnino nomen adinuenit (uipera enim Græcis ὄφις dicitur) uel quòd semen proferat capitibus uiperinis simile, uel quòd uiperarum moribus præstantissimum sit medica-mētum. Hanc herbam ab Alcibio quodam fuisse inuentam aucto-<sup>20</sup> est Nicander in theriacis, & proinde à posteris cognomine Alci-biacum appellatum. Is enim dum secus aream dormiret, à uipera inextremo inguine ictus est. excitatusq; à somno ex hac herba succum commanducando palato & dentibus expresit, haustiq; in corpus. Mansæ uerò herbæ reliquum uulneri superimposuit contra dolorem, quo medicamētum liber euasit. Vnde postea Echion nomen inditum est Alcibion ab eo, qui primus ostēderat, quantum uiribus polleret contra uiperarum ictus. Numenius scriptor grauißimus duo Echij genera inueniri scriptū reliquit. quorum alterum Ocimoides appellari inquit, quòd folia ocimo similia ha-beat, alterum uerò, quod folio est spinis horrido, priuatim Echi-<sup>30</sup>on nominari. Id sanè quod in theriacis ante ipsum scripserat Nican-der. Quibus uidetur etiam Dioscorides adstipulari, quippe qui

Echio statim subiecerit Ocimastrum. His quoque subscribit Plinius libro XXV. cap. IX. sic inquit, sic inquit, duum est generum, altera folijs coronata, pulegio similis: altera lanugine distinguitur spinosa, cui & capitula ui-peræ similia sunt. Sed tamen ignorasse Plinium Alcibion, & Echium idem esse, satis manifestum est: siquidem is lib. XXVII. cap. V. Alcibios, inquit, qualis esset herba, apud auctores non comperi. Ex cuius uerbis illud facile colligi potest, quòd scilicet Plinius non satis accuratè Nicandrum legerit. Ceterum non parua admiratio eum capiet, qui in Echio diligenter opus prudentissimæ naturæ perspexerit, nempe quòd ipsum genuit uiperi-nis capitulis, ut ita apud homines, quorum potissimum curam gerit, testatum relinqueret, eam herbam præstantis-simam esse ad huiusmodi lethaliū ferarum morsus. Echium, quòd ubique ferè proueniat, aridis præsertim locis, sepe in Hetruria, in agro Tridentino, & Goritienfi uidimus, semenq; eius uiperinum decerpimus ad antidota. Her-ba est anchusæ, quæ secundo loco Dioscoridi red dicitur, non absimilis. Vocant quidam sylvestre Buglossum. Flores profert hæc in rubrum purpurascens inter minuta folia à medio caule ad summum: è quibus semen prodit nigrum, hirsutis, spinosisq; inuolucris inclusum, uiperarum capitibus simile. Non inuenio Galenum ullam Echij mentionem fecisse in libris, quos de simplicium medicamentorum facultatibus edidit. Paulus tamen eius uires describit Diosco-<sup>40</sup>ridem secutus libro VII. ubi hæc refert. Echion, alij doriada, nonnulli alcibiadion uocant. Spinosa herba est, quæ non modò à serpente commorsis cum uino pota auxiliatur; sed præsumentes quoque ex ictu nihil molestum pati sinit. Quod Græci ὄφιον, Latini quoq; Echium dicunt: Itali, Echio: Germani, Vuild ochsen zung: Hispani, Yerua della biuora: Galli, Buglossa sauuage.

Echii uires  
ex Gal.

Nomina.

## Ocimastrum.

## Cap. XXVI.

OCIMOIDES, Latini ocimastrum uocant, folia fert ocimi, & ramos dodrantes, hirsutos: siliquas hyoscyamo similes, semine, ut gith, nigro prægnantes. Vim habet semen in uino potum, qua uiperarum, cæterarumque serpentium moribus medeatur. Datur ischiadicis, cum melle, uino, myrrha, & pipere. Radice nititur tenui, & superuacua.

Ocimastrum cõ  
sideratio.


OCIMASTRUM, siue sylvestre Ocimum id ipsum nobis appellare liceat, passim copiosè nascitur in Italia, præsertim inter segetes prope septa, & in agrorum marginibus, folijs sanè satiuo similibus: ramulis hirsutis, qua-dratis, dodranted, uel cubitali longitudine: in quorum summo flores emicant, candidi, quæ doque uerò purpurei, quod silentio præterijt Dioscorides, è quibus uascula erumpunt hyoscyami figura, capaci uentre, artibus sancius, per



## OCIMASTRVM.



ERINVS.



per ambitum denticulatis, uiperinis capitibus similia: in quibus semen includitur nigrum, melanthio ferme simile. Hec uiscula ita à natura facta pueri nostrates colligunt, ubi exaruerint: si quidem, cum semen exciderit, ijs intus sufflantes acutissima edunt sibi: sic enim natura pueris interdum ludendi praebeuit instrumenta. Meminit huius Nicander in theriacis inter echij genera, sic inquit. Echij genera duo: alterum spinoso folio, anchuse simile: alterum minoribus folijs, & purpureo flore, aspero lagnuginosoq; caule, capitulis uiperarum figura. Ocimastri uires tradidit Galenus in calce libri VIII. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Ocimoides quidam Philitarium cognominant. Radix superuacanea est. At semen tenuium partium, & desiccantis citra mordacitatem facultatis est. Herba Graecis *ὀκυμαστρίς*, Latinis Ocimoides, & Ocimastrium appellatur: Italis, Basilico saluatico: Hispanis, Albahagua montesina: Gallicis, Basilic sauuaige.

Ocimastri uires ex Gal.

Nomina.

## Erinus.

## Cap. XXVII.

ERINVS nascitur apud fontes, & fluuios, folijs ocimi, sed minoribus, parte superna diuisis, surculis quinis, senisue, dodrantalibus: flore candido: semine nigro, & acerbo: folia, & caules lacteo succo turgent. Semen drachmis duabus in quatuor mellis cyathis oblitum, oculorum fluxiones cohibet. Succus cum sulphure, & nitro instillatus, aurium dolores sedat.

ET SI nonnulli Dioscoridis codices habeantur, in quibus non legitur Erinum aliquo lacteo succo turgere; non desunt tamen & in quibus planè oppositum scriptum inueniatur, quorum lectio mihi magis probanda uidetur non infirmis, ut arbitror, nixus rationibus. Quippe quòd herbam hanc apud aquarum riuulos uiderim, legerimq; lacteo succo manantem, adeò ut eo manus inficeret. Quòd præterea Plinio reddatur Erinus herba lactaria, seu lacte madens libro XXI. cap. VII. ubi de ea hæc memorie prodidit. Herba, inquit, quam Graeci Erinon uocant, reddenda est in hoc loco propter gentilitatem. Palmo alta est, cauliculis quinis, ferè ocimi similitudine, flos candidus: semen nigrum, paruum, quod tritum cum melle Attico oculorum epiphoris medetur. Manat lacte multo, & dulci. Herba perquam utilis aurium dolori, nitri exiguo addito. Folia resistunt uenenis. hæc Plinius. Caterum Erini facultatis aduersus uenena non meminit Dioscorides, quanquam Nicandro, ut quæ ad id præster, addatur in antidotis. Galenus hanc herbam non Erinum, sed Echinos appellat: neq; id sanè mirum est, quandoquidem in uetustis aliquot Dioscoridis codicibus Echinos legitur: De qua differens ipse Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Echini herbe semen acerbum est: ac proinde repellentis, & exiccatorie facultatis: utuntur eo ad oculorum, & narium fluxiones. Quæ herba Græcè *ἐρίνος*, Latine Erinum, & Ocimum aquaticum nominatur: Italicè, Erino: Hispanicè, Basfigo de lhagoa.

Erini consideratio.

Erini uires ex Galeno.

Nomina.

## Gramen.

## Cap. XXVIII.

GRAMEN geniculatis serpit ramulis, à quibus radices spargit dulces, articulis præcinctas: folia acuminata, dura, & utarundinis parua lata, eaquæ iumentis, & boues pascunt. Trita radix illitu uulnera conglutinat. Decoctum eius in potu, torminibus medetur, & urinae difficultatibus: calculosa etiam uesicæ excrementa comminuit.



## GRAMEN.



Graminis historia ex Pli.

comminuit. Est & arundinaceum gramen, priore multò maius, quod iumenta necare traditur, præsertim in Babylone: idque iuxta vias nascitur. Quod in Parnaso monte gignitur, densius fruticat: foliis hederaceis: flore odorato, candido: semine paruo, non inuiti: radicibus quinis, aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, & admodum dulcibus. Succus si in uino cum melle pari, & myrrhæ dimidio decoquatur, adicianturque piperis, & thuris tertiæ portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum: id in ærea pyxide reconditur. Decoctum radicis idem, quod herba, præstat. Semen uehementius urinam impellit: aluum, uomitionesque sistit. Natum in Cilicia gramen, quod incolæ Cinnam appellant, boues inflammat, si eo uirenti sæpe pascantur.

PLURA, ac uaria sunt Graminis genera: siquidem præter hæc tria, quorum meminit Dioscorides, alia quoque tria aculeati generis Plinio redduntur lib. XXIII. cap. XIX. naturalis historiae his uerbis. Gramen ipsum, inquit, est inter herbas uulgatissimum: geniculatis serpit internodijs, crebroque ab ijs, ex cacumine nouas radices spargit. Folia eius in reliquo orbe in exilitatem fastigiantur. In Parnaso tantum hederacea specie densius, quam usquam fruticante: flore odorato, candidoq; Iumentis herba non alia gratior, siue uiridis, siue in feno seccata. Tunc datur aspersa aqua. Succum quoque eius in Parnaso excipi tradunt propter ubertatem: dulcis enim hic est. In uicem eius in reliqua parte terrarum succedit decoctum ad uulnera conglutinanda. Quod, & ipsa herba tusa præstat illita, tueturque, & ab inflammationibus placat. Decocto adijcitur uinum, ac mel ab aliquibus, & thuris, & piperis, myrrhæque tertiæ portiones. Rursusque co-

quitur in æreo uase, ad dentium dolores, & epiphoras. Radix decocta in uino torminibus medetur, & urine difficultatibus, ulceribus uescicæ: calculos frangit. Semen uehementius urinam impellit: aluum, uomitionesque sistit. priuatim autem draconum moribus auxiliatur. Quod è graminum genere septem internodia habet, efficacissime capiti contra dolores adalligatur. Sunt qui & aculeatum gramen uocant trium generum, cum in cacumine aculei sunt plurimum quini, dactylon uocant. Hos conuolutos naribus inserunt, extrahuntque sanguinis cieiendi gratia. Altero, quod est aizoon simile, ad paronychia, & pterygia unguium, & cum caro unguibus excreuerit, utuntur cum axungia. Tertium genus, quod tenuius est, nascitur in parietibus, & tegulis. Huic caustica uis est. Sistit ulcera, quæ seculi punct. Gramen capiti circumdatum, sanguinis è naribus fluxiones sistit. hæc Plinius de graminibus. Ceterum hinc omnibus planè perspicuum esse puto, Gramen, quod in Babylone, quodque in Parnaso monte prouenit, non gigni in Italia, quanquam illud primum, ac uulgatum genus uobis passim frequentissimum nascatur. Neque illud quoque omnibus non cognitum & uulgare est, cui in cacumine caulium quini sunt aculei, ueluti digiti, quos pueri naribus inserunt extrahuntque, ut sanguinem eliciant. Hanc herbam Hetrusci ab effectu uulgo appellant Sanguinella, alij Capriola. De qua latius in Coronopo diximus, ubi Leoniceni & Ruellij sententiam reprobauimus, qui hanc & Coronopum Dioscoridis unam & eandem herbam esse asseruerunt. Verum de Coronopo separatim differuit Plinius libro XXI. cap. XIX. sue naturalis historiae. Sed iam Graminibus suas reddamus uires ex Galeno, qui de ijs agens libro VI. simplicium medicamentorum, ita scriptum reliquit. Graminis radix mediocriter frigida est, & sicca, mordacitate quandam exigua, & partium tenuitatem obtinens. At herba ipsa primo quidem excessu refrigerat, in humiditate uerò, & siccitate moderata. Porro semen alibi quidem inbecillum est, in Parnaso uerò desiccatorium, & tenuium partium, & subacerbum, Gramen esculentam habet radicem, ubi mollis fuerit, dulcem quidem instar aquæ, sed acre quiddam exiguum, & subacerbum obtinentem. Hæc herba planè aquea gustantibus est. Ex quibus apertum est, radicem modice esse tum frigidam, tum siccam: ac proinde cruenta ulcera glutinare. At ipsa herba illita, non uehementer refrigerat, in medio constituta humiditatis, & siccitatis. Porro mordacitas & tenuitas, quæ radici inest, exigua est quidem, sed interdum tamen lapides frangere assolet, si quis eam decoctam ebibat. At semen alterius quidem inbecillum est, eius uerò quæ in Parnaso nascitur, urinam ciet: & fluxus uentris, & stomachi ressecat: uis enim eius est exiccatoria, tenuium partium, & subacerba. Herba, quæ Græcis ἀγρὸς, Latinis Gramen appellatur: Arabibus, Vagem, Negen, seu Negien, Thel, Kel, & Negil: Italis, Gramigna: Germanis: Graß: Hispanis, Grama, & Gramenba: Gallis, Dent de chien.

Graminis uires ex Gal.

Nomina.



SIDERITIS PRIMA.




SIDERITIS ALTERA.



SIDERITIS TERTIA.

Sideritis. Cap. XXIX.

SIDERITIN aliqui heracleam uocant. folia habet marrubij, sed longiora, satis ad frondem quercus, aut salix accedentia, minora tamen, & aspera: caules edit quadratos, dodrantem altos, aut etiam maiores, non iniucundi gustus, aliquantumque substringentis: in quibus per interstitia orbiculatæ uertebrae, ut in marrubio spectantur: & semen in eis nigrum. nascitur in petrosis. Illita folia, suapte ui uulnera sine inflammationis periculo iungunt.



Sideritis altera. Cap. XXX.

ALTERA Sideritis binum cubitorum ramulis, exhibus: folio filicis, numerofo, utrinque per oras diuifo, pediculo longo: prodeuntibus è summo alarum sinu furculis, longis, tenuibus: capitulo in cacumine orbiculato, aspero: in quo semen continetur, quàm betæ rotundius aliquantò, ac durius. Huius uis foliorumque ad uulnera, præcipua est.

Sideritis tertia.

Cap. XXXI.

SIDERITIN aliam esse tradunt, quam Crateuas heracleam uocat, in macerijis, & uineis nascentem: folijs, ab una radice multis, coriandro similibus, circa coliculos dodrantales, læues, teneros, subcandidos, atque subrubicundos: flore puniceo, paruo, gustanti amaro, & lento. Huius ea uis est, ut quantuis recenti uulneri inposita, sanguinem supprimat.



Sideritidis cō  
sideratio.

TRIA Sideritidis genera præter Achilleā, de qua sequenti capite dicitur, hic à Dioscoride representari con-  
stat. Quorum etsi illam, quæ secundo loco describitur, antea in nostris Italicis commentarijs me nunquam inuenisse,  
ac uidisse tradiderim; eā tamen hoc anno Pisis ad me misit Lucas Ghinus Forocorneliensis uir rei medicæ peritissimus.  
Reliqua uerò genera landiu nouisse nos putamus, quòd ea omnibus notis suam quæq; historiam sequi deprehenderi-  
mus. Caterum nemini mirū sit, quòd tam uaria effigie primæ Sideritidis folia reddiderit Dioscorides, ut qui ea modo  
marrubij, modo quercus, modo saluæ figura depingat. Quippe eorum longitudo saluæ accepta referatur oportet:  
scabrities deinde superficiētē, ac subalbidus color tum eidem saluæ, tum marrubio: quercui postremo, quæ in ama-  
bitu est diuisura. Sed ea mihi quidem nihil prorsus primæ Sideriti adstipulari uidetur, cuius imaginem expressit Fua-  
chsius in suo insigni de stirpium historia commentario. Siquidem perspicuum est, quòd eius pictura non solum non præ-  
se fert folia, & caules, quæ Sideritim ueram referant; sed etiam flores eius spicati in cacumine, non in caulibus inter  
folia marrubij modo, planè ueræ Sideriti refragari conspiciuntur. Ruellius porro Sideritim hanc nonnullis herbam  
Iudaicam appellari tradit. Verum si is Iudaicam illam intelligit, cuius libro II. meminit Auicenna, nullo modo erro-  
ris culpa uacare potest. Nam Auicennæ Iudaica herba nil sanè aliud designat, quàm eruum. Sunt tamen aliqui, qui  
herbam Iudaicam, itemq; Paganam eam nominant, quæ herbarijs, & medicis quibusdam VIRGA aurea dicitur,  
caule rubente, bicubitali, læui: folijs oliuæ latioribus, circum minutissimè ferratis, in superficie leuibus: floribus in  
summitate caulium spicatis, colore aureo, non tamen anthemidis modo rotundis, radiatisq; ut eam minus rectè depin-  
git Fuchsius. flores ij, ubi maturuerint, in pappos abeunt. Hanc chirurgici in Germania, alijs quibusdam additis, ipsi  
feliciter potandam exhibent, quibus intrinsecus inflicta sint uulnera, & ad fistulas. Quinetiam eam in unguentis, quæ  
ad id conspiciuntur, utiliter addunt: nam, ut ipsi referunt, glutinandis uulneribus tam intrò in corpus sumpta, quàm  
exteriori illita, efficax admodum est medicamentum. Extulit hanc Arnaldus inter recentiores clarissimus auctor, ad  
urinam ciendam, comminuendosq; calculos. quod tamen apud alium scriptorem hactenus mihi non licuit reperire.  
Pota hæc alui fluxiones cohibet: id quod etiam præstat clysteribus infusa. Eius decocto sanantur oris ulcera, firmanturq;  
dentes. Idem gargarizatu anginam, & columellæ inflammationem arcet, & faucium morbis medetur. Verum  
tamen hæc, ut ad institutum nostrum redeamus, non erit Sideritis primi generis, ut fortasse Ruellius existimauit.  
Sideritis uires memorie prodidit Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. Sideri-  
ritis habet quidem etiam abstergendi quandam facultatem: sed plurima eius pars humida est, & mediocriter frigida:  
da: paucula uerò in est adstrictio. quare phlegmonem sedat, & glutinat. Hæc Galenus, de una tantum Sideritide  
scribens. Sed cuius ex tribus meminerit, non facile est decernere. Idem sitis sic Græcè, ut etiam Sideritis Latine  
uocatur: Arabicè, Sidrichis: Italicè, Siderito.

Fuchsi erra-  
um.

Ruellij opin.  
reprobata.

Virgæ aureæ  
facies, & ui-  
res.

Sideritidis ui-  
res ex Gal.

Nomina.

## Achillea.

## Cap. XXXII.

ACHILLEA, quibusdam Achillea sideritis, do-  
drantales, aut maiores gerit scapos, fusorum effigie mi-  
nutulis folijs circumdatos, ex obliquo crebras incisuras  
habentibus, coriandri similitudine, subfuluo colore,  
lentis, odore multo, non insuauis, uerum medicato: um-  
bella in cacumine rotunda: floribus candidis. Tri-  
reis, & aurum æmulantibus. provenit læto solo. Tri-  
ta coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum  
periculo tuetur: erumpentem sanguinem inhibet, &  
cruenta uulnæ profluuiā in uellere. Decocto quoque  
insident sceminæ fluxione uulnæ laborantes. ad dysen-  
teriam bibitur.

QUI uulgaris usus Millefolium Achilleam esse existimant  
haud dubie, mea quidē sententia, decipiuntur. Siquidē id (ut infra  
latius dicemus de Stratiote millefolio differentes) folia non pro-  
fert crebris ex obliquo sectionibus, coriandri similitudine, sed au-  
cularum pennas æmulantia. Porro tametsi constet, Millefolium  
umbella coronari modo alba, modo purpurea, modo aurea; non  
tamen propterea colligendum est Millefolium, & Achilleam  
nam eandem herbam esse. Quandoquidem non putauerim  
ego fuisse Dioscoridis institutum (ut Ruellio placet) quòd hæc  
Achillea umbellam ferat candidam, illa uerò purpuream, alia  
denique auream: sed quòd omnibus in uniuersum Achilleæ  
plantis eadem insit umbella, quæ tantum prædictis coloribus di-  
stincta spectetur. Nascitur in Hetruria planta, nascitur & in  
Goritiensi agro, scapis ferè cubitalibus: folijs coriandri pro-  
ximis, odore quadantenus graui, non tamen ingrato: umbella  
in cacumine rotunda, amplaq; colore in purpura candican-  
te,

Achilleæ cō-  
sideratio.

Multorum.  
eror.






Scrapionis  
lapsus.

Achilleæ vi-  
res ex Gal.

**Nomina.**

Cap. XXXIII.



Cap. XXXIII.

IDA E V S. Rubus appellatus est, quoniam copiosus in Ida provenit. Est autem longè tenerior priore, ac minoribus spinis horrens: quanquam & sine spinis inueniatur. Insuper eadem præstat, quæ supradictus. Cæterum flos cum melle oculorum collectionibus illinitur, ignem sacrum extinguit, stomachicisque ex aqua bibendus datur.

Ruborum cō  
sideratio.

Opinio quo-  
rundā repro-  
bata.



Rubi uires ex  
Galeo.

existimem. Rubi uires descripsit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Rubi folia, germina, flos, fructus, & radix qualitate adstringente participant, eaq; non obscura. Sed hoc inter se differunt, quod folia, mollia potissimum, & recens uata, plurimum in se habent substantiæ aqueæ, parum uero adstrictionis: eadem ratione & germina. Itaque si mandantur, aphthas, & alia oris ulcera sanant. quin & alia uulnera glutinare possunt. Est enim eorum temperies & ex terra frigida essentia, & aquea tepida. At fructus, si quidem maturus fuerit, non parum habet succi calidi temperati, & qui dulcis est, uti monstrauimus. Proinde ob hoc, & propter modicam adstrictionem, esui non insuauis est. At immaturus à frigida substantia terrea uincitur: & propterea acerbus est, & ualde exiccatorius. Et sanè uterq; siccatus reconditur, ualidius quàm recens desiccans. Sed & flos eandem suauitatem immaturo facultatem possidet: utraq; ad dysenterias, & uentris profluium, tum robur deperditum, & sanguinis expuitiones, idonea remedia. Porro radix præter adstrictionem non paucam in se habet substantiam tenuem, propter quam & lapides renum comminuit. Hæc planta Græcis *ῥάτος* appellatur: Latinis, Rubus: Mauritanis, Buleich, seu Haleich: Italis, Rouo: Germanis, Carza: Gallis, Ronce. Eius uero fructus Græcè *βάρβα* et *βαρύτινα* dicuntur: Latine, Mora rubi: Italice, More di rouo: Germanicè, Bramaer, & Kratzber.

Nomina.

## Helxine.

## Cap. XXXV.

HELXINE cognomento cissampelos, folijs est hederæ: minoribus: ramulis exilibus, quibus, complexitur quodcunque contigerit adminiculum. Nascitur in sepibus, uinetis, & segetibus. Foliorum succus potu deijcit aluum.

Helxines cō  
sideratio.



NULLI certe dubium esse putauerim, quin Helxine cognomento cissampelos, quasi hederaceam uitem dixeris, species sit Conuoluuli. Sed quæ ea sit, non facile explicari potest. Verum cum eam reddiderit Dioscorides folijs hederæ similibus, minoribus: ramulis exiguis, quibus quodcunque contigerit complexatur: nascaturq; in sepibus, uinetis, & segetibus, satis mihi declarasse uideatur, eam esse Helxinem, quæ quidem in aruis tum segetes ipsas, tum linum, tum legumina omnia irretit, ac uincit, & in uinetis, palis, & uitis circumuoluitur. Hanc Hetruscum uulgus suo idiomate nominat Vilucchio minore, Tridentinis uero Minutola dicitur. Quanquam non desunt, qui putent Helxinem eam esse herbam, quæ crebra reuolutione septa, & uicinos implicat frutices, flores illos candidos æstate ostentans, quos nostri uulgo appellant Campanelle. Hanc Plinius conuoluulum uocat lib. XXI. cap. V. ubi eam his uerbis depingit. Est, inquit, flos non dissimilis lilio in herba, quam Conuoluulum uocant, nascent per frutera, nullo odore, nec crocis intus, candorem tantum referens, ac ueluti in naturæ rudimentum lilia facere condiscens. Sunt qui aberrantes hanc herbam, & eius florem ligustrum uocent: in qua appellatione deceptus fuit Seruius grammaticus. Hunc errorem exploratus libro primo, ubi ueri ligustri mentionem fecimus. Helxinem per paucis perstrinxit Galenus lib. VI. simpl. medic. sic inquit. Helxine, quæ & cissampelos nuncupatur, digerendi facultatem habet. Ea Græco nomine *ῥάτινα* uocatur: Latino item Helxine cissampelos: Arabico, Acsin: Italice, Vilucchio minore: Germanico, Mittel uind: Hispanico, Campanela yerua.

Quorundam  
opinio.

Helxines ui-  
res ex Gal.  
Nomina.

## Elatine.

## Cap. XXXVI.


ELATINE folia habet helxinæ similia, minora, rotundiora, pilosa: tenuibus, & dodrantalibus ramulis, quinque, senisue, à radice foliosis, gustu adstringentibus. nascitur in segetibus, & cultis. Eadem lorum fluxionibus, & inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta tritis, & impositis. Eadem cocta sorbitionis usu dysenteriam sistit.

Elatines con-  
sideratio.

SUNT qui uelint Elatinen eam esse plantam, quam quidam Nummulariam uocant. Alij uero non hanc uolunt, sed eam quam nos uulgò uocamus Solbastrella, officine Pimpinellam, & alij quidam Sanguisorbam dicunt. Sed mihi quidem, ut dicam quod sentio, neutrorum placet opinio. Siquidem Nummularia in primis non fert folia pilosa, neq; in segetibus, neq; in cultis prouenit, sed plerumq; in scrobium marginibus, præsertim uligine madentibus. Deinde



## NVMVLARIA.



EUPATORIVM.



Deinde Pimpinella uocata ramulis exit longè pluribus, quàm scenis in terram procumbentibus, & folia habet undique in ambitu lacinata, asterisci modo. Ruellius porro Elatinem in Gallia uulgo Rapistrum uocari ait, eoq; ut rapo sylvestri in uernis acetarijs rura uti. Verùm si rapistrum id Hetruscis est, quod Gallis, certò scio, Elatinem esse non posse. Quæ tamen quòd nascatur in Italia, nec negare quidem, nec affirmare ausim, cùm hætenus planta non uiderim, quæ illam legitime referat. Galenus de Elatine quàm breuissimè disseruit libro vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Elatine modicè tum refrigerat, tum adstringit. Huic nomen Græcum est ἐλάτινι: Latinum similiter Elatine: Arabicum, Athin.

Elatines vires  
ex Galeno.

Nomina.

## Eupatorium. Cap. XXXVII.

EUPATORIVM fruticosa herba est, unicum effrens caulem, lignosum, nigricantem, rectum, tenuem, hirsutum, cubitalem, interdum ampliorem: folijs per interualla quinquefolijs, aut cānabis potius similibus, quinquepartitò, aut amplius diuisis, nigricantibus & ipsis, per ambitum serratis: semen medio caule erumpit, pilosum, deorsum spectans, quod siccatum uestibus inhæret. Contrita huius folia: & cum suillo adipe imposita, ulceribus, quæ ægrè cicatricem trahunt, medentur. Herba, aut semen in uino potum, dysenteria, iecinoris uitijs, & serpentium ictibus liberat. Nec desunt, qui aberrantes argemonem hanc appellarint, cùm tamen longè alia sit, uti exposuimus.

SVMVNT nonnulli, imò uniuersa frē seplasariorum turba, legitimi Eupatorii uice quandā aspectu insignem plātam, quæ plerunq; in uliginosis locis, & in scrobium marginibus enascitur, tricubitali longitudine, folijs cannabinis æmulis, maioribus tamen, subalbidis, hirsutis, & amaro gustu: caule subrubeo, rotundo, firmo, hirsutoq; multis alarum cauis, multisq; adnatis refferto. Huic flores in umbellam exeunt, non tamen simul coherentem, sed diuulsam, origani uulgaris modo, colore in purpuram albicante, qui maturescentes in pappos abeunt. Radix, quæ in plures diuarcatur partes, illi inutilis est, nulliusq; in medicina usus. Et quanquam ij sciunt, legitimum Græcorum Eupatorium eam esse plantam, quæ uulgò Agrimonia uocatur, eorum fortè imitatione, qui Dioscoridis ætate eandem perperam argemonem appellabant; cùm tamen animis imbibitos iandiu errores reijcere nequeant, uel potius nolint, difficile quidem adduci patiuntur, ut uulgarem Agrimoniam Græcorum medicamentis, quæ Eupatorium excipiunt, admisceant. Non tamen hæc propterea dicimus, quòd omni ex parte illius Eupatorii usum damnenius, cùm id proprium sit Auicennæ Eupatorium; sed ut unumquodq; suo redatur auctori. Palam etenim est, ut ex foliorum amaritudine, & odoris præstantia, quo huius Eupatorii tota redolet planta, percipi potest, id & obstructions aperire, & crassos, lentosq; humores mirifice incidere posse. Veruntamen nunquam eò deueniam, ut asseuerem, hoc apud Græcos legitimi Eupatorii nomē sibi assignisse: tantum illud abest, ut etiam à nullo, quantum equidem inuenierim, ueterem sub alio nomine posteritatis memoriæ proditum sit, præterquàm ab Auicenna. Ruellius tamen nescio qua ratione ductus in suis de natura stirpium commentarijs non siue magno errore sibi persuasit, uulgare hoc Eupatorium dubio procul hydropiper esse à Dioscoride libro secundo descriptum. Sed nos ibi in nostra hydropiperis commentatione Ruellij errorem latius explosimus, quàm ut quicquam supersit addendum.

Eupatorii cō  
sideratio.

Eupatorium  
Auicennæ.



Eupatorium  
Mesuis.

EUPATORIUM AVICENNAE.



Cordi & Fuch-  
sij error.

Eupatorii ui-  
res ex Gal.

POTENTILLA.

Potentillæ de  
scriptio & ui-  
res.



Nomina.

Ceterum Mesues quoque habet suum peculiare Eupatorium, quod, ut ex eius descriptione apparet, à prædictis longè diuersum est. Id namque plures ab radice emittit caules: folijs minoribus, centaurio similibus, per ambitum laciniatis: floribus aureis, in umbellam coherentibus, helichrysi modo. Hoc nostratibus Senensibus unguo uocatur herba Ginja. Huius comam mulieres per noctem uino albo macerant, ac subinde dilutum uermes aditandum præbent dimidij cyathi mensura ad necandos uermes admirabili successu. Nascitur hæc in campestribus: atque, ut me fert opinio, ea est planta, quæ Dioscoridi ageratum dicitur: quippe quæ omnibus notis illi respondeat. Hinc itaque addiscant Mauritanorum sequaces, cum tres habeantur plantæ nomine Eupatorii, in medicamentis à Mesue relictis suum interponere Eupatorium: in Auicennæ remedijs suo item uti: & in Græcorum compositiones Agrimoniam uulgo uocatam addere. Sed animaduertant uelim, ne in hoc Valerij Cordi dispensatorium sequantur, quod perperam, meo quidem iudicio, scribat in confectioe pilularum aggregantium, quin & in syrupo de Eupatorio, pro ipsius Mesuis Eupatorio admiscendam esse: Gratiosam. Siquidem hæc præterquam quod alium magno incommodo deiciat, nullis etiam planè notis, ac reliquis facultatibus illud repræsentareprehenditur. Nempe sua deiectoria uis, quæ magno cum impetu uentrem soluit, iecur imbecillum, atque infirmum reddit. Cordum secutus uidetur Fuchsius, uir aliqui doctissimus, in libro de compositione medicamentorum, quem postremò auctum edidit, ubi in antidoto è lacha magna illuc Eupatorium usurpandum esse tradit, quod à Mesue describitur. Quia in re Græcis ageratum, Italics uerò gratia Dei nominatur. Quia in re illud de ijs duobus uiris (pace eorum dixerim) dici posset, quod est in communi prouerbio: Cæcus cæcum ducit, & ambo in fossam ueam cadunt. Eupatorii meminit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, ubi ita scribit. Eupatorium herba tenui par-tim, incidendi extergendiq; facultatem citra manifestam caliditatem obtinet. quocirca obstruções iecoris expurgat. Inest ei & adstrictio modica, propter quam robur uisceri addit. hæc tenus Galenus. Est & herba Agrimonie non dissimilis, quæ nonnullis POTENTILLA uocatur, tametsi hisfortioribus sit folijs, supernè uirentibus, infernè uerò albicantibus. Cauis liculos profert, qui humi repunt, pilosella uocata modo: aureis floribus ornatur, singulari pediculo pendentibus, raiunculo hor-tens amulis. Radice nititur exterius purpurascete, interius uerò candicante. Nascitur in uliginosis locis, & propter semitas. Vniuersa hæc planta adstrictoria, & exiccatoria facultate pollet. Idcirco mulierum profusua, & dysenterias cohibet, & uuln-nera recentia agglutinat. Prodest item & sanguinem commotos den-tes, stringitq; gingiuas, & dentium dolorem mulcet, si eius des-coctos sepius colluatur. Herba, quæ Græcis Eupatorium, & Hepatorium ap-ellatur: Arabibus, Casat, Cifit, seu Gafet: Italics, Agrimonia: Germanis, Odermenig: Hispanis, Agramonia: Gallis, Aigremoine.

Quinque folium. Cap. XXXVIII.

QUINQUEFOLIUM ramulos fert festucarum similitudine, tenues, dodrantes, in quibus semen, in am- lia mentha: quina singulis pediculis, rarò plura, in am- bitu serrata: florem ex candido pallefcentem, auri amu- lum. Nascitur in riguis, & avarijs ductibus. Subru- brata



## QVINQVEFOLIM.



DIAPENSIA.



bram habet radicem, oblongam, ueratro nigro crassio-  
rem. plurimis pollet remedijs. Ius radicis decoctæ ad  
tercias, si in ore contineatur, dentium dolores sedat: pu-  
trida oris ulcera, collutione sistit, arteriæ scabritias, gar-  
garizatu læuigat: contra alui profluvia, & dysenterias  
auxiliatur: item articulorum, coxendicumque cruciati-  
bus potum. Cocta in aceto, & illita, serpentina ulcera co-  
hibet: strumas, tumores, duritias, abscessus, & collectio-  
nes discutit: ignes sacros, reduuias, condylomata, pso-  
rasque sanat. Teneræ radicis succus, contra iecinoris,  
pulmonumque uitia prodest: item aduersum uenena.  
Cum hydromelite autem, uel diluto uino, & piperis exi-  
guo, bibuntur folia contra febrium circuitus: in quar-  
tana quidem, quaternum ramulorum folia: in tertiana  
uerò, ternum: in quotidiana, unius. Ea quoque folia tri-  
ce nis pota diebus, comitialibus profunt. Foliorum suc-  
cus tribus cyathis aliquot dies potus, celerrimè regio  
morbo medetur. Illita cum melle & sale, tam uulneri-  
bus, quàm fistulis remedio sunt: enterocelicis auxilium  
præstant. Quinquefolium sanguinis profluvia & potu,  
& illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, & incanta-  
menta inciditur.

TAMETSI unius tantum Pentaphylli, siue Quinquefolij  
meminerit Dioscorides; nos tamen quatuor eius genera uidimus  
in Italia. Quorum utiq; primū à Dioscoridis historia nihil pror-  
sus dissentit. Secundum à primo differt, quòd folijs sit albicanti-  
bus, hirsutis, & flore candido. Tertium folio erumpit paruo,  
subalbido, per terram repit. Vltimum uerò folia fert uitiginea, in  
partes quinque diuisa, quod aliqui DIAPENSIAM, alij Sa-  
niculam appellant. Huic in cauliculorum summitatibus, & adna-  
torū fastigijs, capitula prodeunt subalbida, facie fragris similia.  
Primum prouenit in riguis, & scrobium marginibus, cauliculis  
tenuibus, floribus aureis, è quibus subinde semen oritur. Pedicu-  
los è se mittit, & in singulis quina folia oblonga, mentha ferè æ-  
mula, in ambitu tamen magis serrata. Radix illi subrubens appa-  
ret, quod quanuis negat Brasauolus; id tamen alijs, ut mihi eam  
effodienti, uerum esse deprehendetur. Hæc in plures radículas  
diuiditur, elleboro nigro crassiores. Hinc autem mirari subit  
Manardū Ferrariensem uirum alioqui huius nostræ ætatis inge-  
nio, & doctrina insignem: quippe qui tam facile sibi persuaserit,  
id legitimum esse Quinquefolium, quod Greci heptaphyllon, of-  
ficinæ uerò herbariorumq; uulgus Tormentillam dicunt. Siqui-  
dem hæc septem ex uno tantum cauliculo profert folia: Penta-  
phyllum uerò quinque, unde & illi nomen. Hoc radices elleboro  
similes habet, crassiores tamen, oblongas: illa uerò admodū bre-  
ues, strumosas, simulq; in unū compactas globum. Gignitur hæc  
plerunq; in incultis, siticulosissq; locis, in altis præsertim mon-  
tibus: illud uerò in campestribus, & prope aquæ ductus, & in  
riguis. Quæ sanè omnia apertè declarant, hæc in re Manardum  
cæcutiuisse. Ceterum nūquam admiratus sum Plinium in hoc  
(in quo tamen à Leoniceno, ut arbitror, immeritò reprehenditur)  
quòd libro xxv. cap. ix. tradiderit reperiri Quinquefolium,  
quod fraga gignendo commendatur. Quandoquidem (ut paulò  
ante diximus) Quinquefolij genus est, quod à quibusdam Diapen-  
sia nominatur, in cuius summis cauliculis capitula spectantur fra-  
gis non dissimilia. Verum etsi asserat Brasauolus in Veronensi a-  
gro nasci Fragariā, cui quinque unicuique pediculo insunt folia,  
& quæ fraga gignit, in cibis gratissima, putetq; de hac intellexis-  
se Plinium, quòd à Verona, ut ipse inquit, fuerit oriundus; non  
tamen ita planè eū à calumnia uindicari posse putamus, cum Sue-

Quinqueso-  
lij genera.

Manardi erra-  
tum.



## FRAGARIA.


Quinquefolij  
uires ex Ga-  
leno.



Fragariæ, &  
fragorum ui-  
res.

## EUPHRAGIA.

Euphragiæ de  
lineatio, & ui-  
res.



Nomina.

tonius Tranquillus suo de illustriun uirorum catalogo, Plinium Nouocomensem fecerit, non Veronensem. Quarta hac Quinquefolij specie Germaniæ chirurgici maxime utuntur ad intrinseca uulnera, enterocelas, & fistulas eius puluerem, uel decoctum potui exhibentes. Quinetiam ad morbos omnes, ubi adstringenti, solidantiq; medicamine sit opus. Est tamen non ignorandum, hoc non esse Saniculam illam, quæ etiamnum quinis exoritur folijs, prædicte alba, miro nature artificio laciniata, de qua superius in synonymi phytici mentione differuimus: sed aliud longe differens. Quinquefolij uires retulit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, his uerbis. Pentaphylli radix, inquit, desiccatur uehementer, minimum uero acris est. Quare in multo est usu, uelut alia quoque omnia, quæ cum sint tenuium partium, citra morsum desiccant. Est enim hæc radix desiccatoria ex tertio quodammodo ordine, minimum habens euidentis caliditatis. hæc Galenus. Ceterum quoniam Pentaphyllum Fraga nobis in mentem redegit, cum ea sint tam cibis, quam medicamentis idonea, ideo & res, & locus mihi expetere uidetur, ut hic tum plantæ, tum fructus eius uires perstringamus. FRAGARIA itaque planta est nemini satis non cognita, adeo ut hoc nomine supernacuum putem, eius faciem representare. Refrigerat ordine primo, siccaturq; secundo. Folia, & radix uulnera, & ulcera sanant: muliebres fluxus, & dysenterias cohibent, urinam cient, & leni conferunt. Herbe, & radicum decoctum potum, auxiliatur iecinoris inflammationibus, mundatq; renes, & uesticam. Idem ore contentum, collatio, nisq; modo agitatum, gingiuas roborat, dentes commotos firmat, & destillationes sistit. At Fraga præter id quod gustui astate in cibis arrideant, biliosis, æstuantibusq; uentriculis prosunt, siticulosisq; sitim sedant. Vinum, quod ex ijs elicitur, ulcusculis, quæ in facie à caliditate proueniunt, mirifice medetur: itemq; uariorum, & oculorum nubes, calidasq; defluxiones impostum tollit. Neque etiam hic silentio dissimulanda uidetur Euphrasia, quam nobis Fraga nunc ob uocabulorum uiciniam ad memoriam reuocarunt, cum & ipsa miris ad oculorum morbos uiribus prædita sit: ceterum à ueteribus Græcis nusquam, quod legerim, descripta reperiatur. Est itaque EUPHRAGIA tenuis planta, quæ ad palmi altitudinem assurgit: folijs minutis, crispis, per ambitum serratis, gustu adstringentibus, paululumq; amaris: caule exit tenui, rubentiq; flore inter purpuram & aurum albicante, quem emittit abeunte æstate. nascitur in pratis. Præstat hæc quoque modo sumatur tam in cibis, quam in medicamentis recens, uel exiccata ad omnia impedimenta, quæ oculorum claritati offendant, præsertim cum in cibis diutius sumitur. Fit ex ea uinum uindemiarum tempore, uis & musto macerata, de quo Arnaldus in hunc modum differuit. Euphrasiæ uinum, inquit, fit ad oculos ponendo herbam in musto donec fiat uinum. Cuius usu oculi senum reuiuuescunt, & aufert impedimentum corum, & defectum uisus in quocunque cuiusuis ætatis homine, præsertim ubi pinguedo, & pituita redundant. Et est qui peruenit nihil uidens per longum tempus, & infra annum, eius usu restitutus est ad uisum. Ipsa enim herba calida est & sicca: & habet hoc à proprietate, quod quando pulvis eius comeditur cum ouorum uitellis, idem mirifice præstat, uel quando pulvis idem recipitur cum uino. Et superiunt testes fide digni, qui fecerunt in se ipsis, & qui non poterant legere sine ocularijs, & legerunt postmodum absque ipsis, etiam literam subtiliorem. Et usus uini Euphrasiati non habet par in proficiendo uisui. Si autem uinum esset nimis forte, temperetur cum aqua fœniculi: & si opus est, addatur zucarum necessarium. Hæc Arnaldus in libro de uinis. Herba πεντάφυλλον Græcè, Quinquefolium Latine dicitur: Italicè, Cinquefoglio: Germanicè, Vveis sunf, & Fingerkraut: Hispanicè, Cinco en rana: Gallicè, Quinte fueille.



## Phoenix.


## Cap. XXXIX.

PHOENIX folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora: spicam lolio similem: calamos digitorum senum, radici aduolutos: septenas octonasve spicas. In aruis, tectisque recenter illitis nascitur. Harum virium compos, ut in uino austero pota alui profluuium, & emanantem vulua sanguinem sistat, vrinae impetus infragnet. Sunt qui adalligatam in puniceo vellere, & suspensam, sanguinem suprimere prodant.

PHOENIX Hetruscis sylvestre Lolium dicitur, quod spicas proferat lolio similes. Nascitur frequens in uicis secus uias, in agrorum marginibus, & in templorum plateis: quae quidem nulla prorsus repugnante nota Dioscoridis descriptioni adstipulari deprehenditur. Plinius libro XXII. cap. XXV. Phoeniceam herbam ita à Graecis appellatam, à Latinis lolium murium uocari ait, quod fortasse mures derodent spicas illius, quae in aedificiorum tectis prouenit. Haec frequentissima uisitur Goritiae in cœmeterio diui Francisci, & Venetijs in litore maris prope sacellum diui Nicolai. In summa eius uber ubique prouentus: Huic herbæ nomen Graecum φοινίξ, Latinum similiter Phœnix, Lolium murinum, & Hordeum murinum: Italicum, Gioglio saluatico.

Phœnicis cōsideratio.

Nomina.



RADIX RHODIA.

## Idæa radix.

## Cap. XL.


IDÆAE radici folia sunt ea, quæ rusco: adhærent ijs ueluti exigui capreoli, è quibus flos. Radix spissandi naturam habet, his conueniens, quibus adstrictione opus est. Pota, citam aluum, mensesque, & omnem abundantiam sanguinis sistit.

IDÆA radix hodie, quod sciam, ad nos non conuenit: nec quenuquam hactenus reperi, qui scribat, ubi hæc planta proueniat: etsi cognomine natale eius solum facile indicari uideatur, quod scilicet in Ida monte, qui ad Troadem spectat, nascatur: uel in eo eiusdem nominis, qui in Creta habetur, ut etiam Idæo rubo euenire superius dictum est. Huius uires tradidit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic inueniens. Idæa radix gustu admodum acerba est: ac si opere periculum facias, eandem uim præferet, nimirum sanguinis profluvia, alui fluxus, dysenterias, profluuium mulierum, & quæcumque eius sunt geueris tum pota, tum foris imposita curans. Ea ut Graecis Ἰδαία ῥίζα, ita etiam Latinis Idæa radix uocatur: Italis, Radice Idea.

Idææ radicis consider.

Idææ radicis uires ex Gal.

Nomina.



## Rodia Radix.

## Cap. XLI.

GIGNITVR Rhodia radix in Macedonia, costo similis, leuior, inæquabilis: quæ contrita rosas redolet. Vtilissima capitis doloribus, si madefacta fronti, & temporibus cum rosacei momento imponatur.

RHODIA radix planta est non omnibus planè uulgaris, & cognita in Italia: etsi ea facile in Apennino, & Gargano montibus nasci, & inueniri possit. Quæ in nostro horto Goritiae uiret, iandiu cam Gratio Styriae oppido Petrus Salicetus medicus clarissimus, & in simplicium facultate non imperitus, ad nos primum uidendam misit: quam tamen postea frequentissimam reperi in monte magno supra Vipacum, qui circiter uiginti millia passuum à Goritia distat. Ceterum quoniam paucis sanè notis cam perstrinxit Dioscorides, ut ab omnibus facilius & cognosci, & reperiiri possit,

Rhodiæ radicis consid.




possit, nos non temere facturos duximus, si eius historiam hic diffusius tradamus. Radix itaq; Rhodia caules emittit rotundos, quadantenus concavos, cubitales, à quibus circunquaq; folia prodeunt longiuscula, in acutum desinentia, portulacæ, aut sedì instar pinguis, minutimq; per ambitum serrata. In caulium cacumine umbellam profert, viridem tithymali cyparissij modo, sed quæ, ubi defloruerit, rubescat. Radix ei inæqualis, strumosa, crassa, qualis costo, leui cortice quæ recens est, exterius splendescens, et intus subalbida: quæ uerò sicca est, leuis percipitur, intus rubens, et foris squamosa. Mansa hæc recens, aut trita odore mirum in modum rosas refert: unde merito ei Rhodie nomen. Præterea omnium radicum uinacissima est: quippe quæ è terra effossa, nisi locis perquam siccis reponatur, post multos menses rursus plantata statim repullulat. Nasctur in altissimis montium rupibus saxosis, præruptisq; locis, ubi uix tantum terræ circum habet, ut illi inherere possit. Valet hæc ad capitis dolores à quacunq; causa prouenientes, si recens confracta, et rosacea aqua perfusa, ubi calidus sit affectus, aut cum amaraci aqua, si frigidus sit morbus, ut fronti temporibusq; illinatur. Cerebrum roborat odoris iucunditate, conuenitq; (ut diximus) omni capitis dolori, ut pote quæ temperatis sit qualitatibus prædita; id quod indicat rosaceus eius odor, quo mirifice redolet. Rhodia radice meminit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic de eius uiribus scribens. Rhodia radix ea uidelicet, quæ in Macedonia nascitur, tenuium partium, et discutientis est facultatis. In calefaciendo uerò secundi resecta sus censenda est, aut certè tertij incipientis. Hæc planta Græcè ροδία ῥιζα, Latine Rhodia radix nominatur: Italicè, Radice Rhodia: Germanicè, Rosen uurtz.

Rhodie radi  
cis uires ex  
Galeno.


Nomina.

### EQUISETVM PRIMVM.



Equisetum.

### EQUISETVM ALTERVM.



Cap. XLII.

EQUISETVM in riguis, & scrobibus nascitur. cauliculi prodeunt inanes, geniculati, in se farcti, rubescentes, leniter scabri: & iuncea circa eos folia, crebra, exilia. In sublime attollitur, vicinos arborum caudices scandens, obuolutumq; dependet, comis multis, nigris, ut equorum cauda: radix lignosa, dura. Vis herbæ spissare: quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit: prodest dysentericis in vino potus: urinam cit. Sanguinolenta vulnera glutinantur, tritis folijs, & illitis. Radix cum sua herba tussim, orthopnceam, ruptaque; adiuuat. Folijs in aqua potis, dissectiones vesicæ, & intestinorum, enterocelæque in vnum coalescere, cogique feruntur. Alterum Equisetum caulis est rectus, cubito maior, inanis: comis per intervalla breuioribus, candidioribus, & mollioribus. Id cum aceto tritum, vulneribus remedio est, eademque fungitur facultate.



**EQUISETVM** officinis, & herbarijs plerisque uerbum Græcum reddentibus Cauda equina nominatur. Vtrumque eius genus uulgaris est notitiæ. Alterum, quod affero sit caule, à quibusdam uulgo Asperella uocatur. Expetitur hæc mulieribus ad stagnæ uasa detergenda; illustrandaq; necnon etiam materiarijs fabris, ijs præsertim, qui torno opera sua faciunt: siquidem huius herbe scabritia illæ suis uss. splendorem, nitoremq; conciliant: isti uero similiter suorum operum ruiditatem expoliunt. Primum autem Caudam equi omnes frere appellant, quod facie equorum caudas reserat, unde & Græcis Hippuris dicta est. Profert hæc, cum primum è terra erumpit, quoddam tenerum germen, oblongum, iuglandium uulo non absimile. Hoc rura nostra uulgo uocant Paltrusalo, in cibumq; assumunt, ieiunij quadragesimalis tempore. Etenim illud prius elixant, mox farina circumspergunt, & oleo in sartagiæ ne frigunt, manduntq; piscium uice. Ex quo cibo alijs quandoq; eorum adeo constingitur, & constipatur, ut in coacte utantur ad dysenteriam. Quippe quod aqua calida nocte maceratum eo modo decoquunt, quo dictum est, & in cibum magno successu exhibent. Vtrumque Equisetum eleganti admodum pictura expressit Fuchsius clarissimus in suis imaginibus stirpium historia commentarijs. Sed nescio qua postea ratione ductus, is in paruo libro, in quem plantarum imagines duntaxat depingi, & imprimi curauit, primi generis Equisetum pro Polygono fœmina aperto lapsu reddiderit. Equiseti meminit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, ubi eius uires retulit his uerbis. Hippuris, inquit, adstringentem cum amaritudine facultatem possidet, ac proinde ualenter, simulq; citra mordacitatem exicantem. Itaq; uulnera maxima cataplasmate imposita conglutinat, etiam si præfectos esse ueruos contingat: præterea uocatas enterocelas glutinat. Ceterum ad sanguinis reiectionem, ad profluium muliebrem, potissimum rubrum, ad dysenterias, & ad alios uentris fluxus generosum est remedium herba ipsa aut ex aqua, aut ex uino pota. Sunt qui de ea scriptum reliquerunt, quod nonnunquam etiam uesicæ, ac tenuium intestinorum uulnera succus ipsius sanauerit. Prodest etiam profluuio sanguinis ex naribus, tum fluxui obnoxij in uentre affectibus ex austerorum uinorum quopiam potus: ac si febre teneantur, ex aqua. Quæ planta Græcis ἵππουρπις, Latinis Equisetum appellatur: Arabibus, Dhenben alchail, Dhenb alchi, siue Daneb alchail: Italis, Coda di cavallo: Germanis, Rosz schumantz: Hispanis, Coda de mula, & Rabo de mula: Gallis, Queue de cheual, & Prela.

Equiseti consideratio.


Fuch. lapsus.

Equiseti uires ex Galeno.

Nomina.

## Coccum Infectorium.

## Cap. XLIII.



**COCCVM**, quo infectores utuntur, frutex est surculosus, paruus, cui grana ceu lentes adhærent, quæ electa congeruntur. Optimum gignitur in Galatia, & Armenia: deinde Asia, & Cilicia: ultimum ex omnibus Hispanicum. Vis huic spissandi: uulneribus, neruisque præcis, conuenienter ex aceto tritū illinitur. Nascitur quoque in Cilicia è quercubus, cochlearum exilium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, & coccum uocitant.

**ET SI** Coccum seu granum tinctorium seplastarijs, & infectoribus notissimum sit, quod & medicamentis admiscetur, & eo plurimum sericea, tum lanea stamina infici soleant; nescio tamen an eius arbuscula in Italia proueniat. Nos autem eam, cuius picturam damus, uidimus ex Byzantio allatam. Porro Coccum tinctorium communis usus constat rotunda, inanq; bacca, quæ nullam profecto lentis faciem refert, ut Dioscorides asserit. Ut hinc planè conijcere liceat, Coccum hoc diuersorum esse generum, nostrumq; facile illud esse, quod Plinius in Attica, & Aphrica prouenire tradit, Scolecioni ideo uocatum, quoniam ex eius medulla tenues exoriuntur uermiculi: argumento quod hoc inane intus deprehendatur. Huius puluere non infeliciter utuntur mulieres Italice ad prohibendum abortum, ipsum grauidis in ouo sorbili propinantes pauco addito thure, uel mastiche. Ceterum contendunt

Cocci infectorij consolid.

Monachorum opi. explosa.

Monachi illi reuerenti, qui in Mesuem commentarios ediderunt, aliud esse Coccum, aliud uero Chermesinum uulgo uocatum, quo serica stamina roseo colore inficiuntur. Etenim asserunt ij legitimum chermesinum è quibusdam fieri granulis, quæ ut plurimum uulgari Pimpinelle radicibus adhærentia reperiuntur, uocariq; hæc proprie Mauritanis Chermes: & hinc isti deinde colligunt, minime credendum esse, quod Græcorum coccum uulgo grana tinctorij nuncupatum, sit Mauritanorum chermes: quandoquidem magna omnino inter colorem coccineum, & chermesinum intercedat differentia. Sed hos patres hallucinari (pace tamen eorum dixerim) ex eo equidem euidentissimum fieri aether, quod hætenus neminem Arabicæ sectæ inuenerim, qui eorum adspiculetur sententiæ. Siquidem Serapio per chermes nil aliud intelligit, quàm coccum tinctorium à Græcis appellatum, cum de Chermes agens ea sanè omnia in eius historia referat, quæ Dioscorides suo coccò tribuit. Quapropter scirem libentissimè qua ratione, quæ auctoritate nixi ij reuerendi monachi in hanc uanam, et erroneam deuenerint opinionem. Verum non ob id negauerim ego nostrum



Grani tinctorij uires ex Galeno.

Nomina.

nostrum Chermesinum à cocco minimè differre, quòd certò sciam, aliud esse coccum, aliud chermesinum, unde et infectores differentie causa coccum Grauum nuncupant; Chermesinum uerò, quod è pimpinellæ radicibus descriptur, sed negauerim quidem Mauritanorum chermes nostri usus chermesinum esse, quòd nil aliud Chermes esse patem, quam Coccum, cuius hic menùit Dioscorides. Chermesinum nouum iam pridem conuebitur in Italiam ex Hispanijs ab occidentali India importatum, quòd cum copiosissimum afferatur, Chermesina stammina nunc uilesceere cœperunt. Cocci seu Grani tinctorij uires descripsit Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, his uerbis. Grauum tinctorium adstringentem, simulq; amarum facultatem possidet. Vtraque sine morfu desiccatur. proinde ad ingentia uulnera congruit, præsertimq; neruorum. Sed tunc ipsum quidam cum aceto terunt, alij cum oxymelite. Quæ uires præcipue in Græcè, Latine pariter Coccus baphica, & Grauum tinctorium nominatur: Arabicè, Charmen, Kermes seu Chermes: Italicè, Grana de tintori: Germanicè, Scharlach ber: Hispanicè, Grana para tenir, & Grana engorda no: Gallicè, Vermillon.

## Tragium.

## Cap. XLIII.

TRAGIUM nascitur in Creta tantum insula, lentisco semine, folio, & ramis simile, singulisq; men minoribus: succus ei lacteus, gummi non dissimilis. Semen, folia, lacrymaque illius spicula & corpore eijciunt: omnia quoque corpori impacta, euocant: pota stranguriæ medentur, calculos uesicæ frangunt, menses trahunt. modus in sumptione est, drachma una. Fama est syluestres capras sagittis confossas, eius herbæ pabulo spicula excutere.

## Tragium Alterum.

## Cap. XLV.

EST ET alterum Tragium, quod tragoceros aliqui vocant: folia scolopendrij habet, & radicem syluestris raphani, tenuem, candidam. Quam crudam uel coctam esse dysentericis prodest. Folia autumno, hirci uirus olent: exinde sibi tragij nomen adoptauit. Prouenit in montibus, & præcipitijs.

Tragij consideratio.

TRAGIUM, quod in Cretâ tantum nasci tradit Dioscorides, quodq; in uniuersum lentisco simile facit, Plinius libro XIII. cap. XXI. ipsum fruticem terebintho similem reddidit, & libro XXVII. cap. ultimo, idem iuniperò assimilauit. Id quod dubio procul ostendit, Tragium hoc omnino illi fuisse ignotum, & quòd tantum id de comæ moriæ prodiderit, quod ab alijs auctoribus non minus fortasse hac in re cæcutientibus mutuatus est. Hoc ætate nostra non desertur, quod sciam in Italiam. Quo fit, ut id mihi hæcenus sicut & cæteris herbarum studiosis, ut ferme suspicor, sit in Italia incognitum. Quod autem secundo loco à Dioscoride representatum est, id potius herbam esse crediderim, quam arbutusculam, cum eius radix tam cruda, quam cocta in cibum reuiat. Sitq; syluestri raphano proxima. Veruntamen nondum reperi qui plantam mihi demonstraret folijs scolopendrij similibus, qui ei uirus oleant. Ex quo adducor, ut ab ijs plane dissentiam, qui putant Tragium hoc eam esse plantam, quam quidam Pimpinellam, quidam uerò ab odore Saxifragiam hircinam appellant. Quandoquidem huic scolopendrij folia non insunt, nullusq; eius ad dysentericos usus, tametsi ad ciendam urinam, expediendosq; uiscerum infarctus plurimum præstat. Huius PIMPINELLÆ duo habentur genera. Maior radice nititur longa: filijs circumquaque solo procumbentibus, dissectis, per ambitumq; serratis: caule quadrangulâ: floribus in umbellam coherentibus, tenuibus, albicantibusq; Minor caule exit rubenti: folijs minoribus, minus dissectis, minutiusq; serratis. Vtraque tamen hircinum redolet. Radix, in qua uis tota consistit, excoquitur, siccatq; ordine secundo completo, aut sanè tertio incipiente. Præstat hæc ad renum, & uesicæ morbos, quorum calculus est causa. Ob id enim renes à calculis expedit, & urinam remorata pellit. Prodest expressus è radicibus succus ex uiuo haustus, deleterijs medicamentis, & uenenosorum animalium morsibus. Quæ ratione non desunt, qui ad pestilentiam, radicem hanc miris laudibus effe rant. Est & alia Pimpinella, quæ à nostris uulgò SOLELLA STRELLA nominatur, nullis non cognita, utpote quæ accetarijs frequentissimè inferatur. Verum hæc ab antedictis longè distat uiribus, etsi foliorum facie satis inter se conueniant. Signa dem ultima hæc gustata non leuiter adstringens percipitur, et lètoris copiam præbet. Vnde facillè conijcitur, eâ esse adstrictoria facultatis.




Opinio reprobata.

Pimpinellæ genera, & uires.

Pimpinellæ vulgaris uires.



## PIMPINELLA VVLGARIS.



T R A G V M.

facultatis. Hinc itaque fit, ut muliebri profluuium efficacissimè sistat: dysenteriam, & ceteros alui fluxus cohibeat: quin & biliosas uomitiones reprimat. Herba ipsa uulnera, & ulcera sanat: misceturq; unguentis, quæ tum ad capitis uulnera, tum ad carcinomata parantur. Hanc Mattheus Curtius clarissimus ætatis nostræ medicus, contagiosis, pestilentibusq; febribus maxime commendauit. Sunt qui eam Elatinen esse putent. Sed ij, meo quidem iudicio, aberrant, ut suprâ etiam in sua mentione docuimus. Tragij meminit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, ubi hæc de eius uiribus tradit. Tragij, inquit, folia, semen, & lacryma trahentis, digerentisq; sunt facultatis. Est uerò & tenuium partium, & facultate in principio tertij ordinis calida. Corpori infixâ extrahit, lapides frangit, menses mouet drachmæ pondere potum. Porro in Creta sola nascitur tragion lentisco simile. Ceterum alterum Tragium hoc minus, cuius folia scolopendrio similia sunt, uisitur quidem multis in locis: sed non parum habet facultatis adstringentis, ut & ad fluxionum affectus conueniat. Vtraq; planta Græcis τραγιον, quemadmodum & Latinis Tragium appellatur.


Tragi vires  
ex Galeno.

Nomina.

## Tragum.

## Cap. XLVI.

EST etiam herba Tragos, quam aliqui scorpion, aut traganon uocant: maxime in maritimis nascens, palmum alta, aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga, sine folijs: pusillis circa ramos acinis, raris, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente. Racemorum acini decem ex uino poti, coeliacis, & foeminis fluxione vuluæ laborantibus, auxiliantur. Tunduntur à plerisque, & in pastillos digesti asseruantur: quibus utuntur, cum opus est.



TRAGVM aliquibus Scorpion uocari non modo tradidit Dioscorides; sed etiam Plinius lib. xxvii. cap. ultimo, his uerbis. Est & herba Tragos quam aliqui Scorpion uocant, semipede alta, fruticosa, sine folijs: pusillis racemis, rubentibus, grano tritici, acuto cacumine, & ipsa in maritimis nascens. Et lib. xxi. cap. xv. Spinofarum, inquit, multæ species. In totum spinosa est asparagus, scorpio: nullum enim folium habet. Id quod ante ipsum posteritatis memoriæ prodiderat Theophrastus libro vi. cap. primo de historia plantarum, cum inquit. Aculeatorum alia ex toto aculei sunt, ceu corruda, et scorpium: hæc enim nullum præter aculeum folium gerunt. Hinc itaq; omnibus abunde constare arbitror, herbam, cuius hic effigiem damus, legitimum esse Tragum. Ea siquidem in maritimis nascitur (plurima enim in Tergestino litore prouenit, & ad Argentarium promontorium in Hetruria) nulla prorsus reclamante nota ex ijs, quas rei herbariæ auctores Trago reddiderunt. Huius tamen nusquam, quod inuenerim, meminit Galenus in simplicium medicamentorum censu. Herba hæc τραγος & σκορπιος Græcè dicitur: Latine item Tragus & Scorpio.

Tragi consi-  
deratio.

Nomina.

## Iuncus.

## Cap. XLVII.

IUNCUS duo genera. vnum læuis nominati: alterum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cuius etiam duo assignantur genera. vnum sterile: reliquum fert semen nigrum, rotundum, & crassiore constat calamo, carnosioreque. Tertius est iuncus, qui uocatur oloschænos, prioribus carnosior, asperiorque: is similem supradicto fructum in cacumine parit. Semen uirius-



## IVNCVS:

Iunci conside-  
ratio, & uices  
ex Galeno.



Nomina.

## LICHEN.

Lichenis con-  
sideratio.

Lichenis ge-  
nera ex Plin.

Pulmonariz  
depictio, &  
vires.



RIA dicta est. Utuntur hac nonnulli magis fortasse nomine, quam ipsis uiribus freti, ad tabem, pulmonum ulcera, & ad utrumque & cruenta sputa. Nec desunt, qui laudibus eam offerant ad uulnera sananda, ad pudendorum ulcera, & ad utrumque quoque

que tostum, ex diluto uino potum, sistit aluum, & rubra sceminarum profluvia: vrinam cit, capitisque dolores facit. Quæ proxima sunt radici folia tenera, conuenienter illinuntur aduersus phalangiorum morsus. Aethiopici iunci semine somnus allicitur: sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

IVNCVS omne genus uulgaris est notitiæ: quandoquidem propter stagnantes aquas omnes eius reperiuntur species. Inna ci generum meminit Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum, ubi de ijs ita scriptum reliquit. Schœnos lea, hoc est, Iuncus leuis, quædam oxyschœnos, alia oligoschœnos nuncupatur. Gracilior, duriorque; oxyschœnos: crassior, laxiorque; oligoschœnos. Fructus oligoschœni somnum affert. At oxyschœni due sunt species: altera sterilis, cuius quidem in medicina nullus usus est: altera uero semen fert, cuius etiam semen somnum conciliat, sed minus quam oligoschœni: quanquam tamen hoc caput tenet. Vtrumque si frictum cum uino bibatur, uentris fluxus desiccatur, & muliebri profluvium rubrum sistit. Ex quibus clarum est, quod composita eorum temperies est ex terrena uidelicet essentia leni ter frigida, & aquea leuiter calida: ut & inferna desiccare possint, & sensim frigidos ad caput uapores submittere, quibus somnolentos efficiant. Σχοῖνος sic Græcis, Iuncus uero Latinis uocatur: Arabibus, Dis: Italis, Giunco: Germanis, Bimzen schmelen: Hispanis, Iunco: Gallis, Ionc.

Lichen.

Cap. XLVIII.

LICHEN, qui saxis est familiaris, aliquibus & Bryon appellatur, asperginosis petris adhæret, ut muscus. Is illitus sanguinis profluvia sistit, inflammationes arcet, impetigini medetur. Iuuat regio morbo correptos, cum melle illitus: oris, & linguæ defluxiones inhibet.

LICHEN proculdubio ea est planta, quam officinae, & herbarij hodie Hepaticam uocant. Hanc autem Græci Lichea appellauerunt, quod lichenas serpentis morbi genus, imposita sistat, & sanet. Lichen in asperginosis, & rorulentis prodeuenit locis, nudis petris adhærens, musci modo. Folio constat subpingui, cartilagineo, prope radicem angusto, in latum se pandente, triplici uel quatriplici lacinio intersecto. Prodeunt à radice cauliculi tenues, quibus capitula insunt parua, stelatarum effigie. Lichenis Plinius libro XXVI. cap. IIII. duo produntur genera, quæ his uerbis depingit. Lichen, inquit, herba omnibus his præfertur, unde nomine inuento. Nasctur in saxosis, folio uno ab radice lato: caule uno, paruo, longis folijs dependentibus. Hæc delet et stigmata: teritur cum melle. Est aliud genus Lichenis petris tantum adhærens, ut muscus, qui & ipse illinitur. Hic & sanguinem sistit uulneribus instillatus, et collectio nes illitus. Morbum quoque regium cum melle sanat ore illito, & lingua. Qui ita curantur, aqua salsa lauari iubentur ungi oleo amygdalino, hortensibus abstinere. hæc Plinius. Ceterum est herba Licheni non longè dissimilis, quæ in quercuum, aliarumque syluestrium arborum caudicibus nascitur, in opacis præsertim folijs. hæc tamen aridior, & ambitu latior. superiore parte uirens, inferiore uero pallescens, maculis quibusdam referta, adeo ut formam pulmonis referat: unde plerisque PULMONARIA ut formam pulmonis referat: unde plerisque PULMONARIA



## PVLMONARIA.



Paronychia.

que muliebri profluuium, cui mirifice mederi aiunt. Quin et eam dysentericis exhibent et biliosa euomentibus. Est Pulmonaria alia herba, quæ etiam Pulmonaria uulgo nominatur, ab illa tamen maxime differens, in opacis proueniens, folio bugloxi, aspero, hirsuto, albis maculis circumsperso. Caulem gerit hæc ineunte uere, in cuius cacumine flores erumpunt purpurei, perinde ac in uulgari cynoglossa. Huic plantæ rei herbaria perit non continentendas uires tribuunt, ad pulmonis ulcera sananda. Quæ in re iteq; in sanguinis reiectione mirabili successu se eam exhibuisse mihi sæpius retulit Iulianus à Marostica Teruissis medicus peritissimus: decoquitur enim ad medias, daturq; decoctum potandū addito saccharo: uel succus ex ea expressus serapij modo cū saccharo paratus. Præstant hæc omnia herba ipsa, et flores, quoquo modo à tabe affectis sumantur decocta. Lichenis meminit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Lichen, qui in petris nascitur, est uelut muscus quidem, sed recte ex plantarum genere censeripotest. Sic autem nominatus uidetur, quod lichenas seu impetigines curet. Extergentem, ac modicè refrigerantem facultatem habet, utranq; uerò resiccantem. Abstergentem quidem, atque exiccantem à petra obtinet, refrigerantem uerò ab humore aqueo: nascitur enim in humidis, et grauiter olentibus saxis. Porro quod ex talibus substantijs componitur, aduersum esse inflammationi, nihil mirum est. Caterum an sanguinis profluvia sistat, ut refert Dioscorides, id neutiquam dicere queo. Quod Græcis λερνιν, Latinis item Lichen dicitur: Arabibus, Azex alsacher: Italis, Lichene: Officinis, Hepatica: Germanis, Stein laber kraut, et Brunnen leber Kraut: Hispanis, Hepatica, et Figadella: Gallis, Hepaticque, et Porcorau.

Lichenis vires ex Gal.

Nomina.

## Cap. XLIX.

PARONYCHIA exiguus frutex, in petris nascens, peplo similis, minor longitudine, maioribus folijs. Illita paronychij, atque fauis remedio est.



Chrysocome.

PARONYCHIA non modo in saxis gignitur; sed etiam in ueterum ædificiorum parietibus, folijs peplo, aut rutæ similibus, aduersa parte pallentibus, paruisq; maculis refertis, phyllitidis uel hemionitidis modo. Hanc aliqui parietum Rutam, alij Saxifragam appellant. Copiosissima prouenit hæc in ingenti sylua, quæ in itinere est, quo Goritia discedentes petunt Labacum Carniole urbem, ubi et in saxis, et siccis arborum truncis frequentissima uisitur. Meminit Paronychiæ Galenus lib. VIII. simpl. medic. ita de ea scribens. Paronychia ab effectu nominata est: sanat enim paronychias, et ut refert Dioscorides, fauos quoq;. Vis eius est tenuium partium, et exiccatoria morsu uacans: talia enim sint oporætet, quæ paronychias sanant. Porro satis constat tale esse idoneum ad digerendos affectus omnes, qui digeri postulant. Siquidem eius modi sunt, quæ cum ex tertio sint ordine excalfacientium, et desiccantium, uelut et hoc, essentia insuper tenuium partium sunt. Planta Græcis παρωνυχία, pariter Latinis et Italis Paronychia nominatur.

Paronychiæ consideratio.

Paronychiæ uires ex Gal.

Nomina.

## Cap. L.

CHRYSOCOME palmi altitudine fruticat: coma specie corymborum, hyssopo simili: radice hirsuta, veratri nigri modo, tenui, cyperum æquante: gustu non iniucundo, ex dulci austero: in petrosiss,



sis, opacisque nascitur. Radix excafcit, & adstringit: his conueniens, quos iccur, aut pulmonis inflammatione malè habet. contra purgationes vuluæ, decocta cum hydromelite assumitur.

Chrysocomen consider.

Vires ex Galeno.

Nomina.

QVI Chrysocomen in Italia mihi ostenderet, hætenus reperi neminem. Quamobrem in eo naturæ uiridæ, plantis compluribus nobis incognitis referto, quod tantum in sui ipsius usum colit natura, ne omnibus exita medicamentis, suis etiam languoribus mederi nequeat, eam & uirescere, & florescere omittamus, donec nobis aut alijs compertam in communem quoque cognitionem, & usum prodere contingat. Interim tamen, ut nostrum institutum sequamur, uires eius ex Galeno subiiciam: quas ipse libro VIII. simplicium medicamentorum, ijs uerbis descripsit. Chrysocome uocatur & chrysites. Radix uincentes acrem simul, & adstringentem qualitates habet: quare neque multi usus est. Vñ tamen est decocta in melicrato in peripneumonij, & morbis hepaticis. Sed & menstruæ purgationis prouocandæ uim quandam obtinet. *Χρυσόκων* sic Græcè, ut etiam Chrysocome Latine dicitur.

## Chrysogonum.

## Cap. LI.

CHRYSO GONVM dense fruticat, quernis folijs, flore coronarij verbasci: radix ut rapum exuberat, intus ruberrima, foris nigra. Quæ trita cum aceto, atque imposita, muris aranei moribus auxiliatur.

Nomina.

CHRYSO GONVM, nisi aliunde in Italiam deferatur, inter plantas, quæ minimè cognoscuntur, & ipsum perpetuò recensendum esse putauerim: uel nobis in abditissimis naturæ hortis, ubi delitescit, inuestigandum erit. Id siquidem hætenus mihi neque inuenire, neq; ab alijs compertum uidere licuit in Italia. Quod *Χρυσόγονον* Græci, Latini quoque Chrysogonum dicunt.

## Helichrysum.

## Cap. LII.



Helichrysi consideratio.

Fuch. error.

Helichrysi vires ex Gal.

HELICHRYSON, quidam chrysanthemon, nonnulli & id amaranton uocant, quo deorum simulacra coronant. Ramulum habet candidum, uirentem, rectum, firmum: folia intercedentibus spatijs angusta, abrotono similia: comam aureæ lucis, in orbem: umbella rotunda, ueluti siccis corymbis dependentibus: radice tenui. Nascitur in asperis, & torrentium alueis. Contra serpentium ictus, coxendicum dolores, urinæ stillicidia, ruptaque, comæ uino pota opitulatur: ciet menses. Sanguinem concretum ventris ac vesicæ absuit, pota cum mulso: ieiunis: trium obolorum pondere, sistit destillationes, data in uino albo diluto. Vestibus inseritur, ut eas ab erodentium iniurijs tueatur.

HELICHRYSON copiosè prouenit in Hetruria in pratis gracili solo, incultisq; locis, siticulosis collibus, necnon etiam in fluminum alueis. Caule constat recto, æquali, ac lignoso, cubitalem longitudinem non excedente: folijs per intervalla emergentibus, abrotoni æmulis: comantibus in cacumine corymbis, aureo colore fulgentibus, & in orbem umbelle modo coarctatis, corymbacea facie, ueluti myriophylli, uel agerati: qui exiccati aureum colorem diutius retinent. Proinde commode hunc me, quod eo tempore flores deficiant, puellæ siccum Helichrysum coronamentis suis inserunt, quænamodum & Amarantum purpureum, quod nostris Hetruscis uulgò dicitur Fioruelluto. Helichrysum depinxit Fuchsius in suis clarissimis de stirpium historia commentarijs, folio echij aculeato, & floribus bipetalis. Quia in pictura ipsum deceptum suspicor, quod ea Helichryso minimè respondere deprehendatur. Helichrysi meminit Plinius lib. XXI.

cap. XXV. ubi de eo disseruit his uerbis. Heliochrysum, inquit, quod alij Chrysanthemon uocant, ramulos dependentibus candidos: folia subalbida, abrotono similia: ad solis percussum aureæ lucis in orbem ueluti corymbis dependentibus, qui nunquam marcescunt. qua de causa deos coronant illo. Quod diligentissimè obseruauit Ptolemæus rex Aegypti. Nascitur in frutetis. Helichrysi sub Amaranti nomine mentionem fecit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic inueniens. Amarantum facultatis est incidentis, & extenuantis. Coma igitur eius menses cum uino pota educit: & grumos sanguinis liquare creditur, non solum in uentre, sed & in uesica: sed tunc potius cum uino bibenda.



## AMARANTVS PURPUREVS.



CHRYSANTHEMVM.



bibenda. Et omnes simpliciter fluxiones, pota desiccet, stomacho infesta. hæc Galenus. Cæterum cum Helicbrysum tam Dioscoridi, quam Galeno Amarantum dicatur, opportuna nobis sese offert occasio, ut hic AMARANTI purpurei, quod, ut paulò antè diximus, à nostris uulgo uocatur Fioruelluto, historiam, & uires tradamus, præsertim quod puellis gratissimum sit hyeme in suis texendis corollis, utpote quod tam recens, quam siccum purpureum, ac flammeum colorem diutius conseruet. Hoc itaque folia profert ocimi maiora: caulem crassum, pinguem, subrubentem: florem spicatum, admodum purpureum. qui quanquam diu siccatum (ut suprà dictum est) asseruatur, haudquaquam tamen suum deperdit colorem. Amarantum hoc, quantum equidem reor, memoriæ prodidit Plinius lib. XXI. cap. VIII. cum sic inquit. Amaranto non dubiè uincimur. Est autem spica purpurea, uerius quam flos aliquis, & ipse sine odore. Mirumq; in eo gaudere decerpi, & latius renasci. Prouenit augusto mense: durat in autumnum. Alexandrino palma, qui decerptus asseruatur. Mirumq; postquam defecere cuncti flores, madefactus aqua reuiuiscit, & hybernas coronas facit. Summa eius natura in nomine est, appellato quoniam non marcescit. Hactenus de Amaranto Plinius. Huic facultas inest (ut recentiorum quorundam fert opinio) frigida & sicca: proinde flos eius potius celiacos, & dysentericos iuuat. Mensum abundantiam cohibet, & albas uteri fluxiones. Quinetiam cruenta expuentibus prodest, præsertim si in pulmone, uel pectore, uas aliquod fractum fuerit. Planta, quæ Græcis ἐρίγγυρον, & ἐλικοβρύσον, Latinis pariter Helicbrysum, & Heliochrysum appellatur: Italis, Helichriso.

Amaranti purpurei metio, & vires.

Nomina.

## Chrysanthemum. Cap. LIII.

CHRYSANTHEMON aut caltha, nonnullis buphthalmos. herba est tenera, fruticosa, læues proferens caules, & multifida folia: flores supra modum splendentes, luteos, orbem oculi imitantes, unde buphthalmi nomen traxit. propter oppida nascitur. cuius caules oleris uice manduntur. Flores cum cerato triti, steatomata discutere produntur. Regio morbo correptis, colorem bonum breui reddunt, si sequente longo balnei usu, post exitum ebibantur.

QUANQVAM nõ desunt, qui crediderint Buphthalmi, & Chrysanthemum unam, & eandem plantam esse, quod paribus notis inter se certare uideatur; tamè si particulares quædam notæ in utrisque diligenter expendantur, facile inter has plâtas discriminè aliquod notari deprehendetur. Quòd cum optimè sciret Dioscorides, diuersis libris, diuersisq; capitibus de his speciatim differuit. Quod utiq; minime fecisset, si compertum habuisset, nullam inter eas intercedere differentiam. Quæ tamen hinc cognosci potest, primùm quòd Buphthalmo folia insunt foemiculo similia, quæ planè capillaria constant: Chrysanthemo uero tenera, multifida, minutimq; per ambitum laciniata. Deinde Chrysanthemi caules in cibis mandali aliorum olerum modo scribit Dioscorides: id quod de Buphthalmo agens silentio præterijt. Præterea flores Buphthalmo reddidit anthemidi similes: Chrysanthemo uero luteos, & uehementer splendentes. Cæterum de horum uiribus differens, Buphthalmi flores, cum cerato tritos, tumores, duritiasq; discutere tradidit in uniuersum, & affirmatiuè locutus. Verùm postea de Chrysanthemo scribens huius flores, inquit, steatomata discutere produntur, particulariter,

Chrysanthemi consider.



Chrysanthemi caput restitutum.

Fuch. error.

Nomina.

& dubie locutus. Hæc sanè harum plantarum manifesta discrimina faciunt, ut credam, quòd aliquis antiquorum curiosus, nimisq; sciolus Bupthalmum, & Chrysanthemum unam tantum referre plantam fortè existimans, omnia in Chrysanthemo adiecerit, & confuderit, quæ libro tertio de Bupthalamo memoria prodidit Dioscorides. quemadmodum imprudenter de Ruta & Hyperico, Asaro & Bacchari ab alijs factum esse in præcedentibus ostendimus. Hoc itaq; argumento fretus crediderim ego hoc modo Chrysanthemi caput esse legendum. Chrysanthemon herba est tenera, fruticosa, leues proferens caules, & folia multifida: flores luteos, admodum splendentes. Eius caules manentur olerum modo. Flores cum cerato triti steatomata discutere produntur. Hinc itaq; sic Chrysanthemi capite restituto, facile patebit, quantum aberrauerint ij, qui Chrysanthemum cum Bupthalamo confuderunt. Chrysanthemon, cui nulla prorsus ex modò traditis reclinat nota, frequentissimum provenit in Senensi agro prope Montem nigriam oppidum ita appellatum, esturq; ibi à rusticis ueluti beta, & brassica. Bupthalmum uerò etsi antea à me non uisum in nostris commentarijs Italica lingua conscriptis confessus essem; ad nos tamen hoc anno uerum Patavio illustratum esse superius in sua mentione indicauimus. quod etiam postea accepimus Pisis à Luca Chino medico clarissimo, rei herbariæ peritissimo, omnibus prorsus adstipulantibus uotis, quæ illi tribuuntur. Quo factum est, ut certius mecum affirmare Chrysanthemi historiam auctam, deprauatamq; esse in Dioscoride. Credidit Leonardus Fuchsius medicus doctissimus in suo de plantarum historia commentario, Chrysanthemum illud esse ranunculi genus, quod folio apij, luteis floribus, in pratis plurimum nascitur. Quæ in opinione quantum, pace eius dixerim, hallucinetur, euidentius omnibus esse puto, quàm ut à nobis ostendi debeat. Chrysanthemi meminisse Galenum in libris de simplicium medicamentorum facultatibus, hætenus incompertum habeo. Eius nomen Græcum est χρυσάνθεμον: Latium item Chrysanthemum: Italicum, Chrsanthemo.

### AGERATVM.

### AGERATVM ALIVD.



Ageratum.



Cap. LIIII.

AGERATON fruticosa herba est, palmari longitudine assurgens, simplex, humilis, origano maxime similis: umbellam gerit, in qua flos bullis aureis emicat, helicryso minor. Nomen ei indurum est, quoniam diutissime flos in sua coloris specie conferuetur. Vis decocti feruens: huius uisæ nidor urinam cit, & uulæ duritias emollit.

Agerati consideratio.

NASCITVR Ageratum passim in uniuersa Hetruria, folijs origano proximis: floribus aureis, in umbella emicantibus, helicrysi modo. Hanc herbam Mesues Eupatorium existimat, ut superius in Eupatorii commentatione abunde diximus. Ea à nostris Senensibus uulgo appellatur herba Giulia. Agerati uires paucis perstrinxit Galenus



Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Ageratum digerit, & inflammationes leuiter quodammodo resoluit. Quæ herba ἀγρίανθος Græcè, Ageratum quoque Latine dicitur: Italice, Herba giulia.

Nomina.

## Verbenaca.

## Cap. LV.

PERISTEREVM, siue uerbenaca, nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse uidetur, quod columbæ circa hanc perquam libenter uersari solcant. Dodrantis altitudine, & interdum amplius adolefcit. Folia è caule prodeunt incisa, & subalbida. ea singulari ramo, radiceque sola, constare sapius inuenitur. Folia cum suillo adipe recenti, aut rosaceo imposita, uuluarum dolores finire putantur: ignem sacrum illita ex aceto reprimunt: putrida ulcera cohibent: uulnera glutinant, ueteraque ex melle ad cicatricem perducunt.

## Sacra herba.

## Cap. LVI.

SACRA HERBA, quæ & peristereon nominatur, ramulos emittit cubitales, aut maiusculos, angulosos: in quibus ex interuallis folia quercus, sed minora, angustioraque, eiusdem diuisuris in ambitu, colore aliquatenus cæsius: radix longa, tenuis: flores purpurei, graciles. Folia cum radice in uino pota, illitaue aduersus serpentes pollent. eadem drachmæ pondere cum thuris obolis tribus in uini ueteris hemina, quadragenis diebus, ieiuno ore, contra regium morbum bibuntur: ueteres tumores, & inflammationes mitigant: sordida ulcera purgant. Tota in uino decocta, tonsillarum crustas abrumpit: oris normas gargarizatu cohibet. Aiunt si aqua spargatur triclinium, qua maduerit, lætiores conuictus fieri. Datur potandum in tertianis febribus tertium à terra geniculum, cum folijs circundantibus: quartanis quartum. Sacram



uocant herbam, quoniam multum ad amuleta, expiationesque commendetur.

VERBENACA Hetruscis uulgo Verminacola, alijs uero Italjs Berbena, & Berbenaca dicitur. Huius (ut ex his duobus capitibus elici potest) duo habentur genera, quæ hoc tantum inter se differunt, quod alterum caulibus in altum attollatur, rara ex interuallis profrens folia. Alterum uero resupinatis caulibus humi procumbat, & numerosioribus folijs constet. Nec sanè alia inter hæc tum foliorum, tum florum deprehenditur differentia. Hinc fit, ut in suo insigni de stirpium historia commentario Fuchsium uirum aliqui eruditissimum, apertè errasse existimem: quippe qui discriminis causa Verbenacæ rectè florem luteum tribuat. Quod tamen in Dioscoride mihi nunquam licuit inuenire: quemadmodum neque in Plinio, qui utranque Verbenacæ speciem libro xxv. cap. ix. his uerbis descripsit. Nulla tamen Romanæ nobilitatis plus habet quam hic rabotane, aliqui peristereon, nostri uerbenacam uocant. Hæc est, quam legatos ferre ad hostes indicauimus. Hæc Iouis mensa uerritur, domus purgantur, lustranturque. Genera eius duo sunt: foliosa, quam foeminam putant: mas rarioribus folijs. Ramulis utriusque plures, tenues, cubitales, angulosi. Folia minora, quam quercus, angustioraque, diuisuris maioribus: flos glaucus: radix longa, tenuis. Nascitur ubique in plantis aquosis. Quidam non distinguunt, sed unum omnino genus faciunt, quoniam utraque eodem effectus habeat. Utraque fortiuntur Galli, & præcitant responsa. Sed magi utique circa hanc insaniunt. Hæc circa canis ortum debere, ita ut ne luna, aut sol conspiciatur, fauis antè, & melle terræ ad piammentum datis. Circum scriptam ferro effodi sinistra manus, & in sublime tolli: siccati in umbra separatim, folia, caulem, radicem. hæc Plinius. Ex quibus uerbis, ut arbitror, facile deprehendi potest error Fuchsij Brunfelsium fortè secuti, quod in suis de plantarum historia commentarijs primò editis, pro Verbenaca foeminam plantam depinxerit, quæ à Dioscoride, ceterisque antiquis scriptoribus Erigeron, siue Senecio uincupatur, tametsi mutata sententia libro primo de compositione medicamentorum in ultima methodo, rectam uerbenacam perperam, meo iudicio, alteram sinapi speciem esse contendat. Ceterum haud nescius Galenus nullum, uel paruum inter utrasque uerbenacas discrimen esse, breuiter de earum uiribus sub una tantum specie differuit libro viii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Verbenaca ideo peristereon appellata est, quod in ea peristrea, hoc est, columbæ uersentur. Vim habet adeo desiccantem, ut uulnera conglutinet. Et libro secundo de compositione pharnacorum secundum locos, de antiquo capitis dolore scribens: sic inquit. Omnium porro louè maxime discuit, & perfecte corroborat uerbenaca recta, maxime uiridis: imò & arida cum radicibus, & simul cum serpyllo, oleo incocta. Conijcienda etiam ad ea crocodiladis maxime

Verbenacæ confid.

Fuch. error.

Verbenacæ uires ex Gal.




Nomina.

iuxta aquas nascentis radix. Quin & ipsam per se uerbenacam, si oleo incoxeris, caputq; inde rigaueris, omni edipit's dolori amiguo ex frigidityte, aut ex crasis humoribus oborto medeberis. Primum Verbenaca genus Grecis

## ASTRAGALVS.

περισεπεδών, & περισεπεδών ὀφθός uocatur: Latinis, Verbenaca recta. Alterum uerò genus Grecis ἱερὰ βοτάνη, & περισεπεδών ἱππίος appellatur: Latinis, Verbenaca supina. In uniuersum Italis Verminacola, Berbena, & Berbenaca nominatur: Germanis, Eifens kraut.



Astragali cōsideratio.

Astragali uires ex Gal.

## HYACINTHVS.



Nomina.

Hyacinthi cōsideratio.

## Astragalus.

## Cap. LVII.

ASTRAGALVS paruus est à terra frutex, foliis, & ramis ciceri similis: flore purpureo, paruo: radice rotunda, raphani modo grandi, quæ adnatas appendices firmas habet, nigras, præduras, ueluti cornua, inter se implicatas, gustu adstringentes. Nascitur in uentosis, opacis, & in niualibus. eo Memphis Arcadiæ scatet. Alium sistit radix in uino pota: urinam mouet: uetustis ulceribus sicca efficaciter inspargitur: sanguinem supprimit. ægrè propter duritiã tunditur.

ASTRAGALVS frequens nascitur in agro Tridentino, in uallis Anapiae montibus, folio ciceris maiore, floribus purpureis: radice raphani æmula, adnatis appendicibus firmis, nigris, præduris, inter se implicatis, & gustu adstringentibus. Astragalus aliter à Plinio, quàm à Dioscoride describitur. Plinius scilicet in libro XXVI. cap. VIII Astragalum his notis representauit. Astragalus, inquit, folia habet longa, incisuris multis, obliqua, circa radices: caules tres, aut quatuor: florem hyacinthi: radices uillosas, implicatas, rubras, præduras. Nascitur in petrosis, apricis, & iisdem niualibus, sicut Phenco Arcadiæ. Mennius Astragali Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. Astragalus frutex est exiguus, radices habens adstrictorias: quamobrem etiam in numero est non infrene nuè exiccantium. Nam ulcera uetera cicatrice obducit, et alium fluxu tentatam sistit, si quis in uino decoctam radicem bibat. Flaccianus huius fruticis prouentus est in Phenco Arcadiæ. Is Graeco nomine ἀστράγανος dicitur: Latino similiter Astragalus: Italico, Astragalo.

## Hyacinthus.

## Cap. LVIII.

HYACINTHVS folia habet bulbi: dodrantalem caulem, læuem, minimo digito tenuiorem, herbacei coloris: comam procumbentem, florum purpureorum plenam, incuruam: radicem quoque bulbaceam. Quæ, ut creditur, pueris cum uino albo illita, pubertatē coercet, & non patitur erumpere: sistit alium pota, & urinam impellit: phalangiorum moribus auxiliatur. Semen adstringentius est, theriacis expetitur: regium morbum emendat, cum uino potum.

HYACINTHVS in uniuersum in campetribus inter segetes, & in syluis prouenit: folijs, & radicibus bulbaceis: caule dodrantali, uiridi, tenui, læuiq;: floret cum uiolis circa finem Martij, & Aprilis initium: florentem emittit comam, ab ipso caulis medio usque ad summum purpureis circumdatum floribus, quæ maturescentes ad terram incuruantur, perdurantq; diu antea quàm contabescant. Hetruscis nostris Hyacinthi uulgo uocantur Cipollæ canine. Flores primo statim exortu nostrates scire conueniunt, quod Hyacinthus hic non est ille, quem ex Aiæcis sanguine editum



editum poetæ fabulantur, in cuius flore ipsius Aiæcis nomen primis literis expressum legitur. Siquidem is (ut poetæ canunt) florem profert rubentem, lilio adsimilem. Hyacinthi vires memoriæ prodidit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Hyacinthi radix bulbosa est, ordinis primi in desiccando: secundi uero completi, at certè tertij incipientis in refrigerando. Itaque pueros diutissime seruare impuberes illita cum uino creditur. Semen leniter extergit, & adstringit: quoniam ipse regio morbo laborantibus exhibetur in uino, ordine quidem tertio quadrantibus desiccans, cæterum in medio consistens caliditatis, ac frigiditatis. Planta Græcis *Ἰακίνθω*, Latinis item Hyacinthus appellatur: Italis, *Hiacinto*: Germanis, *Mertzen bluomen*: Hispanis, *Mayos flores*, Gallis, *Vaciett*.

Hyacinthi uires ex Gal.

Nomina.

## PAPAVER ERRATICVM.



Papauer erraticum.

## PAPAVER SATIVM.



Cap. LIX.

PAPAVER erraticum, quod rhœada uocant, uere quidem in aruis cum hordeo nascitur, flore protinus deciduo, unde & nomen apud Græcos accepit. Folia erucæ, aut origano, aut cichorio, aut thymo similia spectantur, sed longiora, diuisa, scabra: iuncea ei caulis, rectus, cubitalis, asper: flos sylvestris anemones, puniceus, interdum albus: oblongum caput, sed quàm anemones minus: semen rufum: radix longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Huius capita quinque, aut sex in uini cyathis tribus ad dimidias decocta, potui dabis, quibus somnus accersendus est. Semina acetabuli mensura ex aqua mulsa pota, aluum leniter emolliunt: ad idem præstandum mellitis placentulis, & dulciarijs libis admiscuntur. Folia cum calycibus illita, inflammationes sanant: corundem fotu, & perfusione somnus allicitur.

## Papauer satium.

## Cap. LX.

E SATIUI papaueris genere, quod hortense est, semen in panem densatur, qui sanis in usu sit: eo etiam ex melle pro sesama utuntur: thylacitum uocant. Capitulum habet longum, & semen candidum. Sylvestre uerò caput habet insidens, demissumque, & nigrum semen: quod pithitis nominatur: nonnullis tamen, & ipsum rhœas dicitur, quoniam eius scapo lacteus succus emanat. Tertium magis sylvestre, & ad medicinas ualentius, multò his longius, productiore capitulo. Omnium in commune natura refrigeratrix. quare si capita ipsa, & folia decoquantur in aqua, somnum fotu conciliabunt. Bibitur decoctum contra uigilias. Calyces cum polenta triti, & cataplasmatibus admisti, igni bus sacris, & inflammationibus prosunt. Tunduntur quoque uirides, & digeruntur in pastillos, qui siccati



Opium.

siccati ad usum reconduntur. Capita quoque per se in aqua coquuntur ad dimidias, iterumque adiecto melle, dum humor coeat in eclegmatis lentorem. Id medicamentum in tussi, arteriæ fluxionibus, & coeliacorum affectu, doloris leuamentum præbet. efficacius tamen redditur, addito hypocistidis succo, & acacia. Papaueris nigri semen tritum cum uino bibitur, contra citam aluum, & fœminarum profluuia. in peruigiliis fronti, temporibusque illinitur ex aqua. Opium eius magis refrigerat, inspissat, siccaturque. Sumptum erui magnitudine, dolorem finit, concoquit, & somnum allicit, tussi, atque coeliacorum ualitudini auxiliatur: uerum si copiosius hauriatur, nocet, cum lethargicos efficiens interimat. Ad dolores capitis cum rosaceo perfusum, efficax est: aurium dolori cum amygdalino, myrrha, & croco instillatur: inflammationibus oculorum cum torrefacto oui luteo proficit, igni sacro, & uulneribus cum aceto: podagris, cum lacte mulieris, & croco. somnum accersit subditum sedi pro balano. Optimum habetur graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferum, quod faciliè aqua diluitur, læue, candidum, neque asperum, neque grumosum, quod inter colandum non ut cera coeat, & in sole diffundatur: dein ad motum lucernis, non atra luceat flamma: extinctum denique odoris uim conferuet. Sed opion glaucio, gummi, aut syluestris lactucæ succo adulterant. Verum glaucio fucatum, in dilutione croci colorem reddit: lactucæ succo fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur: gummi uitiatum splendet, & infirmum est. Nec desunt, qui cò dementiae deuenerint, ut adipem ei admiscerent. Ficili nouo torretur ad oculorum medicamenta, dum mollius, atque rufius appareat. Diagoras, ut Erasistratus auctor est, usum eius damnavit, oculorum lippitudinibus, & aurium uitii infundi uetans, quoniam uisus aciem habetaret, & soporem gigneret. Addidit Andreas, illitos eo protinus excacari, si non adulteraretur. Mnesidemus usum duntaxat olfactandi probauit, quoniam ad conciliandum somnum conueniret: alioqui nobis ut noxio interdicit. Quæ commentitia esse experimento deprehenduntur: siquidem effectus, uirium huiusce medicamenti fidem faciunt. Quare non alienum fuerit scriptis mandare, quonam modo is excipiat succus. Aliqui capita ipsa, & folia tundunt, & prælo exprimunt, terentesque in mortario digerunt in pastillos: id meconium uocatur, multum opio ignauius. Porro opij faciundi ratio hæc est. Cum ros in co exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cutem incidere oportet, lacrimam excurrentem digito in concham abstergere: nec multò post redire, ut concreta inueniatur: etenim quæ tum, aut postero die etiam offenditur, in uetere pila teri debet, & in pastillos cogi. cum tamen inciditur, retrocedendum est, ne uestibus succus deradatur.

Papaueris erratici consideratio.

SPECTANTUR Maio mense Papauera erraticæ rubentibus floribus nitentia, in aliquibus campestribus locis adeo numerosa, ut deceptis oculis, campi uideantur coccineis uelaminibus uestiti. Horum flores non desunt, qui affirmet lateris dolori, qui Græcis *πλευρῖτις* dicitur, mirificè mederi: in quem usum eos siccatos in puluerem redigunt, & in potu exhibent. Ab hoc experimento nonnulli medicorum edocti, ex ipsorum florum recentium succo ter, aut quater iterato diluto, serapium conficiunt: quo postmodum magno, ac prospero successu in pleuriticis utuntur. Tridentina rura Papaueris erratici folia prima statim germinatione olerum modo decoquunt, sumuntque in cibum cæseo, & butyro admistis. Nec mirum sanè, cum etiam Theophrasti ætate (ut ipse scriptum reliquit lib. IX. cap. XIII. de plantarum historia) eadem sumerentur in cibis. Loco enim citato ita de eo scribit Theophrastus. Papauer erraticum uocatum non ab simile intubo erratico constat: quare in usum uenit cibarium. Nascitur in aruis potissimum inter hordea. Florem rufum producit: caput pollicaris unguis magnitudine. Legitur ante hordei messem, atque uiridius etiam. purgat inferius. hæc Theophrastus. Sed iam de Papauere satiuo, siue domestico nobis differendum est. Videtur Dioscorides cum satiuo duo syluestris Papaueris genera tradidisse, et hoc nomine hæc ab illo distinctisse. Quæ in re animaduertendum est, ne aliquis fortasse decipiatur, quod omnes hæc papauerum species ab agricolis seruntur. Verum illud duntaxat, mea quidem sententia, hortense appellauit Dioscorides, quod albo constat semine, quoniam hoc frequentius in uiridarijs, & hortis prope ædes feritur. Cætera uero syluestria nominauit, non quod sponte, & per se nascentur (seruntur enim omnia) sed quod asperiora, hirsutioraque: proueniant tum caule, tum capitibus, tum etiam folijs: quod præterea nigrum, asperumque proferant semen: quod denique serantur in campestribus segetum, & leguminum modo. Rem autem se ita habere testari uidetur Plinius libro XIX. cap. VII. cum sic inquit. Papaueris satiuum tria genera. Candidum, cuius semen tostum in secunda mensa cum melle apud antiquos edebatur. Papaueris rusticæ crustæ inspergitur ad fuso ouo inherens, ubi inferiorem crustam apio, githque cereali sapore condiunt. Alterum erraticum dicunt. Sponte quidè, sed in aruis cum hordeo maximè nascitur. hæc Plinius. Papauere candido passim abundat Hetruria. Vtrisque uero nigris scatet uniuersa Insulubrium tellus: sed præcipue apud gentes, quæ Tridena tinas incolunt ualles, ubi Papauera hæc copiose seruntur in campis, & inter legumina, præsertim inter fabas. Ibi si quidem eius semine uescuntur homines, inniisto placentulis, quas ex pasta foliosa multiplici inuolucro conficiunt. Comedunt illi quidem hæc placetas ad saturitatem usque: nec ob id tamen unquam (quod mirum alicui fortasse uidebitur) diuturniore somno capiuntur, neque ueternosi fiunt. Quin nec illi etiam, qui Stiriam, superioremque Austriam incolunt, in ueternum incurrunt: etsi oleum è nigri papaueris semine expressum in cibis continuè assumant, oliuarum olei uice. Ea demum experientia fecit, ut intrepide quandoque, ausus sim Papaueris seminis cremorem hordei decocto expressum in ardentissimis febribus ad sitim extinguendam, somnumque conciliandum etià largius exhibere. Hinc præterea factum est, ut cum metum excusserim, & deposuerim, quem mihi olim præceptorum meorum graues admonitiones

Papaueris satiuum consideratio.



tiones incusserant, & ingesserant. Ceterum ex incisis Papauerum capitibus opus, siue succus manat, qui in Opium uocatum addensatur, ut scitè docuit Dioscorides. Et quanuis Opium quarto excessu frigidum statuatur; tamen si ex sapore, & effectū rerum temperamenta, & qualitates cognoscuntur, opium nostri usus (quantum equidem deprehendere potui) non modò gustu amarum percipitur; sed etiam acre, adeò ut paululum in ore detentum linguam, & palatum exulceret. Vnde haud dubie colligi posse putauerim, calidissimas illi inesse qualitates. Cuius rei fidem augere potest, quæ ex eo prodit odoris grauitas. Veruntamen ne impudentis, atque arrogantis nomen subeam, quòd in hoc omnium ferè medicorum sententiam destruere uelim, eorum iudicio rem hanc æstimandam relinquam, qui ante nos opij tum qualitates, tum facultates diligentissimè expenderunt. Sed fortè ea acris, amaraq; facultas in opium facile inuehitur ex glaucij adulteratione, quod illi sæpius admiscunt, ut Dioscorides adnotauit. Illudq; argumento esse potest, quòd aqua colliquatum croceum colorem reddat. Adde quòd opium, quod hodie ad nos conuehitur, non est illud uerum, & legitimum è lacryma, quæ ex inciso papaueris capite exierit, concretum, sed potius hoc è foliorum, & capitum contritorum succo confectum est; idq; meconium uocatum erit, opio longè deterius. Papauerum uires meconie prodidit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic inueniens. Papauer alterum Rhœas nuncupatur, quòd scilicet celeriter flos eius desinat. Alterum domesticum, quandoquidem colitur. Quin & alteræ duæ sunt præter has species syluestris papaueris: alterum uelut incidentem calycem sustinens: alterum longiorem quàm illud calycem obtinens, totum autem procerius, ac squalidius. Ab hoc succus desluit, atq; hinc est, quòd hanc speciem quidam Rhœada nominent. Porro omnium facultas refrigeratoria est. Ceterum satui semen, quod & thylacite cognominant, mediocriter somnum conciliat, uisu candidum: proinde pani ipsum inspergunt, ac melle maceratum edunt. At eius, quod primo loco recensimus; cuius florem celeriter decidere posuimus, ualidius semen refrigerat, ita ut nequaquam eo quis innoxie solo uti possit, sicut satiuo siue domestico melli admiscens. Admodum uerò, si ita sumptum sit, somnum conciliat. Ceterum pusillum eius inspergunt ijs, qui ex melle conficiuntur bellarijs, atque placentis, panibusq;. Porro tertio loco dicti semen atrum etiam medicamentosum est, admodum refrigerans. At quod quarto loco positum est, omnium est medicatissimum, tum in semine, tum in calyculis, tum in folijs, tum in succo. Valide enim refrigerat, ad stuporem usque, & mortem perducens. quare medici quò probè eo utantur medicamentis miscentes, frigiditatis uehementiam retundunt. Est enim ex quarto, & ultimo refrigerantium ordine. Porro quo pacto maxime ex methòdo misionem facere oporteat, non est presentis tractationis proprium. Et lib. II. de compositione medicamentorum secundum locos, de dolore capitis agens citra manifestas causas oborto, ita de opio diserit. Rarò, inquit, cogimur pharmacis ex opio uti, cum uidelicet præ doloris uehementia homo de uita periclitatur. Quamquam & tunc solide partes ex eius usu offendantur, adeò ut post hæc correctione opus habeant. Sic & ex opio collyria multis detrimento fuerunt, adeò ut debilem oculum reddiderint, & uisus hebetudinem, amblyopiam Græcis appellatam, induxerint, uelut etiam auditus grauitatem inducunt quæcunque ad uehementem aurium dolorem ex papaueris succo sunt composita. Idem Galenus lib. III. eiusdem tractatus, de aurium inflammationibus agens, sic inquit. Pharmaca ex papaueris succo omnia sensum stupefaciunt: & ob id sanè necessariò cogimur ipsis uti ubi nullum aliud mitigantium opem tulit. hæc Galenus. Ex quibus sanè omnibus admoniti esse debent medici, ne temerè, aut inconsultè ad usum opij se conferant. Sed ratio, qua id corrigendum, administrandumq; sit, ex ipso Galeno colligi potest, libro VII. de compositione pharmacorum secundum locos, ubi ita scriptum reliquit. Calefacientia miscuntur, quæ refrigerantium stupefactionem deducere possint, cum illa ipsa per se tardi transitus existant. Hæc igitur ubi quis inaudierit, quantitate consideret simplicium pharmacorum, quæ in compositiones miscuntur. Ex hac enim sciet num magis, an minus efficere possit compositum pharmacum, ea quæ prouenit. Si namque refrigerantia plura apparuerint, sensum affectorum magis obtundit, & quantum caloris in ipsa particula fuerit, etiam hunc extinguit. Vbi uerò calefacientia fuerint aucta, minus quidem hæc efficiet ipsum pharmacum, innocentius autem reddetur. Nosse enim oportet, corpora uiuentium mortificationi simile quæpiam perpeti ab omnium ex opio, hyoscyamo, & mandragora compositorum pharmacorum usu: nimirum causis dolorem infligentibus insensibilibus factis, & multi sanè qui assidue talia accipiunt, ad immedicabilem frigiditatem particulas perducunt. Papauer erraticum sic Latinis, *μικρον ποικιλ* Nomina. Græcis appellatur: Italis, Papauero salualico: Germanis, Klapper rosen: Hispanis, Amapolia, & Papoula: Galis, Coquelourdeis. Papauer uerò satiuum Latine dictum, *μικρον ημερον* Græcè uocatur: Arabicè, Thaxthax, seu Chaschas, Italicè, Papauero domestico: Germanicè, Magsomen: Hispanicè, Dormidera: Gallicè, Pauot. Quod deniq; Græci *οπισον*, & *μικρον οπισον*, Latini item Opium & Meconium dicunt: Mauritanis, Asium: Itali, Opio.

## Papauer corniculatum.

## Cap. CXI.

PAPAUER ceratites, id est, corniculatum, folia habet candida, hirsuta, uerbasco similia, in ambitu syluestris papaueris more ferrata: caule non dissimili: flore pallido: calyculo sceni græci, in corniculorum modum inflexo, unde nomen mutuatur: semine papaueris, pusillo, nigroque: radice per summa cespitum, nigra, crassa. nascitur in maritimis, & asperis. Radici ea uis inest, ut in aqua decocta ad dimidias coxendicum, & iecinoris affectus potu sanet. prodest his, qui crassa quædam, & araneosa cum lotio reddunt. Alium leniter purgat semen, acetabulo in aqua mulla poto. Crustas emarginant, illita ex oleo folia floresque: argema ac nubeculas iumentorum, perunctas abstergunt. Sunt qui glaucium hoc papaueris genere factitari existimarunt, falsi quadam foliorum cognatione.




## PAPAVER CORNICULATVM.

## Papauer spumeum.

## Cap. LXII.

Papaueris  
corniculati  
confid.



Papauer spu-  
meum.

Plinii lapsus

Papaueris  
corniculati  
uires ex Ga-  
leno.

Nomina.

ALIVD Papaueris genus aphrodes, id est, spumeum uocatur, ab aliis heracleum, caule dodrantali, foliis admodum paruis, radiculae similibus: fructu inter ea candido. nam herbula alba est, & spumea tota: radice in summo cespite. Legitur aestate semen, cum integrè adoleuit, deceditque exiccatum. Datum acetabuli mensura in aqua mulsa, uomitione expurgat. priuatim huiusmodi purgatio, comitialibus prodest.

PAPAVER corniculatum in maritimis nostris Senesibus Crassetano, & Orbetellano agro, & circa Herculis litore tum Argentario promontorio, itemque in Adriatici maris litore non longè à Timauro fonte, & Tergesto saxoso litoris tractu, ubi sæpius ipsum legimus, frequentissimum prouenit: quamquam etiam in alijs Italiae locis nascitur, sed quod potissimum in hortis, & uiridarijs ad publicum omnium commodum, & spectaculum fuerit satum. Huius meminit Theophrastus lib. ix. cap. x. i. de plantarum historia sic inquit. Papaueris quoque syluestris genera plura notantur: quoddam enim corniculare appellatum: quoddam autem nigrum est, folio constans uerbasci nigri, sed minus nigro: cauli altitudo cubitalis: radix breuis, per summam cespitem: fructus inflexi, ut cornicula figurantur. Legitur circa messes. Alium purgare potest: folium albuginem ouibus aufert. nascitur iuxta mare, saxosis locis. hæc ille. Credidere nonnulli Glaucium, quod Mauritanis memithe uocatur, fieri è corniculati Papaueris succo. Verumij (ut Dioscorides est auctor) procul dubio decipiuntur. Caterum Papauer spumeum, quod tiam hætenus aliquem reperi, qui illud legitimum ostenderet, non mihi compertum est, neque etiam aliq. 10

Quo fit, ut ipsum quoque inter tot alias nobis incognitas plantas relinquere malim, quam aliquod incertum proferre, ut quidam faciunt. Veruntamen non mihi uidetur silentio prætereundus fatalis ferè Plinii lapsus, in Papaueris spumæ mei mentione lib. xx. cap. xix. Quippe qui huius papaueris folia speciem passerum auium representare tradiderit, deceptus nimirum duplici eiusdem nominis Græci significatione. σποδίων enim Græcis non modo passerem auiculum significat: sed & plantam eam, quam Latini radiculam, siue lanariam herbam appellant: cui quidem Dioscorides, non autem auiculis, quas passerès Latini dicunt, Papaueris spumæ folia similia reddidit. Quemadmodum & Theophrastus, qui de eo loco citato ita scriptum reliquit. Papauer heraclion nuncupatum folio constat struthij, hoc est radiculae, qua linteis candorem conciliant: radice candida, in summa terræ eunte: fructu albo. Huius radix purgare superius nata est. Non desunt, qui contra comitiales ea utuntur in uino mulso. hæc Theophrastus. Papaueris corniculati meminit Galenus lib. vii. simplicium medicamentorum, de eius uiribus in hunc modum differens. Papauer corniculatum nominatum quidem est à seipso leuem inuersionem habente, ueluti & fenum græcum, ut bonis cornu uideatur esse simile. Vocatur porro à quibusdam paraliū, quandoquidem ut plurimum iuxta mare nascitur. Vim habet incidendi, & abstergendi. Itaque radix herbæ in aqua decocta ad dimidium, hepaticos affectus adiuuat. Porro folia, & flores sordida admodum, & maligna ulcera uiuant. Sed ab his abstinere oportet, ulceribus iam expurgatis: adeo enim abstergere ualent, ut & puræ quoque carnis nonnihil eliquent. Hoc uirium robore non sordem duntaxat, sed & crustam ulceribus detrahit. Papauer uerò Herculeum, quod & aphrodes, hoc est, spumeū uocatur, eo quod totum sit candidum, & spumosum, exile est. Semen habet pituitam expurgans. Μύκων κερπίτις id Græcis uocatur, quod Latini Papauer corniculatum: Arabibus, Almacharam: Italis, Papauero cornuto: Germanis, Gelbol magen, Moen, & Bechnagsanen: Hispanis, Dormidera marina: Gallis, Pauot ocornu. Id uerò μύκων κερπίτις Græcè dicitur, quod Latine Papauer spumeum: Arabicè, Dabre, & zebeolij: Italicè, Papauero spumeo. 30

## Hypecoum.

## Cap. LXIII.

HYPECOON, aliqui hypopheon uocant. nascitur in segetibus, aruisque, foliis rutæ, exilibus ramis. Natura eadem, quæ papaueris succo.

Hypecoi cō-  
sideratio.

HYPECOVM ijs facile sese offeret, qui inter segetes, & legumina ipsum perquirere non grauabuntur. Hoc pro syluestri ruta olim Petrus Spezzalancia Clesij uallis Ananiae oppiduli pharmacopola compater meus, mihi ostendere solebat. Quandoquidem id prouenit in aruis, folijs rutæ paulò maioribus: caulibus exiguis, mollibus, hirsutis: in quibus sunt flores, qui in luteum pallescunt, et si prope calycem purpurei spectentur. in horum medio flocculus erumpit colore aurū emulans, uisu incundus. Floribus succedunt capitula, tenui inuolucro contexta: in quibus semen clauditur. 60



## HYPECOVM.

ditur nigrum, asperum, pseudomelanthio proximum. Meminit huius Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, his paucis uerbis. Hypecoon, inquit, refrigerandi uim habet, ex tertio serè refrigerantium ordine, adeò ut parum abstt à papauere.

Hypecoi uires ex Gal.

Quod Græci ὑπὲκον, Latini quoque Hypecoum uocant: Nomina. Itali, Hipecoo.

## Hyoscyamus, siue apollinaris.

Cap.

LXIII.



HYOSCYAMVS.



HYOSCYAMVS: frutex est caules emittens crafos: folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta: flores è latere caulis, ordine prodeunt, tanquam puniceorum cytini, scutulis septi seminum plenis, ut papaueris. Tres eius differentia. Vna semine nigro, floribus penè purpureis, smilacis folijs, citinis præduris & spinosis. Alteris semen subflauum ut irionis. flores lutei, folia & siliquæ simpliciores. ambo insaniam gignunt, & soporem: ideo in communi usu damnantur. Tertium genus, ut quod mitissimum esset, medici recepere: pingue, lanuginosum, molle, candidi floris seminisq; in maritimis rudibusque nascens. cuius occasio si non adsit, rufum usurpari oportet. niger, ut deterrimus, improbat.

Recenti semine, caulibus, folijsque tuis succus in sole exprimitur, & exiccato humore, usus ad annum usque prorogatur: nam facillè corruptionem sentit. Extrahitur etiam ex sicco semine separatim in aqua calida tuso, & expresso. Liquamentum autem succo lacteo præstantius est, & magis dolores finit. Contusa herba recens, addita trimestri farina, digeritur in pastillos, & reconditur. Liquamentum primum, & quod à sicco semine exemptum est, collyrijs, quæ dolori sensum auferunt, commodissimè inferi solent. contra acutas, calidasque fluxiones, dolores aurium, atque uulvæ mala profunt: cum farina autem, aut polenta, oculorum, pedum, cæterarumque partium inflammationes placant. Semen eadem præbet: tussi, destillationibus, oculorum fluxioni, & doloribus efficax: contra mensium abundantiam, & erumpentem aliunde sanguinem, oboli pondere cum papaueris semine, & aqua malsa bibitur: podagris subuenit: testibus inflatis, mammisque tumentibus à partu, tritum ex uino illinitur. Alijs quoque cataplasmatibus, quæ doloribus leuamentum præstant, admisceri solet. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per sese, & ex polenta utilissimè imponuntur. recentia ad mitigandos omne genus dolores oblinuntur: cum uino terna, quaternæue pota sanant algidas febres, quas epialos uocant. Cocta olerum modo folia, si acetabuli mensura manduntur, mediocrem insaniam gignunt. idem efficere tradunt, si colo ulcus sentiente, infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore coluntur.

ET SI tria Dioscoridi Hyoscyami tradantur genera; id tamen solum mihi uidere licuit, quod aureum florem profert, & semen in uasculis subflauum potius, quàm nigrum: nam reliqua, quanquam diligenter inquisiuerim, qui mihi ostenderet, hætenus reperi neminem. Hyoscyami meminit Scribonius Largus, inueniens. Altercum, quod Græcis hyoscyamus uocatur, qui bibet rint, capitis grauitate, & uenarum distentione laborant, menteq; abalienantur cum quadam uerborum altercatione: unde &

Hyoscyami consider.




Hyoscyami  
uires ex Gal.

Nomina.

nomen apud Latinos. Hoc idem equidem testari possum, quod uiderim in Ananiae uallis montibus pueros, qui Hyoscyami semen comederant, adeo desipientes factos, ut parentes, & uicini eos crederent à cacodæmonibus uexatos esse. Hinc est, quod eius regionis incolæ Hyoscyamum uulgari sermone appellant Disturpio, ut quod mentem maxime turbet. Aues, quæ huius herbae semen ederint, præcipue quæ in gallinaceo habentur genere, non multo post tempore pereunt, quemadmodum & pisces. Hyoscyamus uidetur Græcis dicta, quasi faba suilla: propterea quod (ut Helianus inquit) huius herbae pastu resoluuntur, & conuellantur apri. Sed remedium nouere, aquas enim statim addeunt, & caneros uenantur, atque ita protinus saluti restituntur. Hyoscyami uires recensuit Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, his uerbis. Hyoscyamus, cui semen atrum est, insaniam, ac soporem affert. Huic autem is, cui semen mediocriter flauum est, propinquam facultatem obijnet. Verum utrique fugiendi sunt, ut inutiles, & ueneni seu deleterij. Caterum cuius semen, ac flos candidus est, ad sanationes uel maxime idoneus est, ex tertio quadammodo ordine refrigerantium. Porro flos eius quidem, cui semen est nigrum, mediocriter purpureus est: eius uero, cui est subflauum, leuiter mali colorem refert. hæc Galenus. Caterum, ut ad hyoscyami historiam nostra reuertatur oratio, mihi quidem non uidetur præmittenda suspicio, quæ est, quod in huius capituli initio, ubi de floribus fit mentio, mendum aliquod subsit. Ea namque iuxta floribus tribuuntur, quæ siliquis legitime debentur. Etenim siliquæ sunt, quæ scutulis conteguntur, atque semen intus continent, non autem flores. Auget hanc nobis suspicionem Serapio: quippe qui illud de fructibus Hyoscyami Dioscoridi acceptum referat, quod hic de floribus scriptum legitur. Quare non temere, meo iudicio, conijcere possumus, hunc locum in Dioscoride deprauatum aut mutilatum esse. Planta, quæ Græcis υοσκύαμος, Latinis appellatur Hyoscyamus, Apollinaris herba, Altercum: Arabibus, Bengi; Italis, Iusquiamo: Germanis, Bilsomen, & Bilsen: Hispanis, Velenho: Gallicis, Iusquame, & Hænebane.

## Psyllium.

## Cap. LXV.



Psyllij uires  
ex Mesue.

Psyllij confectio.

PSYLLION folijs est coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus. sarmentosa fœni modo in totum herbula, ramis dodrantalibus: coma à medio caule exoritur, duobus tribusue conuolutis in cacumine capitulis: in his semine duro, nigro, pulicem simili, unde & nomen. in aruis, & incultis nascitur. Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum conueniens: articularum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, luxariis, illitum auxiliatur: imponitur in dolore capitis, cum rosaceo, aqua, aut aceto: enterocelis infantum, & prominenti umbilico, illitum ex aceto medetur. Teritur acetabuli mensura, & in aquæ sextario madefactum, ubi concreti aqua, illinitur: siquidem uehementer refrigerat, & in feruentem aquam deiectum calorem reprimat, contra ignes sacros efficax est. Fama est, si uirens domum importetur, non sinere in ea pulices gigni. Cum adipe tustum sordida ulcera, & quæ cacoethe uocantur, expurgat. Succus uermiculosis auribus, aut fluxione laborantibus, ex melle prodest.

PSYLLIVM, quod & Pulicariam herban nuncupant, ubiq; ferè prouenit, sed in maritimis frequentius. Septies semen recondunt ad glutinosos liquores conficiendos, quibus in infirmitatibus inflammacionibus, prohibendisq; calidis defluxionibus, & ad extinguendam sitim, leuigandamq; linguam, & faucium scabritiem, in ardentissimis febribus utuntur medici: quinetiam ad aluum emolliendam. Psyllij uires retulit Mesues inter ex medicamentis, quæ deiectoria ui pollent, ubi hæc ad sensum saltem habet. Psyllium de his est, quæ temperamentum immutant, & quæ emolliunt.

Hic aluum citant. Huius seminis tria habentur genera, candidans, subflauum, & ad purpuram uergens. Præstantius perfectè maturum, ponderosum, & quod in aquam demissum statim inuim petit. Contrarijs constat cum uiribus, tum substantijs: ea siquidem, quæ in medulla continetur, calida est, & sicca ordine quarto, admodum acris, incitans, exulcerans, septica, & deleteria facultatis, quæ uero in cortice residet, teste Ruffo, infrigida, humectansq; tertio excessu. Infunditur psyllij semen in aqua fontana frigida, agiturq; rudicula tandiu, quousque aqua lentorem contrahat, percolaturq; deinde à seminibus, & admiscetur oleo, aut syrupo uiolaceo. hoc enim modo psyllium potest aluum mirificè emolli, & deijcit. Verum si frigus prius semen rosaceo admixtum eodem modo agatur, tunc sumptum dysentericis remedio est, & cæteris alui fluoribus, præsertimq; ijs, qui deiectorio medicamento exuunt, per ante hausto superueniunt, sed præcipue acris, quale est scammonium. Caterum maxime animaduertendum est, ut Psyllij



Psyllij semen ( id quod tamen detestantur recentiorum quidam ) tusum in puluerem potandum exhibeatur. Quippe quod attrita medullari substantia, uentriculum, & intestina exulcerat: iecur, & sanguinem inflammat, & omnia deniq; uiscera lædit. Integri seminis dilutum eo modo, quo diximus, paratum bilem deijcit: eaq; propter ardentissimis febribus, intolerabili siti, inflammatis ualde spiritibus, & faucium, & pectoris asperitatibus mirifice medetur. In aceto diu agitatum inflammatione, igni sacro, & herpete laborantibus auxiliatur, exterius illitum: priuatim prodest capite dolentibus fronti impositum, si tamen dolor à causa calida fuerit excitatus. Hæc ex Mesue decerpimus. Psyllij uires paucis perstrinxit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Psyllij semen admodum utile est, ex secundo refrigerantium ordine: in desiccando uero, & humectando medium quodammodo est, & symmetrum. Herba ψύλλιον Græcè, Psyllium item Latine dicitur: Arabicè, Bazara chathona, seu Bezzer cothume: Italicè, Psillio: Germanicè, Psyllen kraut: Hispanicè, Zargatona: Gallicè, Herbe à puces.

Psyllij uires  
ex Galeno.

Nomina.


### Solanum hortense.

### Cap. LXVI.

HORTENSE Solanum frutex est cibus idoneus, exilis, pusillus, multis concavis alis: folio nigro, maiore quam ocimi, & latiore: fructu rotundo, uiridi, qui post maturitatem nigricat, aut fuluescit. herba innocentis gustus. Natura ei refrigerandi: quare folia ulceribus quæ serpunt, & ignibus sacris, convenienter cum polline polentæ illinuntur. ægilopia, capitisque dolores, trita & imposita per se sanant: æstuanti stomacho auxiliantur: parotidas cum sale detrita illitu discutunt. Valet succus eius aduersus ignem sacrum, atque ulcera quæ serpunt, cum cerussa, rosaceo, & argenti spuma: ad ægilopas cum pane: infantium adustioni, quam syriasi vocant, cum rosaceo perfusus proficit: in collyrijs, aquæ vel oui vicem exhibet, contra acutas fluxiones illitus: aurium dolori instillatus prodest. mensium abundantiam sistit in vellere subditus. Succus fuluo gallinarum cortalium fimo subactus, & linteo appositus, ægilopijs præsentaneo est remedio.

### SOLANVM HORTENSE.

### SOLANVM HALICACABVM.



### Solanum halicacabum.

### Cap. LXVII.

EST ET aliud Solanum, quod peculiari nomine halicacabon, aut physalida, id est vesicariam vocant, folijs antedicto similibus, uerum latioribus: cuius caules, posteaquam adoleuerunt, prona terant spectant: folliculis orbiculatis, vesiculis similibus: in quibus semen continet fuluum, rotundum, acinorum vix figura: quo coronarij utuntur, corollis intexentes. Vim, usumque hortensis



solani habet : verum cibis nequaquam expetitur . Regium morbum purgat , semine potio , & urinam pellit . Ex utraque herba succus extrahitur , qui siccat in umbra reconditur , ad eadem ualens .

## SOLANVM SOMNIFERVM.

## SOLANVM SOMNIFERVM ALIVD.



Solanum somniferum.



Cap. LXVIII.

SOLANVM somniferum , aliqui etiam halicacabon appellant , fruticat multis ramis , densis , caudicosis , fractu contumacibus , pinguium foliorum , cotoneæque mali similibus : flore grandis , rubro : fructu in folliculis crocato : radice grandi , subrubro cortice uestita . nascitur in saxis , non procul à mari . Radicis cortex , in uino drachmæ pondere potus , somnificam uim habet , opio mitiorem . Semen uehementer urinam cit . Corymbi duodecim hydropicis dantur : si quid numero adijciatur , alienationem mentis faciunt . Remedio est aqua copiosa mulsa , potui data . Succus pastillis inseritur , & medicamentis , quæ doloris leuamentum præbent . decoctus in uino , si in ore contineatur , dentium doloribus auxiliatur . Radicis succus , cum melle illitus , oculorum hebetudines tollit .

## Solanum furiosum.

## Cap. LXIX.


SOLANVM manicon , aliqui persion , alij thryon appellauere . Huic folium erucæ simile , maius aliquantò , satis acantho , quem præderota uocant , accedens : caules è radice proceros emittit decem aut duodecim , ulnæ altitudine adolentes : caput in cacumine oliuæ figura , sed ut platani pilule hirsutius , uerum maius , latiusque : florem nigrum : postquam eo exiit , racemus exit rotundus , niger , denis aut duodenis acinis constans , similibus hederæ corymbis , ut uuæ mollibus : radice firmatur candida , crassa , cava , cubitali . gignitur in montibus , uento persflatis , & plataneatis . Radix drachmæ unius pondere pota ex uino , facit species uanas , imaginationesque ; non iniucundas obuersari : sed duplicatus hic modus , ad tres usque dies mentis alienationem affert : quadruplicatus interimit . Remedio est aqua mulsa copiosius pota , & uomitione reiecta .



E' QVATVOR Solani generibus, quæ hic à Dioscoride describuntur, etsi in commentarijs, quos antea Italicosemone conscripsi, me duo tantum genera nouisse prodiderim, hortenise scilicet, & quod aliqui Halicacabum, alij Vesicariam uocant; hoc tamen aucto tertium, quod Somniferum appellant, Pisis ad nos misit uir rei medicæ eruditione clarus Lucas Gbinus Forocorneliensis: idq; mihi planè omnibus notis legitimo respondere uidetur. Verion quartum Solani genus, quod Manicum cognominant, hæctenus me non uidisse fateor. Caterum errant, mea quidem sententia, qui eam plantam, quam herbariorum uulgus Solatrum maius nominat, Veneti uerò uulgò Herba

Solani generum confide.

## SOLATRVMAIVS.



bella donna, Solanum somnificum Dioscoridis esse existimant. Si quidem id fructum nō profert in folliculis croceum, tamen si eius bacca largius sumpta interficiant, facto in expugnabili somno, ut quandoque accidit pueris, qui discriminis ignari eas uice deuorant. Vnde quamuis hæ plantæ uiribus conuenire possint; facie tamen inter se maxime distant. Horum sententia adstipulatus est Fuchsius medicus alioqui peritissimus, in suo magno de stirpium historia commentario. Sed cum in hoc se manifeste errasse deprehendisset, in suo postea paruo plantarum libro, hanc herbam in Mandragoras reposuit, eamq; Mandragoræ speciem uoluit esse, quam Dioscorides Morion uocari tradit, lapsus, ni fallor, de uno in alterum errorem. Mandragora siquidem nomine Morion, folia fert mandragoræ mari similia, dodrantali longitudine, terræ procumbentia, circa radice summum. Id quod manifestum præbet indicium, hanc perpetuò caule uiduam esse, quemadmodum cætera mādragoræ genera. nam pediculi, quibus mandragoræ fructus sustententur, caules dici non possunt. Hinc itaq; fit, ut plantam hanc, quæ uulgò Bella donna uocatur, in nullo Mandragoræ genere legitime referendam putem: cum hæc folia emittat hortenfi Solano maiora, palmi mensuram nunquam excedentia, minime candicantia, nec humistrata, sed in caulibus exeuntia, adnatis plurimis refertis, bicubitalibus, & ligni modo præduris. Quinimò crediderim ego, hanc esse Solani quintæ speciem, antiquis scriptoribus incomptam. Nam quantum equidè longa experientia comperi, uaria ac diuersa Solani reperiuntur genera. Somnifici, & manici Solani meminit Theophrastus lib. IX. cap. XII. de plantarum historia, sic inquit. Solanorum genera duo. Alterum somnificum, radice rubra, sanguinis modo, sed cādida cum siccescit: fructu cocco rubriore: folio thymalo simili, aut malo dulci, sed piloso, & parte ina magno. Huius corticem radice tundentes admodū, & in uino meracius

Fuch. error.

Solani historia ex Theophrasto.

Nascitur in rupibus, & faucibus, atq; sepulchris. Alterum genus facit. id alij Bryoron uocant, alij perisson. Constat radice candida, & longa ad cubitum, atq; caua. Dabitur eius radice drachmæ pondus si ut quis ludat, seq; pulcherrimum putet, placuerit: at si magis insaniat uis, drachmæ opus est: sin autem nunquam insaniam solui malueris, tres dabis: & quatuor, si interinendum sit. Habet pilosus: nec fructui platani ab simile constat. Est & aliud Vesicariæ genus, quod hæc tempestate scenas, atque pugnas, & pergulas inumbrat: quinetiam adium fenestras topiario opere contextit, & opacat. Constat hæc folijs oblongis, per ambitum laciniatis: floribus candidis, è quibus uesiculae prodeunt, in quibus semen includitur albi, & similitudine, in cuius medio ueluti humani cordis effigies uisitur, ob signata nigro colore. Nec sine ratione id à natura factum conijci potest, quòd fortasse huiusce cordis nota nobis insinuet, hanc stirpem ad cordis affectus maxime prestare. quemadmodum & in Echio herba contra niperarum morsus celeberrima, semen uiperinis capitibus sita. Refertur etiānum inter Solani genera alia quædam planta STRAMONIA multis uocata, adeò Solano similis, ut nil aliud, quàm ipsum representet, uerum eius folia opium redolent. Flores, qui suauem odorem spirant, gerit hæc albos, amulos conuoluuli illius, qui compluribus rei herbariæ imperitis Ligustrum dicitur. Fructus ei circumquaq; spinosus, umbilicatusq; colore uiridi. Folia solanum quadantenus referunt, tamen singulis generibus uires reddidit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum. ubi ita scriptum reliquit. Solanum esculentum, quod in hortis nascitur, notum est omnibus, utunturq; ad omnia ea, quæ refrigerari, & ad vesicam, fructum habens rufum, acino uice tum figura, tum magnitudine ad similem: quo etiam ad coronas uiridius appellatur. Halicacabum igitur in foliorum facultate hortenfi solano simile est, fructum habens cicutæ idoneum: proinde multis compositis facultatibus, quæ ad iecur, ad uescam, & reues accommodantur. Solani uerò somnifici cortex radice, si cum uino bibatur, somnum accersit drachmæ pondere sumptus.

Vesicariæ genus aliud.

Stramonium.

Solanorum uires ex Gal.



## STRAMONIA.



Nomina.

Sed & ad cætera quoq; papaueris succo persimilis est, nisi quod eousque imbecillior est, ut ipse tertij habeatur ordinis refrigerantium, cum hic in quarto sit constitutus. Huius solani semen urinae ciendi uim habet. Verum si plus duodecim corymbis hauseris, demeritiam furiamue adsciscet. Porro quod reliquum est ex dictis Solanis, ad medicationes, quæ intro in corpus adhibentur, inutile est. Nam si quatuor eius drachmæ sumptæ fuerint, mortem inferrent: si pauciores insaniam. Vna certè innoxie sumitur: cæterum nec ipsa utile quid obtinet. Verum si foris corpori emplastri modo illinatur, ulcèra maligna, & depascentia curat. Sed ad talia radice cortex optimus est, desiccans secundo ordine iam completo, & tertio incipiente: refrigerans uero secundo incipiente.

Illud solani genus, quod Græcis σπύχρος κατὰ αἶμα, Latine Solanum hortense nominatur: Arabibus, Hamebathanaleb, Hameb alchabaich, siue Hanab althaleb: Italis, Solatro hortolano: Germanis, Nacht schadt: Hispanis, Yerua mora: Gallis, Morelle. Quod uero Solanum Græcè ἀλνδάνισος, Latine Halicacabus, & Vesticaria appellatur, Arabice, Kengkengi, Alkekengi, siue Kekenegi: Italicè, Halicacabo: Germanicè, Laudeu kirsen: Hispanicè, Bexiga de perro: Gallicè, Ber guenaudes. Quod deinde Græcis σπύχρος ὑπνωτικόν, Latine Solanum somniferum dicitur: Italis, Solatro somnifero. Quod denique Græcè σπύχρος μαινόν, Latine Solanum furiosum nuncatur: Italicè, Solatro furioso.

## Dorycnium.

## Cap. LXX.

oleæ similibus colore, minusculis, firmioribus, præter modum scabris: flore candido: siliquis in læuibus, firmis, uersicoloribus. radix ad digiti crassitudinem, & cubiti longitudinem adolefcit. Id somniferum esse constat. Copiosius haustum mortem adfert. Nec defuere qui dicerent, semen in a-

DORYCNION Crateuas halicacabon, aut caleam uocat. frutex oleæ nuper prodeunti similis. Nascitur in petris non procul à mari, ramis cubito minoribus: silijs

Dorycnij cōsideratio.

DORYCNIVM, Crateuæ testimonio, inter saxa in maritimis nascitur, silijs cum forma, tum etiam colore oliuæ proximis. Verum mihi hætenus non contigit ipsum inuenire, aut inuentum uidere: quanuis in eo quoque inquirendo multum laboris insumperim. Cæterum hallucinantur, meo quidem iudicio, qui putant Dorycnium esse eam Vesticariam, quæ semine est rotundo, albo, macula cordis effigie insignito: cuius historiam inter Solani genera præcedenti capite retulimus. Siquidem hæc Dorycnio omnibus ferè nois repugnare deprehenditur. Dorycnij mentem Galenus lib. VI. simplicium medicamentorū ubi de eius uiribus ita scribit. Dorycnium temperamentopapaueris simile est, & mandragoræ, & ijs qui sic refrigerandi uim habent: excellit aquea frigiditate admodum efficaci. Quoniam obrem modicum quidem soporem conciliat: largius uero sumptum interimit. Id δορύκνιον Græci, quod Dorycnium quoque Latini uocant.

Vires ex Galieno.

Nomina.

## Mandragoras.


## Cap. LXI.

MANDRAGORAM, aliqui antmelum, alij circæam uocant, quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera. niger, quæ fœmina existimatur, thridacias appellatus, angustioribus silijs, ac minoribus quàm lactuæ, uirosis ac graueolentibus, in terra sparsis: mâla gerit fortis similia, pallida, odorata, in quibus semen ueluti pyrorum: radicibus inhæret bene magnis, binis, ternisue, inter se conuolutis, nigris foris, intus albis, crasso cortice vestitis: caulem non fert. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis morion uocitatur. huius folia magna, alba, lata, læuia ut betæ: tâta, quorum pomorum cibo aliquantum opiliones soporantur: radix alterius similis, maior & candidior, orbata & hæc caule. Succus fit è cortice recentis radiceis tuso, & prelis subiecto: qui infusus, ubi concreuerit, fictili reconditur. Mâlis quoque succus depromitur, sed aliquantò ignauior. Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad usum suspenditur. Aliqui radices in uino ad tertias coquant, & defæcatum iu seruant, cyathoque vno utuntur in peruigilijs, & doloribus, & ante sectionem



MANDRAGORA MAS.

MANDRAGORA FOEMINA.



nes, vstionesque, ne sentiantur. Succus duobus obolis ex mulso potus, vt veratrum, per uomitio-  
 nes bilem atram, pituitamque extrahit: verum potu largiore vita adimitur. Medicamentis oculari-  
 bus, & his quæ dolores finiunt, pelsis quoque emollientibus, admiscetur: semioboli pondere indi-  
 tus, per se menses, & partus expellit: subditus sedi pro balano, somnificus est. Radix ebur emollire  
 fertur, quæ senis horis cum eo decocta sit: & ad accipiendam quam effingere optaueris formam ip-  
 sum facile præstat. Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus, & collectionibus, quas  
 vlcera citant, cum polenta illinuntur: duritias omnes, suppurationes, strumas, & tubercula di-  
 scutiunt: stigmata sine exulceratione delent, si quinis, senisve diebus sensim perfricentur. Folia ser-  
 uantur in murijs eisdem ad vsus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpentium ictibus ex melle,  
 aut oleo medetur: strumas, atque tubercula cum aqua dissipat: articulorum cruciatus, cum polenta  
 sedat. Fit citra coctionem uinum ex cortice radicis, ad hunc modum. Ternæ minæ in vini dulcis me-  
 teretam coniunguntur. Dantur ex eo terni cyathi, ijs qui secari, aut amburi debent, vt antè dictum est:  
 siquidem nullo tunc afficiuntur dolore, sed ueterno quodam pressi torpescunt. Mâla soporem affe-  
 runt olfactu, & etiam si mandantur: item expressus ex eis succus, nimio tamen odore percussus, ob-  
 mutescent. Semen mâlorum potum vuluas purgat: appositumque cum sulphure ignem non exper-  
 to, rubra scæminarum profluuiâ sistit. Scarificata, punctisque multifariam aperta radice erumpens  
 lacryma, cauo vase recipitur. Liquamentum autem succo lacteo præstantius est. sed non vbique, vt  
 experientia docet, radices lacteum succum delacrymant. Alium tradunt esse mandragoram, nomi-  
 ne Morion, in opacis iuxta specus enatum: folijs albi mandragoræ, minoribus, albis, dodrantali-  
 bus, radicem ambientibus: quæ mollis est, & candida, paulò maior palmo, pollicemque crassitudi-  
 neæquat. Tradunt eam in pane, ossa, obsoniõve drachmæ pondere deuorata, vsum rationis in-  
 tercipere. obdormiscit enim homo, eo ferè quo comederit habitu, sensus impos, ternis quaternisve,  
 ex quo data est, horis. Hac medici utuntur cum scindendi, vrendiue necessitas adest. Antidotum esse  
 uolunt radicem, cum manico solano potam.

MANDRAGORAE utrunque genus frequens nascitur in compluribus Italie locis, præsertim in Apulia  
 Gargano monte, unde radicum cortices, & pomæ herbarij quotannis ad nos conuehant. Habentur & in uiridarijs  
 spectaculi gratia. etenim Neapoli, Roma, & Venetijs utranque Mandragoram in hortis & uasis fictilibus satam ui-  
 dimus.

Mandragoræ  
 utriusque con-  
 sideratio.



Mandragoræ  
humana for-  
ma factitia.

dimus. Sed profectò uanum ac fabulosum est, quòd Mandragoræ radices ferant, quæ humanam effigiem repræsentent, ut ignarum uulgus, & simplices mulierculæ certò credunt, & affirmant. Quibus etiam persuasum est, eas effodi haudquaquam posse, nisi cum magno uitæ periculo, cane qui effodiat, radicibus adalligato, & auribus pice obturatis, ne radicis clamorem audiant effodientes, quòd audita uoce periclitentur, pereantq; sèssores. Quippe rædices illæ, quæ humanam formam referunt, quas impostores, ac nebulones quidam uenales circumferunt, infecundas mulieres decepturi, factitiae sunt ex harundinum, bryoniæ, aliarumq; plantarum radicibus. Scripserunt enim in his ad huiusmodi tam uirorum, quàm mulierum formas infixis hordei, & milij granis, ijs in locis, ubi pilos exoriri uolunt: deinde facta serobe tandiu tenui sabulo obruunt, quousque grana illa radices emittant: id quòd fiet uiginti ad summum dierum spatio. Eruunt eas demum, & aduatas è granis radices acutissimo cultello sciunt, aptantq; ita ut capillos, barbam, & ceteros corporis pilos referant. Huius sanè rei certam fidem facere possum, quòd cum Romæ essem, impostorem quendam circumforaneum lue Gallica correptum nobis curare contigit, qui præter alias immensas imposturas, quibus circumuentis hominibus multam pecuniam extorquent, docuit & artem, qua factitias sibi comparabat Mandragoras, quarum complures mihi demonstrauit, asserens unam tantum interdum diuitibus uendidisse quinque & uiginti, nonnunquam etiam triginta aureis. Quamobrem nos, qui omnium utilitati & saluti quantum possumus consulimus, hæc silentio haudquaquam inuoluenda duximus, ut palam omnibus fiat, quibus fallacijs ac fraudibus maximo cum detrimento, & uitæ sepe discrimine homines ab his impostoribus, & nebulonibus decipiantur. Qui ut antiquorum quoque auctoritate suas imposturas adstruant, prædicant Pythagoram uocasse Mandragoram Anthroponomorphon, quòd eam humanam formam reddere uoluerit. Verum sciendum est, non sine ratione Mandragoram ita à Pythagora dictam fuisse. quippe quòd in uniuersum omnes ferè Mandragoræ radices à medio ad inum bifurcare proueniunt, adeò ut crura hominum modo habere uideantur. Quapropter si eo effodiantur tempore, quo fructum gerunt, qui mālī instar super folia ad terram procumbentia breui pediculo appensus, parum à radice distat, hominis, cui brachia desint, effigiem quadantenus repræsentant. Hanc quidem rem nulli, quòd sciam, uel pauci sunt, qui rescè acceperint. Quin potius plerique huius sententiæ ignari adducti sunt, ut Pythagoræ, & Columellæ id maxime uitio uerterint, ut qui eos de Mandragora fabulosos esse crediderint. Sed ut ad fabulam illam redeamus, quæ periculum denunciat ignaris radices Mandragoræ effodere uolentibus, ijs cane qui effodiat, non adalligato, ea mihi quidem desumpta uidetur à Flauo Iosepho: qui etsi de alio radicis genere scribat, ea tamen potuerunt faciliè ab impostoribus in Mandragoræ radices transferri. Quòd ut omnes clariùs intelligant, hic Iosephi uerba subiiciam, quæ lib. VII. cap. XXV. de bello Iudaico ita scripta sunt. Vallis, inquit, qua ciuitas à parte septentrionali cingitur, quidam locus Baaras appellatur, ubi radix eodem nomine gignitur, quæ flammæ quidem adsimilis est colore, circa uesperam uerò ueluti iubar fulgurans. Accedentibus, eamq; euellere cupientibus facili non est, sed tandiu refugit, nec prius

MALA VVLGO MELANZANE.

manet, quàm si quis urinam muliebrem, uel menstruum sanguinem super eam fuderit. Quinetiam tunc si quis eam tetigerit, mors certa est, nisi fortè illam ipsam radicem ferat de manu pendente. Capitur autem alio quoque modo sine periculo, qui talis est. Totam eam circumfodiunt, ita ut uniuersum ex radice terra sit conditum: deinde ab ea religant canem, illoq; sequi eum à quo religatus est cupiente, radix quidem faciliè euellitur, canis uerò contitnuò moritur, tanquam eius uice, à quo tollenda erat, traditus: nullus enim postea accipientibus metus est. Tantis autem periculis propter unam uim capi eam operæpretium est. Nam quæ nocantur dæmonia, pessimorum hominum spiritus, uinis immersa, eosq; necantia, quibus subuentum non fuerit, hæc cito etiam sitatim modo admoueat agrotantibus, abigit. hætenus Iosephus. Ex cuius utiq; uerbis onuib; perspicuum esse potest, quòd hinc impostores occasionem acceperint, qua postea uanam ac falsam de Mandragoræ radicibus commenti sunt historiam. Ceterum tertium Mandragoræ genus, quòd Dioscorides Morion appellari tradit, in opacis iuxta specus proueniens, qui mihi ostenderet in Italia, hætenus reperi neminem. Brasauolus, itemq; Eucherius Hermolaum immeritò, meo quidem iudicio, damnat, quòd uirum hunc in ea sententia fuisse uelint, ut putauerit mala illa, quæ insubribus MELANZANE uulgò uocantur, nostris uerò Hetruscis Petranciani, esse huius tertiæ Mandragoræ fructus. Sed quòd hæc non fuerit certa ac firma Hermolai sententia, eius uerba abunde testari poterunt, quæ in suis corollarijs de Morio ita scripta inuenio. De Morio, inquit, mandragora nihil habeo quòd addi possit ijs, quæ à Dioscoride notatur. Sed quoniam mala terrestria & canina Mandragoræ fructus appellantur, in mentem subeunt, quæ uulgò Melanzana uocantur, hoc est, ut ipse puto, mala insana: de quibus nihil ueteribus scriptum fuisse iam desino mirari, quòd multa huiusmodi reperio, sicut hercle multa quondam



Hermolai tutela.

Mala uulgò  
Melanzane.



quondam fuere, quæ modò uel ignorantur, uel certè non habentur. Mala ergo insana è frutice uulgari sunt, passim nascente, ut melones, & cucurbitæ: pari quoq; cultu, folijs propè ficulneis: flore oblongo, specioso, candido. Mandatur uulgò pomum ex oleo, sale, pipere, fungorum modo coctum. Hæc ad uerbum Hermolaus. Ex quibus equidem omnibus palàm fieri arbitror, quòd perperam tum Brasauolus, tum Fuchsius hac in re Barbarum insinulauerint.

Sunt è nostratibus, qui Malis insanis uescantur ad uenerem excitandam. Quod fortè ideo præstant, quoniam flatus gignunt, concoctusq; conumacia existunt. Verum cum frequentius manduntur (ut testis est Auicenna) biliosos generant humores. Quinetiam pariunt uiscerum obstructions, carcinomata, elephantiasin, capitis dolores, tristitiam, & iecinoris & lienis infarctus: unde postea diurnæ proueniunt febres, & habitus malus. Hinc itaque fit, ut Auerroen mirari subeat, quòd libro v. collectaneorum, mala insana commendauerit suo quodam modo parata. Iam & aliud horum genus importari cœpit, pressum, orbiculatum malorum modo, melopeponum more sectum, colore primùm uiridi, deinde ubi maturitatem senserit, in quibusdam plantis aureum, in quibusdam uerò rubeum uisitur. Ideoq; uulgò appellantur POMI d'oro, hoc est, mala aurea. Eduntur & hæc quemadmodum illa. Mandragoræ uires descripsit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, his uerbis. Mandragora uincentem habet facultatem refrigeratorem, adeò ut tertij sit ordinis refrigerantium. Verum tamen & caliditatis cuiusdam particeps est, & in pomis humiditatis: proinde soporem conciliandi uim ea habent. Radicis cortex, cum sit ualentissimus, non tantum refrigerat; sed & desiccatur. reliquum quod intus est, imbecillum existit. Hæc planta, quæ Grecis mandragora, Latinis item Mandragoras appellatur: Arabibus, labora, seu Yabrobach: Italis, Mandragora: Germanis, Alraun: Hispanis, Mandracola: Gallis, Mandragore, & Mandegloyre.

Malorum insano-  
rum uires.

Mala aurea.

Mandragoræ  
uires ex Galeno.

Nomina.

### ACONITVM PRIMVM.



### ACONITVM SECVNDVM.



### Aconitum. Cap. LXXII.

ACONITVM, aliqui pardalianches, alij cammaron, alij thelyphonon, alij myoclonon, alij theriophonon uocant. Folia habet cyclamini, aut cucumeris, tria aut quatuor, minora, & subhirsuta: caulem palmo al-

### ACONITVM TERTIVM.



tum:



## ACONITVM QVARTVM.



Aconiti genera, &amp; consideratio.

Dioscoridis locus suspectus.

Gesnerus deceptus.

tum: radix scorpij caudam æmulatur, & alabaſtri modo ſplendet. Torpeſcunt, ut fama eſt, ſcorpiones adnota radice, ſtupentque: qui ruſum ellebori contactu, excitantur. Oculorum medicamentis leuandi doloris gratia adiicitur. Enecat pantheras, fues, lupos, & feras omnes, in carnibus obiectum.

## Aconitum Alterum. Cap. LXXIII.

EST ET alterum Aconitum, quod aliqui cynoctonon, alij lycoctonon appellant. Huius genera tria: vnum, quo utuntur uenatores: alia duo in uſum ſuum uertere medici. è quibus tertium, quod Ponticum nominatur, plurimum in Italia, montibus Iuſtinis exilit, à priore diſtans, quoniam folia facit effigie plarani, crebriore diuiſura, longiora, & maultè nigriora: caulem filicis pediculo ſimilem, nudum, cubitali altitudine, aut ampliorem: ſemen in ſiliquis oblongis recondit: radices in modum ſquillæ marinæ circorum nigreſcunt. Quibus ad uenationem luporum utuntur: intertæ ſiquidem crudis carnibus, & deuorata lupos enecant.

DVO DIOSCORIDI produntur Aconiti genera, quanquam poſtremum triplici diſtinguit differentia. Primum, quod pardos enecat, Pardallanthen: alterum uerò, quod canes, luposq; conficiat, Cynoctonon, Lycoctononq; uocari ait. Hoc (ut diximus) in tria genera diſtribuit: ueruntamen poſtremum tantum deſcribens, duorum priorum hiftoriam, & uires ſilentio præteriit. Quo fit, ut Hermolai, & Marcelli ſententiâ præterea non parum ſuſpicionem auget, quod in tertio genere, quod Ponticum appellauit, nihil ſit ab ipſo Dioſcoride prætermiſſum. ex quo quis fortè conijcere poteſt, in cæteris quoq; cum quicquam non prætermiſſe. Tertium hoc genus paſſim in Italia omnibus ferè montibus naſcitur, folijs quæ platani quadantenus æmulantur, magis tamen per antheras ferratis, albis quibuſdam maculis reſperſis: caule filicis, bicubitali: floribus ſubluteis, acutis galericulis ſimilibus: è quibus ſiliquæ prodeunt, ſemen continentes: radice multiplici, ac nigra. Habetur & aliud genus ipſidem ferè folijs, & caule, floribus tamen melinis, ramunculo non diſſimilibus, longè tamen maioribus, adeo ut ſolueſtes roſas hic æquet amplitudine. Quanquam Geſnerus in ſuo magno libro de animalibus inſcripto (in quem iſt mihi quidam uidetur ut multa uera doctè, ita non pauca etiam falſa ac uana ineptè congeſſiſſe) negat inueniri Aconitum, cuius flores lutei ſint, atque roſas æmulentur: ut qui ſibi fortæſſe perſuaſerit omnia naturæ opera ſe nouiſſe. Attamen in hoc, pace eius dixerim, decipitur: ſiquidem plures extant montes, qui cum hoc Aconiti genere ſeateant, nos hic uera ſcripſiſſe, Geſnerum contra ueritati reſragari, poſteris omnibus teſtatum relinquent. Sunt qui hoc Aconitum ab effectu Lupariam uocent: at rura Tridentina, in quorum montibus copioſè prouenit, ipſum paſſim Vulpariam nominant, utpote quod præter lupos, uulpes etiam interminat. Quin & canes occidit, & feles, & mures, & omnia denique animalia, quæ ſuo exortu tanquam cæca producantur. Primum genus thelyphonon appellatum, quo uenatores pantheras, & pardos interficiunt, ſæpius legimus in Tridentinis montibus. Huius generis eſt & illud, quo utuntur quidam in Romano, & Neapolitano agro, lupis eo tantum cædem procurantes. Radices eius pluries uenales uidimus Romæ in Aurelio ponte iuxta molem Adriani: quandoquidem non deſunt, qui eas expetant ad mures, & canes, & lupos enecandos. Primi generis Aconiti, quod thelyphonon uocant, meminit Theophraſtus libro x. ſcap. xix. de plantarum hiftoria, ubi ita ſcribit. Thelyphonon, quod alij ſcorpionem appellant, quia radicem ſcorpionis effigie. Naſcitur graminis modo, & geniculis conſtat. loca amat umbroſa. Quod ſi uera ſint, quæ de ſcorpione narrantur, iam & reliqua eiufmodi haudquaquam incredibilia, & fabuloſa dici debent. Hæc Theophraſtus de thelyphono. qui alterius quoque Aconiti mentionem fecit cap. xvi. eiufdem uoluminis, ſic inquit. Aconitum naſcitur in Creta, atq; Zacyntho: ſed plurimum, optimuq; in Heraclia Ponti. Conſtat id folio intubaceo, radice tum ſpecie, tum colore nuci proxima. uim illam mortiferam in hac eſſe, folium, & fructum nihil nocere affirmant. Enecat herba eſt, non humilis materiæ: herba ea breuis eſt, & nihil ſuperuacui habens, ſed frumento ſimilis: ſemen non ſpicum.



*Spiceum*. Nascitur ubiq; & non in Aconis solum, à quibus habet appellationem: is autem uicus est Periandinorum. Amat autem loca potissimum saxosa. Pascitur eo neq; pecus, ueque ullum animal. Preparari ad afficiendum modo quodam enarrant, nec nosse quenquam: quoniam componere nesciant, pro putrefactorio uti. Hec ille de secundo Aconiti genere. quod duorum alterum Dioscoridi esse potest, & illud fortasse, quod (ut ipse inquit) in usum suum uertere medici. Sed & de tertio Aconiti genere differuisse Theophrastum equidem crediderim, cum eodem loco paulò post hæc uerba subdit. Aliud quoq; uenenum uim diurnariam euicandi sortiens compertum affirmant: esse uanq; radiculam quandam, quæ eodem die possit occidere: folium hanc habere ellebori, notamq; omnibus esse. hætenus Theophrastus. In quo nihil moueor, quòd huic Aconito, quod tertium suspicor, ueratri folia tribuerit. nam & Dioscorides nigro ueratro folia platani reddidit, quemadmodum etiam tertio Aconitorum generi.

Fuch. error  
Herba Paris

## HERBA PARIS.



herbariorum uulgus HERBAM Paris appellat. Sed is plantæ, mea sententia, aberrat: siquidem hæc uno tantum constat caule, rotundo, duorum palmorum altitudine: è cuius medio quatuor erumpunt folia, eodem ambitu, crucis instar patentia, sanguineæ uirgæ simillima: alia præterea quatuor eodem modo prodeunt prope caulis summitatem, sed hæc minima sunt, & longiuscula: in quorum medio purpureus, uinosusq; extat globulus, acino uuæ similis, in quo semen concluditur album, minutum, copiosumq;, balicacabi modo. Radix, quæ illi subest tenuis, in capillares ferè particulas dissecta, pallefcit, nulla scorpionis caudæ effigie, uel alabastri modo aliqua ex parte nitet, ut primum Aconiti genus à Dioscoride representatur: cuius folia (ut etiam Plinius libro XXVII. cap. IIII. est auctor) præter id quòd cyclamino, aut cucumeri similia sunt, nunquam, quod uiderim, in caulis medio suam habent originem, sed statim ab ipsa radice exeunt, hirsuta, humiq; recumbentia. Semen huic nullum, quod sciam, à rei herbarie scriptoribus redditur. Sed ex herbe Paridis acino semen colligitur, cui non modò nulla deleteria uis inest; sed etiam contra ueneficia præstantissimum est medicamentum. Noui enim ego quosdam, quorum aliqui morborum diuturnitate, alij uerò ueneficij semistulti facti erant, hoc tantum Paridis herbe semine ad uigesimum usq; diem in puluerem hausto drachmæ pondere, pristinae sanitati omnino restitutos esse. Porro idem Fuchsius in suis paradoxis nil aliud Aconitum esse putat Mauritanis, & præsertim Auicennæ, quàm Napellus. Quæ in re rursus, meo quidem iudicio, fallitur. quippe quòd reperio Auicennam de utroq; Aconiti genere scriptitasse, & alterum appellasse strangulatorem adib, alterum uerò strangulatorem leopardi. quæ nomina eadem sunt, quæ apud Græcos lycostonos, & pardalianches: atq; eundem prius magna differetia speciatim de Napello egisse constat. Præterea N A P E L L U S radicem Aconitis longè dissimilem


Fuchsij error  
alius.

Napelli historia, & uires.

profert: scuti & folia, quæ potius artemisiæ, quàm cyclaminum, & platani referunt. Flores idem edit purpureos, qui antequàm dehiscant, mortui hominis caluariam representant, dehiscentes uerò pandunt sese urticæ mortuæ modo. Caules ei bicubitales, & aliquando maiores: semen paruum, nigrum, corniculis conclusum breuibus. Quæ certè omnia & harum plantarum discrimen apertè ostendunt, simul & Fuchsij sententiam refellunt. Hinc itaq; colligendū putauerim, Aconitum cuiusque generis nullam habere cum Napello cognationem. Napelli uis in necandis hominibus adeò immanis, seu iq; existit, ut nullis ferè antidotis occurrì possit, nisi quàm primum, & statim succurratur, quod tamē Aconitum sumentibus non euenit. Napelli immanitatē uidimus nos Rome anno à Christo uato 1524. in mense nouembri in Capitolio Clementis VII. Pont. max. anno primo. Nam cum decerneret experiri olei cuiusdam præstantissimi uires, quod Gregorius Carauita Bouoniensis chirurgicus tuuc præceptor meus contra deleteria medicamēta, & uenenosorum animalium quorumcumq; morsus parauerat, iussit Pontifex uenenum dari duobus latronibus, quos leges damnauerant, quò suorum facinorū poenas luerent, laqueo uitam finire, ut in ijs olei huius experimentū fieret. Horum alterum, qui plurimum Napelli sumpserat dulciarijs panibus comistum, pontificij medici statim oleo inungendum præbent, qui post tertium diem sæpius oleo perunctus enasit incolomis: quinquam non sine magna formidabilium symptomatum accessione. Alterum uerò, cui longè minus uenenati panis exhibuerant, oleo inungi uetant, ut assumpti ueneni effectum, scutiamq; cernerent. Id quod illis rei exitus facile comprobauit: quandoquidem paucis post horis obiit infelix, ijs omnibus incommodis cruciatibus, & symptomatibus correptus, quæ ab epoto Napello prouenire scribit Auicenna. Caterum idem quoq; Fuchsius loco supra citato Leoniceum testimonio uixus, in Auicennā acerrimè innecatur: nec sanè eum, ut nostri recentiores, principem, sed tyrannum, & homicidam uuncupat, eosq; pariter detestatur, qui eius sectantur doctrinam. quippe quòd Auicenna scripserit (ut ipse inquit) Napellum perniciosum esse uenenum: mox subdidit, quòd linitum, & bibitum delet albas cutanei morbi genus. Quæ in re nō possum non admirari Fuchsium,

Auicennæ de  
fensio.





Fuchsum, uirum aliqui ingenio & eruditione clarum, quem etiam hoc nomine plurimum diligo, quod in tam celebrem & antiquum scriptorem paulo acrius, & immodestius egerit. Hominum etiam eruditorum partes esse semper existimaui, etsi ego eas usquequaq; seruare non potuerim, ut non uanis contentionibus, neq; conuitijs aliorum scripta resellant, sed rationibus, ijsq; probatissimis, praesertim cum eos accusant, qui multis ante saeculis e uita decesserunt, nec amplius a calumnijs se tueri possunt. Qui praeterea considerare debent, an in quo aliquem reprehendant, in eo propius sit auctoris lapsus, an interpretis, aut librarij, antequam ulli iurgijs potius, quam rationibus inuadant. Quippe relictis tam Mauritanorum, quam Graecorum sectis, quarum uni magis quam alteri addictus esse nolo, mihi quidem non uidetur existimandum, quod Auicenna uir sane singulari doctrina, & admirabili ingenio ab omnibus recentioribus nostris maxime commendatus, eodem in loco sibi omnino contraria scripserit in ueneno tam seuo, cui exitiales formidandasq; uires tribuit. Cuius rei firmissimum praebet indicium scriptura Auicennae ab Andrea Bellunensi castigata, in qua nusquam legitur Napellum bibittu albaras delere, sed quod hoc efficit quaedam eius confectio in potu sumpta. Verba enim Auicennae secundum castigationem Bellunensis ita sonant. Napellus delet albaras linitum, sicut & confectio eius dicta alberzacali in potu sumpta. Ex quibus uerbis plura mihi sese offerunt conicienda, ut tuear Auicennam, aut quod confectio illa tam exiguum Napelli partem excipiat, aut ea, quam recipit, adeo antidotis correctam sit, ut non solum necem non inferre possit, sed ne tantillum quidem obesse. Aut quod Napellus in illam additus, is forte est, quem Auicenna appellat Napellum Moysi, aliqui uero Antoram. quandoquidem haec planta antidotum sit admodum efficax contra Napelli uenenum, praesertim quod dicat Auicenna, inesse similiter huic plantae uim ad albaras, & lepras. aut in eadem confectioe fortasse mus ille interponitur, qui Napelli radicibus uictit, a nobis pluries inuentus in Ananiensibus montibus, quod etiam mus iste Napellus Moysi ab Auicenna dicatur, quoniam iisdem contra Napelli uenenum polleat uiribus, quibus & eiusdem nominis planta. Haec fortassis fusius, quam decebat, persecuti sumus. Deo tamen eo consilio id libenter fecimus, primum ut quantum per uos fieri posset, Auicenna a calumnia uindicaretur. Sed inde ut ingenue dicerem quod de ijs omnibus sentio, qui optimos etiam quosq; auctores, praesertim Arabas, lacerant ac discerpunt, quorum plerisque magna est habenda gratia: tantum adest ut eos odio perpetuo prosequi debeant. Verum cur id faciant, non uideo, nisi quod tutum sit in mortuos inuehi, quando hodie pauci sint, qui eos tueri uelint. Ceterum existimarunt Manardus Ferrariensis, & Leonicens, quod Napellus, & Toxicum Graecis uocatum inter se non differant. Sed quantum & isti uiri grauissimi aberrauerint, inferius libro sexto in toxici mentione latius ostendemus. Aconitorum uires tradidit Galenus libro vi. simpl. medicam. ubi ita scriptum reliquit. Aconitum parum lianches putrefaciendi facultatem obtinet, & lethale est. Itaq; in cibo potuq; fugiendum: attamen ad putrefaciendum externas corporis partes, aut circa sedem idoneum est. Herbae uero radix ad haec utilis est. Quod autem Lycos non



Aconon uocatur, similem alteri facultatem habet, sed peculiariter lupos, sicut illud pardos, interficere cōsuevit. Hæc Galenus. Meminit Aconiti etiam Plinius libro XXVII. cap. 11. his uerbis. Sed antiquorum curam, diligentiamq; quis possit satis uenerari, cum constet Aconitum uenenorum omnium ocysimum esse, & tactis quoque genitalibus foeminei sexus animalium, eodem die inferre mortem? Hoc quoq; tamen in usus humanæ salutis uertere scorpionum ictibus aduersari experiendo datum in uino calido. Ea est natura, ut hominem occidat, nisi inueniat, quod in homine perimat. Cum eo solo colluctatur, uelut pari intus inuento. Sola hæc pugna est, quum uenenum in uisceribus reperit: mirumq; exitalia per se ambo quum sint, duo uenena in homine cōmoriuntur, ut homo supersit. Torpescunt Scorpiones Aconiti tactu, stupentq; pallentes, et uinci se confitentur. Auxiliatur eis Helleborum albū tactu resolvente, ce dirq; Aconitū duobus malis, suo, et omnium. Quod si quis illa fortē ab homine excogitari potuisse credit, ingrātē Deo rum munera intelligit. Aconiti primum genus Græcē uocatur ἀκόνιτον παρδαλιανχῆς: Latine, Aconitū interficiēs pardos ac pantheras: Italicē, Aconito pardalianche: Germanicē, Vuolffs beer, et Doll uurt: Hispanicē, Centelha: Gallicē, Herba de la tora. Alterū uerō genus Græci ἀκόνιτον κυνοκτόνον dicūt: Latini, Aconitū cynoctonū et Lycocctonū Itali, Acouito cynoctono: Germani, Vuolffs uurtz: Hispani, Yerua mata lono, et Yerua de balhesteros: Galli, Paté-louine.

## Appendix.

CONRADVS Gesnerus hæc ætate eruditione, ac copia rerum clarissimus medicus suo, quem de raris, & admirandis herbis appellauit libello, de primo Dioscoridis Aconito disserens, quod ipse uulgus sequutus Toram appellat, non solum imaginem nostram in huius capitis initio appictam pluribus impugnare nititur, sed (ut arbitror) inuidorum potius quorundā suasionibus, quā sui ipsius genio excitatus cō inmodestia, iniuriarq; peruenisse demonstrat, quod haudquaquam decere crediderim honestos quosque viros desistere. Quamobrem non possum non admirari, Gesnerū, quem hæc tenus modestissime de omnibus scripsisse constat, nunc primum longē aliter se gerere, præsertim cum certō sciat se iam plura magna edidisse volumina, quæ censuris innumeris nō uacabant. Ecquid profectō turpius, detestabiliusq; Gesnero euenire potuit, quā in infidelitatis illum arguere hominem, cuius auctoritas, integritasq; tanta iandudum fuit apud ipsum, ut innumeris ferē locis in libris de animalium historia, alijsq; voluminibus non solum illum laudauerit, probauerit, ac etiam obseruauerit, sed illius scriptis, inuentisq; pro sui commodo usus sit, ac multa illi accepta referre possit? Etenim non abest suspicio, quin eius sinceritatem uaser qui ipsam labefactauerit maleuolus, (nam & alios synceros, ac probos viros ab ipso deceptos scimus) quo postea factum sit, ut dum is immeritō nostram accusat imaginem, aconito pingit: de quo Dioscorides, & antiquorum alij meminere, nullis prorsus notis legitimū illud Aconitum reserat. Aded ut à genuino non minus differre videatur, quā coruus à cygno. Nam ubi hirsuta folia? ubi Cucumeris, aut Cyclamini facies? ubi plura quā vnū tantū solum? ubi rādx caudæ Scorpionis æmula? ubi (Dij boni) zia-bæstri splendor? Nullum penitus talium notarum apparere vestigium. Quamobrem plurimū mirari subit, quod quasi falsitatus maluerit Gesnerus imperitissimi olitoris, cuius balistæ se telum effecit, contra nos probare sententiā, quā Theophrastum, Dioscoridem, Plinium, Oribasium, & alios quot quot sunt clarissimi nominis auctores admittere. Ad hæc non video, cur ea ratione adducatur Gesnerus, ut non putet imaginem nostram nisi fictitiā, quod scilicet nimis artificiosa sit radix, & quod absque vllis videatur fibris, quum aliarum etiam plantarum habeantur radices omnino glabræ, & editæ longē maiori; ut in Dentaria uocata, & in eo Saniculæ genere, quod album Germani vocant, cuius superius inter symphyta meminimus, uideri potest. Sed dicat Gesnerus, obsecro, quot nam in suis de animalibus libris ficticia appinxit imagines? longum sanē esset recensere. Recensebo fortasse alias. Quippē nil minus ferendum, quā rationem ab altero reposcere eum, qui suæ reddere non possit. Sunt enim in promptu doctissimi viri, & in plantarum historia, ac facultate exercitatissimi, qui rerum ueritatem optimē norunt, quorum nomina, etsi copiosum non efficiāt numerum, satius mihi fuerit ijs commendati labores nostros, quā à cæteris improbari. Equidem Gesnero alioqui viro doctissimo nostri Aconiti stirpem mittere possem, nec me tæderet ad montes illos me iterum recipere, licet magna intercedat itineris distantia. Atqui quum plantam non requirit, sed duorum, aut trium eruditorum testimonium, hæc semper in promptu erunt. Vniit Georgius Liberalis pictor, qui plantam delineauit; Viuit Petrus Spezzalancia, qui eam effudit; Viuit Franciscus Melchiorius medicus Tridentinus, qui nobiscum ierat. Viuo ego (Dij boni) qui adhuc fidei aliquid prestare possum; & montes viuunt, & extant, qui tales nobis alunt plantas. Mirum sanē, quod iam tam morosi sint homines, ut nil aliud extare terris, maribusq; censeant, quā quod ipsi tantū viderint. Verū enim uero non possum satis explorare Gesneri mentem, quippē qui hæc, & alia nonnulla aduersum me prius scripserit, & nunc primum nos honestē benignēq; defendit aduersus Guilandinū quendam Borussū, qui ad ipsum epistolam quandam scribens de Bulbo Castaneo, Trasis, Moly, alijsq; nonnullis barbara quadam inuidia fauciatus citra causam omnem, ac rationem temulentis hominis instar, acrius, inmodestiusq; quinetiam iniquius quā par fuerat, in nos inuehitur. Sed licet etiam nobis, obsecro, parumper vnā cum Gesnero, quem tamen suis maledictis fautorem sperabat, tam impudentis hominis rabiem repellere. Nam quis hoc pati possit? Quis non modestiæ fines prætergrediatur, ubi tantum contumelijs, calumnijs, & imposturis fuerit laceratus? Nihil est, quod bono, doctoq; viro grauius, molestiusq; contingat, quā si senserit labores suos ab imperitissimis hominibus rabidis moribus carpi, & præter equū impugnari. Id quod autem nostrum tantum xuo, aut mihi soli euenire perspectum habere, dolerem primum horum temporum nequitiam, inde uerō fortunam meam deplorarem. Verū quum id omni tempore fuisse commune animaduertam, eamq; fuisse semper bonorum, doctorūq; virorum conditionem nō ignorem, ut inuidorum tela euitare, rabiemq; effugere neuti quam possint, facili æquo animo patior quorundam audaciam, inūgenq; temeritatem. Inter quos nulli mihi secundus uidetur Borussus ille, quem potius (ut ita dicam) Marasum uocauerim. Quid? Mihi blatero inuidiā parare credit, quod me herbariorum Deum appellat? An nescit rabula, non aliam ob causam labores nostros in omnium ferē studioforum manibus florescere, & legi, laudari, foueri; ab omnibus, quā quod ij de re herbaria benemeritum me indicent? quinetiam ob id mihi tantas agant, habeantq; gratias, quantas mihi uix meritis esse uideo? At qui is, tamen istultissimus sit, in hoc tamen (me hercule) sapere uidetur, quod corium illud suum tanti faciat, ut Matthioli pelli antefereat præterio. Quippē nisi proprio fuerit adiutus corio, parum aberit, quin liuoris intumescencia rumpatur medius. At uideant candidi, pijq; lectores, qua hypocriti inceptis in nos inuehi Guilandinus, quum primum inquit. Non is sum, qui cauillis, & imposturis inanem gloriolam aucupari uelim. Mentiri nescio, nec si scirem, uelim, quum tamen nil magis proficere, quā calumnijs, maledictis, & imposturis sinceritatem, & modestiam nostram impugnare; & id me scripsisse asserat, quod nusquam in nostris legitur commentarijs. Sed nescio quomodo turpiora sint uitia, quā quæ uirtutum specie celantur. Porro si quandoque fortasse nonnullas bonas horas malē consumpsero, ut huic impudentissimo

Cōradi Gesneri calūnia recurritur.

Gesneri lapsus.

Gesnerus notatur.

Matthioli testimonia aduersus Gesnerum.

Melchioris Guilandini explosa temeritas.



## CICUTA.



conuitoriatori respondeam (id enim hic non expostulat locus; ne frivolis inutilitate, & frivolis ineptijs nostra descendatur commentaria) rogatos velim studiosos omnes, ne id à me factum putent, ut aliquam mihi exinde laudem requiram, quæ nulla mihi tam diu esse potest, quam diu cum homine tam impudenti negotium est: qui tanquam lulentus sus cum quovis volutari cupit, sed si quam ille maledicendo voluptatem accepit, eam malè audiendo amittit; cæteri; eius simillimi apertè omnes intelligant, plus esse bonis, eruditissq; viris in se defendendo præsidij, quam vanis obrectationibus in calumniando fraudis.

## Cicuta.

## Cap. LXXIII.

CICUTA caulem edit geniculatum, ut sceniculi, grandem: folia ferulæ, angustiora, graui odoratu: rami, mox umbellæ in summo prodeunt: flores quoque albicantes, & semen aniso candidius: radice non alta, concava. Cicuta lethale venenum inest, sua; ui refrigeratoria necat. Remedio est uini meraculi potus. Succus exprimitur contusis caecuminibus, priusquam semina, & comæ siccescant, qui sole densatur in pastillos. Multus ad medendi rationem usus est aridi: commodè miscetur collyrijs, quæ leuandi doloris gratia temperantur: ignes facros, & ulcera quæ serpunt, illitu restinguit. Herba cum coma trita, & testibus circumlita, libidinum imaginationes in somno compefcit, sed genitale resoluit. Iac puerperarum mammis apposita extinguit: in uirginitate manens eo ceter, & increfcere non patitur. pueris præstat, ut eorum testiculi cibum non sentientes intabescant. Efficacissima uis Creticæ, Megarensi, mox Atticæ, & in Chio, & Cilicia nascenti.

Cicutæ confectio.

## TAXUS.



Cicutæ vires ex Galeno.

Nomina.

CICUTA uulgaris notitiæ est planta, utpote quæ plerumq; prope urbium, & oppidorum moenia proueniat, ferulæ adsimilis, odore tamen admodum graui. Maxima uis Cicutæ, ut Plinius refert, quæ nascitur in terra Parthorum, mox Laconicæ, Creticæ, Asiaticæ. In Græcia uerò Megaricæ, deinde Atticæ. Cæterum in Italia constat Cicutam non adeo exitialem esse. Eam in Hetruria si asini depascantur, profundissimo somno, & torpore capiuntur; ita ut non tantum stupidi, sed plane mortui uideantur. Id quod aliquando rusticos huius rei ignaros fecit: nam dum asinos, quos mortuos credebant, pellem ad usum detraherent, accidit mirum, quod in medio seræ operis asini experrecti sunt, non sine magno excoriantium terrore, atque ingenti spectantium risu. Cicutæ breuiter meministi Galenus lib. vii. simplic. medic. ubi tantum omnibus notum esse scribit, quod ea extreme refrigerantis sit facultatis. Et in libro quod animi mores corporis temperaturam sequantur. Cicuta potu illam fieri amentiam tradidit, quam à Cicutâ ipsa Græci contion appellant. Hoc uobis contigit uidere, ut latius libro sexto explicabimus, in quibusdam, qui imprudenter Cicutæ radicem pastinacæ uice decoctas comederant. Planta, quæ Græcis ξαίον, Latinis atq; etiâ Italis Cicuta uocatur: Arabibus, Sucarâ: Germanis, Ziger Kraut, Schirling, & Vuetterich: Hispanis, Cezguda: Gallis, Cigue, Cocue, & Segue.

## Taxus.

## Cap. LXXV.

SMILAX à Græcis, Taxus à Latinis appellatur, arbor abietis magnitudine, & foliorum eiusdem figura, in Italia, & Narbonensi Gallia Hispaniæ contermina nascens. Auiculæ quæ Italicæ taxi baceas deuorant, denigrantur: & qui ederint easdem homines, alii profluo corripuntur. Narbonæ tam præsentis est ueneni, ut si qui dormiant



dormiant sub ea, aut in eius umbra subsideant, lædantur, & sæpenumero moriantur. quare de taxo hæc traduntur, ut ab ea caueamus..

**N A S C I T V R** Taxus frequens in Ananie uallis montibus, saxosis ac prerruptis locis, inter abietes, & piceas, quibus folio, ac forma non longè dissimilis uisitur: quanquam hæc illarum proceritatem non nisi rarissimè æquet. Baccæ fert rubentes, agrifolij modo, dulces, uinosasq;: quas quandoque mandentes tum pastores, tum qui in syluis arbores cædunt, statim in fibres incidunt, & dysenterici sunt, sanguine & spiritibus inde admodum inflammatis. Lignimateries, quod rufescat, quàm plurimis intercurrentibus uenis, incorruptaq; sit, lignarijs fabris maxime expetitur, & plurimi sit, præsertim concinnandis mensis, & hastis, telisq; conficiendis. Quamobrem Germani huius arboris afferes ad sua construenda hypocausta non exigua sibi comparant pecunia. Taxus meminit Theophrastus libro III. cap. x. de plantarum historia, sic inquit. Taxus quoque genere simplex, proceræ, auctu insignis, similiq; abieti, nisi quod non pariter excelsa, magisq; alis sinuata est: folio quoque Abieti similis, sed pinæ uolior, molliorq; ligno. Quæ in Arcadia nascitur, nigro ligno, aut puniceo constat: quæ autem in Ida, flauo admodum, & cedro simili. propter quod uendentes fraudare dicuntur, tanquam cedrum uenundent. Totum enim cor esse, cortice detracto: corticem similem cedro habere tum scabritia, tum colore: radices breues, graciles, per summasq; cespitum. rara hæc circa Idam. At in Macedonia, Arcadiaq; uel fructum abunde proferre, rotundum, fabæ paulo maiorem, colore rufum, tactuq; mollem. Aiunt, quod si inuenta folia comederint, emoriuntur: si ruminantia, nihil patiuntur. Fructus & ab aliquibus hominibus manditur, suauisq; est, atque innoxius. hætenus Theophrastus. Cuius sententiæ illud ob stare uidetur, quod nostra Taxus fructum ferat non innoxium, ut ipse ait, sed noxium, ut supra diximus. Taxi Plinius quoque meminit lib. xvi. cap. x. ubi de ea ita scribit. Abieti, & piceæ similis est, minus uirens, gracilisq; & tristis, ac dira, nullo succo, ex omnibus sola baccifera. Hæc noxio fructu: lethale quippe baccis, in Hispania præcipue, uenenum inest. Vasa etiam uiatoria ex ea uinis in Gallia factis mortifera fuisse compertum est. Hanc Sestius simlacem à Græcis uocari dixit: & esse in Arcadia tam præsentis ueneni, ut si qui dormiant sub ea, cibumue capiant, moriantur. Sunt qui & toxica hinc appellata dicant uenena, quæ nunc toxica dicimus, quibus sagittæ tingantur. Repertum innoxiam fieri, si in ipsam arborem clauus æreus adigatur. hæc Plinius. Foliorum fumo mures necantur. Taxi præterea nocumenta tradidit Dioscorides lib. sexto, ubi de noxijs medicamentis pertrahat. quò cum peruentum fuerit, de ijs diffusius nobis differendum erit. Taxi uires quàm paucis reddidit Galenus lib. viii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Smilax, aut taxus arbor est ueneno sæ facultatis. Huic arbori nomen Græcum est *quixaz*, Latinum, Taxus: Italicum, Tasso: Germanicum, Eiben baum: Hispanicum, Texo: Gallicum, Yf.

Taxi confideratio.

Taxi historia ex Theophr.

Ex Plinio.


Taxi uires ex Galeno. Nomina.

## Apocynum.

## Cap. LXXVI.

**A P O C Y N O N**, siue cynocrambe, brassica canina, frutex est longis uiticulis constans, malè olentibus, lentis, vitiliumque modo obsequiosis, fractu ferè inuictis: folio hederæ, molliore tamen, & per extremum acutiore, lento, graui odore: id luteo succo turget. Siliquæ ceu fabarum folliculari specie, digiti longitudine protenduntur: semine intus duro, paruo, nigro. Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, vulpes, & pantheras enecant, in cibo data, & protinus eorum coxendices resolunt.

**A P O C Y N O N**, quod & Brassicam caninam appellant, Apocyni consideratio. etsi iandiu mihi quidè incognita fuerit, adeò ut inter alias incomptas stirpes in amplissimo naturæ uiridario posteris reliquerim explorandum; hoc tamen anno è Pisis medicus eruditione, & in re herbaria clarus, Lucas Ghinus Forocorneliensis duas ad me misit plantas, quarum una per omnia Dioscoridis Apocynon representat. Scribit enim uir ille, duas à quodam nobili antico siliquas dono accepisse è Syria allatas, quarum alteri inscriptum erat Periploca repens, alteri uero Periploca non repens, fortasse quòd ita Syriæ plantas non inuent. Subdit præterea, has siliquas rhododendri siliquis admodum fuisse similes: inter quas tamè hæc erat differentiæ, quòd repentis Periplocæ siliqua ea sanè longitudine constabat, quæ et rhododendri, gracilior tamen erat: alterius uero breuior. E longiori sata plantam prouenisse ait, quæ nò modo humi repit; sed et arbores quantūuis proceras scādit: è breuiori uero aliā, quæ notis omnibus Apocynon refert. Vtraq; porò nò minus lacte turget, ut scribit, quàm tithymali omne genus: uerum id repenti omnino album inesse: non repenti uero suberocum.





Apocyni vi-  
res ex Gal.


**Nomina.**

544 AND. MATTHEOLI COMM.

ceum . Hinc itaque fit , ut huic uiro planè subscribam , & alteram , cui omnes prorsus notæ adamusim adstipulari uideantur , Apocynon esse certò credam . Neq; hanc facile mutabo sententiam , nisi aliam plantam proferri uidero , quæ clarioribus notis , quàm hæc , cuius picturam exhibemus , Apocyni faciem exprimat . Apocyni uires memoria prodidit Galenus lib. vi . simplicium medicamentorum , sic inueniens . Apocynum , aut Cynocrambe . Vocant autem quidam eam Cynomorum , quandoquidem canes celerrimè interimit , sicut Lycostonon lupos . Est autem hominibus uenenum , herba multum grauiter olens : proinde omnino calida est non infrenuè , non tamen proportionè desiccata . Itaque illi ta admodum digerentis est facultatis . Quæ planta ἀπόκυνον Græcè , Apocynum item & Brassica canina Latine dicitur : Italicè , Apocino .

Nerium, siue Rhododendron.

Cap. LXXVII.



Nerij confi-  
deratio

NERION aliqui Rhododaphnen, alij Rhododendron uocant. frutex est vulgaris notitiæ, longioribus quam amygdala folijs, crassioribusque: flore in rosam conformato: fructu amygdalæ simili, corniculato, qui patefactus quandam lanosam naturam ostendit, spinarum pappos representantem: radice longa, acuta, lignosa, gustanti salsa. nascitur in amœnis, maritimis, & secus amnes. Flores; & folia mulis, canibus, alumnis, & quadrupedum plurimis uenena sunt: hominibus uerò contra serpentium morsus præsidia, è uino pota, cò magis ruta addita. Imbecillæ etiam animantes, ut pecus, & capræ, si aquam bibant, in qua folia ea induerint, moriuntur.

NERIVM, quodd flores rosarum effigie proferat, lauri-  
nisq; folijs constet, Græcorum quidam Rhododendron, alij Rho-  
dodaphnen appellant. Italis Oleandro vulgò dicitur. Vidimus  
nos hoc primum ad Benaci ripas, & in Argentario promonto-  
rio in maritimis nostris. Planta est lauri facie, spectabilis, & vis  
su non iniucunda, præsertim cum roseis emicat floribus. Horum  
similitudine deceptus quondam fuit Lucius Apuleius sub asini me-  
tamorphosi, dum rosas quæreret, quarum passu in pristinam  
formam restituendus erat. Nam cum procul uidisset Nerium suis  
floribus refertum, ratus eos esse veras rosas, eo aperto ore ac-  
currit tanta aviditate, ut parum defuerit, quin eas primo occu-  
su imprudens deuoravit. Verum is, ut qui in plantarum histo-  
ria, & uiribus earum indagandis diligentissimus auctor exiit,  
non immemor Nerij flores depastos asinis venenum præsentæ-  
reum esse, ita deceptus labra submouit, demissiq; ad terram at-  
Nerium, ut

Nerij vires  
ex Galeno.

Conciliatio  
Dioscoridis  
cum Galeno.

Nomina.

ribus abijt. Nerij uires descripsit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Rhododaphne notus omnibus est frutex. Foris quidem corpori illitus, discutiendi uim obtinet. Intrò autem in corpus assumptus, perniciosus, ac uenenosus non tantum hominibus est; sed plerisq; etiam pecudibus. hæc Galenus. Quæ maxime repugnant Dioscoridis, & Plinij placitis: quippe qui Nerium potum commendauerint hominibus contra serpentium uenenosorum morsus. Nisi dicere uelinus, quòd Nerium sumptum secundum Galenum sit hominibus non demorsis perniciosum: secundum uerò Dioscoridem idem ijs remedio sit, quos serpentes momorderint. Idq; ex ratione fiat, quæ & cantharides (ut inquit Auicenna) à cane rabido demorsis medentur, & euphorbium à scorpionibus ictis, & alia deniq; lethalia medicamenta alijs item uenenis aduersantur, ut inferius libro sexto latius dicetur. Sic quidem mihi non uidetur uerisimile, quòd præter rationem id prodiderit Dioscorides in simplicium materia omnium facile princeps. Νέριον, ποδὸ δάφνον, & ποδὸ δένδρον sic Græcè planta dicitur, quæ Latinis pariter Nerium, & Oleandro: Gallis, Rosagine.

## Fungi.

Cap. LXXVIII.

Fungi. Cap. LXXVIII.

FUNGORVM differentia duplex: aut enim manduntur, aut perniciales sunt. Multis de causis venenosi gignuntur: vbi videlicet clauus ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcor adhaerit: aut si iuxta serpentis cauernam, arborésve, quæ priuatim pariunt noxios fructus, erumpant. Continent qui tales sunt, nescio quod strigementum, concretamque pituitam, terraque eruti, quam celerrimè computrescunt, atque marcore vitiantur. Sed qui veneno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiam habent: largius tamen sumpti nocent, & ægrius concocti strangulant, aut chole-



ram morbum citant. Remedio est nitri potus, aut lixiuum cum acida muria, aut feruefactæ satureiæ, aut origani iusculum: debellantur etiam gallinæ fimi potu ex aceto, aut eiusdem delinctu cum melle multo. Corpus alunt, sed ægrè dissoluuntur, cum magna ex parte integri ipsi cum recrementis alui deiciantur.



TAM ET SI duo tantum Fungorum genera hic uideatur recensere Dioscorides, ad fungos duntaxat innoxios, perniciæ respiciens; tamen, ut omnibus palam est, plura ac diuersa eorum, quæ in cibis expetuntur, discrimina notantur. Horum inter omnes Italiæ regiones feracissima est Hetruria, ubi illi Fungi cæteros antecellunt, qui uulgo dicuntur Prignoli: ij siquidem singulis annis Aprilis imbribus erumpunt, neq; solum odorem eximium spirant, gustuq; gratissimi sunt: sed etiam omnino innocui habentur. Secundum uero locum apud nostros Hetruscos tenent ij, qui uulgo Porcini, hoc est, suilli nuncupantur: quippe qui prius elixi, ac demum farina circumliti, et oleo uel butyro frixi, magnam cum palato incant gratiam. Verum hi non adeo tuti sunt, quod in suo genere perniciosi plures, quam in alijs reperiantur. Cæterum periculosi ac malefici à peritis, et oculatis uiris facile dignoscuntur, cum à tera et cortice purgantur, incidunturq; decoquendi. Nam cultello dissecti illico (ut Plinius inquit) dilutus eius aduenit rubor, rancidus subinde aspectus, liuidus intus color, rimosa stria, pallidum per ambitum labrum: postremo accedit nigredo, et ita protinus computrescunt. Quamobrem recte scribit Auicenna libro IIII. sen VI. eos nocentiores esse, qui nigri, uel uirides, uel in nigro purpurascetes uisuntur. Proinde amens quidem, et planè stupidis, et imperitis, qui tam repentinas mutationes uiderit, et non cognouerit bis notis eorum uirus patefieri. Sed accidit plerumq; ut illos potissimum Fungi interimant, aut saltem in magnum discrimen adducant, qui eos super ferrea craticula, aut prunis, calentibusq; cineribus affatos deuorant. Hoc enim modo decocti, cum in taleolis non secuntur, non tam facile cognosci possunt, ut ij qui dissecti parantur. Ad hæc non semper officiant Fungi, quod per se lethiferi sint, sed quod copiosius, quam par sit, ingerantur. Quandoquidem cum leni admodum, crassissimiq; succi existant, arte uariarum oscula usque adeo obstruunt, ut cõclusis intus spiritibus suffocent. Quod cum probe norint agrestes in Hetruria mulieres, rarissime fungos mandunt, nisi allio, et pipere adiectis. Asseruantur Fungi muria, præsertim qui uulgo Porcini dicuntur: namq; hoc modo parati innocentiores redduntur amisso lentore. Præter hæc multa alia fungorum genera apud nos inueniuntur, ut ij qui nobis uulgo appellantur Prataioli, Turini, Boleti, Orcelle, Cardarelle, Maxine, Ordinali, Parigiole, Vescie di lupo, et complura alia, quæ, cum nihil uel parum ad rem faciant, silentio inuoluenda duximus. Cæterum Fungi non tantum humi proueniunt, sed et in arborum caudicibus, qui omni ferè periculo vacant (dummodo non sint arbores noxiæ) quod è cortice profiliant, cui nec ferrum, nec tabefactus pannus, nec serpens cadauer subesse potest. Ex hoc genere quidam, præter agaricum, laricibus inascuntur in Ananienfibus montibus triginta librarum pondere, aureo colore, per ambitum dissecti, in cibis gratissimi, nullo amarore præditi, licet agaricus ab eadem arbore productus sit amarissimus. Hic certe mirari subit, quod tanta hominibus inferitur gula libido, luxur, et incontinentia, ut adeo inconsulto, auideq; fungis uescantur, in quibus sæpius immatura mors delitescit. Tanta hodie intercessit gratia Fungis cum mensis in Italia, ubi eorum frequentissimus est usus, ut Neapoli inuenti sint lapides, qui defossi, et in cellis uinarijs translati, terra aliquantulum operiti, et subinde tepida aqua inpersi, intra quatuordecim dies non ingratos procreant. Hos et Romæ, et Neapoli uidimus, ubi magna seruantur diligentia, nempe quorum merito quolibet tempore fungos edant. Sunt et lucernarum Fungi, qui in elychnio sunt, præsertim cum aer humorem contraxerit, et ad pluuiam præparatur. Fungus itaq; lucernarum, meo quidem iudicio, fuerit is caryæ bonis globulus, qui fungi faciem representans, in elychnij extremitate concreuit, et flammæ lumen obumbrat. Neg; enim in hoc subscribam Cornario, uiro alioqui ingenio et doctrina celebri, qui in commentarijs, quos inter alia Galeni librum de compositione medicamentorum secundum locos edidit, censet fungum illum esse elychnium lucernarum ex quodam fungi genere factum, quod facie (ut ipse inquit) marinas emulatur spongas. Siquidem apud ueteres nusquam me legisse memini, è fungis elychnia fieri: cum tamen legerim apud Virgilium, et Plinium, cum fungi generantur in lucernis, futura pluuiæ esse præsagium. Namq; Virgilius libro primo Georgicorum, ubi futura pluuiæ signa recenset, id apertissime testatur, ijs carminibus.

Fungorū genera, & consideratio.

Fungorū alia genera.

Fungi lucernarum.

Cornarij opinio explosa.



Tum cornix plena pluuiam uocat improba uoce,  
Et sola in sicca secum spatatur arena.  
Nec nocturna quidem carpentes pensa puellæ  
Nesciuere hyemem, testa cum ardente uiderent  
Scintillare oleum, & putres concreescere fungos.

Fungi corpo-  
ris affectus.

Fungorum vi-  
res ex Gal.

Nomina.

Eorum porro generationis causam scite quidem reddidit Seruius Grammaticus in commento hisce uerbis. Nam (ut inquit Plinius) cum aer humidus esse coeperit, fauilla, quæ cum fumo solet egredi, prohibita aeris crassitate in lucernis residet, & quasdam uelut fungorum imitatur imagines. hæc ille. Sed præterea ipse Plinius Virgilio, & nobis quoque ad stipulatur lib. xviii. cap. ultimo, cum ita scribit. Palladi nanque ignes, murmurantesq; tempestatum muncij sentiuntur: pluuiæ etiam, si in lucernis fungi. hæc Plinius. Ex quibus omnibus luce clarius fieri puto, hæc in re Cornarium cæcutiuisse. Fungi præterea apud Hippocratem & Galenum lib. & comm. iij. de morbis uulgaribus, sunt excrecentiæ, quæ quandoque in palpebris, quandoque in pudendis enascuntur. Quin & Fungi dicuntur à Galeno lib. i. de locis affectis adnascencia capitis, ubi hoc fracto, meninx, quæ est membrana cerebrum custodiens, fuerit affecta. Nec alia sanè de causa hos affectus uocant, id est fungos, uocari crediderim, quàm quòd fungorum imaginem referant: quemadmodum et ij qui in lucernis concreescunt. Fungorum uires memoriæ prodidit Galenus lib. viii. simplicium medicamentorum, sic inquit. Fungus frigida, humidaq; admodum planta est. quamobrem etiam proximè ad deleteriam, enecantem uel facultatem accedit: & sanè inter eos sunt qui interficiant, potissimum qui ex natura mistam habent qualitatem putredinosam. Et libro secundo de alimentorum facultatibus, idem de fungis ita differit. Inter fungos Boleti, si bellè in aqua elixi fuerint, propè accedunt ad cibos insipidos. Non tamen sic solis ipsi uulgo utuntur, sed adparant uariè & condiunt, ut alia omnia, quæ nulla insigni qualitate sunt prædita. Alimenta autem ex ipsis est pituitosum, & frigidum uidelicet, prauiq; est succi, si quis ipsis largius utatur. Omnium igitur fungorum ij minimum sunt noxij. Secundi autem post hos sunt Amanitæ. Reliquos uerò tutius est omnino ne attingere quidem: multi enim ex ipsorum esu interierunt. Equidem noui quendam, cui post Boletorum non satis elixorum (qui innocentissimi esse putantur) usum largiorem, os uentriculi pressum, ac grauatum, coarctatumq; fuit, difficilemque habuit respirationem, & in anini deliquium incidit, sudoremq; frigidum sudauit, ac demum seruari ægre, sumptis ipsi, quæ humores crassos incidunt, potuit: cuius generis est oxymeli ipsum per se, & cum hyssopo, & origano ipsi medicati. Is enim tum hæc sumpsit, tum nitri spumam ipsis inspersam: post quæ fungos, quos comederat, uomuit, qui iam quodammodo in succum pituitosum, frigidumq; admodum ac crassum erant mutati. Mox uires qui Græcis, Fungi Latinis appellatur: Arabibus, Hatar seu Father: Italis, Fonghi: Germanis, Psifferling, & reyschen: Hispanis, Hongos, Cogomelos, & Cylherquas: Gallis, Champignon, & Potyron.

COLCHICVM.



EPHEMERVM.



COLCHICVM



## Colchicum.

## Cap. LXXIX.

COLCHICVM, aliqui ephemerum, sunt qui agrestem bulbum uocant. Autumni exitu florem edit croci, candicantem: ab eo tempore folia bulbi, sed pinguiora: caulem palmo altum, ferentem rufum semen: radicem foris è nigra rufescentem, quæ delibrata, candida, & mollis spectatur, lacteo succo madet, atque gustatu dulcis inuenitur: bulbus eius mediam habet rimam, fissuramque, qua flos erumpit. plurimum in Messenia, & Colchis enascitur. Ea comesa, fungorum more, strangulando enecat. Hanc autem depinximus, ne à quoquam imprudenter pro bulbo deuoretur: mirum enim in modum saporis uoluptate imperitos allicit. Remedio sunt eadem, quæ fungis, bubulum etiam lac potum auxiliatur: itaque cum adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

## Ephemerum.

## Cap. LXXX.

EPHEMERON, aliqui syluestrem irin appellant. Folia habet lili, sed tenuiora: caulem parem: florem candidum, amarum: semen molle: radicem unam, digitali crassitudine, longam, adstringentem, odoratam. nascitur in syluis, & opacis. Huius radix dentibus præcipua, si decocto colluantur. Folia in uino cocta, discutiunt tumores, & tubercula, quæ nihil adhuc humidi contraxerunt.

EPHEMERI duo genera constituisse uidetur Dioscorides. unum, quod Colchicon, & agrestem bulbum: alterum, quod Irin syluestrem cognominant. Quod primo loco describitur, usque adeo perniciosum affirmant, ut uno die sumptum interficiat: unde illi Ephemerum nomen. Ea autem ratione illud se depinxisse tradit Dioscorides, ne ab aliquo imprudenter bulbi uice deuoretur: mirum enim, inquit, quantum saporis uoluptate imperitos allicit. Verum cum hoc diuinum Dioscoridis institutum non animaduertierint, uel forte neglexerint Mauritanii, & eos secuti medici superioris nostræ ætatis, non modo seipsos, & sequaces misere deceperunt; sed & cæteris omnibus errandi ansam præbuerunt. Siquidem Colchicum ephemerum deleterium medicamentum, si eius nota diligentissime expendatur, nil aliud, meo quidem iudicio, representare deprehenditur, quam candidum illud bulbum, quem uulgo officinæ Mauritanos secuta falsò Hermodactylum appellant. Sed quantum detestandum sit erroris, & abolenda praua, ac perniciofa hæc consuetudo, quantumue discriminis, & incommodi nostris corporibus hinc imminet: æstimabunt illi, qui recte diligentesque ea perpenderit, quæ non solum Dioscorides, & Galenus; sed & Paulus, & Nicander, & Plinius de Colchico ephemero posteritatis memoriæ prædiderunt. quippe qui affirmauerint, id deuoratum eadem die bonos minime interimere. Quem effectum etsi hac tempestate ab hoc manifestè præstari non constet experimento in his, qui ipsum in medicamentis assumunt: id tamen non alia de causa fieri putauerim, quam quod fortasse in Italia, ut in Colchide, mortiferum non proxiat: aut quod ea, quæ sumitur quantitas, exigua sit, neque ad periculis sufficiens. Sed non propterea dubitandum est, quin hoc sumentibus grauius & periculosa incommoda inferre ualeat. Erroris occasionem dedisse uidetur Serapio, utpote qui confusè uno tantum capite de utroque Ephemero, & de Hermodactylo scripserit, nomine duntaxat Hermodactyli omnibus inscripto, immemor, uel potius ignarus, apud Græcos, a qui bus tamen quicquid ferè boni habet, mutuatus est, eas plantas inter se maxime differre. Quod autem in hoc deceptus Serapio has herbas turpiter confuderit, fidem manifestam facit Paulus Aegineta, qui libro VII. de Ephemeris, & de Hermodactylo separatim tanquam de diuersis differuit: & primum de Hermodactylo, sic inquit, Hermodactyli radix & per se, & ipsius decoctum uinum habet purgandi: priuatim arthriticis tunc; cum humores defluunt, exhibetur. uerum stomacho nimis quam aduersatur. Mox paulò inferius, sex tantum interiectis capitibus, de Ephemeris ita scribit. Ephemerum non nenenum illud, sed quod Iris hyliatica nominatur, misere potestatis est, & repellentis, & discutientis per halitum. hætenus Paulus. Ex quibus sanè palam fit, non modo Hermodactylum cum Colchico nullam habere cognationem; sed etiam hac in re planè hallucinatum fuisse Serapionem, quem secuti cæteri Mauritanii, qui post ipsos libros conscripserunt, atque etiam ex nostris plerique, qui superiore ætate claruerunt, ut cæci cæcos sequentes omnes in hanc erroris foueam inciderunt, & posteros hucusque; in hunc pessimum & detestandum usum pertraxerunt. Nam itaque resipiscant tum medici, tum seplastarii, qui Colchicum suis medicamentis, & catapotijs inserunt, & ipsum iam non secus ac scopulum euitent, utpote quod, omnium probatissimorum auctorum testimonio, mortiferum sit medicamentum. Quæ autem radix nobis hodie Hermodactylus dici possit, difficile quidem fuerit decernere, quod ex probatis rei herbariæ scriptoribus hætenus neminem inuenerim, qui notis illis eius tradiderit historiam. Veruntamen, si ex uocabuli etymo conijcere licet, nil aliud significare uidetur Hermodactylus, quam digitum Herminii, aut Hermetis. Vnde factum est, ut aliquando cogitauerim, an illa bulbacea radix, quæ manus humane formam refert, quamque uulgo Christi palman appellant, ad Hermodactylum accedere posset, quod bulbacea sit, quemadmodum & Colchicum, quodque sumpta non modo uomitiones, sed & aluum cieat, ut testis est Nicolaus Florentinus, qui hac radice pluribus factis uomitionibus, Biliotum quandam quartanarium curauit. Hæc in medium proferre libuit, non quod ita esse certò asserere ausim, sed ut rei herbariæ studiosis res hæc melius æstimanda proponeretur. Nec illud sanè hoc loco prætereundum duxi, quod Hermodactyli Actuarius, & Nicolao Myrepsico, qui albi, & rubri Hermodactyli meminerit, nil aliud representant, quam Behen album, & rubrum Mauritanis appellatum. Siquidem ex descriptione aureæ Alexandrinæ apud Nicolaum, & diamoschi antidoti apud Actuarium id liquidò constat. Sed non ob id dicendum est, hermodactylum Pauli, & Serapionis idem cum illis esse, his nanque alterius generis radix est, quæ uinum habet deiectionem ad articulorum defluxiones præcipuam. Fuchsius medicus ætatis nostræ celebris, in libro de compositione

Colchici, & Ephemerum cōsideratio.

Mauritanorum & sequacium error.

Serapionis lapsus.

Hermodactyli coniectura.

Fuchsius deceptus.



Fuchſii erratum.

Monachorū hallucinatio.

Ephemerī uires ex Gal.

Nomina.

poſitione medicamentorum, quem non pridem locupletatum edidit, hermodactylum Pauli deſcribens, inquit. Vnus habet radicem albam, craſſam, ac modicè duram. atq; iſ eſt, qui in hodiernum diem nomen hermodactyli in officiis medicorum retinet. A Paulo quoque hermodactylus appellatur. Ex ijs uimurum uerbis Fuchſius ſibi perſuaſiſſe uideatur hermodactylum communis uſus eundem eſſe cum Pauli hermodactylo: cū tamen omnibus ſerè conſtet, illud nō aliud eſſe quā Colchicum. Quocirca nulli equidem dubium eſſe puto, quin Fuchſius hac in re deceptus ſit. niſi ſepiſſe Tubingenſes pro hermodactylo aliam uſurpent radicem ab ea, quā haſtenus in reliquis Germaniæ pharmacopolijs uſurpari uidimus. Ceterū Ephemerum, quod ſylueſtrem Irin appellant, in Ananienſibus montibus tam in prætijs, quā in ſyluis copioſe naſcitur, ubi indigenis uocatur uulgò Giglio matto, hoc eſt, Liliū ſtultum. Huic certè, niſi me fallit iudiciū, omnes prorsus notæ conueniunt, quæ alteri Ephe uero à Dioſcoride tribuantur. Hiſce itaque ſit, ut in hoc Fuchſius, uir aliqui doctiſſimus, apertè erraſſe deprehendatur, qui plantam uulgò Liliū conuallium uocatam Ephemerum alterum, & non lethale eſſe contendit. Quandoquidem illud folia lilio latiora: non autem anguſtiora, & diſſimilia proferit: canlem noui liliij modo, ſed gracilem, & ſtamiuis inſtar tenuem: radicem item exilem, quæ capillaribus diuiditur fibris, tantum abeſt, ut digiti craſſitudinem æquet, qualis in Ephemero requiritur. Præterea neminem adhuc reperi, qui tradat Ephemerum flores ſerè ſuauius olentes: cū tamen Liliij conuallij diſſi flores adeò incundum ſpirent odorem, ut eius gratia ab omnibus maxime expetantur: id quod nunquam ſilentio præteriſſet Dioſcorides in re herbaria grauiſſimus auctor, præſertim quòd ea nota fuiſſet Ephemero inſignis, & notabilis. Ex his igitur colligendum eſſe putauerim, non ſolum Fuchſium in aperto errore uerſari, ſed reliquos etiam, qui Liliū conuallium uocatam Ephemerum eſſe contendunt. Sed ad Colchicum reuertamus. Floret hoc autumni tempore, floribus croco æmulis, nullis tamen emiſſis ſolijs, niſi appetente uere, quo tempore ſubrubeum gignit ſemen, quibusdam folliculis incluſum, iuglandium ſimilitudine. Verū hoc tempore radix ei dulcis non eſt, quemadmodum in autumno, ſed lacte preguans, & amara inuenitur. Quare hic cogimur dicere, & fateri, quòd hoc non obſeruaſſet Dioſcorides, uel ſaltem, quòd indiſtinctum id omiſerit. Porro in communem illam hallucinationem ante exploſam deducti ſunt & patres illi reuerendi, qui in Meſuem commentarios ediderunt: quippe qui nullam faciunt differentiam inter Colchicum, & Hermodactylum, idq; apertè aſſerunt. Quorum etiam auctoritate freti pharmacopole adduci poſſunt, ut cum maximo humane uitæ detrimento colchicum catapotijs immiſceant. Quare caueant nunc conſilio ſe-plaſtarij, neque facile ſidant ijs, quos magis decet libros ſacros, quā medicos euoluere, ut animabus potius, quā corporibus mederi ſciant. Ceterū colchici floribus, ut audio, utuntur Turcæ, cū inebriari uolunt: eos enim nō macerant, eoq; pote adeò ſtupidi redduntur, ut in ecſtaſin abeant. Vtriusque Ephemerī meminit Galeus lib. VI. ſimplicium medicamentorum, ſi inquit, Ephemerum non illud lethale ſeu deleterium, quod & Colchicon uocant, ſed alterum, quod & Irin agreſtem cognominant, folia, & caulem lilio ſimilem obtinet: radicem oblongam,

## HELXINE.



non rotundam ceu colchicum, digiti potiſſimum craſſitudine: eſt autem adſtringens, & boni odoris. Ex quibus palam ſit, quòd miſte ſit facultatis, temperatæq; nempè repellentis, & halitus digerentis. Teſtificantur uerò id opera, quæ particulatim edit. Siquidem non inefficaciter radix eius in dentium doloribus colluitur: & folia tuberculorum tum augmento, tum uigori congruant. Oportet autem ea in uino decocta, priusquā uſus moueas, illineſcere. Planta, quæ Græcis κολχικόν, Latinis Colchicum, & Bulbus agreſtis uocatur: Arabibus, Surugen: Italis, Colchico: Germanis, Zeitloſz: Vuld ſaffran bluom: Gallis, Mort auchin, chien, & chiennee. Quam uerò Græci ἐφίμερον, Latini item Ephemerum dicunt: Itali, Ephemero. At quæ recentioribus Græcis ἐρμωδακτύλος, Latinis quoque Hermodactylus appellatur: Italis, Hermodatilo: Mauritanis, Surugen, uel Surengia, ita tamen ut hæc cum colchico apertè confundant.

## Helxine.

## Cap. LXXXI.

HELXINE naſcitur in parietinis, ſepibus, & maceris. folia ei mercurialis inſunt, hirsuta: cauliculi ſubrubentes, & circa eos ueluti ſemina aſpera, adhærentia uelut ſtibus. Folia refrigerandi, ſpiſſandiſque naturam habent, quæ ex cauſa ſanant illitu ſacros ignes, aduſta, condylomata, panos incipientes, tumores, inflammationeſque. Succus eius cum ceruſſa, ignibus ſacris, & ulceribus quæ ſerpunt, commodè illinitur: imponiturq; podagris cum hircino adipe, aut cerato cyprino: ueterem tuſſim emendat, inſtar cyathi hauſtus: tonſillis inflammationem ſentientibus utiliter & gargarizatur, & oblinitur: aurium dolorem cum roſaceo, inſtillatus leuat.

HELXINEN,



**HELXINEN**, quæ hic à Dioscoride describitur, officinarum uulgus Parietariam appellat, quod in ædificiorum parietibus nascatur. Alij, quod detergendis uitreis poculis sit aptissima, Vitreolam nominant. Hæc planta omnibus notissima est: quare superuacaneum esset, eam longiore historia representare. Verum alia ab hac, & longe diuersa est Helxine, quam Plinius libro xxi. cap. xvi. inter aculeata retulit, & depinxit his uerbis. Helxine rara uisu est, neque in omnibus terris est: radice foliosa, ex qua media ueluti malum extuberat, contextum sua fronde. Huius uertex summus lacrymam continet, iucundi saporis, acanthicen mastichen appellatam. hæc Plinius. Helxines uires tradidit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, sic inquit. Helxinen aliqui perdicium nominant, alij parthenium, alij siderit in, sunt qui heracleam appellitent. Caterum uis ei inest abstergendi, & leuiter constringendi cum humiditate subfrigida. Quamobrem phlegmonas omnes in initio, & augmento sanat usque ad statum, & maxime si calidæ fuerint. Quinetiam incipientibus phygethliis cataplasmatibus ritu illinitur. Succus quoque eius cum rosaceo ad aurium dolores phlegmonosos, mediocriter profuerit. Gargarizandum item nonnulli exhibent ad paristhemia. Sunt uero etiam ex medicis quidam, qui ijs, qui diutina tussi uexantur, illam exhibuerint. Certè euidens extergendi experimentum præbet & in uasis uitreis. Herba, quæ Græcis ἐλξίνη & περδίων, Latinis item Helxine appellatur: Italis ac uulgò, Parietaria, & Vitriola: Germanis, Tag und nacht: Hispanis, Yerua del muro, Gallis Paritoire.

Helxines cōsideratio.

Helxines uires ex Gal.

Nomina.

## Alfine.

## Cap: LXXXII.

**ALSINEN**, aliqui anthyllion, nonnulli myosota uocant, quoniam muscutorum aures folia imitantur. Lucis, opacisque gaudet, unde alsine dicta est. Hæc erat eadem, quæ helxine, nisi humilior esset, & foliis minoribus, nec hirsuta. cum teritur, odorem cucumis reddit. Vim refrigerandi, adstringendique obtinet: oculorum inflammationibus cum polenta illinitur. Succus aurium doloribus infunditur. quin & emendat omnia quæ helxine, id est, muralis herba.

**ALSINE** ea nimirum herba est molliuscula, quæ Hetru- scis Centone, alijs uerò Pauarina, alijs Pizze gallina, alijs Centonice uulgò appellatur. Et quauis Dioscorides unam tantum Alsinen representauerit; plura tamen eius reperiuntur genera. Porro habentur quædam Dioscoridis exemplaria, in quibus caput hoc legitur in calce libri secundi statim post Muris auriculæ mentionem. Sed nos, ut eo in loco latius diximus, hanc suam ueram ac germanam sedem esse censemus. Alsinen meminit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, ita de eius uiribus scribens. Alfine, aut Myosota similis helxine facultatem obtinet, nempe refrigerantem, & humectantem: est enim essentie aqueæ frigida: quare & citra adstrictionem refrigerat. Quocirca ad feruentes phlegmonas, & mediocria erysipelata competit. Hæc ἀλσίνη Græcè, ut etiam Alfine Latine dicitur: Italicè, Centone, & Pauarina: Germanicè, Huener dorm, & Vogel kraut: Gallicè, Mouronem.

Alsinen cōsideratio.

Vires ex Gal.

Nomina.

## LENS PALVSTRIS.





## Lens palustris.

## Cap. LXXXIII.

**LENS** palustris inuenitur in aqua non fluente, muscus lenticulae similis, refrigeratoe naturae. Propter quod conuenienter collectionibus, igni sacro, & podagris illinitur per se, & cum polenta: glutinat & procidentia puerorum interanea.

Lentis palustris confid.

Facultas ex Galeno.

Nomina,


**PALVSTRIS** lens, quam officina, & herbariorum uulgus Lenticulariam appellant, notior omnibus est, quam ut pluribus describi mereatur. Ea plerunque stagnantibus aquis innatat, & praesertim, quae urbes, & oppida cingunt, Lentis palustris non nisi temperamentum prodidit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Lenticula palustris humida, frigidaque temperatura est, utrinque ex secundo quodammodo ordine. Quae Lens palustris Latinis, & αὐτὸς ὁ ἐν τῶν τελευτῶν Graecis uocatur: Arabibus; Tahaleb, seu Thaleb, Italicis, Lente de i paludi; Germanis, Vuasser linsen: Hispanis, Lenteya dellagoa: Gallis, Lentille de mer.

## SEDVM MAIUS.



Sedum maius.

## SEDVM MINVS.



Cap. LXXXIIII.

**SEMPERVIVVM** magnum ideo nominatur, quoniam perperuò folia uireant. cuius caules cubiti altitudinem implent, interdum excedunt, pingues, crassitudine pollicari, uirentes, characis tithymali modo infecti: folia pingua, carnosa, longitudine pollicari, in cacumine linguarum similia, alia in terram conuexa, alia in capite stantia inuicem, ita ut ambitu effigiem imitentur oculi. nascitur in montibus, & testaceis, supra domicilia etiam feritur. Eius uis refrigerare, & adstringere. Medetur igni sacro, nomis, ulceribus quae serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni, podagris per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti in doloribus, cum polenta, aut rosaceo perfunditur: datur in potu contra phalangiorum ictus, dysenteriam, aluique profluvia: teretes tineas potus in uino excutit: subditus in uellere; mulierum abundantiam sistit. Succus oculorum lippitudinibus, sanguinis uitio conceptis, inungitur.



Sedum minus.


Cap. LXXXV.

SEMPERVIVVM paruum in petris, parietinis, & maceriis, necnon scrobibus opacis nascitur, caulibus ab una radice multis, tenuibus, crebro foliatis: exilibus foliis, rotundis, pinguibus, mucronatis: caule à medio emicante, palmum alto, umbellam, herbidosque flores, & tenues gerente. Folia eisdem cum priore uiribus prædita sunt.

Sedi genus tertium.

Cap. LXXXVI.

TERTIVM uidetur semperuiui genus, quam aliqui andrachnen agriam, aut telephion uocauerunt, Romani illecebram, pusillis, crassioribusque foliis, hirsutis, portulacæ proximis. nascitur in saxis. Vis ei excalfactoria, acris, exulcerans. illita cum auxungia strumas discutit.



EX TRIBVS Sedi, siue semperuiui generibus, quæ hoc loco à Dioscoride pinguntur, primum, & alterum omnibus nota sunt. Vtrunque officinæ Semperuiuum appellant, addita maioris, & minoris differentia. quantum non desint, qui minus Vermicularem, Crassulamque herbam uocent. Minoris duo uisuntur genera. Alterum, cuius Dioscorides meminit, foliis crassioribus, longioribus, rarioribusque, facie nucleis pineis à putaminibus repurgatis similibus, unde quibusdam uulgo etiam Pignola dicitur. Caules fert tenues, pluresque: in quorum cacumine flores exeunt herbacei, seu subcandidi, umbellæ diuulsæ modo. Alterum foliis breuioribus, angustioribus, copiosioribusque: floribus melinis, eodem ordine prodeuntibus. Hoc marem, illud feminam recentiorum quidam existimant. At tertium, quod mihi iandiu incompertum extitit; cum usque adeo excalfaciat, ut carnem exulceret impositum, à cæteris longè facultatibus disidet. Huius uaria in Dioscoridis codicibus legitur historia: cæterum nos Aldinum exemplar secuti, hinc ea abdicauimus, quæ adulterina censentur. Nec desunt qui crediderint, tertium hoc Dioscoridi esse spurium: quod duorum tantum inuenerit Galenus. Veruntamen à Pisis hoc anno tertium Sedi genus, gustu sanè acerrimo, adeo ut linguam exulceret, ad meminit Lucas Ghinus. Forocorueliensis medicus rei herbariæ peritissimus. qui illi plantæ hæc uerba subiecerat; quæ hic refrangere eius humanitati fretus. Visitur, inquit, in uiridario Illustrissimi Ducis Florentiæ quoddam tenuissimum Sedi genus, gustu nihilominus acris, quam ranunculi omne genus, quod etiam in antiquis edictis uerba paritibus, & saxorum rimis provenire conspexi. Hoc, meo iudicio, tertium est Sedum. Sed cum Dioscoridis uerba hoc loco obscura sanè, & intellectu difficilia habeantur, iandiu una cum alijs plerisque, qui hac simplicium facultate maxime delectantur, plurimum laboris inpendi, ut tertium Sedum consequi possem, cui folia inessent hirsuta, & facie portulacæ similia. Cæterum cum postea attentius, diligentiusque Dioscoridis uerba perpenderem, sic Latine sonare uidentur. Est & tertium sedi genus, quod portulacæ respectu, folia edit pinguiora, densioraque, &c. Quibus cum hunc dederim sensum, qui sine sententiâ, propriam Dioscoridis mentem explicat, tertium hoc sedum facile mihi sese obtulit cognoscendum, ut omnibus quoque id ipsum euenire haudquaquâ dubitauerim, qui Græcam dictionem huiusce tertij sedi folia, portulacæ folijs comparata, ijs densiora, crassioraque, facile cernuntur. Hactenus amicus ille. Cuius certè sententiæ non possum non adstipulari. quippe quæ doctissimis rationibus nitatur, & ipse sit apud me gravis testis. Semperuiui mentionem fecit Theophrastus lib. xvii. cap. viii. de plantarum historia, sic inquit. Semperuiuo datum à natura est, quod humidum, uirideque semper durare ualeat. Folio carnosum, lenis atque oblongo id constat. Planis parietinis nascitur, nec non & in tegulis, cum terræ confluuium quoddam arenaceum factum est. hæc Theophrastus. Sedi uires descripsit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, his uerbis. Aëreum utrumque, tum maius, tum minus, desiccatur quidem leuiter, quandoquidem & mediocriter adstringit, omnis alterius uchementis

Sedi genera, &amp; confid.

Sedi uires ex Galeno.




## Nomina.

uehementis qualitatis expers: quare in eo plus cæteris abundat essentia aqua. Cæterum nõ mediocriter refrigerat: est enim ex tertio ordine, & recessu refrigerantium. Hinc etiam ad erysipelata, & herpetas, & phlegmonas à fluxione natas accommodatur. Semperuium siue Sedum maius quod Latini uocant, Græci αἰζῶν μέγα: Mauritan, Beihatalen, seu Hai alhalez: Itali, Sempreuio maggiore: Germani, Grosz hausz uurtz: Hispani, Sempreuio, & yerua puntera: Galli, Ioubarbe. Quod uerò Græci αἰζῶν μικρόν, Latini Semperuium, siue Sedum minus dicunt: Itali Sempreuio minore: Germani, Klein hausz uurtz: Galli, Ioubarbe petite. Quod denique Græci αἰζῶν εἶδος τρίτον, Latini Semperuii siue Sedi genus tertium appellatur: Arabibus, Alsebram, Handrachabara, & Tilafon: Itali, Sempreuio terzo.

## UMBILICVS VENERIS.

## UMBILICVS VENERIS ALTER.



## Umbilicus ueneris:

COTYLEDON, siue umbilicus Veneris, folio est in acetabuli formam tornato, ineuidenter concauo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest: radice oliuæ modo rotunda. Succus cum uino circumlitus, instillatusue contacta genitalia nudat: inflammationibus, sacris ignibus, strumis, pernionibus, illitu auxiliatur: stomachi ardorem refrigerat. Folia cum radice comesta, calculos frangunt, urinam cient: hydropicis ex melle dantur. Herba utuntur ad amatoria.

## Umbilicus ueneris alter.

## Cap. LXXXVII.

EST ET alterum umbilici Veneris genus, cymbalion aliqui uocant, pinguibus foliis, latioribus, ligularum modo, densis circa radicem, medium oculi ambitum describentibus, ut in maiore semperuiuo, adstringentis gustus: cauliculo tenui, in quo flores & semina hyperici: radice masculula. Facit eadem, quæ semperuium.

## Cap. LXXXVIII.

Umbilici Veneris utriusque confid.

UMBILICVS Veneris, quem primo generi assignant, frequens nascitur in uniuerfa ferè Hetruria, saxis, & uetustis ædificiorum parietibus. Huius folia, quod fictilium operculis similia sint, uulgò Senenses appellant Copertoziuole. Alterum uerò eius genus à quibusdam Cymbalion uocatum, uidimus primum in Foro iulienſium ciuitate Austriæ, in hortulo quodam excellentissimi medici Iuliani à Marostica Teruistensis. Hanc porro plantam in pluribus montibus saxis inhaerentem inuenimus. Cui, meo quidem iudicio, omnes prorsus conueniunt notæ, quæ alteri umbilico Veneri



Veneri tribuuntur. Ceterum apud Insu-bres officinae legitima Cotyledonis, siue umbilici Veneris loco, herbam quandam in parietinis, et maceris nascentem usurpant, quæ ex ijs eminet, et comæ modo dependet, caule tenui, folijs hederaceis, per ambitum mucronis instar laciniatis. Hanc fortè, quòd Cymbalaria uulgo uocetur, putant à cymbalio corruptè nomen traxisse, et ideo uerum Veneris umbilicum esse. Sed euidentius errant, quàm ut ostendi debeat. Fuchsius quoq;, cuius uiri alioqui eruditi pace dixerim, in hac re hallucinatus deprehenditur, quòd in paruo suo libro, in quo plantarum duntaxat imagines expressit, pro utroq; umbilico Veneris eas uinirum plantas depinxit, quæ nonnullis uulgo Fabaria, et Fabæ crasse appellantur: quas tamen prius in suo de stirpium historia commentario pro telephio ostenderat. Verum tam prima, quàm altera eius opinio, ut dicam quod sentio, mihi planè reprobanda uidentur. Quemadmodum et tertia eiusdem de eadem re sententia, quàm non ita pridem protulit in eo libro de compositione medicamentorum, quem postremo auctum excudit. Ibi enim putat Fuchsius Acetabulum alterum, siue alterum umbilici Veneris genus, esse Fabariam, quàm uulgo et sepalsia Crassulam maiorem nominant. Sed quòd is in magno uersetur errore, manifestum fit satis ex Dioscoride. Quippe qui Cymbalio, seu alteri Veneris umbilico, folia reddiderit densa circa radicem, quæ medium oculi ambitum describunt, ut in maiore semperuiuo: cauliculum uero tenuem, in quo flores et semina hyperici. Quæ tamen notæ in Fabaria, aut Crassula maiore desiderantur. Si quidem hæc folijs constat hortensis portulacæ maioribus, quæ cum semperuiuo nullam habent ferè similitudinem, nec oculi formam describunt. caulem præterea emittit crassum et firmum. radicibus deniq; nititur pluribus, asphodeli proximis. Umbilici Veneris meminit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Cotyledon facultatis mista est, nempe humida, subfrigida, et cuiusdam obscure adstringentis, et cum ea leuiter amara: unde refrigerat, repercutit, abstergit, et discutit. Itaque phlegmonis erysipelatodes, et erysipelata phlegmonode curat: et maxime stomachi ardore aestuantis admodum utile est epiplasma. Putantur folia cum radice manducata calculos confringere, et urinam mouere. Κουτυλιδων sic Græcè, Latine uero Acetabulum, et Umbilicus ueneris nominatur: Italicè, Omilico di Venere: Hispanicè, Seudetes: Gallicè, Escudes. Quæ uero

Officinarum error.

Fuchsij hallucinatio.

Umbilici Veneris uires ex Galeno.

Nomina.

## VRTICA PRIMA.

## VRTICA SECUNDA.



Vrtica.



Cap. LXXXIX.


DVO VRTICAE genera. Altera syluestrior, asperior: latioribus, nigrioribusque folijs: semine lini, sed minore. Altera non aequè aspera, minuto semine. Folia utriusque illita, canis moribus addito sale, medentur: gangrænas, carcinomata, sordida ulcera, & quæ cacoethe uocantur, item lura



## VRTICA TERTIA.

Vrticæ con-  
sideratio.Vrticæ vires  
ex Galeno.

## CARDIACA.

Cardiacæ hi-  
storia, & vires

xata, panos. tubercula, parotidas, suppurationesque sanant: lienosis cum cerato imponuntur: faciunt ad profusum narium cum succo trita, & naribus indita: menses eadem detrita cum myrrha, & imposita: proci dentes uulvas recentia contactu resiliere cogunt. Semen potum ex passo uenerem stimulat: & vuluæ ora patefacit: cum melle delinctum orthopnceæ, lateris, & pulmonum inflammationibus prodest: thoracem expurgat. erodentibus medicamentis admiscetur. Cocta cum conchis folia aluum emolliunt, urinas mouent, inflationes discutiunt: decocta cum pisana, uitia pectoris extrahunt: mulierum menses euocant, cum myrrhæ modico pota. Inflammatione turgentem vnam, gargalizatus succus reprimat.

VRTICA adeo uulgaris notitie est, ut non modo inter diu; sed etiā noctu in tenebris solo tactu ab omnibus facillime cognoscatur. Proinde operæ pretium non est, ut hic pluribus eius faciem depingamus. Veruntamen iguorandum non est, quod est Dioscoridi duo tantum Vrticæ assignentur genera; tria tamen in Italia reperiuntur. Siquidem præter Vrticæ à Dioscoride traditas, alia est, quam aliqui syluestrem appellant, cæteris acrior, & mordacior, folijs paruis, hirsutioribusq; caulibus: omnibus hæc nota. Vrticæ vires memorie prodidit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Vrticæ, et huius herbe tum semen, tum folia (nam hæc potissimum in usum ueniunt) digerentis sunt facultatis, adeo ut & phymata, & parotidas digerent. Sed & quiddam flatuosum obtinent, quo & uenerem extirpant. Sed & maxime ubi cum musto semen bibitur. Porro quod non uehementer calfacit, sed admodum tenuium sit partium, stimonio est crassorum, uiscosorumq; humorum ex pectore, pulmoneq; eductio, tum quod partes, quas contigerit, pruriat. Cæterum flatuosum eius, cuius particeps esse dicta est, dum concoquitur, nascitur: non enim actu flatuosa est, sed potestate. Ventrem autem modice subducit, duntaxat abstergendo, ac ueluti titillando, non purgando. Et gangrenosa, & canerosa, & in totum quæ exiccare citra mordicationem postulant, ea conuenienter sanat. nimirum cum subillium sit partium, & temperature sicca, non tamen tantum habens caliditatis, ut iam mordicet. Et libro II. de alimentorum facultatibus, idem de urtica ita scribit. Vrtica, herbarum agrestium una etiam hæc est, tenuium partium uim obtinens. Iure itaque nemo ipsa, ut alimento utitur, nisi maxima prematur fame. Vtilis autem est obsonium ac medicamentum, quod aluum deiecit. hætenus de urtica Galenus. Sed quoniam nunc ob cognitionem, quam cum Vrtica habere uidetur, mihi in mentem uenit; ideo non alienum puto, quod hic de ea quoque alia quid differamus. Hæc itaque urtica proxima est, tametsi folijs quæ prope terram prodeunt rotundioribus constet, ramunculi modo per ambitum laciniatis. Ei caulis est quadrangulus, in quo biua ubique folia paribus interuallis exeunt, oblonga, urtica simili, sed per ambitum serratiore. Flores, qui in purpura albescunt, urticae foetide, de qua sequenti capite dicturi sumus, non dissimiles profert, minores tamen, qui uerticillato ambitu marrubij modo caulem circundant in ipso foliorum exortu. Radix in rubro pallescit, alijs pluribus paruis radicibus adnatis. Prouenit usque iuxta semitas, circa sepes, & post urbium incenia. Gustu usque adeo amarescit, ut facile existimari possit ad secundum excelsi scientium ordinem, & ad tertium siccantium accedere. Præstat hæc, ut recentiores quidam tradunt, ad cordis affectus, unde etiam apud uulgares nomen accepit. Medetur item conuulsis, ac resolutis.



## GALIOPSIS.

lulis . Obstructiones aperit, quas causa frigida induxerit : urinam cit, & menses . Pectus à pituita detergit, & lumbricos necat . Ceterum in puluerem contrita, & cochlearis mensura ex uino hausta, difficile parientibus mirum in modum opitulatur . *Nomina .* Vrtica sic Latinis dicta, ἀκάλυον Græcis nominatur : Arabibus, Humiure, Vraith latum, & Angiara : Italis, Ortica : Germanis, Nessel : Hispanis, Ortiga : Gallis, Ortie .

## Galiopsis.

## Cap. XC.

GALIOPSIS, frutex in totum caulem, & folia habet urtica, læuora, & quæ grauem odorem trita reddant : flore purpureo, tenui . nascitur circa sepes, ædificiorum areas, ac semitas ubique . Folia, caules, semen, succusque, duritias, & carcinomata dissipant : strumas, panos, & parotidas discutiunt . Oportet bis die tepidum ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fouere . ad putrescentia, gangrænas, & nomas, cum sale efficaciter illinuntur .

GALIOPSIN eam equidem plantam crediderim esse, quam nos in Italia Vrticam foetidam appellamus, quæ ubiq; ferè prouenit, in ædificiorum areis, in plateis, iuxta semitas, & circa hortorum sepes, odore ingrato : unde & foetide cognomen adinuenit . Quandoquidem hæc folijs, & caule constat urticae similibus, tactu tamen non mordentibus : floribus item purpureis, tenuibus . Hinc itaque fit, ut ij, mea quidem sententia, in errore uersentur, qui putant Galiopsin esse herbam illam uulgarem, quæ officinis, & herbariorum uulgò Scrophularia maior, Millemorbia, Ferrara, atque etiam Castrangula dicitur : hoc fortasse argumento nixi, quòd ea flores edat, qui galeæ similitudinem referunt . Sed eorum error ex eo, ut arbitror, aperte diluitur, quòd Scrophularia maior dicta folia non proferat urticae admodum æmula, nec ea graui odore prædita sentiantur . Adde quòd huic radix substat magna, alba, undique strumosa, unde fortè Scrophulariæ nomen traxit, adeò notatu digna, ut non uideatur uerisimile, quòd eius faciem non depictam reliquisset Dioscorides, quando sensisset hanc herbam esse Galiopsin . Huc etiam illud accedat, quòd illa ut plurimum in scrobium marginibus, in riguis, & uliginosis locis nascitur, non autem ( ut Dioscorides inquit ) circa sepes, & in ædificiorum areis . In hac sententia fuisse inuenio Fuchsum, uirum alioqui eruditum, qui à galea, cuius effigiem Scrophulariæ flores representant, hanc sibi nomen asciuisse existimat . Id quod mihi planè non uidetur esse rationi consentaneum, quòd non sit ex more Græcorum, ueterum præsertim, apud quos nulla uerborum inopia fuit, ut ex Latinis, & Græcis dictionibus plantarum, & aliarum rerum nomina componant : galeam enim Græcum nomen non esse constat . Ex his igitur adducor, ut in hoc neque Fuchsio, neq; alijs adstipulari possim, quorum potius sententiam ex suprà dictis reprobendam esse censeo . Est præterea alia planta Vrtica foetida non absimilis quæ à lacteis maculis singula folia in longū procurrentibus Vrtica lactea à nostris Sanensibus uulgò cognominatur, quam rectius fortè quis Galiopsin dixerit, si à γαλα, quod uocabulum Græcis lac significat, Galiopsin dictam esse statuat . Quòd autem res hæc ita esse possit, ex Dioscoridis ordine coniectura quadam colligi posset . nam quòd statim post Galiopsin Galiò descripserit, cui ex eo nomen inditum esse tradidit, quòd in cogenendo lacte coaguli uicem expleat, uidetur innuisse, inter utrumque magnam esse nominis cognationem . Hanc itaque legitimam esse Galiopsin quasi affirmare non dubitarem, nisi Plinius lib. xxi. cap. xiiii. eam Lamium appellari prodidisset, laudibusq; extulisset .

Galiopseos consideratio.

Opinio quorundà reprobata.

Fuch. erratū.

Vrtica lactea

Lamium Plinij.

Aa 2 lisset



SCROPHULARIA.






## GALION.

Scrophulariæ  
uires.

Nomina.



lisset album; quod habet in medio folio, ad sacros ignes, & foliorum reliquum cum uniuersa planta, addita mica salis, ad contru-  
sa, incussaq; ad ambusta, strumas, tumores, podagras, & uulne-  
ra. Quibus sanè Plinij placitis decernere cogimur, primam,  
quam Vrticam foetidā diximus, esse Galiospin: alteram uerò Pli-  
nij Lamiū. Sed si sustinere uelimus hanc secundam esse uerā Ga-  
liospin, dicere nobis liceat, Pliniū nō cognouisse Galiospin. neq;  
id fortasse temerè diceretur, quod in multis alijs Plinius euideret  
errasse deprehēdatur. Caterum quanuis ex rationibus superius  
adductis perspicuum, ni fallor, factum sit, SCROPHULARI-  
AM non esse Galiospin; ea tamen uiribus pollet non contem-  
nendis. nūq; eius radix strumas, & hæmorrhoidas sanat. In  
quem usum radix effoditur autumnali tempore, & repurgata  
tunditur cum recenti butyro, operculatoq; fætili in uliginoso lo-  
co reponitur, ubi dimittitur per quindecim dies. Deinde lento  
igne butyrum illud liquefit, & percolatum asseruatur. quo præ-  
dicti morbi utilissimè illinuntur. Planta, quæ Græcè γάλιον, &  
Latine itē Galiospis, Vrtica labeo, et Vrtica foetida nominatur:  
Italicè, Ortica fetida: Hispanicè, Ortiga muerta.

## Galion.

## Cap. XCI.


GALION nomen ex eo traxit, quod in contrahen-  
do lacte, coaguli uicem impleat. ramulum, foliumq; ha-  
bet aparinæ simillimum, rectum: florem in cacumine lu-  
teum, tenuem, densum, copiosum, odoratum. Flos igni  
ambustis illinitur, & sanguinis profluuiā sistit. Cerato  
rosaceo galion admiscetur, insolutum usquedum albe-  
scat, & sic lasitudines reficit. Radix uenerem concitat.  
Nascitur in palustribus.

Galii confi-  
deratio.

## SENECIO.

Galij uires  
ex Galeno.

Nomina.



GALIVM ubiq; copiosè nascitur prope sepes, & secus  
uias, folijs aparinæ minoribus: flore tenui, spicato, partim luteo,  
partim albo. Verum non propterea omnibus nota est uis, quam  
coagulandi lactis habet: nam si ea pastoribus innotuisset, non mi-  
nus apud eos huius herbæ inualuisset usus, quam cineræ apud He-  
truscos: qui eius flore, ut dulcior suauiorq; caseus euadit, tum  
ouillū, tum etiam caprinum lac cogunt, ac spissant. Galio uires  
reddidit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorū sic inquit.  
Galium inde adeo nomen sortitum est suum, quod lac coagulet.  
Adsimile autem est aparinæ, facultatem obtinens exiccatoriam,  
& subacrem. Flos eius sanguinis profluuijs competere uidetur,  
& combustis mederi. Est autem boni odoris, & coloris lutei.  
Huius herbæ nomen Græcum γάλιον: Latinum, Galium: Ita-  
licū, Galio: Germanicum, Vnser frauēn, Vuestro: Hispanicum,  
Coia leche yerua: Gallicum, Petit muguet.

## Senecio.

## Cap. XCII.

SENECIO cauliculo est cubitali, subrubro: folijs  
continuis, per extremitates eructa modo diuisis, sed mi-  
noribus multò: luteis floribus, qui celeriter dissecti vane-  
sunt in pappos. Nomen uerò sibi uendicauit, quoniam  
flores capillorum ritu canescant. radice supernacua. Na-  
scitur maximè in macerijs, & circum oppida. Folia cum  
floribus refrigerant: quare illita cum uini modico, uel  
per sese, testium & sedis inflammationes sanant: quin &  
ex manna thuris medentur, cum reliquis vulueribus, tum  
ijs quæ nerui acceperunt. Illi per se cum aceto pappi, idē  
munus præstant: uerum recentes epoti, strangulant. To-  
tus caulis, si coctus in passo potui detur, stomachi dolo-  
res à bili contractos persanat.

SENECIO



**SENECIO**, quæ Græcè Erigeron dicitur, aliquibus uulgò Cardoncello, alijs uerò Spellicciofa uocatur. Planta est uulgaris notitiæ. Cauliculis exit (ut Dioscorides inquit) subrubentibus: folijs laciniatis, erucæ amulis, minoribus tamen, & asperioribus: floribus luteis, qui dehiscentes in pappos abeunt. Nascitur passim, adeo ut etiam super urbium moenia, & in parietinis proueniat. Hanc herbam Otho Brunfelsius esse Verbenacæ supinam magno & aperto errore existimauit. Senecionis quàm breuem mentionem fecit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, eius tantum facultatem referens his uerbis. Erigeron, sine Senecio facultatem mistam obtinet, simul refrigeratorem, & modicè digerentem. Herba hæc Græcis ἑριγέρων dicitur: Latinis, Erigerum, & Senecio: Italis, Cardoncello: Germanis, Creutz uurtz: Hispanis, Bonuaron: Gallis, Seneffon.

Senecionis consider.

Brunfelsij error.

Senecionis facult. ex Gal. Nomina.

## Thaliætrum.

## Cap. XCIII.

**THALICTRON** folia coriandri habet, pinguiora paulò: caulem rutæ crassitudine, in quo folia. Quæ trita illitu antiqua vlcera ad cicatricem perducunt. Nascitur maximè in campestribus.

**THALICTRON**, si Ruellio credimus, herbarij in Gallia Argentinam appellant, quòd argenteo micet coloratu, cæteris notis Thaliætri picturæ adstipulantibus. Hæc (ut ipse scribit) inuenitur ubique, sæpe in campestribus, & macerij. Verum cum mihi hæc non contigerit eam herbam uidere, idcirco Ruellij sententiam non ausim probare, neque etiam refellere. Thaliætron Thaliætron nominat Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, ubi de eius uiribus in hunc modum differit. Thaliætrum folia habet coriandro similia, caulem crassitudine rutæ. Vis ei inæst exiccatoria citra morsum: itaque ulcera inueterata ad cicatricem perducit. Quod Græci θάλιτρον. Latini item Thaliætrum, & Thaliætrum appellant.

Thaliætri consideratio.

Vires ex Galeno.

Nomina.


## Musculus Marinus.

## Cap. XCIIII.

**MARINVS** musculus nascitur in scopulis, testaceisq; haud procul à mari, gracilis, capillaceus, caulis expers. Præcipua ei spissandi uis, & collectiones cohibendi, & podagras, quas refrigerare opus sit.

Non possum eorum non probare sententiam, qui dicunt Muscum marinum eam capillaceam esse plantam, quam officinæ Corallinam appellant. Hanc circumforanei in puluerem contriti: in plateis uendunt ad puerorum uermes necandos, mirisq; laudibus efferunt. Quæ in re nimirum cæteris præstat medicamentis: siquidem non modò interficit lumbricos, sed eos quoque eadè die expellit, magna sæpe cum astantium admiratione, quòd quandoque uisus sit puer, qui ex assumpta huius pulueris drachma centum uermes excreuerit. Crediderim itaque Corallinam hanc esse Muscum marinum, quod certò sciam, eam ab ijs reperiri, qui corallia expiscantur, corallijs, sicuti etiam scopulis, & piscium testis inhaerentem, eo sanè modo, quo arboreus musculus arboribus ipsis innascitur. Is utique cæteris præfertur, qui corallijs adnascitur, unde ei nomen. Probatum secundo loco, qui saxis adheret, colore rubicundo: cinereus uerò improbatum. Sed marinum muscum hæc pollere facultate non nouere ueteres: quandoquidem nusquam apud ipsos legerim marino musco interaneorum uermes necari. Musci marini historiam (longè tamen ab ea diuersam, quam paucis perstrinxit Dioscorides) prosecutus est Plinius lib.

Musci marini consider. Corallina.



xxvii. cap. viii. his uerbis. Bryon marina herba sine dubitatione lactucæ folijs similis, rugosa ueluti contracta, sine caule ab ima radice exeuntibus folijs. Nascitur in scopulis maximè, testisq; terra comprehensis. Præcipua siccandi ei spissandiq; uis, & collectiones omnes inflammationesq; cohibendi, præcipuè podagræ, & quicquid refrigerare opus sit. hæc Plinius. Ex quibus nimirum uerbis liquidò constat ipsum errasse in historia Musci marini, quòd hunc perperam fecerit folijs lactucæ similem. Cæterum Musci marini meminit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, sic inquires. Muscus marinus compositus est ex terrena, & aquea essentia, utraq; frigida. Siquidem & ipsum adstringit, & calidis quibusuis illitus, ea euidenter refrigerat, & adiunat. Id Græcis ἑρπύων θαλάσσιον quod Latinis Muscus marinus uocatur: Tahaleb, siue Thabel Arabibus, quibus tamen muscus is cum lente palustri confunditur: Italis ac officinis, Corallina: Germanis, Meermeisz, seu Mermoes: Hispanis, Malhorquiana yerua: Gallis, Coralline.

Musci marini uires ex Gal. Nomina.



## Fucus Marinus.

## Cap. XCV.

EPHYCI marini generibus, quoddam latum, & alterum sublongius, & rubens: tertium candidum, nascens in Creta, floridum ualde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia uim habent refrigeratorem, non podagræ modo, sed etiam inflammationibus, in cataplasmatibus efficaciter utilem: uerum ijs uti humidis conuenit, priusquam exarescant. Nicander puniceum aduersus serpentes dedit. Hoc fuco quidam putant mulieres suum colorem mentiri, cum tamen sit radícula eiusdem nominis, qua sese fucant.

Fuci marini  
hist. ex Plin.

DE FVCO marino locutus est Plinius libro XIII. cap. XXIII. ubi ita scriptum reliquit. Nascentur in mari frutices, arboresq; minores in nostro. Rubrum enim, & totius orientis Oceanus refertus est syluis. Nō habet lingua alia nomen quod Græci uocant phycos, quoniam algæ herbarum magis uocabulum intelligitur: hic autem est frutex. Et lib. XXVI. cap. X. Triā, inquit, Phyci thalassij, id est, Fuci marini genera, latum, & alterum longius, quoddamtenus rubens: tertium crispis folijs, quo in Creta uestes tinguntur. hactenus Plinius. Ceterum cum Fuci genera mihi planè incomperta sint, quid de ijs dicam non habeo. Non tamen deest suspicio, quin Fucus marinus si algæ non est, in eius saltem genere recenseri possit et debeat: nam Theodorus in Theophrasto non aliter Fucum marinum prætatur, quàm algæ nomine. Adde quod & Plinius alijs in locis Fucum marinum algam maris aliquando uocauit, etiam adnotauit Marcellus. Sed non ob hoc existimauerim, Fucum marinum eam uulgarem esse algam, in qua Veneti uasa uitrea recondunt, ne inter uehendum collidantur, & confringantur. Quod præterea Fucus marinus algæ esse possit, illud argumento sit, quod nullum aliud, quod sciam, apud Latinos nomen inuenit. Algæ species est, quæ in ulua dicitur, hoc tantum inter se differentes, quod hæc palustris, lacustris, fluuiatilisq; sit: illa uero tantum in mari proueniat. Quod discrimen illo uulgari nerficulo indicatur.

Algæ uenit pelago, sed nascitur ulua palude.

Vnde etiam Virgilius libro sexto Aeneidis ita cecinit.

Tandem trans fluuium incolumes, uatēq; uirumq;

Infirmi limo, glaucaq; exponit in ulua.

Et libro secundo eiusdem.

Linosaq; lacu per noctem obscuris in ulua.

Delitui.

Fuci marini  
uires ex Gal.

Nomina.

Fuci marini mentionem fecit Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum, his uerbis. Phycos humens etiamnum, & uirēs ex mari exemptus desiccatur, & refrigerat ordine secundo: habet enim quiddam modicè acerbum. Nomen Græcis φυκος, Latinijs, Pbucus seu Fucus marinus: Italij, Phuco marino.

## Potamogeton.

## Cap. XCVI.

POTAMOGETON: folium betæ simile, hirsutum, paululum supereminens extra aquam. Refrigerat, & inspissat: pruriginibus utile, & contra ueterum ulcerum nomas. Nomen ex eo inditū est, quod palustribus, & aquis enascatur.



Potamogeton  
nis confid.

Vires ex Gal.

Nomina.

POTAMOGETON lacubus, & paludibus innasci amat, ubi filijs betæ proximis, super aquam expansis in compluribus locis emicare inuenitur. Hanc herbam nos sæpe uidimus, & legimus, priuatim in lacubus quibusdam in Ananiensi agro, quàm ibi unā cum nymphæa aquis supernatantem deprehendimus. Potamogeton, ut testatur Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum, adstringit, & refrigerat similiter polygono, sed essentia eius crassior, quàm Polygonon est. Huic herbe nomen Græcum ποταμογείτον, Latium similiter Potamogeton: Italicis, Potamogeto: Germanis, Seebalden, kraut, & Sam kraut.

STRATIOTES



## Stratiotes.

## Cap. XCVII.

STRATIOTES in aquis nascens, iisdem supernat, & sine radice uiuit: unde cognomen traxit. Herba semper uiuo similis, ni maiora haberet folia. Quæ refrigerant: sanguinem, qui defluit à renibus, pota sistunt: uulnera, quæ inflammationem minantur, intumescere non sinunt: ignibus sacris, & tumoribus ex aceto illinuntur.

NON EST profectò quòd mirentur, si Stratiotes in Italia non prouenit. Quandoquidem ea, ut lib. XXIII. cap. XVIII. Plinius testatum reliquit, est in Aegypto tantum, & inundatione Nili nascitur, aizo similis, ni maiora haberet folia. Vocatur Græcis *spatiótēs ēvvdpos*: Latinis, Stratiotes aquaticus.

Nomina.

## Stratiotes millefolium.

## Cap. XCVIII.

STRATIOTES millefolium exiguus frutex, palmi altitudine, aut amplius affurgit: folijs auium pulli pennas imitantibus, breui admodum, dissectoque foliorum exortu. Folia sylvestre minimum simulant, præsertim breuitate, atque scabritia, breuiora paulò: densiore umbella, & plenior. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modum anethi: flores paruos, & candidos. Nasceitur in asperis agris, præcipuè circa semitas. Eximij usus ad ulcera uetera, recentiaque, profluentem sanguinem, & fistulas.

## MILLEFOLIUM MAIVS.

## MILLEFOLIUM MINVS.



STRATIOTES in hunc usque diem Millefolij cognomen retinet. Planta est officinis notissima, in incultis proueniens, in pratis, & circa semitas, lignosis caulibus, dodrante maioribus, pluribus ab una radice prodeuntibus, quibus folia insunt auium nouellarum pennis similia, sylvestriq; cumino æmula. Flores eius densiore umbella sustinentur, candidi, et si nonnunquam in purpura rubescant. Ex his utique notis palam est, communis usus Millefolium nil aliud dici posse, quàm Stratioten, de quo hic agitur, non autem, ut Brasauolus existimat, Myriophyllum infra à Dioscoride descriptum. Siquidem Myriophyllum caulis est tener, singularis, unica nixus radice: folijs plurimis, leuibus, scoride descriptum. Quæ sanè omnia, ni fallor, apertissimè ostendunt, Brasauolum hac in re hallucinatum esse. Millefolij genus quoddam nascitur in Goritensi agro Saluatino monte prope sacellum diuæ Mariæ uirginis, eo tantum

Stratiotes millefolij consideratio.



## VERBASCUM PRIMVM.

Stratiotæ uir-  
ges ex Gal.

Nomina.



VERBASCUM SECVNDVM.



saxoso tractu, quo ad Sontium fluvium descenditur. Id quoniam aliud præstat magnitudine, ut eius effigies, quam hic damus, aperte ostendit; ideo nobis iure liceat ipsum nominare Millefolium maius. Stratioten hunc, & superiorem perstrinxit Galenus libro VIII simplicium medicamentorum, ubi de utriusque uiribus ita differit. Stratiotes aquaticus quidem humida, & frigida facultate est: terrestris uero nonnihil habet adstrictionis: proinde sanæ. & ulcera glutinare potest, & ulceribus esse utilis. Sunt qui eo & ad sanguinis eruptiones utantur, & ad fistulas. Herba, quæ Grecis στρατιώτης χυλλόφυλλος, Latinis Stratiotes millefolium appellatur: Italis, Stratiote millefolio: Germanis, Garben: Hispanis, Milhoyas yerua: Gallis, Mille feuille.

## Verbascum. Cap. XCIX.

VERBASCUM differentias summas habet duas, hoc nigrum, illud album: in quo mas, & fœmina intelligitur. Fœminæ igitur folia sunt brasicæ, pilosiora multo, & latiora, candida: caulis albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus: flores albi, aut ex luteo pallescentes: semen nigrum: radix longa, gustu acerba, crassitudine digiti. nascitur in campestribus. Verbascum, qui mas appellatur, oblongius, albis folijs, & angustioribus, tenuiori caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore, latioreque constaret folio. Sylvestre folia fert saluix: altas uirgas, & lignosas, & circa eas ramulos, quales marrubium: flores luteos, aut æmulos. Sunt & phlomidæ duæ, hirsutæ, rotundis folijs, humiles: Tertia lychnitis appellatur, ab alijs autem thryallis, folijs ternis, aut quaternis, uel paulo pluribus, hirsutis, crassis,

## VERBASCUM TERTIVM.



pinguibusque.



RBASCVM SYLVESTRE.

VERBASCVM LYCHNITIS.



PRIMVLA VERIS.



PRIMVLA VERIS ALTERA.





pinguibusque: apta ad lucernarum lumina. Radix priorum duarum adstringit: quare quod magnitudine ludicrum talum æquet, in alui profluuium, conuenienter ex uino datur. Decoctum ruptis, conuulsis, fractis, antiquæ tussi auxiliatur: dentium dolorem collutione mitigat. Verbascum, cui flos aureus, capillos tingit, & quocumque abijciatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia aduersus tumores, & oculorum inflammationes illinuntur, syderatis ulceribus ex uino, & melle, cum aceto autem uulneribus medentur: contra scorpionum ictus sunt auxilio. Syluestris folia ambustis igni sunt cataplasmatis. Aiunt in folijs eius, quam fœminam dicimus, aridus ficus omnino non putrescere.

Verbasci genera, & confideratio.

Ruellij, & Fuchij opinio. reprobata.

Verbasci uires quædam.

Blattariæ historia, & uires.

Verbasci genera, & uires ex Galeno.

Nomina,

**PRIMA** Verbasci genera, domestica scilicet duo, nulli non cognita sunt. Verum syluestre, quod folijs saluie similibus, aureisq; floribus prouenit, non omnibus sanè notum existimo. Viret tamen hodie Patauij in uobilissimo simplicium horto, quem ad commune studiorum commodum Illustrissimus Venetorum Senatus construi curauit. Quin nec fortasse Lychnitis, cuius etiam figuram hic damus, nouere uult. Reliqua uerò, qui mihi demonstrauerit in Italia, hætenus reperi neminem. Et quauis sint, qui putent, ut Ruellio, Fuchio, & recentiorum alijs placet, eas uulgaris notitiæ plantas, quæ quibusdam Brachæ cuculi, officinis Primulæ ueris, Germanis clauis sancti Petri, uon nullis uerò herbæ paralytici appellantur, esse Dioscoridis Phlonides, quæ hirsutis, rotundisq; folijs, humiles prostratæ, eorum tamen sententiæ, licet eruditorum uirorum, haudquaquam ad stipulandum possum. Siquidem plantis ijs folia non in sunt hirsuta, nec etiam rotunda, sed alteri leuia, alteri uerò crispæ, lactuce, aut dipsaci modo. Adde quod florum, quos hæc Phlomidum genera proferant, uisquam, quod sciam, meminit Dioscorides, neque è ueteribus alijs, qui Verbasci genera recensent. Id quod in herba paralytici, meo quidem indicio, silentio inuolueudum uon fuerat, cum hæc omnium prima suis aureis floribus emicet, uerq; nouum pronunciet: unde illi officinæ nomen imposuerunt. His recentiores uim efficacem tribuunt ad articularum dolores. Radicis earum decoctum ad reuuium, & uescicæ calculos commendant. Succum quoque tum potum, tum exterius illitum fractis, luxatisq; ossibus utilem esse tradunt. Quo item ex floribus expresso utuntur mulieres ad erugendam faciem, eiusq; maculas detergendas. Sed ad legitima Verbasci genera redeamus. Hæc omnia in uniuersum, ut plurimis factis periculis constat, omnibus ferè sedis morbis mirifice subueniunt: adstringunt enim, & exiccant. Quamobrem seminis, & florum puluis, additis chamæmali floribus, & laricis resina, procidentem sedem suffitu cohibet, & tenasimum præcipue dysentericis tollit. Verbasci fœminæ folia inter lapides confusa, si equi claudicantis ex clauorum uoxa ungui prius excauato imponantur, mirum dictum quam breui tempore is liber euadet. Radicis eiusdem succus, antequam caulē proferat, duarum drachmarum pondere ex Cretico uino haustus, in ipsa acceptionis hora (ut Arnaldus refert) quartanam fugat, cum hoc tamen, quod delet, et aut quotuor iteratis uicibus hauriatur. Succus tam florum, quam foliorum asperis uerrucis illitus, eas facillè delet, et si leuibus nihil proficiat. Est & herba similis Verbasco, quæ

#### BLATTARIA.



**BLATTARIA** Plinio nominatur libro xxv. cap. ix. ubi eam ijs uerbis depingit. Est similis Verbasco herba, quæ sepe falsit pro ea capta, folijs minus candidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Hæc abiecta blattas in se contrahit, ideoq; Romæ Blattariam uocant, hæc Plinius. Eundem uerò effectum Dioscorides illi Verbasci generi assignauit, quod floribus aureis descripsit. Quæ certè res facit, ut creda, quod non aberrarent ij, qui sibi animam inducerent, blattariam Plinij, & uerbascum illud Dioscoridis, cui flores insunt aurei, uiam & eandem plantam esse. Porro Blattaria passim ferè nascitur: folijs oblongis, per ambitum serratis: floribus tertium Verbasci genus maxime æmulantibus. Quibus decidentibus circa caulē folliculi exoriuntur parui, lini iustar, duariorum tamen, ac leuioribus, in quibus semen continetur. De hac herba plures, quod inuenerim, facultates non produntur. Sed cum ea gustu amara deprehendatur, hinc certò colligere licet, quod eadem & aperire, & abstergere possit. Verbasci genera, & uires memoria tradidit Galeus lib. viii. simplicium medicamentorum, ubi ita scribit. Verbasceum, quoddam folijs album est, quoddam uerò nigrum. Et albi aliud quidem mas est, cuius folia angustiora: aliud fœmina, cuius maiora. Est præterea aliud Verbascum syluestre cognominatum, quod floribus constat aureis & luteis. Sed & præter has species alia est, quam proprie phlomidida, & thryallida nominant. Priorum itaq; duarum radix gustu acerbata est, & fluxionis affectibus prodest: sed & ad dentium dolorem eam quidam colluunt. Attamen folia digereudi uim habent: sic & aliarum folia, & maxime eius, quæ aureos flores obtinet: qua etiam capillos rufant. Omnium enim folia desiccandi, & digereudi moderatè uim possident. Quæ planta Græcè φλόινος, Verbascum Latine dicitur: Italis, Verbasco, & uulgò Tasso basso: Germanis, Vulkraut: Hispanis, Verbasco: Gallis, Bouillon.



## Aethiopis.

## Cap. C.



**AETHIOPIS** folia habet verbasco similia, perquam futa, densa; in orbem circa radicem imam redacta: caulem quadrangulum, † scabrum, similem apiastro, aut arctio, multis concavū alis: semen erui magnitudine, geminum, in uno conceptaculo: radices ab eodem cespice numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu: quæ siccae nigrescunt, duranturque, ut cornua possint uideri. Plurima nascitur in Ida monte Troadis, & in Messenia. Auxiliatur purulentis excreationibus, ischiadicis, pleuriticis, arteria scabritijs, decocta radix, & pota: quin & cum melle, eclegmatis uicem præbet.

**TAMETSI** iam pridem existimauerim, Aethiopidem herbam in Aethiopia, & Ida Troadis tantum uisci, quod eam inibi plurimam gigni testentur Dioscorides, & Plinius; hoc tamē anno legitima, ni fallor, Aethiopis ad me allata est Patavio ab erudito iuueni medico Ioanne Odorico Melchiorio Tridestino, quā, nulla prorsus reclamante nota, Aethiopidem referre deprehendi, ut eius pictura, quam hic damus, pulchrè demonstrat. Aethiopidis non reperio ineminisse Galenum in simplicium medicamentorum censu. quamquam eam memoriæ prodidit Paulus lib. VI. ubi nō plures de hac herba vires tradit, quā quæ Dioscoridi acceptæ referri possunt, cum ita scribat. Aethiopis similia verbasco habet folia. Radicis decoctum potum auxiliatur ischiadicis, pleuriticis, & sanguinem reiicientibus: arteria etiam asperitates cum melle lenit. Ut Græcis hæc planta *αἰθιοπία*, ita etiam Latinis Aethiopis nominatur; Italis, Ethiopide.

Aethiopidis  
coulider.

Aethiopidis  
vires ex Pau.

Nomina.

† Hoc loco in vulgatis Græcis codicibus legitur *αἰθίοψ*, hoc est, crassum. Quam uocem interpretes Plinium fortè, ut solet, secutus omisit. Sed cur nos eam non adiecerimus, fecit Oribasius, quem in hoc Plinio adstipulari iuuenimus.

## Arction.

## Cap. CI.

**ARCTION**, aliqui potius Arcturon uocant, similis est verbasco folijs, nisi quodd hirsutiora, & rotundiora sunt: caule longo, molli: semine cumini, paruo: radice tenera, alba, dulci que. Decocta cum semine radix in uino, dentium dolorem mulcet, si contineatur ore decoctum: ambusta, pernio-nesque fouentur eodem: bibitur aduersus coxendicum dolores, & stranguriam è uino.

**CREDIDIT** Ruellius, Arction eam esse plantam, quæ & secus uias, & in scrobium marginibus nascitur, quamq; officinarum uulgus Lappam minorem appellat. Sed Ruellius in hoc haud dubie, meo quidem iudicio, fallitur, neq; audiendus est. Siquidem, ut diligenter notas expendentibus perspicuum fiet, Lappa minor aliud profectò nō est, quam xanthium inferius à Dioscoride representatum. Etenim Lappa minor folio uerbasco, coq; hirsutior non uisitur: neque caulem profert longum, & mollem: quin nec semen cumino simile, neque radicem teneram, ac dulcem. Ex quibus sanè notis repugnantibus Ruellij opinio euidentissimè refellitur. Nulla equidem hætenus herbam reperi, ac uidi, quæ Arctium legitime referat. Huius meminit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum, ubi de eo ita scriptum reliquit. Arction illud, quod uerbasco est simile, radice tenera, candida, dulci: caule oblongo, & molli: semine cumino simili, facultatis est admodum tenuium partium, & ob id exiccantis, extergentisq; tamen modicè. Quam obrem radix, ac semen eius cocta cum uino, quadantenus dolores dentium mitigant. Porro ambusta, & chinethla, non horum modò decoctum perfusum, sed & caules teneriores sanare possunt. Quod *ἄρτιον* Græcis, Arctium quoq; Latini dicunt: Itali, Arctio.

Arctij confi-  
deratio.  
Ruel. error.

Arctij vires  
ex Galeno.

## Personata.

## Cap. CII.

**PERSONATA** folia habet cucurbitæ, maiora tamen, hirsutiora, nigriora, & crassiora: caulem albicantem, quamquam & interdum uidua caule reperiatur: radice intus candida, foris nigra. Hæc drachmæ unius pondere pota cum pineis uncibus, purulenta, & cruenta extusiscentibus auxiliatur: trita dolores à contorsionibus artuum contractos, illitu sedat. Folia utiliter antiquis ulceribus illi-  
nuntur.



## PERSONATA.

Personatæ  
consideratio.



Plinii tutela.

Fuch. error.

Brasavolii hal-  
lucinatio.

Personatæ ui-  
res ex Gal.

## PERSONATA ALTERA.



Nomina.

PERSONATAM, Plinio libro XXV. cap. IX. teste, quidam Arcion uocant, cuius folio nullum est latius, grandes lappas ferentem. Ex quibus Plinij uerbis planum fit, Personatam eam minirum plantam representare, quam officinae uulgo Lappam maiorem uocant, quod huic folia insint herbarum omnium maxima, longeque cucurbitina excedentia: quodque hæc lappas grandiores ferat. Huius altera habetur species, quæ quidem folijs cucurbitas magis æmulatur, ijs tamen maioribus, in rigulis, et scrobium marginibus proueniens, caule interdum nidua, non tamen perpetuo, quoniam ueris initio et caulem, et flores proferat, licet ijs subinde consistim exnatur. Ex huius folijs nostrates rustici pileos sibi conficiunt, quibus à solis radijs se timent, dum Sirio ardente segetem uel metunt, uel triturant. Huius item meminit Plinius loco citato, ubi eam non quidem Personatam, sed Persolatam appellat, sic scribens. Persolatam, quam nemo ignorat, Græci uero Arcion uocant. Folia habet maiora etiam cucurbitis, et hirsutiora, nigrioraque, et crassiora: radicem albam, et grandem. Hæc Plinius de Persolata. Ex cuius notis facile cognosci potest, Plinium hic secundum Personatæ genus descriptisse. Quo fit, ut maxime redarguendum putem Leonium, utpote qui Plinium in hoc perperam damnauerit, asserens non nisi unum Personatæ genus reperiri. Fuchsius, et recentiorum nonnulli non dubitant, quin hoc Personatæ genus sit Petasites. Sed omnes, pace eruditorum dixerim, in errore versantur, ut proxima commentatione liquebit. Ceterum Brasauolus in suo simplicium examine Lappam credidit esse Dioscoridis Aparinen, in hoc euidentius hallucinatus, quam ut eius error explodi debeat, ut etiam ij diiudicare poterunt, qui in re herbaria etiam mediocriter uersati fuerint. De Personatæ medicamento, his uerbis. Alterum uero Arctium, quod Prosopida uocant, cuiusque folia cucurbitinae similia sunt, nisi quatenus tum maiora, tum duriora, discutit simul et desiccant, sed et adstringit medicocriter. Quamobrem folia eius ueteribus ulceribus mederi possunt. Quæ planta Græcis ἀρτίων, Latinis Personata uocatur: Italis, Lappolla maggiore: Germanis, Groß kletten: Hispanis, Bardana, et Pagamacera mayor: Galicis, Gloteron, et Bardana.

## Petasites. Cap. CIII.

PETASITES pediculus est cubito maior, crassitudine pollicis, à quo prægrande folium, galeri modo amplum, ceu fungus dependet. Contra phagedænas, et ulcera quæ cacoethe uocantur, efficaciter illinitur.

Petasitis con-  
sideratio.

Ruellij, & Fuch-  
sij opinio.

Vires ex Gal.

Nomina.

QUANQVAM scribit Ruellius, nasci Petasiten in Gallia; non tamen uideo, quomodo quis recte eius sententia subscribere possit ac debeat. Quandoquidem is Persolatam, de qua superiori capite differuimus, pro Petasite sumptisse uidetur, quam etiam ipsum forte secutus Fuchsius pro eadem depinxit. Sed quoniam Petasites pediculum sumit cubito proceriorem, à quo amplum folium, galeri figura, tanquam fungus, dependet, cui folium huius Persolatæ uel Arctij generis minime respondereprehenditur; hinc fit, ut horum alioqui doctissimorum uirorum sententiam improbandam esse existimem. Nobis hactenus ueram Petasiten non licuit inuenire. Atque adeo mea sententia est, quod hæc non nascatur in Italia, argumento, quod tam grande folium tandiu nunquam latere potuisset. Petasiti uires paucis reddidit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Petasites ex tertio est ordine desiccantium. Quamobrem ad maligna, quæ cacoethe uocantur, et phagedænica ulcera, ea utuntur. Non secus Latinis Petasites, ac Græcis πετασίτης nominatur.



## Epipactis.

## Cap. CIIII.

EPIPACTIS ab alijs elleborine, parua herba, exiguis folijs, Iecinoris uitijis utilis, & contra uenenapota.

EPIPACTIDA adeo paucis perstrinxerunt Dioscorides, ac ceteri, qui ante & post ipsum de plantarum historia scripserunt, ut difficile admodum sit decernere, quænam planta sit hæc in Italia, ubi fortasse ea non prouenit. Nam, ut Plinius lib. XIII. cap. XX. commemorat, Epipactis in Asia, & Græcia nascitur. Verum enimvero si Epipactis Elleborine ex eo dicta est, quod cum Elleboro nigro similitudinem habeat, eam quidem crediderim nasci in Goritiensti agro. Quandoquidem inibi frequens quedam parua herba reperitur, cuius hic figuram damus, quæ folijs, floribus, & radicibus elleborum nigrum representat. Epipactidis inter simplicia, quod inuenerim, non meminit Galenus. Sed Paulus idem, quod Dioscorides, de eius uiribus tradidit.

Hæc ἐπιπᾶκτις Græcè dicitur: Latine item Epipactis, & Elleborine.

Epipactidis  
consideratio.

Nomina.


## Fumaria.

## Cap. CV.

FVMARIA fruticosa herbula est, prætenera, coriandro similis: folijs candidioribus, undique numerosis, cineracei coloris: flore purpureo. Huius succus acris est: claritatem facit oculis, delacrymationemque: unde nomen traxit. Illitus cum gummi, euulsas palpebras renasci prohibet. Commanducata herba biliosam yrinam trahit.

FVMARIA.

FVMARIA ALTERA.



Bb

FVMARIA,



Fumariæ con-  
sideratio.

Fumariæ ge-  
nera ex Plin.

Fumariæ vi-  
res ex Mesue

Fumariæ vi-  
res ex Gal.

Nomina.

**FUMARIA**, herba vulgaris admodum notitiæ, officinis passim uocatur *Fumus terræ*. Fumariæ uero nomen sibi ascuit, quod eius succo oculis immisso, quibus mirifice claritatem conciliat, lacrymas, quemadmodum & *Fumus cieat*. Debet hæc Mauritanis longè magis, quam Græcis, quod illi eam pluribus commendauerint uiribus, nec eis quidem contenendis, ut Serapionem, Auicennam, & Mesuem legentibus facile patebit. Fumariæ Plinio duo traduntur genera lib. xxv. cap. xiii. ubi ita scriptum reliquit. Capnos prima, quam pedes gallinaceos uocant, nascens in parietinis, & sepibus, ramis tenuissimis, sparsisq; flore purpureo, uiridis, succo caliginem discutit: itaque in medicamenta oculorum additur. Similis & nomine, & effectu alia est Capnos fruticosa, præterea folijs coriandri, cineracei coloris, flore purpureo. Nascitur in hortis, & segetibus hordeaceis. Claritatem facit in oculis, delacrymationemq; ceu fumus, unde nomen accepit. eadem euulsas palpebras renasci prohibet. hæc Plinius. Caterum quænam altera sit Capnos, quæ etiam ab Actio describitur, superius libro tertio de Aristotolis geographia, & Pistolochia differentes latius explicauimus. Eò igitur illos remittamus, qui plura de altero Fumaria genere scire desiderant. Hic satis nobis sit eius tantum inaginem exhibere, Fumariæ alterius nomine inscriptam, atque eius notas, quas loco citato retulimus, omittamus, ne idem frustra repetere uideamur. Porro in nobis, & Dioscoridi adscriptis simplicium nomenclaturis reperio Capnon quibusdam Corydalion appellari. Vnde factum est, ut in suspicionem uenerim, an de Capno intellexerit Galenus libro xi. simplicium medicamentorum, ubi de galerita scribens, quæ Græcis corydos dicitur, Corydalios herbæ meminit, sic inquit. Adieci hæc sermoni, quod uellem clare hoc animal, nempe galeritam, manifestare, quos ferat in capite pilos erectos: quandoquidem expertus sum eius aduersus colicos utilitatem, uelimq; qui ipsum non norunt, ijs bene monstratum. Nam & ipsa Corydalis appellata herba colicis conuenit. Et hoc quoque tibi obiter sit notatum. hætenus Galenus. Sed iam ad Fumariæ uires redeamus, quas primum ex Mesue sic ad sensum referam. Fumaria inter mitiora, innocentioraq; recensetur medicamenta, quibus deiectoria uis inest. uerum nimia huius herbæ copia facit, ut eius quoque auctoritas & pretium plurimum diminuat. Hæc non modo aluum soluit; sed & uiscera roborat, contrahitq; distentos eorum uillos. Omni prorsus noxa caret: quo fit, ut hæreticis nullum inferat incommodum. Roboratur deiectoria eius facultas, quod non admodum sit ualentior, additis myrobalanis, sena, caprino sero, insectorio cocco, aut uis passis. Præstat quæ uirentior, folijs extensis, non saucè crispis, & quæ uiolaceo sit flore. Colligi debet uerno tempore, & ex eo succus exprimi. Sunt qui hanc in uniuersum temperamento frigidam dixerint. Sed aberrarunt, quoniam in ipsa foliorum superficie reperitur & caliditas, quæ tamen eius frigiditatem non superat. Siccit præterea ordine secundo, sed semen calidum est. Deprehenditur sanè eius caliditas ex amaritudine, & acridinis parte quadam modica, quæ gustu percipiuntur. Quapropter attenuat, penetrat, obstructions aperit, ac deiectoriæ est facultatis. Sicut & frigiditatis, & acerbæ qualitatis adminiculo, cohibet, aggregat, & roborat. Aluum facit deiecit, bilem trahit, & adustos humores. Eius uis non modo ad hepar; sed & ad uenas diffunditur. Quamobrem sanguinem expurgat, & omnibusq; incommodis medetur à bile, aut exustis humoribus prouenientibus. Proinde elephantiasis medetur, aduersus carcinomata efficax est: lichenas, & alia cutis uitia mirifice emendat: quin & omnibus morbis auxiliatur, qui ex uiscerum infarctu originem ducunt. Roborat Fumaria uentriculum, iccur, & cætera interna uiscera, biliosasq; sunt febres, quemadmodum & eas, quæ ex uasorum obstructione excitantur. Fumariæ meminit Galenus lib. vii. simplicium medicamentorum, ubi de eius uiribus disserit his uerbis. Capnos, hoc est, Fumaria acris simul, & amaræ qualitatis est particeps, nec tamen planè expers est acerbæ. Quamobrem urinam biliosam multam prouocat, sanatq; iccinoris obstructions, & debilitates. Succus eius oculorum aciem acuit, non paulum trahens lacrymarum, uelut ipse fumus: nam hic ei appellatio indita. Plebeius quidam ea uti solebat ad stomachum roborandum, unaq; uentrem lubricandum. Siquidem herbam primum desiccata condebat; porro cum uti uolebat, subductionis quidem gratia, melicrato inspergebat: at roborare uolens stomachum, uino nimirum diluto. Herba, quæ Græcis nazvis, Latinis quoq; Capnos & Fumaria nominatur: Arabibus, Scheiterig, siue Saheteregi: Officinis medicorum, *Fumus terræ*: Italis, Fumaria, & Fumoterra; Germanis, Erdtrauch; Hispanis, Palhomilba; Gallis, Fumeterre.

## Lotus urbana.

## Cap. CVI.

**LOTVM** urbanam alij trifolium uocant. nascitur in hortis. Extractus succus, addito melle, oculorum argema, nubeculas, cæterasq; caligines discutit.

## Lotus syluestris.

## Cap. CVII.

**SYLVESTRIS** Lotus, quam trifolium minus appellant, plurimum in Libya gignitur, caule bicubitali, & sæpe maiore, alis multis: folijs trifolij pratensis: semine sceni græci, multò minora, gustu medicato. Vim calfaciendi, & leniter adstringendi obtinet: vitia cutis in facie, maculasq; cum melle peruncta expurgat. Trita per sese, aut cum malux semine, in uino, aut passo bibitur aptissime contra dolores, qui uescicam malè habent.


Loti utriusq;  
consideratio.  
Gesneri, &  
aliorum opin.  
reprobata.

**NULLA** certè hætenus nobis sese obtulit herba, cui meritò subscribi possit: hæc est uera ac legitima Lotus syluestria. Caterum non desunt & recentioribus, quorum opinionem tuetur Gesnerus uir doctissimus in suo libro animalibus dicato, qui putant, Lotum satiuam esse Trifolium illud, quod in pratis passim atque alibi etiam prouenit: eo fortasse argumento adducti, quod Dioscorides scripserit Lotum tam urbanam, quam syluestrem ab aliquibus trifolium appellari.



LOTVS VRBANA.

LOTVS SYLVESTRIS.



lari. Sed quod errent ij, qui ita sentiunt, ex eo manifestè cognoscitur, quod à Dioscoride Loto sylvestri folia trifolij pratensis tribuantur. Nam si Dioscoridi Lotus sativa fuisset trifolium pratense, is nimirum scriptis tradidisset, eam in pratis nasci, non in hortis: atque satis illi fuisset Lotum sylvestrem sativæ similem reddere, omissa trifolij pratensis mentione. Hinc ergo colligendum arbitror, Lotum esse plantam aliam à Trifolio: eosq; in errore uersari, qui secus opinantur. Sunt porro alij, qui existimant, eam plantam esse Lotum urbanam, quam vulgares herbarij, & effigine Melilotum falsò appellant, utpote quæ folijs constet trifolij effigie, nascaturq; non in pratis tantum, sed etiã in viridarijs ac hortis. Verum horum sententiam cur plane probem, aut refellam, nihil equidem habeo, cum ij sua potius opinione duci, quàm rationibus aut auctoritatibus niti uideantur. Inclinat tamen animus ad credendum, quod ita, ut illi rentur, facile esse possit. quandoquidem vulgaris Melilotus & in hortis provenit, & folia trifolio proxima profert: quin & omnibus notissima est herba, quemadmodum Lotum urbanam olim fuisse aperte innuit Dioscorides, qui eam ut triviale ideo non depinxit. His illud etiam accedit, quod in hunc usque diem proprium seruari nomen, eo tantum aucto ex Loto in Melilotum. Vnde postea facile factum esse potest, ut eadem legitime meliloti locum occupauerit. Sylvestris uerò Lotus, quam copiosam in Libya gigni tradidit Dioscorides, an nascatur in Italia, non ausim affirmare. Equidem herbam quandam sæpius uidi, ac legi in incultis, & pratis nascentem, folijs trifolio emulis, bicubitali caule, quàm plurimis adnatis, luteis floribus, è quibus cornicula prodeunt semine plena, fœni græci modo, odore non ingrato. Sed an hæc sit uera Lotus sylvestris, nondum compertum, & exploratum habeo. Loti utriusque uires reddidit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Lotus domestica, Loti utriusq; vires ex Gal. quam quidam triphyllon, hoc est, trifolium nominant, ut mediocriter concoquendi uim possidet, sic etiam exiccant: di: in caliditatis, frigiditatisq; coniugatione media quodammodo est, & temperata. Lotus autem agrestis plurima in Libya provenit. Semen eius secundi est ordinis excofacientium, habetq; nonnihil absterforium. Λωτός quæ Græcè ἡ ψευδος, Latine Lotus urbana cognominatur: Italicè, Loto domestico. Quæ uerò Λωτός ἡ ἄγρια Græcis, Lotus sylvestris Latinis uocatur: Italis, Loto saluatico. Arabes utrunque cum Aegypto etiam indifferenter uocant Handachocha, Garch, & Thusf.

Loti utriusq;  
vires ex Gal.

Nomina.

## Cytisus.

## Cap. CVIII.

CYTISVS frutex est albus in totum, ut rhamnus, ramos spargens cubitales, & maiores: in quibus folia fœni græci, aut loti trifolix, minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita erucam olent, gustataque cicer recens sapiunt. Folia refrigerant: tumores inter initia discutunt, si

Bb cum



cum pane trita illinantur: decoctum potu vrinam ciet. Nonnulli, quod apes alliciat, prope alucaria ferunt.

Cytisi confi-  
deratio.

Cytisus fru-  
tex est, non  
herba.

Cytisi histo-  
ria ex Columella.

Cytisi histo-  
ria ex Plin.

CREDIDIMVS iandudum Cytisum, si tamen is in Italia proueniret, non aliam esse plantam, quam eam Tri-  
folij odorati speciem, quæ Romanis uulgo appellatur Tribolo, alijs uerò Trifoglio cauallino, hoc est, Trifolium equis-  
num, eo quod equis gratissimum sit pabulum, cum nulla sanè mihi occurreret planta, quæ magis notis omnibus Cytisum  
præ se ferre uideretur. In hanc opinionem me primum deduxerat Plinius, quod scripserit, iumenta degustato Cytiso  
hordeum spernere. Nam cum certò scirem, equos adeo huius Trifolij genere auidos esse, ut eo magis delectentur, quam  
Cytisum, præsertim cum pluribus constet notis, quæ Cytiso respondent. Huc præterea alia accedebat ratio, quod  
cum Dioscoridem uiderem de Cytiso inter herbas, non autem inter frutices, & arbores differere, non aliud quidem  
mihi persuadere poteram, quam quod Cytisus esset herba potius, quam arbor: præcipue cum palam sit, iumenta  
herbas, & fœnum potius depasci, quam arborum frondem. Siquidem eruo, & medica herbis antiqua ætas armenta,  
& pecora alebat, ac saginabat. His itaq; rationibus fretus (tunc enim plura neglexerā inuestigare) adductus eram,  
ut existimarem, illud Trifolij genus odoratū omnino esse Cytisum. Verum enimvero cum postea rem hanc accuratius,  
rectiusq; expendissem, me in errore uersari deprehendi. Proinde in præsentia non grauabor priorem mutare senten-  
tiam, constanterq; affirmare, aliam ab illa planta Cytisum esse: nec eam quidem herbam, sed fruticem, qui cultura  
arborescat. Non enim is sum, qui opinionis alicuius sustinendæ gratia adeo pertinax esse uelim, ut falsum magis,  
quam uerum tueri contendam. Sed quod iure putem in aliam me deuenisse sententiam, facit in primis Galenus li-  
bro primo de antidotis, ubi Cytisum fruticem esse myrti magnitudine scribit, his uerbis. In Mysia quoq; quæ parte  
nostræ provincie finitima est, tractus occurrat, quem Britton nominant, in quo mel Attico persimile magna cum ada-  
miratione conspexi. Extabat enim ibi quoq; collis quidam non magnus, saxosus totus, thymo, & origano refertus:  
alibi locus erat Cytiso plenus. Apes plurimum mellis ex Cytisi floribus excerpere scriptores uuo ore tradunt. Fru-  
ticosa uerò planta Cytisus est, eam altitudinem attingens, ad quam myrti crescunt. hæc Galenus. Est deinde Plinius,  
quem Galeno subscripsisse inuenio libro XII. cap. III. cum inquit. Alterum est ebeni genus fruticosum, Cytisi modo  
& tota India dispersum. Et libro XVI. cap. XXVIII. ubi inter arbores Cytisum enumerat, scribens. Tota ossa  
est, ilex, cornus, robur, Cytisus, morus, ebenus, lotus, & quæ sine medulla esse diximus. Accedit his etiam Colum-  
mella, qui idem testari uidetur in calce libri V. ubi cum longius de Cytiso differuisset, demum inquit. Hactenus de ar-  
boribus præcepisse abunde est. Horum itaque probatorum auctororum testimonio planum fieri arbitror, Cytisum arbo-  
rescentem esse fruticem myrti modo, ut Galenus scriptum reliquit. Sed mihi quidè hactenus inter Italicos frutices, qui  
arboris instar adolescunt, nullum contigit inuenire, qui legitime Cytisum referret. Cæterum non desunt, qui sibi  
persuadeant, atq; etiam scriptis tradant (ut Gesnerus in libro magno, quem de quadrupedibus edidit) se Cytisum  
uidisse, legisseq; in Italia in syluis, alijsq; syluestribus locis, qui per se tantum proueniat. Sed equidem dubitauerim,  
ne, & ipsi decipiantur: quandoquidem ij, quantum ex eorum scriptis colligi potest, Coluteam sic Theophrasto non  
catam sumunt pro Cytiso. Neq; propterea illud dixerim, quod putem Cytisum sua sponte non prouenire, cum teste  
Columella lib. IX. cap. IIII. de re rustica, duplex sit Cytisus, una satina, & altera sue spontis: sed quod scribat  
Plinius, raram esse in Italia. De satina autem Cytiso diligentissime scripsit idem Columella lib. V. de re rustica,  
capite ultimo, cuius hæc uerba subijciam. Cytisum, inquit, in agro esse quam plurimum maxime refert, quod gallinis,  
apibus, capris, bubus quoq; & omni generi pecudum utilissimus est, quod ex eo citò pinguescit, & lactis plurimum  
præbet ouibus: tum etiam quod octo mensibus uiridi eo pabulo uti, & postea arido possis. Præterea in quolibet agro,  
quanuis macerrimo, celeriter comprehendit: omnem iniuriam sine noxa patitur. Mulieres quidem si lactis inopia  
premuntur, Cytisum aridum in aqua macerari oportet, & cum tota nocte permaduierit, postero die expressi succi  
ternas heminas permisceri modico uino, atque ita potandum dari: sic & ipsæ ualebunt, & pueri abundantia lactis  
confirmabuntur. Satio autem Cytisi uel autumnus circa idus Octobris, uel uere fieri potest. Cum terram bene sub-  
egeris, areolas facito, ibiq; uelut ocymi semen Cytisi autumnus serito. Plantas deinde uere disponito, ita ut inter se  
quoquo uersus quat uor pedum spatia distent. Si semen non habueris, cacumina Cytisorum uere deponito, & stercore  
tam terram circumaggerato. Si pluuia non inceserit, rigato quindecim proximis diebus, simul atque nouam frons  
dem agere cœperit, sarrito, & post triennium deinde cadito, & pecori præbeto. Equo abunde est niriis pon-  
do XV. bubus pondo uicena, cæterisq; pecoribus pro portione uirium. Potest etiam ante Septembrem satis commodè  
ramis Cytisus feri, quoniam facile comprehendit, & iniuriam sustinet. Aridum si dabis, præcius præbeto, quoniam  
uires maiores habet, priusq; aqua maccrato, & exemptum paleis permisceto. Cytisum cum aridum facere sole hæc  
circa mensẽ Septembrem, ubi semen eius grandescere incipiet, cadito, paucisq; horis, dum flaccescat, in sole hæc  
beto: deinde in umbra exiccato, et ita incondito. hactenus Columella. Plinius quoq; Cytisi historiam copiose pro-  
sequitur libro XIII. cap. XIIII. ubi hæc habet. Frutex est & Cytisus ab Aristonacho Atheniensis miris laudibus  
prædicatus pabulo ouium, aridus uerò etiam suum: spondetq; iugero eius annua H--S: MM. uel mediocri solo redi-  
tus. Utilitas quæ eruo, sed ocyor satietas, perquam in modico pinguescente quadrupede, ita ut iumenta hordeum sper-  
nant. Non ex alio pabulo lactis maior copia, aut melior: super omnia pecorum medicina à morbis omni usu præstans  
te. Quin & nutricibus in defectu lactis aridum, atq; in aqua decoctum, potui cum uino dari iubet, & firmiores, cele-  
stioresq; infantes fore. Viridem etiam gallinis, aut si aruerit madefactum. Apes quoque nunquam defore, Cytisi pa-  
bulo contingente, promittunt Democritus, & Aristomachus. Nec aliud minoris impendij est. Seritur cum hordeo,  
aut uere semine ut porrum, uel caule autumnus ante brumam. Si semine madidum: & si desint imbres, satum spera-  
gitur.



gitur. Plantæ cubitales seruntur scrobe pedali. Seritur post æquinoctia tenero frutice: perficitur triennio: demeritur uerno æquinoctio, cum florere desijt, uel pueri uel anus uilissima opera. Canus aspectu, breuiterq; si quis exprimere similitudinē uelit, angustioris trifolij frutex. Datur animalibus post biduum semper: hyeme uero quod inaurit, madidum. Satiant equos denæ libræ, & portione minora animalia: obiterq; inter ordines allium, & cepe seri fertile est. Inuentus hic frutex in Cithno insula, inde translatus est in omnes Cycladas, mox in urbes Græcas, magno casei prouentu. Propter quod maxime miror rarum esse in Italia. Non æstuum, non frigorū, non grandinum, aut niuis iniuriam expanseit. hæc Plinius. Ex quibus hic certè subit nobis mirari Gesnerum, uirum alioqui cruditone clarum, quod in suo magno libro de quadrupedibus, ubi probare contendit arborem, quam rura Tridentina Eghelum uocant (nos eam Anagryis generi adscripsimus) esse Laburnum, scribat ex auctoritate Democriti Cytisum apibus aduersari. Qua in re is mihi quidem uidetur (pace eius dixerim) non fuisse memor illorum uerborum, quibus paulo ante asseruerat eisdem Democriti testimonio, apes uunquam desore, cytisi pabulo contingente. Id quod nos quoq; ex Plinio paulo supra retulimus. Ceterum de Trifolio illo odorato, cuius initio huius commentationis, atq; etiam fusius libro tertio in Trifolij mentionem fecimus, neque Dioscorides, neque Galenus, quod sciam, quicquam memoræ prodiderunt. Non desunt, qui id uelint esse Theophrasto plantam Mel frugum appellatam, quam ipse inter loti genera recenset libro VII. cap. XIII. de plantarum historia, ubi sic inquit. Quædam enim formis pluribus constant, quanquam nomen unum sortiantur, ut ita ferre æquiuoca sint, ceu lotus. Huius enim genera plura recondant, folio, caule, flore, fructuq; discreta. Inter quæ uel illud redditur, quod Mel frugum appellatur diuersum tum uiribus in usu cibario, tum quod non eadem loca desideret. hæc Theophrastus. Quæ sanè illorum sententiam mihi probare non uidentur, quod Trifolium odoratum minime in cibis ueniat, & iisdem in locis nascatur, in quibus lotorum omne genus uirescere conspicitur. Atqui Plinio libro XXII. cap. ultimo, nil aliud est Mel frugum, Dioscoridis testimonio, quam panicum. Cytisi uires Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, reddidit his paucis uerbis. Cytisi folia digerendi facultatem obtinent aquæ temperatæ mistam, sicut & malæ folia. Planta ut Græcè καλίστος, ita etiam Cytisus Latine, & Citiso Italicè dicitur.

Gesneri lapsus.

Cytisi vires ex Galeno.  
Nomina.

### Lotus ægyptia.

### Cap. CIX.

EST ET in Aegypto lotus, quæ in campis flumine inundatis prouenit, caule fabæ: flore paruo, candido, lilio simili, quem tradunt occidente sole comprimi occludique, ad ortum autem aperiri: adduntque, caput ipsum uespera aquis condi, & ad exortum solis emergere. Caput quale papaueris, maximum: & intus grana, ceu milij, quæ Aegyptij exiccant, & in panes cogunt. Radicem lotos hæc habet, mali cotonei similitudine, quæ cruda coctaque manditur: decoctaque lutei oui qualitatem exhibet.

LONGAM satis historiam de Loto Aegyptia posteritatis memoriæ tradidit Theophrastus libro III. cap. X. de plantarum historia, cuius hic uerba referam. Qui Lotus, inquit, uocitatur, planis partē maxima prouenit, cum rura inundantur. Huic natura caulis similis fabæ, & fructus eodem modo, uerum minores, gracilioresq;. Nascentur fructus in capite, modo quo in faba: flos candidus, lilijs foliorum angustia proximus: multi, ac densi, promiscui exant. Sole occidente se comprimunt, caputq; integunt, ad ortum aperiuntur, & super aquam assurgunt: idq; facit, dum caput perficiatur, floresq; defluant: Capitis magnitudo quanta papaueris maximi, & percingitur incisuris non alio modo, quam papauer: nisi quod in his fructus frequentior habetur, qui milio non absimilis est. In Euphrate caput, floresq; mergi referunt, atq; descendere usq; in medias noctes, tantumq; abire in altum, ut ne demissa quidem manu capere sit, diluculo deinde redire, & ad diem magis: sole oriente iam extra undas emergere; floremq; patefacere: quo patefacto amplius insurgere, ut planè ab aqua absit altè. Aegyptij capita ipsa acernis putrefaciunt, cumq; tegumenta puruerint, in flumine lauando separant fructum, & siccantes, pinsentesq; panem faciunt, eoque cibo utuntur. Radix loti Corsion appellata, rotunda est, cotonei mali amplitudine, cortice nigro, quali nux castanea tegitur. Corpus internum candidum: elixum, assumq; in speciem albuminis uertitur, gratum cibus: manditur etiam erudum, sed gratius decoctum seu aqua, seu pruna. Hactenus de Loto Aegyptia Theophrastus. Ceterum hæc Arabum Handachocha. Eius supradictas Loti species Serapio sua lingua Handachocham indifferenter nominat. E cuius semine oleum exprimitur Mauritania ad articulorum dolores expetitum. Neq; enim sit Handachochæ oleum ex uulgaris trifolij semine, ut quidam aberrantes existimant, sed ex omnium Lotorum semine, & ex eo tantum trifolio, quod asphaltiten Græci uocant. Loti Aegyptiæ breuiter meminit Galenus inter alias lotos, libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Loti Aegyptiæ semen in panes quidem cogitur. Planta lotos αἰγύπτιας Græcè, Lotus Aegyptia Latine, Handachocha Arabice, & Loto d'Egitto Italicè appellatur.

Loti Aegyptiæ historia ex Theophr.

Arabum Handachocha.

Lotus Aegyptia ex Gal.  
Nomina.

### Millefolium.

### Cap. CX.

MYRIOPHYLLVM, siue millefolium, caulis est tener, singularis, unica nixus radice: plurimis folijs, læuibus, fœniculo similibus, unde nomen accepit. Caulis flauescit, varius, ac. ueluti ex industria deliniatus. nascitur in palustribus. Vulnere recentia ab inflammatione uindicat, si uel uide, uel siccum ex aceto oblinatur: præcipitatis in potu cum aqua, & sale datur.



## MYRIOPHYLLON.

## MYRIOPHYLLON ALIVD.

Myriophylli  
consideratio.

## MYRRHIS.

Myriophylli  
vires ex Gal.

Nomina.

Myrrhidis cō  
sideratio.

ET SI non desunt, qui uelint Myriophyllum, ut superius in Stratiotis millefolij commentatione diximus, esse uulgare Millefolium, quo omnes passim utuntur in Italia: tamen cum hoc plurimis caulibus à radice profiliat, folijs constet à ferniculo diuersis, nascaturq; in pratis & incultis, non autem in paludibus, hinc satis perspicuum fieri puto, hos qui ita sentiunt, in errore uersari. Equidem legitimum Myriophyllum me inuenisse, & sepe uidisse crediderim in uallis Anania palustribus, unico tantum caule, innumeris foliolis referto, capillaceis sceniculi modo, odore non ingrato. Huius plantæ hic picturam damus, aliamq; appinximus ad nos Pisis missam ab eruditissimo uiro Luca Ebino. Myriophylli uires paucis perstrinxit Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Myriophyllum usque adeo desiccatorie est facultatis, ut uulnera glutinet. Quod Græci μυριόφυλλον, Latini item Myriophyllum, & Millefolium aquaticum uocant: Itali, Miriophillio.

## Myrrhis.

## Cap. CXI.

MYRRHIS simillima est cicutæ, caule, folijsq; : radix ei oblonga, mollis, rotunda, odorata, cibo non insuauis. Quæ pota in uino, phalangiorum morfib; auxiliatur: cit menstrua, & partus secundos, purgatque à puerperio scæminas: subuenit & phthisicis cocta in sorbitione. Aiunt quoque eandem bis die cërue potam ex uino, in pestilentia salutarem esse, & ne morbi contagia sentiantur, obstore.

GIGNITVR in quàm plurimis Italie locis planta quædam cicutæ faciem representans, minor tamen, minimeq; grauius uolens



ueolens, Cicutaria nonnullis uocata, quam quidam censent legitimam esse Myrrhim. Sunt deinde, qui pro Myrrhidae Angelicam uulgò appellatam accipiunt. Alij uerò, ut Menardus, illud uideris genus intelligunt, quod Cheresfolium uocant. Veruntamen hoc, meo iudicio, nullis notis Myrrhida refert, sicuti nec illa: tametsi huius radix à recentioribus in pestilentia miris laudibus commendetur. Quòd autem Angelica non sit Myrrhis, ex eo euidentissimum esse arbitror, quòd ei folia sint satinae pastinacae similia, non quidè multifida, ueluti cicutae. Ceterum si Myrrhis in Italia prouenit, nulla sanè mihi hactenus sese obtulit planta, quae magis illi respondeat, quam haec, cuius hic effigiem pictam exhibemus, quae quidem longè ab Angelica differt.

## ANGELICA.



Sed quoniam ANGELICAE mentio incidit, ut tamen praestantissimam plantam silentio praetercamus, hic fusius de ea nobis differendum est. Haec itaque planta cubitalem excedit altitudinè, caule geniculato, inani, multis alarum caulis referto: folia profert oblonga, per ambitum serrata, in nigrum uirescentia: flores albos, in umbellam coherentes: è quibus semen prodit tenue, lentum modo còpressum. Radix ei subest crassa raphani modo, quae in plures diuincatur ramos, gustu acris, & suauiter odorata. Excalfacit, pariterq; desiccatur ordine secundo completo, aut tertio incipiente. Proinde aperit, attenuat, & discutit. Venenis mirifice aduersatur: quare pestilentiam arceat hausta, aut frequenter commansa. Ipsa per se sumpta pituitosos, lentosq; humores digerit. Idem praestat & radice decoctum, quod etiam celerius ex frigore tussientibus auxiliatur: expectorat enim efficaciter crassam, lentamq; pituitam. Sanantur eodem ex aqua, aut uino interna uiscerum ulcera, còcretusq; sanguis dissoluitur, et roboratur uentriculus. Radix in puluerem trita animi deliquis, & ceteris cordis affectibus opem unice praestat. Valet ad rabiosorum, & uenenosorum morsus, exterius cum ruta imposta, & intro in corpus assumpta. Hinc fit, ut recentiores quidam magna opinione hanc suis inferant antidotis. Myrrhidi iam suas reddamus uires ex Galeno, qui eas lib. VII. simplicium medicamentorum, his uerbis descripsit. Myrrhis, quidam myrrham nominant. Radicem habet odoris iucundi, & dulcem, quae menses mouet, & ea quae in thorace, ac pulmone sunt, expurgat. Itaque ex secundo ordine fuerit excalfacientium, adiuncta quadam partium tenuitate. Mùp-  
tis ita Graecis, Myrrhis quoq; Latinis dicitur: Italis, Mirrhide.

Angelice historia. & uires.

Myrrhidis uires ex Gal.

Nomina.

## Myagrum.

## Cap. CXII.

MYAGRON, aliqui melampyron uocant, herba est furculacea: folijs rubiae, pallidis, tripedanea: semen o-

leosum, fœno græco simile. Quod contusum igni torrent, perunctisque uirgis ad lucernarum luminantur. Hoc pingui, scabritias corporis læuigari, atque expoliri constat.

SCRIBIT Ruellius, Myagrum frequentissimum nasci in Gallia, eiusq; semine agros bene subactos perinde quasi napsi feri, quin & suae spontis inter segetes inueniri. Ex semine autem oleum exprimi ait, quo non ad luminantur lucernarum; sed ad ciborum quoque condimenta pauperes utuntur. Addit id à suis Cameliam, aut Camamitam uocari. Sed ipse non equidem Ruellio ausim subscribere, quandoquidem non pudeat fateri me hactenus Myagrum non uidisse in Italia, quod Dioscoridis delineationi respondeat. Ceterum eos haud dubie falli crediderim, qui putant, uulgare illud aurei coloris semen, quod aliqui Drodam, Drodellam alij, nonnulli uerò Dorellam dicunt, legitimum referre Myagrum. Siquidem hoc folijs rubiam non aemulatur, sed syluestrem erucam, ut quae laciniata spectentur; nec semen profert fœno græco simile, sed papaueris modo exile. Myagri semen, ut testatum reliquit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, pingue est. Quare si tundatur, oleosum quid effundit, quod euoplasticum nim obtinet. Herba, quae Graecis μύαγρος, Latinis pariter Myagrum appellatur: Italis, Miagro.

Myagri consideratio.

Quorundam error.

Myagri uires ex Gal.

Nomina.

## Onagra.

## Cap. CXIII.

ONAGRA, siue onothera, aut onuris frutex est arboris instar, praegrandis, amygdalino folio, sed latiore, lilio non dissimili: flore rosaceo, magno: radice candida, longa, cum siccata est, uinum olente. nascitur in montibus. Aqua, in qua radix maduerit, in potu data, feras mitigat, & cicures facit, illitu quoque tetra ulcera mulcet.

TAMETSI memoria prodiderit Theophrastus lib. IX. cap. XXI. de plantarum historia, Oenotherae radicem è uino potam mitiores, hilarioresq; mores conciliare; nullum tamen, qui eam mihi offenderet, hactenus licuit re-

Onagreae consideratio.

Bb 4 perire,



## CIRSIVM.



ASTER ATTICVS.

Onagræ ui-  
res ex Gal.

Nomina .

Cirsij confi-  
derario.

Nomina .

perire, quanuis ad mitigandam omnium animalium feritatem, ne dum hominum quorundam, esset optimum, utilissimumq; remedium. Caterum ad me scripsit clarissimus medicus Lucas Ghinus Forocorneliensis, sepius ex Apennino in uiridarium suum transulisse plantam homine proceriorem: folijs amygdale, maiori- bus tamen: flore rhododendri: semine perquam minuto, exili- bus teretibus siliquis contento, molli ac candida lanugine obu- luto: radice subalbida, longa, subter humum repente. Quæ sa- nè omni ex parte Onagram referre uidetur, etsi ipse quoque pro- certo non ausit asserere, hanc legitimam esse Onagram, cum hæc ætenuis experientia compertum non habeat, an huius radix sicca uinum redoleat, mitigetq; feras aqua, in qua maduerit pota, ut Dioscorides testatur. Onagræ meminit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Onagron, aut onos- thera, aut onothuris, huius radix arefacta uinosum quiddam rea- dolet: sed et uini maximè facultatis est. Quæ ἐνὰ γὰρ Græcæ, Onagra item, siue Oenagra Latine dicitur.

## Cirsium.

## Cap. CXIII.

CIRSIVM, caulis est tener, duorum cubitorum, triangulo similis: ab imo foliola, rosæ speciem referen- tia: anguli spinosi: per interualla molles: folia buglos- so similia, longiora, subcandida, modicè hirsuta, parti- bus extremis aculeata: cacumen caulis orbiculatum, hi- spidum: in quo capitula in summo purpurea. quæ fol- uuntur in lanugines. Radicem huius loco laboranti ad- alligata, dolores uaricum sedare Andreas scripsit.

CREDIDERE recentiores quàm plurimi rei herba- ria periti, nil aliud esse Cirsium, quàm uulgare Buglossum. Sed mihi planè hæc sententia, pace eorum dixerim, resellenda pos- tius, quàm probanda uidetur: quod Buglossum caulis triangulus non insit, sed rotundus: quod ab imo foliola per ambitum acu- leata rosæ speciem non referant, sed longa, et continua pro- deant: quod deniq; Buglossum flores non euanescent in pappos, sed languescens integri decidant, relicto in folliculis semine. Plantam, quam proculdubio Cirsium referre putamus, nuper Pisis ad me misit clarissimus medicus Lucas Ghinus, cuius etiam hic figuram damus. Nascitur, ut ipse scribit, in uliginosis locis. Ea, meo quidem iudicio, Cirsio maximè ad stipulari deprehendi- tur: Cirsij nusquam, quod legerim, meminerunt in simplicium censu Galenus, et Paulus. Id æquè ὀπίσθιον Græca uoce, atq; Latina Cirsium appellatur.

## Aster atticus.

## Cap. CXV.

ASTER Atticus cauliculus lignosus, florem in ca- cumine habens purpureum luteumue, per ambitum di- uisum, anthemidis modo, capitulum, foliolis stellæ mo- do radiatis: quæ autem caulem ambiunt folia, oblonga sunt, ac hirsuta. Feruenti stomacho, oculorum inflam- mationibus, procidux sedî, ac inguinibus illitu auxi- liatur. Tradunt purpureum florem, si ex aqua bibatur, anginis, & pueris comitale malum sentientibus, opi- tulari. Inguinum inflammationi recentem illinire con- uenit. Si aridus flos sinistra dolentis manu decerpatur, & inguinibus adligetur, dolore liberat.

ASTER



**ASTER** Atticus, qui & Bubonion, hoc est nostris Inguinalis, dicitur, sibi Attici nomen asciuit, quod in Athe-  
niensi agro frequentior, quam alibi proueniat. Bubonion uero, & Inguinalis dicta est herba, quod bubonum, siue in-  
guinum præcipuum sit remedium. Asteris porro appellationem accepit, quoniam eius capitula, in quibus flores cha-  
mamali instar emicant, per ambitum diuisa foliis stellæ modo radiata spectantur. Planta est hodie non paucis cog-  
nita. Nascitur in asperis, incultis, & conuallibus. Hanc Serapio (ut libro tertio in eryngij mentione prodidimus) cum  
Eringio confudisse deprehenditur, florum similitudine falsus, qui in utraq; planta stellæ figuram præ se ferunt. Cæ-  
terum non est prætereundum, quod nonnulli Dioscoridis codices reperiuntur, in quibus hoc capite plura leguntur,  
quam supra sint reddita. quæ quoniam à doctissimis uiris Dioscoridi accreuisse comperta sunt; ideo nos quoq; ea, ut-  
pote adiectitia omisimus. Quod autem adscititia sint, testimonio esse possunt Galenus, Oribasius, Paulus, & Serapio,  
in quorum libris illa, quæ redundant, nusquam leguntur, etsi reliquæ, ut solent, bona fide referant. In cuiusdam ta-  
men Apuleij libello de plantarum historia ex uiribus scripto, nonnulla habentur capite de Astere Attico, quæ inde fa-  
cile, quod ferè eadem esse uideantur, huc adiecta sunt: sic enim uerbis illa sonant. Stellarum radij noctibus collucent:  
quare qui naturam stirpis ignorant, inane simulacrum se uidere putant. Reperitur à pastoribus pecudum. Astera  
Atticum à Virgilio quoque celebratum fuisse existimo lib. IIII. Georgicorum, ubi Amellum, quem florem ita ab a-  
gricolis uocari ait, herbamq; eius descripsit. Id quod suis luculentissimis carminibus aperte testatum reliquit, dum  
ita cecinit.

Asteris Atti-  
ci confid.

Sarapionis  
erratum.

Amellus Vir-  
gili.

Est etiam flos in pratis, cui nomen Amello  
Fecere agricolæ, facilis quærentibus herba:  
Nanque uno ingentem tollit de cespite solum.  
Aureus ipse, sed in folijs, quæ plurima circum  
Funduntur, uiolæ subluçet purpura nigra.  
Sæpe deum nexis ornata torquibus aræ.  
Asper in ore sapor: consis in uallibus illum  
Pastores, & curua legunt prope flumina Melle.

Asteris Attici recens herba (ut Crateus tradit) cum axungia senio tusa rabiosi canis moribus utiliter imponitur.  
Turgentia guttura discutit, & incensa serpentes fugat. Huius meminit Galenus libro VI. simplicium medicamen-  
torum, ubi eius uires retulit his uerbis. Aster Atticus, alij bubonium uocant, non ob id tantum quod illitum, sed etiã  
quod suspensum bubonas sanare creditur. Habet quiddam etiam digerens, habet uero non minime & refrigerans  
quiddam, ac reprimens, adeo, ut mista sit facultatis, uti rosa, uerum id non adstringit. hætenus Galenus. Sed quo-  
niam Attica stella mihi in nientem redigit Stellariam recentioribus uulgo uocatam, cum & ipsa uiribus non uulgari-

Asteris Attici  
uires ex Gal.

### STELLARIA.

bus sit prædita, eam minime silentio dissimulandam duximus. Est  
igitur **STELLARIA**, quam alij Pedem leonis, alij Alci-  
millam uocant, plãta, quæ ut plurimum in montibus prouenit, præ-  
sertim in pratis, folijs malue ferme similibus, durioribus tamen, &  
crassioribus, angulis octo distinctis, prominentioribus, & per am-  
bitum serratis, adeo ut latius aperta stellæ formam referant. Cau-  
lis ei tenuis, semicubitalis, à quo plures exeunt ramuli, in quorum  
summo flores emicant subpallidi, tenucs, stellarum effigie. Radi-  
ce nititur, quæ crassitudine digitum æquat, & longitudine palmi  
excedit. Erumpit hæc Maio mense, Iunio uero floret. Efficax est  
pota sanandis non solum internis uiscerum uulneribus, sed & si-  
nuosis ulceribus. quinetiæ extrinseca uulnera glutinat. Expeti-  
tur Germanis chirurgicis, mirisq; laudibus celebratur: quippe  
qui eam felici successu uulnerarijs potionibus admisceant. Aride  
pulis in sui ipsius decocto, aut cum aqua eius stillatitia sumptus,  
enterocelis medetur. Datur idẽ pulvis ex uiuo, aut iure cochlea-  
ris mensura, quindecim aut uiginti diebus, mulieribus, quibus adẽ-  
pta sit concipiendi facultas à nimia uteri humiditate, quæ iniectioni  
semen contineri prohibet. Stillatitia eius equa epota, tum etiam  
in uulua indita, alba mulierum profluua mirifice sistit: adeo ut  
eius quoq; diutina iniectione corruptæ ab incorruptis uix diguo-  
sci possint, restrictis uirum in modum femineis locis: quod tum ce-  
lerius, tum efficacius præstat, si in eius decocto insideant. Quin  
& laxas procidenteq; mulierum mammas contrahit, & duras so-  
lidasq; efficit, si lintea in eius decocto, aut stillatitia aqua intincta  
manibus sæpius imponantur, diutiusq; importentur, præsertim hy-  
pocistide, equisetis, stypteria, siccisq; rosas admixtis. Planta,  
quæ Græcis ἀσπὴ ἀττικὸς Latinis item Aster atticus nomina-  
tur: Arabibus, Astaraticõ: Italis, Aster attico: Germanis, Stern-  
kraut: Gallis, Aspergoutte mineur.

Stellariæ hi-  
storia, & ui-  
res.

Nomina.





## Isopyrum.

## Cap. CXVI.

**ISOPYRON** aliqui phasiolon ob similitudinem uocant, quoniam folium, quo d est aniso simile, in pampinos torquetur: capitula sunt in summo caule, tenuia, plena seminis, melanthii gustum imitantis. Contra tussim, & cætera pectoris uitia, semen ex aqua malsa bibitur: hepaticis, & sanguinem excreantibus utile.

**HACTENVS**, ut ingenue fatear, mihi non contigit uerum Isopyrum inuenire, neq; ab aliquo compertum uidere. non tamen negauerim, quin illud nascatur in Italia. Quare si hac nostra ætate nobis non sese offeret, id posteris inquirendum relinquentur, qui fortasse diligentius in hac studia incumbunt, ut earum rerum, quæ nos latent, aliquando exactam cognitionem assequantur. Quod Græci *ἰσόρυον*, Latini etiam Isopyrum uocant.

Nomina.

## Viola purpurea.

## Cap. CXVII.

**VIOLA** purpurea folium habet hedera minus, tenuius, ac nigrius, nec multò dissimile: cauliculus à radice medius prodit, in quo flosculus suauissimè olens, purpureus. opacis, & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se, & ex polenta illinuntur aptissimè stomacho æstuanti, & oculorum inflammacionibus, sedique procidenti.

## VIOLA PURPUREA.

## IACEA.



Viola purpurea  
reg. confid.

**SUNT** in Violarum genere non modò purpureæ, sed etiam candidæ, frigidis & uliginosis locis nascentes, proventus tamen inodore, de quibus nihil, quod extet, memoriæ prodidit Dioscorides. Hæ numerosæ proueniunt in Anagniniensi agro supra Tridentum, ubi mense Aprili adeò copiosè florent, ut si longè prospiciantur, oculos fallant, & extensa lintea uideantur. Alij præterea flores per æstatem Maio, & Iunio mensibus uisuntur supernè purpurei, in medio candidi, inferius uerò lutei, forma purpureas uiolas reserentes, aspectu gratissimo, cum tamen nullo & ipsi commendentur odore. Prodeunt hi ex quadam planta, cui primo exortu folia insunt rotunda, per ambitum serrata, & ita tamen per incrementum in longitudinem desciscunt. Constat hæc caulibus triangularibus, quadrantenus striatis, & intus concavis, quibus paribus interuallis genicula supereminent, e quorum concavo ramusculi exoriuntur, quibus flores dependent. Vocant hanc nonnulli **IACEAM**. Verum an hæc illa sit Iacea, quam ad intestinorum ramices magnificiunt recentiorum quidam, nondum satis compertum habeo. Quanquam non desunt, qui affirmant, hanc esse

Iacea.



de qua modò sermo est, eamq; symphyti facultatibus pollere. quemadmodum etiam sunt, qui eandem egrè spirantibus, & pulmonum inflammationibus, non obscure opem ferre tradant: quin & scabiem sanare, & cetera cutis uitia delere. Violarum purpurearum facultates exquisitè descripsit Mesues inter simplicia soluentia, unde hæc de cerpsimus. Viola temperatum, conueniensq; sunt medicamentum, quo immutantur male humorum qualitates, & natura eorum soluitur. Præferuntur quæ primo uere florent, solis ardorem, qui uim resoluit, minimè expertæ, nec imbris dilutæ. Viola refrigerant, & humectant ordine primo, cum tamen sicca minus refrigerent. & minus humectent. Recentibus quedam inest humiditas, quæ obtundit caliditatem, à qua potior est uis. Quapropter siccata humiditate, quæ in superficie continetur, gustu amaritudo deprehenditur, quæ à calido prouenit, qui prius sub humido delitescibat. Quo fit, ut exiccata magis calidæ, minusq; humidæ habeantur. Humiditas, quæ superflua recentibus inest, aluum emolliendo ciet: uerùm arefactæ, deiectionis sunt facultatis, non quòd emolliant, sed quòd dissoluant. Viola in summa soporiferæ sunt, refrigerant, calidos dolores mulcent, inflammationes extinguunt, leniunt, & soluant. Earum succus & syrupus ex eo factus uentrem leniunt. Macerantur in aceto, quòd ualentius ardentissimis conferant febribus. Fit ex uiolis oleum, ijs in eo diutius maceratis: ceteris tamen præstat, quod ex inumaturis oliuis, aut ex dulcibus amygdalis exprimitur. Viola bilem educunt, eiusq; feruorem mitigant. Conferunt capitis doloribus, quos caliditas excitauerit: somnum conciliant: pectoris, & asperæ arteriæ scabritiem leniunt: medenturq; anginis, & columellæ uitij: præcipuò autem auxilio sunt pectoris, & lateris inflammationibus: stimulantq; arcent. At quæ sicca sunt, iecoris obstructions referant, inflammationes discutunt, & morbo regio laborantibus opitulantur. Hæc sunt de uiolis Mesues. Parant hac ætate è uiolarum recentium diluto, quo pluries uiole fuerint maceratæ, deiectionis Syrupum, quemadmodum & ex rosis rosaceum, quo deiectionis alui gratia recentiores medici in pleuritide utuntur, uncias quaternas, uel quinas exhibentes. Violarum uires tradidit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Viola folia aqueam & subfrigidam substantiam superantem possident: proinde tum per se, tum cum polenta illita calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur & ori uentriculi æstuant, & oculis hæc Galenus: Ex quibus abunde palam est non nouisse Galenum, sicuti & ceteros ueteres, Violas deiectionis facultate citra noxam præditas esse. Viola nigra, & Viola purpurea sic Latinis dicta, Græcis ἰὼν μέλαν, & ἰὼν πορφύρεον uocatur: Arabibus, Seneffgi, Sonofrig, siue Benefefgi: Italis, Viola porporea, & Viola manumola: Germanis, Mertzgen uiole: Hispanis, Violeta: Gallis, Violetes, Violes de martz, & Carefme.

Violarum uires ex Mesue.

Syrupus uioleaceus.

Violarum uires ex Gal.

Nomina.

## Cacalia.

## Cap. CXVIII.

CACALIA, quæ leontice uocatur, folia fert magna, alba: è quibus medius caulis emicat, rectus, albus: florem ferens robori, aut oleæ similem. nascitur in montibus. Radix in uino madefacta, ut tragacantha, delinctu aut manducatu per se tussibus, scabritiis arteriæ medetur. Grana, quæ post excussum florem innascuntur, trita & cum cerato illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

CACALIA, Plinio libro XXV. cap. XI. auctore, uocatur semen margaritis minutis simile, dependens inter folia grandia, in montibus ferè. ita Plinius. Sed non propterea mihi hæcenus contigit Cacaliæ reperire in Italia, est eam diu quæsiuerim in montibus. Ceterum herbam Cacaliæ similem testatur se pluries uidisse in Apennini Alpibus Lucas Ghinus Forocornelienfis medicus rei herbariæ diligentissimus inquisitor, folio tussilaginis, maiore tamen, uersa parte candidiore, minusq; per ambitum angulostore: caule palmi altitudine, recto, subcandido: in cuius caumine flores exeunt paniculæ faciem referentes, muscosi, oliuæ instar. Hanc ipse Cacaliæ suspicatur. Equidem huius uiri iudicio facile ausim subscribere, quòd is in simplicium cognitione diligenter uersatus sit, atq; inter Italos in ea maxime præstet. Cacaliæ cancanon uocauit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, ubi eius uires redidit his uerbis. Cancani radix facultatem habet mordacitatis expertem, & modicè exiccantem: essentiam crassam, & emplasticam. Quapropter macerata uino, sicut tragacantha, & linctæ arteriæ asperitates sanat: nec minus, si quis eam commandat. Succus eius defluens prodest arteriæ, similiter ut glycyrrhiza. Κακάλια ita Græcè, ut etiam Cacalia Latine dicitur.

Cacaliæ confederatio.

Cacaliæ uires ex Gal.

Nomina.

## Bunium.

## Cap. CXIX.

BVNION caulem edit quadrangulum, procerum, digiti crassitudine: in quo ramuli minutis foliis, ac floribus scatent: folia proximè radicem, apio similia, longè tenuiora, coriandrinis proximè: flores anethi: semen odoratum, hyoscyamò minus. Vrinam ciet, excalfacit, secundas euocat: renibus utile. Tam humidi, quàm sicci, expressiq; succi caulibus, foliis, radicibusque, usus inualuit ex aqua mulsa.

## Pseudobunium.

## Cap. CXX.

PSEVDVBVNION palmi altitudine fruticat in Creta, folia, ramulosque napi ferens, acri gustu. Tormina, atque stranguriam, laterumque dolores sanant quaterni rami eius poti in aqua: illiti quoque cum sale, & uino tepentes, strumas discutunt.

BVNIVM,



Bunii confid-  
deratio.

Bunii uires  
ex Gal.

Nomina.

**BUNIVM**, quod nostri *Napum sylvestrem* uocant, *Plinius* uidetur posteritatis memorie prodidisse lib. x. cap. iiii. ubi de *napis* ita scriptum reliquit. *Naporum* duas differentias, & in medicina *Græci* seruant. *Angulosis foliorum caulibus florentis*, & quod *Bunion* uocant, purgationibus sceminarum, & uescica, & urina utile decoctum, sed potum ex aqua mulsæ, uel succi drachma. Semen dysentericis tostum, tritumq; in aqua calida c cyathis quatuor: sed urinam inbibet, si non lini semen unâ bibatur. Alterum genus *Buniada* appellant, & raphano, & rapo simile. Semen præclari contra uenena: ob id & in antidotis utuntur illo. hæc *Plinius*. Ex cuius sanè uerbis palam fieri arbitror, eam nobis plantam esse *Bunium*, quæ *Napum sylvestrem* rura in *Hetruria* appellant. Nascitur hæc inculto solo, frigido præcipue tractu. Verum *Pseudobunium*, quod *Græci* uocant, nondum mihi in Italia compertum est. Quod nimirum uideri debet: nam quod planta hæc fruticet in *Creta*, ut *Dioscorides* testatur, uidetur potius *Cretensium* propria, quam aliarum gentium. *Bunium*, ut *Plinius* tradit, antidotis admiscetur: quare & in ipsa *Andromachi theriaca* *Bunium* expetitur. Vtriusque uires sanè paucis tradidit *Galenus* lib. vi. simplicium medicamentorum, sic inæquisimilis illi caliditatis est. Quod *Græci* *Βούιον*, *Latini* similiter *Bunium* uocant: *Itali*, *Nauone saluatico*. Quod uero illi *Πεῦδοβούιον*, hi *Pseudobunium*, & *Bunio falso*.

## Chamæcissus.

## Cap. CX XI.

Chamæcissi  
confid.

Chamæcissi  
uires ex Gal.

Nomina.

**CHAMÆCIS** folio est *hederæ*, tenuiore, longiore: ramulis à radice quinis *senisue*, *dodrantalibus*, foliosis: flore *uiolæ albæ* simili, candidiore, ac tenuiore, gustu supra modum amaro: radice tenui, candida, inutili. nascitur in cultis. Bibunt conuenientissimè *ischiadici folia*, tribus obolus in aquæ *cyathis* tribus, tricenis, *quadragenisue* diebus: eodem pota modo, *senis* aut *septenis* diebus, regium morbum purgant.

**CREDIDIT** *Leonardus Fuchsius*, medicus ætatis nostræ celebris, in suo de stirpium historia commentario, nihil differre *Chamæcissum* ab ea uulgaris notitiæ planta, quam, ut superius libro tertio in *Asclepiadis* mentione diximus, herbariorum uulgus *Hederam terrestrem* nominat. Sed cur eius sententiam comprobem, sanè non habeo. Siquidem uulgaris *hederæ* *terrestris* folio constat rotundo, quadantenus serrato: caulibus, uel potius funiculis uutilium modo longis, humi longo tractu repentibus. *Chamæcissus* uerò *Dioscoridi* folijs est *hederæ*, tenuioribus, longioribus: ramulis à radice quinis *senisue*, *dodrantalibus*, foliosisq; . Adde quod *Chamæcissi* flores *uiolæ albæ* similes facit *Dioscorides*, ac etiam candidiores. Sed *terrestis hederæ* *florem* profert pusillum, in candido purpurascentem. Quibus utique rationibus ducor, ut putem, hanc herbam non esse *Chamæcissum*, quod notis inter se plurimum pugnare deprehendantur. His etiam accedit, quod *Chamæcissos* (si *Plinio* credimus lib. xxiii. cap. xv.) spicata est *tritici* *modio*: & cum floret, existimari potest *alba uiola*. *Ruellius* hanc in *Gallia* nasci scribit. Sed eam aliam esse à *Chamæcisso* hic representato perspicuum est: ea enim, quæ *Plinius* refert, à *Dioscoride* dissentiant, quem nullam spicarum mentionem fecisse constat. Equidem, ut ingenue fatear, nullam hactenus in Italia herbam comperi, quam legitimè esse *Chamæcissum* ausim affirmare. De uiribus *Chamæcissi* breuiter differuit *Galenus* libro viii. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. *Chamæcissi flos*, cum sit admodum amarus, iecur obstructione liberat. Sunt & qui *ischiadici* ipsum exhibeant. Hæc planta ut *Græcis* *χαμαίμοσος*, ita etiam *Latinis* *Chamæcissus* nuncupatur.

## Chamæleuce.

## Cap. CXXII.

**CHAMÆLEUCE** lumborum doloribus propitia est. herba uirens, incuruis foliis, surculisque: flore rosaceo.

Chamæleuces  
confid.

Chamæleuces  
uires ex  
Galeno.  
Nomina.

**SANE** quam paucis *Chamæleuces* historiam perstrinxit *Dioscorides*. quare difficillimè quidem decerni potest: quænam in uniuerso plantarum genere *Chamæleucen* referat. Ceterum hic silentio non dissimulandum puto, quod non desunt codices (ut *Marcellus* & *Ruellius* *Dioscoridis* interpretes aiunt) in quibus non *χαμαίμοσος*, sed, *χαμαίμοσος* legitur. Alteram quidem lectionem nos quoque magis probamus, tum quod in notis *Dioscoridis* nomenclaturis *Chamæleuce* nil aliud sit quam *tussilago*, quemadmodum & apud *Plinium* libro xxiii. cap. xv. ubi eam *Farranum* siue *Farfugium* uocari tradit: tum etiam quod eodem loco *Plinius* idem fere scripserit de *chamæpeuce*, quod de *chamæleuce* in hoc capite scriptum reperitur. Quod haud dubiè ostendit, huius capituli initio mendum subesse. Et certè facilis ac lubricus potuit esse librariorum lapsus, ut qui unius tantum literæ mutatione *χαμαίμοσος* pro *χαμαίμοσος* scripserint. Porro *Plinius* *chamæpeuce* folijs *laricis* similem reddidit. mihi tamen ea uidetur potius *picæ* folijs assimilanda, si in composito plantæ nomine uolumus rectè posterioris uocis significatum spectare: non *picæ* *πεύκον*, *larix* uerò *λαρίξ* item *Græcè* dicitur. *Chamæleuce*, ut auctor est *Galenus* lib. viii. simplicium medicamentorum, calide est facultatis tertio quodammodo ordine, sicca primo. Ea *Græcè* *χαμαίμοσος*, *Latinè* item *Chamæleuce*, & *Chamæpeuce* uocatur.



BVGLOSSVM, BORRAGO.

BVGLOSSVM VVLGARE.



Bublossum, Lingua Bubula.



Cap. CXXIII.

**BVGLOSSVM** nascitur in campestribus, & sabulosis. Iulio mense colligitur. Aiunt eam, quæ thyrsos emittit, cum semine, & radice tritam, potamque contra tertianos horrores prodesse: quæ quatuor ad quartanos: ea in uino decoquitur. Herbam abscessibus vtilem esse uolunt. Verbasco simile est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum, bubulas imitans linguas. Quod in uinum decoctum, animi voluptates augeat.

**QVI** diligenter Buglosi historiam expendunt, omnes herbam Borriginem uulgò uocatam, in hortis, alijsq; locis nascentem, potius legitimum esse Buglossum censent, quàm illam, quæ Buglossa uulgò nominatur, cuius in officinis communis est usus. Quorum equidem iudicio non dubitauerim subscribere. siquidem Borrigo dicta folijs est in uerbascum uerbascum similibus, nigrioribus tamen, & asperioribus: quibus etiam hæc Symphytum alterum æmulatur, quod folia buglosso proxima ferre superius prodidit Dioscorides. Adde præterea, quod folia Borriginis in terram prostrantur, & bubulas linguas tum forma, tum asperitate imitantur. Contra quæ Buglosi nomen sibi falsò uendicauit, folia habet longa, echio similia, non usque adeò lata, ut bubulas refrant linguas, minusq; humi depressa, quæ potius è toto ferme cespite sursum aspiciunt, nec aliqua ex parte uerbascum, aut Symphytum alterum representant. Non ob id tamen negare auferim, quin uulgare Buglossum in campestribus nascens, iisdem cum Borragine polleat uiribus: quandoquidem eadem utriusque asperitas, idemq; sapor gustui manifestum præbent eiusdem facultatis indicium. Atq; facie non multum dissidere ea inuenias, si illud genus spectes, quod hodie in hortis feritur ex Hispanijs allatum: hoc enim etsi uerbascum adeò aduersum non representet, quemadmodum Borrigo; foliorum tamen effigie bubulas linguas maximè imitatur. Sed quoquomodo hæc se res habeat, concedam faciliè Borriginem, & uulgarem Buglossam esse speciem, & forma inter se differre: attamen crediderim alteram ad alterius uires proximè accedere, & si non eandem utrisque, simillimas tamen inesse. Cæterum non desunt, qui his rationibus neglectis asserant uulgare Buglossum Echij omnino genus esse, quod illud omnibus notis referre putent. Alij uerò sunt, qui idem Buglossum Cirsium existimant. Verum nos aliud à uulgari Buglosso & echium, & cirsium esse censemus, ut abunde suis locis docuimus.

Quod insuper Borrigo faciliè sit legitimum Buglossum, Auicenna testimonio comprobari potest, qui libro 11. sui canonis ita scribit. Lingua bouis est herba lata, habens folia sicut almaru, & ad tactum aspera, & rami eius asperi, sicut pedes locustarum. Oportet autem, ut illa administretur, quæ est in Corasceni, crassa habens folia, super quorum

Buglosi consideratio.

Buglosi descriptio Auicennæ.



faciem sunt puncta, quæ sunt radices spinarum, & pilorum exeuntium ab ea. Quibus notis adeo euidenter nostram Borriginem expressit Auicenna, ut nemo non intelligat, hanc esse Linguam bubulam. Eam præter morem descripsit Auicenna, quod suo quoque tempore non deessent, qui ueri Buglosi loco aliam quandam substituerent plantam, ut aperte eius uerba declarant, dum subdit. Quæ autem in hac terra reperitur, & qua utuntur medici, plurimum eius est genus almaru, & non est lingua bouis, & neque confert, ut inuamentum illius est. hæcenus Auicenna. His omnibus illud denique accedit, quod apud Apuleium in eo libello, qui de herbarum medicaminibus inscribitur, inuenio Buglossum Lucanis Corraginem nuncupari prioris tantum literæ mutatione, quod cordis affectibus quam maxime opituletur. Quæ sanè omnia, ni fallor, clarissime ostendunt, Borriginem esse uerum ac legitimum Buglossum. De cuius uiribus differens Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Buglossum humide calidèq; temperiei est. Itaque uinis iniectum, lætitiæ ac hilaritatis causa esse creditum est. Sed & ijs, qui ob faucium asperitatem tussunt, coctum in melicrato conuenit. Herbæ, quæ Græcis Βούγλωσσον, Latinis item Buglossum

Buglosi uires ex Gal.

Nomina.

& Lingua Bubula nominatur: Arabibus, Li seu althaur, seu Lesan althaur: Italis, Borrachine: Germanis, Burretsch: Hispanis, Borraia, & Borraienes: Gallis, Borrache.

### CYNOGLOSSVM.



CYNOGLOSSVM VVLG.

### Cynoglossum. Cap. CXXIII.

CYNOGLOSSON folia latifolia plantaginis habet, arctiora, minora, lanuginosa: caule vacat, & humi sternitur. prouenit in sabuletis. Folia cum suillo adipe ueteri, medentur moribus canum, alopecij, & ambustis. Emollit aluum, decoctum herbæ ex uino potum.

Cynoglosi consider.



Plinij lapsus.

LEGITIMUM Cynoglossum, quod Dioscoride teste, neque caulem, neque flores, neque semen gignit, pluries non modo uidimus: sed etiam legimus Romæ post Adriani molem in sabulosis quibusdam locis entum. Hoc à uulgari Cynoglossò, quo passim officinæ utuntur, perquam longè distat: quippe quod in radiantis solis morem felicitat, suppingua, tenui lanugine albicantia, humi strata, & caule perpetuo uiduum est. Illa uerò planta, quæ Cynoglossi usum omnibus præstat, plurimos emittit caules, cubito sæpius longiores, adnatis in cacumine ramis: quibus flores insunt purpurei, echinoides: è quibus deinde quædam parua prodeunt lappæ, non sine magno naturæ artificio factæ, quæ contactu uestibus per tinaciter adherent. Meminit Cynoglossi Plinius libro XXV. cap. VIII. his uerbis. Iungitur & Cynoglossos caninas imitans linguas, topiarijs operibus gratissima. Aiuntq; quæ tres thyrsos seminis emittat, eius radicem potam ex aqua ad tertianas prodesse: quæ quatuor, ad quartanas. Est & alia similis ei, quæ ferat lappas minutas. hæc Plinius. Ex quibus satis perspicuum esse potest, quod neutrum Cynoglossi genus à Plinio traditum, Dioscoridis Cynoglossò respōdet. Siquidem primū Plinio caules uel thyrsos edit adeo flexiles, ut ij topiarijs operibus maxime conueniant. Dioscoridi uerò plāta est sine caule, quæ humi sternitur. ut hinc apertissime constet, hanc operi topiario, ut aliquid conuoluitur uel contextat, prorsus ineptā esse. Adde quod Dioscoridi Cynoglossum medetur canum moribus alopecij, & ambustis: quintanarum aluum emollit. Plinio autem ad tertianas tantum, & quartanas prodest. Id quod de Buglossò intelligitur, ut superiori Buglossò statueret Dioscorides. Hinc itaque palam fieri arbitror, Buglossi sibi historiam, & uires cū Cynoglossò turpiter confudisse Plinium. Cuius certè lapsus non animaduertuerunt recentiorum uonnulli, qui Plinij auctoritate freti contra Dioscoridis grauem sententiam probare contendunt, Cynoglossum caules, flores, & semen producere. Quod autem secundo loco à Plinio describitur, lappas minutas



natas ferens, nil aliud, meo quidem iudicio, fuerit, quàm uulgare Cynoglossum omnibus notum. Quo fit, ut omnino errasse existimem Ruellium, & Fuchsum uiros aliqui doctissimos: quippe qui crediderint, uulgarem Cynoglossam esse Lycopsin, ut etiam supra suo loco monuimus. neq; enim hos auimaduertisse uideo de hac cum alio Cynoglosso scripsisse Plinium, ac deinde speciatim de Lycopsi lib. xxvii. cap. xi. Cynoglossi in libris de simplicium medic. facultatibus nusquam reperio meminisse Galenum. Id Græcis κυνόγλωσσον, Latinis Cynoglossum & Lingua canina uocatur: Italis, Cinoglossa.

Ruel. & Fuch.  
error.

Nomina.

## Phyteuma.

## Cap. CXXV.

PHYTEUMA folia habet struthij, minora: copiosum semen, perforatum: radicem parua, tenuem, per summa terræ nitentem. Quam ad amatoria conuenire, nonnulli scriptum reliquerunt.

CVM sit usus Phyteumatis ad amatoria duntaxat, exemplo Plinij ductus, plura hic de eo referre superuacuum habeo: præsertim quod nulli rei herbariæ studio id hodie compertum esse, etiam. Mihi quidem hætenus herba hæc incomperta est. Quare eam relinquamus in hortis Veneris, quos ipsa ad delicias & amatoria tantum colit, donec quis Deæ charissimus hanc herbam edoctus, eam nobis quoque indicare possit. Huius, tanquam superuacuae, & inutilis herbe, Galenus & Paulus nusquam, quod legerim, inter simplicia meminerunt. Quædæ ut Græcè, ita etiam Phyteuma Latine dicitur.

Nomina.

## Leontopodium.

## Cap. CXXVI.

LEONTOPODION duum digitorum herbula est, folia ferens angusta, longitudine ternam, quaternumve digitorum, hirsuta, quæ iuxta radicem lanosiore flocco canescunt: capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri: semen usqueadè spissa lanugine inuolutum est, ut saepe fallat: radice parua cohæret. Quam tradunt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

VERVM Leontopodium hætenus non solum mihi incompertum est; sed alijs quoque ignotum esse arbitror: nullum enim inueni, qui ipsum hodie ostenderet. Neque propterea hoc multum curare debent medici, cum & eo adalligato ad amatoria tantum usa fuerit antiquitas. Cæterum hic non est audiendus Brunfelsius, qui Stellariam herbam uulgò uocatam in suo onomastico Leontopodium esse scribit. Qua in re non minus hallucinatus deprehenditur, quàm in alijs compluribus.

Brunfelsij  
eratum.

Nomina.

Vocant ita λεοντοπόδιον Græci, ut Latini quoque Leontopodium.

## HIPPOGLOSSVM.

## Hippoglossum.


## Cap. CXXVII.

HIPPOGLOSSON, frutex est folia habens rufci tenuis figura, & spinosam comam, & in summo ceu linguas è folijs exeuntes. Capitis dolorem corona ex comis imposita minuit. malagmatis radix, succusque admiscetur.

HIPPOGLOSSVM, quod in folijs ueluti prominentes linguas proferat, Bislinguam uocat Hetruria, alij uerò Bonificiam. Nascitur hæc frequentissima in Liguriæ Alpibus, Urbinate agro, & quibusdam syluosis montibus non longè à Goritienst comitatu, quæ iter est in Hydriam ad argenti uiui fodinas. Verumtamen non est hæc Laurus Alexandrina, aut Idæa, de qua infra suo loco differemus, ut in suo insigni de plantarum historia commentario existimat Fuchsius. Quandoquidem Laurus Alexandrina è foliorum umbilico nullam aculeatam exerit linguam, sed tantum fructum rotundum tilie modo longiori pediculo appensum profert. Hippoglossum recetiores longè pluribus commendant uiribus, quàm fecerint antiqui scriptores. nam, ut illi tradunt, in ueteri affectibus magno datur iuuamento. Quo fit, ut strangulatu uulua laborantibus mulieribus radice, aut herbe puluis cochlearis mensura, ex uino, uel iure haustus, præsentaneo remedio opem ferat.

Hippoglossi  
consideratio.

Hippoglossi  
uires.





Nomina.


ferat. Est & ad puerorum enterocelas præstantissimum medicamentum, si diutius diluculo hauriatur pulvis idem sesa-  
quidrachmæ pondere ex maioris symphyti decocto. Verum id sumentibus euenit, quod primis tantum diebus adeo ra-  
micem pulsare percipiant, ut intestina foras prolabi uelle uideantur: quare subcingulis, fasciis, & fibulis reprimen-  
tibus, roborantibusq; primis diebus uti opus est. Quæ planta Græcis ἵππογλωσσον, Latinis similiter Hippo-  
glossum appellatur: Italis, Bislingua, & Bonifacia: Germanis, Zepflir kraut: Hispanis, Lengoa de cavallo: Gale-  
lis, Lingua pagana.

## Antirrhinum.

## Cap. CXXVIII.

Antirrhini co-  
sideratio.Antirrhini ui-  
res ex Gal.

Nomina.



ANTIRRHINON, alij anarrhinon, uocant herba  
caule, & folijs anagallidi similem: florem albæ uiolæ, pur-  
pureo, minore tamen, ideoque syluestris anagallis no-  
minata est: semine vituli narium simili. Tradunt per-  
unctos ea cum oleo lilino, uenustiores fieri, nec ullo me-  
dicamento lædi posse, si quis appensum gesserit.

VARIAT. admodum Antirrhini apud ueteres historia. Si  
quidem Dioscorides Antirrhinum herbam folijs, & caule anagalla-  
lidi similem reddidit. Theophrastus uero eandem aparina simi-  
lem fecit. Veruntamen Antirrhinum illud, quod ego sepe tum ui-  
ditum etiam legi, semine uitulinum caput referente, unde Gale-  
nus hoc & Bucranion appellari prodidit, folijs est longiusculis,  
& angustis, lino, aut osyridi similibus: floribus lychnidi corona-  
rie æmulis, purpureis, & uisui gratis. Huic sanè ad stipulari uir-  
detur Plinius libro xxv. cap. x. ubi Antirrhinon, fortasse rea-  
ctius quàm alij, depinxit lino simile, & semine uitulinum. Vnde  
de facili suspicor, Dioscoridis, & Theophrasti exemplaria hoc in  
loco deprauata esse, atque in aliqua parte uitium latere. An-  
tirrhini meminit Galenus lib. vi. simpl. medicamentorum, ubi de e-  
ius uiribus ita scribit. Antirrhinum, aut anarrhinum semen habet uir-  
tuti narium simile, ad sanationes inutile. Ipsum autem ad similitu-  
dinem bubonij facultatis, sed multò minoris. Itaque ex illo de  
hoc coniecto. Hoc ut Græci ἀντίρρινον, ita etiam Latini An-  
tirrhinum uocant: Itali, Antirrhino: Germani, Orant, Streich  
kraut, seu Streich kraut: Hispani, Cabezza de ternera: Galli,  
Moron uiolet.

## Catanance.

## Cap. CXXIX.

EX EO genere una, folia coroponi habet, longa: radicem iunci modo prætenuem, capitula se-  
na, septenave, in quibus erui semen inest. Arescens in terram flectitur, & se contrahit ad speciem un-  
guium milui exanimati. Altera mali parui magnitudinem explet, radice exigua: oliuæ magnitudi-  
ne: folijs quoq; oliuæ colore, & figura, mollibus, diuisis, humi inclinatis: semen ut cicer, minutum,  
in uirgulis dependet, punicei coloris, multis foraminibus pertusum. Vtranque narrant in amatoria  
expeti. Thessalicæ mulieres his uti traduntur.

Catanances  
consider.Ruellij-  
ror.

Nomina.

NEUTRVM equidem Catanances genus hæcenus me comperisse fateor, neq; aliquem scio in Italia, qui alter-  
rum saltem legitime nouerit. Sed nihil certe referre arbitror: quippe quod ea rebus ueneris tantum conueniant, & 50  
amatorijs nascentur. Proinde mulieribus Thessalicis reliquenda sunt, quibus olim fuit usus: præsertim cum hæc æ-  
tate homines in uenerem admodum proclines sint, atque etiam multi nimis calleant amatoria. tantum abest, ut etiam  
huiusmodi herbarum, si cognoscerentur, auxilia ijs indicari debuissent. Ceterum existimat Ruellius in hoc sub  
scribens Hermolao, secundi generis Catanancen rectè eam herbam dici posse, quam herbariorum uulgus Bistortam  
appellat. Sed meo quidem iudicio errat Ruellius, quod Bistorta dicta rumicis folia proferat, & radices quandoque  
humani brachij crassitudine, anguium modo contortas, non autem paruas oliuæ magnitudine, uelut altera Catanance.

Nomen eius Græcum κατάνανς, Latinum item Catanance.



## Tripolium.

## Cap. CXXX.

TRIPOLIUM in marinis nascitur locis, quæ allidit unda, recedensque dimittit, neque in mari, neque in sicco: folio glasti crassiore: palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius, ut tradunt, flores colorem ter die mutant, mane candidi, meridie purpurei, sero punicei conspiciuntur. Radice alba, odorata, calidi gustus. Quæ drachmis duabus in uino pota, aquam, urinamque per aluum extrahit. In medicamenta digeritur, quæ uenena arcent.

TRIPOLIUM Serapioni Turbit appellatur. Quapropter credidere nonnulli, Turbit uulgo uocatum Dioscoridis esse Tripolium, præsertim quod ipsum & album, & deiectionis facultatis esse deprehenderent. Veruntamen aliter se habere illud argumento est, quod communis usus Turpetum nullo commendetur odore, nec gustui acridinem relinquat, sed tantum salsedinis, & asperitatis quidpiam. Ex quibus sanè notis asserere licet, Tripolium in Italia non reperiri, neque aliunde aduechi: quemadmodum nec Turbit, de quo differuit Auicenna, quem etiam Dioscoridis Tripolium intellexisse reor. Caterum ab his longè differre uidetur TURBIT, quod à Mesue describitur, nostrati Turpeto omnibus prorsus notis respondens. Ait enim Turbit radicem esse herbæ folia ferulæ minora ferentis, tripliciq; notari differentia, nempe alba, subcinerea, & nigra. Quæ quidem omnia in nostri usus Turpeto diligenter intuentibus facile sese offerunt. Siquidem in Turpeti radicibus, quæ ex orientali plaga ad nos deferuntur, omnes hi reperiuntur colores: non tamen quod putem, eos ita factos esse tantum ex ipsius plantæ natura: sed quod ob uetustatem, & aduentitij aeris humorem radices hæc corrumpantur, & nigrescant, illosq; sibi asciscant colores. Cuius rei in causa etiam esse potest maris, per quod conuehitur, exorta procella, undis triremes superantibus, quibus maris radices facile situm, uel nigredinem contrahunt. Præterea cum asserat Actuarius, nil aliud esse album Turpetum, quàm alypiæ radicem, eorum planè refellitur opinio, qui Mesuem errasse existimant, quod album Turpetum dixerit plantæ radicem esse, quæ folia ferret ferulæ. quandoquidem alypum, siue alypia, ut in sequentibus docebit Dioscorides, folijs tenuibus profilit, quemadmodum & ferula. Ex his igitur, ut arbitror, abunde liquet, Turpetum à Mesui, quàm à Actuario alypiæ esse radicem. Est & aliud Turpetum, quod potius pseudoturpetum dixerim, crassius, & cortice nigrius, quod ex Gargano Apuliæ monte conuehitur duplici genere, quoniam unum è thapsiæ, alterum è pityusæ radicibus concinnant impostores, à quibus hæc omnia didicimus. Non itaq; ab re scripsit Actuarius, nigrum Turpetum radicem esse pityusæ. Verùm hoc (ut mea fert opinio) Mesuis Turpetum haudquaquam fuerit, cum ipsius Turpetum nil aliud esse existimem, ut paulò antè diximus, quàm alypiæ radicem. Quanquam putat Brasauoli nullam tamen, quod equidem sciam, ratione uel auctoritate nixus, apud Mesuem Turpetum omnino tithymali myrsinæ radicem esse. Sed quantum myrti folia à ferulæ folijs differant, qui nesciunt, rei herbariæ peritos consulant. Euchsii porro libro de compositione medicamentorum Turpetum, de quo Mesues egit, è thapsiæ radicibus exemptum existimat. Sed ipsius quoq; sententia mihi planè, ut liberè dicam, reprobanda uidetur: nam è ueteribus nullum Turpetum reperi, qui Thapsiam lacteo succo turgere scribat: cum tamen Mesui Turpetum à planta eximatur, quæ plurimum lacte madet. Præstat in Turpeti genere album ex orientali plaga allatum, resinosum, minime cariosum. Deijcit hoc pituitam, crassos lentosq; humores ad articulorum compagines defluentes, remotioresq; corporis partes. Ventriculorum expurgat, & quæ illi penitus inherant excrementa detergit: item & pectus à pituitæ lentore. Datur magno iuuamento aqua intercutie laborantibus: item elephantiacis, & Gallica lue affectis: quin & ijs, qui morbis ab exustis humoribus prouenientibus sunt obnoxij. Prodest diuturnis febribus, & in uniuersum ubi pituita redundet. Uti qui sumunt cauere debent à piscium esu, & australi flatu. Sed iam ad Tripolium nostra redeat oratio. Reperio hac in historia non parum hallucinatum esse Plinium libro XXI. cap. VII. ubi turpiter Tripolium cum polio herbæ confundit, adeo ut asserere non dubitauerit, polium ter in die foliorum mutare colorem. Id quod de Tripolij floribus tradidere tum Dioscorides, tum antiquorum reliqui. Tripolij quàm breuissimè meminit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, ita scribens. Tripolij radix gustanti acris est, & facultate calida in tertio excessu. Quod Græci τριπόλιον, Latini quoq; Tripolium dicunt: Itali, Tripolio.

Tripolij consideratio.

Turpeti consideratio.

Brasauoli erratum.

Euch. opinio reiecta.

Plinij lapsus.

Tripolij uires ex Gal. Nomina.

## Adiantum.


## Cap. CXXXI.

ADIANTUM, polytrichon, pusilla gerit folia, similia coriandri, in summo incisuris diuisa: cauliculi, quibus exoriuntur, nigro colore nitent, prætenues, palmum alti: radice superuacua: neque caulem, neque fructum, neque florem profert. Decoctum herbæ potum, prodest spirandi difficultati, suppuriosis, lienis, & felle suffusis, & urinæ difficili: calculos frangit, aluum sistit, serpentium moribus auxilio est: contra stomachi fluxiones in uino bibitur: secundas ciet, & menstrua: sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur, alopecias densat, strumas dissecut: furfures, & manantia capitis ulcera ex lixiuio emendat: defluentes capillos continet, cum ladanum, & myrtino, & susino, aut hyssopo, uinoque. Decoctum eius cum lixiuio, & uino infusum, idem præstat. Coturnices, & gallinaceos pugnaciores facit, in cibos eorum additum. Seritur gratia utilitatis pecorum circa ouilia. Umbrosus, & palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus nascitur.



## ADIANTVM.

## TRICHOMANES.



Trichomanes.

Cap. CXXXII.

TRICHOMANES nascitur eisdem in locis, quibus adianton: filici simile, sed exilius: folijs lenticulæ: tenuibus, in ordinem utrinque digestis, aduersis in se, in ramulis tenuibus, acerbis, fusco colore splendentibus. Eadem quæ & adianton præstare posse constat.

Adianti, &  
Trichomanis  
consider.

Plinij lapsus.

ADIANTVM officinæ Capillum Veneris appellant. Duo eius genera Theophrastus assignauit libro VII. cap. XIII. de plantarum historia, ubi ita scriptum reliquit. Adianti folium in aqua nunquam madescit, nec quicquam adhæsisse humoris constat: unde & nomen herba accepit. Genera eius duo, candidum, atque nigrum. Ambo ad deum fluuium capillorum utilia, oleo trita. Nascuntur maxime locis humidis. hæc Theophrastus. Cui subscribit Plinius, licet confusè satis, libro XXII. cap. XXI. dum sic inquit. Aliud Adianto miraculum, æstate uirer, bruma non marcescit, aquas respuit: persusum, mersumue; sicco simile est, tanta dissociatio deprehenditur, unde & nomen à Grecis. Quidam callitrichon uocant, alij polytrichon, utrunque ab effectu. Duo eius genera, candidius, & nigrum, breuiusq;. Id quod maius est Polytrichon, aliud Trichomanes uocant. Vtrique ramuli nigro colore nitent, folijs filicis, ex quibus inferiora aspera, ac fusca sunt: omnia autè contrarijs pediculis densa inter se ex aduerso: radix nulla. Umbrosas petras, parietunq; aspergines, ac fontium maxime specus sequitur, & saxa manantia. quod miremur, cum ad quas non sentiat. ita Plinius. In quibus nimirum uerbis manifestè deprehenditur ipse Plinius, Trichomanes, quod & Filiculam appellamus, in secundi Adianti locum retulisse. quippe qui perperam fortasse acceperit Theophrasti sententiam, à quo illa mutuatus est. Nam Theophrastus ubi de utroq; Adianti genere differuisset, eodem loco citato statim de Trichomane hæc uerba subiunxit. Trichomanes uel ad distillationes urinae uncitur, ut aliqui existimant. Caulè hæc Adianto nigro similem gerit: folia admodum parua, densa, aduersa, inter sese condita: radicem minimam. Loca amat opaca. hæc Theophrastus. Ex quibus liquidò apparet, Theophrasto Trichomanes, quod Fidicula à Theodoro ueritur, nullū Adianti genus esse, sed per se suiq; generis plantā: quod enim Fidiculam dixerit cauliculum ferre nigro Adianto similem, clarissimè ostendit, candidum Adiantū cum Trichomane nullā habere cognationem. Hinc itaq; facile crediderim, Adiantū nigrum, quod caule filiculam referat, nobis legitimum esse, id sanè intelligens, quod Capillū Veneris passim nominant. Candidum uerò eam plantam esse aliquando putauimus, quæ unā cum Trichomane in petris, parietibus, ac fontium asperginibus, specubus, & humentibus locis nascitur: folijs nigricantibus, minutim laciniatis, luteas maculas quā plurimas auersa parte habentibus: caule uiridi, gracili, flexiliq;: quam nonnulli, eò quod folijs rutam amul-



letur, & in muris proueniat, Rutam murariam cognominant, alij Saxifragam dicunt. Sed nunc equidem hanc eandem cum Paronychia Dioscoridis esse opinor, ut etiam superius in sua mentione monuimus. Ceterum Fuchsius medicus clarissimus, hanc herbam pro Saxifraga Dioscoridis depinxit in suis de stirpium historia commentarijs. Verum quod hæc folio constet rutæ, illa uero epithymi, capillorumq; modo tenui, cur planè eius sententiam comprobem, non habeo. Adianti meminit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic de eius uiribus scribens. Adiantum in caliditate quidem, & frigidityte symmetrum est, uerum desiccatur, & extenuatur, & discutitur. Etenim alopecias capillis uestit, & strumas & abscessus digerit, lapidesq; frangit epotum. Viscosorum, crassorumq; e pectore pulmoneq; excreationibus non mediocriter confert, & uentris profluuium sistit: non tamen ullam manifestam caliditatem affert, sicut nec frigiditytatem. Verum posuerit ipsum quispiam secundum hanc oppositionem & temperiem in ordine medio. Trichomanis autem meminit libro VII. eorundem simplicium medicamentorum, ubi subscribens Dioscoridi, hæc tantum retulit. Trichomanes eadem præstat, quæ adiantum. hætenus Galenus. Porro Adiantum, ut Mesues inter sua simplicia refert, aluum subducit, bilem, & pituitam deiecit, crassaq; excrementa, quæ diu interioribus inhæserunt. Pectus, & Pulmonem detergit, sanguinem clarificat, bonum facit habitum, animam dilatat, & iecur & uentriculum purgat, præsertim si obstructione laborent: tametsi ad eorum infarctus potèstius sit eius dilutum ex apij, aut endiuæ aqua paratum, aut ex cicerum migrorum iure, aut caprino sero. Sed si addatur saccharum, lateris inflammationes sanat, & urinam trahit. Eius præterea decoctum frequentius potum calculos frangit, & foeminas à partu purgat. Hos autem effectus præbet calida tantum facultate, quæ illi inest. At adstringente ui, qua etiànum pollet, defluxiones inhibet: fluentem sanguinem sistit, uentriculum roborat, & capillorum defluuium usque adeò emendat, ut non modò eos cohibeat, sed & renasci faciat, præsertim emplastri modo impositum, myrtino oleo, ladano, & austero uino additis. Idem præstat & combusti cinis: quinetiam eius ex uino decoctum. Furfures reiteratis lotionibus depellit. Eius cinis hæc omnia potest, & agilops curat. Ipsius diluti libra epota commodissimè aluus subducitur.

Adianti, & Trichomanis uires ex Galeno.

Adianti uires ex Mesue.

Nomina.

Herba, quæ Græcis ἀδίατρον, Latinis pariter Adiantum nominatur: Arabibus, Berscegnascen, seu Bersausan, & Chulbare albir: Italis & alijs uulgò, Capel uenere: Germanis, Fraunenhär: Hispanis, Culantrillo de pozo: Gallicis, Capil uenere. Quæ uerò τριχομάνης Græcè, Latine Trichomanes, Polytrichum & Callitrichum dicitur: Italicè & officinis Politricho: Germanis, Steinbrech: Hispanis, Politrigo: Gallis, Polytricen.

## Xanthium, siue lappa.

## Cap. CXXXIII.



XANTHIUM nascitur læto, & pingui solo, & lacubus exiccatis, caule cubitali, anguloso, pingui, prodeuntibus ex eo crebris alis: folia atriplicis habet, insecta, nasturtium odore imitantia: fructum grandis oliuæ modo, rotundum, & ut platani pilula, spinosum, qui contactu uestibus adhærescit. Is antè collectus quàm perfectè siccescat, tunditur, & fictili uase reconditur. Flauos autem facit capillos, si acetabuli instar tepida aqua madescat, mox caput, nitro antè perfrictum, illinatur. Alij in uino tundunt, & ita asseruant. Semen aptissimè tumoribus imponitur.

XANTHIUM, quod uulgus Lappam minorem cognominat, omnibus uulgarissimum est: quandoquidem publicis ubiq; seminis, & exiccatis scrobibus, lacubusq; nascatur. Huic, meo quidem iudicio, omnes conueniunt notæ, nulla prorsus reclamante, quæ Xanthio à Dioscoride tribuuntur. nam præterquàm quòd caulem gerit angulosum, ac pinguem, folia, quæ ei subalbida sunt, atriplicis effigiem referunt, per ambitum serrata, nasturtium odore imitantia. Prodeunt etiam e caule ramuli, quibus racematim fructus oliuæ figura dependet, aculeatus ceu platani pilula, qui maturescens, cum tangitur, uestibus pertinaciter adheret. Pauca admodum huius herbe uires descripsit Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum, sic inueniens. Xanthium uocatur etiam phasganium. Fructus discutiendi uim, obtinet. Hæc planta Græcis ξάνθιον appellatur: Latinis quoq; Xanthium: Italis, Lappa minore: Germanis, Bettlersleijß, & Spitzkletten: Hispanis, Lappa menor: Gallis, Gloton, & Grapellas.

Xanthij consideratio.

Xanthij uires ex Galeno.

Nomina.



## Aegilops siue festuca.

## Cap. CXXXIII.

Aegylopis cō  
sideratio.Error quo-  
rundam.Aegylopis  
ex hordeo ge-  
neratio.Aegylopis ui-  
res ex Gal.

Nomina.

**AEGILOPS** herbula folia tritici habens, sed molliora, in summo capite semina bina ternave rubra, quibus aristae quasi capillaceae exeunt. Illita cum farina herba aegilopijs medetur, duritias discentit. Succus farinae admixtus siccatur, & eorundem gratia reponitur.

**NASCITUR** frequens Aegilops inter segetes, sed frequentissima inter hordeum, & zeam, folio tritici, culmo praetenui, in cuius cacumine bina ternave rubra semina dependent, oblonga: e quibus aristae prodeunt longae, capillorum modo tenues. Hanc non modo uidimus in Ananienſi agro, & ubiq; ferè locorū; sed etiam sepiſſimè legimus. Eam rura Ananienſia unguo Squallam appellant. Proinde errant ij, ut equidem arbitror, qui Aegilopem, & auenam idem esse contendunt. quandoquidem est primo statim intuitu Aegilops anenae faciem referre uideatur; diligenter tamen singulas eius uotas expendenti, facile & discernimen, & error deprehenditur. Etenim Avena in stipulae cacuminibus grana profert, longiusculis appensa pediculis, oblongis siliculis contexta, bipedum locustarum effigiem representantibus. At Aegilops tenuissimas fert spicas, tribus, aut quatuor tantum granis contentas, auenae ferè modo dependentibus: e quibus aristae prodeunt capillorum instar tenues, rubentes, & auena longiores. Quod autem ita se res habeat, manifestum praebet indicium ipse Dioscorides: utpote qui de auena libro secundo inter cetera realia abunde scripserit, neq; bis seorsumq; eiusdem plantae historiam tractare soleat: superuacaneum enim fuisset idem repetere, & inordinatum eidem inconsulto addere. Huc accedit, quod si nota, quae utriq; plantae à Dioscoride redduntur, inuicem conferantur, haud dubie alteram ab altera tum facie, tum uiribus, longe differre comperietur. Namq; Dioscorides Auenam, quam Βρώμον, non ἀγίλωπα uocauit, depinxit stipulae geniculis intercepta, dependentibus in cacumine paruulis ueluti locustis bipedibus, in quibus semen concluditur. Aegilopa uero in summo capite semina bina, aut ternae rubra habentem, aristis capillaceis. Porro cum libro secundo de uiribus Auenae differeret, inquit. Huius semen non secus atq; hordeum, utile est ad cataplasmata. Pulvis eius alius sistitur. prodest iussientibus in sorbitione succus. Verum hic de uiribus Aegilopis scribens, herbam eius ad siu uos oculos abſceſſus, quos Graeci aegilopas uocant, & ad duritias discuticudas commendauit: succumq; sariuae admixtum ad idem ualere prodidit. Quae sanè omnia, ui fallor, apertissime demonstrant, Aegilopem auenae quam maxime repugnare. Aegilopem ex hordei uitio fieri, sicut lolium ex tritico nimia uligine, testis est Galenus libro primo, capite ultimo de alimentorum facultatibus, ubi ita scribit. In tritico quidem, frequens lolium sepe inuenitur: in hordeis uero reperitur, sed paucum: quam autem aegilopem appellant, ea in hordeis frequens inuenitur, cum prima generatio, uel incrementum ipsis non rectè successerit. Porro pater meus etate iam declinante, cum agricultura delectaretur, triticum, ac hordeum aliquando seminauit, omnibus diuersi generis seminibus, quae ipsis erant admixta, diligenter selectis, quò certò cognosceret, num ex ipsorum mutatione lolium & aegilops nascerentur, an propriam haec quoq; semina naturam haberent. Cum autem fortè uia cum puris seminibus in tritico quidem frequens lolium, in hordeo autem parum, sed magnam aegilopis uim enatam conspiceret, in alijs quoque seminibus itidem experiri est aggressus. haecenus Galenus. Ceterum ipse quoq; testari possum, me saepenumero in Anania nate le auduisse agricolas conqueri, quòd hordeum degenerasset in Squallam: sic enim ipsi Aegilopem uocant. Aegilopis uires retulit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, his uerbis. Aegilops digerendi uim possidet, id quod ex gustu patet: leuiter enim est acris. Verum & ex eo liquet, quòd pblegmonas induratas, & aegilopas sanat. haec Galenus. Cuius etiam testimonio satis planum fieri potest, Auenam, & Aegilopem inter se disſidere, quòd de ijs seorsum egerit, & singulis diuersas uires reddiderit. Quae Graecè ἀγίλωπα, Latine etiam Aegilops dicitur: Arabice, Dausir, Dalisit, Dosana, Dauser, siue Dusser: Italicè, Egilopa.

## Bromus.

## Cap. CXXXV.

**BROMVS** herba aegilopi similis, exiccatoriam uim habens. Decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, & iuri colato par modus mellis adijcitur: rursus incoquitur, dum liquidi mellis crassitudo fiat. Lintheum eo humore imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam ulcerum efficax est. Aliqui tritam aloen addunt, & eo modo utuntur. Cum siccis rosis cocta in uino, grauem oris halitum emendat.

TAMETI



TAM ET SI non desunt Dioscoridis studiosi, atq; etiam interpretes, qui putant, Bromum huic loco illegiti-  
me accreuisse, quod de ea quoq; libro secundo idem Dioscorides tractauerit, aliudq; non sit Bromos, quam Avena;  
nos tamen longe aliter sentimus. Mea siquidem sententia est, eritq; donec melior ab alijs proferatur, quod Diosco-  
rides, ubi secundo libro Bromum inter segetes, legumina, & alia frugum genera, quæ satione proueniunt, descri-  
psit, de satia Bromo tantum intellexerit: hic uero, ubi de his, quæ sponte nascuntur, differit, nobis syluestrem Bro-  
mum reddat. Hæc uulgaris notitiæ est, domestica auena in omnibus persimilis, granis tamen maioribus, uigriori-  
bus, hirsutioribusq;. Bromi huius mentionem fecisse opinor Plinium libro XXII. cap. XXV. dum sic inquit. Bro-  
mos semen est spicam ferentis herbæ. nascitur inter uitia segetis auenæ Græcæ, genere, & filio, & stipula triticum  
imitatur. In cacuminiibus dependentes paruulas uelut locustas habet. Semen utile ad cataplasmata, atq; hordeum,  
& similia. Βρόμος ita Græcè, ut Latine Bromus & Avena syluestris nominatur: Italicè, Vena saluatica.

Bromi confi-  
deratio.

Nomina.

## Glaux.

## Cap. CXXXVI.

GLAUX cytiso, aut lenticulæ folijs similis, quæ supernè uirent, auersaq; candidiora spectan-  
tur: ramuli à terra exiliunt quini fenive, ténues ab radice, dodrantem alti: flores uiolæ albæ, pur-  
purei exeunt, minores tamen. nascitur iuxta mare. Coquitur cum hordeacea farina, sale, & oleo in  
sorbitione, ad reuocandam extincti lactis ubertatem.

QV AN QV AM scribit Dioscorides iuxta mare uascei Glaucem, eam tamen ipse hæcenus nusquam reperi, ne-  
que ab aliquo compertam aut diui. Nisi Ruellio ad stipulari uelimus, qui eam herbam Glaucem putat esse, quæ fruti-  
cat multis caulibus: folijs oblongis, in ordinem utrinq; digestis, ciceris modo, subter cæsijs, supernè uiridibus: flore  
purpureo, paruo, siliqua terete, non in aduncum ut sceni græci corniculata. Hæc, etsi Ruellio teste nullum apud  
Gallos inuenerit nomen, à quibusdam GALEGA, ab alijs Ruta capraria, in Hetruria uero uulgo appellatur Laua-  
nese, siue ut quidam alij Lauamani, quod prope riuos aquarum  
nascatur, ubi manus lauantes rustici, hac planta saponis uice si-  
bi sordidum lutum absterguunt. Verum cum uideamus huiusce  
plantæ flores, & caules, qui se quandoq; ad bicubitalem altitu-  
diuem attollunt, Glaucis faciem non representare, cogimur di-  
cere Ruellium hac in re hallucinatū deprehendi: præsertim quod  
Glaux & Dioscoride & Plinio auctoribus, inuenitur iuxta mare.  
Galega uero in uliginosis locis, in scrobium aggeribus, in monti-  
bus, & deniq; passim ferè prouenit. Huic plantæ recentiores asi-  
gnant uires non uulgares contra pestilentiam, & uenenosorum  
animalium morsus. in quorum remedium herba per se estur, at-  
que etiam exterius illinitur. Sunt & qui eam morbo comitali la-  
borantibus auxiliari prædicent: in quem usum eius succum exhi-  
bent, drachmarum quatuor pondere. Quod autem hæc extin-  
ctum lac reuocet, ad quod Glaux à Dioscoride commendatur  
non equidem ausim asserere, cum nullum inueniam, qui Galegam  
his uiribus præstare testetur. Glaucis meminit Galeus lib. VI.  
simplicium medicamentorum, de eius uiribus differens in hunc  
modum. Glaux herba, & ipsa lactis generandi uim obtinere ui-  
detur. Quod si ita sit, calida quodammodo, humidq; fuerit tem-  
peramento. Ea æquè Græcis γλαυξ, atq; Latinis Glaux ap-  
pellatur.

Glaucis con-  
sideratio.Ruellij opin-  
explosa.Glaucis uires  
ex Galeno.

Nomina.

## GALEGA.



## Polygala. Cap. CXXXVII.

POLYGALA palmi altitudinem petit, folijs len-  
ticulæ, gustu adstricto. Quæ pota, lactis abundantiam  
facit.


POLYGALA mihi planè incomperta est. neq; id temerè fateri licet, quod tam pauca eius tradantur nota  
tum à Dioscoride, tum etiam à Plinio, ut admodum difficile sit discernere, quæ nobis hodie sese offerat planta, cui  
Polygale nomen rectè competere possit. Hæc Græcè πολύγαλον, Polygalum quoque & Polygala Latine  
dicitur.

Nomina.



## Osyris.

## Cap. CXXXVIII.



Osyridis con-  
sideratio.

Plinij lapsus.

Osyridis uir-  
res ex Gal.

Nomina.

ramulis nigrum initio, dein colore mutato rubescens. hæc Plinius. In quibus, meo iudicio, lapsus deprehenditur ipse Plinius, quod ijs notis depinxit huius plantæ semen, quæ folijs reddidit Dioscorides, à quo tamen Plinius illa mutuatus est. De uiribus Osyridis Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum differuit, ijs uerbis. Osyridi, inquit, herbæ, ex qua *καρφηματα* (siue scopas, siue medicamenta, quæ cutem exterunt, & leuigant, interpreteris) fieri solent, amara inest qualitas, & obstructions expediendi facultas. quare & in iecinore consistentes obstructions adiuuat. Herba hæc *ὀσυρίς* Græcis, Latinis item Osyris dicitur: Germanis, Harn kraut: Italis pariter & Hispanis, Linaria.

OSYRIS frutex est niger, ramulos ferens tenues, lentos, fractuque contumaces: & in his folia quaternaria, quina, senave, ceu lini, nigra in initio, dein colore mutata to rubescencia. Decoctum eius potum, iuuat arquatos.

OSYRIS, quod folijs, & caule lini faciem representet, officinis Linaria appellatur. Huius flores, quos tamē omisit Dioscorides, numerosi à medio usque ad summum uisuntur, syluestris cumini secundi generis modo, uerum in hoc purpurei sunt, in illa sublutei. Suunt tamen qui uelint, Osyrim eam esse plantam, quam uulgò nos appellamus Bel uedere, quod bellè, densissimèq; fruticet, uireatq; per æstatem, non solum in hortis, & uiridarijs sata, sed etiam in fictilibus ornandi fenestras gratia. Qui uerò ita existimant, eo ducuntur argumento, quod hæc non modò crescat folijs lino similibus, sed quod etiam uinc feratur à multis ad scopas ex ea parandas. Quandoquidem id à Galeno dictum uolunt in simplicium censu, ubi uerbum *καρφηματα* (ita enim legendum est, non autem *καρφηματα*, ut male habent codices) non solum medicamenta, quæ faciem uenustant; uerum etiam scopas Græcis significare arbitrantur, quemadmodum & Cornarius in Actio interpretatur. Quorum equidem sententiam non prorsus improbandam censeo, quoniam palam est, hæc plantam folijs lino reserre, & ad scopas conficiendas aptissimam esse. tamen si Dioscoridis placitis ea non admodum adstipuletur, sicuti nec alia uocata Linaria, quod neutrius folia è nigro, quod uiderim, in rubrum mutantur, quodq; harum ramuli longè plura habeant folia, quam quina, uel sena. Osyridis historiam tradidit etiam Plinius lib. XXVII. cap. XII. ubi ita scriptum reliquit. Osyris ramulos fert nigros, tenues, lentos: & in his folia nigra, ceu lini: seminaq; in

## Smilax aspera.

## Cap. CXXXIX.

SMILAX aspera, folia habet periclymeni: sarmenta tenuia, multa, rubi modo, aut paliuri aculeata: arbores scandit, ab imo ad summa perreptans, se conuoluens eis: fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, gustumque leniter mordent. Nascitur in palustribus, & asperis: radice dura, crassaque. Folia, & acini, & antè, & post epoti, uenenosorum antidota sunt. Tradunt, si infantibus nuper in lucem editis, quid ex his tritum propinetur, nulla postmodum uenena nocitura. Inciditur etiam ad alexipharmaca, id est, ad ea medicamenta, quibus uenena arcentur.

## Smilax læuis.

## Cap. CXL.

LAEVIS Smilacis folia hederæ similitudinem habent, molliora, læuiora, tenuiora: huius sarmenta supradictæ similia, nullis horrent spinis: conuoluitur arboribus, ut prior: fructum parit lupini modo nigrum, exiguum: floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Hac smilacæ, quadam topiariorum arte, tentoria contra æstus molestiam faciuntur: folia per autumnum decidunt. Semine cum dorycnio poto, ternis singulorum obolis, uaria & tumultuosa in somnis obuolari traduntur.


Smilacis asperæ historia ex Theophr.

SMILAX aspera Hetruscis Hederæ spinosa, siue Rubus ceruinus nominatur. Hanc diligentissimè persecutus est Theophrastus lib. III. capite ultimo de plantarum historia, ubi ita scriptum reliquit. Smilax, id est, hederæ Ciliæ, amplexicaulis ipsa quoque assurgit, frutex aculeatus, & uelut præhorridus: folium hederæ, paruum, sine angulo,



## SMILAX ASPERA.

## SMILAX LAEVIS.



Palo, iuxta pediculi retinaculum humectum: peculiare, quod medium illum callum, qui instar spinæ animantium se-  
 cat, prætenuem habet, & interualla staminea, non ex eo porrecta, ut cætera, sed circa eum in orbem circumacta,  
 ab annexu pediculi ducit, caulem uero foliorum internodia consummantem: iulus ab eisdem pediculis atque folia,  
 tenuis, seq; conuoluens dependet. Flos candidus, suauiter olens, uerno proueniens tempore: fructus proximus so-  
 lano, atque melothro, & maxime uua labruscæ uocitate. Racemi pensiles ut hederæ sunt, uerum ad labruscam po-  
 tius accedunt: nam de eodem puncto pediculi acinorum exeunt. Colore fructus rutilus est: nucleos in uniuersum qui-  
 dem binos continet, quamquam grandior ternos, & paruulus unum. Nucleus durus admodum est, & colore forin-  
 secus niger. Peculiare racenis, quod per latera caulium sepiunt, postremoq; caulis racemus omnium maximus pro-  
 pendet, sicut in rhamno, & rubo: unde fit, ut extremo si uctifera, & latere large fructifera ista spectetur. Hæc  
 Theophrasti de smilace aspera sententia. Quæ autem Smilax laevis appellatur, ubiq; ferè prouenit, sed præ-  
 fertim in Hetruria, ubi passim frequentissima inuenitur. Incolæ eam uulgò uocant Vilucchio maggiore. Hæc folijs  
 asperam quadantenus imitatur, nec secus ac illa arbores scandit, seq; conuoluit eis, proxima quæq; uiuens: ue-  
 rum sarmentis, siue ramulis constat, non ut altera horridis, aculeatisq; sed læuibus, flexilibus, ac lentis. Flores  
 profer candidos, calathi effigie: e quibus semen prodit atrum, lentibus maior, sed lupinorum figura. Officinæ hanc  
 plantam Volubilem nuncupant. Cuius tamen plura Mauritanis habentur genera, quorum unum illud est, quod Lu-  
 pulum appellant. Huius etsi apud medicos ætatis nostræ frequentissimus usus, addaturq; ab ijs in quàm plurima  
 medicamenta; nihil tamen de eo, quod equidem inuenerim, Galenus, & Dioscorides, aliq; ueteres tam Græci,  
 quàm Latini auctores, posteritatis memoriæ prodiderunt. quanquam non desunt, qui uelint, hunc Plinio esse Lu-  
 pulum salictarium, ab eo hoc tantum nomine demonstratum libro XXI. cap. xv. atq; ibi inter eas herbas communera-  
 tum, quæ sponte nascuntur, quibusq; plerq; gentium utuntur in cibis. Lupuli uocati latius meminit Mesues inter  
 sua deiectionis facultatis medicamenta, ubi hæc ad sensum habet. Est & aliud Volubilis genus, quod LVPVLVS  
 appellatur, folia habens aspera, cucumeris modo: flores exilibus filliculis squamatis compactos, racematimq; de-  
 pendent, colore subcinereo. Hic flauam bilem detrabit, sanguinem ab ea expurgat, & eius inflammationes ex-  
 tinguit. Sero caprino maceratus, ualentior redditur. Succus cum saccharo decoctus syrupi modo, regio morbo la-  
 borantibus medetur. Sed profecto mirum est, quod eo nostræ ætatis medici tam parcè raroq; utantur, cum tamen  
 præstantissimum sit medicamentum. quandoquidem tum herba ipsa per se, tum etiam succus polente admixtus, capi-  
 tis dolorem à caliditate contractum tollit. Iecinoris, & uentriculi astus mitigat. Syrupus ex saccharo, & eius suc-  
 co paratus, utilissimè exhibetur in febribus à bile, & sanguine excitatis. hæc Mesues de Lupulo. Cæterum ad insti-  
 tutum

Smilacis læ-  
uis historia.


Lupuli histo-  
ria, et uires ex  
Mesue.



Smilacis utri  
usq; uires ex  
Galeno.


Nomina.

LVPVLVS.



Rusci confi-  
deratio.

RVSCVS.



Nomina.

Lauri Alexan-  
drinae cōfide-  
ratio.

tutum nostrum reuertatur. Smilacis utriusque uires tradidit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Milax (sic enim Smilacem uocat Galenus) aspera clauiculus ple-  
na est, ita ut uariè sursum deorsumq; arboribus circumuoluatur. Folia gustata aliquid habent acrimoniae, & alioqui si illis utaris, calefaciunt. Milax leuis facultate quodammodo prædicta similis est. Planta, quæ Græcis *σμίλαξ τραχὴ*, Latinis Smilax aspera, & Hedera Cilissa uocatur: Italis, Hedera spinosa, & Rouo ceruino: Germanis, Scharpfe uinden. Quæ uero *σμίλαξ λεία* Græcè, Smilax leuis siue lenis Latine dicitur: Italicè, Vilucchio maggiore: Hispanicè, Correguela mayor: Gallicè, Liset maior.

Ruscus.

Cap. CXLI.

SYLVESTRIS myrtus, aliquibus oxymyr sine, aut myrtacantha, Latinis ruscum appellatur. folium fert myrti, latius, in formam lanceæ mucronatum. baccæ per maturitatem rubescunt, rotundæ. à medio folio dependentes. osseo intus nucleo: cubitales ramuli ab radice exeunt. uitilium modo lenti, fractu contumaces, foliosi: radice graminis simili, acerba, & subamara. Folia, & baccæ in uino potæ, urinam cient: menses pellunt, uesciæ calculos frangunt, stillicidio urinae medentur, dolores capitis sanant, & regium morbum. In asperis, & præcipitibus locis enascitur. Decoctum radices in uino potum, eisdem præbet effectus. Cauliculi recentes, asparagorum uice in cibo sumuntur: amari autem sunt, sed urinam mouent.

RUSCUM officina corrupto nomine ex literæ additione Bruscum appellant. Nos uero, quod arcendis muribus is apertissimus sit, si salitis appensis carnis funiculo circumligetur, Pungitopi Hetrusca lingua dicimus. Germinat hic uere asparagi modo, turionibus tamen breuioribus, crassioribus, hirsutisq;: qui cauli manduntur ex oleo, sale & aceto. Ceterum, quod non obsecrè amarorem gustui relinquunt in medicamentis potius, quam in cibis expetuntur: sunt enim ciendæ urinae, aperiendisq; obstru-  
ctionibus perquam idonei. Græcis, quod folijs sit acutis, & myrtum æmuletur, oxymyr sine, hoc est, acuta myrtus appellatur. Ea Græcis *μύρτιν ἀγρία* & *ὄξυμύρτιν* uocatur: Latinis, Ruscus, & myrtus sylvestris: Arabibus, qui Cubeas cum rusco confundunt, Cubebe: Italis, Rusco et Pongi topi: Germanis, Brusch: Hispanis, Ius barba, & Gil barbera: Gallis, Brusco.

Laurus Alexandrina. Cap. CXLII.

LAVRVS Alexandrina folio est rusci maiore, molliore, & candidiore: semine inter folia rubro, ciceris magnitudine: ramos spargit in terra dodrantes, interdum longiores: radice sylvestri myrto simili, maiore, molliore, odorata. inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pondere in uino dulci, & stillicidio urinae auxiliatur, sed sanguinem extrahit.

SI LAVRUM Alexandrinam, & Hippoglossum unam & eandem plantam esse sensisset Dioscorides, ut quidam existimant, nulli quidem dubium est, quin superuacuum erat, de iisdem seorsum, diuersis atq; etiam proximis capitibus Dioscoridem differere. uel nulla in earum notis, & uiribus reperiretur differentia. Sed quoniam eas seorsum tanquam diuersas retulit, diuersasq; notisq; notas assignauit; idcirco has plantas inter se differre dicatur.



LAURVS ALEXANDRINA.

LAURVS ALEX. ALTERA.



catur, necesse est. Nam etsi utriq; folia rusci reddiderit Dioscorides; tamen Hippoglossum statuit aculeatam gerere comam; & in summo ceu linguis e folijs exeuntes, commendauitq; comam ad dolorem capitis coronæ modo impossibilis; & radicem, succumq; malignatis admisceri scripsit. Verum hic in Lauro Alexandrina nec linguarum meminit, nec aculeorum e folijs prodeuntium: tradidit quidem hanc folia habere rusco similia, sed maiora, molliora, & candidiora: ramos dodrantales, in terram sparsos: radicem rusco similem, maiorem tamen, molliorem, & odoratam. Cui uires tribuit ad difficiles partus, ad urinæ stillicidium, & ad sanguinem extrahendum. His accedit, quod (ut Dioscorides testari uidetur) Laurus Alexandrina fructum fert rubrum, ciceris magnitudine, inter folia, non autem in medijs folijs, ut hippoglossum, & ruscus. Ex his itaq; tum notis, tum uiribus, quæ in hisce duabus plantis maxime pugnare deprehenduntur, omnibus abunde constare arbitror, hallucinari eos, qui putant Laurum hanc, & hippoglossum unam & eandem esse plantam. Nos equidem hanc, cuius hic figuram damus, ueram ac legitimam Laurum Alexandrinam esse censemus, quæ (ut pictura pulchre demonstrat) non parum ab hippoglossa differt. Huic alteram adiecinus, quæ & ipsa haud dubie, ni fallor, fuerit Laurus Alexandrina, si huic fructum in medijs folijs nasci concedamus. Lauri Alexandrinæ uires memorie prodidit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, sic iniquiens. Lauri herba, quam & Laurum Alexandrinam appellant, temperatura euidenter est calida, & gustu acris simul et subamara est: potaq; tum urinam, tum menses prolicit. Planta Græcis δάφνη ἀλεξάνδρεια. Latine Laurus Alexandrina dicitur: Arabibus, Gar Alexandrie: Italis, Lauro Alessandrino.

Lauri Alexandrinæ vires ex Galeno.

Nomina.

### Daphnoides.

### Cap. CXLIII.

DAPHNOIDES cubiti altitudine fruticat: ramis flexilibus, obsequiosisque, multis, à medio sursum uersus foliosis: cortex supra modum uiscosus ramos vestit: folia lauri, graciliora, & molliora, fractu contumacia, quorum gustatu os & fauces incenduntur: flores candidi: bacca, cum ematuruerit, nigra: radix inutilis. nascitur in montosis. Pituitam extrahit folium recens, uel aridum in potu: menses ciet, & vomitum: caput inanit commanducatum: sternutamenta mouet. Bacca quindecim pota aluum resoluunt.

### Chamædaphne.

### Cap. CXLIIII.


CHAMAEDAPHNE virgas emittit cubitales, singulari ramulo constantes, rectas, tennes, laues: folia lauri similitudine, lauiora multo, ac uiridiora: semen rotundum, rubens, annexum folijs



folijs. Illinuntur capitis doloribus trita folia, & stomachi ardores mulcent: ad sedanda tormina cum vino bibuntur. Potus cum uino succus menses, & vrinam ciet: idem facit pefso appositus.

## DAPHNOIDES.

## CHAMÆDAPHNE.



Daphnoidis,  
& Chamæda  
phnes confi-  
deratio.

DAPHNOIDES, quam officinæ, & herbariorum vulgus Laureolam uocant, frutex est uulgaris notitiæ. Prouenit hæc frequens in uallis Ananie montibus Tridentino agro, nullis prorsus reclamantibus notis. Cubitalibus enim assurgit uirgis, flexilibus, obsequiosisq;: folijs numerosis, sursum spectantibus, lauro similibus, gracilioribus tamen, ac mollioribus, acerrimo gustu: quin & ramorum cortex admodum tenax est. Hinc itaq; fit, ut eos errare toto celo deprehendantur, qui putât Mezereum Mauritanis uocatum esse Daphnoidem. quandoquidem Mezereum Chamælea est, de qua suo loco differemus. Porro Chamædaphne, quam Laureolam inarem pleriq; cognominant, folijs ac fructu à Daphnoide non longè differt: uerum hæc tantum intercedit differentia, quòd Chamædaphne singulâ rectoq; caule constat, cui folia circumquaq; promineunt, adeò ut in cacumine in orbem umbellæ instar diuersentur: semine inde prodeunte Daphnoidis modo. Ceterum, quod uocauerit Plinius Chamædaphnen eam clematidem, quam aliqui Vincam peruincam appellant, credidere quidam hanc Dioscoridi esse Chamædaphnen. Sed proscelto ij falluntur: errorq; omnibus euidentior fiet, quàm ut pluribus explodi postulet, si modò contemplantur, & conferantur notæ, quibus Vincam peruincam descripsit Plinius libro XXI. cap. XI. & quibus representauit Chamædaphnen lib. XXI. cap. XV. Verum Plinio, quòd clematidi folia sint lauri, uideaturq; humilis laurus, ideo non temerè eam Chamædaphnen dici placuit. Sunt, qui Laureolæ fructum Piper montanum uocent, quanuis rusticis Ananieusibus nil aliud sit piper montanum, quam Dioscoridis granum Gnidium, ut infra suo loco dicemus. Daphnoidis, & Chamædaphnes uno tantum capite meniuit Galenus libro VI. simplic. medicamentorum, sic inquit. Chamædaphnes germina tenera edi quoq; assolent. Est autem persimilis uiribus lauro Alexandrinæ: sicut sanè & quod Daphnoides nuncupant. Planta, quæ Græcis δαφνοειδής, Latinis item Daphnoides, & Laureola nominatur: Arabibus, Daphnides: Italis, Laureola. Quæ uerò χαμαὶ δάφνη Græcè, Chamædaphne pariter Latine dicitur: Arabicè, Chamædaphnes: Italicè, Chamædaphne.

Daphnoidis,  
& Chamæda  
phnes vires.

Nomina.

## Veratrum album.

## Cap. CXLV.

ELLEBORVM album, Latini veratrum album uocant, fert folia plantaginis, aut betæ syluestris similia, sed breuiora, & nigriora, rubescencia: caulem cauum, quadrantalem, tunicis conuolutum, quas abdicat, cum arescere incipit, radicibus nititur multis, tenuibus, ab oblongo, & exiguo capite ceparum modo exeuntibus. nascitur in montibus, & asperis. Radices menses colligenda. Optimum



num habetur candidum, friabile, carnosum, modicè extentum, nec tamen iunci modo mucronatum, quod frangendo puluerem emittit, & tenuem habet medullam, gustu non admodum feruens, neque saluam subinde ciens. huiusmodi autem strangulat. Primatum Cyrenaicum tenet. Galaticum autem, & Cappadocicum candidiora, & puluere quodam obsita, celerius strangulatus mouent. Vomitione autem uarios extrahit humores. Collyrijs admiscetur, quæ caliginem oculorum discutiunt. partus impositum necat, menses pellit, sternutamenta excitat: mures interficit, cum melle, & polenta subactum: absomit carnes, si coquatur unâ. Datur per se ieiunis, & cum sesama, aut ptisanæ succo, aut halicæ, aut lentis cremore, cum aqua mulsa, aut pulte, aut quauis alia sorbitione. Cogitur cum pane, & ita inassatur. Præparatio corporum, ac uictus ratio diligenter tradita est, cum ab his qui de medica eius potione scriptitarunt, tum maximè à Philonide Siculo Ennensi, cui nunc assentimur: quippe longum nimis esset in hac præsertim editione de materia simul medicam curandirationem exponere. Dant nonnulli in pultis sorbitione, aut copioso halicæ cremore, aut paucum antea cibum dari præcipientes, statim ueratrum offerunt, ijs præsertim, quibus strangulationis suspicio imminet, aut si ualetudo corpus iuifirmat: hoc enim modo deiectio nihil periculi minatur, quod cibo munitis non intempestiuè medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones concitant subditæ ex eo balani cum aceto.

VERATRVM ALBVM.

VERATRVM NIGRVM.



Veratrum nigrum.



Cap. CXLVI.

ELLEBORVM nigrum appellatur melampodion, quoniam caprarum pastor nomine Melampus furens in se Prætidas primus purgasse, & sanasse fertur. Folia ei uiridia, platani similia, minorâ, folijs sphondylii proxima, subaspera, nigriora, pluribus diuisuris incisa: caulis asper: flores in purpura albicantes, racematim cohærentes: semen cnici, quod in Anticyra sesamoides uocant: quod deiectiones molliuntur. Radicibus cohæret nigris, tenuibus, à capitulo cepæ simili confibratis, quarum est usus. In collibus, asperis, & sitientibus locis enascitur. Optimum est, quod ex huiusmodi petitur terris, ut ex Anticyra. Nigrum inibi probatissimum gignitur. Eligi debet corpulentum, & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, feruensque: cuiusmodi est in Helicone, Parnaso, & Aetolia natum: attamen Heliconium præcellit. Veratrum nigrum purgat uentrem, detrahit bilem pituitasque, datum per se, aut cum scammonia, & tribus obolis siue drachma falis. decoquitur uel cum lente, & iusculis, quæ purgationis causa sumptantur. Prodest morbis comitialibus, melan-



cholicis, infanientibus, articularijs doloribus, & resolutis. Menfes inditum trahit, partus necat: purgat fistulas impositum, & tertio die detractum. Item contra grauitatem auditus in aurem demittitur, ibique in alterum, aut tertium diem esse finitur. Scabiem sanat illitum cum thure, aut cera, & pice, & cedrino oleo: vitiliginibus, lepris impetiginibus ex aceto medetur: dentium dolorem collutione mitigat. Erodentibus medicamentis commiscetur: hydropicorum uentri utilissimè imponitur factum ex eo, farina hordeacea, & uino, cataplasma. Confitum proximè radices uitium, uinum purgandi facultate donat. Huius resparfu domos expurgari arbitrantur: quare inter fodiendum stantes Apollinem, Aesculapiumque precantur, ac uitant aquilæ uolatus: aduolare enim non sine periculo tradunt. nanque si auis effossionem ellebori conspexerit, moriturum qui succidit, augurium est. Celeriter effodiatu oportet, quoniam halitu caput aggrauat: quapropter ad id arcendum, fossuri allium presumere, & uinum bibere consueuerunt: nulli ita noxæ opportuni redduntur. Veratri albi modo emedullatur.

Ellebori utriusque consideratio.

**ELLEBORVM**, quod & Veratrum Latinis dicitur, tam album, quam nigrum omnibus, ni fallor, notum est in Italia. Et quanuis inibi unum tantum Ellebori albi genus inueniatur; nigri tamè tria nobis comperta sunt genera, flore duntaxat inter se distincta. Vnum quidem flores profert purpureos, quales suo reddidit Dioscorides: alterum uerò candidos: tertium deniq; herbaceos. Hæc ut flore distinguuntur; ita etiam uiribus inuicem differunt. quandoquidem alterum, & tertium genus adeò uiribus imbecillia sunt, ut ferè nihil ad aluum deiciendam præstent. Id quod factò periculo didici, cum primum ellebori genus flores ferens purpureos nobis non esset ad manus. Huius radicem diluto ex more nostro parato, hyeme etiam media, & magis urgente frigore (etsi id improbet medici) præparata prius diutius materia decoctis, ac syrupis ad id facientibus, plures quartana febre laborantes sanauimus. Nunquam enim, quod memincrim, hoc ellebori dilutum dedimus quartanarijs nostris, quin ex unica assumptione, uel saltem altera, Deo iuuante, fuerint ad sanitatem restituti. Cæterum albi quoq; ellebori dilutum exhibimus quibusdam melancholicis, magno sanè successu: nullo tamen ægotantium incommodo, nullaq; noxa. Quod non alia ex causa euenisse putauerim, quam quòd in Tridentino agro, alijsq; circum finitimis locis, ea fortasse sit illius cœli temperies, ut non adeò perniciosi facultatibus scateat utrunq; elleborum, quemadmodum illud, quod in calidioribus prænit regionibus: tamen si non dubitauerim etiam utriusq; acerrimam uim reprimi, ac corrigi proprijs quibusdam ad ista medicamentis. Visuntur nigri uniuersa genera Martio, & Aprili mensibus uno & eodem loco florere in amplissima Sylua, per quam transeunt, qui Goritia Labacum Carniolæ urbem proficiscuntur, ubi & nos præstantissimum seminum subalbidæ spectentur: omnibus tamen in uniuersum eadem est foliorum facies. Herophilus antiquissimus medicus elleborum fortissimo duci æquabat: concitatis enim intus omnibus, ipsum in primis exire dicebat. Ideo errauisse antiquos parcius id præbendo, cum celerius erumperet, quod daretur largius. Sed hæc Herophili sententia non placet nostræ ætatis medicis, neq; etiam nobis, ut quæ pluribus daminari, & explodi possit. Elleborus niger bores, & quos, & sues necat: proinde id in pascuis cauent, quanuis album innoxie depascantur. Nigri radices demorsæ, quod ita pente quadrupedibus mirifice medentur, si recentes in uulneris osculum, sublata à carne cute, immittantur, quod ita eiaculatum reuocent uenenum: quin & illud idem prodest, si gregi pestilentia ingruerit, in auribus traiecta uel per fori infixæ radice. Quæ ratione ducti credere nonnulli, id etiam in hominibus fieri posse, quòd si in perforatam calcanei cutem nigrum elleborum inferatur, eos omniuo à pestilentia tutos reddat, qui gestauerint. Ellebori semen, Aristotele auctore, coturnicibus gratissimum est: quam ob causam antiqui eas abdicarunt mensis. quæ tamen hodie magnopere expetuntur. Porro non desunt & recentioribus, qui putent nigrum communis usus Elleborum, cui flores herbacei insunt, non elleborum, nec eius speciem esse, sed eam sanè plantam, quam Colnmiella, & Plinius Consiliginem uocant, quamq; ad pecorum puluouariam curandam, pestilentiamq; arcendam summis laudibus efferunt, hoc tantum puto argumento fracti, quòd scripserint ij, si in morbo quadrupedis auricula consiliginis radix inferatur, perforata ferro prius aure, omnem morbi uim eò confluere, & per illud foramen pestilens uirus elici. Siquidem cum præ flores huius ætatis obseruauerint, id totum (ut uos quoq; paulò antè diximus) præstari tantum illius ellebori radicibus, existimauerunt hoc ueratri nigri genus, quod flores rubentes uon proferat, uel (ut Dioscorides inquit) in pura albicantes, sed herbaceos, consiliginem esse. Sed ij, mea quidem sententia, falluntur: quippe Abhyrtus, & Hierocles idem præstare nigrum ueratrum affirmant. Quibus etiam subscribit Plinius lib. xxv. cap. v. his uerbis. Nigrum elleborum pecorum, & iumentorum pituitas sanat, surculo per aurem traiecto, & postera die eadem hora exierit: hæc Plinius. Ex quibus utiq; perspicuum fit, non modò consiliginis, sed etiam nigri ueratri radicem hæc omnia efficere posse. Vanum profectò esset dicere, exempli gratia, sabinam esse calamintham, uel contrà, quòd utræq; remoratos menses eliciant. quasi natura adeò fuerit auara, ut unicuiq; morborum generi unum tantum genuerit medicamentum, cum tamen nullus sit morbus, cui innumeras non creauerit medicinas, uno & eodem ordine adhibendas. Adde etiam, quòd cum nullus extet auctor, quod ego inuenerim, qui Consiliginis historiam describat, neq; una quidè nota eius faciem repræsentet, non uideo, quomodo rectè ij asserere possint, ueratrum nostri usus esse consiliginem. Sciant itaq; uelim, qui nigrum herbacei floris Elleborum ideo Consiliginem esse contendunt, quòd pestilentibus pecorum morbis præsens remedium sit, si eius radix auriculis, & alijs corporis partibus inferatur, id successu longè meliori effici, si rubentis floris elleboro idem fiat, citiusq; expurgari uirus illud pestilens, quòd huic uires insunt ualentiores. Horum quidem opinionem ut plane sequitur Fuchsius uir doctissimus in libro de compositione medicamentorum, quem postremo auctum edidit; ita etiam idem, meo iudicio, in manifesto illorum errore uersatur. Cæterum hic notum est

Herophili sententia damnata.


Opinio quorundam reprobata.



Vgonis Sole-  
rij opinio ex  
plosa.

est silentio dissimulanda inepta satis, et uana, meo quidem iudicio, de nigro ueratro opinio Vgonis Solerij, uiri alio-  
qui doctissimi, ut eius testantur scholia, quæ nuper in priores Aetij libros edidit. Is enim in prædictis scholijs censet,  
Elleborum nostri usus tam illud, quod flores fert rosarum modo purpureos, quam quod albos, esse lycostoni, uel cyno-  
toni aconiti species: quod uero herbidos habet flores, Plinij et Columellæ Consiliginem, aliorum iudicium secutus.  
Quod quibus rationibus comprobet, ex eius uerbis, quæ modo referam, cognosci poterit. Si quis, inquit, commemo-  
ratarum iam plantarum radices diligenter expendat, nihil illas cum nigri ueratri radicibus (quæ, teste Dioscoride,  
cepe modo bulbosæ sunt, erumpentibus ab imo earum bulbo multis radicibus) commune habere multò euidentius com-  
periet, quam ut pluribus demonstrari nunc debeat. Taceo nullum ex his plantis dum uelluntur, capitis dolorem ob  
uaporum halitum concitari, ut ipse milles sum expertus, id quod in nigri ueratri emulsione testatur Dioscorides. Ex  
his igitur constat, nullam harum trium plantarum ad uigrum ueratrum satis aptè posse reduci, quin duas priores aco-  
niti lycostoni postremas species esse, postreman herbam sui generis. hæc Solerius. Quibus uerbis cum in me egisse,  
licet non apertè, meamq; oppugnasse sententiam ex hoc planè conicio, quod nullus, quod sciam, ante nos scripserit,  
tria in Italia, ac priuatim in Carniola reperiri nigri ueratri genera, florum tantum colore distantia. Neque id certè  
egregio, quod libenter audiam, indies nouas in re herbaria proferri sententias. Velim tamen id liberius, apertius,  
et firmiter rationibus, tum auctoritatibus fieri. Redeo ad Solerium, cuius sanè hac in re argumenta me faci-  
lè diluere posse spero, utpote quæ (pace eius dixerim) leuia satis sunt, et prorsus à ueritate desciscant. Nam falsum  
esse, ac nimis fortasse temerè dictum arbitror, quod Ellebori genera illa, quorum superius meminimus, non mittant ra-  
dices (ut Solerius asserit) tenues, nigras, à tepacæ quodam capitulo pendentes, ac confibratas: cum omnibus non  
modo rei herbariæ peritis; sed etiam pharmacopolis, ne dicam lippis, et tonsoribus, manifestum sit, nigri ueratri com-  
munis usus radices non aliunde, quam à bulbaceo quodam tuberculo omni ex parte pendere nigras, ac graciles: non  
autem cepe modo bulbosas esse, et ab imo bulbo multas erumpere, ut ille pronunciauit. Vnde facile adducor, ut crea-  
dam, si licet ingenuè dicere quod sentimus, Solerium aut Dioscoridis lectionem luxasse, aut eam minus rectè perce-  
pisse, aut parum adhuc rei herbariæ gnarum esse, ut qui fortè in ea re non multum laboris insumpserit. Quod autem (ut  
idem ait) ex hoc nostro elleboro, dum effoditur, nullus ob uaporum halitum capitis dolor concitetur, et ob hoc illud le-  
gitimum esse non possit, nulla hæc est ratio apud me. Neq; enim mirum alicui esse debet, cur id non faciat: quoniam  
Dioscorides non dicit, quod Elleborum nigrum effoditibus capitis dolorem inferat, sed quod halitu caput aggrauat.  
Quam nimirum grauitatem id, cui flos purpurascit, tanquam cæteris acius, apud nos sæpius excitat, præsertim si li-  
gone uulnerentur radices, et uentus aduersa parte spiret. Id quod fortasse in Anticyra, Helicone, Parnaso, et Ae-  
tolia ualentius præstat. quandoquidem, Dioscoridis testimonio, his in locis acre gustu, feruensq; et omnium proba-  
tissimum gignitur climatis illius ratione. quod in Gallia fortasse, et in Germania coeli inclementia non euenit. Cæ-  
terum quod priora nigri Ellebori genera, quæ flore tum purpu-  
reo, tum albo constant, aconiti cynostoni, uel lycostoni sint spe-  
cies (ut Solerius sibi perperam, meâ quidem sententia, persuasit)  
mihi planè absurdius uidetur, quam ut ab aliquo approbari possit,  
et debeat. Eas quidem aconitorum genera iam omnibus clarif-  
simè innotuerunt, suntq; caule filicis simili, cubito longiore, et  
radicibus adeo tenuibus, ut squillarum marinarum cirris eas com-  
parauerit Dioscorides. Quæ sanè omnia in nigro ueratro commu-  
nis usus nunquâ quis inueniat. Huc præterea illud accedit, quod  
nobis iam milles experimento compertum est, uigrum communis  
usus ueratrum, quod proprio fungatur munere, atrabiliarios o-  
mnes sanare morbos: fistulas callo induratas tribus diebus imposi-  
tum emollire, et purgare: in aurem demissum auditus grauitatè  
auferre: scabiem, uiriliginem, lepras, et impetigines illitum em-  
dare: et carnem in ulceribus excrecentem absumere. Quibus  
tamen uiribus non Aconitum cynostonon, sed Elleborum prædi-  
tum esse, in confesso est. Ex his itaq; omnibus abunde perspicuum  
fieri puto, in hoc Solerij opinionem prorsus explodendam esse: et si  
idem in alijs quoq; non paucis, meo iudicio, falli deprehendatur.

## CONSILIGO.



Sed iam nos quoque de CONSILIGINE nostram profera-  
mus sententiam. Ea quidem nobis hætenus incomperta fuit, quod  
ueminem ex scriptoribus tam ueteribus, quam recentioribus inue-  
nerim (ut supra dixi) qui eius notas memoriæ prodiderit. Atq;  
adeo hinc fit, ut nō ausim ego asserere plantam illam, quam hîc de-  
pingi curauimus, esse ueram ac legitimam Consiliginem. neque  
enim est, cuius auctoritate fretus possum eam radicibus, folijs, cau-  
libus, floribus aut seminibus comprobare. Verum quoniâ huiusce  
plantæ radices per auriculam perforatam insertæ, pecorum pul-  
monariam atque etiam alios morbos curant, ellebori nigri modo,  
facile adducor, ut ferme suspicer eam esse ueram Columellæ et  
Plinij Consiliginem. Hanc uero plantam Hieronymus Tragus,  
cuius

Consiliginis  
consideratio.



cuius sæpe testimonium adfert & probat Gesnerus, putat esse legitimum Veratrum nigrum. Sed is ut in hac euiden-  
tius errat, quàm ut mediocriter etiam in re herbaria uersatis ostendi debeat; ita in multis alijs plantis, quorum nume-  
rum referre longum esset, à peritis herbarum faciliè cognoscitur uanum atq; leue iudicium habuisse. Plantam, cuius  
hic imaginem exhibuimus, coniectura quadam ducti eam Consiliginem esse, describamus. Hæc ad duum palmorum lon-  
gitudinem assurgit. cauliculos emittit tenues ac molles. folia habet longiuscula, tenuia, quadantenus abrotoni. flo-  
res profert buphtalmi, paulò maiores: ex quibus prodeunt capitula oblonga, ruborum moris similia. radicibus ni-  
tatur nigris, nigrum ueratrum emulantibus, tenuioribus tamen, & aliquantò nigrioribus. Plurima nascitur in Bohe-  
mia præsertim in agro Pragensi. Ea utuntur omnes illius regni tum medici, tum pharmacopœi pro Elleboro nigro:  
priuatim magno successu ad pecorum morbos. Reliquum autem est, ut de utriusq; Ellebori uiribus iam aliquid di-  
camus. Album, ut Mesues in suo de medicamentis deiectionis censu prodidit, mortiferum est, quod faciliè homines sus-  
ficare possit: idcirco omnino reiiciendum esse præcipit. Nigri tamen usum probat, sed in ualidissimis tantum corpo-  
ribus. Quod sanè decretum nonnullos adeò perterritum, ut non modò suis medicamentis Elleborum admiscere non au-  
deant; sed & nomen abhorreant. Verùm iij ridendo potius timore quodam ducuntur, quàm quod iure usque adeò El-  
leboro refragari debeant. Siquidem ego testari possum, me sexcentis ferme hominibus nigri ellebori dilutū exhibuisse  
nullò prorsus incommodo: atq; etiam eiusdem diluti faciendi rationem quàm plurimos docuisse medicos, qui, factò  
subinde periculo, effectum consecuti sunt, unde ingentes mihi gratias retulerunt, quæ meritò debètur elleboro. Præ-  
stat quod, euulsis statim radicibus, interna repurgatur matrice, siccaturq; in umbra. Harum puluis diluto longè for-  
tior est; ob id enim non datur nisi robustis, & ubi obcalluerit morbus. Proinde de eo ita scriptum reliquit Actuarius  
in libro de compositione medicamentorum. Veratrum nigrum, atram bilem flauamq; è toto trahens corpore deora-  
sum, nec tamen citra ullam difficultatem pellit. Ideo febribus circuitu repetentibus, & diuturnis obijcimus. Datur  
quoq; insanientibus: altera caluariæ parte, & subter caput diutine cruciatis commodissimum: præsertim in scieribus,  
utero, & uesticæ deiectionum medicamen postulantis. Maxima autem eius uis est peculiariter educere, quicquid  
sanguini commistum, eum corrumpit. Ideo ueterascentibus arquatis morbis utile: & quibus in superficie sionmæ  
asperitudines emerferunt, uelut lepris, impetiginibus, & horum similibus: elephantia quoq; laborantibus accommo-  
datum est. Datur scrupulorum teruium pondere, aut paulò plus minùsue. Fit è siccis radicum fibris, aqua paulum ma-  
ceratis: postea cortice detractò, & in umbra siccato, proiectaq; tenui, quæ in ipsa subest, medulla. Exhibetur alui  
ex passo, & aceto nullo: uerùm suauitatis gratia, quedam ex odoratis seminibus inferenda. Si uerò efficaciorè alui  
deiectionem moliri sit in animo, scammonij paucillum adijcito. hætenus Actuarius. Ellebori utriusq; uires postea  
ritatis memoria tradidit Galenus lib. vi. simpl. medic. sic inquit. Elleborus uterq; tum albus, tum niger extergè  
tis simul & excalfacientis est facultatis. Quamobrè ad alphas impetigines, scabies leprasq; accommodi sunt. Quin-  
etiam niger, si in fistulam callo induratum demissus fuerit, duobus tribusue diebus callū detrahit. Dentibus prodest cū  
aceto colluentibus. Sunt autem in tertio ordine excalfacientium, & desiccantium. Porro niger gustu calidior est, cādidi subama-  
rus. Hætenus de utroq; Elleboro Galenus. Ceterum quæ dā plū-  
ta reperitur à recentioribus OPHRIS appellata, quæ folijs ma-  
ximè album ueratrum representat. Duo tantum hæc folijs pro-  
fert: inter quæ caulis erumpit, capitulis quibusdam oblongis in-  
uniuersum refertus: è quibus flores exeunt cādidi, exiguis linguis  
similes. Radice nititur gracili, non sine multis appendicibus, odo-  
re præstanti. Præfertur uniuersa planta ad denigrandos capillos,  
fracturas sanandas, et uulnera glutinanda. Illa plantæ quæ Gre-  
cis ἐλλέβορος λευκός, Latinis Elleborus albus, et Veratrum albu-  
appellatur: Arabibus, Cherbachem, seu Charbech abaid: Italis,  
Elleboro biāco: Germanis, Vucis niesz uurtz: Hispanis, Verde ga-  
bre blanco, et yerua de ballesse: Gallis, Viraire, Verarum, Ver-  
tre, & Ellebore blanc. Illa uerò, quæ ἐλλέβορος μέλας Græcè  
Elleborus niger, & Veratrum nigrum Latine dicitur: Arabi-  
cè, Cherbachem, seu Charbech asued: Italicè, Elleboro nero:  
Germanicè, Christ uurtz: Hispanicè, Verde gambre negro, &  
Elleboro: Gallicè, Viraire, & Ellebore noir.

## OPHRIS.



Ophris de-  
scriptio & vi-  
res.

Nomina.

## Sesamoides magnum. Cap. CXLVII.

SESAMOIDES magnum in Anticyra elleborum  
uocant, quoniam albo ueratro in purgationibus miscea-  
tur. Simile est senecioni, aut rutæ: longo folio: flore cā-  
dido: radice gracili, ignaua: semen gustu amaro, cætera  
sesamæ simile. Ventrem detrahit. datur tritum ad bi-  
lis, pituitæq; deiectionem, quantum tribus digitis capi-  
tur, addito ueratri albi sesquiobolo, ex aqua mulla.

Sesamoides



## Sesamoides paruum.

## Cap. CXLVIII.

SESAMOIDI paruo cauliculi sunt dodrantes: folia coronopi, minora, hirsutiora: & in cauliculorum cacumine capitula florum penè purpureorum, medio eorum albo: semen sesamæ, fuluum, amarum: radix tenuis. Detrahit bilem, pituitasque semen ex aqua mulla potum dimidio acetabulo: illitum ex aqua tumores, ac tubercula discutit. Nascitur in asperis.

NON est, quod in rebus incomptis longiorem moram nos ducere oporteat. quandoquidem hactenus non solum ipse non reperi in Italia maius, aut minus Sesamoidis genus, etsi in eorum inquisitione multum laboris ac studij impenderim; sed neque etiam ullum inuenire contigit, qui unum, uel alterum legitime ostenderet. Quare has plantas deinceps perquirendi curam ijs relinquemus, qui nauigationibus Anticyram petunt. Illud Græci σισαμοειδής, Latini Sesamoides magnū nomināt. Hoc uerò Græci σισαμοειδής μικρόν: Latini, Sesamoides paruum.

Nomina.

## Cucumer syluestris.

## Cap. CXLIX.



CUCUMIS syluestris fructu solo distat à fatiua cucumere, quem longè minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem: folia, atque sarmenta fatiui refert: radice candida, magna. Nascitur in sabuletis, & ruderibus. fruticè in totum amaro. Instillatus foliorum succus aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix ueterem omnem tumorem discutit: imposita cum resina terebinthina, tubercula rumpit: ischiadicis infunditur: podagras discutit decocta ex aceto & illita. Eius decocto dentes in dolore colluuntur. Arida farina impetiginem, lepras, & uiligines absterget: nigris cicatricibus colorem reddit, & in facie maculas expurgat. Radicis succus sesquiboli pondere, & item cortex acetabuli quarta parte, bilem, pituitamque deiciunt, præsertim in hydropicis: deiectiones autem citra stomachi iniuriam mouet. Radicis selibra, in uini præsertim Lybici hemina conteritur, danturque ex eo terni cyathi tri duo, dum tumor abunde deprimi cernatur. E fructu huius cucumeris fit medicamentum, quod Elaterium uocatur, ad hunc modum. Decerpti cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, seruantur nocte una. postridie imposito supra craterem rariore cribro, utrisque manibus prehenso, sigillatim supino cultro, sursum uersus aciem habente, finduntur, atque per cribrum humor in subiectum uas exprimitur, simulque carnosum, quod hæsit cribro, quod facilius excidat, cliditur. quod ita pressum est, residere sinitur, atque in nicinam peluim demittitur. Coaceruata autem in cribro segmina dulci aqua perfunduntur, & de nouo pressa abiiciuntur. Humor in pelui agitatur, &

Elaterium.

lintheo opertus, soli exponitur: dumque steterit, tota supernatans aqua cum humore concreto, effunditur. Hoc uerò identidem fieri solet, donec existens aqua liquecat: qua stillatim exhausta, sedimentum mortario suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam protinus succi abundantiam, cribratos cineres humi inspargant, & medium cauantes, triplicatum lintheum obiciunt, per quod elaterium cum sua humiditate diffundunt, siccaturumque in pila, ut dictum est, conterunt. Aliqui pro dulci aqua marinam perfundentes, ita eluunt. Alii in nouissima lotionem mulsam aquam respergunt. Elaterium optimum esse constat, læue, non ponderosum, cum candore leniter humectum, gustu amarissimum, quodque lucernarum luminibus obiectum, facile flagret. Porraceum tamen scabrumque, si turbidum spectetur, atque erui cinerisque plenum sit, graue & uitiosum esse solet. Nec desunt, qui cucumis succo amyli immisceant, ut candorem ipsum, & læuitatem imitentur. A bimatu ad decennium deiectionibus utile est. Integer modus obolus est, minimus semibolus, pueris chalciduo, siquidem copiosius, periculum adfert. Bilem, ac pituitam utraque parte extrahit. optima suspensio est purgatio. quod si in animo sit deiectionem moliri, adiecto salis duplo, & stibii quod colorare sufficiat, ex aqua, erui magnitudine catapotia dato, postea cyathus unus aquæ tepidæ sorbeat. Ad citandas tamen uomitiones aqua diluens elaterium, subiectas linguæ partes penitus pennæ oblinito. quod si quisquam difficiliter uomat, oleo, aut



unguento irino resoluto: somnum inhibeto. Porro his, qui eximie uacuantur, continue uinum, & oleum dare conuenit: etenim uomendo restituntur. Quod si uomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachum densando corroborant, offerenda sunt. Cier elaterium menses, & partus enecat, in pecto subditum. morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum, & diuturnis capitis doloribus liberat. efficacissime anginis illinitur, cum uetere oleo, melle, aut felle taurino.

Cucumeris  
syluestris cõ-  
sideratio.

**SYLVESTRIS** Cucumis frequens in Hetruria prouenit, præsertim agro nostro Senensi in oppidorum pla-  
teis, & secus mœnia, & semitas. Ex eius fructibus succum exprimunt officina, atq; Elaterium uocatum parant. De quo differens Theophrastus lib. I. x. cap. XIII. de historia plantarum, ita scribit. Sed omnium medicamentorum diuturnissimum Elaterium est, optimumq; quod uetustissimum. Itaque medicus quidam uir baud insolens, neque mendax, elaterium ducentorum annorum, uirtute mirabili seruare apud se retulit, eo à quodam munere donatus. Causa, ob quam tam longo seruari tempore possit, humoris copia est, quamobrem uel cum præciderint, in cines re humidum poiunt, & tamen ne ita quidem siccari potest, sed usq; ad quinquagesimum annum lucernis admotum lumen extinguit. Hec igitur uis peculiaris isti tribuitur. hætenus Theophrastus. A quo maxime dissentire uidetur Dioscorides: quippe qui Elaterium dixerit à bimatu ad decennium deiectionibus utile esse. Theophrastus uero, idem ducentis annis mirabili uirtute seruatum esse. Quin et in eo discordare deprehenduntur, quod alter tradiderit tantum humoris in se continere Elaterium, ut usq; ad quinquagesimum annum lucernis admotum lumen extinguat. Alter uero probatissimum illud esse Elaterium, quod lucernarum luminibus obiectum, facile flagret. Theophrasto subscribit Plinius lib. XX. cap. I. ubi sic inquit. Elaterium usq; ad quinquagesimum annum lucernarum lumina extinguit. Hoc enim ueri experimentum est, si admotum prius quam extingnat, scintillare sursum ac deorsum cogat. hæc Plinius Theophrastum secutus. Caterum hac in re facile crediderim, Dioscoridis codicem hoc in loco omnino deprauatum esse. Quippe præter Theophrasti, & Plinij sententiam, cum omne humidum, quod pingue non sit, ignis flammam protinus extinguat, nulli profecto dubium est, quin Elaterium, in quo humiditas aquea multum exuperat, potius flammam extinguat, quam flagret: namq; flammæ admotum; excitato in humido à calore flatu, lumen extinguit. id quod nobis aliquando experimento compertum est. Elaterij uires descripsit Mesues inter sua deiectionia medicamenta, ubi in hunc sensum inquit. Cucumis syluestris, siue asinius abradit, & uasorum oscula aperit: proinde & inter stinorum tormina excitat, & alia adfert nouimenta. Sed tolli hæc omnia possunt, si addatur aut bdellium, aut tragacanthæ lacryma, aut aqua mulsæ cum salis modico, aut si ex lacte bibatur. Roboratur elaterij uis, addito fossitij salis momento, aut odorato puluere, quem officina species elephanginas uocant, ijs enim admistum felicius quoq; operatur. Purgat, ut quidam ferunt, scammonij modo. At re uera magis pituitam deijcit, quam bilem: quauis & hanc quandoque detrahat, præsertim cum deiectioni parata promptaq; sese offert. Mirifice præter hæc sanguinis serum expurgat, ab ijs potissimum partibus ducens, à quibus ægrè decumbentes humores detrahi solent: quamobrem articulorum dolore nexatis opem non modicam præstat. Radix in aqua elixa, tusa, & oleo subacta cum absinthio, diuturnam hemicraniam sanat sincipiti, & loco dolenti illita, si tamen prius eius decocto foueatur locus. Præstat idem & succus ex lacte naribus inmissus, quod cerebrum purget: idcirco & uarium tedia delet, & conitiales iuuat. Idem obduratos resoluit abscessus, quemadmodum & strumas, præsertim addito melle, & caprino stercore. Radicis, & cucumis ipsius succus aqua intercute laborantibus præstantissimum est medicamentum, quod flauam proprie educat aquam. Ad idem ualet & radicis decoctum. Prodest præterea arquatis, & iecoris, & lienis obstructionsibus. Item ischiadicis, tum chysteribus infusum, tum etiam si decocta radix exterius imponatur. Siccata radicis puluis, uulnerum cicatrices attenuat ex melle impositus: & sugillata ex ictu delet. Eiusdem succus sabacea farina admixtus & linimenti modo adhibitus maculas omnes, quæ cutis nitorem uitiant, mirifice detergit. Sed animaduertendum est, ne plusquam par sit hauriatur: quod reueratis uasorum osculis sanguinem eliciat. Cucumeris agrestis uires reddidit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, his uerbis. Cucumeris agrestis, & fructus ipsius succus, quem uocant Elaterium, & non minime radicis, ac foliorum, ad medicationes accommodus est. Elaterium itaq; menses ciet, & foetum interimit appositum, ceu alia omnia amara simul & subtilium partium, maxime si aliquam habeant caliditatem, ueluti nimirum Elaterium. Summe siquidem amarum est, leuiter calidum, ut ex secundo sit ordine excalfacientium Porro tale profinus quoq; digerendi uim possidet. Sic igitur eo angina laborantes inungunt quidam cum melle, aut oleo uetere. Bonum item est regio morbo affectis, fusum cum lacte in nares. Hoc etiam usu dolores capitis sanat. Atq; Elaterium quidem eiusmodi est. At radicis succus, ut & foliorum, licet elaterio similem uim habeat, imbecilliores tamen. Sed & ipsa radix ad similem facultatem possidet: abstergit namque, digerit, atque emollit. Porro cortex ea potentius deficcet. Huius planta Græcis οἶνος ἄγριος appellatur: Latinis, Cucumis anguinus, syluestris, & erraticus: Arabibus, Chese allimar, Kate alhenei, seu Cheba alhamar: Italis: Cocomero saluatico: Germanis, Vvider cucumer, & Esels cucumer: Hispanis, Cogombrillos amargos: Gallis Cocombre sauage. Eius uero succum Græci ἐλατήριον, Latini similiter elaterium uocant: Itali, Elaterio.

Cucumeris  
syluestris ui-  
res ex Gal.

Nomina.

## Sthaphis agria.

## Cap. CL.

**STAPHIS** agria, siue herba pedicularis, folia habet labruscæ, diuisa: & cauliculos rectos, molles, nigrosque: fert florem glasti: & folliculos uirides, similes ciceri, & in his nucleum triangulum, scabrum, ex nigro subfuluescentem, intus album, gustu acrem. Grana quindecim, si trita in aqua mulsæ



## STAPHIS AGRIA.



THAPSIA.

mulsa dentur, crassum humorem per uomitum purgant: sed qui hauserunt, ambulare debent. Prudentes tamen attendere oportet, & aquam mulsam continuò potui dare: quoniam pericula strangulationis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex oleo illita phthiriasi prodest: item prurigini, & psoris. Cit plurimam pituitam commanducata: decocta in aceto, dentium dolori, coluto ore, subuenit: rheumatismum gingivarum sistit: ulcera, oris manantia eum melle sanat. Vrentibus malagmatis imponitur.

STAPHIS agria, quam officinae Græca uoce corrupta uulgò Staphusariam uocant, Latinis ab effectu, quòd pediculos necet, Herba pedicularis dicitur. Hæc in Istria, Dalmatia, Apulia, Calabria, frequentissima prouenit. Eius semen copiosum apud seplasiarios inuenitur: nanq; eo frequenter utuntur medici in apophlegmatismis. Id quod etiam plurimum expetitur mulieribus ad pediculos, & lendes necandos. Staphidis agriae meminuit Galenus in Astaphide libro VI. simplicium medicamentorum sic inquit. Astaphis agria uehementer acrem obtinet facultatem, adeò ut ex capite pituitam purget, quod ἀσπαρῆς τῆς αἰς Græci dicunt, abstergatq; ualenter. Itaq; ad psorani ac commodata est. Sed & urendi uim aliquam habet. Ea planta Græcis σάπης ἀγρία, & ἀσάπης, ἀγρία nominatur: Latinis, Staphis agria, Vna syluestris, Herba pedicularis, & Pituitaria: Arabibus, Alberas, Habelras, Muibazagi; siue Miubezegi: Italis acofficinis, Staphusaria: Germanis, Biszmijantz: Hispanis, Fabaraz, Paparraz: Gallis, Estaphisagrie, & Herbe au poulx.


Staphidis agriae confid.

Staphidis agr. uires ex Galeno.

Nomina.

## Thapsia.

## Cap. CLI.



THAPSIA nomen ideo acceperit, quòd in Thapso eiusdem nominis insula, primùm inuenta sit. Tota uerò natura ferulæ similis est: graciliore caule: folijs fœniculi: umbella anethi in cacumine, à singulis surculis erumpente: flore luteo: semen quale ferulæ, latiusculum, sed aliquantò minus: radix foris nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro uestita. Succus extrahendi ratio hæc est. Facto in ambitu scrobe cortices ineiduntur, aut radix in fornicis speciem in se excauata cooperitur, quòd merus succus confluat. oportet illuc sequenti die se conferre, & congestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallum expressus, fœtili erasso insolatur. Aliqui folium unà terunt: sed inualidior huiuscemodi succus. Hoc autem interest, quoniam qui ab radice manauit, grauius olet, & humidus permanet: è folijs autem extractus exiceatur, atque teredinum iniuriam sentit. Qui succum colligit, stare debet non obuersus uento: aut potius eum dies aprius est, & à flatu silet: quoniam ob halitus aerimoniam facies uehementer intumescit, nudaque corpora inuadunt pustulæ. ob id prius liquido cerato, & adstringente, nudas partes illinunt, & ita muniti accedunt.

Tam cortex radice, quàm succus purgandi uim habent, & lacteus succus in aqua mulsa potus: nam utriusq; bilem extrahunt. Radicis modus, quaterni oboli, cum tribus seminibus anethi drachmis: succi, terni oboli: lactis, obolus unus. quod eo amplius assumitur, periculosum est. Huiusmodi purgatio conuenit suspensio, & diuturnis laterum doloribus, reiectionibusque: datur



datur in cibis, aut obsonio, quibus difficile sit uomere. Tam radix, quam succus omnium maximè, quæ partes cum eius uires adepta sunt, uim habent extractoriam ex alto, ubi ex imo aliquid euocandum est, aut meatuum laxitas aliò transferenda est. unde succus illitione, aut radix recens affricu lopecias explent. Radix, succusque cum æquis ceræ, thurisque portionibus, sugillata, liuoresque tollunt: sed non plus binis horis dimittantur: locus deinde aqua maris calida foueatur. Vicia cutis in facie emendat, cum melle illitus succus: lepras tollit: tubercula discutit, perunctus cum sulphure. Indiu turnis pulmonum, laterum, pedum, articularumque ualeudinibus utiliter illinitur. Valet ad integendam colic glandem iis, qui natura, non circuncisione curti sunt: tumorem enim excitat, qui pinguium fotu emollitus, præputij iacturam refarcit.

Thapsiæ con-  
sideratio.

DE THAPSIÆ uiribus locutus est Theophrastus libro IX. cap. XXII. de plantarum historia, ubi ita scribit. Thapsiæ radix uomitoria est, & si quis continuit, tam superius, quam inferius purgat. Ad hæc liquida tollere potest: suppuraciones tamen alias exalbidat facit. Succus eius ualidior est, & quidem tam superius, quam inferius purgat. Nullus feminis usus. Nascitur tum alibi. tum in terra Attica, in qua pecudes incolæ eam non tangunt, peregrina uerò depascunt: & aut alius soluitur, aut intereunt. hætenus Theophrastus. Thapsiam auctor est Plinius libro XIII. cap. XXII. à Nerone claritatem accepisse, eiq; magno usui fuisse sui imperij initio, quod nocturnis grassationibus conuerberatam faciem illinens sibi cum thapsia, thure, & cera, sequenti die contra sanam cutem synceram cuncte, inter complures ferulacei generis plantas. Prouenit & in nostris maritimis locis adeo ferule adsimilis, ut non facile, nisi à rei herbaria peritis, una ab altera dignoscatur. Visitur etiam hodie in hortis ad spectaculum plantæ. quæ ratione iam ferme omnibus innotuit in Italia. Ceterum non desunt impostores, qui Thapsiæ radicem cortices pro Turpeto uendunt: quæ quidem à peritis seplastarijs in ea medicamenta iure optimo addi possunt, quæ Thapsiam exposcunt: sed in turpeti locum non sunt, meo iudicio, recipiendæ. Quapropter maximè in hoc (ut superius diximus in Tripolij commentatione) à Fuchio dissentimus, qui Turpetum à Mesue descriptum, nil aliud esse censet, quam Thapsiæ radices. Thapsiæ uires memorie prodidit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum, si inquit. Thapsiæ acrem habet, ac uehementer excafacientem facultatem cum humiditate. Quamobrem ex alto uolenter extrahit, & ipsum quod extrahit, digerit. Verum plusculum ad ea efficienda tempus postulat, ut quæ largè excrementitia humiditate impleta est, ob quam celeriter corrumpitur. Et lib. primo de compositione medicamentorum secundo locos, sic inquit. Qui Thapsia utitur, sciat opus est, maximam differentiam esse recentis ad uetustiore. Vis enim huius pharnaci post annum multum exoluitur, atque amplius adhuc post duos annos, ausiniq; ferè dicere eam pernitius inutilem esse ad triennium progressam. Hæc ut Græcè θάψια, ita etiam Latine & Italicè Thapsia nominatur: Maxritanis, Hiantum, & Driz.

Thapsiæ ui-  
res ex Gal.

Nomina.

† Hoc loco Græci codices habent θάψια. quod uerbum Ruellius uerterat hic, lac extrahitur; licet alibi, ut in panace Heracleo, idem uertat, succus excipitur. Nos uerò, quod θάψια, à quo uerbum illud defluxit, succum, lachrymam significet, malimus reddere, succus extrahitur. Neq; certè temere, quod non solum nobis conueniat cum Marcello interprete; sed quod etiam arbitremur hanc esse germanam illius uerbi significationem, atque melius rem exprimere, de qua sermo est. Huius tamen mutata à nobis uersionis lectorem admonendum esse duximus.

## Spartium.

## Cap. CLII.

SPARTION frutex est longas ferens uirgas, sine foliis, firmas, fractu contumaces, quibus uites uinciuntur: semen lenticulæ, in folliculis phasiolorum modo nascens: florem, ut albæ uiolæ, luteum. Purgant per superna uehementer ellebori uice, citra periculum flores, & semina quinis obolis in aqua nulla pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tufis, extractus succus, ischiadicis, & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiunii bibant. Quidam marina aqua maccrare malunt, & infundere ischiadicis clystere, strigmenta autem elicit cruenta.

Spartii confi-  
deratio.



TANTA uimirum inter Spartium, siue Spartum, & Genistam intercedit similitudo tum facie, tum etiam uiribus, ut eorum affinitate deceptus iam crediderim omnino errasse eos, qui alterum ab altera secernerent: præsertim cum hac in re deprehendissem Plinium dubitasse libro XXI. cap. IX. ubi ita scriptum reliquit. genista quoq; uini culi usum præstat. Flores apibus gratissimi. Dubito an hæc sit, quam Græci auctores Sparton appellauere, cum ea lina piscatoria apud eos factitari docuerim: & nunquid hanc designauerit Homerus, cum dixit. Nanius sparta dissoluta. Nondum enim fuisse Aphricanum, uel Hispanum spartum in usu certum est: & cum sutiles fierent naues, lino tamen, non sparto unquam sutas. hæc Plinius. Verum cum accuratius Dioscoridem perlegissem, hæc de re prius admonitus à clarissimo medico Petro Cannizero Hispano Serenissimi Ferdinandi Romanorum Regis Protophysico, qui in Hispania copiosissimum Spartum, numerosamq; Genistam se uidisse testatus est, comperi planè inter has plantatas discrimen esse. Quippe quod Spartium Dioscoridi frutex sit folijs uiduus: & floribus constet albæ uiolæ similibus. Genista uerò folia proferat longiuscula, lini ferè modo: & flores luteos, pisi modo lunatos. Hinc itaq; factum est, ut nunc in eorum sententia consistam, qui Spartium à Genista differre existimant. Non tamen quod diuersi prorsus generis has plantas esse putem. nam tanta, ut dixi, uni cum altera cognata est, ut etsi non eadem sint; tamen consus generes esse uideantur. Sparti quidem usus (ut Plinius est auctor lib. XIX. cap. II.) multa post secula coæptus est, nec

Sparti usus  
ex Plinio.



## SPARTIVM.

## GENISTA.



nec ante Fœnorum arma, quæ primùm Hispaniæ intulerunt. Herba & hæc sponte nascens, & quæ non queat feri: tuncusq; propriæ aridi soli, nui terræ dato uitio. Namq; id malum telluris est, nec aliud ibi feri, aut nasci potest. In Africæ exigui, & inutile gignitur. Carthagineus Hispaniæ ceterioris portio, nec hæc tota, sed quatenus parit, montes quoque Sparto operit. Hinc strata rusticis eorum: hinc ignes, facesq;: hinc calceamina, & pastorum uestis. Animalibus noxium, præterquam cacuminum tenerit, etc. Ad reliquos usus laboriosè euellit: ocreatis cruribus, manibusq;: testis manicis: conuolutum offeis, ligneisq;: conamentis. Vulsim fascibus in accruo adunatum biduo, tertio resolutum. Spargitur in sole, siccaturnq;: & rursus in fascibus redit sub tecta. Postea maceratur aqua marina optimè. sed & dulci, si marina desit. Siccatumq; sole iterum rigatur, si repente urgeat desiderium, persusum calida in solio, ac siccatum stans compendium operæ fatetur. Hoc autem tunditur, ut fiat utile, præcipue in aquis mariq;: inuitum. In sicco præferunt è cannabi funes. At spartum alitur etiam demersum, ueluti natalim sitim pensans. Est quidem eius natura interpolis: rursusq;: quàm libeat uetustum nouo miscetur. Veruntamen complectetur animo, qui uolet miraculum æstimare, quanto sit in usu omnibus terris nauium armentis, machinis & edificationum, alijsq;: desiderijs uite. Hactenus de sparto Plinius. Ceterum Genistæ in Hetruria adeo frequentissimè proueniunt, ut Maio, & Iunio mensibus magnum & incundum spectaculum præbeant uiatoribus, quoniam tam copiosè suis speciosis, ac fulgentibus floribus ornantur, & uestiuntur colles, ut procul aurei uideantur. Gaudet earum floribus apes, ut Plinius inquit: proinde aluearijs circumferuntur. Genista nobis ligandis uitibus salicis uicem explet, maceraturq;: etiam cannabis modo, fiuntq;: inde funes, & rudia liuteamina, quæ conficiendis saccis aptissima sunt. Expeditur Genistæ liquor etiam figulis, qui in Italia id uasorum fictilium genus conficiunt, quod uulgò de maiolica uocant: quippe quod (ut ipsi affirmant) nullo alterius arboris ligno fornax succendi possit, quo aureus ille color conferretur in opere. Genistæ recensuit Mesues inter sua simplicia deiectionis facultatis, ubi hæc ad sensum scribit. Genista arbor est montana, è cuius caudice quàm plurimè funduntur uirgæ, rectæ: flexiles, fractu contumaces, quibus uites, & alia ligantur. Flores edit flauos, lunari figura: è quibus siliquæ prodeunt, erui magnitudine: & semina in eis lenti similia, interuallis distincta. Planta tota perturbat, prouocat, incidit, attenuat. Obsistit cordi, & uentriculo. Sed tollitur noxa (ut Philagrius est auctor) addito rhodomelle, aut rosa, & mastiche: quin & anisi, dauci, & sceniculi semine. Epotum semen pituitam utrinq; ualentissimè purgat, & ab articulis quoq; humores trahit. Renum excrementa pelliculæ, urinam citè efficacissimè, & calculos disrumpit tam in renibus, quàm in uestica: nec in his materias figi, & in calculum durescere sinit. Flores contriti strumas auferunt, si cum melle rosaceo, aut sorbili ouo deuorentur. Fit ex ijs ozymel, cuius usu indurati lienes resoluuntur. Pro sunt ischiadicis, podagricis, calculosisq;: si postquam illos sumpserint, subinde frequenter euomant agri. Modus, præsertim floris, à drachmis duabus ad quinque: seminis uerò à drachmis

Genistæ consideratio.

Genistæ descriptio, & uires ex Mesue.



chmis duabus ad quatuor. hæc Mesues. Qui tamen Genistæ semen non rectè obseruasse uidetur. quandoquidè id erui, uel uiciâ faciem potius refrat, quàm lentis. Sparti, ut iam ad eius uires redeamus, meminit Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, his paucis uerbis. Sparti, quo & uites apud nos alligant, tum semen, tum uirgarum succus non instrenuè trahentis est facultatis. Quod Græci σπάρτιον, Latini item Spartium & Spartum dicunt: Itali, Spartio. Quæ uerò Latinis Genista, Italis Genestra uocatur, Hispanis quoque; Genestra, Giesta, & Giestra.

Sparti uires  
ex Gal.

Nomina.

### Silybum.

### Cap. CLIII.

SILYBON lata spina est, folia ferens chamæleonis albi. Hæc recens cum sale oleoque cocta estur. Radicis succus drachmæ pondere potus uomitiones ciet.

Silybi confid.

HACTENVS non ex nostra tantum, sed neq; ex aliorum quoque inquisitione uerum ac legitimum Silybum in Italia nobis licuit reperire. Et quamuis inter tot alias plantas aculeatas inibi nasci, & esse possit; tamen tam paucis eius notas explicauit Dioscorides, ut difficile admodum illud inuentu iudicem: neq; enim ipse, ut ingenue fatear, quod ex illis sit, ausim decernere. Vt Græcis σίλυβον, ita pariter Latinis Silybum appellatur.

Nomina.

### Glans vnguentaria.

### Cap. CLIIII.

GLANS vnguentaria fructus est arboris myricæ similis, magnitudine auellanae nucis, cuius nucleus amygdalarum amatarum more tritus, humorem reddit: quo ad pretiosa unguenta pro oleo uenturunt. Nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudæam. Præfertur plena, recens, candida, quæ facile delibretur. Ea drachmæ pondere pota lienem absorbet: cum loli farina, & aqua mulsa podagricis illinitur. Psoras, leprasque, decocta in aceto: uiriligines, & nigras cicatrices cum nitro emendat: & cum lotio lentigines, uaros, & papulas in facie, & cutis uitia tollit. Vomitiones mouet, & aluum cum hydromelite resoluit: stomacho aduersatur. Oleum, quod ea exprimitur, aluum potu ciet. Cortex eius magis adstringit: uerum tussæ, & expressæ succus abstergentibus medicamentis adiicitur, quæ aduersus pruriginis, & scabritias idonea sunt.

Glandis vnguentariæ cōsideratio.

GLANS Vnguentaria, quam Græci βάλανον μυρικήν dicunt, in Hispania frequentissima gignitur. Adfertur hodie copiosa in Italiam. Vnguentarijs, ac seplastarijs Mauritanorum nomina secuti, eam Ben appellant. Forma hæc pistacia maximè refert, albo cortice, triquetra, fractu facili, nucleo intus conferto, & admodum pingui: ex quo oleum exprimitur, quod de Ben uocant. Magnificiunt id vnguentarij, quod quamuis diu inueteratum, nunquam rancorem sentiat, ut etiam libro primo suo loco monuimus. Arabicae familiæ auctores (ut modò dictum est) vnguentariam glandem Ben nominant. Proinde de ea inter sua soluentia simplicia scribens Mesues, in hunc sensum inquit. Benæ duorum est generum. Maius est nucis auellanae magnitudinis, triangulare. Minus uerò ciceri simile. Viriq; inest oleosa medulla, lenis, & alba. Præstat maius, quod noxa uacet: minus siquidem noxium est. Præfertur in maiori genere, quod putamine sit albo, laui, tenui, necleo fragili, albo, oleosoq;. Vetustum recenti melius. In minori autem præcellit in cinereo albicans, fragilis pariter, & pinguis. Dioscoridi tamen in maiori genere (minoris enim non meminit, quemadmodum nec Theophrastus, neque Plinius) præstantius est recens, etsi contrarium asserat Mesues. Oleum ab vnguentarijs hoc tempore è nucleis tantum exprimitur, ut Dioscorides docuit, non autem, ut quidam existimant, ex putaminibus, quod dixerit Theophrastus, vnguentarios putamine fructus contuso uti solere. Plinius, ut Theophrasti & Dioscoridis sententiam comprobaret, vnguentarios prodidit è putaminibus, medicos uerò è medulla oleum elicere quod hoc medicamentis, illud odoramentis usum præbeat. Verum tamen hac ætate (ut diximus) ab omnibus tantum è nucleis à putamine repurgatis exprimitur. Nec crediderim unquam, quod ex solis putaminibus oleum effluere possit, quamuis diligentissime comprimantur, & constringantur prælo etiâ grauissimo: quoniâ hæc putamina arida sunt, & omni prorsus humore carent. Illud quoque fidem non dubiam facere potest, quod hanc parandi olei rationem silentio prætermisit Dioscorides, non modò in hoc loco, sed etiam libro primo, ubi tamen de oleis, & unguentis conscriptione prætermisit. Cuius fortè doctrine immemor Mauardus Ferrariensis, uirjalioqui nostræ ætatis celebris, dubitat in adnotationibus, quas in Mesuem edidit, an Vnguentariæ glandis oleum è nucleo, an è putamine exprimi debeat, asserens quamquam in quibusdam Dioscoridis codicibus legitur, oleum hoc è nucleis exprimi debere; in aliquibus tamen nec nucleorum, nec putaminum ullam fieri mentionem. Verum etsi ambigendi non defuerit occasio, præsertim ex Theophrasti testimonio, qui putaminibus uti vnguentarios tradidit; aderat tamen grauissimus auctor Galenus, qui rem hanc abunde enucleauit, cum constanter asserueret, Balaninum oleum vnguentarijs ex carne nucleorum, non ex putaminibus exprimi. Id quod etiâ facile ex Dioscoride colligi potest, cum dicat consimili modo fieri balaninum & amygdalinum. quod autem hoc ex amygdalarum nucleis fiat, nemo est qui dubitet. Hæc sane uobis non leuem faciunt auctoritatem, quod aut eo in loco Theophrasti exemplaria sint deprauata, aut minus integri, & ueraces fuerint auctores, à quibus fortassis vnguentariæ glandis historiam accepit. His porro accedit huius olei communis usus, & eius parandi ratio. Siquidem Balaninum oleum plurimi faciunt vnguentarij, non quod aliqua odoris præstantia commendetur (inodorum etenim est) sed quod nunquam uetustate rancorem contrahat. Id scilicet quod è nucleorum medulla, non autem ex putaminibus conficiunt. Nam rancoris expers cum sit, omnium aptissimum habetur ad odoratissima unguenta (mistasuras uocant) temperanda, quæ ex moscho, zibetto, & ambaro, illinendis chirothecis, & alijs, quorum in

Manardi dubium solutū.



in delicijs, & lasciuiâ omnis est usus & gratia, parantur. Quandoquidem si hæc alio quouis oleo liquefcerent in unguentum, contracto inde non multo post tempore rancore (etate enim omne oleum præter Balaninum rancescit) non modò uniuersam odoris suauitatem exuerent; sed etiam putida, foetidaq; euaderent. Quo utique experimento apertissimè dignoscitur, an oleum illud Balaninum fuerit, quod ex unguentariæ glandis nucleis fieri solet. Ceterum de uiribus Pen hæc subiunxit Mesues. Maioris, inquit, generis fructus incidit, abstergit, attenuat, expurgat, & aperit: sed uentriculum subuertit, & uiscera perturbat, ob excrementitiam, acremq; humiditatem, quam possidet. Minoris autem uis longè uehementior, & magis periculosa: namq; adeo perturbat, agitâtq; humiores, ut sæpius animæ deliquium faciat, & frigidos sudores cõcitet. Proinde non in alios usus is admittendus est, quàm in unguenta, & cataplasmata. Maioris noxa demitur, cum igne torrescit: siquidem ignis calore exuperantem deperdit humiditatem, quæ uomitionem mouet, sitq; medicamentum tantum deiectionum. Decoquitur etiam cum anisi, & fœniculi semine: quoniam hoc modo prior noxa corrigitur. Tam in potu, quàm aliter sumptus lentam, crassamq; pituitam uomitu, & deiectione purgat. Ideoq; aptissimum medicamentum est coli cruciatibus non modò haustus, sed etiam clysteribus infusus, præsertim ubi à flatu, & pituita ortum habuerint. Fit etiânnim ex contritis ipsius nucleis, polenta, & melle admistis, cataplasma ad strumas, durosq; tumores admodum utile, & ad neruorum morbos à frigidityte excitatos, addito tantum melle. quo fit, ut conuulsis, resolutis, & contractis opem ferat non obscuram. Pollet præterea ad iecinoris, & lienis infarctus duritiesq; si addita lupinorum farina, & nardo emplastri modo imponatur. Nucleorum oleum uulnerrum cicatrices attenuat, & delet: item lentigines, aliasq; cutis fœditates emendat. Auribus infusus non modò doloribus leuamentum præstat; sed & surditatem, & tinnitum curat. Glandis unguentariæ uires memoria prodidit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, his uerbis. Balanus myrepsice, hoc est, Glandis unguentariæ, adfertur ex barbarica regione. Utuntur unguentarij carnis eius succo, qui facultate calidus est. Reliquæ autem, unde expressus est succus, terrestres scilicet, & duræ, uincemtem habent qualitatem amarâ. Sed & admista est quædam adstrictio. Proinde extergentem simul, & incidentem, contrahentemq; & stipantem effectum possident. Itaq; ad ionthos, lentigines, ephelin, & pruritus, deinde & ad psorâ, & lepram conueniunt. Verum enimuero & lienis liquant, iecurq; indurescens. Quod si quis carnem eius drachmæ pondere cum melicrato bibat, medicamen experietur uomitorium. Sæpe etiam per infernam aluium largiter subducit. Itaq; cum hoc medicamento utimur, ad uiscerum expurgationem, & maxime iecinoris, lienisq; ex oxycrato ipsum exhibere conuenimus. Gaudet uerò uel maxime alioqui acetò ad extrinsecas actiones. Adeo enim efficax efficitur, ut & psoras, & lepras extergeat, & multò etiam magis quæ his sunt minora, lentiginem, uutiliginem, ionthos, ephelin, exanthemata, achoras, tum ulcerosa, & quæ crassi sunt succi omnia. Sed & cicatricibus decorem adfert. Porro quod cum illinenda est lieni, præstet admistam esse farinarum quampiam exiccantium, cuiusmodi est erui, ac lolij farina, id iam potius ad componendorum medicaminum tractationem, haudquaquam ad præsens institutum pertinet: sed & in paratu facilibus ipsum dicitur. Verum in præsens sufficit abstergentem, & incidentem cum adstrictione quampiam proposti medicaminis dixisse facultatem, ac sic ad aliud transgredi. Cortex tamen eius admodum adstringit: itaq; eo posito quis ad ea uti, ad quæ ualida usus est adstrictione, hætenus Galenus. Sed quoniam Balanus myrepsica Mauritanorum Myrobalana nobis ad memoriam reuocauit, quorum idem quinq; faciunt genera, cum ea in medicamenta frequenter, & commodè ueniât, nec eorum, quod extet, meminere ueteres Græci; ideo nunc de ijs nobis differendum est: neq; enim ob eorum usum silentio erant dissimulanda. Sunt itaq; ut diximus, MYROBALANORVM genera quinque: nempe Flaua, Chepula, Indica siue nigra, Empelica, Bellerica: quæ omnia facie inter se distant, ut etiam uiribus. Quamobrem omnino censendum esse putauimus, & ea à diuersis produci arboribus. quamquam non desint, qui affirmant, flaua simul, & chepula ex una & eadem arboře nasci, existimantes flaua decerpi ab arboře immatura, chepula uerò cum ultimam adeptâ fuerint maturitatem. Verum cum horum fructuum ortus, & arbores nos prorsus lateant, non est quod illorum sententiam probare, aut resellere ausim. Recensentur genera omnia inter ea medicamenta, quæ aluium citra noxam deiciunt: nam etsi purgatoria ui polleant; nulla tamen uirium imbecillitate, aut molestia sumentes afficiunt, sed potius sua adstringenti facultate, quam possident, cor, iecur, & uentriculum roborant, quinetiam uniuersum corpus. Id tantum illis noxæ adscribunt, quod obstructions, & uiscerum infarctus augeât: proinde ne obstructis exhibeantur præcipiunt. Inflanantur Myrobalanis medicamenta omnia, quæ deiciendo laborem inferunt: quo fit, ut utiliter admisceantur scammonio. In flauorum Myrobalanorum genere ea cæteris præstant, quæ in uiridi plenè flauescunt, ponderosa, saccta, gummosa, crassi corticis, & quibus pusillum osiculum inest. E Chepulis ea probantur, quæ cæteris crassiora sunt, colore nigro purpurascete, cortice crasso, & quæ in aquam deiecta fundum quàm citissimè petunt. Inter Indica excellunt, quæ maxime nigricant, crassa, ponderosa, nullo intus osse, & quæ contrafacta in unum compacta cernuntur. In Empelicorum classe laudantur, quæ in maiora, crassiora, densiora, ponderosioraq; frustra diuiduntur, & quæ minus osis, quàm pulpæ habent. Bellericorum uerò illa in suo genere præferuntur, quibus crassities, densitas, grauitasq; non desit, & quibus crassus in uniuersum sit cortex. Flaua, Indica, Chepula, Bellerica refrigerant ordine primo, siccantq; secundo. Empelica uerò primo tantum tum refrigerant, tum exiccant. Vim obstructoriam exuunt omnia genera, additis aperientibus, & urinam cientibus medicamentis: uel si macerata caprino sero, aut sumariæ succo exhibeantur: uel si cum absinthio, aut agarico: aut rhabarbaro hauriantur. Perfunduntur anygdalino, & sesamino oleo, ut contrafacta inde pinguedine, uentriculo non inhæreant. Quin & id noxæ pariter tollitur, ubi cum castæ nigre medulla, aut mamma; aut acidis palmulis deuorentur. Vbi deiectione sit opus, eorum tantum dilutum præbet: ubi autem adstrictione in puluerem conuertunt, & subinde propinquant: Chepula quæ saccharo coniunguntur, quàm deiciant. Contrarium efficiunt, quæ cruda siccataque reponuntur. Myrobalana omne

Glandis unguentariæ uires ex Mes.

Glandis unguentariæ uires ex Gal.

Myrobalanorum genera.

Myrobalanorum uires.

Ec genus



genus (ut Mesues est auctor) eorum senectutem remorantur, qui ipsis frequenter utuntur: colorem faciunt elegant-  
torem, corpori odorem iucundum conciliant, hilaritatem afferunt, & uenterculum, cor, & iecur roborant: con-  
ferunt hemorrhoidibus, & bilis firuorem reprimunt: ad quod flaua ceteris præstant, ut quæ priuatim bilem detra-  
bant: & eos peculiariter iuuent, qui temperamento calidi sunt. Fricantur coie ad oculorum collyria, cum uine acere-  
be, aut rosarum aqua, aut fœniculi succo, quod oculorum inflammationes reprimant, lacrymas sistant, defluxio-  
nesq; cohibeant. Sanantur horum puluere ulcera, addita lentiscina resina. Chepula pituitam exhauriunt, intelle-  
ctum clarificant, & uisum, præsertim saccharo asseruata: uenterculum tum mundant, tum confirmant. Dantur uti-  
liter aqua intercute affectis, & diuturnis febribus laborantibus. Nigra utranque bilem trahunt, præsertim exu-  
stam. Conferunt membrorum tremoribus, coloris nitorem conciliant, elephantiacos iuuant, mœrores auferunt, &  
quartanam fugant. Empelica pituitam educunt, cor, & cerebrum, corroborant, intellectum augent, uentricu-  
lum à pituita, alijsq; noxijs humoribus expurgant, ac etiam confirmant, ac sitim extinguunt, uomitiones cohibent,  
& cibi appetentiam inuitant. Bellerica ea omnia possunt, quæ & proximè dicta. Myrobalanorum inter recentiora  
res Græcos tantum, quod sciam, Actuarius meminit: qui tamen ea, quæ de illis scripta reliquit, à Mauritanis (ut ip-  
se quoq; fateri uidetur) mutuatus est. Sed profectò nesciuerim, qua ratione ductus inter ea medicamenta, quæ uo-  
mitum eliciunt, myrobalana reposuerit, cum omnia eorum genera planè uomitiones compeſcant. Porro hodie igno-  
rata uidetur quæ *χρυσόβαλανος* Græcis uocatur, digerens, & roborans Indica nardi modo, ad colicos affectus,  
uenterculi ardores, & singultus à Galeno Asclepiadis auctoritate commendata libro VIII. & IX. de compositio-  
ne medicamentorum secundum locos. quanquam non desunt è recentioribus, qui sibi persuadeant Chrysobalanum  
esse nucem myristicam: cum tamen plura sint, quæ eorum destruant sententiam, nempe cinereus color, acutus ori  
sapor, & quod myristica nucis nusquam meminerint ueteres Græci. Nullam huiusce, quod legerim, mentionem fa-  
cit Galenus in libris simplicium medicamentorum. Id quod argumento esse potest, Galenum ipsum non habuisse com-  
pertum, quid esset Chrysobalanus. Sed de his hæcenus. Ceterum quandoquidem Balanus myrepſica, quam ab Ara-  
bibus Ben appellari diximus, nobis in mentem redegit radices illas, quas officinæ Behen album, & rubeum uocant,  
ad cordis affectus ijs, ac etiam recentioribus expetitis, hunc locum non prætereundum esse duxi, quin de ijs quoque  
aliquid differerem, præsertim quod è Græcis non inueniatur, qui illa posteritatis memoriæ prodiderit. Sed illud in  
primis animaduertendum est, quod communis usus radices, quas uulgò Behen nuncupant, eæ quidem non sunt, de  
quibus Mauritani scripsere, imò eas prorsus ementiuntur. Siquidem scribit Serapio, Behen radices proferre minoris  
pastinacæ similes, contortas, odoratas, & mansu lentas, & in Armenia nasci. Auicenna autem radicem effodina-  
frusta Behen esse ait, in se contracta, & siccitate exoleta. At nostrates, quæ in Italia, non in Armenia effodina-  
tur, nulla penitus odoris suauitate commendantur: quin & mansæ nullum ori lentorem reddunt, nec erraticæ pastina-  
cæ faciem repræsentant: cum tamen Arabicum Behen radicibus adeò pastinacam referat, ut scripserit Haliabbas clarissimus  
Mauritanorum, auctor, Behen & syluestris pastinacæ radices  
nullum inter se discrimen habere. Quo fit, ut nulla sese offerat  
nobis ratio, qua probare possimus, Behen communis usus esse  
Arabum legitimum. quanuis & ipsi inter se hac in historia non  
parum dissentiant. Nicolaus Myrepſicus, itemq; Actuarius Be-  
hen hermodactylum uocant, nescio tamen qua ratione, cum alia  
sit radix apud Paulum, & Arbes hermodactylus. Behen adulteris-  
na, tam album, quam rubrū, passim in Italia proueniunt. Sed qui  
bus polleant uiribus, nondum mihi compertū esse ingenuè fateor.  
Βήλανος μύρε-ψικς sic Græcis dicitur, Latinis uerò Glans uine-  
guentaria: Mauritanis, Habben, seu Ben: Italis, Ghianda uine-  
guentaria: Hispanis, Auellana de la India, Tartago, & Muid.

## NARCISVS.



Nemina.

NARCISVS. CAP. CLV.  
NARCISVM sunt qui ut lilium, liliū appella-  
larint. folia profert porro similia, tenuia, multò mino-  
ra, & angustiora: caulis uacuu, & sine folijs, supra dos-  
drantem attollitur: flos albus, intus croceus, in quibus-  
dam purpureus: radix intus alba, rotunda, bulbosa: se-  
men uelut in tunica, nigrum, longum. Probatissimus  
nascitur in montibus, suauis odore: cæteri porrum imi-  
tantur, atque herbaceum uirus olent. Radix cocta, si-  
ue esur, siue bibitur, uomitoria est: ambustis igni pro-  
dest cum exiguo melle trita. præcisos neruos illitu gly-  
loribus trita ex melle, & imposita subuenit. Vicia cutis  
in facie, uirilignesque cum semine urticæ, & aceto ema-  
culat: cum eruo, & melle, ulcerum sordes expurgat: ab-  
fcessus rumpit concoctioni repugnantes. infixæ corpori  
extrahit, illita cum lolij farina, & melle.

NARCISVS



**NARCISVS**, inquit Theophrastus libro 6 cap. VI. de historia plantarum, uel liriū (alij enim hoc, alij illo nomine uocant) folium albuci, terræ proximum gerit, sed longè latius, lilij modo. Habet caulem sine folio, herbaceum, florem suo ferentem cacumine, in membrana ueluti uasculo inclusum, largè amplum, coloreq; nigrum, figura oblongum. Hic decidens sponte germinat, ceterum & qui legunt desigere eum solent. Quin & radicem ferunt, quæ carnosæ, rotundæ, amplæq; constat. Serotinus admodum: post arcturum enim, & circa æquinoctium floret. Hæc Theophrasti de narcisso sententia. Porro Plinius libro XXI. cap. XIX. duo Narcissi genera prodidit, quæ his uerbis etiam depinxit. Narcissi duo genera in usu medici recipiunt. Vnum purpureo flore, alterum herbaceum. Hunc stomacho inutilem, & ideo uomitorium, alios quoque soluentem, neruis inimicum, caput grauantem, & a narce narcissum dictum, non à fabuloso puero. hæc Plinius. In quibus planè deprehenditur à Dioscoride dissentire, quod neutrum Narcissi genus flore albo descripserit. quanquam idem Plinius cap. V. eiusdem libri inter lilij genera Narcissum communerans, hunc flore candido constare tradidit. Veruntamen nulli ex hoc mirari licet, neq; propterea Plinium damnandum esse censeo, quod uiderim ego plures Narcissi species florum tantum uarietate distingas. Narcissi uires retulit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Narcissi radix usque adeo exiccandi facultate pollet, ut & maxima uulnera conglutinet, uel ad incisiones usque, quæ circa teudones accidunt. Habet uerò quiddam abstersorium, & attractorium. Planta, quæ Græcis νεφροσός, Latinis item Narcissus appellatur: Arabibus, Narcis seu Nargies: Italis, Narcisso: Germanis, Vebtblumen, Hornungsblumen, & Zeitlosen.

Narcissi historia ex Theophrasto.

Narcissi uires ex Gal.

Nomina.

## Hippophaes.

## Cap. CLVI.

**HIPPOPHAES**, quo fullones uestes interpolant, in fabulosis, maritimisque nascitur, succulaceo frutice, undique denso, & largo: folijs oleæ longioribus, mollioribusque: inter quæ candicantes spinæ emicant, siccæ, angulosæ, interstitio quodam distantes: flores hederæ corymbis similes, racematim coherentes, minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescentes: radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustanti: ex qua perinde ac thapsia, succus eximitur. qui per se, & cum erui farina subactus, siccatur, & ad usum reconditur. Syncerus pituitas, bilem, aquasque deiecit, oboli pondere: erui uerò farina subactus, quatuor obolis, cum aqua mulsa. Frutex cum radicibus siccatus tunditur, & cum aquæ mulsæ dimidia hemina tritus datur. Radice, & herba liquamentum depromitur, uti in thapsia. huius in purgationibus modus est drachma.

## Hippophæstum.

## Cap. CLVII.

**HIPPOPHAESTON**, id quod aliqui hippophaes appellant, nascitur eisdem locis, quibus hippophaes, estque spinæ fulloniæ genus, humilis herba, simul cauliculo, sine flore: inanibus tantum capitulis: folijs paruis, spinosis: radículas habens molles, crassas. Succus radice, folijs, & capitulo exprimitur, & exiccatur. Datus, cui uoles, tribus obolis in aqua mulsa, aquam pituitasque detrahit: pruriti comitialibus morbis, neruorum uitij, & orthopnæ conuenit huiusmodi purgatio.

**ET SI** quandoq; maritima, & sabulosa adierim loca, ut Hippophaem, & Hippophæstum, utpote plantas inibi nascentes, inquirerem; neutrum tamen hæcenus mihi licuit inuenire. Ceterum retulit nobis Hieronymus Amaltheus Opitergensis, medicus ingenio, & eruditione clarus, se olim Venetijs plantam accepisse à Ioanne Baptista Zepisso Papiensi clarissimo medico, quæ non modò notis omnibus Dioscoridis Hippophaem referebat: sed etiam uiribus, ut se experimento comperisse testatus est. Quare non prorsus desperandum est, quin & nobis, & alijs quoque aliquando contingat Hippophaem consequi. Non inuenio, quod Galenus hippophaes, aut hippophæsti meminerit in suo simplicium medicamentorum censu. Hippophaes tamen mentionem fecit Paulus lib. VII. inter simplicia. Hippophæsti uerò Plinius libro XXVII. cap. X. Illius nomen Græcum ἵπποφαῖς, Latinum quoque Hippophaes. Huius uerò nomen Græcum ἵπποφαῖς, Latinum item Hippophæstum.

Hippophaes consideratio.

Nomina.

## Ricinus.

## Cap. CLVIII.

**CICI**, aut croton, nomen accepit, à ricini animalis similitudine. Arbor prouenit parue ficus altitudine, folio platani, maiore, læuiore, & nigriore: ramis, caudicibusque cauis, in arundinis more: semine in uuis asperis, quod corticibus exutum ricinum animal representat. ex quo oleum nomine cicini exprimitur, cibus scædum, lucernis emplastrisq; utile. Grana triginta numero purgata, trita potu pituitas, bilem, aquamque per aluum extrahunt, uomitionesque mouent. sed iniucunda admodum est, & molesta purgatio: siquidem stomachum uehementer subuertit. Tusa & imposita, uitia cutis in facie, uarosque expurgat. Folia cum polenta trita inflammationes oculorum, tumoresque leniunt: turgentes mammas cohibent. eadem ex aceto illita, ignes sacros restinguunt.



## RICINVS.

Ricini con-  
sideratio.Ricini vires  
ex Galeno.


Nomina.

TITHYMALVS CHARACIAS.



RICINVM uocauere Latini plantam, quæ Græcis *ῥίχι* dic-  
citur, à similitudine, quam eius semen habet cum ricino liuido ac  
fædo animali, quod canibus, bubus capris, alijsq; quadrupedibus  
adheret: neque prius decidit, quàm plenius sanguine saginatum  
rumpatur. In Hetruria planta hæc à quibusdam uulgò uocatur  
Girasole, aliquibus uerò Fagiuolo Turchesco. Apud Insu-  
bres autem pluribus in locis Mirasole. quanquã id nominis potius Helio-  
tropio cõuenit, de quo in huius libri calce differemus. Semen ofi-  
cinae Cheruam maiorem appellant: tametsi ab ipso Mesue, cuius  
uestigia pharmacopola maximè sequuntur, Regium granum appel-  
lari constet. Ricinus copiosè feritur in Aegypto, ubi ex eius semi-  
ne plurimũ olei exprimitur, cibis quidè fædũ (ut inquit Plinius)  
sed lucernis utile. Deijcit alium, perinde ac balanum myrseis,  
tolliturq; eius noxa iisdem medicamentis. Quamobrem de eo sic  
loquitur Mesues. Regium granum (hoc est Ricini semen) pituita  
tam per uomitum, quàm per alium extrahit, sed non sine assumen-  
tium molestia: quinetiam bilem, et aquam inter cutem deijcit: et  
ea sanè omnia excrementa purgat, quæ ad articularum compagia-  
nes defluunt. Confert item coli, et articularum doloribus, nempe  
podagris, et ischiadicis, si ex iure ueteris galli decoctum hauria-  
tur. Hydopicis uerò decoquitur cũ caprino sero, aut emulso Gale-  
center lacte maceratum. Ricini vires memoria prodidit Gale-  
nus lib. VII. simpl. medic. sic inquit. Ricini semen, quemadmo-  
dum expurgat, detergit, ac digerit; sic quoq; folium, sed undequa-  
que debilius. Oleum, quod ex semine conficitur, tum calidius, tum  
teuiorum partium est, quàm oleum commune, ac proinde etiam  
discutit. Planta, quæ Græcis *ῥίχι*, siue *ῥότον*, Latinis Ri-  
cinus appellatur: Arabibus, Cherua: Italis, Girasole: Germanis,  
Vunderbaum, et Creutzbaum: Hispanis, Figueira de lhinfer-  
no: Gallis, Paulme dien.


TITHYMALVS MYRSINITES.



TITHYMAL



TITHYMALVS PARALIVS.



TITHYMALVS HELIOSCOPIVS.



TITHYMALVS CYPARISSIAS.



TITHYMALVS DENDROIDES.





## Tithymali,

## Cap. CLIX.

**TITHYMALI** genera septem, quorum masculus characias appellatur, ab aliquibus amygdaloides, alter myrtites, qui foemina existimatur; eumque myrsinitem, aut caryitem vocant: tertius paralius, quem tithymalida appellant: alius helioscopius: quintus cyparissias: sextus dendroides: septimus platyphyllos dicitur. Characiae caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri, lacteo succo, atque acrimadentes: folijs oleae circum ramos, angustioribus, & longioribus: radice crassa, lignosa: pendet in cacuminibus caulium coma iunci, sub qua caeolae foliolis balnearum similes, in quibus semen continetur. nascitur in asperis, & montibus. Succus aluum purgat, trahit pituitam, bilemque binis obolis in posca sumptis, & cum aqua mulsa uomitiones mouet. Appetente uindemi- arum tempore succus, congestis ramulis, mox dissectis, & uase conclusis, excipitur. Aliqui adijciunt farinam erui, & in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem impleant. Alij in aridas ficos ternas quaternasve guttas instillant, ut cum his inarescant, quas ad usus recondunt. Per se etiam tusus in pila, & in pastillos coactus reponitur. porro cum extrahitur lac, neque quod uentus aspi- ret, stare quen- quam, neque manus oculis admouere conuenit, sed antequam colligas, corpus, praesertim faciem, collum, scrotumque genitalis, adipe, aut oleo cum uino perungere. Fauces autem exasperat: quapropter catapotia cera, aut decocto melle oblini par est, & hoc modo dari. binas tamen ternasve ficos purgationis gratia sumplisse, satis est. Recens lac ex oleo, perunctos in sole capillos euellit, renascentesque flauos, & exiles efficit, denique omnes perimit. dentium cauernis inclusum, leuat dolores: sed cera dentes oblinendi, ne suo delapsu fauces, & linguam uitiet. Tollit illitu impetigines, formi- cantes verrucas, pensiles, & quae thymi florem repraesentant. ualet aduersus pterygia, carbunculos, phagedaenas ulcerum, gangraenas, fistulasque. Legitur semen autumnus, & siccatum sole leuiter tun- ditur, seruefactumque loco mundo reponitur. Folia item siccantur. Semen, & folia lactei succi effe- ctum praebent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui inueterant admisto cum lacte lepidio, & caseo con- tuso. Radix drachmae pondere in hydromelite pota, per inferna trahit. decocta cum aceto, dentium dolori auxiliatur, colluto ore. Foemina, quam myrsinitem, aut caryitem uocant, similis suapte na- tura daphnoidi: folijs myrti, sed maioribus, firmis, in cacumine acutis, & pungentibus: ramulos ab radice mittit dodrantes: fructum fert alternis annis, nuci similem, mordaci gustu. nascitur in aspe- ris. Succus, radix, semen, folia, consimilem antedicto sortiuntur facultatem: sed ad citandas uom- itiones inualidior haec est. Aliud tithymali genus dicitur paralius, quem tithymalida, aut mecona- aliqui appellauere. Nascitur in maritimis, ramis subrubentibus, palmum altis, quinis, senisve à ra- dice exeuntibus: folijs lini, angustis, paruis, oblongis, in uersus quosdam digestis: capite in cacumi- ne orbiculato, in quo semen, ut eruum, uario colore emicat: flos albus. Frutex totus cum radice lac- teo succo turget. Similes ad usus reconditur. Helioscopius dicitur, folijs portulacae, tenuiori- bus, rotundioribusque: ramulis prodeuntibus à radice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodran- tali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis: capite anethi: semine uelut in capitulis incluso. He- lioscopij nomen accepit, quoniam comas cum sole circumagat. circa oppida nascitur, potissimum in ruderibus. Colligitur succus, semenque, ut aliorum. Eadem, quae superioribus uires, non ta- men usque adeo ualida. Cyparissias in caulem exit dodrantalem, uel maiorem, subrubrum: ex quo folia pini similitudine exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora: & in totum nascentem pinum aemulatur, unde nomen traxit. Candido succo madet: cui eadem uis, quae superioribus. In petris nascens dendroides cognominatur. ampliter opacat, in cacumine frondosam spargens comam, suc- co lacteo praegnans, cauliculis rubentibus, folijs myrti tenuioribus, fructu characiae. Eiusdem effe- ctus, cuius superiores, simili- que modo reconditur. Platyphyllos uerbasco similis est. Radix, suc- cus, & folia per inferna trahunt aquas. Pisces necat, tusus, & aquae insparfus. Reliqua tithymalorum genera, quae supra scribuntur, idem efficiunt.

Tithymalo-  
rum confid.

Brasauoli opi-  
nio explosa.

**TITHYMALORVM** omne genus officinae Esulam indifferenter appellant, quanquam plura sunt tithyma- li genera, quorum historiam satis confuse Mauritanii tradiderunt. quo fit, ut apud hos non sine magno labore tithyma- lorum genera recte, & distincte cognosci possint: quae tamen à Graecis ordine pulcherrimo descripta inueniuntur. Ob id igitur mihi quidem difficile uidetur discernere quae Tithymali genera ex ijs, quae à Graecis repraesentantur, et duo sint, quae à Mesue, & Auicenna Scebram, & Alsebram nominantur: quoniam horum neuter, quod extet earum plantarum faciem notis explicauit. Credidit Brasauolus illud esse Mesui alsebram minus, & Auicenna scebram, quod Dioscoridi paralius. Sed equidem ab eo dissentio, quod nusquam in horum monumentis legerim, Alsebram minus in maritimis nasci: quin nec ramos ferre subrubentes, nec lini folia, nec semen eruo simile, capitulis tenuibus, quae- tum repererim memoriae prodidisse Mesuem, Alsebram esse plantam lacteo succo refertam, radicibus tenuibus, quae- rum haec praeseruntur, quae subrubeant. Auicenna uero Scebram nasci ait in hortis, non autem in maritimis, canle te- nui, hirsuto, folijs tarco similibus. Quae sane omnia Brasauoli sententiae aperte refragari deprehenduntur. Nec pos- sum praeterea cum eodem sentire, quod Alsebram maius apud Mesuem, & Mebezeheregi apud Auicennam idem sint Mauritanis, quod Graecis Tithymalus platyphyllos. quandoquidem in eorum scriptis nusquam reperi maioris gene- ris



ris Alsebram folia edere uerbasci similia : nec quòd tusum , & aquæ insparsum pisces interficiat , sed quòd rectius ( ut inquit Auicenna ) eius folia minori Scebram sint similia . Porro si mihi hac in re coniectandum esset , putarem equidem nil aliud Mauritanis esse minoris generis Alsebram , siue Scebram , quàm plantam illam , quæ officinis Esulæ minor uocatur , quòd ( ut inquit Auicenna ) in hortis , & ubiq; proueniat . Hæc autem , ui fallor , ea est , quam uocat Dioscorides Tithymalum cypariisiam : quippe quæ piui arbores uiper natam folijs prorsus imitetur . Quin etiam censerem Alsebram maius , siue Mehezeberegi eam omnino esse plantam , quæ Græcis dicitur pityusa , utpote quæ Tithymalo cypariisæ folijs sit similis , quanuis magnitudine excellat : non enim desunt , qui inter tithymalorum genera etiam pityusam recenseant . Proinde non ab re dicebat Auicenna , Mehezeberegi esse simile Scebram , sed maius , & colore subcineritio . Mesues uerò , quòd radicibus esset rotundis , crassis , crassiq; cortice obductis , ponderosisq; : quæ ferè omnia radici Pityusæ reddidit Dioscorides . Accedit his Serapionis auctoritas , qui de Scebram agens , ea omnia ex Dioscoride illi tribuit , quæ pityusæ idem Dioscorides assignauit . Ex his itaq; perspicuum fieri arbitror , pityusam Mauritanis Scebram maius appellari : minus uerò id , quòd Græcis tithymalus cypariisias dicitur . Caterum Characiam uocatum , postquam multum laboris in eo indagando frustra impendissem , hoc anno uisit ad me Pisis clarissimus medicus Lucas Ghiuus Forocorneliensis : qui , meo quidem iudicio , omnibus prorsus notis legitimo respondet . Myrsin ten quoq; hoc tantum anno reperimus , folijs circa caulem totum crassis , acutis , myrtis similibus . Paralius uerò in maritimis tautium nascens , quem uulgaris usus tithymalum putat Brasauolus , in maritimis nostris Senensibus , Argentario promontorio , & in uniuerso illius regionis tractu , item in Aquileiensi agro frequentissimus inuenitur . Huic folio similis uisitur quedam alia planta , quæ in Hetruria uulgò appellatur Herba uora . Cuius radicibus prius contusis , ac deinde fluminibus demersis , pisces protinus enecantur . Sed caret hæc lacteo succo . quapropter eam inter tithymalorum genera iam non esse adnumerandum cognoscimus : etsi aliàs aliter sensimus , quòd , alijs notis neglectis , lini folia uiderentur , & caules subrubentes . Si hæc desuerit , Platyphylli radices sumunt , quo uniuersa regio scatet . Porro Helioscopius , sic dictus , quòd cum sole comam circumagat , omnibus uulgaris notitiæ planta est . Prouenit enim hæc passim prope urbium , & oppidorum moenia , in campis , incultis , hortis , collibus , & ubique tam culto , quam inculto solo . Cypariisias deinde ( ut supra diximus ) ea est planta , quam Esulam miuorem uocant , cuius pro omni Tithymalo inualuit usus . Dendroidem uidimus primum in regno Neapolitano extra Terracinam urbem inter saxa antiquissimi specus in itinere Neapolim uersus , plantæ arborecentis effigie . Hunc dum contemplari cœpissim , superuenit peritissimus medicus Hieronymus Drogus Parmensis , & doctissimus Hieronymus Rorarius Portonouensis ( tunc omnes unâ sequebamur Bernardum Clesum amplissimum Candinalem Tridentinū ad Casarem pergentem ) quibus magno solatio Dendroidem tithymalum ibi à me primum repertum ostendi : erant enim ambo rei herbariæ studiosi , atq; etiam gnari . Nascitur idem tithymalus etiam in Tergestino litore non longè à Timaio fonte , in saxosis quibusdam rupibus arborecens . Theophrasto tria tantum Tithymalorum genera produntur libro IX . cap . XII . de historia plantarum , ubi ita scriptum reliquit . Lactariarum ( sic enim tithymalum uertit Theodorus ) quod maritimum granum appellant , folio est rotundo , caule , totaq; magnitudine ad palmum , fructu candido . Demetitur , cum uua nigrescere incipit : & siccatus fructus tritus potui datur acetabuli tertia parte . Nascula autem uocitata oleæ folio constat , & magnitudine cubitum æquat . Huius lac , cum uindemia incipit , exprimunt , & præparato utuntur : purgat inferius . Myrtaria uerò cognominata , candida lactaria est , folijs myrti condita , uerum aculeatis parte postrema : sarmentula in terram demittens , longitudine palmi , quæ non simul , sed alternatis annis fructificant , alia hoc anno , alia postero , quanquam omnia eadem radice exorta . Loca montuosa desiderat . Fructus uux appellatur . demetitur , cum hordeum turgescit , & exiccatus , purgatusq; datur clotus cum papaueris nigri duabus partibus , ita ut totū modo acetabuli sit : trahit pituitam per aluum . At uerò si nucè ipsam placeat dare , trita dabitur ex uino dulci , aut cum sesama tosta , torrefactaq; comedenda . hætenus Theophrastus . Tithymali omnes , Mesue auctore in suis simplicibus deiectionis facultatis , cordi , iecinori , & uentriculo maxime officijunt : uasa disrumpunt , intestina abradunt , uniuersum excalfaciunt corpus , adeo ut inde febres faciliè conuulentur . Tollitur prima tithymali noxa ijs admistis , quæ cor , iecur , & uentriculum roborant . Secunda uerò , & tertia ijs , quæ agglutinaria facultate pollent . cuiusmodi sunt tragacanthæ lacryma , gummi , bdellium , psyllij seminis spissamentum , & portulacæ succus . Tollitur & quarta , admistis frigidis , & humidis : proinde aut fonschi succo , aut intubi aut portulacæ , aut hortensis solani , aut aceto cum cydoniorum semiuibis diutius rudicula agitato , commiscet . Vulgaris usus Tithymalus pituitam uehementer deiecit , & atrū quem uocant succum , pariterq; pituitas ad articulos decurrentes . Aquam inter cutem ualidissime extrahit : nihilo secius exiccatur uniuersum corpus , & geniturā extinguit . Vnde rusticorum medicamenti nomen sibi meritò asciuit . Tithymali omnes generis uires commemorat Galenus lib . VII . simplicium medicamentorum , sic inquit . Tithymali omnes uincentem habent acrem , calidamq; facultatem , inest uerò & amaritas . Validissimus itaq; est eorum liquor . Secundum locum tenent semen , & folia . Sed & radix dictarum facultatem particeps est , sed non ex æquo . Sanè ipsa cum aceto decocta dolores dentium sanat , maxime qui illis erosis proueniunt . At liquores , ut qui ualentiores uin habeant , in foramina quidem ipsa dentium induntur : ceterum si aliam corporis partem contigerint , continuo adurunt , ulcerantq; ; proinde foris illis cera circumlinitur . quippe cum ex quarto sint excalfacientium ordine , quem esse adurentium posuimus . Sic pilos quoq; succus inunctus tollit . Porro cum uehementior sit , oleo miscetur : & si id sape fiat , tandem prorsum pilorum radices adustæ extirpantur , corpusq; depile reddetur . Eadem facultate uerrucas , quas acrochordonas nominant , & myrmecias , & pterygia , siue oculorum ungues , & thymos auferunt , detergentque lichenas & pforas , quia scilicet & abstergendi facultas inest propter amaritudinem . Præterea ulcerum phagedenica , anthracode , & gangrenode , quia ualenter tum excalfaciunt , tum extergunt , si in tempore , & moderatè utare , iuuare aliquando potuerunt . Vc-

Tithymali  
cogniti.Tithymalo  
rum historia  
ex Theophras-  
to .Tithymalo  
rum uires ex  
Mesue .Tithymala  
rum uires ex  
Galeno .




rum enim uero, & fistularum callos eximunt eadem facultate. Ceterum hæc omnia genere quidem similiter, imbecillius tamen & folia, & fructus præstare possunt. Quibus sane & ad pisces in aqua stagnali capiendos uti assolent. Celerrimè uanq; ab illis in uertiginem acti, ac semimortui redditi, ad aquæ superficiem feruntur. Porro cum septem sint eorum genera, ualentissimus est quem characiam nominant, quem utiq; etiam quidam marem cognominant, & fœmina uincupata myrsinites, & qui in petris nascitur ad modum arboris: deinceps qui uerbasco adsimilis est, & cyparissias: deinde paralius, siue marinus: denique helioscopius. Proportione uerò comprehensæ illorum facilitatis et cinis, & ex ipso lixiuium erit. In uniuersum planta Græcis τιβυμάλος, Latinis quoq; Tithymalus nominatur: Arabibus, Xauser, & Ethuba: Italis, Tithimalo: Germanis, Vuolffs milch: Hispanis, Leche trefusa, & Leche tregua: Gallis, Herbe à laich.

Nomina.

## Pityusa.

## Cap. CLX.



Pityusæ consideratio.

PITYVSAM specie à cyparissia differre constat, et tithymalorum generi assignetur. Caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus: folijs piceæ, acutis, exilibus: flore paruo, uelut purpureo: semine instar lenticulæ: lato: radice crassâ, candida, succo referta. quibusdam in locis frutex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per aluum radix drachmis duabus data in aqua mulla: item seminis drachma. Succum cum farina subacti cochlearium in catapotio datur. modus foliorum drachmæ tres.

PITYVSA, ut latius præcedenti capite retulimus, et nimirum fuerit planta, quam officinæ Esulam maiore nominant. Huius radices herbarij, qui quotannis è Gargano Apulie monte succos, & alias radices ad nos comportant, magna impostura pro Turpeto uendunt, quemadmodum & thapsiæ radices pro eodem subijciunt, ut superius in tripolijs mentione diximus. Quod cum sua ætate non ignorasset Actuarius, album turpetum Alypiæ esse radicem prodidit, nigrum uerò Pityusæ. Nec his obstitit, quod dixerit Dioscorides, Pityusæ radicem subesse candidam: nam is de interiore substantia tantum intellexit, non autem de exteriori corticis membranula, quæ uiridis rufescit, siccata nigrescit. Porro quod Esula maior sit Mauritanis alsebram, uel sebram, satis liquido ex Serapione colligi potest, ut pote qui integrum de Pityusa caput ex Dioscoride sumpsit, & in suum Scebram reposuit. Quo fit, ut planè falli putem Brasauolum, quippe qui cetero sibi persuadet, Alsebram maius Mauritanis esse tithymalum platyphyllon. Nicolaus Myrepsicus quibusdam in antidotis, & catapotijs aluum soluētibus Esulam imponit cognomine chamæ-

Fuchsij opinio reprobata.

pityn. Vnde Fuchsius in suis doctissimis adnotationibus nil aliud esulam Nicolao referre scribit, quam Chamæpityn, non autem tithymali speciem. Qua in re Fuchsij opinio (pace eius dixerim) mihi non planè satisfacit. Nam cum plura sint tithymalorum genera, quæ in uniuersum Esulæ nomine appellantur, de ea tantum intellexisse Nicolaum existimo, quam Dioscorides à foliorum forma Pityusam uocat, eo quod pini, uel piceæ arboris folio constet: quæ ob id esula chamæpitys differentie causa Nicolao appellata est. Paruam enim pinum pityusa representat: quare non ab re esula quoque chamæpitys cognominari potuit. Pityusa in Italia passim ferè prouenit, facie minoris esulæ, sed longè in omnibus maior, adeo ut quibusdam in regionibus, ut in Apulia, arbusci speciem referat. Visitur copiosa in Veronensi agro, ea immensa plantitie, per quam ad Benacum transitur. Sed quod aridissimum ibi sit solum, non admodum adolefcit. Hæc (ut Mesues est auctor) agrestium hominum medicamentum est: multa enim sumentibus adfert incommoda. proinde eius usus apud medicos peritos prorsus exoleuit, quemadmodum, & turpeti ex huiusce radicibus parati, postquam detecta est impostorum fraus: etsi non desunt improbi pharmacopole, qui pityusæ radices legitimi turpeti uice suis inferant medicamentis: sintq; etiam circumforanei, qui harum radicum puluere plures ingulcent rusticos, quam sanent. Adscribunt quidam Pityusam tithymalorum generibus, quoniam & ipsa similiter laetum succomadeat, purgetq; eorum modo. Id quod Galenus apertè testatur lib. viii. simplicium medicamentorum: dum sic inquit. Pityusa, & hanc quidam speciem putant esse tithymali, quod succum habeat, ut illi, quodq; similiter illis purget, ceteraq; omnia uiribus illis est adsimilis. Ea Græcè πύρσος, Latine item Pityusa uocatur: Arabicè, Scebram, & Pthias: officinis, Esula maior: Italis, Pityusa, & Esula maggiore.

Pityusæ uires ex Galeno. Nomina.




## Lathyris.

## Cap. CLXI.



P.EPLVS.



**LATHYRIS**, quam aliqui tithymalum appellant, eamque tithymalorum numero adscribunt, caulem emittit cubiti altitudine, & digitali crassitudine, inanem. gignuntur in cacumine alæ, & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & lauiora: quæ autem in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, aristolochiæ, aut oblongæ hederæ figura. In cacumine fructum summis surculis gerit, triplici loculamento insignem, rotundum, ceu capparin, in quo grana, intercurfantibus membranis, inter se distincta continentur, eruis maiora, rotunda: quæ dum corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radicis vsus. totus frutex lacteo succo turget, uti tithymalus. Grana sex, aut septem in catapotio, aut cum ficis, aut palmulis deuorata aluum purgant: sed aqua frigida postea sorbenda. trahunt autem bilem, pituitam, & aquas. Succus, tithymali modo exceptus, eundem effectum præbet. Cum gallinaceo, aut oleribus folia decoquantur ad eisdem effectus.

**LATHYRIN** officinæ Cataputiam appellant. Planta est uulgaris notitia. Hæc in Hetruria siquætiissima nascitur. Apud Insuæres, quod aluum ualenter euacuet, uomitionesque eliciat, catapuzza uulgo nominatur. Iisdem pollet facultatibus, quibus et ricius, iisdem quoque medicamentis infusetur. Huius plantæ meminit Actuarius in suo libro de compositione medicamentorum, ubi ita scribit. Lathyris uehementer pituitam purgat. Dantur grana eius maiora, quindecim: minora uero uiginti. Iis qui efficacius purgari cupiunt, mandenda præcipito: ijs uero, qui deiectionem non desiderant copiosam, iubendum est, ut integra deuorent, præsertim si qui sumit, malo fuerit stomacho. hæc Actuarius. Lathyris uires descripsit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Lathyris, sunt qui dicant & hanc esse tithymali speciem, tum quod similiter illis succum habeat, tum quod eodem illis modo purget, totaque illis facultate similis sit. nisi quod semen gustatibus uideatur dulce: quod sanè etiam maxime purgatoriæ uim obtinet. Quæ planta Lathyris Græcis, Lathyris item Latinis dicitur: Arabibus, Mendana, seu Mahendane: Italis Lathiri, & Cataputia minore: Germanis, Spring kraut, Spring, koerner, & Tereib koerner: Hispanis, Tartago: Gallis, Espurge.

Lathyris consideratio.

Lathyris uires ex Gal.

Nomina.

## Peplus.

## Cap. CLXII.

**PEPLUS** frutex est lactei succi plenus, folijs paruis ut rutæ, paulò latioribus: rotunda coma, fere dodrantalli, humi resperfa: semine sub folijs paruo, rotundo, minore quàm candidi papaueris. pluribus scatet auxilijs. Vnicam radicem habet, superuacua, ex qua fruticat: nascitur inter uites, & in hortis. Colligitur messibus, ficcatur in umbra, & continuè versatur. Fructus tusus, & feruefactus reconditur. Bilis, ac pituita detrahatur acetabulo eius in hydromelitis cyatho poto. Obsonijs insperfa conturbat aluum. muria conditur.

## Peplis.

## Cap. CLXIII.

**PEPLIS**, quam aliqui syluestrem portulacam vocant, Hippocrates peplion, in maritimis maxime nascitur, latè opaco frutice, candidi succi pleno: folijs satiuæ portulacæ, rotundis, infernè rudentibus. semine sub folijs



lijs rotundo, vti in peplo, feruente gustu: radice singulari, superuacua, tenui. Colligi, & reponi, ac dari, vti peplos, & sale condiri solet. Eadem habet vires.

Pepli, & peplidis cōsid.

Vires utriusque ex Gal.

Nomina.

PEPLVM herbariorum vulgus, quod orbiculata constet coma, Esula rotundam uocat. Prouenit non modo in uinetis, sed etiam in agris cultura destitutis, lacteo succo prægnaus. Peplida uero, quæ Peplion dicitur, in maritimis nascentem, non prius quam hoc anno euulsam uidimus. Sed nobis non licuit hoc tempore eius effigiem pictam exhibere: tamen, Deo concedente, aliquando dabitur. Vtriusque vires reddidit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, ubi primum de Peplo ita scribit. Peplos, quidam uero papauer spumeum, & hic frutex paruum succum habet similem tithymalis, cum in alijs, tum quia purgat, cum illi. Mox de Peplio idem Galenus hæc uerba subiunxit. Peplium, & hic quoque frutex exiguus succum obtinet, sicut tithymali: nasciturque plerumque ad mare, radicem habens inutilem, ut & peplos: succum uero ualidum, non tamen admodum utilem. Sed semen utile est, & fistulosum, similiter semini pepli purgans. Quæ planta πεπλος Græcè, Peplus etiam Latine uocatur: officinis & uulgo, Esula rotunda. Quæ uero πεπλῖς Græcè, Peplis quoque & Peplium Latine dicitur.

### Chamæfyce.

### Cap. CLXIII.

CHAMÆSYCEN aliqui sycen nominant. Ramos emittit quaternum digitorum, teretes, succosos, in terram deiectiones: folia lentis, parua, peplum planè referentia, tenuia, quæ à terra non attolluntur: semine sub folijs rotundo, ut in peplo: neque caulem, neque florem promit: radice firmatur tenui, superuacanea. Rami ex vino triti vuluæ dolores sedant, in pecto appositi: tollunt tumores, ac verrucas omnium generum illiti. Decoctorum cibo alius resoluitur. Succus simili effectu prodest. Illitus contra scorpionis ictus auxiliatur: aduersus caligines oculorum utilis, & hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle inunctus. In squalidis, petrosisque nascitur.

Chamæfyces consider.

Chamæfyces vires ex Gal.

Nomina.

NASCITVR Chamæfyce, quemaduodum & peplus, in uineis, petrosis, & squalidis monticulis. Hæc, ut ex totius plantæ descriptione colligi potest, in pepli genere enumeranda uidetur: quippe quæ ramulis exeat humi perpetuo sparsis, lacteo succo refertis: foliolis, & coma peplo similibus. Hinc itaque quispiam fortè non aberraret, si censeret Chamæsyce esse minorem peplum: ego tamen id planè asserere non ausim. Chamæfyces vires tradidit Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum, his uerbis. Chamæfyce abstergerendi simul & acrem uim possidet. Itaque quæ acrochordonas, & myrmecias caules eius teneriores in modum cataplasmatibus admoti, & ex eis liquor auferunt. Cum melle uero crassas oculorum cicatrices detergunt. sed & hebetudinem uisus à crassitie natam adiuvant, sicut sanè & suffusionum principia. Χαμαίσυκς sic Græcè, ut Chamæfyce pariter Latine uocatur.

### Scammonia.

### Cap. CLXV.

SCAMMONIA ramos ab una radice emittit trium cubitorum, multos, pingues, & qui nonnihil crassitudinis præ se ferant: folijs helxinæ, aut hederaceis, mollioribus tamen, hirsutis, & triangularibus: flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graueolente: radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus. Capite exempto, radix in testudinis speciem cultro excuatur: quo fit, ut in cauum confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fodiunt, in quos subiectis iuglandium folijs, profundunt succum, siccatumque exrahunt. Laudatur autem Scammonium leue, nitidum, rarum, & colore quàm simillimum taurino glutini: fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asie deportatur. Nec attendere solum par est, si linguæ tactu albescat (hoc enim euenit adulterato, quod admisto sit tithymali lacte) sed longè magis, antea narratis, item si non uehementer linguam exurat, id quod misti tithymali argumentum est. Natione autem Syriacum, & Iudaicum deterrima habentur, graua, densa, erui farina, & tithymalo yitiata. Succus drachmæ vnius, aut quaternum obolorum pondere haustus ex aqua pura, uel mulsæ, per inferna bilem, & pituitam extrahit. Ad resolucendam aluum binos obolos cum scama, aliòve semine sumpsisse satis est. Dantur efficacioris purgationis causa, succi tres oboli, cum duobus ueratri nigri, & aloes drachma una. Fiunt purgatorii sales, drachmis uiginti succi scammonie in senos salis cyathos adiectis. Horum modus proportione uirium: integer quidem, tria cochlearia: medius, duo: minimus, unum. Radicis drachma una, aut altera purgat cum ijs, quæ retulimus. Nonnulli decoctum radicis ebibunt. Coquitur in aceto, & cum hordeacea farina teritur, cataplasmate ischiadicis utili. Partus enecat succus, vuluæ in lana subditus: tubercula discutit cum melle, aut oleo illitus: decocto in aceto perunctæ lepræ abiguntur: diuturni capitis dolores ex aceto, & rosaceo perfunduntur.

Scammonie, eiusque succi consider.

SCAMMONIVM, quod est Scammonie succus, copiosum quidem in Italian aduehitur, præsertim Venetiæ, quò ex Alexandria Aegypti, & Syria importatur: sed quod probatissimum sit, rarum admodum inuenitur. Siquidem quod omnibus ijs notis, ac dotibus præditum sit, quas optimo tribuit Dioscorides, hæcenus nunquam, ut inge-



nuc̄ fatar, sum consecutus. Nec mirum mihi quidem uidetur, cum id, quod à mercatoribus ad nos deferretur, Syria cum plurimum sit, & Iudaicum, compactum, densum, graue, & erui fortasse farina, tithymali lacte, alijsq; imposturis uitiatum, & illud denique, quod ut omnium deterrimum, Dioscoridi improbatum. Verum hoc parum expeditis plerique pharmacopole, illud præstantissimum Scammonium existimant, quod linguae salua madentis contactu, facile, consistimq; albescit. In quo Dioscoridis doctrinam hi negligere manifestè deprehenduntur: quandoquidem ipsius Dioscoridis admonitio est, ut non solum illi experimento fidere conueniat, sed etiam alijs, certioribusq;: id namque euenit adulterato quoque lactis tithymali admistione. Quamobrem medici, qui Christianam religionem, ac pietatem colunt, si probe, sancteq; artem medicam exercere cupiunt, pro uiribus suos quisque pharmacopolas moneat, inretq; ut laudatissimum querant, habeantq; scammonium. Nam cum hoc medicamentum omnium ferè electariorum, catapotiorumq;, quorum passim est usus ad humores in morbis deiciendos, sit basis, qui ijs adulteratum immiscet, nulli dubium est, quin pessima, & plerunque exitiosa conficiantur medicamenta. quo certe nihil detestabilius, nihilq; execrabilius esse potest. Sed caueant seplasiarij, & peritorum admonitus libenter audiant: aliàs enim sciant, errorum perniciosorum, quos sepe committunt, tandem meritis poenas luent. Quod autem scammonium illud, quo omnes ferè officinae refertæ sunt, tithymali succo sit uitiatum, hinc liquidò patere arbitror, quod decem, uel quindecim eius grana aluum pluries resoluunt, cum synceri drachma, Dioscoridis testimonio, id uix præstare possit. Plantam, & cuius radice scammonium colligitur, uidimus primum Neapoli, allatam (ut quidam seplasiarius asserbat) ex Gargano Apulie monte, quæ omnibus notis, meo quidem iudicio, legitimam Scammoniam referebat. Sed profectò mirari nobis subit, quod Galenus in libris de simplicium medicamentorum facultatibus, nihil de Scammonij uiribus meminerit, cum tamen pleraque alia scriptis tradiderit longè etiam minoris momenti, atque aliàs sæpius obiter Scammonij mentionem fecerit in suis alijs monumentis. Scammonium, auctore Mesue in suis simplicibus deiectionijs, quinque corporibus læsiones inferre potest. Prima est, quod flatus quosdam mordaces gignit, usque adeò uentriculum lacescentes, ut sumentibus nauseam commoueat. Noxa hæc tollitur, si in excavato cydonio malo, clibano, aut prunis infusetur, pasta undiq; circumlita, præsertim additis, aut foeniculi, aut dauci, aut apij semine, aut galanga. Inflammatur deinde acedinis exuperantia corporis spiritus: quo fit, ut facile febres excitet, ijs præcipue, qui obstructionibus uiscerum, & humoribus putrescentibus obnoxij sunt. Sed id nocuenti aufertur, admistis inter coquendum, quæ refrigerant, & feruorem extinguunt: cuiusmodi est psyllij seminis spissamentum, prunorum decoctum, sed potius pulpa, rosarum & uiolarum succus, aut dilutum, aut aqua: quinetiam si ante coctionem maceretur oleo rosaceo, aut uioleæ, aut cotoneorum misti saporis succo, aut admisto rhoe, aut castitio spodio. Ad hæc quod magna tum attrahendum aperiendi facultate sit præditum, immoderatas alui fluxiones facit: uasorum enim oscula plusquam par sit aperit. Hæc læsio adimitur admistis rebus adstringentibus, cohibentibusq;, nempe mastiche, cydonijs malis, succoq; ab eis expresso & myrobalanis, præsertim flauis. Abradit præterea acri succo, quo scatet, intestina: proinde & tormina, & dysenteriam, & tenasnum excitat. Sed deletur hoc incommodum, additis humidis, pinguibus, lentisq; medicamentis: cuiusmodi sunt, tragacantha lacryma, bdellium, amygdalinum oleum, aut rosaceum: item prunorum pulpa per se, & saccharo asseruata, psyllij spissamentum, mastiche, cydonia mala post sumpta, & calida aqua post bibita: utpote quæ medicamentum ocys à uentriculo & intestinis expellant, & ita simul noxam prohibeant. Hinc est, quod prudentes medici, quò celerius Scammonium à uentriculo, & intestinis deiciant, hordei iuseulum, cum saccharo superbibendum præbent. Obest postremo scammonium cordi, iecori, ac uentriculo, substantiæ suæ totius proprietate. Vitium hoc aboletur, si illi tum calida, tum frigida admisceantur medicamenta, quæ cordi, iecori, uentriculoque opem suam præstant. Deicit scammonium ualentissimè bilem, quam & à uasis, et à sanguine exhaurit. Eius deiciendi facultas haud sanè alijs medicamentis absimilis est, quæ purgant cum labore & molestia. Planta Græcis *καμμωνία*, Latiniis item Scammonia uocatur: Arabibus, Scammonia, siue Sachmunia: Italis, Scammonia.

Scammonij  
læsiones.

Nomina.

## Chamelæa.

## Cap. CLXVI.

CHAMELÆA furculosa fruticat, ramis dodrantalibus: folia oleæ similitudinem habent, tenuiora, & amara, quæ gustata linguam mordent, & arteriam deradunt. Detrahit pituitam bilenique, folijs præsertim in catapotio deuoratis. nanque duæ absinthij partes, adiecta chamelæa una, hydromelle excipiuntur, & in catapotia coguntur. ea autem in uentre non liquecunt: siquidem quotquot fuere deuorata, regeruntur. Folijs cum melle tritis, sordida ulcera, & crustosa repurgantur.

## Thymelæa.


## Cap. CLXVII.

THYMELÆA est, ex qua granum Gnidium, quod est semen ipsius, colligitur. Hoc Syriacum uocant, quoniam satiui lini frutex suapte natura similitudinem referat. Virgas edit pulchras, multas, tenues, binum cubitorum: folijs chamelæa, angustioribus, & pinguioribus, uiscosis, gummosisque, si mordcantur: flore candido: fructu myrti in modum rotundo, qui inter initia uiuret, & tandem rubescit: inuolucrum fructus durum, foris nigrum, intus album. Hoc per interna bilem, pituitam, aquasque detrahit, si uiginti granorum pars interna bibatur: verum fauces adurit. Itaque cum farina, aut polenta, aut in uia acino dari debet, aut melle cocto obductum deuorari. Qui ægrè defudant, trito semine cum nitro, & aceto inunguntur. Folia, quæ peculiariter cneorum appellantur, per messes colligi debent, & siccata in umbra recondi. Quibus dare libeat, antea tundere,



tundere, & nervos eximere conuenit. Illitum acetabuli modo cum diluta uini potione, aquam extrahit: mediocrius purgat, addita lente cocta, aut contritis oleribus. Thymelææ farina vix acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho infesta, partus imposita necat. Nasctur in montibus, & asperis. Hallucinantur, qui coccon Cnidium fructum esse chamelææ existimant, decepti quadam foliorum similitudine.

CHAMELAEÆ.



THYMELEÆ.



Chamelææ,  
& Thymelææ  
confid.

CHAMELAEAM, pariter & Thymelæam Arabes confusè satis, ac perplexè Mezereon appellant. Cuius etsi duo faciant genera, unum album, alterum nigrum; tamen ijs etiam Daphnoidem admiscunt, & hæc omnia adeò confundunt, & implicunt, ut hac in re nihil certi, nihilq; perpetui ac tuti ex eorum scriptis elici possit. Illarum plantarum uis in exoluendo corporis humores, tam uehemens, uiolenta, ac furiosa existit, ut nisi robustissimis hominibus tuto in medicamentum dari possint: plerunq; enim imbecilles confecerunt, abrais uisceribus, apertisq; uiscerum osculis. Quare non temerè eas Mauritanii & terræ leones, & plantas uidiuicias cognominarunt. Proueniunt hæc plantæ numerosæ in uallis Anauia montibus Tridentino agro: & utræq; (licet hoc in chamelæa præterierit Dioscorides) fructum ferunt myrti baccis similem, quanuis Chamelææ quadratenus longior sit, & oliuæ formam repræsentet. Vtrique fructus initio sui exortus uirescit, mox per maturitatem rubescit, denique exiccatus niger conspicietur. Ceterum baccam, quæ è Thymelæa decerpitur, quoniam siccata piperis faciem præ se ferat, acrimoniâq; non obscuram gustantibus relinquat, rura Auaniensis, unâ etiam cûn Laureolæ semine, Piper montanum indifferenter nominant. Nec sanè mirum, quandoquidem & Theophrastus libro IX. cap. XXI. de plantarum historia, ubi de pipere disseruisset, statim Cnidij grani ineminit: utpote quod maxime piperis imagiuem referat, & admodum etiam acriter sentiat. Simul hoc piper (ut eorum nomine utar) frequenter incolæ in suis purgationibus aduersus omnes ferè morbos ita medicos, & pharmacopolas fallere credentes. Sed sæpe euenit, ut cûn futuram noxam non præuideant (quæ eorum multorum imperitia est) non solum seipsos decipiant; sed etiam sibi mortem consciscant. Et certè hoc testari possum, quod ex montani illius piperis assumptione plures periissent, nisi antidotis nostris succurrissem, eosq; in uita seruasssem. Proinde scitè posteritatis memoriæ prodidit Mesues, nemini Mezereon præbendum esse, nisi ijs admixtis antidotis, quibus eius deleteria facultas infrenari possit, quæ omnia corporis principalia membra corrumpit, ac destruit. Habentur tamen passim in pharmacopolijs catapotia, quæ de Mezereo appellant, quibus aliquando utuntur medici, ad aquam inter cutem extrahendam. Verum ea non audent exhibere (quanquam medicamenta simul receperint, quibus eorum malitia reprimatur) nisi robustis, ac fortioribus hominibus. Chamelæam tantum, quod sciam, commemorauit Galenus in simplicium medicamentorum censu, de cuius uiribus libro VII. eorundem ita scribit. Chamelæa uincentem habet qualitatem amarâ. Quamobrem admodum sordida ulcera, & quæ maximas habent crustas, cum

Chamelææ ui  
res ex Gal.



cum melle purgare potest. Quæ Græcis χαμελαία, Latinis quoque Chamelæa & oleastellum appellatur: Man. Nomina. ritanis, Mezerion, seu Almezzerion: Italis, Chamelæa: Germanis, Zylandt: Gallis, Boys gentil. Quæ uerò Græcè Συμελαία, Latine pariter Thymelæa uocatur: Italice, Thimelea.

## S A M B V C V S.



Sambucus.

## E B V L V S.



Cap. CLXVIII.

S A M B V C I duo genera. Vnum in arborem assurgit, surculos spargens arundinaceos, teretes, cauos, candicantes, proceros: folia iuglandis, terna quaternave, ex interuallis circa ramos exeunt, grania odore, minutim in ambitu secta: & in ramulorum cacuminibus, cauliculisque circinata vmbelle, quæ florem candidum pariunt: mox acinum terebintho similem, in nigredine subpurpureum, racemosum, succo madentem, uinosumque. Alterum genus chamæactæ uocatur, Romanis ebulum, longè humilius est, magisque herbaceo generi assignandum: caule quadrangulo, geniculato: folijs amygdalæ, ex interuallo longioribus geniculatim expansis, pinnatisque, graueolentibus, in ambitu ferratis: muscario Sambuci: flore, & acino eiusdem: radice nititur longa, crassitudine digitali. Eadem utriusque uis, & usus exiccans, aluo detrahens aquam, stomacho inutilis. Folia olerum more coquantur, ad pituitam; bilemque detrahendam. Caules teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix in uino decocta, & in cibis data, hydropicos adiuvat: prodest uiperarum morsibus, eodem pota modo. vuluas emollit insidentium, decocto: patefacit eorum spiracula: & uitia corrigit. Acini in uino poti, eodem funguntur munere: denigrant capillos illiti. Folia, si prætenera ac mollia ex lenta illinantur, inflammationem mitigant: ambustis, & canum morsibus illitu profunt: ulcera quæ dehiscunt in fistulam, agglutinant. ijs, qui podagra tentantur, cum seuo taurino, aut hircino profunt illita folia.

S A M B V C V S, & Ebulus plantæ sunt nullis non cognitæ. Prioris etsi unum tantum genus prodatur à Dioscoride; nobis tamen duo eius obseruata sunt genera: alterum quidem montanum, & sylvestre: alterum uerò urbanum, plerumque in hortorum, & uinearum sepibus proveniens. Hæc genera fructu inter se differunt: siquidem montano bacca perpetuò rubescunt. Illud etiam discrimen facit, quod urbanum in maiorem proceritatem adolescit, & leuiore constat materie. Sunt præterea: qui palustrem Sambucum ostendant, nempe arbusculam uliginoso, & palustri solo enascentem, uirgis sambuci æmulis, geniculatis, alba intus medulla, sed caduca, & fragili materie: folio utigineo: flore albo sambuci modo, odore non prorsus iniucundo: à quo bacca prodeunt rubentes, oxyacanthæ magnitudine,

Sambuci, & Ebuli genera & vires.



magnitudine, uinoso succo refertæ. quæ deuorata uomitiones cient. Aqua è sambuci floribus fronti, & syncipiti illita, capitis dolores mulcet, qui à calido humore prouenerint. Succus è radicis cortice expressus, uomitum ualentissimè commouet, & aquam inter cutem pellit. Præstat idem è radicibus ebuli extractus succus. Quin & crassam pituitam ad articulos decurrentem extrahit. Ebuli semen per diutinas aquæ lotiones à nigro circumstante succo expurgatum, datur utiliter drachmæ pondere ex chamæpityos decocto, podagricis, ischiadicis, & Gallica lue laborantibus: mulcet enim deiectionia uiriles eorum dolores, cum humores eo fluentes tum reuocet, tum deiciat. Sunt qui ex ebuli radicibus succum eliciant, insolentq; subinde, & in pastillos digerant, seruentq; ad usus. Hic clystere infusus tam intestinorum, quàm coxendicum dolores tollit à frigidityte, & flatu genitos. Supponitur conuenienter foeminarum locis ad euocandos menses, præsertim si lana exceptus intronittatur. Suffiuntur ebuli decocto commo-  
de ij, qui diuturna febre uexati ad malum deuenerunt habitum, si tamen uenterculus, & iecur interea roborentur  
odoratis adstringentibus, & ad id conferentibus medicamentis. Meminit Sambuci utriusque Galenus lib. vi. simp-  
plicium medicamentorum, sic inquit. Vtraq; sambucus tum magna illa, & arborecens, tum herbacea, quam  
chamæactem uocant, desiccandi, conglutinandi, modiceq; digerendi facultatem obtinent. Planta, quæ extra Græ-  
cis, Sambucus Latinis appellatur: Arabibus, Iafatti: Italis, Sambuco: Germanis, Holder, seu Holler: Hispanis,  
Sabugo, & Caninero: Gallis, Suseau, & Suer. Quæ uerò χαμαίχνη Græcè, Ebulus Latine dicitur: Ara-  
bicè, Kameactis: Germanicè, Attich, & Niderer holder: Hispanicè, Hiezguos, & Sabugo pequeimo: Gallicè,  
Hyble.

Sambuci utri-  
usq; vires ex  
Galeno.

Nomina.

### Pycnocomum.

### Cap. CLXIX.

PYCNOCOMON constat erucae folijs, acrioribus, scabris, & crassis: caule quadrangulo: flo-  
re ocimi: semine marrubij: radice nigra, aut pallida, rotunda, exigui mali figura, terram redolen-  
te. inuenitur in saxosis locis. Semen graui somnia, & tumultuosa facit, drachmæ instar potum.  
tumores discutit, illi tum cum polenta: & spicula, adactosque corpori aculeos extrahit. Folia illi-  
tu tubercula, panosque discutiunt. Radix eius in aqua mulla duum drachmarum pondere, aluum  
soluit, & bilem extrahit.

NULLAM equidem usquam plantam hætenus sum consecutus, quæ facie Pycnocomo responderet. Quare  
& hoc mihi, ut ingenue fatear, referendum est inter alias herbas, quas hodie omnibus incomptas esse arbitror.  
Ita enim fiet, ut & posteris, quos spero futuros rei herbariæ diligentiores inquisitores, suis relinquatur scribendi  
locus. Nec sanè quenquam pigere debet, cum ex his, quæ nobis uel incognita, uel incerta sunt, aliquid inuenierit,  
& compertum habuerit, ad communem utilitatem in medium proferre. Eam ut Græci πυκνόμον, ita Latini  
Pycnocomum uocant.

Nomina.

### Apios.

### Cap. CLXX.

APIOS ramulos duos siue tres iunceos spargit, ru-  
bros, tenues, qui à terra parum attolluntur: folijs rute,  
oblongioribus tamen, & angustioribus, herbaceis: se-  
mine paruo: radice hastulæ regie in formam pyri tur-  
binata, rotundiore tamen, succi fecunda, intus habet  
corpus candidum, extra cortices nigros. Superior pars  
eius uomitione bilem, pituitasque extrahit: inferior  
per aluum: tota utrinque purgationes mouet. Succum  
si libet eximere, tusa radix in fictili mergitur, & agitata  
aqua, quod supernatat penna selectum, exiccatur. Pur-  
gat utraque parte is succus, sesquiobolo potus.

APIOS, quæ & Ischas appellatur, nascitur in Creta (quæ  
quam non desunt qui uelint eam quoque prouenire in Italia, præ-  
sertim in Apulia) folijs exiguis, rutæ, uel hyperico proximis, pri-  
mo statim uere ab radice erumpentibus, nigrioribus tamen, alba  
quadam linea in longitudinè percurrente: cauliculis iunceis sub-  
rubentibus, lacteo succo madentibus: radice exterius nigra,  
interius cãdida, pyri effigie, unde & nomen: ἀπιος enim Græ-  
cis nil aliud significat, quàm Latini pyrum. Theophr. lib. ix.  
cap. x. de plant. historia, Apion his notis representauit. Ischas,  
siue Apios folio constat rutaceo, breui, caulibus ternis, aut qua-  
ternis humi prostratis: radice, quæ asphodelus, uerùm squamosa.  
Nascitur in montibus. Legitur uere. Datur ad expurgandum  
corpus, quod altera radice parte superius, altera inferius pur-  
get. hæc ex Theophrasto. Apion legitimam, quam primam me  
uidisse recorder, ad me misit Venetij Nicolaus à Sãcto Michaeli

Apij, siue I-  
schadis confi-  
deratio.





le Nouocomensi, medicus singularis ingenij, atq; eruditionis & rei herbarie peritus. Caterum scribit Ruellius Ruell. lapsus, Apion frequentissimam in Gallia nasci, eiusq; radice ruri pauperes per inopiam frugum vesci. Sed Ruellij sententia non esse subscribendum iudico: nam cum Apios per superna, & inferna purgationem molitur, male nimirum eos haberet, qui nulla huius facultatis habita ratione copiose (ut rustici facere solent) eius radices sumerent in cibis. Apij huius nusquam, quod inuenerim, mentionem fecit Galenus in simplicium medicamentorum censu. Hæc planta Nomina. non secus Latinis Apios, atque Græcis ἀπιον nominatur.

## Colocynthis.

## Cap. CLXXI.



COLOCYNTHIS sarmenta, foliaq; satui cucumeris emittit, per terram repentia, diuisa: fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratum, vehementer amarum. quem legere oportet, cum cœperit in pallidum colorem permutari. Medulla fructus purgatoriam vim habet, si quatuor oboli cum aqua mulsâ, melle cocto, myrrha, & nitro excipiantur, & cogantur in catapotium, Arefactæ pilæ teruntur, & infusæ clysteribus prosunt neruorum resolutioni, coxendicum doloribus, & coli uitij, vt quæ bilem, pituitam, & strigmenta, interdum etiam cruorem eliciant. fœtus admotæ enecant. Dentium dolorem tollit, si una repurgetur, & luto oblita cum aceto & nitro inferuescat, hocque iure decocti dentes colluantur. Si aqua mulsâ, aut passum in eadem incoquatur, & sub diuo refrigescat, potu crassum humorem, & strigmenta alui detrahet: stomacho supra modum aduersatur. subdita ex ea balneo alui excrementa eijciuntur. Virentis suc co vtilissimè ischiadici perfricantur.

COLOCYNTHIS planta est tam medicis, quàm seplarijs uulgaris notitiâ. Verùm etsi (ut Mesues est auctor) præstantissimum ex eius fructu paretur medicamentum ad uaria morborum genera; ea tamen cordi, iecinori, & uentriculo maxime aduersatur, quin & uniuersum perturbat corpus, fastidium, & intestinorum tormina excitans. Abradit enim intestina, & uasorum oscula aperit, adeo ut etiam cruenta sæpe eliciat. Hinc merito fit, ut eam dari prohibeant, nisi prius malefica eius uis prorsus aboleatur, ijs additis antidotis, quæ ad id præstant: cuiusmodi sunt illa, quæ uentriculû, iecur, & cor tum roborare, tû tueri possunt, & quæ lentore suo glutinandi uim habent. Colocynthis trahit pituitosa, crassâ, lentâq; corporis excrementa in reuolutoribus partibus delitescencia: proinde cerebrum, & ueruos expurgat, nec non etiam musculos, thoracem, & pulmonem. Eam ob causam uertiginosis, comitialibus, resolutis, conuulsis, hemicrania, diurnoq; capitis dolore efficitis, asthmaticis, & ægre spirantibus utiliter in catapotijs exhibetur. Collachrymantes adiuuat oculos, et diuina russi laborantes. Est præterea uis eius efficax ad omnes frigidos articulorum dolores, præsertim podagricos, & ischiadicos: ad quæ non modo in catapotijs deuoratur, sed etiam clysteribus infunditur. quibus sanè nil præstantius est ad coli cruciatu ex fluxu, & frigiditate prognatos. Pellit aquas tam bibita, quàm per sedem infusa. Fit & colocynthidis fructu oleum, ad retardandam canitiem, denigrandos capillos, & eorum destium cohibendum, si exempta è fructu pulpa, cavitatis oleo repleatur, & in cineribus decoquatur. Eodem mulcentur aurium dolores, & earum incerti sonitus discutiantur. Colocynthidis uires retulit Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum, his uerbis. Colocynthidis gustu amara est, sed quæ amarissimo medicamento epoto adsunt opera, ea euidenter efficere nequit, ob purgatoriam facultatem, quam ualidam in sese continet, nimirum cum ijs, quæ expurgat, antè & ipsa per aluum excerni præuertens. Viridis ipsius succus illius ischiadibus prodest. Κολοκυνθίς sic Græcis, Latinis item Colocynthidis, & Cucurbita syluestris appellatur: Arabibus, Chandel, Handel, seu Handal: Italis, & Hispanis, Colôquintida: Germanis, Coloquint, & Vuilder kurbisz: Gallis, Coloquinte, & Courle sauuage.

Colocynthidis confideratio.

Colocynthidis uires ex Galeno.

Nomina.

## Epithymum.

## Cap. CLXXII.

EPITHYMON flos est è thymo duriore saturæ similis. Capitula habet tenuia, & leuia: & in eis caudiculas, quasi capillamenta. Potum cum melle detrahit pituitam, bilemque atram per inferna. Priuatim prodest melancholicis, & inflatis, acetabuli mensura ad quatuor drachmas, cum melle, sale, & aceti exiguo. Plurimum in Cappadocia: & Pamphylia gignitur.



## EPITHYMV.

Epithymi cō  
sideratio.



Multorū opi  
nio reprob.

IN HAC equidem opinione uersantur complures huius  
etatis medici rei herbariae periti, quemadmodū Brasauolus Fere  
rariensis, ut credant, Dioscoridis, aliorumq; Græcorum Epithy  
mum in magno discrimine ab eo diuersum esse, de quo scrips  
erunt Mauritanii, præsertimq; ab illo, cuius meminit Mesues.  
Quippe qui asserant, nil aliud Arabicum epithymum esse, quam  
capillaris cassuthæ genus quoddam, quod thymo circumuolu  
tur. Græcum uerò idem esse uolunt cum proprio flore durioris  
thymi satureiæ similis. Suam autem sententiam hoc argumento  
comprobare uidentur, quod si uulgaris usus epithymum, Ara  
bicum scilicet, illud esset, de quo differit Dioscorides, is non di  
xisset, Epithymum florem esse durioris thymi, sed alterius plan  
tæ thymo adnascens, eiq; sese conuoluentis. Id quod etiam Pli  
nij auctoritate confirmant, ut qui eorum opinioni ex eo maxi  
mè adstipulari uideatur, quod duo Epithymi genera prodiderit  
lib. x. xvi. cap. viii. ubi sic inquit. Epithymum est flos è th  
ymo satureiæ simili. Differentia, quod l. ic herbaceus est, alterius  
thymi albus. Quidam aliter epithymum tradunt sine radice na  
sci, tenuis similitudine pallioli (rectius fortè pili legendū est)  
rubens. hæc Plinius. Ex quibus utique planum fit, duo esse E  
pithymi genera: quorum alterum illi ad Græcos, alterum ad  
Arabas referunt, & ita suam tuentur sententiam. Horum  
certè iudicio ego quoq; facile subscriberem, nisi quædam sese ho  
bis offerrent, quæ aperte reclamare uidentur, atque etiam ostens  
dere, Plinium ipsum Dioscoridis codicem, unde illa mutuatus est,  
deprauatum habuisse, uel alium auctorem in hoc minus grauem  
seculum fuisse, uel seipsum deceptum, ut in alijs compluribus illi  
euenisse adnotauimus. Palam etenim faciunt, quantum equidem  
reor, nostri usus, & Dioscoridis epithymum, unum & idem esse  
medicamentum, quæ de eo Actius, & Actuarius, Dioscoridem,  
et Galenum secuti, concordēs posteritatis memoria prodiderunt,  
cū ita scribunt. Epithymum atram bilem excernit. Datur adultis tusum, & cribro excussum, scrupulorū quatuor  
pondere, cum passo, uel oxymelite, & salis modico. Vitijs flauis turgentibus, & præcordiorum noxis opitulatur, &  
quibus iecur aggrauatur, & ijs, qui spirandi uexantur difficultate. Quod uerò in stœbe nascitur, aut in satureiæ pro  
filit, Epistœbe, atque Epithymum inde appellatum, thymi modo alium resoluit: sed utrunq; facultate censetur in  
firmius. hæc illi ambo. Quæ sanè liquidò ostendunt, quod non secus Epithymum thymbræ, & Epistœbe stœbe in  
nascatur, atq; Epithymum in thymo nascitur, uel profilit. Hoc idem præter Aetium, & Actuarium longè antea te  
status est grauius auctor Paulus Dioscoridis, & Galeni sectator acerrimus ijs uerbis. Epithymum inter ea, quæ  
atram bilem extrahunt, præstantissimum est remedium. Dantur ipsius drachmæ quinque leuigatæ ex lactis hœmæ.  
Epithymum uerò, quod thymbræ innascitur, epithymo similiter euacuat, sed imbecillius est. hæcenus Paulus. Ex  
his itaq; omnibus non dubitauerim asserere, unum tantum esse epithymum, non autem plura. Quandoquidem si Pau  
lus, Aetius, et Actuarius pro certo non habuissent legitimum Epithymum esse illud thymi florem, de quo scribit Dio  
scorides, putassentq; duo eius genera reperiri, nulli dubium est, quin & ipsi explicassent duplex in thymo nasci epi  
thymum. Verū cū conperit habere, unum & idem esse medicamentum capillamentumq; quod in thymo,  
thymbræ, & stœbe profilit, ijsq; nullo radice adminiculo conuoluitur, & implicatur, sibi usum est, quod suo tem  
pore Epithymum uulgaris notitiæ medicamentum esset. sat fore declarasse non modò id in thymo gigni; sed etiam in  
stœbe, thymbræ, & (ut nos sæpe uidimus) in polio, & chamædry. ut hinc scirent medici, in epithymi defectu, epithy  
mum, uel epistœbem substitui posse: quinetiam ut non ignorarent, id capillamentum harum plantarum propriam non  
esse partem, neq; suam habere sedem, sed ascititium quoddam esse exteriū adueniens, & in ijs profiliens, & uiuens.  
His igitur rationibus adducor ut nō temerè existimem, Dioscoridis codicem, quem Plinius habuit, fuisse (ut diximus)  
deprauatum, & ob id ipsum Plinium deceptum esse: aut hunc aliunde accepisse occasionem, ut duo magno errore su  
ceret Epithymi genera. Quod autem Dioscorides epithymum florem thymi dixerit, haud ineptè dictum putauerim:  
nam cū is sciret Epithymum thymo innasci, nulla radice propria, sed thymi adminiculo fultum, floresq; per se albos  
ferre, qui cū in thymo sunt, huius plantæ proprii uidentur; ideo non absurdum fore duxit scribere, Epithymum esse  
florem durioris thymi. Sed quod Epithymum flores albos ferat, declarasse uidetur Dioscorides, cū dicit. Capitū  
la habet tenuia, & leuia, caudiculas habentia capillorum modo. Siquidem his notis non descripsit Dioscorides thymi  
florem superius libro tertio (ut Brasauolus asserit) sed capitulis in cacumine, flore purpurascēte refertis, nulla  
caudicularum, neque capillorum habita mentione. Præterea conijcere licet Dioscoridem epithymum thymi florem  
appellasse, quod à thymo decerpatur eo duntaxat tempore, quo epithymum ipsum largè floret. Nam quod pro epi  
thymo non intellexerit is purpureum thymi florem, hinc perspicuò apparet: quoniam de epithymi uiribus libro i. i.  
ubi de thymo, & eius floribus egit, nihil in medium protulit, nimirum eam ob causam, quod epithymum propriam  
thymi



thymi particulam non existimauerit esse, sed ( ut suprà dictum est ) ascititium quoddam, ut in arboribus muscus, & uiscum: quæ tamen legitimæ arborum partes non sunt, sed uiribus & facultate diuersæ. His igitur rationibus, ut arbitror, ductus Dioscorides, egit de thymo, & eius floribus libro tertio inter odoratas plantas: de epithymo uero, tanquam de re à thymo diuersa, differuit in hoc libro quarto inter deiectoria medicamenta. Similiter de arboribus, quibus uiscum innascitur, disputauit libro primo: de ipso autem uisco libro tertio cum ijs medicamentis, quæ suo lentore glutinant. Adde quòd idem indicare uidetur nomen Græcum ἐρίδι, quod Latinis modò sub, modò in significat. Unde nil aliud nobis epithymum infert, quàm in thymo, uel sub thymo. Id quod flori thymi quomodo conuenire possit, non uideo: utpote qui non in thymo, neque sub thymo nascatur, sed super thymo, ea eminentiori parte, qua capitulo emergunt. His alia accedit ratio, quòd, cum scripserit Dioscorides Epithymum plurimum in Cappadocia, & Pamphylia gigni, facile colligi potest, ipsum de Epithymo uulgaris usus esse locutum. Quippe si epithymum proprii thymi florem esse duxisset, ei sanè opus non fuisset scribere, quòd magis ijs in locis epithymum copiosum proueniret, quàm alibi: quoniam scripsisse sat erat, oriri epithymum, ubicunque thymum proueniat, hoc argumento, quòd thymum ubicunque nascatur, æstate suos edat flores. Epithymum in thymo satureiæ simili nos sepius legimus prope Goritiam Saluatino, & Gargaro montibus supra Salicanum, qui eo durioris thymi genere copiose uestiuntur, sed cui epithymum insidet eo tantum tractu, qui ad meridiem spectat. Et si enim montes illi thymo omni ex parte secant, nusquam tamen thymi plantas mihi licuit inuenire, in quibus Epithymum spectaretur, nisi in amœniore montis parte, ubi herba enata austro perflatur. Quamobrem nil mirum esse debet, quòd in Pamphylia, & Cappadocia epithymum frequentissimum proueniat. Sed quoniam tot scio me frustra huc adduxisse argumenta, quibus meam firmam sententiam, nisi etiam Plinii auctoritati, quam titulus Brasauolus, clarius responderent: idcirco illi ita responsum uolo, quòd cum Plinius Dioscoridis mentem, à quo priorem suorum uerborum partem sumpsisse uidetur, non rectè perceperit, ideo non affirmatè, sed dubitè duo fecit Epithymi genera, & aliorum potius, quàm suam opinionem retulit, cum inquit. Epithymum est flos è thymo satureiæ simili. Differentia, quòd hic herbaceus est, alterius thymi albus. Quidam aliter epithymum tradunt sine radice nasci, tenuis similitudine pili, &c. Porro uero idem Plinius in ijs uerbis errasse deprehenditur, quòd maiori, duriori; thymo herbaceum florem, minori uero album reddiderit: cum tamen minoris flos purpureus sit, alterius autem modò candidus, modò in candido purpurascens. Hinc itaque perspicuum fit, tam confusè, & inconstanter de epithymo, & thymo tractasse Plinium, ut nihil certi in hac re ex eius uerbis elici possit. Ceterùm hallucinantur, mea quidem sententia, in Epithymi historia, etiam Monachi illi reuerendi, qui in Mesuem commentarios ediderunt: quippe qui Dioscoridis uerba perperam interpretati deprehendantur, etsi ut fortè alijs doctiores uiderentur, suam in Epithymo sententiam proferant ijs uerbis. Certissime à paucis uerus sensus uerborum Dioscoridis de epithymo percipitur. nam cum ipse Dioscorides dicat capitulo de epithymo, epithymum flos est è thymo satureiæ similis, non per hoc intelligit Epithymum, scilicet capillamentum thymi esse simile herbae satureiæ, sed asserit illud dictum capillamentum thymi esse simile capillamento satureiæ, scilicet thymbræ. quia etiam & supra thymbram generatur huiusmodi capillamentum, sicut supra thymum. hæc patet illi. In quibus facile cognoscitur horum inanis quædam iactantia, ne dicam, pace sua, ignorantia. quòd sensus uerborum obscuros, claros reddere profiteantur, atque ijs subinde, ut mihi uidetur, maiorem caliginem offundant. Quòd enim Dioscoridis sententia hoc loco euidentior sit, quàm ut exponi debeat, quòd; aperte Monachis refragatur, eius uerba testantur, quæ ita Græcè habent. Ἐρίδιμον δύμον ἐστὶν αἶθος τῶ σκληροτέρῃ καὶ δύμῃρα ἐοικέναι. hoc est ad uerbum. Epithymum thymi est flos durioris & satureiæ similis. His sanè uerbis liquet, quòd Dioscorides non comparat Epithymum, quòd florem thymi uocat, flori satureiæ, ut Monachi illi malè interpretantur, sed illud genitium ἐοικέναι ad thymum tantum refert: ita ut thymum, cui Epithymum insidet, satureiæ simile faciat. Thymi nanque duo habentur genera. Vnum maius satureiæ simile, in quo epithymum proflit. Alterum minus, tenuissimis folijs refertum, in quo nullum nascitur epithymum. Hoc certè non latebat Dioscoridè. quare ne quispiam fortasse putaret utriq; thymo epithymum innasci, id tantum in thymo duriori inueniri prodidit. Sed satis superq; de Epithymo disputatum est; iam medicinae reddenda est ratio, & de eius uiribus agendum. Illud sibi peculiare ascribit Epithymum (ut testatum reliquit Mesues in suis simplicibus) quòd ualentius cæteris medicamentis atram bilem excernit, idq; facile, & citra ullam molestiam præstat. Efficax est ad morbos cerebri, nempe melancholiam, epilepsiam, diuturnos capitis dolores, aliasq; atrabiliaras egritudines. Confert cordis tremoribus, & animi deliquijs. Præterea cunctis lienis affectibus mire opitulatur: item renum uitijs, & hypochondriaca melancholia uexatis. Frequens epithymi usus: datur enim utilissimè aduersus carcinomata, elephantiasin, & ulcera maligna, & atra. quin & quartana febre detentos liberat. Epithymi uires breuissimè perstrinxit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, sic inueniens. Epithymum thymi facultatè habet, ad omnia efficacius, exiecat, & excalfacit ordine tertio. hætenus Galenus. Verum quia Epithymum ob similitudinem mihi ad memoriam reuocauit CASSVTHAM ita à peritioribus medicis uocatam, licet officinis, & herbariorum uulgo Cuscuta nominetur, cian à ueteribus Græcis nihil, quòd consistet, de ea memorie proditum sit, hic locus poscere uidetur, ut de ea aliquid disseramus. Cuscuta igitur, siue Cassutha ejus generis est, ut in frutices, & herbas epithymi modo proflit, & uiuat earum adminiculo sulca, nulla radice nixa, sed uelut ab alarum sinu prodeuntibus cirris, capillamentisue longissimis. Hæc statim ab exortu plantarum ramulis se implicat, & adeo crebris inuolutionibus his se circumuoluit, ut breui plantas ipsas strangulet, atque enecet. Folijs nullis unquam uestita uisitur. Flores tamen edit albos, quàm plurimos, à quibus semen tenue prodit. Cirri nixi sunt, uittum capreolis crassitudine, & facie pares. Sunt qui putent, admirabile hoc plantæ genus Plinio Cassutham appellari libro xvi. capite ultimo, ubi ita scriptum reliquit. Est & in Siria herba, quæ uocatur Cassutha, non tantum arboribus, sed ipsi etiam spinis circunoluens sese. Nec plura Plinius. Ex quibus equidem, quòd repe-


Epithymum  
ubi plurimū.

Plinii lapsus.

Monachorū  
expositio uana.Epithymi vires  
ex Mesue  
& Galeno.Cassuthæ historia  
& vires.



## CASSUTHA.



ALYPVM.

Nomina.

Alypi confi-  
deratio.Opinio quo-  
rundam resu-  
tata.Alypi vires  
ex Paulo.

riantur Plinij codices, in quibus cadytas, non casytas legitur, quodq; hæc arboribus tantum, & spinis se circumuoluat, nostra uero Cassutha duntaxat herbas, & frutices, non arbores complectatur, & irretiat, non ausim affirmare uulgarem cuscutam esse Plinij casytam; præsertim cum in Syria tantum nasci scribat ipse Plinius. Credidere præterea plerique Cassuthæ eandem inesse facultatem, quæ & plantis inest, in quibus nascitur. Quorum utiq; sententiam potius probandâ, quam rescilendam censeo, argumento quod Epithymum iisdem, Galeni auctoritate, polleat uiribus, quibus & thymum. Excalfacit Cassutha ordine primo, siccâtq; secundo. Abstergit, et quadam cum adstrictione roborat. Iecoris obstructions aperit, infarcti lienis uitia expedit: uenas pituitosis, atq; biliosis exonerat humoribus: urinam pellit, & reo gio morbo subuenit. Puerorum febribus auxiliatur: sed diuturno usu uentriculum grauât, quæ tamen noxa tollitur, si anisi momentum adiciatur. Bilem deiecit, præsertim absinthio admista. In quem usum decoquitur, bibiturq; eius decocti selibra, cum sacchari sesquuncia. Quod Græci ἐπίθυμον, Latini quoq; Epithymum dicunt: Mauritani, Esitimo, seu Esichemo: Itali, Epithimo: Hispani, Cabellos, seu flores del thomilho: Galli, Teigne de thyn.

## Alypum. Cap. CLXXIII.

ALYPON surculosa herba est, subrubra: gracilibus ramulis: tenuibus folijs: flore molli, leui, & copioso: radice betæ, tenui, referta acri succo: semine epithymi. Gignitur in maritimis, maximè Libiæ, quàm largissima, quanquam alibi quoque plurima prouenit. Semen atram bilem deiecit, si mensura epithymo parâ cum sale, & aceto sumatur: verùm interanea leniter exulcerat.

ALYPVM, eiusq; radix (si Actuarius credimus) nil aliud sanè fuerit, quàm officinarum Turpetum, turbit Arabibus dictum, quod album uocant. Ipse enim suo de compositione medicamentorum libello, ubi minoris parandæ triphere rationem docet, sic inquit. Si hoc medicamento pituitæ deiectionem moliri instituis, alypum, id est, album turpetum addas. Idem post, ubi de simplicibus medicamentis uonitû cientibus tractauit, ita scribit. Turpetum, quod radix est pityusæ, & album alypie, paulatinosam detrahit pituitam. Verùm quia idem Actuarius, paulo antè Alypum describens, prodidit eius semen atram bilem per aluum ducere, putauere quidam Actuarius alypiam ab alypo differre, quòd huius seminis tantum uires reddiderit. Sed ijs respondi potest, quòd cum probè sciret Actuarius aliam uim inesse semini, aliam uerò radicibus, proinde de radicibus sub turpeti, quæ semine sub Alypi uonitue differuit. Plantæ enim habentur, quæ alium folijs, alium semine, alium radicibus effectum præbent. Mædium herba nobis exemplo erit, quæ, Dioscoridis testimonio, mensuræ sistit, cum tamen eius semen contrarium efficiat. Quamobrem facillè crediderim Alypum, & Alypiam nullis inter se notis dissidere: nec modò his rationibus fretus; sed etiam Pauli auctoritate. quippe qui libro VII. Alypum inter ea, quæ atram bilem depellunt, commemorauit ijs uerbis. Alypi semen inferius atram purgare bilem pari epithymo mensura, cum sale, & aceto dictum est: intestina uerò, si fidem Dioscoridi accommodamus, leniter exulcerat. Est autem, meo iudicio, quæ nunc Alypius uocatur, hæc Paulus. Ex quibus palàm est, Paulo nullam inter Alypi, & Alypiâ fieri differentiâ. Ceterum ad nos solam radicem differre, neq; ullum hæctenus qui plantâ, uel semen ostenderit, me nactum fuisse.



fuisse, antea prodideram in commentarijs nostris Italica lingua conscriptis. Verum hoc tempore Lucas Gbinus uir rei medica eruditissimus, Pisis herbam hanc pro Alypo ad uos misit, cuius hic picturam damus, quæ quidem descriptioni pulchrè quadrare deprehenditur. Alypi, quod legerim, non meminit Galeus in simplicium medicamentorum censu. Hic de Turpeti uiribus nobis differendum esset, nisi superius in Tripolij commentatione, eius historiam, ac facultates latius prosecuti essemus, quam ut adhuc plura dicenda, uel addenda supersint. Herba, quæ ἄλυπον Nomina. Græcè, Alypum quoq; & Alypia Latine dicitur: Italice, Alipo.

## Empetrum.

## Cap. CXXIIII.

EMPETROM aliqui phacoides uocant. nascitur in montibus, & maritimis, falso gustu: sed quò propius terreno fuerit, amarius sentitur. Trahit bilem, pituitam, & aquam, si bibatur in iure aliquo, aut hydromelite.

EMPETRI herba faciem nullis prorsus notis depinxit Dioscorides. Vnde solo nomine uobis de hac herba potius diuinandum esset, quam quòd aliquid certi, ac perpetui statui possit. Non desunt tamen qui Oedipum se faciant, & hæc Dioscoridis obscura quasi anigmata audeant soluere. His quidem Empetron eam planta putant esse, quam hodie Romani Fœniculum marinum appellant, alij uulgari sermone herba di san Piero. Sed hanc nos superius libro secundo legitimum esse erichnum pluribus probauimus. Porro & ubi nascatur Empetron, & quibus facultatibus sit præditum, Plinius quoq; tradidit lib. xxvii. cap. ix. ita ut ea plane à Dioscoride mutuatus deprehendatur. Verum in reddendis medicinis, nominis fortasse similitudine deceptus, quòd Empetron saxifragam esse existimauit, uires, quas utriq; seorsum tribuit Dioscorides, ipse uni Empetro assignauit, addens huic, quòd urinas ciet, & calculos frangat: quæ medicinae saxifragæ debentur. Quæ in re Plinium omnino errasse fatendum est. Empetri meminit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, ubi de eius uiribus in hunc modum differit. Empetron ad solas purgationes uidetur esse commodum, bilem, ac pituitam educens. Gustu falsum est: proinde ad alia quoq; utaris licet, ad quæ pollere ostendimus substantiam falsam. Nominatur item prasoides. Hæc Galenus. qui tamen à Dioscoride in nomenclatura discordat: quandoquidem alter Empetron phacoides à quibusdam uocari prodidit, alter uerò prasoides dici ait. Quare non deest suspicio, quin aut horum alter errauerit, aut alterius codex hoc in loco sit deprauatus. Non enim uideo, quomodo rectè idem Empetrou simile reddi possit, & lenti, & porro, ut illa nomina demonstrant. Quod Græci ἐμπετρον, Latini similiter Empetrum & Calcifragam nominant: Itali, Empetro.

Empetri confederatio.

Plinii error.

Empetri uires ex Gal.

## Vitis syluestris.

## Cap. CLXXV.

VITIS syluestris sarmenta uitis modo prælonga emittit, aspera, lignosa, rimoso cortice, folijs hortensis solani, longioribus, ac latioribus, muscoso flore, & capillacco: fructu exiguis uitis simili, post maturitatem rubente: rotunda est acinorum facies. Feruescens radix in aqua, & in cyathis duobus uini aqua marina diluti, pota, humorem alui ciet: ideo hydropicis datur. Vuæ eius uitia cutis in facie, & maculas omnes expurgant. Enascentes uiticulæ, cibi gratia, sale condiuntur.

VITIS syluestris planta est in Hetruria mulieribus notissima: utpote qua eius uuis, quibus lentigines, & maculas in facie emendant, plurimum utuntur. Hæc constat folijs hortensis solani, sed longioribus, ac latioribus: floribus racematim coherentibus (ita enim legendum censeo in Dioscoride, non muscosis, ut uulgata habent exemplaria, Oribasij testimonio fretus, qui hoc loco non ἰσχυρῶς, sed ἰσχυρῶς legit) capillaceis, purpureo colore: fructu exiguis uitis simili, rubente, ac uinoso. Illud porro nobis obstare potest, quò minus hæc sit uera Vitis syluestris, quòd etsi eius sarmenta, quibus uinifera uitis modo uicinas arbores scindit, ac uincit, quadantenus aspera uideantur; non tamen, ut in Dioscoridis codicibus scriptum reperitur, rimoso sunt cortice, sed albo. Huic obiectioni ita respondere possum, quòd ea non sit legitima huius plantæ nota. nam quòd uerbum illud φλοιόφραγος non legatur in Oribasio, facit ut suspicer in Dioscoride hoc loco medium ac uitium subesse. Hinc itaq; moneor, ut hæc pro syluestri uite nunc proferre non dubitem, donec alia nobis, aut alijs cõperta sit planta, quæ magis notis omnibus illi respondeat. Theophrastus uitem syluestrem Atragenā uocasse uidetur lib. v.

Vitis syluestris confid.





cap. ultimo de plantarum historia, ubi de somitibus ad ignem concipiendum egit. Antiqua enim ætas chalybem fortasse non experta, ex ligno duriore, & fungoso ignem parabat: ad quod, meo iudicio, sylvestris uitis materies admodum apta fuit. De huius uitis sylvestris uiribus scripsit Galenus lib. vi. simplicium medicam. his uerbis. Vitis agrestis racemi extergendi uim habent, ut ephelis, & uæuos, & id genus omnia in extrema cute existentia curare possint. Sed & adstrictionem quandam extrema germina obtinent, quæ & sale condiri assolent. Quæ uitis ἀμπελος ἀγρία Græcis, Vitis sylvestris Latinis uocatur: Vite saluatica, Italis.

Vitis sylvestris uires ex Galeno.  
Nomina.

## Vitis alba.

## Cap. CLXXVI.



multa potus. Ad psoras, & lepras semen efficaciter illinitur. Lactis abundantiam facit succus eius, si cum tritico decocto sorbeatur.

VITEM albam aliqui bryoniam uocant. Folij, uiticulis, pampinisque satiuam uitem imitatur, sed hirsutiora sunt omnia: ea, quos prope se nata sit frutices, suis clauiculis complectitur: fructus rubens in uua dependet, quo coria pilis spoliatur. Ex ea asparagi, qui prima germinatione exeunt, decocti in cibo, aluum, & urinam cient. Folia, fructus, radix acrem uim sortiuntur: itaque ulcerum phagedænis, gangrænis, chironiis, putrentium tibiarum tædio, efficaciter ex sale illinuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat: uitia cutis in facie, uarosq; lentiginis, & cicatrices nigras emendat, cum eruo, creta Chia, & sæno græco. Eodem effectu prodest decocta in oleo usque dum liquecat, sugillata tollit, & reduuias committit. inflammationes diffundit illita ex uino: suppurationes rumpit. medicamento aptè immiscetur, quod carnem exest: infracta ossa extrahit, trita, & impolita. Datur comitialibus in potu, drachmæ pondere, quotidie anno toto: prodest atonitis, & uertigine laborantibus, consimiliter assumpta. Contra uiperarum ictus pota drachmis duabus, auxiliatur: partus necat: mentem interdum subvertit. Fœminarum locis apposita partus, secundasque morantes trahit: cit urinam pota. Eclegma ex ea fit cum melle, difficile spirantibus, strangulatu oppressis, tussientibus, uulsi, ruptis, & laterum doloribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto triginta diebus, consumit: illinitur ad eadem cum fico. Ad muliebres quoque infessus decoquitur: siquidem uulvas purgat, sed abortum facit. Succus è radice uere exprimitur, qui trahit pituitam cum aqua

Vitis albæ cōsideratio, & uires.

VITIS alba officinis, & herbarijs Bryonia nominatur. Vulgò mulieribus Cucurbita sylvestris dicitur. Nota omnibus ferè planta est, quod passim secus uias, & propter sepes proueniat. Hanc inter sua deiectionaria medicamenta reposuit Mæsius, qui de ea hæc ad sensum scribit. Vitis sylvestris, quod hausta, quemadmodum & dracunculus, uentriculo, & iecinori noxam inferat, danda non est, nisi aromatum puluere permista, aut addito mastiche, cydonijs malis, aut alijs adstringentibus, roborantibusq; medicamentis. Succus è contrita radice expressus pituitam eicit, urinam remorantem trahit, cerebrum mundat, quinetiam pectus, & nervos à pituitosis, putridisq; excrementis: uiscerum obstructions aperit: renes à calculis expedit: subuenit item uertiginosis, comitialibusq;. Præstat opem mirificè tussientibus: & induratos tumores resoluit, præsertim lienis, si cum uiuo, & ficibus tusa radix illinatur. Menstrua elicit, & uniuersum purgat uterum, atq; etiam foetum expellit, si in eius decocto insideant fœmina. Succus fabarum, aut cicerum farina exceptus, maculas in facie, & uulnorum cicatrices emendat, linimenti modo adhibitus. Oleum excauatis eius radicibus inmissum, cineribusq; incoctum, sugillata delet. Præterea mulieres uulue strangulationibus obnoxias mirum in modum iuuat, adeo ut eas à strangulatu liberet, & sanet. Equidem noui mulierem quotidie ferè per annos hoc morbo uexatâ, quæ tandem à quodam uulgari herbario edocta, ut uinum albam biberet, in quo uitis albæ radicis uncia efferbuisse dormitum itura semel in hebdomada, cum hac medicina per annum usa fuisset, optimè ex illo morbo conualuit. Vitis albæ meminit Galenus libro vi. simplicium medicamentorum, de eius uiribus ita scribens. Vitis albæ, quam & Bryoniam, & Psilothrum uocant, prima quidem germina ab omnibus pro more in uere eduntur, utpote edulium stomacho, eo quod adstringat, gratum. Habent etiam subararam, & modice acrem adstrictionem: quare & urinam moderate cient. At radix & abstergentem, & desiccantem, & tenuium partium, ac moderatè calidam uim obtinet: quamobrem & lienem induratos liquat, tum epota, tum foris cum ficibus impolita: & psoram, & lepram sanat. Porro fructus eius racemi speciem præferens, ijs qui coria cin-

Vitis albæ uires ex Gal.



gunt, utilis est. *Planta hæc Græcis ἀμπελος λευκή, & βρυονία uocatur: Latinis, Vitis alba: Mauritanis, Nomina. Fesire, Alfeſtre, Feſſera ſine Alfeſcera, Nezargieſan, ſeu Nezarchaſen: Italis, Vite bianca, & Zucca ſaluatica: Germanis, Stickenurtz, & Teuſel kirchsz: Hiſpanis, Nuxa & Anorca: Gallis, Colubrine, & Couluree.*

## Vitis nigra.

## Cap. CLXXVII.



**NIGRA** uitis, quam aliqui nigram bryoniam uocant, folia fert hederæ, ſmilaceis proxima, ſed maiora: caules etiam cognatos: capreolis ſuis arbores, quaſi adminicula, comprehendit: fructus racematim coherent, qui inter principia uirent, & poſt maturitatem nigreſcunt: radix foris nigra, intus buxco colore nitet. Viticulæ, quæ primo germinum partu erumpunt, in olera recipiuntur. menſes pellunt, urinas cient, lienem abſumunt: uertiginofiſ, comitialibus, neruorû reſolutione tentatis proſunt. Radix eadem, quæ uitis alba præſtat, ſed inefficacius. Folia cum uino exulceratis iumentorum ceruicibus commodiſſimè illinuntur: luxatis itidem imponuntur.

**VITIS** nigra Hetrufciſ uulgò appellatur Tamaro, corrupto à tamaro uocabulo. Sunt enim qui hanc tannum, ſiue tannum etiam uocent, unde Latinis eius uua Taminiæ dicta eſt. Huius uiticulæ, quæ uere primùm è terra erumpunt, quòd aſparagi ſimiles ſint, eorum more decoctæ, hæc etiam tempeſtate manduntur, quæ uis non eam, quam aſparagi, cū palato incant gratiam. Frequentiſſima hæc in Hetruria prouenit, quin et in Goritienſi conitatu, ubi Martio & Aprili menſibus, eius cauliculi in faſciculos digeſti in foro ueneunt ad ciborum uſum. Huic tamen, quæ in Itatia naſcitur, illud tantùm obijci poſſe putauerim, quòd in uuarum colore ab illa diſidere inueniatur, quam Dioſcorides repræſentauit, quòd huic uua poſt maturitatem nigreſcant, noſtræ uerò perpetuò rubentes ſpectentur: cætera enim, meo quidem iudicio, inter ſe maximè conueniunt. Sed illud nihil me mouet, neque facit, ut mutare debeam ſententiam, & credere hanc aliam eſſe à Vite nigra, quòd ſæpe uiderim ſolanum hortenſe quibuſdā in locis uuas ferre modo

Vitis nigræ  
confid.

nigras, modò rubentes, modò croceas: quandoquidem natura plerumq; cum florum, & fructuum colore ludere ſoleat, ut in uuis, ceraſis, moris, ficubus, prunis, malis, & alijs cōpluribus perſpicuè cernitur. Idcirco nil mirum eſſe debet, ſi in Italia Vitis nigra rubētes uuas proſerat, alibi uerò nigras, ut in Græcia, Aſia, alijsq; calidioribus regionibus, quòd huiusmodi diſcrimina ſepenumero cœli, ac ſoli diuerſitate contingant. Hæc igitur ratione fretus, quæ, ni fallor, illā obiectionem diluit, non dubitauerim aſſerere, hanc plantam, cuius etiam hic effigiem pictam damus, eſſe uerā ac genuinam Vitē nigram, quoniam cæteræ omnes prorſus notæ illi adſtipulari deprehenduntur. Ceterum credidit Leonardus Fuchſius, medicus noſtræ ætatis celebris, eam ſtirpem eſſe legitimam Vitē nigram, quæ noſtris in Hetruria uulgò Vitalba dicitur, quamq; alteram eſſe Dioſcoridis clematidem ſuperius huius libri initio abunde oſtendimus. Verum hæc eius opinio nobis, pace ſua, planè reprobanda uidetur. Siquidem noſtra Vitalba non habet radicem ſoris nigram, intus buxco colore: non fert folia hederæ maiora, ſed potius minora, & per ambitum laciniata: nec ſemen edit in racemi modum, ſed ſimul compactum, nulla cum uuis ſimilitudine. Adde, quòd eadem ſua facultate exulcerat. Vitis uerò nigra exulceratis boum ceruicibus medetur, & luxatis ob adſtrigentem uim, quam habet, utiſſimè imponitur. Vitis nigra uires pauciſ perſtrinxit Galenus lib. vi. ſimplicium medicamentorum, ſic inquit. Vitis nigra: uocatur autem hæc propriè bryonia, uiti albe ad omnia ſimilis, niſi quòd imbecillior. haſtenus Galenus de uite nigra. Huius autem ſucco (ut eſt auctor Meſues) nibi ualentius ad ſtrumas ſanandas, ſi cum uini, & mellis æquali portione is hauriatur. Præſtat ad idem radix quoq; ſi tuſa, & melle excepta illinatur. Sed quoniam Vites tam alba, quàm nigra, de quibus hætenus dictum eſt, mihi in mentem eam herbam redegerunt, quæ aliquibus uulgò uocatur BALSAMINA, alijs Viticella, alijs Momordica, alijs Caranza, cum ueteribus nihil de ea poſteritatis memorie prodiſſet, ſitq; dotibus quàm plurimis non obſcuris prædita, hunc locum opportunum duximus, in quo huius herbæ hiſtoria pertractetur. Eſt itaque VITICELLA, ſiue BALSAMINA, planta, quæ prælongis, tenuibuſq; uiticulis, ultro citroq; reptantibus, proximas tum herbas, tum arbuſculas comprehendit: folijs uitis albe, aut uiniſe ſimilibus, ſed longè minoribus magiſq; per ambitum laciniatis: capreolis tenuibus ex alarum ſinu prodeuntibus quibus ſefe implicat appoſitis adminiculis. Florè promit cucumeri ſimilem, colore ſubluteum: fructum utrinq; turbinatum, oui ſerè faciem repræſentat, cute carnoſa, quibuſdā acutis bullis rigente, diſſaci modo. Huic maturo puniceus color, qui præterea facilè diſſilit ultimam maturitatem adeptus. Semen includit angurie uocata ſimile, minus tamen, contextum cute craſſa, pingui, lubrica, & perquam rubente. Planta hæc gracili nititur radice, nec ci-

Fuchſii opin.  
reprobata.

Viticellæ, ſiue  
Balsaminæ hiſ-  
toria.

tius




## BALSAMINA.

viticellæ no-  
cata vires.

Nomina.

FILIX MAS.



FILIX FOEMINA.



FILIX

tius fructum perficit, ac maturat, quàm aduentante autumno, Au-  
gusto, & Septembri mensibus. Nusquam nisi sata, quod sciam, in  
Italia provenit: pluribus autem in locis inibi plantatur, & nasci-  
tur. Folia vulnera recētia glutinant. Fructus exempto semine in-  
solantur diu in oleo omphacino, aut macerantur eodem oleo in bal-  
neo calentis aquæ, aut equino calente fimo; sitq; inde oleum præ-  
stantissimum ad arcendas vulnerū, manillarumq; inflammationes,  
doloresq; mulcendos. Valet idem ad exulceratos, inflammatosq;  
uteros si phloe iniectum. Doloribus hæmorrhoidum mirè auxilia-  
tur: in quem usum macerantur fructus (ut diximus) oleo amygdali-  
no dulci, aut è semine lini expresso, addita ad unamquāq; olei li-  
bram, liquide uernicis uncia. Medetur hoc ambustis tam igne,  
quàm aqua. Punctis, sauciatisq; nervis utiliter illinitur: quin &  
vulnorum cicatrices tum attenuat, tum etiam prorsus delet. Scri-  
bunt recentiorū quidam, steriles mulieres fecundas fieri, si à bal-  
neo medicamētis utero confrentibus parato, hoc oleo uteri oscu-  
lum sibi perunxerint, ac demum suis se iunxerint uiris. Ramicosi  
pueris efficax remedium est, si eo locus sæpius perungatur. Folio-  
ram pulvis (ut ij affirmant, qui periculum fecerunt) cochlearis mē-  
sura ex plantaginis, siue equiseti decocto, intestinorum vulnera sa-  
nat. Nec desunt qui eundem pulverem laudibus efferant, ad coli  
dolores, & intestinorum tormina. Porro illud hic prætereundū  
non est, ne forte huiusce plantæ nomina alicui imponāt, quod sunt  
qui Momordicam etiam appellant geranij genus quoddā, illud sci-  
licet, quod maiora inter cetera folia profert, malæ amplitudine,  
de quo libro tertio in Geranijs abunde differuimus. Quæ Viris  
nigra Latinis, ἀμαρὰν μέλαινα Græcis nominatur: Arabibus,  
Fesire sentanim, Fesiresim, Alsiresim, siue Faserfin: Italis, Vite-  
nera, & Tamaro: Hispanis, Congorca.



## Filix mās.

## Cap. CLXXVIII.

**FILICI** folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex uno pediculo cubitali longitudine exeunt, multifida, & lateribus pinnata, sub graui odore: radice per summa cespitum, nigra, oblonga, filices multas fundente, subaltringente gustu. nascitur in montibus, & saxosis. Radix latas tineas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsā: melius si cum scammonia, aut ueratri nigri totidem obolis detur: sed qui sumunt, allia prægustare debent. laborantes lienis incremento recreat. Radix & potu, & illitu cum axungia, uulneribus sagitta arundinea factis, est auxilio. cuius rei probatio talis fertur. Peribit filix, quam per ambitum lata copiosior arundo coronet: & contra euanescentes abibit arundo, quam obsepiens multa filix in orbem cinxerit.

## Filix Fœmina.

## Cap. CLXXIX.

**FILIX** fœmina folijs est filicis, sirculosis, altioribusque, & quæ non singulari, ut illa, pediculo fulciantur: radicibus longis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in lutenum flauescunt: aliquæ etiamnum rubræ inueniuntur. Pellunt lata interaneorum animalia, cum melle, eclegmate sumpto: potæ cum uino drachmis tribus teretestineas eiiciunt. Data fœminis sterilitatem faciunt: & prægnantibus abortum, si supergrediantur. Farina humidis ulceribus, & cicatrici repugnantibus inspargitur: iumentorum ceruicibus medetur. Folia recentia in oleribus cocta manduntur, ut uentrem emolliant.

**FILICIS** tam maris, quam fœminæ, quibus scatet uniuersa Italia, meminit Theophrastus lib. IX. cap. XX. Filicis utriusque historia. Filix fœmina utilis contra interaneorum animalia lata, melle subacta: & contra tenuia, in uino dulci cum farina hordeacea data. Si mulieribus grauidis detur, abortum facere: si cæteris, steriles in totum reddere aiunt. Differt fœmina filix à mascula, quod folium unico artu porrectum hæc habeat, radicem uero crassam, longam, & nigram. Harum igitur uires sterilitati addixisse natura putatur. Hæteus de filicibus Theophrastus. De ijs etiam scripsit Plinius lib. XXVII. cap. IX. sic inquit. Filicis duo genera, nec florem habent, nec semen. Pterin Græci uocant, alij blechnon, cuius ex una radice complures exeunt filices, bina etiam cubita longitudine excedentes, non graues odore. Hanc marem existimant. Alterum genus thelypterin Græci uocant, alij nymphaeam pterin. Est autem singularis, atque nou fruticosa (fortè rectius non singularis, atque fruticosa) breuior, molliorq; & densior, folijs ad radicem canaliculata. Vtriusq; radice sues pinguescunt. Folia utriusq; lateribus pinnata, unde nomen Græci imposuere. Radices utriq; longæ, in obliquum, nigra, præcipuè cum inaruerunt: siccari autem eas sole oportet. Nascuntur ubiq; sed maximè frigido solo. Effodi debent Vergilijs occidentibus. Vsus radis in trimatu tantum, neq; autè, neq; postea. Pellunt interaneorum animalia: ex his ptæniis cum melle, cæteras ex uino dulci tri duo potæ. Vtraq; stomacho inutilissima. Aluum soluit, primò bilem trahens, mox aquam. melius ptæniis cum scammonij pari pondere. Radix eius duum obolorum pondere ex aqua, post unius diei abstinentiæ bibitur, melle prægustato, contra rheumatismos. Neutra danda fœminiis, quoniam grauidis abortum, cæteris uerò sterilitatem facit, Farina earum ulceribus tetrus inspargitur, iumentorum quoq; ceruicibus. Folia cimicem necat, serpentem non recipiunt. Et libro XVIII. cap. VI. idem de Filice hæc scripto reliquit. Filix biennio moritur, si frondè agere non patiatis. Id efficacissimè contingit germinantis ramis baculo decussis: succus enim ex ipsa defluens necat radices. Aiunt & circa solstitium auxulas non reuasci, nec aruudine sectas, aut exaratas uomeri aruudine imposita. Filicem utranque prodidit Galenus lib. VIII. simplicium medicamentorum, ubi de earum uiribus in hunc modum differt. Filix mas radicem habet maxime utilem: latum enim lumbricum interficit, si quis eam quatuor drachmarum pondere in aqua mulsâ sumpserit. Ad eundem modum fœtum uiuum quidem necare, mortuum autem eiicere mirum non est: est enim amara, paulum habens astrictionis. Quamobrem ulceribus imposita ualenter desiccandi facultatem obtinet, non tamen mordax est. Similem ei uim habet Thelypteris nominata. Plauta Græcis πτέρις & πτέριον, Latinis Filix appellatur: Arabibus, Sarax, seu Sarachs: Italis, Felce, Germanis, Vualdfarn: Hispanis: Helecho uerus: Gallis, Osmunda regale.

Filicis utriusque historia.

Filicis utriusque uires ex Galeno.

Nomina.

## Filicula.

## Cap. CLXXX.

**FILICULA** nascitur in muscosis petris, uetustis arborum caudicibus, præsertim quercuum, palmi altitudine, filici similis, subhirsuta, non tenui perinde diuisura. Radix pilosa, in qua continentur cirri, ceu polyporum, crassitudine digiti minimi, coloris intus herbacei, austeri aliquantum, & gustu subdulcis. Purgandi uim habet. Coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluum soluendam. Arida farina aquæ mulsæ insparfa, detrahit bilem, & pituitam, trita luxatis efficaciter illinitur, & aduersus rimas, quæ inter digitos fiunt.



**POLYPODIUM** Latinis Filicula nuncupatur. Recentiores medici, atque etiam officinæ Græcum nomen retinent. Eius duo reperiuntur genera. Alterum, de quo hic Dioscorides differit, omnibus notum est, quod ubiq; locorum

Polypodii cōsideratio.



## POLYPODIUM.

## POLYPODIUM ALTERVM.



corum frequens proueniat. Alterum uerò non nisi paucis cognitum esse reor, folio aspleni, sed longiore, uiridiorè, magisq; per ambitum lucinato: radice priori simili, graciliore tamen paulò. hoc plurimum nascitur in montium syluis. Nos copiosum uidimus, legimusq; quibusdam in montibus, per quos iter breue, ac compendiosum faciunt, qui Goritia Labacum contendunt. Pretulit Mesues filiculam, quæ in quercuum caudicibus gignitur, quod ea, quæ solo, aut muscosis lapidibus inuascitur, suo quodam exuberante, incoctoq; humore maxime uentriculo sit noxia, quodq; ipsum flatibus repleat, ac etiam subuertat. Id quod postea in uniuersum de omni Filicula subiunxit, dicens. Polypodium interea recensetur medicamenta, quæ uel maxime corpora exiccant, & extenuant: subuersionem, & nauream facit. In quo tamen Mesui refragatur doctissimus Manardus Ferrariensis, asserens, quod polypodium, cum imbecilliter leuiterq; purget, corpora extenuare non possit: addens se certò scire, quod idem per se exhibitum, nullam stomacho infirat iniuriam. Proinde Auerroei in hoc magis ad stipulandum censet, quam alteri: quandoquidem Auerroes auctor est, Polypodium tutum esse medicamentum, & epithymo præstantius. Polypodium (ut testatur reliquit Aetnarius in libro de compositione medicamentorum) bilem, & præsertim atram, & pituitam extrahit. Dantur purgata radices seni scrupuli adfusa aqua iulsa. Mediocriter uerò aluum ciēt, & citra molestiam, tum in gallinaceo iure, tum in cremore ptisanæ cocta radix. Polypodio facultatem duntaxat assignauit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, ijs uerbis. Polypodium dulcem simul & austeram habet uincentem qualitatem, ut facultatis sit admodum desiccantis, citra morsum tamen. hæc Galenus. Ex quibus sanè satis constare posse arbitror, Mesuem rectè dixisse, & in hoc immeritò à Manardo reprehensum fuisse. Nam quod Polypodium abundè exiccet, Galenus testis est grauissimus. Ex quo cur etiam efficaciter extenuare non possit (ut inquit Mesues) non equidem uideo. Quare re potius adducor, ut in hoc opinio Manardi alioqui celebris, mihi planè reprobanda uideatur. *Πολύποδιον* quod Grecis, Latinis similiter Polypodium & Filicula uocatur: Mauritanis, Bisberg, Albeig, siue Beffaigi; Italis, Polipodio: Germanis, Engelsuesz, Baumffar, & Dropffauuerz: Hispanis, Filipodio, & Polipodio: Gallis, Polypode.

Polypodii uires ex Aetnario, & Gal.

Nomina.

## Dryopteris.

## Cap. CLXXXI.

DRYOPTERIS nascitur in ueterum quercuum muscu, filici similis, multò minore foliorum incisura, radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem uergentibus. Psilothrum est cum radicibus trita: illinitur enim primùm usque dum sudorem euocet, mox sudor abluatur, & recens imponitur.

NON



## DRYOPTERIS.

NON aliud Græcis significat Dryopteris, quàm filix in quercubus nascens, quòd filix hæc in amosis, muscosisq; (ut Dioscorides inquit) quercubus proveniat, folijs filicem ad unguem referentibus. Nasceitur etiam humenti solo, & inter uepres, circa quercuum caudices: eam siquidem ipse in Goritiensi agro pluribus in locis inueni extra quercuum caudices enatam, nullis repugnantibus notis. Dryopteris ijs, qui sylvas ingentes fræquantant, notissima est. Dryopteridis meminit Galenus libro VI. simplicium medicamentorum, eius facultates referens his uerbis. Dryopteris gustu mistam facultatem præfert, dulcem, acrem, amaram: in radice uerò item acerbam. Facultatem habet septicam, proinde etiam pilis glabram cutem efficit. Quæ ὀρυζαντέπις Græcè, Dryopteris item & Filix quercus Latine dicitur.

Dryopteridis consideratio.

Dryopteridis facult. ex Gal.

Nomina.

## Cnicus.

## Cap. CLXXXII.

CNICVS folijs constat oblongis, per ambitum diuisis, asperis, spinosis, caule sesquipedali: capitulo magnitudine grandis oliuæ: flore croci: semine candido, alioqui rufo, longo, anguloso. Huius flore in obsonijs utuntur. Seminis tusi, & expressi succus, cum aqua mulsa, uel iure gallinacei, aluum purgat: sed stomacho aduersatur. Ex eo autem fiunt offulæ, quas placentulas uocant, adiectis succo amygdalis, nitro, aniso, & melle decocto, quæ aluum emolliunt. Hæ in partes quatuor finduntur, quæ nucis iuglandis magnitudinem impleant: è quibus ante cœnam duas, uel tres sumpsisse satis est. Ratio temperandi hæc est. Cnici candidi sextarius, amygdalarum tostorum & delibratarum cyathi tres, anisi sextarius unus, aphronitri drachma una, cum carnibus triginta caricarum. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluendæ alui facultate donat.

SUNT in Italia, qui Cnicum Crocum Saracenicum appellant, quòd eius flore plerunq; croci loco ruraliter utantur: tametsi officinæ Mauritani secutæ Cartamum uocent. Cnicus (ut auctor est Theophrastus libro VI. cap. IIII. de plantarum historia) duorum est generum, satiuum unum, alterum syluestre, ut latius libro tertio in Atractylidis mentione retulimus. Porro in usum medicinæ semen tantum uenit. Quod (ut Mesues inquit) haustum superne, inferneq; purgat. Pituitam, & aquas extrahit: quo fit, ut coli dolore affectis, & aqua inter cutem laborantibus opem mirifice præstet, non modò haustum, sed & clysteribus infusum. Seminis medulla à putaminibus repurgata, & saccharo eclegmatis modo excepta, pectus, & pulmones abstergit, uocem clarificat, prolificumq; semen auget. Cnici uires paucis perstrinxit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Cnici semine duntaxat ad purgationes utimur. Tertij est ordinis excalescentium, si quis foris eo uti uolet. Eius planta xixos Græcis, Cnicus, & Cnecus Latinis appellatur: Mauritanis, Kartam, siue Charthom: Italis, Zaffarano Saracinesco: Germanis, Vuilder saffran: Hispanis, Alacor, & Semente de papagaios: Gallis, Saffran bastard, & Saffran sauage.

Cnici consideratio.

Cnici uires ex Geleno.

Nomina.

## Mercurialis.

## Cap. CLXXXIII.

LINOZOSTIS, aliqui parthenion alij hermion botanion appellant, folijs constat ocimi, helixinæ cognatis

CNICVS.



tis, sed minoribus: ramulis duplici geniculorum modo cinctis, alarum canis multis. fructu racemæ, copioso, quandam racemorum speciem præbente: mari è foliorum sinu dependente, paruo, rotundo, ceu binis testiculis unà coherentibus: frutice dodrantali, aut maiore. Vtraque in oleribus manditur, ad aluum ciendum. cocta in aqua, epoto iure, bilem aquamq; detrahit. Constat, vt mares gignantur, hunc facere: vt fœminæ, illam, si à purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoquantur.

## MERCVRIALIS MAS.



## MERCVRIALIS FOEMINA.



Mercurialis  
confid. & hi-  
storia ex Pli.

MERCVRIALEM, quæ Græcis Linxostis appellatur, duorum generum esse constat: unum mas, aliter  
rum fœmina. Vtraq; non modò medicis, ac seplastijs vulgaris admodum est notitiæ; sed etiam mulierculis, & fœ-  
re omnibus, quòd in clysteribus plerumq; imponatur. Quare non est, cur de Mercuriali hic pluribus differamus. 40  
Subijciam tamen quæ de ea memoriæ prodidit Plinius lib. x. xv. cap. v. ijs uerbis. Linxostis, inquit, siue paribez-  
nion, à Mercurio inuenta est, ideo apud Græcos heruū poan multi uocant eam, apud nos omnes mercurialem. Duo  
eius genera, masculus, & fœmina, quæ efficacior: caule cubitali interdum, ramoso in cacumine, ocimo angustior  
ribus folijs, geniculis densis, alarum canis multis: semine in geniculis dependente, fœmine copioso, mari iuxta ge-  
nicula stante, rariore, ac breui, contortoq; fœmine soluto, & candido: folia maribus nigriora, fœminis candidiora  
ra: radix superuacua, prætenuis. Nascuntur in campestribus cultis. Mirum est, quod de utroque eorum genere  
proditur: ut mares gignantur hunc facere, ut fœminæ illam. Hoc contingere, si à conceptu succus protinus biba-  
tur in passo, edanturue folia decocta ex oleo & sale, uel cruda ex aceto. Quidam decoquunt eam in nouo scitili, cum  
heliotropio, & duabus, aut tribus spicis, donec decoquatur. Decoctum dari iubent, & herbam ipsam in cibo, ala-  
tero die purgationis mulieribus per triduum, quarto die à balneo coire eas. Hippocrates miris laudibus in mulierum  
usu prædicauit illas: eas ad hunc modū adhuc medicorū nemo nouit. Ille eas uulue cū melle, uel rosaceo, uel trino, uel  
lirino admouit. Item ad ciendos menses, secundasq; Hoc idē præstare potu, fotuq; dixit. Instillauit auribus surdis suc-  
cum, inunxitq; cum uino uetere. Aluo folia imposuit, epiphoris, stranguriæ, & uesticæ. Decoctum eius dedit cum  
myrrha, & thure. Aluo quidem soluendæ, uel in febris, decoquitur quantum manus capiat, in duobus sextarijs aque  
ad dimidias, bibitur sale, & melle admisto, necnon cum ungula suis, aut gallinaceo decoctum salubrius. Purgatio-  
nis causa putauere aliqui utranque dandam, siue cum malua decoctum. Thoracem purgant, bilem detrahunt, sed  
stomachum ledunt. Hactenus de mercuriali Plinius. Eius quoque uires descripsit Galenus libro vii. simplicium  
medicamentorum, sic inquit. Mercuriali utuntur omnes ad uentris purgationes duntaxat. Verum enimerò si quis  
eius facere periculum uolet in cataplasmate, sanè eam digerentis admodum facultatis esse experietur. 40  
sic Græcè, Latine uerò Linxostis & Mercurialis uocatur: Italicè, Mercorella: Germanicè, Bingel kraut: His-  
panicè, Mercuriale, & Vrtigua muerta: Gallicè, Mercuriale.

Mercurialis  
uires ex Gal.

Cynocrambe



Cynocrambe.

Cap. CLXXXIII.

CYNIA, aut cynocrambe, cauliculum binum draconem altitudine emittit, mollem, subalbidum: folia mercuriali, aut hederæ similia, certis interstitijs subalbida. semen folijs adhæret, paruum, rotundum. Folia cum caulibus pota, aluum cient, oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam, & bilem, aquamque detrahit.


VIDETVR Ruellius existimasse Cynocrambem eandem herbam esse cum Atriplice sylvestri. Quæ in re (si ita esse credit) aperte errasse deprehenditur, quod præter sylvestrem atriplicem, etiam comperta sit legitima Brassica canina, quodq; de sylvestri atriplice simul cum sativa scripserit Dioscorides libro secundo. Cynocrambe, quam nos Mercurialem spuriam appellamus, in Italia omnibus ferè locis prouenit, in campis, in uis, & in uineis, nulla prorsus descriptioni reclamante nota. Differt hæc ab agresti atriplice non modo folijs, & facie: sed etiam caulis proceritate. Siquidem atriplex sylvestris quandoque ad duum cubitorum altitudinem assurgit. Cynocrambe uero binum palmorum longitudine contenta est. Huius nusquam, quod inuenerim, meminit Galenus in libris simplicium medicamentorum. nam ea Cynocrambe, cuius ipse Galenus, & alij rei herbarie scriptores mentionem faciunt sub nomine Apocyni, alia est ab hac, de qua hic agitur. Quæ planta Græcis κυνικράμβη, Latinis Cynocrambe, & Brassica canina appellatur: Italis, Mercorella bastarda: Germanis, Vuid bingel kraut.

Cynocrâbes  
consideratio.  
Ruellij error



HELIOTROPIVM MAIVS.

HELIOTROPIVM MINVS.





## Heliotropium maius.

## Cap. CLXXXV.

**HELIOTROPION** magno flos est effigie scorpionis caudæ, unde scorpiuro ei nomen: & quoniam folia cum sole circumagat, heliotropion dicitur. Folia ocimi habet, hirsutiora, candidiora, & maiora: ramuli à radice terni, quaterni, aut sæpe quini exiliunt, multis alis concaui: flos in cacumine candidus, aut subfulvus, incuruatur ut scorpionis cauda: radix tenuis est, & inutilis, nascitur in asperis. Decoctum herbæ ex aqua, fasciculo manus plenæ, potu pituitam, bilemque per aluum extrahit: contra scorpionum ictus in uino potum, & illitum prodest. adalligatur ad conceptus arcendos. Aium per horam unam ante accessiones, seminis grana quatuor cum uino quartanas finire, tria uerò tertianas. Illitum semen formicantes verrucas, pensilesque, & thymos, & epinyctidas exiccat. Folia infantium destillationibus, quas syriaseis uocant, podagricis, luxatisque utilissimè illinuntur. menses crient: partus trita, & imposita pellunt.

## Heliotropium minus.

## Cap. CLXXXVI.

**HELIOTROPION** paruum nascitur in palustribus, iuxta lacus, folijs antedicto proximis, rotundioribus: semine acrochordonum uerrucarum modo, pensili, rotundo. Herba cum suo semine pota, adiecto nitro, hyssopo, nasturtio, & aqua, latas tineas, teretesque excutit. Pensiles uerrucas, quæ acrochordones uocantur, cum sale illita tollit.

Heliotropij  
utriusque con-  
sideratio.

**HELIOTROPION** maius, licet in asperis nasci Dioscorides tantum prodiderit; tamen in Hetruria, & in comitatu Goritiensi, ubi frequentissimum uisitur, passim ferè prouenit, in campis, secus uias, in oppidorum plateis, & circa edificiorum areas, aridis item, & sabulosis locis. Herba hæc apud Hetrustos officinis Verrucaria appellatur, quod uerrucas, myrmecias, & thymos affricata ualenter adimat. Quare mihi, ut Ruellio quoque doctissimo, plurimum errare uidentur, qui censet Caleculam officinis dictam, quæ & uetericis Caltha existimatur, esse Heliotropium maius, namque omnes prorsus illius notæ huic reclamare deprehenduntur. Neque eorum opinioni illud quicquam addit, quod huius Calthæ semen quadantenus scorpionum caudiculas referat, quoniam Dioscoridi Heliotropij flos, non semen scorpionis caudæ effigiem representat. Porro Ruellius heliotropium hoc uocari ait herbam cancri, quod

## CALTHA.



Calthæ con-  
sideratio, &  
uers.

Nomina.

eius flores in caudæ cancri (qui uobis astacos esse putatur) similitudinem inflectatur. Verum hæc nominis ratio à Ruellio assignata mihi non planè satisfacit, quod scorpionum, & astacorum caudæ forma inter se maximè differant. Vnde potius crederem, hoc Heliotropium herbæ cancri appellationem traxisse, quod efficacissimum sit aduersus carcinomata, & ulcera gangrenosa, ad quæ magno admodum successu eo utuntur chirurgici, qui & plantam, & eius uires compertas habent. Ceterum Heliotropium minus uidimus, ac sæpe legimus in Tridentino agro, in palustribus quibusdam locis, idque compluribus ostendimus, ut quod piculæ satis respondere mihi uideretur. Quod autem huius Heliotropij, aut alterius mentionem fecerit Galenus, non inuenio in simplicium medicamentorum censu. Paulus tamen utriusque mentionit, sed non plura de his tradidit, quam quæ Dioscoridi accepta referre potest. Sunt et recentioribus (ut supra diximus) qui Caleculam uocatam, Virgilij & Plinij **CALTHA** existiment, hoc argumento nixi, quod flores aureos luteosue profert. Quorum equidem sententiæ non ausim omnino subscribere, aut refragari. Ea in Hetruria à florū colore uulgò Fior rancio nominatur. Hanc inibi passim acetarijs adhibent. Gustu est adstringenti, cum quadam leuiuscula amaritudine. Ex quo non uideo, quomodo hæc, ut quidam scriptis tradiderunt, menses eiere possit. nisi id fortasse fiat ab occulta quadam facultate. Siccatæ puluis canis dentium immixtus, dolorem leuat. Ut Græci ἡλιότροιον, ita etiā Latini Heliotropiū dicunt: officinæ & uulgus, Verrucariam.



## Scorpioides.

## Cap. CLXXXVII.

SCORPIOIDES herbula est, folijs paucis: femine caudæ scorpionis effigie. Illita scorpionum ictibus præsentaneo est auxilio.

SCORPIOIDIS speciem Calendulam nominatam haud dubiè esse censerem, si folia, sicuti semen. Scorpioidi responderent. Verùm cum hæc folijs paucis, illa uerò multis, longisq; prosiliat, ij apertè falli deprehenduntur, qui in hac opinione uersantur. Equidem ueram, ut arbitror, Scorpioidem uidi primum superioribus annis in Foroiulensi agro in Ciuitate Austriæ quodam in hortulo clarissimi medici Iuliani à Marostica Teruisiensis. Hanc eadem, cuius hic effigiem pictam damus, dum hoc tempore diligenter curarem, ut singulis plantarum descriptionibus, quarum cognitionem habemus, pictura accederet, ad me misit quidam ex ijs, qui rei herbariæ dant operam. Quam sanè suis notis ueram Scorpioidem referre putamus: etsi non desunt uiri doctissimi, qui aliter sentiunt. Scorpioidem breuissimè perstrinxit Galenus libro VIII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Scorpioides excalfacit quidem ordine tertio, desecat uerò secundo. Ea non secus Latini Scorpioides, ac Græcis σκορπιουίδης appellatur.

Scorpioidis  
consider.

Scorpioidis  
facul. ex Gal.

Nomina.



LIBRI QVARTI FINIS.



# PETRI ANDREAE MATTHIOLI MEDICI

## Senensis Commentarii,

IN LIB. QUINTVM PEDACII DIOSCORIDIS  
ANAZARBEI, DE MEDICA MATERIA.

**S**UPERIORIBVS quatuor libris, amicissime Aree, tradidimus de aromatibus, oleis, unguentis, arboribus, & earundem lacrymis, ac fructibus: item animalibus, melle, lacte, adipe, cerealibus, oleis: necnon de omni radicum, herbarum, succorum, seminumque ratione. In hoc autem totius operis quinto differemus de uinis, & metallicis, à uite nostram commentationem auspicati.

### COMMENTARIVS MATTHIOLI.



**Q**UONIAM non difficile tantum, sed quasi etiam impossibile esset, ut cuiuscunque scientiæ, aut facultatis principijs, ac fundamentis uniuersalibus ignoratis, sciri per se et possint illa, quæ deinceps speciatim in ea considerata ueniunt; ideo non minus necessarium, quam utile fore existimaui, si hic in uniuersum fossilium, ac metallorum materia tractaretur. Nam etsi in hoc quinto libro, nonnullorum fossilium medicamentorum cum historiam, tum facultates tradiderit Dioscorides, & ipsum secutus Galenus in libris simplicium medicamentorum; cum tamen eorum neuter originem, materiam, causas, ac alia plurà in his æstimanda, ac cognoscenda explicauerit, illa quidem hoc loco silentio inuoluenda non duximus, ut quantum per nos fieri potest, nihil quod ad abso-

lutam rerum simplicium cognitionem, & communem usum faciat, à nobis intactum relinquatur. Cum itaq; plures tam antiquos, quam recentiores, qui de fossilium, ac metallorum materia scripserunt, diligenter satis perlegimus, eos utique non modo inter se differentes reperi, sed in aliquibus etiam contrarios. Nam licet eorum quidam de ueritatis tranite parum defleuant: uidentur tamen non exactè ea omnia explicauisse, quæ hac in re maxime necessaria censentur. Fieri enim lapides, Aristoteles auctor est, igne non liquecentes ex sicca ignescente exhalatione. Ex quibus deduci potest, exhalationem humidam materiam esse lapidum liquecentium, è quibus metalla constentur, quo fit, ut ex Aristotelis sententia, lapides igne non liquecentes fiant ex calido, & sicco uapore: liquecentes uero ex humido halitu tantum. Sed opinionem hanc, qui rem altius, diligentiusq; inuestigarunt, minime probandam existimant, cum lapides longè minus, quam terræ ex uapore fieri queant. Siquidem puluis, qui sic gigneretur, nunquam aliquod ex pluribus fieri nunquam posset, nisi humor illi commisceretur. & omnes pariter lapides non liquecentes absq; multa hominum opera, ac tundendi labore facile in arenam, uel puluerem transirent, si tantum ex ijs nullo accedente humore efficerentur. Quod profectò haud ita se habet: lapides namq; ferè innumeros admodum compactos, solidosq; uidemus. id quod haud dubiè ostendit, ex illo tantum uapore eos nequaquam genitos esse. Quod si ex eo lapides eiusmodi procrearentur, magis omnino fierent in superiore aeris regione, ut quæ facile ignis contactu incendatur, quam intra terrâ. Quandoquidem omnibus liquidò constat, quam superior illa aeris regio ex uelocissima ætherum conuersione, citius accendatur. Ac certè si non aliàs, saltem quoties gignerentur cometa, faces, flammæ, clypei; ardentes, deciderent lapides è cælo, aut terræ. quod tamen fieri non uidemus. Et quamuis tradiderint prodigiorum scriptores pluisse quandoq; lapides, ut Plinius, & alij quidam testantur; non tamen ob hoc opinatus est Aristoteles in aere lapides gigni posse. Nempe is lapidem è cælo delapsum uentorum ui in aerem sublatum scribit. At si lapides in aere fiunt (quod planè negare non ausim) quid obstat, cur dici non possit, hos ex eadem fieri materiam, ex qua illi sub terra generantur? quam quidem materiam facile produxisse potuerint uiolentissimæ tempestates: ut pote quæ repentino aliquo motu dum oriuntur, ex reliquorum elementorum mutatione terrena illa corpora gemerint.

Theophrastus uero non lapides solum, sed terras etiam constare scribit ex pura, ac equali materia, quæ confluxu quodam, siue percolatione sit effecta, aliò uero modo excreta. Quod etsi iure aliquo probari possit, non tamen ijs duobus modis tantum talis efficitur. Nec ea quauis proxima sit materia terræ insignis, omnis etiam est lapis, uerum alijs quoq; modis fit pura, & equalis materia, ut cum succi nascuntur. Interdum quoq; necesse est, ut calor materiam ijs duobus modis genitam, prius coquat, ut inde efficiat succum, ex quo tandem lapis, qui liquecat ignis calore, fieri possit. Verum enim uero multò magis in hoc errasse Theophrastus deprehenditur, quod scilicet omnes lapides etiam pretiosos terra abundare crediderit: is enim ita inquit. Eorum, quæ in terra consistunt, alia aquea sunt, alia uero terrena. Aquea quidem sunt metalla, nempe aurum, argentum, & reliqua. Terrena uero lapis, & lapidum species pretiosæ, ac etiam terrarum species omnes, quæ colore, uel lauore, uel spissitudine, aliàue facultate sunt insignes.

Varia de generatione lapidum sententia.

Aristotelis opinio.

Theophrasti opinio.



ignes. Quandoquidem si uera esset hæc Theophrasti sententia; nulla quidem inueniretur gemma, quæ translucet, cum tamen uariæ, ac ferme innumere reperiantur, quæ maxime pellucunt. Hinc itaq; fit, ut citra iniuriam dici possit, non omnes pretiosorum lapidum species esse terrenas, sed aqueas, id est, ex humore quodam conflatas, cui aquæ pondus longè maius, quam terræ insit. Cæterum Auicennæ opinio, quam sequitur Albertus, multò magis ueritati, ac rationi coherere uidetur, quam aut Aristotelis, aut Theophrasti. Quippe quanquam non explicuerit ipse, quibus modis futura lapidis materia congregetur; dixit tamen lutum esse in primis lentum, & aquam non simplicem illam, sed cum terra permixtum. In qua permissione si plus terræ, quam aquæ confluerit, lutum dicitur, si aquæ, succus. nihil enim aliud est lutum, quam terræ, quæ permixta aqua: nec succus aliud quidem explicat, quam aquam, quæ sorbuerit terram, uel abarserit, tetigeritq; metallum. Lutum enim, ex quo lapis futurus est, lentum, ac tenax esse oportet, cuiusmodi illud est, ex quo lateres & fistilia fiunt: nam ab alterius generis luto, quod penitus lentore careat, haud diffucile separatur, ac dissoluitur humor, tumq; non lapis ex eo efficitur, sed puluis. Lutum uerò tenax calor primum exiccando conspissat, efficitq; medium inter lutum, & lapidem: deinde quia diutius idem agit, uel acrius, lapidem gignit, Quinetiam succus crassus, & lentus facile conuertitur in lapidem. quod in animantibus est euident, præsertimq; in nobis, cum iandudum ueteribus medicis, ac etiamnum recentioribus decretum sit, tum renum, tum uescicæ calculos non aliunde progigni, quam ex lento, crassoq; humore temporis tractu à calor nostri facultate coactos. Ob id igitur translucens gemmas non ex aqua tantum fieri constat; sed ex puro, liquidoq; succo, qui aquæ multum, terræ uerò tantillum referat. Siquidem si ex aqua tantum huiusmodi lapides efficerentur, non utiq; mergerentur in ea proiecti, sed ea supernatarent, non secus ac glacies, & grando. At cum omne lapidum genus demergatur aqua, ac etiam crystallus, & beryllus, quæ tamen, quoniam glaciem colore repræsentant, omnino uidentur ex aqua constare, satis intelligimus, ex sola aqua non gigni lapides illos. Quapropter (ut in sequentibus suo loco dicitur) planè explodenda uenit Plinij, & aliorum quorundam sententia, quibus certum est, crystallum glaciem esse, quæ niue in algidissimis montibus concreuerit, cum aqua non supernatet. Generantur præterea lapides ex lapidibus ipsis, cum fluuiorum, riuiolorum, ac subterraneorum fontium aqua per saxa excurrentes, ab eorum superficie aliquid lapidosi abarserit, quod cum resederit, solis calore siccatur, ac lapidescit. Hoc enim euidentissimè apparet in canalibus, ac soli patentibus aqueductibus, quibus nonnullæ aquæ calidæ ducuntur. Li nimirum lapideis quibusdam crustis oblinuntur, quæ cum tenuissimis ramentis compactæ sint, cæteris mollioribus, infirmioresq; habentur. Hoc idem apertissimè conspicitur in quibusdam balneis aquarum sponte nascentium, præsertimq; in balneo sancti Philippi comitatus nostri Senensis. Quandoquidem ex huiusce balnei aqua, particula quædam gignuntur lapideæ, saccharum tum candore, tum etiam materia referentes, quæ usque adeo imitantur semina saccharo contexta, & alia id genus, quæ in officinis saccharo similiter conteguntur, nempe anisum, coriandrum, ac etiam plerumq; cinnamomum, ut ijs capsula à quibusdam impleantur, itaq; aptentur, ut solatij causa aliquos sacchari eiusq; confecturarum audissimos decipiant. Fit hoc quoq; in his, qui huius aquæ stillicidio utuntur ad cerebri morbos curandos, illi quotidie caput subijcientes. Siquidem lapidosa illa materia, capillis circumcisis continè inhaerens, in granula quædam cogitur, ac coalescit, ab aniso saccharo contexto nihil ferè dissimilia, quæ non nisi tractu temporis inde se explicant, & dissoluantur. Idem præterea euenit in montium concauitatibus, ac speluncis, quæ ex saxo potissimum calcario constât. quippe aquarum ex saxorum commissuris stillicidio lapidea conrescit materia, quæ in concauitatibus illarum cameris non aliter pendet, quam stiria hyberno gelu è domorum nostrarum tectis prominent. Ex eodem etiam saxo calcario oritur gypsum, melitites, galactites, & alij quidam lapides: & ex succo, qui ex eodem saxo, & aqua contemperatur, lapis specularis, & gypsum, quod raro translucidum inuenitur. Eodem modo ex ramentis rubei lapidis fit hæmatites, & schistos: item in commissuris marmoris maculosi, aut eius, quod in candido cinereum colorem refert, reperiuntur dactyli Idæi, lapidei Iudaici, trochites, & consimiles. Verum enim uero succus lapidescens omnino differt ab aqua, quæ saxorum ramentis referta est, uel quod plus habeat sedimenti, uel quod calor tamen coquendo aquam, eam densiorem effecerit, uel quod aliquid is succus contineat, quod nelementer adstringat. Ex quo (ut opinor) corallium maris planta, & antipathes oriuntur. Postremo materia lapidis erit quicquid habet meatus, per quos succus lapidescens imbibi possit, siue is à terra contineatur, siue cum aquis mixtus ex ea effluerit. Quamobrem multoties arbores, frutices, animantes, ossa, & alia in lapides uertuntur, ut Boheam aperte testantur. Quandoquidem in eorum regno pluries in subterraneis fodinis (Georgius Agricola auctor est) arbores inuictæ fuerint in lapidem conuersæ, stantibus adhuc ramis, cortice, medulla, ac radicibus. Equidem ipse quoq; ingenuè fateri possum, arboris ramum ex lacu cuiusdam litore mihi allatum esse, qui altera parte lapideus, altera uerò ligneus cernebatur. Venetijs item in magno Germanorum emporio, quod uulgo uocant il Fondaco de Todeschi, equi testiculū lapide factum, Antonius Golb mercator ibi pro Fucharis agens, iucundo omnium spectaculo, & admiratione ostendebat. Id quod animalium quorundam carnibus, & ossibus, tum etiam testaceis piscium operimentis euenisse comperimus. namque in Hetruria quam plurimis in agris, buccina, cochleæ, conchulae, & eiusmodi multa aratro ab agricolis eruantur in lapidem conuersa. Quæ sanè omnia haud dubiam fidem faciunt, ita se rem hæc habere, uti diximus. Sed ut ex prædictis omnem lapidum materiam paucis perstringamus, ea in primis est lutum, in quo multò plus sit tenacis terræ, quam aquæ. Deinde est succus, qui uehementi frigore congelascit, in quo aqua ipsa terræ superat. Sūt præterea ramenta saxorum, quæ aquarum decursus abradit. Quinetiam succus lapidescens, qui cum in aerem effluxit, in lapidem concrescit. Omne deniq; quod habet meatus, in quibus lapidescens succus facile excipitur. Nihil fecius in metallorum ortu & materia, de quo iam nobis disserendū est, auctores inter se dissentire inuenio. Alia etenim est philosophorum, alia chymistarum, alia astrologorum sententia, quibus etiā accedit opinio imperitissimi uulgi, quæ tantum ab alijs dissidet, quantum à ueritate, & à ratione prorsus abhorret. Is namq; certò credit, non modò saxa; sed etiam me-

Auicennæ opinio comprobata.

Plinij opinio explosa.

Varia de metallorum ortu sententia. Vulgi opinio explosa.



talla omnia, pretiosos lapides, & gemmas, ac terrarum uaria genera, in ipsa tantum mundi creatione Deum optimum maximum talia finxisse, atque creasse, qualia nunc reperiuntur: nec medio temporis lapsu, ullam ex materijs ad id dispositis esse uataui, uel reuataui, neq; aliquam uim naturæ, ad eorum perennitatem summum rerum opificem tribuisse. Qui certè uulgus ita temere pronuntians, non uidet quàm maximam naturæ inferat iniuriam, quæ nunquā aliquo temporis momento quiescens, nil aliud agit, quàm ea semper regenerare, quæ aliàs genuit, quæ etiam noua multa producit. Vnde hæc uulgaris opinio prorsus explodenda, atq; exhibenda est. Quam insuper ut uanam ac ridiculam, illud maxime diluit, ac demolitur, quod in antiquis metallorum cuniculis sole clarius uisitur. Siquidem innumere inueniuntur metallorum fodinæ, tanquam inutiles à fossoribus derelictæ, quod inde omne metallum effoderint, per quas etsi prius longè, lateq; patebat transitus, ita ut libere, & absq; ullo impedimento non modò fossores ipsi, sed uehicula, ac curricula per eas discurrerent; tractu tamen temporis factum est, quod materia lapidescens in ipsis adeo creuerit, ut fossoribus denuo ingredi uolentibus ob cauitatis angustiam denegaretur aditus. Sed præterea metalla continuè generari, ferrum inditio est. Id quod in illæ insulæ metallicis fieri (ea enim à maritimis nostris non longè distat) non modo probatissimi scriptores memoriæ prodiderunt; sed fossores ipsi, qui diutius in ipsis uersati sunt, uerbis referunt. quippe quod ferreæ illæ fodinæ multis iam annis destitutæ, iterum atque iterum ferrea materie impleantur. Porro philosophi, & chymistæ aliter sentiunt. Aristoteles lapidum materiam halitum tantum existimat. Chymistarum uerò nonnulli omnino asserunt, metalla in uisceribus terræ gigni ex sulphure, & argento uiuo: alij ex quadam cinere aqua madefacta. Quorum sententia, cum non solam suspecta, sed etiam planè falsa habeatur, eos uisum mirum omnes decipit, qui horum lubricis fundamentis nixi philosophantur, ut firmis tum rationibus, tum argumentis probare non uererentur, nisi id præter nostrum institutum esset, qui hic barum rerum capita tantum percurramus. Verum si quis rem hanc fusius enarratam, atque exactissimè discussam habere cupit, librum legat Georgij Agricolæ uiri eruditissimi, à quo nos plura mutuatos esse ingenue fatemur. Ceterum illud omnibus, ut mea quidem fert opinio, persuasum esse debet, quod nil aliud sit metallorum materia, quàm substantia elementaria, quæ tanto perscitiùs metallum efficit, quantò magis in equali proportione tum qualitatis, tum quantitatis impensè depurata constat. Quippe in metallorum materia aquam esse, maximo argumento est, quod ignis calore liquetur, ac fluant: frigore uerò tum aeris, tum etiam aquæ rursus densentur, ac coeant. Id quod clare ostendit, ea aquæ multum, terræ uerò parum obtinere. Simplex enim aqua non est eorum materia, sed iuxta cum terra: atque terræ quidem portio tanta in mistione existit, quanta aquæ perspicuitatem obscurat, fulgorem uerò non aufert. Quinetiam mistura quò purior fuerit, eò pretiosius (ut diximus) metallum conflat, idq; magis ignis patiens redditur. Sed quota terræ portio in ista humiori, ex quo efficitur metallum, uero mortalium unquam mente concipere potest, nedum uerbis explicare. Id tantum nouit Deus optimus maximus, qui certas, ac definitas quasdam leges naturæ tribuit, quibus res inter se miscet, ac temperat: Succus igitur est, ex quo formatur metallum, quem pariunt uarij motus, quorum proximi sunt aquæ defluxus terram mollientis, aut secum rapientis: terræ cum aqua permistio: & uis caloris agens in misturas, ut id genus succos gignat. Sed cum de metallorum materia satis dictum sit, iam causam efficientem prosequamur. Ea autem nil aliud nobis esse censetur, quàm calor, & frigus, qui in ipsius terræ uisceribus reconduntur. Calor inquam is est, qui humoris metallici mistionem coquit, ac purificat; frigus uerò, quo eadem densatur, & dura efficitur. Hoc equidem experientia facillè comprobatur, cum nemiuem lateat igni metalla liquefcere, ac etiam tractu temporis post liquationem, ipsius ignis calore contabescere, auro excepto. Quamobrem detestanda uidetur eorum opinio, qui tantum calore subterraneo metalla confici crediderunt. Sunt & qui putent, metalla omnino effici siderum errantium influxu. Soli nanque auri generationem assignant, Lunæ argenti, Marti ferri, Mercurio argenti uiui, Ioui stagni, Veneri aris, Saturno denique plumbi. Adduntq; quod sicuti metalla ab errantibus stellis sui ortus principium habent; ita pretiosi lapides, ac gemmæ, à fixis suam effectricem causam suscipiunt. Huic autem sententiæ plerique non acquiescunt, quoniam has causas nimis remotas credunt, & propinquieribus causis inherendum esse arbitrantur. Ego tamen inficias non eundem reor, quin omnia hæc inferiora terrena, ac finita regantur, gubernentur, & producantur à superioribus cœlestibus, ac sempiternis. quæ tandem diuturno orbium circumuolutione, omnium causarum tam remotarum, quàm propinquarum causa existunt. Ita pariter dicendum existimo lapidum gignendorum causam non semper à solo frigore, uel calore, sed modò ab hoc, modò ab illo provenire. Nam lapides, quos aqua humectando dissoluit, calorem exiccando compegiisse intelligimus. Contrà uerò, qui calore ignis liquefcunt, ut fluuiorum, & torrentium silices, quibus igne liquatis uitrum conficiunt artifices, eos frigore concreuisse certum est. Concretio enim, eiq; appositæ affectiones, resolutio scilicet, atq; liquefactio, oriuntur à causis inter se contrarijs. Etenim calor à materia humoreni extrahens, eam efficit duram: at frigus eandem, aere maxima ex parte excluso, uehementer constringit, quemadmodum agit, cum aquam in glaciem, uel niuem cogit. Hinc est, quod memoriæ prodidit Galenus, eam aquam corporibus prorsus iuimicam esse, quæ à niue, uel glacie colliquatis fluxit: quoniam omne, quod in ea tenuissimum erat, à gelu expressum fuerit. Duabus his causis tertia quoq; accedit, quæ est succus ille lapidescens, de quo superius diximus, qui uel solus, uel cum aquis permistus in stirpium meatus, aut in animantium particulas recipitur. Nam præterquam quòd sit lapidum materia, causæ etiam efficientis partes subit: quando scilicet in corpus aliquod per meatus penetrat, idq; totum secum in lapidem uertit. Quòd si in lapidem concreuerit gutta immodica, aut in urceos diffusus, tunc materia tantum, non causa efficiens dici merebitur. Gignitur hic (ut supra dictum est) in locis quibusdam lapidosiss, & interdum aquæ commistus, per uenas terræ manat, & effluit. Quapropter mirari non licet, si fontes, riuuli, lacus, ac putei reperiri possint, qui stirpes, ossa, & alia multa in lapidem tractu temporis uertant. Verum non est ignorandum, quòd succus is lapidescens motu aliquo agitatus, non facile in lapide densatur, nisi crassus admodum fuerit, sed simul atq; in meatus ligni, aut alterius rei receptus, dispersusq; quiescit, frigore

Causa metallorum efficiens.







etiam quod cognationem quandam, & quasi consensum cum ipso habere uideatur. Metalla insuper, quæ liquefunt ijs quæ attingunt, minime adhærent, nec eadem humectant, neque etiam labuntur, ut ceteri aquei liquores tam fesse sitij, quam à plantis, aut animalibus producti: sed eorum partes inuicem coguntur, simulq; coherent. Idq; non alia ratione fieri constat, quam quod tam bona, firmaq; mistio rei sicca cum humida facta sit, ut sicca obstet humida, ne adhærescat, & humectet: humida uero contrà impediatur, ne sicca prorsus conquefcat. Quæ quidem mistio quoniam in auro perfectissima reperiatur, ideo hoc igne nunquam absimitur. nam cum eius purissima terra sit optime cum ea qua permista, humorem stringit, & continet, ne uel ignis expiret: humor uero contrà tuetur, ac defendit terram, ne accendatur. Idcirco nunquam comburitur aurum, ut cetera faciunt metalla, quæ quandoquidem impuriorem sortiantur terram, deterioremq; mitionem; proinde ignis uiolentia faciliè rapiuntur, & conficiuntur: cum enim terra flammis accensa fuerit, humorem celeriter deperdit. Attamen metallum unum alio magis, & citius comburitur, prout hoc illo plus terræ, eamq; minus probè mistam obtinet. Etenim si libeat experiri, in primis ferrum deprehendetur igni consumi, propter nimiam, quam habet, terræ impuræ copiam. Mox plumbum, & stagnum, quod ijs non satis firmum sit cum terra temperamentum, quam ob causam postquam humorem exhaurerit ignis, terram consumit. Deinde æs, quod cum terræ purioris, ac etiam paucioris particeps sit, quam ferrum, etsi ea non satis exquisitè mista sit cum aqua, diutius igni resistit. Postremo argentum, quod quia puriore terra constat, ac melius ea quæ commista, non nisi longiori tempore flammæ cedit. Verum plumbum, ac stagnum non ob id igne tam faciliè uiuantur, quod multum impuræ terræ contineant, sed solum ob mixturæ uitium, quoniam in his imperfectior inuentatur. Sed ad lapides nostra reuertatur oratio. de quorum quoq; luciditate, siue perspicuitate, ac nitore, uel horum oppositis obscuritate, ac squalore iam aliquid nobis differendum est. Ex prædictis itaque omnibus clarum esse arbitror, lapides aquam magis, ac terram participare, quam cetera elementa. Sed quoniam non terra, sed aqua cernitur esse perspicua, ac pellucida; ideo ab ea tantum perspicuitatem, luciditatemq; ijs aduenisse constat. Unde ex succis claris, & perlucidis constare lapides, qui translucent, affirmamus. quemadmodum ex terra eos, qui qualitatibus perspicuitati oppositæ reperiuntur: hi enim ex claris succis gigni nequeunt, sed ex impuris, ac turbidis uel luto, uel nigrore infectis. Quod uero alij lapides magis, alij minus pelluceant, non aliunde fieri certum est, quam à succorum diuersitate, cum scilicet alij alijs clariores, ac lucidiores existunt. Ex quo sequitur, quod albe gemmæ gignantur ex succo, cui aquæ color insit, atque adeo ceteris clariores, ac illustriores appareant, ut crystallus, & iris, gemma sic ex argumento uocata: nam sub tecto percussa sole ob angulos, quos habet, colores ex opaco reddit. Speciesq; arcus cælestis in proximos (ut Plinij uerbis utar) ei aculatur parietes. At adamas ex succo minus clara progignitur, ideoq; tam iride, quam crystallo obscurior est. Non dissimili uarietate notantur aliorum colorum gemmæ translucentes, siue ortæ fuerint è succis uiridibus, ut smaragdus, ac prasij: siue è cæruleis, ut sapphiri, cyaneis, & iaspidium quoddam genus: siue è rubris, ut carbunculi: siue è purpureis, ut amethysti, & hyacinthi: siue ex aureis, ut chrysolithi, & chrysopatij: siue ex misti coloris succis, ut opali. Hinc igitur colligi faciliè potest, quod cetera gemmarum genera, quæ perspicuitate carent, è succis concreuant impuris, atris, & obscuris: quando nec aqua quidem limpidissima, cui ater succus infusus sit, clara ac pura perspicui possit. Nitent tamen gemmæ non translucentes propter insignem leuorem, qui lucis continuitatem, & densitatem parit. Quem quidem leuorem aut sibi natura comparant, aut artificum mangonio consequuntur. Idem de causis marmora quoq; radiant. Porro lapides, & gemmæ pellucentes nonnunquam coloris labem, aut uitium aliquod contrahunt: sæpe enim aut umbra, aut uidebuculis, aut capillamentis, aut sale, aut plumbagine uitiantur. Quæ sanè omnia non alia ex causa proueniunt, quam ex coloris succi diuersitate. Gignitur quidem umbra, cum succi color aliqua parte obscurior fuerit: nubecula uero ob partem albidioris coloris. At capillamentum, quo præsertim sapphirus inficitur; sal, quo opalus; plumbago, quo smaragdus, ex alieno prorsus colore fiunt, non autem proprio gemmarum. Quinetiam sibi gemmæ scabritiem induunt, cum ob succi diuersitatem partes inæqualiter coalescunt. His ergo rationibus nixus, nemo non audebit dicere atq; asserere, lapides omnes, ac saxa, quæ neq; nitent, neq; pellucunt, ex crassissimo succo, & terrena materia fieri. Differunt præterea lapides spissitudine & raritate, leuitate & grauitate. itaq; ponderosis, ac compactis lapidibus pauci, & admodum occulti sunt meatus: raris uero, ac leuibus contrà multi, & patentes. Quapropter dicendum esse reor, quod rari, ac leues efficiantur lapides, ubi eorum humor cum terra non probè fuerit mistus, is siquidem à calore siccatus locum, in quo confederat, uacuum relinquit, ut in topis, & similibus conspicitur. Idem quoq; euenit, cum sponte flagrant montes, ut Aetna in Sicilia, & Vesuius in Campania Plinij tempore, ac etiam hac nostra ætate, nam cum ibi magnis incendijs terra cremetur, eadem ratione ex ipsa fiunt meatuum pleni, cauernosi, & leuissimi pumices. Contrarium planè fieri constat: si humor undiq; in terram penetret, & illi optime misceatur: is enim hoc modo lapides graues, compactos, ac duos generat. Quod autem lapides duri, uel molles fiant, partim materia in causa est, partim uero id, quod materiam fingit, & fornat. Nam si fuerit materia tenax, & calor tantus, ut ex ipsa humorem exhaurire queat, uehementer constringitur, & in se cogitur, fitq; ex ea lapis densus, & durus. Sin leuioris parum admodum, aut nihil habuerit, & calor fuerit multus, aquam etiam si probè terræ permista sit, absimit, & resoluit, terram uero comburit. quo fit, ut lapis adeo mollis fiat, & fiabilis, ut faciliè in puluerem redigatur. Obdurescunt ad hæc lapides frigore, utpote quod succum ualidissimè cogat, & constringat. Atq; ij lapides, qui ex huiusmodi succis coactis concreuerint, in fornaces ardentes coniecti liquefunt, fluuntq; ob conclusos humores. Qui uero igni admoti franguntur, & dissiliunt, non quidem tantum humoris in se continent, quantum priores, ut eo terrene partes cohiberi possint. Quos autem ex luto genuit calor, ignis terit in puluerem, propter terrenam siccitatem. Ceterum qui ex succis pinguibus, & bituminosis constant, accensi non secus ac ligna ardent. Cuius generis est gages, latapis, quo Cimbri, & alij pleriq; Germaniæ inferiores populi passim lignorum uice, quorum inopiam habent, ad ignem utuntur.

Lapidum diuersa discrimina.



utuntur. Verum eniuvero non ob id tanta est ignium uis, ut adamantem uincat: quandoquidem huius humor ignis calore fortior existit. Eandem etiam ob causam amiantus non modo non comburitur igni, sed ne quidē dissoluitur. Vterque enim etsi siccus, cum tangitur, esse sentitur; tamen humorem immixtum obtinet, non aliter atque metalla. Porro lapides, qui corpora erodunt, ut in Lycia inueniunt, uel absument, ut Afsius, in quo corpora defunctorum condita absumi tradunt, unde illi sarcophagi nomen, ex materia admodum acri gignantur, ut in fodinis quibusdam cadina quædam inuenitur, quæ fossoribus ipsis manus erodit, & exulcerat. Postremo nonnulli lapides sunt, qui ueluti prægnantes lapillum, uel argillam, uel liquorem in utero gerunt. Cuius rei causa est & materiæ diuersitas, & quod eadem magna ex parte figuram globosam referat, aut quam proximè accedat. Materiæ enim pars interior ab exteriorē differens, aut calore cocta mox diuiditur, aut aliquo post temporis spatio separatur, non secus ac arefactæ nucis auellane nucleus à putamine. Quod si fuerit succus, uel lutum tenax, ipsa etiam pars interior in lapidem cogitur, ut in actite uisitur: si uero lutum non tenax, uertitur in terram plerunque argillaceam, ut cernere licet in græde: si succus tenuis, uel aqua, liquor interdum remanet, ut in enhydro, in quo ad motum fluctuat intus, ueluti in ouis liquor, ut inquit Plinius. Cæterum cochleas in saxis repertas, calor conclusus, ex materia pingui, & lenta efficere uidetur, & ex eadem gignere musculos, & conchylia: sed terra quantò est crassior, quàm mare, tantò ea magis imperfecta gignit. Nec mirum cuiquam esse debet, quod eiusmodi conchylia in lapidum medio orta, ibi diutius conclusa, ipsis cedente lapidibus, crescant, & uiuant. Siquidem ego certò testari possum, me uidisse non longè à Timæo fonte prope Diuinum castrum in Adriatici litore situm, ubi maris alluit unda, lapides à sociis malleis ferreis frangi, atque in illis plurima reperiri conchylia, quæ dactylos à forma, & colore uocant: sunt enim palmarum caryotis similia. Hæc eadem me aliquando comedisse memini in castro Goritiæ in opiparis mensis illustri, ac clari comitis Francisci à Turri nostrorum studiorum (quæ eius est singularis humanitas) fautoris, promotorisq; maximi: quæ sanè non minorem quàm ostrea, in cibis gratiam habere comperi. In ipso quoque Diuini castro ipsdem uesci mihi contigit apud magnificum Matthiam Hofferum, uirum sanè nobilitate & moribus insignem. Neque me fugit, his nuper elapsis annis uirum magnificum atque præclarum Didacum Mendozium Hispanum, lapideas quasi tabellas mihi ostendisse ex Veronensi agro (ut assererat) delatas, quæ in longum scisse uarios intus pisces ueluti insculptos habebant, cum omnibus suis particulis quânuis minimis in lapidem uersos. tot tanq; admirabilia sunt opera naturæ. Huc præterea illud accedat, quod pisces fossiles reperiuntur ultra Pyrenæos montes, ut narrat Polybius lib. xxiiii. suarum historiarum. Usque ad Narbonem omnem, inquit, planities est, per quam flumini feruntur Illiberis & Rhoscinus, fluentes propter urbes eiusdem nominis, quæ habitantur à Celtis. In hac igitur planitie sunt pisces fossiles dicti. in ea enim est terra tenuis, ubi multum nascitur gramen, sub quod altitudine duorum uel trium cubitorum per arenam aqua fluminis delata fluit: & si quando inundauerint, cum aqua pisces terram subeunt (nam inirrisce appetunt graninis radices) planitiem efficiunt repletam piscibus subterraneis, quos incolæ effodiunt. hæc Polybius. Quibus adde, quod etiam pisces fossiles inueniuntur circa Heracleam, atque in alijs plerisque Ponti locis, ut Theophrastus est auctor. quin & in Germania ultra Albim fluium quibusdam in locis hac ætate effodiuntur. Verum quandoquidem Dioscorides in hoc quinto libro scripsit tractauitq; etiânum de uarijs terrarum generibus, quæ in medicum usum ueniunt, non alienum fore iudico, quod de his quoque uniuersim aliquid differamus. Terram itaque aut simplicem, aut compositam esse oportet. Simplicem nunc eam intelligo, quæ cum nulla re fossili, neque cum aliquo liquido succo fuerit permixta: non autem eam, quæ à cæteris elementis si penitus munda. quippe ob continuam elementorum mixtionem uix ullam reperiri posse putauerim, quæ nonnihil aque, aeris, uel ignis non complectatur. Quamobrem eam simplicem dixerim, quæ nullam prorsus aluminis, aut salis, aut nitri, aut chalcanti, aut bituminis, aut cuiusuis alterius rei metallicæ mixtionem admiserit. Contrà compositam appellauerim, quæ unum, uel plura ex his in se receperit. Simplex autem terra, de qua nunc sermone habemus, in modò grauis, modò leuis constat, pro maiori, aut minori elementorum mixtione, quæ illi inest. quis enim dubitet, quin ea sit leuior, ac rarior, quæ plus aeris, aut ignis participat, quàm aqua? Ad hæc terra ipsa per se omnis exccat, sed uarias sortitur facultates pro uaria eorum, quæ ei admiscuntur, qualitate. Nam illa, in qua sit aqua frigus, adstringit: quæ ignem accepit, acris est: quæ aerem, glutinosa, & leuis: quæ aerem & ignem, leuis, & acris. Illa uero, quæ sibi sulphur adiunxit, aut alumen, aut chalcantum, aut metallum aliquod uel fossilem succum, facili quidem gustu, ac etiam olfactu cognosci potest. Nec de his plura dicenda sunt, quod mihi plane persuasum est huiusmodi qualitates nulli non cognitu faciles futuras, gustu duntaxat iudice, qui tamen dulcia ab amaris, acris ab acidis, salsa ab insipidis, acerbæ à maturis discernere sciat. Terræ autem, quarum in medicina est usus, sua mutantur nomina partim à locis, ubi effodiuntur, & asportantur: partim à coloribus, quibus insciuntur: partim à facultatibus proprijs. A locis enim denominantur Lemnia, quod ex Lemno insula deferatur, Samia quod ex Samo, Chia quod ex Chio, Cimolia quod ex Cimo, Eretria quod ex Eretria Eubœæ ciuitate, & Pnigitis quod ex Pnigite Libyæ pago. A colore appellationem trahunt rubrica, & aliæ nonnullæ. A facultate deniq; nomen accepit ampelelitis, quod eius sit usus ad illinendas uites sub germinationis tempus aduersus erucarum iniurias. Et ut aliorum quoque fossilium colores percurramus, colore albo constant, creta, qua sarcinatores utuntur, gypsum, alumen, amianthus, Arabicus lapis, Iudaicus, melitites, galactites, alabastrites, crystallus, argentum, argentum uiuum, stagnum, & sincerissimum marmor. Colore cinereo produntur melia terra, & Eretria altera. Cæruleo uero colore spectantur sapphirus, cyaneus, & lapis propriè cæruleus dictus. Virent smaragdus, prasius, chryfocolla, & chalcantum. Flavoluteo colore sunt aurum, ochra, chrysopatius, chrysolithus, & auripigmentum. Rubeo tinguntur rubini, granati, sandarachæ, corallium, hematites, scissilis lapis, minium, cinnabaris, rubrica, & Lemnia terra. Quædam colore purpureo fulgent, ut hyacinthus, & amethystus. Alia cæruleo diluto uisuntur quemadmodum iaspis, quem boream dicunt. Nonnulla cæruleo uirescente, ut ærugo, & Armenius lapis. Alia albo rufescente, ut aphrodisiæ.


Terrarum breuis enarratio

Quædam



Quædam rufo candicante, ut xanthos. Quædam nigro rufefcente, ut tertia batrachitis species. Aliqua atro purpurafcente, ut alabandicus lapis. Alia aureo candicâte, ut topatius. Sed plura separatos colores habent, ut nigro, albo, & quouis uersicolore, ut achates. Apſistou uerò nigram rubentes uenæ distinguunt. Contrà nasomonites, cum sit sanguinis colore, nigris uenis decoratur. Venæ autem, quæ speciem præ se ferunt sanguinis intextæ, quodammodo sunt heliotropijs, corpore porracei coloris. At in cæruleo sapphiro aurea puncta collucent. Quinetiam quædã sunt, quæ tres separatos habent colores: nam per album ægyptellæ corpus duæ uenæ permeant, altera nigra, altera rubra. Porro eupetalos, & orca quatuor habent colores: eupetalos enim cæruleum, igneum, minij, mali: orca uerò nigrum, fuluum, uiridem, candidum. Versicolores postremo nonnullæ habentur, non aliter, ac collum gallinæ Numidicæ, uel pauonis, aut columbæ in sole apricantis, ut cristalis, & pæderotum genera: ea enim ad inclinationem colores permutant. Ceterum sciendum est, quod ex fossilibus, quæ in medendi usum recipiuntur, alia quidem corpora sanant, alia uerò eadem affligunt, in cibis uel potionibus data. At quæ remedia corpori sunt, medentur ei partim proprietate totius substantiæ, partim qualitate aliqua, qua profligantur morbi. Quæ autem proprietate ualent, earum quædam resistunt uenenis, quædam morbos sanant. Quibus natura dedit uires superandi uenena, eorum alia corpora, quæ pestilentia sunt affecta, curant, ut smaragdus, sigillium Lemnium, gleba Armenia. Alia singulari ueneno medentur, sicuti scorpionum ictibus sapphirus potus, sulphur plagæ illitum: fungus strangulantibus nitrum potum, ac pariter atramentum sutorium. Alia pluribus aduersantur uenenis, ut sal morsibus uiperæ, cerasitis, ac crocodili. his enim emplastri modo imponitur: sed potum opio, & fungis præsidio est. Quibus uerò fossilibus comparatum est, ut morbos proprietate fugent, eorum quædam sanguinis profluuium sistunt, ut hieracites. alia os uentriculi gestatu & appostu roborant, uelut iaspis. alia sinistro mulieris brachio adalligata abortum prohibens, ut æcites. alia item ad femora præguantis alligata partum accelerant, ut idem æcites, & iaspis. Sunt quæ crassa & corporibus deiciunt, ut magnes: alia atram bilem, ut Armenius, & cæruleus lapis: nonnulla uomitû faciunt, ut idem Armenius lapis, chrysocolla, & chalcantbû. Sed inter ea, quæ elementaribus qualitatibus agunt, calefaciunt alumen, chalcantbû, chalcitis, misy, sory, melanteria. refrigerant terra Eretria, molibdoides, stibium, argenti spuma, cerussa. Quæ autem secundis qualitatibus operantur, quædam molliunt quæ dura sunt, ut gagates: quædam contrà indurant quæ mollia sunt, ut lapis plumbarius, & stimmi. Sunt & quæ insensibiles ferè poros aperiant, & quæ claudant: aperit enim nitrum, spuma nitri: claudit terra Samia, & in summa omnis terra glutinosa. Alia, quæ corpori coherunt, nempe glandulas, & nodos, discutunt, ut pyrites, molaris, bitumen. Aliqua cicatricem inducunt, ut chalcitis, misy, alumen scissum. Nonnulla carnem excrecentem minuunt, ut asij lapidis flos, ærugo, chalcantbû, chalcitis, misy, calx uiua, auripigmentum, sandaracha, chrysocolla. Non desunt etiam, quæ diuersis uiribus prædita sint, ut cimolia, & sal: cimolia enim & reprimat, & discutit; sal abstergit, & adstringit. Sunt deniq; quæ uires easdem habent, ita ut deficiente una, altera eius locum suppleat. Siquidem chrysocolla, & lapis Armenius eundem effectum præbent: auripigmentum, & sandaracha: hæmatites, & schistos: atq; hæc quinque, chalcantbû, misy, chalcitis, sory, melanteria inter se uiribus consentiunt. Veruntamen ex his chrysocolla, auripigmentum efficacior em obtinet, quàm lapis Armenius: auripigmentum, quàm sandaracha: hæmatites, quàm schistos: chalcantbû, quàm reliqua sibi cognata. Ceterum non pauca reperimus uir fossilium medicamenta (ut fusius libro sexto dicitur) quæ in cibo, aut potu frequentius, aut copiosius sumpta, uel maxime sumentes, uel ipsi mortem inferunt. Idq; efficiunt, uel quod uiscera erodant, ueluti sandaracha, & auripigmentum: uel quod spirandi organa occludant, ut gypsum, & cerussa. Sed hæc de fossilium facultatibus. Nam de concretis succis, cuiusmodi est sal, nitrum, alumen, chalcantbû, & cætera, quæ cum eo cognitionem habent, sulphur, sandaracha, auripigmentum, chrysocolla, & alia nonnulla, in huius libri processu suis locis latius tractabimus.

## VITIS VINIFERA.



## Vitis Vinifera.

## Cap. I.

FOLIA uitium, & triti capreoli, capitis dolores illitu mitigant: & inflammationem stomachi, ardoremque cum polenta. Folia etiam per se, ut quæ refrigerent, & adstringant, imponi solent. Potus eorum succus: dyfentericis, sanguinem excreantibus, stomachicis, & grauidarum malaciæ medetur. Eadem efficiunt maderacti in aqua capreoli, & poti. Lacryma uitium, quæ ueluti gummi in caudicibus concrefcit, ex uino pota calculos pellit: illita lichenas, & pſoras, leprasque, nitro prius perfrictas, sanat: eadem cum oleo sapius pilis illitis, pſilothri effectum habet: maximeque sanies, quam accensa



ensa sarmenta uitium uiridia exudarunt : qua & perunctæ uerrucarum informicationes extrahuntur. Cinis sarmentorum, & vinaceorum, detractis in sede condylomatis, & thymijs, illitus ex aceto medetur : prodest luxatis, & uiperarum morfibz : contra lienis inflammationem illinitur cum rosaceo, & ruta, & aceto.

## Labrusca.

## Cap. II.

**LABRUSCA** duorum generum est. Alterius uia non maturefcit, sed florétenus cenanthen nominatam perducit. Altera ad frugem peruenit, paruis acinis, nigra, & adstringens. Folia, caules, & clauiculæ, quibus repunt, uim habent cultæ uiti similem.

## Vua.

## Cap. III.

**VVAE** recentes aluum turbant, & stomachum inflant. innocentiores, quæ decerpitæ diu pependere, ideo quod in eis copia humoris exiccatur, utilesque sunt stomacho, ægrisque, atque cibi auiditatem excitant. In vinaceis, & ollis seruata, ori & stomacho gratæ sunt, aluum sistunt, sed vesicam, & caput tentant : & sanguinem excreantibus conueniunt. Similesque, quæ in musto fuere. Sapa, aut passio conditæ, stomachum magis infestant. At quæ solem prius passæ, in aqua cœlesti conduntur, minus vinosæ sunt, siticulosæ, ardentibus, & longis febribus salubres. Reconditi vinacei inflammationis mammis, rigentibus, ac præduris, cum sale illinuntur. Decoctura eorum dysentericos, cœliacos, & fœminas fluxione vuluæ laborantes iuuat infusa : ad defefsiones, ac fots assumitur. Nuclei acinorum adstringendi uim obtinent : stomacho vtiles sunt. Inspargitur farina tostorum, potentæ modo, dysentericis, & cœliacis, & solutis stomacho.

**VITIVM** omnium genera, quæ non modò gratissimas, dulcissimasque uuas ad cibos proferunt ; uerum etiam ex his uinum præcipuum humane uitæ bonum, suauissimumque potum largiuntur, quot & qualia sint, hic scribere superfluum esse puto. Quandoquidem earundem dulcedine humanum genus allectum, adeo eas sibi conciliauit, familiaris que reddidit, ut nullus tam clarus quam obscurus, tam nobilis quam ignobilis, tam denique urbanus quam rusticus inueniatur, qui de uitium generibus, earumque historia non possit aptè, atque etiam distinctè loqui. Vt autem & uites ipse & uinum à quorundam uermiculorum erodentium uindicerentur iniuria, illud omnino silentio inuoluendum non duximus, quod si, dum à sarmentis repurgantur, ac putantur, falx hirci sanguine oblinatur, uel ea ipsa prius cotem exserta, castorei corio affricetur, nuper emissæ gemmæ (si tanta rei agrariæ auctoribus fides adhibenda est) ab erudum est, quod magna admodum iniuria uitibus infertur, atque uuis maximum detrimentum, si brassica seratur inter uites. siquidem perniciole uni cum altera odium intercedit. Quod cum animaduernerint rei medicæ scriptores, præcipuum ebrietatis antidotum in brassica collocarunt. Ea enim si eruda præsumatur (ut apud plerasque nationes in cœne initio capitata brassicam minutim rescissam, lactuca & intubi loco in acetarijs recipi obseruauimus) ebrietatem suam mirum in modum arcet, quemadmodum etiam post sumpta crapulam discutit. Quo fit, ut Germaniæ populi uino admodum addicti, semper suis mensis brassicam interponant, uel recentem, uel nuria asseruatam. Ad Elephantem (ut Theophrastus est auctor) itemque circa Memphim, uites perpetua fronde uirent : tametsi annuas tantum proferant uuas. In Italia uero uites habentur, Plinio insanæ appellatæ, quæ ter in anno florent, sed primas tantum maxime uuas. Uuas sine uinaceis quidam prouenire affirmant, si propaginum ima pars, quæ terra in scrobe obrui debet, ante plantationem adeo secetur in longum, ut medulla utrinque eximatur, ac deinde coniunctis partibus, et ulneo cortice circumuolutis, propagines ipsæ suis scrobibus implantentur. Sed ut iam uuis suas reddamus facultates, Vuae (ut Galenus libro II. de alimentorum facultatibus memoriæ prodidit) quemadmodum inter fructus autumnales præcipuam obtinent ; ita fugacibus omnibus magis nutriunt, minimumque prauis succi habent, præsertim cum exactam maturitatem fuerint adeptæ. Porro quod ipsæ nutrant, maximo argumento sunt ij, qui uinearum fructum custodiunt : quippe qui tunc temporis uuarum esu admodum pinguescant. Ceterum non omnes uno quidem modo nutriunt, quoniam quæ dulces existunt, cæteris succum habent calidiorem : ob id sunt siticulosæ, ac uentriculum inflant, & aluum subducunt. Contrarium efficiunt austere : siquidem, & uentrem cohibent, parum nutriunt, ægreque concoquantur. Acerbæ autem uitari prorsus debent, utpote quæ uentriculo aduersentur. Vuae eò laudabiliores, quod carnosiores fuerint, præsertim cum probè mature à uite decerpuntur. At pensiles, si prius mature sint, & dulces, cæcis minus uentriculum inflant, & aluum conuenienter emolliunt. Vitis, quæ Græcis ἀμπέλος οἰνοφόρος, Id est Nomina. Vitis uinifera appellatur ; Arabibus, Harin, Karin, seu Karm : Italis, Vite uinifera : Germanis, Vueinreb : Gallis, Vigne. Quæ uero ἀμπέλος ἀγρία Græcè, Labrusca Latine dicitur : Italicè, Lambrusca : Germanicè, Wild ueinreb : Gallicè, Vigne sauuage. At Vua Latinis ac Italis, σαπυλή Græcis uocatur : Arabibus, Haineib, Germanis, Veinbeer : Gallis, Roisin.

Vitis uinifera uuasque consideratio.

Vuarum facultas ex Gal.



## Vua passa.

## Cap. IIII.

VUA PASSA alba adstringentior est. Prodest esitata caro earum tussi, faucibus, renibus, ac vesicæ. Estur in dysenteria per se cum nucleis: & decocta in patinis cum melle, admista milij, ac hordei farina, & ouo, ualet ad purgandum caput: eiusdem gratia cum pipere commanducatur. Testium inflammationes sedat, illita cum lomento fabarum, & cumini farina. Fauos, epinyctidas, carbunculos, enatas in articulis putredines, & gangrænas, sine nucleis trita, & cum ruta imposta sanat. podagræ conuenienter cum panacis succo illinuntur: mobiles vngues illita, celerius extrahit.

Vua passæ cōsideratio.

VVAS PASSAS, quarum ubique vulgaris & frequens est usus, omnibus notissimas esse arbitror. Veruntamen non est, meo quidem iudicio, credendum, quod cum de Vuis passis mentionem faciunt Galenus, & ueteres alij, paruulas illas tantum intelligant, quæ hoc tempore ex quibusdam Aegæi insulis, ac Peloponneso Venetias conuehantur, & in quibusdam etiam Italiæ locis insolantur. Siquidem Galenus nulla magnitudinis, uel paruitatis habitatio ne, omnes in uniuersum uuas solis calore siccatas, passas appellat. Id quod ipse Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus ijs uerbis declarat. Porro quemadmodum passarum differentia, quæ à colore sumitur, nihil ad passarum facultatem confert, ita nec magnitudo: sola autem qualitatis, quæ gustui inest, differentia potest omnia. Ex his nimirum Galeni uerbis satis colligi potest, ipsum omnis generis uuas, quæ solis feruore flaccescunt, nullo prorsus discrimine passas appellasse, nempe Damasceñas cæteris grandiores (xibum officinæ uocant) ac pariter his congeneres, quæ à Smyrnis (ut aiunt) Cypro, & Creta comportantur. Præterea loco citato idem Galenus ita scribit. Nonnulli autem, & recte sanè, è dulcibus, grandibusq; quales sunt scybelitides, priusquam mandant, semina eximunt, quæ & ipsæ inueteratæ, cutim duram, crassamq; habent, easq; prius in aqua coguntur macerare: nam & semen ipsum facilius sic eximitur. Aliæ quædam sunt his contrariæ, solidæ, & crassæ, quæ nullum prorsus semen habent. Crescunt hæ in Cilicia, colore subflauo. In Pamphylia autem scybelitica, & colore nigre: quæ, ut dixi, sunt maximæ. hæc ille. Cæterum sciendum est, non omnes Vuas passas eiusdem esse facultatis. alia nanque facultas inest dulcibus, alia austeris, alia uinaceos habentibus, alia non habentibus. Quæ itaque uinaceis carent, uel quod ita natura producantur, uel quod ij arte fuerint exempti, si dulces sint, adstringente facultate usque adeo priuatur, ut etiam mirifice leniant. quamobrem pectoris angustia, tussi, exasperatis faucibus, & renum, uescicæq; uitijis maximè conueniunt. Id quod planè confirmat Galenus libro septimo, & octauo de compositione medicamentorum secundum locos, ubi uuas passas sine uinaceis leniendo pectori, ac iecinorosis plurimum commendat. Contrà uerò facultate omnino adstringente censentur, quæ cum suis uinaceis manduntur. Quod cum non ignoraret Dioscorides, Vuam passam cum nucleis in dysenteria edendam esse tradidit. Hinc itaque fit, ut maximo in errore uersari existimem medicos aliqui ætatis nostræ celebres, qui alui deijciendæ gratia, Vuam passam paruam uulgarem, quæ ex locis supra dictis in Italiam defertur, simul cum uinaceis deuorandam exhibent. quippe cum aluum fluidum facere in animo sit, eam potius cohibent, quàm leniant: idq; potissimum, ubi uua passæ temporis tractu succi partem amiserint. Quare perpessus in hanc sententiam deducor, ut ad aluum euolliendam aptiores censeam Damasceñas, Cyprias, ac Creticas (quibus tamen prius nucleis exempti sint, uel ea sumantur, quæ sine nucleis nascuntur) quàm quæ minutæ passim in officinis inueniuntur. quandoquidem hæ succi longè minus, quàm corticis, & uinaceorum continent, nisi sint omnino reuocantes, & diligenter asseruate. Quapropter si hoc tenui uuarum passarum genere uti quandoque cogimur ad emolliendam aluum, eas eligi præstat, quæ sine uinaceis proueniunt: uel si hæ defint: suppleant illæ, quæ à nucleis fuerint expurgatæ. tametsi Damasceñas, & Creticas longè bonitate cedant: de quibus sanè intellexisse Galeuū, easq; ad peccoris uitia laudasse planè suspicamur. In quorum genere hæc etiam tempestate sunt, quæ semine carent, quemadmodum quæ Galeni ætate ex Cilicia conuehebantur. Illud porro animaduertendum est, quod ubi quis aluum bonam facere contendit, non debet passis uti, quæ gustui acerbicatem, uel austeritatem relinquunt: sunt enim tales frigide, ac terrestres. quibus utique facultatibus cohibent, adstringunt, & roborant, præsertim si cum uinaceis nucleis comedantur. Vnde scitè Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus, hæc prodidit. Vua passæ cum alijs uuis eadem habent rationem, quam caricæ cum ficibus. Multæ enim sunt dulces, acerbæ autem omnino pauca: plurimæ uerò ex dulci, & austera qualitate sunt mistæ. quanquam dulces nonnihil quoque austere qualitatis habent: & austera, dulcedinis. Cæterum ut dulces temperamento sunt calidiore, ita austera frigidiora. Ad hoc austere stomachum roborant, & uentrem constipant, & his multò magis acerbæ: mediam autem quodammodo inter ipsas constitutionem dulces obtinent, ut quæ nec stomachum dissoluant, nec aluum subducant. Dulcibus tamen, ut uis quædam semper inest contemperandi, ita & mediocriter detergendi: quibus duabus facultatibus exiguas mordicationes, quæ os uentris thoracis tamen, & pulmonis affectibus conducunt. De uuis autem passis, ut cibus sunt, locutus est ipse Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus, his uerbis. Alimentum ex passis uuis tali qualitate in corpus distribuitur, qualis

Medicorum error.

Vua passæ uires ex Gal.



qualis ipsarū natura fuerit, dulce ex dulcibus, austerū ex austeris, mistum ex ijs, quæ utriusque qualitatis sunt participes. Quantitate uerò copiosius ex pinguibus, ac dulcibus: parcius ex austeris, & macris. Quod si passarum pinguium, ac dulcium, à quibus semina fuerint exempta, parem inolem cum pari uuarum mole contuleris, passas ualentius nutrire deprehendes. Huiusmodi sanè, ut minus quàm carica subducant, abstergeantq; magis tamen quàm illæ stomachum iuuant. Hæc uua, quæ Græcis σάπης, Vua passa Latinis pariter ac Italis uocatur: Arabibus, Zibib: Germanis, Vucinbeerlen, Mertreubel, & Kosein: Hispanis, Passas: Gallis, Roisins en captz.

Nomina.

## Oenanthe.

## Cap. V.

OENANTHE vocatur vitis sylvestris fructus, cūm floret. Recondi debet fictili non picato, collectaque substrato linteo, in umbra siccat. Laudatissima in Syria, & Cilicia, & Phœnice. Vis ei adstrictoria: quare pota stomacho, ac ciundæ vrinæ utilis. aluum sistit, ac sanguinis excretionem. Contra fastidia, & acorem stomachi, sicca, & illita efficax est. capitis doloribus tam viridis, quàm sicca ex aceto, & rosaceo perfunditur: sanguinolenta vulnera cataplasmate, & incipientes ægylopos, oris vlcera, & genitalium nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo ab inflammatione vindicat. Pelsis miscetur ad sistendum sanguinem: contra oculorum delacrymationem, & stomachi ardorem cum polline polentæ, & vino illinitur. Cinis crematæ in testa candentibus prunis, facit ad oculorum medicamenta: reduuias, & pterygia, abscedentes gingiuas, cruentasq; cum melle sanat.

OENANTHEN non illius labruscæ modò florem esse, quæ uuas ad maturitatem non perducit; uerū etiam alterius, quæ fructum perficit, asserere non dubitamus. Nam etsi superius scripsit Dioscorides, labruscam duorum generum esse, atque alterius uuam non maturescere, sed florētē uua Oenanthē nominatam perducere: nihil tamen propterea prohibet, quin alterius quoque labruscæ florentis uua Oenanthē pariter dici queat, cūm non aliud ueteribus significet Oenanthē, quàm uitis flos. Quod in præsentī capite ipse Dioscorides manifestè declarat: quippe qui tradat Oenanthē uocari uitis sylvestris fructum, cūm floret, nullius facta generis distinctione. Quin & idem in sequentibus confirmat, ubi uini oenanthini meminit, ē feracis sylvestris uitis floribus fieri scribens. Ex his itaq; abunde constare arbitror, nō tantū infructiferæ, sed etiam fructiferæ labruscæ florem Oenanthē uocari posse. Adde quod id quoque apertè testatur Galeus lib. v. cap. i. de compositione medicamentorum secundum locos, his uerbis. At uerò quemadmodum omphacium, sic etiam absinthij succo admisceo, quandoque etiam ambo, & tertium insuper hypocistidis, & quartū oenanthē. sic autem appello uitium sylvestrium germen unā cūm floribus, ex quo succedentibus diebus uua fit. Plinius lib. xii. cap. xxviii. Oenanthē uuam, non florem esse censet sic inquit. Eodem & Oenanthē pertinet. est autem uitis labruscæ uua. Colligitur cum flore, cūm optimè olet. hæc Plinius. In cuius ultimis uerbis suspicor mendum subesse, & fortè rectius legendum esse, cūm floret, non cum flore. Non enim uideo, quomodo quis unquam uuam cum flore colligere possit. Caterū ne aliquis fortasse decipiat, hic non dubitamus silentio dissimulandum esse lapsum Marcelli Vergilij, alioqui doctissimi interpretis, & commentatoris Dioscoridis. Is autem ex eius uerbis, quæ nunc subiiciam, magis innotescet. Monemus, inquit, scribere in vi. suæ medicinæ Paulum Aeginetam plurimum quidem ex labruscæ Oenanthē usum esse, quoniam egregiè adstringit, stomachumque, & aluum maximè format. Veruntamen traditis his, idem statim subiicit. Dioscorides autem aliam describit Oenanthē contrarias huic uires habentem. ideoq; secundis, stillicidio uestica, & follis suffusionibus eam mederi ait. Quorum nihil in capite hoc legitur, neque in scriptore hoc alibi legisse me memini, & nihilominus non negligenda. Aeginetæ auctoritas, & testimonium est, quem credere oportet uera, & quæ aliquando legisset, testari. hæc Marcellus. In quibus sanè uerbis euidentissimè deprehenditur hallucinatus, uel potius eorum oblitus, quæ de Oenanthē herba uiribus huic cōtrarijs prædita, memoriæ prodidit Dioscorides libro tertio. Neque solum huius, quàm tamen Latinam fecerat, non meminisse uidetur; sed neque eorum quoque, quæ ibidem in sua commentatione doctè satis scripsit. Sed aliquando etiam bonus (ut aiunt) dormitat Homerus. Illud postremo addiderim, quod etiam domesticæ uitis flos Oenanthē dicitur. Verū quia sylvestris uitis ui multo magis adstrictoria pollet, is per excellentiam Oenanthē appellatur. Dicitur igitur Græcis οὐρανός: Latinis, Oenanthē, & Labruscæ flos: Italis, Enanthē: Germanis, Vuild reben: Gallis, Grappe de uigne sauuaqe.

Oenāthes cōsideratio.

Marcelli Vergilij lapsus.

Nomina.

## Omphacium.

## Cap. VI.

OMPHACIUM succus est acerbæ uuæ nondum maturescētis, ē Thasia vite, aut Aminæ. Oportet autem ante Canis ortum, expressam melliginem in rubro ære, linteo cooperto, insolare, usque dum cogatur: semperque quod ceruici uasis concretum hæsit, reliquo humori permiscere: noctu uerò à subdialibus locis in tectum referri, quandoquidem nocturni rores ipsum concrescere non sinunt. Eligendum est flauum, friabile, vehementer adstringens, & linguam mordens. Sunt qui coquendo melliginem cogant. Prodest contra tonsillas, uuam, vlcera oris, humida gingiuarum uita, purulentas aures cum melle, aut passo: item ad fistulas, vetera vlcera, nomasque ex aceto. dysentericis, & mulieribus fluxione. vuluæ laborantibus clystere infunditur: oculorum claritati, & scabritiæ, & erosionibus angulorum conuenit. Bibitur ad recentem sanguinis excreationem, etiam si rupta parte aliqua contingat: sed pauco, & aquatiore est utendum, valde siquidem exurit.

Hh 2 OMPHACIUM



Omphacij  
consideratio.

OMPHACIVM ex omni immaturarum uuarum genere parat Italia, cum Thasijs, & Amineis careat uuis, è quibus ueteres suum Omphacium conficiebant, ad medicinæ duntaxat usum, id in sole cogentes, ubi uidelicet adstrictione opus erat. Quæ tamen parandi ratio hoc tempore ferè prorsus exoleuit. Sunt qui ut maiorem omphacio adstrictionem comparent, è syluestrium uitium uuis illud exprimant, non ad medicamenta tantum, sed etiam ad ciborum condimenta. Verum omphacium nostrum sole non cogitur, etsi pluribus diebus ipsum in solari dimittamus suis cum uinaceis in cado, crasso linteamine cooperto, donec excrementa subleuentur, fæx uerò subsidat, & inclarescat succus. Siquidem hac parandi ratione absq; sale per annum incorruptum asseruatur tam ad ciborum, quàm ad medicamentorum usum. Omphacium (ut Galenus memorie prodidit lib. IIII. simpl. medic.) calidis morbis omnibus magno inuamento adhiberi potest. quippe cum id omnino acidum sit, perfecte etiam refrigerat, uniceq; ardoribus prodest, siue ori uentris inpositum, siue totis hypochondrijs, siue cuilibet alij, quod refrigerare uelimus. Id Græci ομφακον dicunt, quod Latini item Omphacium: Itali, Agresto: Germani, Agrest: Hispani, Agraz: Galli, Veriust.

Omphacij ui  
res ex Gal.

Nomina.

## Vini natura.

## Cap. VII.

VINO vetere nerui læduntur, & reliqui sensus; quod tamen gustu suauius est: quare cauendum ijs, qui intestinæ alicuius partis imbecillitatem sentiunt. attamen in secunda valetudine paucum aqua dilutum, innoxie sumitur. Nouum inflat, ægrè coquitur, insomnia parit grauiora, & vrinam ciet. Actate medium utraque uitia fugit: quare ad victus sanorum, ægrorumque vsurpatur. Album, tenue, stomacho utile, ac facile in membra distribuitur. Nigrum uerò crassum est, & concoctu difficile, carnem alit, & ebrietatem creat. Giluum, utpote quod medium est, medias inter utrumque vires habet. In secunda tamen, & sinistra valetudine, cum primis laudatur album. Quia & vina sapore distant. Siquidem dulce crassis partibus constat, & difficiliter à corpore expirat: stomachum inflat, aluum & interanea ut mustum turbat, sed minus inebriat: renibus, & uesicæ aptissimum. Austerum per vrinam celerius transit: sed capita dolore tentat, & temulentiam gignit. Acerbum ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum: aluum, & cæteras fluxiones cohibet, minusque vrinam expellit. Nouum neruos minus tentat. Vinum aqua marina factum stomacho aduersatur, sitim stimulat, neruos infestat, aluo aptum, à valetudine se recolligentibus inutile. Passum, quod uis sole siccatis in area, aut in sarmento torrefactis exprimitur, Creticum cognomine, aut pramnon, aut protropon: & sapa, quæ sit musto igni decocto, Græci sirion, aut heplema appellant: nigra quidem, & quæ dicuntur melampsithia, crassa sunt, & corpora multum alunt: candidum tenuius: & heluola inter hæc media, medias sortiuntur vires. Omnia tamen adstringunt, & pulsus reuocant. faciunt aduersus venena, quæ exulcerando necant, ex oleo pota, & vomitionibus reddita: contra cicutas, meconium, pharicum, toxica, & concretum in grumos lac: item contrarium, & uesicæ pruritus, rosiones, exulcerationesq; inflat tamen, & stomacho aduersatur. Priuatim, prodest melampsithium, si venter rheumatismum sentiat. Album magis cæteris emollit aluum. Gypso conditum neruis officit, caput aggrauat, & incendit, ac uesicæ aduersatur: contra uenena cæteris aptius. Picata, aut resinata excalfaciunt, concoquunt: sanguinem excreantibus inimica. Quæ uerò aparachytæ vocant, ut quæ admistam saponem recipiunt, caput implent, temulentiam gignunt, ægrius in halitum expirant, stomachum male habent. Inter Italica vina Falernum principem locum obtinet: quod inueteratum perquam facile coquitur, pulsus exuscitat, aluum adstringit stomacho utile: sed uesicæ nocet, atque ijs qui uisus hebetudinem sentiunt, & ad potus crebros minime idoneum. Albana crassioribus constant partibus, dulcia: stomachum inflant, ventrem emolliunt, sed concoctionem non æquè adiuuant, & neruosa minus infestant: vetustate eadem austerum saporem concipiunt. Cecubum, cum sit dulce, est & Albano crassius: corpus, & colorem alit: ægrè tamen coquitur. Surrentinum valde austerum est: quare intestinorum, & stomachi fluxiones cohibet, & cum tenue sit, caput minus tentat: inueteratum suauius redditur, & stomacho utile. Adrianum, & Mamertinum in Sicilia æquè crassis partibus gignuntur: modicè adstringunt, & ocysium inueterantur, minusq; ob suam tenuitatem neruos tentant. Paratypianum, quod ex Adriatico sinu defertur, odoratum, ac tenuius est: quare liberaliter epotum fallit, diu seruat ebrietatem, & soporem adfert. Istricum Paratypiano simile est, sed vrinam vehementius pellit. Chium tamen antedictis mollius, & aptum potui est. bene alit, & minus inebriat, fluxiones cohibet, oculorum medicamentis utile. Lesbium facile membra subit, Chio leuius, & aluo idoneum. Ephesium eandem vim habet, quod Phygelites nominatur. Verum Asianum è Tmolio monte, Mesogites appellatum, capitis dolores ciet, & neruos lædit. Coum uerò, & Clazomenium, quoniam multam sibi maris aquam vendicant, facile corrumpuntur: flatus movent, aluum turbant, neruis officiunt. Vinum omne (ut reliqua in commune dicantur) merum, ac syncerum, & sua natura austerum, excalfacit, facile in membra distribuitur, stomachum adiuuat, appetentiam ciborum inuitat, vires alit, ac robur augeat: somnum conciliat, & commendat colorem. Potum liberalius auxilio est contra assumptam cicutam, conriandrum, pharicum, ixiā, meconium, argenti spumam, taxum, aconita, fungosve: contra serpentium morsus, & omnium ictus, quæ refrigerando necant, aut stomachum in vomitiones effundunt. Facit ad longas inflationes, rosionesque præcordiorum, ac distentiones, stomachi resolutionem, & si venter







Ob id ergo mirandum non est, si Plinius magnis laudibus prædicauit Pucinum libro XIII. cap. VI. ubi ita scriptum reliquit. *Liuius Augusta octuaginta duos annos uitæ Pucino retulit acceptos, non alio usæ. Gignitur in sinu Adriatici maris, non procul à Timauro fonte, saxeo colle, maritimo afflatu, paucas coquente amphoras. Nec aliud aptius medicamentis iudicatur. Hoc esse crediderim, quod Græci celebrantes miris laudibus pyctanum appellauerunt ex Adriatico sinu. hæc Plinius. Cuius certè testimonio planè subscribunt rustici Iapidie incolæ: quippe cum ij uinis Pucino cognatis in quotidiano potu utantur, rarissime ægrotant, & longeuam admodum uitam traducunt, adeo ut plurimi reperiantur, qui nonagesimum, & centesimum annum attingunt. Est autem uinum hoc tenue, clarum, lucidum, colore aureum, odoratum, gustuiq; gratissimum. Potum ualenter excalfacit, nisi dilutum fuerit, facileq; in uniuersum permeat corpus. Quamobrem (ut libro tertio simplicium medicamentorum scribit Galenus) tale natura uinum, non modò persfrigeratorum omnium, sed eorum etiam, qui aut ex oris uentriculi, aut cordis dolore animi deliquim patiuntur, præsentaneum fuerit remedium. Ex quibus facile colligi potest, felicissimos esse eos, qui in regionibus, quæ uina optima ferunt, oriuntur, si tamen modeste (ut fieri decet) eis utantur. Cæterum quæ uina in uniuersum quotidiana usui magis conueniant, hic longiori sermone commemorare superuacuum duximus, cum hoc à Dioscoride latius sit proditum, atq; etiam de omnium uinorum uiribus diligentius scriptum, quàm ut plura à nobis referri debeant. Vinum sic Latine, oïvos autem Græcè uocatur: Germanicè, Vwein: Italicè pariter, & Hispanicè, Vino.*

Nomina.

## Vinum Omphacites.

## Cap. VIII.

OMPHACITES nomine, peculiariter fit in Lesbo, siccata sole acri uia, paulò ante maturitatem decerpta, triduo aut quadriduo, donec racemi in rugas contrahantur: expressumque vinum candidis insolatur. Vim adstringendi habet, prodest dissolutis stomacho, & ilei dolore laborantibus: item prægnantium malaciæ, & crudis. in pestilentia quoque sorptum auxiliari dicitur. Huiusmodi uina non nisi post multos annos bibi possunt.

## Lora.

## Cap. IX.

LORA, quam deuterian, alij potimon appellant, fieri solet adiectis metretis tribus aquæ in uinacea, quibus triginta vini metretæ extractæ fuerint: calcatis vinaceis, expressoque decocto ad tertias partes, & additis in singulos congios modi eius qui remansit, binis salis sextarijs, post hyemem transfunditur in vasa. Lora intra annum vtendum: etenim celeriter exolefcit. Conuenit ægris, quibus timemus noxam vini, coacti sæpe desiderijs eorum obtemperare: item à longa ualentidine se recolligentibus. Fit & vinum, quod adynamon vocant, loræ vires habens, hoc modo. Pares aquæ, & multi mensuræ coquantur molliigne, donec absumatur aqua: quod, ubi refrigerit, clutrium picato vase reconditur. Alij marinæ, & cœlestis aquæ, mellis, & multi pares miscent portiones, decapulant, & quadraginta diebus insolant. quo ad annum vtuntur ad omnia eadem.

Loræ parandæ ratio ex Galeno.

LORA alia ratione Galeni ætate, quàm Dioscoridis parabatur. Ille siquidem loram faciendi modum libro II. de alimentorum facultatibus ijs uerbis tradidit. *vinaceorum quoque dilutum Græci τρύφα uocitant. quod rursus ab Atticis Δατρία, à nostratibus σεμυλίτις, id est, lora appellatur. Coniectis namque in parua dolia uinaceis, tantum aquæ superaffundunt, quoad omnia permadeant. Quod ubi satis factum uidetur, in dolij fundo foramen apeririunt, ut dilutum effluat, idq; pro uino bibunt. Perspicuum autem est, quod pro racemorum copia aquam affundunt, experientia docti: quò uidelicet neque aquosa admodum, neque meraca sit lora: Deinde rursus aliam aquam, parciorem tamen priori, uinaceis affundunt, sic ut hoc quoque potioni sit attemperatum: quod quidam Atticæ proprietatis curiosi propriè Δατρία dici uolunt, non ueluti prius illud. Vtraq; lora capiti dolorem adfert, nisi dilutior bibatur, sed prior magis caput ferit. Dos una huic potioni concessa est, nempe quod ocyus per urinam reddatur: sed nò pauca subest diuersitas ex uaria uuarum specie, e quibus uinacei sunt relictæ. Etenim si dulces fuerint, potus multò erit suauior, citiusq; per urinas excernetur: sin uerò acerbæ, & acidæ fuerint, insuauior longè, ac minus ciens urinas. Porro dilutum hoc ualentius uinosiusq; efficitur, cum uinaceus ad uer, aut æstatem fuerit asseruatus. Hyemis autem tempore si quis utatur, ut caput minus tentat, ita & per urinas minus expellitur. Hæc de lora Galenus. Ea Δατρία Græcis, Latinis Lora, & Italis Acquarello appellatur.*

Nomina.

## Vinum è Labrusca.

## Cap. X.

VINUM è syluestri uia nigrum, adstringit: prodest alui, & stomachi fluxionibus, & cæteris, quibus constrictione, & contractione opus est.

NON desunt in Hetruria, qui uinum è Labruscæ uuis exprimant, colore admodum nigro, idq; giluo admiscent, ut rubicundius reddatur. Vtuntur eo rustici in alterius uini penuria. siquidem constat dulce simul, et austerian: uerò riam tractu temporis dulcedinem facile deperdit, sitq; tunc gustui omnino insuauis, adeo ut tantum medicamenti uicem expleat, ubi adstrictione sit opus.

Vinum



## Vinum melitites.

## Cap. XI.

MELITITES datur in longis febribus, quæ stomachum infirmarunt. nanque aluum leuiter emollit, urinam ciet, stomachum expurgat. prodest articulario morbo, renum vitiiis, imbecillio capiti, & mulieribus abstemiis: odoratum liquidum est, & corpus alit. Distat à mulso, quod fit è uino uetere, austero, & melle exiguo. Melitites autem adiecto ad quinque congios austeri multum mellis congio, & salis cyatho. Cortinis magnis, quò magis ad efferuescendum locus pateat, fieri oportet, sensum asperso sale: cumque efferuere desierit, in alia uasa transfunditur.

## Mulsum.

## Cap. XII.

MVLSVM è uetere uino, austeroque, & bono melle factum, præfertur, minus enim inflat, ac celeriter id genus in usum uenit. Vetus, corpus alit. media ætate, aluo prodest, urinam pellit: à summo cibo sumptum, nocet: & inter initia potum, implet: dein appetendi auaritatem reuocat. Fit mulsum duabus uini metretis, admista una mellis. Aliqui, quò celerius præberi possit, mel cum uino coquunt, & ita transfundunt. Alii utilitatis gratia, ad sextarios sex multum feruentis unum mellis addiiciunt: & ubi ferbuerit, uase recondunt. dulce autem permanet.

## Aqua mulsa.

## Cap. XIII.

AQVA mulsa easdem, quas mulsum uires possidet. Cruda utimur cum moliri deiectionem, aut uomitionem incitare uolumus: ut ijs, qui uenena hauserunt, ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominibus elanguescentis pulsus, quos illi dixere microsphyctos, tussientibus, peripneumonicis, & ijs, qui immodico sudore digeruntur. Iam paratum, condituumque, quod aliqui hydromeli propriè uocant, media ætate adynamo uino, aut loræ in recreandis uiribus respondet, & similem uim adipiscitur. quare inflammationibus alicuius membri plusquam lora prodest. Inueterati tamen usus damnatur inflammatis, aut constrictis: sed laboranti stomacho, aut cibum fastidienti, sudatoribusque conuenit. Fit duabus pluuiæ aquæ ueteris ad unam mellis partem additis, & insolatis. Alij fontanam aquam addiiciunt, & ad tertias partes decoquunt, & ita recondunt. Nec desunt qui hydromeli appellent, quòd à melle elutis aqua fauis confici ac seruari soleat: sed meracius confieri conuenit. aliqui id coquunt. Aegrotantibus noxium est, quoniam plurimum ceraginis sibi uendicat.

ALIA sanè Aquæ mulsæ ratio conficienda est apud Mauritanæ familie auctores, ab hac quæ hic à Dioscoride traditur. Inter Arabas nanque Mesues de ea ita scribit. Aqua mulsa, ex antiquorum sententia, magnis utique uiribus prædita est. Sitim etenim arcet, frigidis affectibus, præsertim cerebri, & neruorum, & articularum, auxilium. Loco uini pota, humida extusientibus prodest: quin & pus & lentam, crassamque pituitam e pectore trahit. Intestina, uiscera, urinososque motus purgat, terget, ac lauat: quapropter subuenit coli doloribus, aluum subducit, & calculum gigni prohibet. Fit è libra laudatissimi mellis, non tamen ueteris, colore pallido, odore iucundo sapore cum dulcedine modicè acri, cum aquæ fontanæ libris octo, in uase lapideo, uel fictili uitrato, lento igni decocta, de spumataque, & demum linteo percolata. Verum si aqua hæc paulò post bibenda erit, aquatior fiat, & statim à sublata spuma percoletur. Nam quæ longa coctione in lapij consistentiam acquirit, diutius quidem seruari potest, sed ægrius penetrat in remotas corporis partes, facileque in bilem uertitur, ob suam exuperantem dulcedinem. unde sitim accendit, nisi plurima affusa aqua dissoluatur, adeò ut aquæ seræ modo reddatur insipida. Variant autem mulsæ facultates pro diuersæ coctionis ratione. quippe quæ breui coquitur tempore, status in uentriculo parit, aluum magis mouet, & minus nutrit. quæ uerò longiori coquitur tempore, status discutit, magis nutrit, minusque aluum stimulat. Sunt qui mulsæ aromata etiam addant, nempe gingiber, crocum, cinnamomum, macin, & id genus alia. Alij galliam moschatam officinis uocatam, & agallochum adiiciunt. Fit præterea ex parte una mellis, & aquæ fontanæ partibus octo, fermenti (alias fœni græci) in his dissoluti uincijs tribus, & propriè ad centum mulsæ libras. Quæ denique omnia, musti modo efferuescenda in ligneum cadum coijciuntur, non tamen ad summum repletum, ne feruescens resiliat. Vbi uerò defuerit obturato uase, asseruetur uini modo ad potandum, ueruntamen non bibatur, nisi tertio mense transacto. Huic mulsæ aromata quoque admisceri possunt linteolo inclusa, & adalligata in cadum demissa: hæc Mesues. Cuius ultimam mulsæ parandæ rationem, Germani Medonem uocant. qui tamen fermentum addunt, non ex cerealium genere aliquo paratum, sed ex uini musti recremento, & lupi salictarij floribus, quibus etiam utuntur ad zythum conficiendum, quod Ceruissam appellant. Medonis plurimum bibunt Poloni, ac Lituani, quòd melle plurimo abundant. Quod Græcis μελίκρατον, Latinis item Melicratum & Aqua mulsa uocatur: Italis, Aqua melata.

Aquæ mulsæ ratio facienda uaria.

Nomina.

Hoc loco uulgata exemplaria Græca habent, χράμεθα δὲ τῷ ἀφ' ἡμετέρου. hoc est, Utimur cocta. In quibus nimirum uerbis utitum aliquod latere suspicor. nam contextus uerborum & res ipsa postulabant, ut prius Aquæ mulsæ crudæ, mox coctæ usum traderet Dioscorides. quod hunc fecisse puto, sed librariorum culpa euenisse, ut sit



negatio omiffa, uel uerbum ἀφ' ἑνός alterius loco fcriptum. Auget uobis fufpicionem Actuarius, qui in libro fuo de compofitione medicamentorum, ubi ea de Melicrato, id eft Aqua mulfā fcribit, quæ Diofcoridi accepta referri poffunt, inquit primum, Cruda utuntur ij etc. deinde, Cocta uero exhibetur etc. Hunc fecutus fortaffe Ruellius uir doctiffimus, uulgatam illam lectionem ut deprauatam reliquit, & alteram ut uerorem accepit. Addam infuper, quod ratio ex ufu Aquæ mulfæ fumpta fuadet, ut cruda magis quàm cocta aluum deijcere, aut uomitum ciere poffit.

## Aqua.

## Cap. XIII.

DE AQVIS in uniuerfum decernere, propter locorum proprietates, & peculiare naturas, cœlum, & alia pleraque, difficile eft. Magna tamen ex parte optima eft dulcis, fyncera, nullius omnino qualitatis particeps, & quæ ne minimo quidem tempore in præcordiis commoratur, ad hæc quæ & facili uia fertur, & citra moleftiam, nec inflationes creat, & minimè computrefcit.

Aquarū differētiæ, & facultates.

PAUCISSIMIS quidem uerbis de potabili in uniuerfum aqua differuit Diofcorides, ita tamen ut nullam planè notam prætermiferit ex his, quæ in optima aqua requiruntur. Quare fi nobis effet ijs tantum faciendum fatis, qui rerum naturalium periti funt, non operæpretium exiflimarem, hoc in loco plura de aquis commemorare. Verum quia hosce commentarios in ftudioforum, & imperitorum potiffimum gratiam condimus; ideo non folum aquarum omnium, quæ in communem tam cibi, quàm potus uſum ueniunt, tum qualitates, tum facultates hic breuiter perſtrigam: ſed etiam earum, quæ ſponte naſcuntur, & ſibi metallorum, cæterorumq; foſſilium uarias uendicant facultates. In primis itaque illa aqua ad potandum laudatiſſima ceuſetur, quæ clara, pellucida, tenuis, pura, fruftillorū, & ſaporum omnium expers, leuiſq; reperitur: necnon quæ igni adnota citò caleſcit, remota uero ocyſſimè frigefcit, guſtu iucundo: quæ denique celeriter præcordia pertranſit, & ſine ulla uentriculi moleſtia labitur, & ſecedit. Talis autem ea eſſe ſolet, cuius fons ad orientem ſolem erumpit, curritq; ſuper lapides, aut arenam, aut puriſſimam terram: quæ æſtate frigida, hyeme autem calida manat. Omnium tamen præſtantiſſima eſt pluuialis, eaq; præſertim, quæ æſtate media pluit, ſilente cœlo. Huic ſerè illa reſpondet, quæ eodem tempore cum tonitruis deſcendit, tonitruoſa. propriè appellata. At ea, quæ maxima aeris, ac uentorum procella, terrifico tonitruum, fulgurum, & grandinis impetu, ex uelociter concitatis nubibus cœlo demittitur (ut in commentario libri ſexti epidemiorū ſcribit Galenus) in humanæ uitæ uſum adniti non debet. Porro aqua ciſternarum non tot ſanè laudibus commendanda uidetur, licet à quàm plurimis medicis laudetur. Siquidem non modò noxia exiſtit, quòd miſcella quædam ſit diuerſarum aquarū, quæ in diuerſis anni tēporibus inibi colliguntur ex pluuiâ, tum ex grandine, & niuib; hyemali tēpore in tectis colligatis ſed etiam quòd aquæ omnes ſtationariæ putrefactioni facile ſint obnoxie. Quo ſit, ut aqua in ciſternis collecta (ſi rem rectè expendamus) ſynceræ pluuiali minimè ſit comparanda. Dicendum igitur erit, aquam ſic aſſeruatam eò pluuiali ſyncera deterioreſſe, quò magis fuerit niuium, & grandinum liquationibus commiſta. Quandoquidem (ut in libro de bonitate aquæ ſcribit Galenus) quæ à niuib; & glacie colliqueſcit, concoctionem impedit, urinam cohibet: peſtus, pulmonem, ac uentriculū malè habet, conuulſiones, laterum dolores, & ſtatus generat. Quod alia de cauſa non euenit, quàn quòd cum in glaciem, uel niuem concreuit, omne, quod tenue inerat, deperdit. Putealis præterea graniſ quidem eſt, ægrèq; conficitur, nec ſtatui quidem poteſt, quòd ſit putredinis omnis expers: ueruntamen tanto minus fuerit damanda, quàn to frequenſius hauritur, uel ſi è ſubterraneo fonte ſcaturiat. Sequuntur lacuſtres, & paluſtres, quæ omnino ſunt improbandæ, niſi coctæ, uel igne deſtillatæ fuerint. Fluiatilis deinde probatur, uel im-  
49  
probatur, pro concurrentium aquarum, & rerum iniectionum qualitate, quemadmodum ijs omnibus euenit flumini-  
bus, quæ magnas perluunt ciuitates. Nam quibus animalia putrefacta, excrementa, & urbium ſordes ineſſe ſentiri-  
tur, cæ ab alimentorum uſu abdicandæ ſunt, niſi longo temporis tractu magnis ſcicilicet aſſeruatæ, ac deſecate cla-  
reſcant, & prorsus expurgentur. ut Romani faciunt cum ſui Tiberis aqua, quæ præ cæteris hac facultate pollet, ut  
clara facta, ad centum, & plures annos perduret incorrupta. Ad hæc noxiæ ſunt, quæ plurimam terræ miſtionem  
conſequuntur, quòd non modò uiſcera obſtruant; ſed & calculos in renibus, & ueſica procreent. Cæteram aquæ,  
quæ lapideum admittunt ſuccum, de quo ſatis diximus in prima huius libri commentatione, prorsus uitandæ ſunt, ut  
quæ potantes ſtrangulare poſſint, eo ſanè modo, quo epotum gypſum. quippe hæc arterias obſtruentes ſpirituū trans-  
ſitum intercipiunt: quin & alimentum in corpus deſerri prohibent. Quocirca huiusmodi aquæ potabiles non ſunt,  
neq; in ciborum coquendorum uſum recipiendæ. Quemadmodum nec illæ ſanis probantur, quæ ſal, nitrum, chalcant-  
thum, alumen, & alia id genus concreti ſucci continent. quanquam omnes in medicina uſum ueniunt. Nam quòd om-  
nes prædictis ex calfacientibus medicamentis reſertæ ſint, frigidis, & humidis morbis laborantibus utiliſſimè exhi-  
bentur: ijs uerò noxiæ ſunt, qui à biliſis uel acribus proueniunt humoribus. Salfæ, ſi bibantur, pituitam eijciunt,  
ſanguinem in uentriculo concretum diſſolunt, aquam intercutem exiccant, & obefa corpora extenuant. Sed his  
conſumptis potantes ſticuloſos reddunt, uentriculum ledunt, inteſtina abradunt & ſcabiem, & pruritum excitant,  
utpote quæ non obſcurè ſanguinem acuant, & ſua ſalfedine adurant. Clyſteribus infuſæ pituitam attenuant, & de-  
trahunt, & ex ea prognatos dolores mirificè tollunt. Factis ex balneis aquæ cutem ſubeuntes reſoluuntur, ſi no-  
uus fuerit morbus: frigidi neruorum dolores mulcentur, pectoris fluxiones cohibentur, ex calſitq; uentriculus frigidi-  
tati obnoxius, & humiditate languesceus: quin & pituitosa ſcabies curatur. Tollitur quoq; uapores ex ijs calētibus  
accepto, tum capitis grauitas, tum aurium cruciatus: ſotu uerò frigidi tumores, & totius corporis ſugillata delentur.  
Nitroſæ, ſi bibantur, corpus perturbant, pituitam deijciunt, ſcæminas prolificas reddunt, & ſtrumas abſumunt. 60  
A ſaliſis hæc facultatibus non diſident, præterquàm quòd in omnibus illis ualentiores ſunt, nō adeo tamen astringunt. ſed



sed ualenter abstergunt. quare & scabiosos mundant, & aurium ulceribus medentur, incertosq; earum sonos, atq; tumores discutunt. Aluminose admodum adstringunt. proinde mirum non est, si uentriculum roborent, qui crebris uomitionibus imbecillus efficiatur. Vteri fluxiones cohibent, abortum prohibent, & in his præsertim feminis, quæ ante fetus maturitatem plerumq; abortiri consueuerunt. uescæ ulceribus medentur: & oris, gingivarumq; inflammationibus, si ex eis frequens collutio fiat. Gargarizatu non modò destillationes ad fauces inbibent, sed etiam confluos resoluunt humores. Idem præstat balneum ex ijs paratum: confert enim magno iuuamento exterioribus totius corporis exulceratis, particulis, ijsq; præsertim, quæ defluxionibus tentantur. Cruentis item expuitionibus subuenit, anum procidentem reprimat, & sudorem superfluum cohibet. Nocet tamen tam in potu, quàm balneo ijs, qui uiscerum infarctu laborantes in febres faciliè incidere possunt. Porro aquæ, quibus chalcantum, aut misy, aut sory, aut melanteria immiscetur, cum omnia eadem facultate consent, aluminosis sanè persimiles sunt: ueruntamen hæ ualentius suum obeunt munus, nempe quòd præter adstrictoriam facultatem, succum etiam admodum acrem obtineant. quamobrem serpētibus ulceribus, ac phagedænis opitulantur. Sulphureæ excalfaciunt, ac efficaciter neruos emolliunt. proinde resolutis, conuulsis, tremulis, stupidis, contractisq; peridoneæ inueniuntur. Eadem compaginum tumores discutunt, & dolores mitigant; nam ubi quissiam coxendicum dolore, aut podagra, uel chiragra uexetur, sulphureæ aquæ balneo magnopere iuuatur. Præstant præterea ad iccinoris, lienis, ac uteri dolores, atque tumores in ijs genitos mirificè resoluunt: uentriculum tamen laxant, & infirmant. Bituminosæ, etsi potæ internis quibusdam morbis conueniant, & balneis adhibere aliquo temporis tractu neruos emolliant, ac excalfaciant; attamen caput replēt, sensus hebetudine afficiunt, præsertimq; oculos. Quæ autem Arinenij, aut cærulei lapidis, aut æruginis, aut chryso-collæ aliquid admistum habent, si bibantur, uomitiones concitant: ablutionibus uerò phagedænica ulcera sistunt. Quæ præterea auripigmentum, aut sandaracham continent, pectus dilatant, asthmaticis, & suspiriosis prosunt, & omnibus frigidis in uniuersum morbis opem ferunt, quibus respirandi facultas impeditur. Aereæ oris, & genitalium membrorum ulcera sanant: quin & faucium, & oculorum destillationibus auxiliantur. Quæ deniq; ferreæ sunt, uentriculi, lienisq; uitrijs, seminis profluuio, & menstruis albis utiliter adhibentur. Et ut rem hanc summam cōplectamur, aqua omnis, cui quoduis fossile medicamentum admisceatur, eandem facultatem præbet, quam quod illi admiscetur. Quæ nimirum ratione ducor, ut superuacuum putem, reliqua sigillatim prosequi, ut taceam id uim longū futurum.

Aqua Latinis dicta, Græcè ὕδωρ appellatur: Italicè, Acqua.

Nomina.

### Aqua marina.

### Cap. XV.

**AQVA** maris calida est, & acris. stomacho aduersatur, aluum enim conturbat: pituitam expellit. Si uerò calida ad fatus adhibeatur, elicit, & discutit, neruorum uitiiis, & pernionibus, ante ulceram prodest. Miscetur cataplasmatibus ex hordacea farina, & emplastris, & discutientibus malagmatis. Ad mouendas deiectiones tepesfacta infunditur, & ad tormina, calida. pforas, pruritus, impetiginēs, lendes, & mammas rigentes, foueri utile est: liuores fotu discutit. ad uenenatos ictus, qui tremorem, & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur: maximè scorpionum, phalangiorum, aspidumque: etiam si quis in calidam descendat, auxiliatur. & malo habitu confectis iandiu corporibus, neruisque: balneæ ex ea utiles. hydropicos, capitis dolores, aurium grauitates, feruentis uapor leuat. Syncera, & sine potabilis aquæ mistione reposita uirus deponit. Sunt qui etiam præcoquant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per sese, aut ex posca, aut cum uino, aut melale: uerum post deiectionem dant gallinæ, aut piscium iuscula, ad domandam morsus acrimoniam.

### Thalassomeli.

### Cap. XVI.

**QVOD** thalassomeli uocatur, uehementer purgare constat. Temperatur autem æquis portionibus maris, mellis, & imbris ex alto, defæcatis, & picato uase per Canis æstus insolatis. Alij ad binas marinæ coctæ singulas mellis adijciunt, & uase condunt. huiusmodi moderatius est aqua marina, & mitius.

### Acetum.

### Cap. XVII.

**ACETVM** refrigerat, & adstringit. Stomacho utile, appetentiam excitat: erumpentem undecunque sanguinem, potu infessiuè sistit. prodest alui fluxionibus coctum cum cibis: cruentis uulneribus inditur: inflammationes arcet, in succidis lanis, aut spongia impositum: reprimat procidentia sedis, uuluarque: item abscedentes gingiuas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignem facrum, ulcera quæ serpuunt, lepras, impetiginēs, pterygia, cum aliquo conuenienti efficax est: phagedænas ulcerum, nomasque fotu continuo cohibet: podagricis calido fotu, cum sulphure auxiliatur: sugillationes rapit, cum melle illitum. Contra capitis ardores cum rosaceo in succidis uulneribus, aut spongia imponitur. Ad aquam inter cutem, grauitatem aurium, & sonitus sibilosq; feruentis uapor proficit, instillatum quoq; aurium uermes necat. Panos coercet tepidi fotus, aut si imbuta aceto spongia admoueat: pruritus permulcet. Contra uenenatos serpentium ictus, qui refrigerando nocent, calidum commodè fouetur: & frigidum ijs, quæ exurens uirus ei aculantur.

Calidum



Calidum potum, atq; uomitionibus redditum, aduersus omnia uenena efficax est, præsertim contra meconium, & hauſtam cicutam, conglobatum in uentre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiám, taxumq; cum sale. hauſtu uoratas hirudines, si sorbeatur, eiicit: tuſim ueterem mitigat, & recentem laceſcit. In orthopnœa calidum commodè sorbetur: gutturis fluxiones gargarizatum inhihet: anginis, & uuæ procidenti conuenit. contra dentium dolorem, calidum colluitur.

Aceti miſtæ  
facultatis cõ-  
ſideratio.

QV ANVIS Dioscorides ſimpliciter pronunciauerit Acetum eſſe frigidũ, quòd fortasſe in eo magis frigiditas exuperet, quàm caliditas; tamen Galenus qualitatum medicamentorum omnium indagator maximus, ex contrarijs qualitatribus, calidis ſcilicet & frigidis, acetum conſtare docuit libro primo de ſimplicium medicamentorum facultatibus, nec eſſe homœomere ſimilarẽ, quemadmodum nec lac uniuerſum. Id quod ipſe Galenus lib. VII. de eorumdem facultatibus, apertiſſimè confirmauit his uerbis. Acetum primo horum commentariorum miſtæ eſſe ſubſtantie, nempe frigide, pariter & calidæ, cuiusq; utriuſq; tenuium partium demonſtratum eſt: cæterum calidam frigida exuperat. Porro magnam deſiccandi facultatem obtinet, adeò ut ſit tertij ordinis deſiccantium iam completi, utiq; cum ualidum extiterit. Et libro primo de compoſitione pharmacorum ſecundum locos, idem ſic inquit. Atqui Acetum ex incidentium ordine exiſtens, ultra hoc quòd diſcutit, præcipuum quiddam in ſe habet, quod reprimat, ac quod inſuauit, & repellit: utpote quod ſubſtantia ſua parum calidum eſt, plurimum uerò frigidum, & partium tenuium. Idẽ quoq; libro III. ſimplicium medicamentorum, ita ſcribit. At frigiditas, quæ ab aceto proficiſcitur, tantò eſt ualidior, quantò & tenuior. Ineſt uerò illi & acrimonia quædam excalfaciens, quæ tamen ſatis non ſit ad ſuperandum ab aciditate prouenientem frigiditatem: uerum quæ tranſitus modo celeritatem promoueat. nam quantò calidum frigidò facilius penetrat, tantò acris ſuccus aptior eſt, qui ſenſibiliũ corporum meatus traſeat, quàm acidus. Ita quæ ille, uelut præcedens uiam ſternit, hic uerò haud ita tardè inſequitur: quo tempore ſenſus perficitur miſtus, & qui ægrè exponi queat, utpote qui nec planè frigidum eſſe acetum denunciet, quippe cum in eo ignea quædam percipiatur acrimonia, nec planè calidum. Nam perpetuò, quæ ex præcedente ſit acrimonia, calefactionem frigus ab inſequente aciditate occupans, obſcurat, protinuſq; extinguit. quo ſit, ut maior multò ex frigore percipiatur ſenſus, quàm ex calore. Hæc ad literam Galenus. Ex quibus abunde liquet, quòd acetum eſſe ex contrarijs qualitatribus conſtat; plus tamen frigiditatis, quàm caliditatis particeps eſt. Quod cum rectè animaduertiſſet Dioscorides, acetum ſimpliciter (ut ſuprà diximus) refrigerare pronunciauit. Veruntamen illud ignorandum non eſt, quòd acetum nimirum eò calidius erit, quò uetuſtius, & acrius extiterit. Siquidem ex Galeni ſententia, libro XI. ſimplicium medicamentorum capite de adipe, item tertio de compoſitione pharmacorum ſecundum locos, uinum, mel, acetum oleũ, adeps, uetuſtate calidiora ſiunt. Ex quo facile fieri poteſt, ut reperiatur acetum adeò uetuſtate acerrimum, ut plus habeat, caliditatis, quàm frigiditatis. Acetum quod Latini uocant, Græcis ὄξος dicitur: Arabibus, Chalkitis, Aceto: Germinis, Eſſig: Hiſpanis, Vinagre: Gallis, Vin aigre.

Nomina.

### Acetum muſſum.

### Cap. XVIII.

ACETVM muſſum, quod oxymel uocant, hoc modo temperatur. Aceti heminas quinque, ſalis marini pondo, mellis minas decem, aquæ ſextarios quinque pariter coquito, decies efferueſcente cortina: atque ubi refrigerit, diſfundito. Sumptum craſſos humores extrahere, & iſchiadicis, comitialibus, & articulorum morbo conſtiſtatis prodeſſe creditur. Contra morſum eius uiperæ, quam ſepa uocant, hauſtum meconium, ixiámue auxilio eſt. Anginis utiliter gargarizatur.

Oxymelitis  
conſectio tri-  
plex Galeno.

TRIPLICEM oxymelitis componendi rationem poſteritatis memoriæ tradidit Galenus libro III. de ſanitate tuenda. qui tamen ſal nulli commiſcuit, ut eius uerba loco dicto aperte teſtantur, quæ ita ſequentur. Vni aceti parti, mellis, à quo detracta ſpuma ſit, duplum eſt miſcendum: deinde ambo in leni igni coquenda, donec eorum qualitates in unum coierint: ita enim nec acetum amplius crudum apparebit. Cum aqua uerò ſtatim ita facies oxymeli. Melli quadruplum optimæ aquæ miſcebis: dein coques modico igni, quoad ſpumare deſinat. Ac malum quidem mel multam egerit ſpumam. quo etiam diutius coqui debet. Optimum uerò, ut breuiſſimo tempore coquitur, ita minimũ ſpumæ euomit, unde nec pari ei coctione eſt opus. Plurimum certe quartam partem eius, quod ab initio eſt inditum, amitti: poſt uerò dimidio aceti adiecto, rursus coquendum, donec qualitatum omnino ſit unitas, nec acetum crudum etiam appareat. Conſicitur ſanè oxymeli etiam tribus ſtatim ab initio miſtis, ad hunc modum. Aceti uni parti additur mellis duplum, & aquæ quadruplum: atque hæc ad tertiam partem coquuntur, uel etiam quartam, ſpuma interrim detracta. Quòd ſi ualentius id facere ſtudes, tantundem iniicies aceti, quantum mellis. haſtenus Galenus. Quæ ſecutus Meſues, ipſe quoq; de oxymelite ſic ſcripſit. Oxymeli ſit ex aqua, aceto, & melle. Aqua uerò miſceatur, ut longa coctione reſoluatur id, quod in oxymelite ſtatu excitat, ut etiam promptius deſpumetur, ut deniq; medicamenti huius facultas, aquæ miſtione tenuior facta, facilius in corpus diſtribuatur. Mel uerò additur, ad oppugnandam pituitam. Ex melle denique, & aceto miſtis, facultas quædam tertia, quæ neutri eorum ineſt, tanta conſurgit, ut effiſſima ſit, atque certiffima ad attenuandum, incidendum, reſoluendumq; craſſa, lentaq; excrementa, quæ in uentriculo, & icore exiſtunt longo tempore genita: quin & ea, quæ ad articulorum compaſſes deſluerunt, & diuturnas procreant febres: ea namque & incidit, & coquit. Fit ex aceti parte una, mellis partibus duabus, aquæ partibus quatuor. Primum autem mel, & aqua ſimul coquuntur, ubi deſpumata probè ſunt, addito aceto percoquantur, ſemper quoque deſpumando. Datur ab uncia una, ad uncias tres. hæc ille. Nomen eius Græcum ὀξύμειλον; Latine Acetum muſſum: Italicum, aceto melato.

Oxymelitis  
conſectio ex  
Meſue.

Nomina.

ACIDA



## Acida muria.

## Cap. XIX.

**ACIDA** muria, quam Græci oxalmen uocant, contra nomas fotū, putrida ulcera, canum morfus, & uenenatos ictus auxiliatur. Sanguinis fluxiones post excisos calculos sistit, si statim calida in uulnus iniiciatur: & procidua sedem reprimat. dysentericis, si nomas sentiant, infunditur: oportet autem ex lacte instillare. Hirudines sorbitione, aut gargarizatu necat. furfures, & manantia capitis ulcera extergit.

**ACIDAE** muria, quæ Græcis oxalme appellatur, usus ætate nostra prorsus exoleuit. Parabatur autem ueteribus illis ex sale, & aceto: uel ex muria, & aceto. Quæ Latinis Acida muria, Græcis ὀξύλην uocatur.

Nonina.

## Thymoxalme.

## Cap. XX.

**THYMOXALME** ueteres utebantur, dabantque laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quaternosue cyathos, aqua calida dilutos: item in articularibus morbis, & inflationibus. Crassos humores, atrosque trahit. Hoc modo facitatur. Thymi triti acetabulum, salis idem modus, rutæ; pullegii, polentæ, singulorum exiguæ portiones in uas coniiciuntur, aquæ terni sextarii, & aceti terni cyathi infunduntur, & circumposito linteo sub dio madescunt.

## Scillinum acetum.

## Cap. XXI.

**SCILLINVM** acetum hoc modo fit. Scilla, quæ candida fuerit, expurgata conciditur, traiectione segmenta modicis interuallis, ne se contingant, siccantur in umbra quadraginta diebus: mina eorum in aceti boni sextarios duodecim immergitur, & uase diligenter operto septenis diebus in sole madescit: post eum dierum numerum scilla eximitur, & expressa abiicitur, defæcatum acetum transfunditur, & reponitur. Aliqui scillæ minam quinque aceti sextarijs miscent. Alii citra excretionem repurgantes, parem mensuram adiciunt, & senis mensibus macerari patiuntur. Id multo magis humorum lentitias digerit. Gingiuas humore prægnantes collutione stringit, firmatque, & motos dentes stabilit, & putredines oris, & graues halitus tollit. durat fauces sorbitione, & callosas facit: uocem expedit, & lymphidam, canoramque reddit. Datur stomachicis, ægrè cibum concoquentibus, melancholicis, comitialibus, uertiginosis, mente captis: item uuluarum strangulationibus, lienis incremento laborantibus, ischiadicisque. Imbecillos admodum recreat, corpus sanum reddit, & bonum colorem præstat: oculorum aciem exacuit: tarditatem quoque aurium in infusione purgat. In summa ad omnia efficax. Cauendum tamen intestinis exulcerationibus, in capitis dolore, aut nervorum uitis. Datur quotidie ieiunis sorbendum inter initia exiguum, paulatim adaugendo, ad cyathum usque. Nonnulli binos dant cyathos, aut largius.

**QUANQVAM** satis superque de Scillino aceto à Dioscoride dictum est; non tamen alienum fore existimo commemorare hoc in loco, quæ de eo miris laudibus scripsit Galenus libro III. de medicinis paratu facilibus, sic inquit. Salubre optimam acetum Scillinum à Pythagora scribitur, quo omnes Imperatores usi sunt. Ab ipsius auctore feratur, quicunque hoc utatur longæ uitæ fore, & eius extrema integra, usque ad finem permanens. Et ipse quidem Sanius senex huiusmodi extitit: quantum enim temporis uiixerit, haud ignoras. de ipso in libro traditum est, quod cum suis consanguineis hanc facultatem communicauit: cumque hoc medicamento uti incepit, quinquagesimum annum natus erat, & usque ad centesimum decimum septimum uitam produxit integer, & uulla unquam aduersa ualitudine tentatus. Hæc sanè medicamenti auctor disseruit, quod fortasse uir philosophus erat, mentiri nescius. Nos autem uiri huius fidei periculum fecimus, ac firmam, constantemque huiusce medicamenti facultatem esse testamur. Oportet igitur sumere Scillam montanam libræ unius ponderis, & dura circuncidere, & mollia minutatim condecidere, & aceti acerrimi sextarios octo in uitreū uas mittere atque obturare, ac per triginta dies in Caniculæ caloribus, ut maceretur, permittere: deinde scillam extractam exprimere. Id genus aceti parum mane sorbeto. Tibi autem hæc uenient, ut ne faucium orisque partes unquam remollescant, os uentriculi bene ualebit, facile spiritum duces, uox rectè habebit, oculi acutissime cernent, aures in officio manebunt, nullusque flatus uapor in uentre unquam excitabitur, nullum uiscus suspensum erit, & bene spirans, bene coloratus deges. Ad ciuilia negotia rectè affectus, non acidum, non salsum rutæ, si aliquid aceti huius assumpseris: & ieiunus ut assumes præcipio, septemque postea stadios deambules. ita enim dissoluetur. Hoc aceto qui utitur, in uictu quauis lecentiosus esto: omnia enim cibaria conficiet, & à nullo unquam offensam patietur, neque ualde implebitur, sed in melius proficere uidebitur. nihil superuacui in corpore residebit, non flatus, non bilis, non stercus, non urina, sed omnia facile excernit, atque educit. Alius lubrica omnino est, totiusque corporis purgatorium medicamentum, etiam si in ossibus sordes inhereant. Item phthysicos ab omnibus deploratos, hoc medicamento sanitati restitutos nouimus. Morbo comitali diuturno efficaciter profuit, ut nisi post longæ temporis interualla, non redierit: incipientem uero ac nouum perfecte discutit, neque reuerti amplius hunc affectum permittit. Ad podagras præterea, & articularum morbos, iecoris, lienisque duritias uehementer facit, & particulares quidem

Scillini aceti uires mirabiles.



quidem aceti scillini effectus hi sunt. Communes autem quàm plurimi, quibus nos commoti salutare hoc medicamentum, sanitatis, integritatisq; causa, tibi tradidimus. Hæc ille, quicumque fuerit. nam liber is inter nothos, & Galeno adscriptos recensetur. Acetum Scillinum quod Latini, ὄξος σκιλλινικόν Græci nominant: Itali, Aceto scillino.

Nomina.

## Scillinum uinum.

## Cap. XXII.

SCILLINUM uinum fit hoc modo. Dissectam, uti dictum est, scillam, & sole siccata[m] contundito: minam eius tenui cribro incernito, & linteo raro illigatam in uicenos sextarios multi recentis, ac boni demergito. ubi trimestri spatio maduerit, elutriatum uinum, obstructo diligenter uase, recondito. Licet quoque sic humida scilla uti. In orbiculos, rapi modo, dissectam duplicato pondere, quadraginta diebus insolari oportet, & ualde inueterascere. Alia parandi ratio. Scilla dissecta, & repurgata tres minas in Italicam metretam multi demittito, & senos menses in uase obstructo macerari finito. post id tempus defæcatum, & excolatum uinum recondito. Vtile est contra cruditates, & ciborum corruptiones: item ijs, qui reuomunt cibum: & si pituita in uentre, aut stomacho coierit. Prodest lienosis, malè habitis corporibus, aquæ inter cutem, regio morbo, difficili urina, torminosis, inflationibus, resolutioni neruorum, horribus longis, uertiginosis, & uulsis. menses pellit: minimè neruos infestat. Hoc uinum uetustate fit melius. Cauendus in febre usus, aut si interanea ulcus sentiant.

Scillini uini uires ex Gal.

SCILLINI uini meminit Galenus libro tertio de medicamentis paratu facilibus, his uerbis. Vinum hoc potui datum, omnem sanitatem adfert. humores enim attenuat, sed maxime pituitam, neq; ipsam in stomacho, aut uentre, aut capite, aut iecore, aut liene, aut neruis, aut ossibus consistere permittit, neq; alium id genus tenacè humorum obstructions facientem: sed omnia dissoluit, & uentrem lenit, atque ita subducit, & urinam mouet, & per ipsam causas attenuat, excernitq; Adeo uerò caput purgat, ut nares humiditate uacent. Commodum est podagra, arthritici, & comitiali morbo: denique omnis sanitatis est auctor. Ex his constat. Scillam albam, montanam circiter Canis exortum accipito in libræ pondere, per dies decem in umbra refrigera: deinde scillæ laminas refrigeratas in uitreum uas mitte, & uini albi ueteris sextarios duodecim superinfunde, & suspensum uas per quadraginta dies habeto: postea scillam exime, & abijce, & uino ad antedicta uitiâ utere, & eius uim percipies. Subinde ante cibum uini duas uncias exhibe, sin à cibo unciam mediam. Quod si ipsum potui commodum efficere uelis, ut magis delectet, mellis sextarios duos, aut tres admisceto. Quod Græcè ὄξος σκιλλινικόν, Latine Vinum scillinum appellatur: Italice, Vino scillino.

Nomina.

## Vina marina.

## Cap. XXIII.

VINA ex marina aqua, uariè factitantur. Aliqui enim statim cùm decerptæ sunt uuæ, aquam maris admiscunt. Alii in area uuas sole siccant, quibus calcatis marinam adijciunt. Alii passas prius uuas in doliis marina aqua macerant, mox calcatas exprimunt. id magis passu generibus adscribitur.

Quæ tamen austeriore gustu temperantur, contra febrium aduentantium indicia ualent, modò meliora non adsint: aluum subducunt: profunt purulenta extulsientibus, & si dura aluus exerceat. Quæ ex Aminæis uuis fiunt, caput tentant, stomacho aduersantur, flatus creant. Verùm quò plenior habetur historia, ijs qui huius studio tenentur, non inutile existimamus uarias uinorum compositiones adferre, non quòd frequens eorum, aut necessarius existat usus, sed ne quid omisisse uideamur, quod ad eorum rationem attinet. Sunt autem quædam ex ijs factitia, minoris curæ ac impendii, quæ cadunt in usus: uti quæ cotoneis malis, pyris, siliquis, item myrti baccis componuntur.

## Vinum cydonites.

## Cap. XXIII.

CYDONITES, nomine alio melites appellatur, & ita fieri consuevit. Mala cotonea exemptis feminibus, frustatim rapi modo scinduntur, & duodecim minarum pondo, in multi metretam, triginta diebus macerantur: postea defæcatum uinum reponitur. Alia faciendi ratio. Oportet ad singulos mellis sextarios denos succi cotoneorum tusorum pressorumque adicere, & ita recondere. Vinum hoc adstringit: prodest stomacho, dysenteria, hepaticis, renum uitiis, & urinæ difficultati. Melomeli, quod & cydonomeli nominant, sic fit. Cotonea mala seminibus suis castrata, in quàm plurimum mellis, quo penitus demersa contegantur, coniiciuntur: id post annum mitescit, multo non dissimile. Præstat eadem, quæ superior compositio.

## Hydromelum.

## Cap. XXV.

FIT hydromelon duabus mensuris aquæ coctæ, & sub Caniculæ sydus insolatæ, additis ad unam melomelitis facti ex cotoneis. Vis huius eadem est.



## Omphacomeli.

## Cap. XXVI.

OMPHACOMELITIS faciendi ratio hæc est. Acerbæ uuæ adhuc immaturæ, & tribus diebus insolatæ exprimuntur, & ad ternas succi partes, mellis optimi despumati singulæ partes adijciuntur: & insolatæ in uasa transfusum. Vim reprimendi, ac refrigerandi habet. Stomachicis, cœliacisque conuenit. Vfus post annum est.

## Vinum ex pyris.

## Cap. XXVII.

FIT & è pyris, perinde atque cotoneis, vinum, apijtes nomine, sed ita ut pyra non magnopere maturefcant. Ex siliquis etiam, mespilis, sorbis, simili modo temperatur. Omnia hæc genera acerbassunt, & adstringunt. Stomacho utilia sunt, atque intestinas fluxiones cohibent.

## Vinum œnanthinum.

## Cap. XXVIII.

FIT è feraci uite syluestri, quod uocatur œnanthinum. Sicci flores minis duabus musti cado macerati, post triginta dies mutantur, mox colatum uinum reconditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatem, cibi fastidia, cœliacos, & dysentericos.

## Vinum ex punicis.

## Cap. XXIX.

FIT è punicis malis maturis, quod rhæten nominant, succo expresso ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, apyrena uocant, ac decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est contra fluxiones internas, & febrim cum alui profluuium exortam. Stomacho utile, adstringit aluum, & urinam mouet.

VINVM è Punicis malis multifariam conficitur in Italia. Aliqui enim repurgatos punicorum acinos prælo statim subiiciunt, & expressum succum uitreis amphoris recondunt: ibiq; per se tandiu effervesce sinunt, quousque deferbuerit, & subsidat fæx. deinde in alias transfundunt amphoras, quod à fecibus repurgatum eximunt, & oleum superinfundunt, ne euanescat, & corrumpatur, uel acefcat. Alij, qui magis punicis abundant, acinos in ligneum cadum altera parte patulum conijciunt, & uuarum modo pedibus calcant, donec uniuersus exiliat succus: deinde per se in sole effervesce sinunt, cado linteo spissiore cooperto, usquedum fæx uniuersa residat, nuclei supernatent, & uinum defæcatum, ac pellucidum reddatur. Vbi autem hæc facta sunt, perforato paulò supra fecem uase, uinum eximunt, & cadis ligneis asseruant. Huic oleum superinfundere non opus est: seruatur enim sic paratum per se, modò nassus osculum pice, uel cera obturetur. Sunt præterea, qui repurgatos punici acinos, cum pari mensura nigræ uuæ æsteriusculi saporis commisceant, calcent, & per se effervesce sinant, quoad uinum claritatem consequatur. Subinde in doliolis asseruant: siquidem hoc gustui plurimum arridet.

Vini è punicis varia comfeditio.

## Rosaceum uinum.

## Cap. XXX.

RHODITES sic fit. Rosarum siccarum, tusarumque minam linteolo deligatam in sextarios octo musti demergito: & post tres menses defæcatum uinum transfundens, recondito. Vtile ijs, qui febri carent: & ad stomachi coctiones, & dolores, à cibo potum: & contra humidam aluos, & dysenterias. Fit quoq; ex succo rosarum addito melle, quod rhodomeli uocant: quod arteriæ scabritijs conuenit.

## Myrtites uinum.

## Cap. XXXI.

MYRTITES fit, baccis nigris, quæ maturitatem excefferint, tufis, & organo expressis. Alij, qui ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole torrent, & quaternis sextarijs contusarum, ternas aque heminas adijciunt, & uini ueteris parem modum: postea exprimunt, & seruant. Magnopere adstringit. Stomacho utile: fluxionibus uentris, ac stomachi prodest, & contra intestinas ulcerationes, & profluuia. denigrat capillos.

## Myrsinites uinum.

## Cap. XXXII.

MYRSINITES sic temperatur. Rami nigræ myrti cum suis baccis, & folijs tufi, decem minarum pondo, in tribus musti congijs feruescunt, donec duo supersint, aut certè dimidium. id uinum colatum ad usus reconditur. Contra furfures, ulcera in capite manantia, eruptiones papularum, gingiuas, tonsillas, & purulentas aures efficax est: sudores sistit,



## Lentiscinum, &amp; terebinthinum uinum.

Cap. XXXIII.

**LENTISCINVM** similiter ut myrsinites temperatur. Nec secus terebinthinum. namq; bacca-  
feri eorum rami sumi debent. Similes insunt uires: adstringunt, stomacho accommodantur, & deflu-  
xionibus intestinorum, uesicæ, & stomachi, & sanguinis profluuiis. Ulcera omnia fluxionibus obno-  
xia, fotu ad cicatricem perducunt: fluxiones vuluæ, ac sedis, infusione cohibent.

## Palmeum uinum.

Cap. XXXIII.

**PALMYLAS** maturas, quas uocant chydæas in urceolum imo pertusum, & obstructum pica-  
ta arundine, demittito: lino foramen sit obturatum, & quadragenis sextarijs ternos aquæ congios  
infundito. quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quinque congios infudisse satis est. post decem dies  
detracto ab arundine linteo, assumito uinum crassum, & dulce, & reposito. Suauē illud quidem, sed  
capiti noxium. contra fluxiones propter adstrictoriam uim efficac: stomachicis, cœliacis, sangui-  
nem expuentibus conuenit. Aliqui idem addita aqua iterum capiunt, & tertio, quarto, quinto, sexto-  
ue faciunt, quod tandem acore uitatur.

## Vinum ex caricis factum.

Cap. XXXV.

**CATORCHITES**, aliquibus sycites vocatur, in Cypro fit, ita ut palmeum: sed hoc interest,  
quoniam pro aqua tantumdem humoris adijciunt, in quo recenter pressa vinacea maduerint. Caricæ,  
quæ chelidonæ, aut phœnicæ appellantur, præsertim nigrae macerantur, uti diximus: & post decem  
dies humor excipitur. atque iterum, aut tertio, idem modus, aquæ, in qua uinacea maduerint, infun-  
ditur. simili modo intercedente spatio, quarto, aut quinto assumitur. Demaceratorum liquor non  
secus acorem contrahit, & aceti usum præbet. Id tenue est: status gignit, stomacho aduersatur, fasti-  
dium parit, aluo tamen prodest, urinam cient, menses trahit. lactis ubertatem facit, uitiosum sangui-  
nem creat, & elephantiasin adfert, ut potio, quam zythos appellamus. Aliqui sex amphoris, decem  
salis sextarios adijciunt. Alij muria amphoram. quod non facile uitatur, & aluo idoneum fore cen-  
sent. Alij thymum, & fœniculum imo subijciunt, & caricæ superponunt: & ita uicissim, donec uas  
expleuerint. Fit & è sycomoribus eodem modo uinum, sed in acetum acre degenerat: quoniam non ita  
præualeat uis eorum, ut fluentis liquoris dulcedinem retinere possit.

## Resinatum uinum.

Cap. XXXVI.

**RESINATVM** uinum populatim factitari solet. copiosum in Galatia: quoniam uinum illic  
coacescat, uua non maturescit, ob cœli algorem, nisi picea resina temperetur. Resina autem cum  
cortice tunditur, & amphoræ dimidiata hemina permiscetur. Aliqui ubi efferbuit, excolant, separan-  
tes resina: alij relinquunt. Hæc uina uetustate dulcescunt. Omnia capitis dolorem, & uertigines  
faciunt: coctionem tamen adiuant, & urinam cient: tussientibus, ac destillatione uexatis conde-  
niunt: item cœliacis, dysentericis, & hydropicis, & fœminis fluxione uulua laborantibus: altis exul-  
cerationibus infunditur. In hoc autem genere nigricans magis albo constringit.

## Vinum strobilites.

Cap. XXXVII.

**STROBILITES** fit maceratis in musto nucibus pineis, recentibus, fractisque: prebetque re-  
sinati effectus. Siquis madefactas nuce pini musto decoquat, potum affatim conuenit ijs, qui tabie  
tudine conficiuntur.

## Cedrinum, &amp; ex aliquot arboribus, ac fructibus uinum. Cap. XXXVIII.

**CEDRINVM**, iuniperinum, cupressinum, laurinum, pineum, aut abiegnum, simili ratione  
fiunt. Diuisos recenter ramos, cum fructum edunt, aut soli, aut balneo, aut igni admouere oportet,  
uri consudent, congioque uini minam unam permiscere, & post duos menses transfundere, & ante-  
quam recondantur, insolare. Factitiorum uinorum uasa impleri debent: namq; non plenis uasis, uina  
in acorem corrumpuntur. Medicata autem uina rectè ualentibus insalubria. Omnia excalfaciunt,  
urinam cient, & substringunt. Laurinum tamen uehementius excalfacit. Fit quoq; è fructu cedri ma-  
ioris uinum, congio multi, adiecta tusarum baccarum selibra. diebus quadraginta insolari debet,  
& defæcatum



& defæcatum in uasa transferri. Fit etiam uinum è baccis iuniperi, non aliter quàm cedrites, & ad eadem ualens. Cedrites hoc modo fit. Cedriam dulci aqua lauant, & singulas amphoras singulis cyathis diluunt, & ita musto replent. Hoc genus uini excalfacit, extenuat: tussis antiquæ utile sine febre pectoris laterisque doloribus, torminibus, uentris, & interaneorum ulceribus, purulentis excretionibus, mulieribus uulvæ causarijs, hydropicisque: facit aduersus uentris tineas, & horrores. Contra uenenatos ictus auxiliatur: serpentes necat: aurium doloribus instillatum medetur.

## Picatum uinum.

## Cap. XXXIX.

**PICATVM** exliquida pice, & musto temperatur. Picem autem primùm marina, aut muria tantisper eluere oportet, dum inalbuerit, & syncera maris aqua defluat: mox aqua dulci proluenda: congijs octo musti uncia picis una, aut altera adijcitur: ubi efferbuerit, & constiterit, in uasa diffunditur. Hoc genus uini excalfacit, concoquit, purgat, abstergit: utile doloribus pectoris, alui, iecinoris, lienis, & uulvæ, si sine febre sint, ueteri rheumatismo, exulcerationibus in altum recedentibus, tussis, spirijs, concoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, præsertim in succida lana impositum.

## Vinum absinthites.

## Cap. XL.

**ABSINTHITAE** faciendi ratio euariat. Aliqui enim duodequinquaginta sextarijs Italicarum amphorarum, admistam absinthij pontici libram decoquunt ad tertias: & ubi infunderint sex acetis sextarios, & absinthij selibram, ac diligenter permiscuerint, diffundunt in uas: dumque conquieuerit, defæcant. Alij absinthij minam in amphoram demittunt, tusamque; & raro linteo deligatam, in cado musti macerant binis mensibus. Alij absinthij quadrantem, alij trientem, & nardi Syriacæ, cinamomi, cassiæ, floris iunci odorati, calami, elatæ palmarum singulos sextantes iniiciunt in metretam musti, & tundentes prius pila, obstructo uasis spiraculo, binis ternisque mensibus dimittunt: postea defæcatum uinum transfundunt ad usum. Alij addunt in musti cadum Celticæ nardi drachmas quatuordecim, & absinthij drachmas quadraginta, linteo inuolutas: & post quadragesimum diem elutriant. Alii in senos sextarios musti, absinthij libram, & siccæ pini resinæ sextantem immittunt: & post decem dies excolant, recondunt. Vitale est stomacho, urinam citet, tardam concoctionem accelerat: hepaticis, regio morbo, & renum uitis auxiliatur: fastidia discutit: iis prodest, quibus stomachus negotium exhibet: ualet contra longam præcordiorum distentionem, & inflationes, reteresque uentris tineas, & remoratos menses. contra hausta ixiæ uenena quàm plurimum potum, & uomitionibus redditum, auxiliatur.

## Vinum hyssopites.

## Cap. XLI.

**HYSSOPITES** è Cilicio hyssopo maxime laudatur. Fitque similiter, foliorum hyssopi tussorum libra in amphoram musti coniecta: linteolo raro cum quibusdam lapillis folia inuoluuntur, ut degrauius pondusculo fasciculus fidat: uinum post quadraginta dies defæcatum elutriatur. Contra pectoris, laterum, & pulmonis uitia, ueterem tussim, & suspiria prodest: urinam citet: torminibus, & horribus febrium circuitu repetentibus auxiliatur. menses mouet.

## Vina ex diuersis plantis facta.

## Cap. XLII.

**SIMILI** modo chamædryites fieri solet. Excalfacit, discutit: conuulsis, regio morbo, uulvæ inflationibus, tardæ concoctioni, incipienti aquæ inter cutem subuenit. Inueterascens melius redditur. Stœchadites non secus temperatur. Congij sex stœchadis minam addere oportet. Crassitiem, inflationes, laterum neruorumque cruciatus, & perfrictiones discutit. comitialibus commodè datur cum pyrethro, & sagapeno. Fit ad eadem acetum è stœchade herba, ut paulò antè diximus, acetum macerata, quod eisdem implet effectus. Fit uinum è betonica, quam celtron psychotrophon appellant. Herbam semine maturo prægnantem: cum suis ramulis minæ pondo, congijs duobus uini macerant, & post septimum mensem transfundunt. Ad multa interaneorum uitia, ut frutex ipse, pollet. Et ut in uniuersum dicatur, factitia uina sibi misturarum uires adsciscunt. quare non difficile fuerit, qui illarum naturam norint, uinorum uires coniectura quadam consequi: ueruntamen uinorum usus febricitantibus abdicandus. Fit etiamnum è betonica acetum ad eadem uitia utile. Tragoriganites fit quaternis tragorigani drachmis linteolo colligatis, in quaternos musti sextarios coniectis, & post tertium mensem transfusis. Prodest torminibus, uulsis, ruptis, laterum doloribus, spirituum discursationi, ægris concoctionibus. E' napsi fit uinum, nomine bunites, drachmis duobus tussi napi in sextarios duos musti additis, & cæteris eodem modo factis. prodest stomachicis, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis. Dictamni drachmas quatuor macerato quaternis musti sextarijs.



sextariis. Facit aduersus stomachi fastidia: menses, & purgamentum à partu subducit. Marrubii a-  
dulti folia tundito, & sextarios octo in musti metretam demittito, & reliqua consimiliter facito. Con-  
uenit hoc uinum pectoris uitiiis, & omnibus, quibus marrubium. Thymi tusi, & cribrati uncias  
centum linteolo colligatas, & in amphoram musti adiecto. Valet contra ægras cõctiones, fastidia, dy-  
senteriam, neruorum & præcordiorum dolores, hybernos algores, & uenenata animalia, quorum mor-  
sus frigus insequitur, aut putrescit locus. Simili modo è satureia uinum fit. quod eadem, quæ thy-  
mites præstat. Sic quoque origanites ex Heracleotico origano conficitur similiter cum supradicto.  
Facit eadem, quæ thymites. E calamintha, pulegio, & abrotono uina fiunt eodem, quo thymites,  
modo. Profunt stomachicis, cibum fastidientibus, & regio morbo: quòd urinam moucant. Fit item  
è conyza uinum contra uenenata ante alia efficax.

### Vinum aromatites.

### Cap. XLIII.

AROMATITES ita fit. Palmæ, aspalathi, calami, nardi Gallici, singulorum quatuor sextarios su-  
mito: postquam contriueris, passo subigito, coactis ingentibus offis, & in sextarios duodecim auste-  
ri musti deiectis, opereulato uase, quadraginta diebus quiescere finito: deinde ubi face expurgatum  
fuerit, recondito. Alia eius ratio. Calami uncia, phu drachmæ septem, costi drachmæ duæ, nardi Sy-  
riaci drachmæ sex, cassiæ uncia, croci drachmæ quatuor, amomi drachmæ quinque, asari drachmæ  
quatuor. Omnia simul trita, & linteo colligata in cadum musti demerguntur: & postquam uinum  
deferbuerit. transfunditur. Facit ad pectoris, & laterum, & pulmonis dolores, difficili urinae, horro-  
ribus, retardatis mensibus, atq; ijs qui per frigora iter faciunt, potum conuenit. pituitæ crassitiem ex-  
tenuat, colorem alit, somnum conciliat, dolorem finit: renum, & uesicæ uitiiis auxiliatur.

### Vina ex diuersis odoramentis facta.

### Cap. XLIIII.

Fit & uinum ad destillationes, cruditates, tussim, inflationes, & si humor in stomacho coit. Myr-  
rhæ duæ drachmæ, piperis candidi drachma vna, iridis drachmæ sex, anisi drachmæ tres. omnia ple-  
nius tusa, & linteolo inuoluta, in sex vini sextarios conijciuntur: uinum post triduum colatur, & in  
lagena reconditur. Datur post deambulationem meraculum, cyathi vnus mensura. Fit quoque ne-  
ctarites ex helenio herba, radice sicca pondo quinque drachmarum linteolo colligata, & in congios  
sex musti addita, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi, & pectoris uitia: urinam pellit. E Sy-  
riaca nardo, & Celtica, malabathroque uinum facitatur, hac ratione. Singulorum selibram in binos  
musti congios mittito, post menses duos colato. Datur chyathus vnus cum tribus aquæ. Hoc uinum  
efficax est contra uitia renum, hepaticos, regium morbum, & urinae difficultatem. prodest stomachi-  
cis, atque iis quos pallor decolorat. Alii vnciam, aut sextantem acori, & Celticæ nardi quadrantem  
in musti amphoram adijciunt. Asari quadrantem in senos musti sextarios itidem demittito. id uini  
genus urinae ciet: hydropicis, & regio morbo laborantibus, hepaticis, ischiadicisque conuenit.  
Radiciis syluestris nardi recentis, & trita, cribrataque bessem in congiu musti conijcitur: duos men-  
ses quiescere finito. Vtile est hepaticis, difficili urinae, inflationibus, stomachicis.

### Vina ex diuersis herbis facta.

### Cap. XLV.

RADICIS dauci contusæ drachmas sex in musti amphoram imposito, & similiter transfun-  
dito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum, & vuluæ: menses pellit, ructus ciet, & urinam: pro-  
dest tussi, ruptis, uulsisque. Saluæ vnciam in musti amphoram, quod idem cum ceramio est, mitti-  
to. Valet contra renum, uesicæ, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, ulsa, & sup-  
pressos menses. Panacis vnciam in musti congiu mittito, & transfundito. Prodest ruptis, uulsis,  
contusis, orthopnææ: lienis crassitiem extenuat: contra tormina, coxendicum dolores efficax est:  
tardas concoctiones accelerat: menses, & partus extrahit: aquæ inter cutem, & serpentium ictibus  
auxiliatur. Vina ex acoro, & dulci radice consimili modo fiunt. Oportet enim singulorum uncias  
octo in senos congios mittere, tribus mensibus macerare, mox in vas transferre. Faciunt ad pectus,  
& latera, & urinae mouent. Seminis apij recentis, maturi, & cribrati uncie nouem in linteo colli-  
gata in musti amphoram demittantur. Appetitum excitat: stomachicis, & difficili urinae auxiliatur:  
faciles spiritus facit. Ex sceniculo, anetho, & petroselino, uina eodem modo fiunt, & ad eadem effi-  
cacia. Fit & è flore salis uinum, multò ad purgandum efficacius, quàm uinum aqua marina tempera-  
tum. Fauces, uesicam, renes, & stomachum infestat: quare neq; in secunda, neq; aduersa ualitudine  
prodest. Fit etiam uinum, quod phthorion uocant, quoniam partus necat, & abortus facit, ueratro,  
aut scammonia, aut syluestri cucumere, iuxta radices uitium sato: siquidem uites sibi illorum uires ad-  
sciscunt. Id uinum partus enecat: datur ieiunis mulieribus, quæ antè uomuerunt, cyathorum octo  
mensura



mensura, dilutum. Ramorum thymelææ cum suis folijs, & fructu triginta drachmas mitto in congios tres multi, & leui igne coquito, donec congij duo supersint, defæcatumque recondito. A quoia purgat excrementa, & lienem absomit. Chamelæa dum floret, cum folijs tusa, & cribrata decem drachmarum pondere, in musti congiu additur: post duos menses uinum in uas transfertur. Aquæ inter cutem, hepaticis, & lasitudine contractis, efficax est: item mulieribus, quæ à partu ægrè purgantur. Chamæpitium simili modo fit, ad eadem conueniens: urinam quoque ciet. Librum radicis mandragoræ concidito, segmenta lino traiecit, quod selibram æquat, in musti cadum demittito, ibique esse finito ad menses tres, deinde transfundito. Media potio, hemina dimidium: bibitur, passo in duplum addito. Aiunt heminam uini congiu mistam, potu soporem adferre. cyathus unus cum sextario uini potus, enecat. Mediocris usus eius doloris sensum aufert, fluxiones in-  
crassat. olfactu, potuque, & cum inditur, idem præstat. In congiu multi aqua marina diluti, drachmas duodecim nigri ueratri triti in linteo mundo mitto: dumque efferbuerit, in marinæ aquæ congios quatuordecim, ubi pleniusculè fregeris, iniicito: post aliquot dies colato, & utitor. Dato cyathum vnum ex aqua bálnei, in potu ad aluum soluendam, iis qui euomuerunt à cœna. Alia ratio, Veratri drachmas uiginti, iunci odorati uncias duodecim, spicæ Syriacæ uncias tredecim. cribratas, & linteo colligatas, in septem uini Coi sextarios, diebus quadraginta macerandas indito, postmodum colato. dabis in potu sesquiheminam. Aliter. Decoctæ marinæ aquæ ex alto petita sextarios duodecim, ueratri candidi libras sex, in musti amphora quadragesimo die quàm madeseceris, colato, & utitor. Alia ratio. Veratri drachmas duodenas, & aphronitri quaternas in senis musti sextariis diebus quindenis macerato, mox colato: & semestri exacto, utitor. Id uini genus abortus facit, & par-  
tus necat. Aut uas in sole siccatas imposito in musti metretam (implet autem metreta congios duodecim) & gypsum in vinum mitto pondo drachmarum viginti, & biduo residere finito: coniecit  
ueratri nigri drachmas triginta, iunci odorati, calami, singulorum drachmas triginta, baccarum iu-  
niperi sextarios duos & trientem, myrrhæ, & croci singulorum drachmam: inuoluens linteolo die-  
bus quadraginta appendito, postea colato. dabis heminas tres, aut duas dilutas. Purgat à partu, &  
abortu foeminas: fœtus extrahit: contra strangulatus uulvæ efficax. Scammonites sic fit. Radicis  
scammonia per menses effossa, trita, & linteo colligata drachmas quinque in musti congiu mitti-  
to ad dies triginta. Aluum purgat: bilem, & pituitam extrahit.

VINA factitia parandi ratio diuersa, quam superius ab initio propè huius libri ad hunc usque locum pluribus capitibus diffusè diligenterque tradidit Dioscorides, nobis quidem clarior, & euidentior uisa est, quàm ut operæ pre-  
tium esset, singula eorum capita nostris commentationibus prosequi, præsertim cum omnium fere iam usus apud nos exoleuerit. quanquam non equidem dubitauerim, quin essent huiusmodi uina, si eo modo parata in promptu essent, ijs  
morbis profutura, quibus prodesse produntur. Vnde pluribus adhuc rationibus uixus, primus ego, ut arbitror (quod  
etiam lib. i. in Ebeni mentione diximus) è ligno Guaiaco uinum confeci, & alijs quoque conficiendum esse scriptis tra-  
didi. Cuius postea usu innumeròs Gallica lue correptos, nos, & alij medici sanitati restituerunt. Videmus enim Eu-  
phrasium ad oculorum claritatem efficacissimum esse, Myricinum lienis morbos sanare, & quod ex sena paratur,  
atrabiliarijs morbis, & cutètenus exulcerantibus, nempe scabiei, lepris, uiriliginibus, lichenis, & id genus alijs, com-  
modissimum esse medicamentum. Quod cum animaduertisset magnus philosophus, & medicus non spernendus, Ar-  
naldus de Villa noua, de factitijs uinis, quæ medicine usui conueniunt ad uarios corporis morbos, copiosissimum edi-  
dit libellum. In quo qui uinis medicamentosis delectantur, & hæc conficiendi modum, & eorum facultates, facile a-  
dicipi poterunt. Nam apud Germanos, & alios illis conterminos, medicamenta uinis commista in frequentissimo ha-  
bentur usu, quod magis, quàm nos odoratis, & conciuatis delectentur potionibus.

Vinorum fa-  
ctitiornm cõ-  
sideratio.

## De Metallicis Lapidibus.

Cadmia.

Cap. XLVI.

EX CADMIAE generibus optima est Cypria, botrytis nomine, densa, modicè grauis, & in  
leuitatem magis declinans, racemosa facie, colore spodii, quæ fracta cinerulenta est, & ærugi-  
nosa. Proxima habetur foris carulea, intus candidior, internatis uenarum discursibus, onychitæ  
lapidi similis, cuiusmodi sunt quæ è ueteribus metallis effodiuntur. Quædam etiam placodes, id est,  
crustosa dicitur, segmentis quibusdam perinde quasi zonis cincta, ob quod eam zonitin appellauere.  
Alia ostracitis nominatur, gracilis, & magna ex parte nigra. Sed quæ testaceam faciem habet,  
terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamenti botrytis nomine, & onychitis,  
utiles: reliquæ ad emplastra, & farinas, quæ cicatricibus induendis insparguntur. Ad eadem Cy-  
pria prodest. Ex Macedonia uerò, Thracia, & Hispania delatæ improbantur. Cadmiæ effectus ad-  
stringere, caua explere, sordes expurgare, exiccare, corporis meatus insarcire, excrementa in carne  
coercere, crustas creare, & ulcera, quæ cacoethæ uocantur, ad cicatricem perducere. Cignitur cadmia  
ex ære in fornacibus candente, fuligine egesta flatu, & lateribus, camerisque fornacum inhaerente.



Prægrandes autem, ac ferreæ sunt rudes, ab officinis appellatæ acestides, per summa fastigia connectæ, & concameratæ, ut quæ ab ære iactantur sursum corpuscula, cohæcant, & inibi detineantur: quæ cum spissius insident, in corpus concresecunt, & modò genus unum eius, modò duo, modò omnia perficiunt. Extrahitur & cadmia in Cypro è monte, qui Solis incumbit, cremato lapide, cui pyritæ cognomen est. in quo etiam monte quædam quasi uenæ chalcitis, misyos, soreos, melanteriæ, cœrulei, chryfocollæ, atramenti sutorii, diphrygisque inueniuntur. Nec desunt, qui cadmiam in lapidum fodinis inueniri tradant, falsi quadam lapidum cognatione: qualis inuenitur, & apud Cumas lapis, nullam sui uim ostendens. Li eo deprehenduntur, quòd sunt cadmia leuiorès, nullumq; alienum mandentibus saporem exhibent: commanducatus item lapis dentes offendit: cadmia, utpote cum cedat, esum non respuit. Alio autem discerni possunt argumento. Cadmia in farinam detrita, & aceto subacta, atq; in sole siccata, coit: quod in lapide non accidit. Item tritus, & igni appositus lapis proflit, & fumum igni similem ei aculatur: cadmia uerò quieta manet, fuliginemque luteo colore, aut æreo splendenter expuit, uario zonarum discursu. Insuper lapis ignem expertus, atq; refrigeratus colorem mutabit, ac leuior multò fiet: sed cadmia nihil euariat, nisi quis eam multis diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus candidior, ac minus ponderosa, sed uiribus nequaquam comparanda ærariæ. Vritur cadmia superior carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferrei stercoreis morbo bullet: mox extinguitur uino Aminæo, quæ ad emplastra præparatur: sed quæ ad psoriarum medicamenta præparatur, aceto. Alii hoc modo exustam conterunt in uino, rursusq; fictili crudo torrent, donec pumicosa videatur: iterumq; tritam ex uino: tertio urunt, donec prorsus in cinerem redigatur, nihil scabritiæ retinens. hac spodij uice utuntur. Lauatur autem in mortario trita, effusa subinde aqua, dum sordium nihil emergat: dein coacta in pastillos reponitur.

Cadmia con-  
sideratio.

Historia ex  
Galeno.

CADMIÆ duo genera. uanque non modò factitia, sed etiam fossilis reperitur. Arte quidem ea fit, quæ in fornacis testudine, ubi aris materia comburitur, coalescit, ut ea quæ Dioscoridis, & Galeni ætate in Cypro eo monte, cui Solæ urbs adiacet, ex pyrite lapide in fornacibus concremato conficiebatur. Verum fossilis (ut Galenus est auctor libro IX. simplicium medicamentorum) in ærarijs ipsius montis fodinis frequentissima habebatur, de qua ita scriptum reliquit. Cadmia fit, ubi in fornacibus æs paratur, nempe tota terra illa, ex qua æs generatur, in fornacibus in altum egerente, uelut fuliginem quampiam, & fauillam, siue utcumque appellare licebit. At si non terram, sed lapidem nuncupare uelis, ex quo in fornacibus secernendo partim fit æs, partim cadmia, partim diphryges, nihil sane retulerit. Sed & in argenteis metallis efficitur simili secretionem, siue generationem, aut quomodocunque uocare uoles. Quin & ex pyrite lapide in fornacibus usito fit cadmia. Cæterum absque fornace in Cypro cadmia inuenitur: ac iure quissiam illam lapidem nuncupet. Itaque in Solis, quo tempore ego in insula peregrinabar, paucissimum etiam reliquum erat cadmiæ, quæ in fornacibus fit. Verum lapidibus, qui in montibus, & riuis reperiebantur, à metallis profecto acceptis, eos in Asiam, Italiamq; portauit ad amicos, à quibus summam inibam gratiam, quòd se uel maximum munus accepisse dicerent, & quæ alia omni cadmia multò esset præstantior. Et talem certè meritò quis lapidosam uocet cadmiam. At eius, quæ combusta est, aliam botryitiū, aliam placitū medici nuncupant. Botryitiū quidem, quæ in editoribus domorum, in quibus fornaces extractæ sunt, partibus colligitur. Placitū uerò, quæ inferioribus, ac liquet sanè botryitiū esse tenuiorum partium, crassiorum uerò placitū: utranque autem ui desiccandi, seu alia medicinalia omnia, & lapidosa, terrenaq; . Porro præter desiccandi facultatem, mediocriter item extergit. Attamen, quæ in fornacibus colligitur, igneæ facultatis aliquid habeat necesse est. Meritò itaque lauantes eam, medicamentum efficiunt mediocriter tum desiccans, tum extergens absq; mordicatione, utile ad ulcera impletionem exposcentia, & in oculis, & in toto corpore. Porro ulcera magnopere humida, aut putrescentia, in corporibus impendio mollioribus, qualia sunt eunuchorum, puerorum, ac mulierum, eiusmodi cadmia adiuuat. At in durioribus, & contentioribus, quæ ualentius desiccant, requirunt. Itaq; illud semper memoria tenendum, sermonem ad temperatam, & medium excessuum naturam, in ijs quæ ita simpliciter efferuntur, referendum: puta cum dicimus medicamentum, aut uelut carne implere, aut cicatrice claudere, aut aliud quiduis eius generis præstare. ad quam utique & nos nunc resistentes, leuiter desiccatoriam, absterforiamq; cadmiæ esse facultatem dicimus. In caliditatis autem, & frigiditatis differentia, temperata quodammodo existit cadmia, nempe neutrum insigniter efficiens. hæc Galenus. Quibus maxime ad stipulatur Plinius lib. XXXIII. cap. X. sic inquit. Metalla æris multis modis instrunt medicinam, utpote cum ulcera omnia ibi ocysimè sanentur. Maxime tamen prodest cadmia. Fit sine dubio hæc & in argenti fornacibus, candidior, ac minus ponderosa, sed nequaquam comparanda ærariæ. Plura autem genera sunt. Nanque ipse lapis, ex quo fit æs, cadmia uocatur, fusuris necessarius, medicinæ inuitis. Sic rursus in fornacibus existit, aliamq; nominis sui originem recipit. Fit autem egesta flammis, atq; statu tenuissima parte materiæ, & cameris lateribusne fornacium pro quantitate leuitatis applicata. Tenuissima est in ipso fornacium ore, qua flammæ eluctantur, appellata caputis, exusta, & nimia leuitate similis fauillæ. Interior optima cameris dependens, & ab eo argumento botryitis cognominata. ponderosior hæc priore, leuior porro secuturis. Duo eius colores. deterior cinereus: pumiceus melior, friabilis, oculorumq; medicamentis utilissima. Tertia est in lateribus fornacium, quæ propter grauitatem, ad psoras utilior, & ad cicatrices trahendas. Fluunt ex ea duo alia genera. Onychitis extra penè cœrulea, intus uaria: nychis maculis similis. Ostracitis tota nigra, & caterarum sordidissima: uulneribus maxime utilis. Omnis autem cadmia in Cypro fornacibus optima. hæc Plinius. qui à Galeno in hoc dissentit, quòd dixerit fossilē cadmiā fusuris tantum

Cadmia hi-  
storia ex Plinio.



tantum necessariam, & medicinæ inutilem, cum tamen Galenus contrarium scribat. Cadmiæ omne genus uidimus sepe nos in pluribus Germaniæ locis, ubi æs, argentum, & aurichalcum conficitur. Sed speciatim botryit in apud Perænum quinto à Tridento lapide, & apud Sbozium in Tirolensi comitatu, ubi in quàm plurimis fornacibus æs, ac alia metalla funduntur. Botrytis cadmiæ frustulum sanè pulcherrimum nouissimè ad me misit Sagabria Dalmatiæ urbe clarissimus medicus Iosephus Salandius Bergomensis: quæ adeò in racemi modum congesta est, ut planè uix speciem referat. Porro officinæ omnes Tutiam, quæ pompholyx est, Cadmiam perperam nominant. Quandoquidem Tutia illis uocata (nisi mea me fallit opinio) Cadmia est & botryitis genere. Neque enim mirum esse debet, quòd Cadmia proprio amisso nomine, in pompholygis locum successerit, cum etiam Dioscoridis tempore spodio loco uterentur medici. Metallicum, quod Græcis καδμια, Latinis item, pariter & Italis Cadmia nominatur: Arabibus, Climia seu Chlimia: Germanis, Grauer, Augstem.

Nomina.

## Pompholix, Spodium, Antispodium.

## Cap. XLVI.

POMPHOLYX specie sola, non genere à spodio distat. Siquidem spodos nigricat, & plerumque ponderosior est, palcarum pilorumque plena, quasi purgantium quoddam, quod ab arariorum officinarum pauimentis, & fornacibus eueritur. Pompholyx uerò pinguis est, & candida, usque adeò leuis, ut in auras euolare possit. Cuius duo fluxerunt genera. Vnum ad acris colorem vergens, subpingue: alterum magnopere candidum, summamque leuitatem nactum. Candida fit pompholyx, quoties in perficiendo are, fabri præstantiorem facere volentes, detritam cadmiam cumulatius insperferint. nanque tenuissima fauilla, quæ effertur, in pompholygem coit. Cæterum pompholyx non ex æris modò materia, & fabrilis industria factitatur; sed ex cadmia quoque, ad gignendam ipsam eximiè foliis proflata. Cuius faciundæ ratio hæc est. In domo gemina contiguatione operta, fornax extruitur, iuxta quam mediocris fenestra, ad tabulatum à supernis partibus pateat. domicilij paries fornaci proximus, tenui foramine ad fornacem usque perforetur, ad excipiendam folliis narem: ostium mediocri habeat, pro exitu ingressuque artificis fabricatum. domicilia altera huic coniuncta sit, in qua & folles, & stator suo munere fungantur. deinde carbonibus in camino succensis, assidens artifex cadmiam particulatim fractam inspargit, à locis supra infurnibulum extructis. idem negotium obit inferne artificis minister, simulq; carbones adijcit, usque dum indita cadmiæ copia prorsus absumatur. Itaque egesta fuffitu tenuis pars, & leuis materiæ in summam domum euolat, & parietibus, tectis, fornaci que adhærescit: conflatum autem inde corpus, inter initia erumpentibus aquarum bullis simile prodit, postea maius incrementum capeffens, glomusculis vellerum simile redditur. Ponderosius autem in ima loca se recipit: sed hoc fornacibus offunditur, illud domus pauimento coheret: quod tenuiore deterius existimandum est, ideo quòd multum terræ collegerit, & spurcitia in aceratione referciatur. Sunt qui hoc modo tantum fieri spodium arbitrantur, de qua antè dictum est. Optima creditur Cypria, quæ accepto aceto halitum æris præstat, colore aliquantum picco, sapore cœni horrido: & si fraudem non experta, flagranti carbone inferuescit, acreum colorem contrahit. Antedictis autem notis diligenter attendendum est. Siquidem à nonnullis adulteratur taurino glutine, ouillo pulmone, aut marino, aut crematis grossis, & quibusdam consimilibus. quod facile cognitu fuerit: quippe nihil in ijs probandis inuenietur eorum, quæ antè dicta sunt. Pompholygem in commune ita lauare oportet. Ligatam linteo munda, modiceque raro, aut siccam, aut aqua respersam in labellum demittito, quod imbrem contineat, & huc atque illuc fasciculum deferens, immergito: ita enim limosa pars eius, ac utilis effluet, & omne sedimentum in linteolo remanebit. postea residere sinens aquam cum cinere colis incernito, & nouam infundens, agitato, & effundito: mutata tantisper aqua, & colata, dum arenosi nihil sit. demum aquam exprimito, & siccatum cinerem recondito. Alij quantum maximè fieri potest siccant, manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum imitetur: deinde linteo faucibus excepturi uasis obtento, aut laxius illigato, colant, & quòd facilius transeat, infusa per linteum largiore aqua, cinerem conturbant: mox spumofum, quod traiectum est, & supernatât uasi, concha excipiunt, & fictili nouo ad usus recondunt. Quod uerò resedit, sensim cribratum, in aliud uas transfundunt, relicto arenoso, quod pessum ierat: rursus lapidosa sidere patiuntur, & in uas aliud excolant: hoc identidem faciunt, donec cinis merus, & arenæ expers inueniatur. Alij paulatim integram in aqua respergunt, arbitrati arenas, lapillosque suo pondusculo degrauatos, pessum ire: pilos autem, & paleas leuitate sua in sublime attolli. Cæterum cinerem medium separant, & in pilam coniectum, ut cadmiam, eluunt. Quinetiam lauatur vino chio marina aqua diluto, modis quos supra diximus: & ita redditur adstringentior, quàm aquis elota. Vis pompholygis adstringere, refrigerare, explere, purgare, obstruere, & aliquantum exicare. Inter medicamenta numeratur, quæ leniter crustas obducunt. Quòd si spodon torrere libet, diligenter tritam, & irrigatam aqua, colliges in pastillos, fictilique nouo, subiectis leuibus prunis orbiculos continuò uersabis, dum assiccati fuluescant. Neque ignorandum ex auro, argento, plumboque fieri spodium: uerum post Cyprium, plumbeum maximè commendatur. Quoniam spodos sæpenumero desideratur, necesse est ostendere,



dere, quæ simili virtute polleant, ut in spodij locum suffici possint, antisпода vocant: quoque modo sumi debeant. Folia itaque myrti cum floribus, & immaturis, in fictile crudum coniecta, indito operculo continua foramina habente, uruntur fornacibus, donec figlinum percoquatur. iterum in fictile aliud crudum transferuntur, quod ubi perassatum fuerit, exempta lauantur ad usus. Idem quoque fit è termite sylvestris oliuæ, si habeatur: sin secus, satiuæ cum suis floribus, aut malis cotoneis dissectis, & detractis ossibus, aut gallis, aut laceratis linteolis: item ex moris immaturis, id est candidis, in sole prius arefactis, aut terebintho, aut lentisco, cenanthe, aut mollibus rubi foliis, vel è buxi coma, vel è pseudocypero cum flore. Alii ficulneas frondes in sole antea siccatas, eodem modo parant: alii taurinum glutem: alii succidas lanas asperas, pice aut melle irrigatas. Quæ omnia in spodii uicem usurpantur.

Pompholygis  
consider.

Manardi er-  
ratum.

POMPHOLYGE officinæ Mauritanos secuta Tutia dicunt. Ita enim pompholyx appellatur Serapioni, & Auicennæ. Verum quàm seplasiarij Tutiam existimant, legitima non est, sed cadmia potius species. Siquidem cùm hæc lapidis modo crustosa, prædurâq; sit, pompholygem, siue tutiam dictam prorsus mentitur. Pompholyx namque Dioscoride, & Galeno auctoribus, ex æris, uel cadmiæ fauilla in glomusculos uellerum similes coit, & farinæ modo contacta dispergitur. Id quod recentiorum nullus, quod sciam, animaduertit, fortasse quod omnes rei herbariæ indigandæ magis insudauerint; quàm in inuestiganda fossilium materia. Quamobrem Manardum Ferrariensem, medicum ætatis nostræ clarissimum, hac in re deceptum satis reperio. Quippe qui, dum Auicennam redarguit, quod spodium è combustis arundinum radicibus conficiat, sedulo nos admoneat, ut secuti Galeni sententiam, in spodij defectu, tutia potius utamur, quæ seplasiæ abundant, quàm Auicennæ antispaddingo. Sed in hoc Manardus planè hallucinatus deprehenditur, quod procul dubio crediderit, uulgarem officinarum tutiam legitimam Dioscoridis, & Galeni esse pompholygem, cùm tamen legitima Tutia nullis in officinis sit usus, quod (ut iam diximus) omnes pompholygis loco cadmia tantum utantur. Porro legitimam tum pompholygem, tum spodium, quæ à Dioscoridis, & Galeni historia nullis disident notis, ego ab ærarijs, argentarijsq; fornacibus pluries mecum detuli, tam ab his, quæ Perzeni, & Lausij in Tridentino agro habentur, quàm ab illis, quæ Sbosij in Tirolensi comitatu Germaniæ inueniuntur, ubi certi è celeberrimæ sunt metallorum ferè omnium fornaces, ac fodinæ: è quibus non modò pompholygis, & spodij quantum satis fuerat, accipiendi nobis fuit facultas; sed etiam cadmiæ, pyritidis, diphrygis, floris æris, belcysmæ, molybdænæ, cernæ lei, & Armenij lapidis. Quorum ne minimam quidem particulam apud Italiæ seplasiarios reperi unquam, quàm apud eos, qui uel à me, uel ab amicis meis admoniti, legitima hæc metallica medicamenta, adulterinis ex suis officinis abdicatis, in medicum susceperunt usum. Nunc uero amicos intelligo (quos tamen uerius fratres amantissimos appellare possem, ut qui & ætate, & longa consuetudine, & studiorum communione mihi coniunctissimi sint) clarissimos medicos Tridento oriundos Andreæ Gallum, & Iulium Alexandrinum, qui iamdudum ob suam tum doctrinam, tum integritatem à Serenissimo Ferdinando Romanorum, Vngariæ, Bohemiæq; Rege in sui, & suæ prolis commodum in medicos honorifice recepti sunt. Hoc itaq; pacto cadmia officinis pompholygis uicem explet: quibus etiam antispaddinga quædam ex arundinum radicibus, & boum ossibus concrematis facta, spodium falsò referunt. Quod tamen non omnino fuerit reprobandum. nam, Dioscoridis testimonio, ubi legitimum desideretur spodium, antispaddingis uti sâne licebit: nempe quæ fieri possint è myrti folijs, floribus, bacisq; ex oliuæ frondibus, & donijs malis, quercuum gal-  
lis, attritis linteaminibus: item moris nondum maturis, terebintho, lentisco, buxo, pseudocypero, fici frondibus, tau-  
ri glutino, succida lana, pice aut melle perfusa. Quo fit, ut mihi planè immeritò à Manardo reprehensus uideatur Auicenna, qui ex combustis arundinum radicibus sibi spodium confecit, medicinis commiscendum, quæ ad cordis robur parantur, & intus in corpus sumuntur. His enim longè melius, ac consultius fuerit arundinaceum admiscere spodium, quàm eius uice tutiam seu pompholygem imponere. licet hæc quoq; sit Brasauoli sententia. Sed equidè hæcenus nunc quam me legisse recordor, pompholygem seu spodium ijs medicamentis tutò admisceri posse, quæ intus in corpus sumuntur: cùm neq; Dioscorides, neq; Galenus, nec qui post ipsos diuersis temporibus claruerunt, tam ex Græcis, quàm Mauritanis, usquam, quod inuenerim, memoriæ prodiderint, citra uitæ periculum hæc hauriri posse. Nam fieri non potest, quin tam pompholyx, quàm spodium uentriculo, & cæteris uisceribus, mirum in modum noceant, cùm ex tenuissima æris substantia uehementissima ignis ui conficiantur, & ob id deleterij aliquid habeant. Quod maiori quidè diligentia expendere potuisset Brasauolus, cùm interrogatus à suo sene pharmacopola, quid spodij loco in compositis medicamentis imponendum foret, inconsultè satis respondit, pompholygem, ut faciebat Galenus. Quæ in re duplici meo quidè iudicio, notatur errore. Primum, quod respondens non distinxerit, an hoc uel alio modo agendum fuerit uia medicamentis, quæ ore sumuntur, quibus myrepolæ spodium quandoq; commiscet, omnino hac in re concludere uideatur, pompholyge indifferenter pro spodio utendum esse, tam in hauriendis, quàm exterius ad mouendis medicamentis. Deinde uero cùm pompholygem, siue (ut ipse habet) tutiam spodij loco sumendam statuit, in eodem uersari erroris re deprehenditur, in quo Manardum eius ciuem uersatum ostendimus. Quandoquidè si rectè nouisset tutiam communis usus, legitimam non esse pompholygem, omnino (ut semper in cæteris tam adulterinis, quàm supposititijs medicamentis facere ad solet) errorem hunc suo seni pharmacopola indicasset. Nec obstat, quod dixerit Galenus in spodij defectu, pompholygem supplendam. Siquidem is in ijs tantum medicamentis id faciendum uoluit, quæ exterius illinuntur. Nam Galeni etate nullus spodij uel antispaddingis extitit usus ad medicamenta, quæ intus in corpus sumuntur, ut longè post tempore à Mauritanis factum esse reperio. Cæterum Fuchsius medicus ætate nostra celebris, libro de compositione medicamentorum ratione, Agricolaui fortasse secutus, præter illud spodium, quod in forma cibi fit, alterum quoq; recenset subterraneum seu fossile dictum, idq; in quatuor species, cinereum uidelicet, nigrum, & luteum

Brasauoli du-  
plex error.

Fuchsi opi-  
nio.



Et luteum digerit : quod quidem solis Arabibus ( Agricola soli Serapioni ) notum esse scribit . Veruntamen Serapio ubi de pompholyge agit cap. 422 . ubi item de Spodio cap. 342 . nullam, quod legerim, spodij fossilis mentionem facit : quemadmodum neq; Auicenna, neq; etiam alij Arabicæ familiæ auctores . Porro meminit tum Pompholygis, tum etiam Spodij Galenus lib. 1x. simplicium medicamentorum, sic inquit . Pompholyx fit in æris fornace, uelut et cadmia : fitq; et dum in fornacibus cadmia uritur, ut in Cypro . Cum enim præfectus ad æris fornacem instructas res non haberet, præcepit ex ipsa cadmia præparari ( præsentibus, atq; inspectantibus nobis ) pompholyga, uidelicet minutis cadmiæ fragmentis in ignem coniectis, qui autè ærarium iacebat sollem . Camera erat incurua, nusquam pertusa, sed integra, quæ egestam ab usta cadmia fauillam excipiebat : quam ubi collegissent, habebant pompholyga . At quod reflectens infra in pauimentum recidebat, spodos est quam uocant, quæ plurima, ubi æs in fornacibus uritur, colligi assolet . Quidam eam spodium neutro genere pronunciant : cui uidetur similem habere facultatem quod uocant Antispodium . At ego illo usus sum nunquam, cum largè mihi semper pompholyx suppetteret . Nec enim quisquam, ubi hæc adsit, spodio uti uelit, nedum antispodio . Est autem pompholyx medicamentum propè omnium, quæ intra morsum desiccant, si elota fuerit, præstantissimum . quamobrem ad ulcera cancrosa idonea est, et ad alia omnia maligna . Itaq; inditur collyrijs, quæ ad oculorum imponuntur fluxiones, quæq; bullas, seu pustulas in eis natas curant . Præterea ad pudendorum, ac sedis ulcera optimum est medicamentum, nimirum sine morfu desiccans . Sed non est huius negotij in istis diutius immorari . Idem lib. 1111 . de compositione pharmacorum secundum pompholyge ita scribit . Pompholyx lota nulli pharmacorum mordacitati expertium inferior : atq; ob id ea utimur ad acres, et tenues fluxiones, capite uidelicet prius simulq; uniuerso corpore euacuata . At uerò manifestum est, quod per uenæ sectionem, ac purgationem totum corpus euacuamus, per apoplegmatisimos uerò caput à pituita uidicamus . Potest enim pomphorlyx lota, quemadmodum etiam spodium, atq; amyllum simul, et moderate humores resiccare, simulq; ne per tuniculas euacuetur ea, quæ in magnis ipsorum uenis, superflua humiditas continetur ; prohibere . Quare si quis prius, quam caput ab humoribus ad oculos defluentibus expurget, obturantibus phar-  
 eis utatur, uehementem dolorem ex distentis tunicis efficit, et ex multitudine influentium humorum aliquando ru-  
 pturam, aut corrosionem inducet . Πομφόλυξ sic Græcis, ut etiam Pompholyx Latinis et Bulla dicitur : Arabi-  
 bus, Thucia : Italis, Pompholige : Germanis, Vveis nicht . Σπόδιον, et σπόδος Græcè, Spodium similiter  
 Latine uocatur : Italicè, Spodio : Germanicè, Grau nicht .

Pompholygis,  
 & spodij hi-  
 storia, & vires  
 ex Galeno.

Nomina.

### Aesustum.

### Cap. XLVII.

AESustum probatur rubrum, & quod contritu colore cinnabarim imitetur : nigrum uerò plusquam deceat, exustum est . Fit autem è clauis solutarum nauium, fictili crudo compositis : subperso sulphure cum sale pari, omnibus uicissim insparsis, fictile, circumlito figulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec figlinum percoquatur . Quidam pro sulphure, & sale alumen inspargunt . Alii sine sulphure ac sale, fictili multos dies urunt . Alii sulphure solo utuntur, fuliginem tamen ex-  
 erant . Alii oblitos scissili alumine clauos cum sulphure, & aceto, fictili crudo cremant . Alii in ænea  
 olla aceto resperfos urunt, & iterum ac tertio idem efficiunt, postea recondunt . Principem locum te-  
 net, in Memphide combustum : proximum in Cypro . Adstringit, exiccat, reprimit, extenuat, attra-  
 hit : ulcera purgat, & ad cicatricem perducit : vitia oculorum emendat, excrecentia in carne consu-  
 mit : vomas cohibet : uomitus ciet cum hydromelite potum, aut cum melle delinctum, illitumve .  
 Lauatur ut cadmia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat . Aeris recremen-  
 tum, sterçusue, quam scoriam uocant, eodem modo lauatur : & eandem uim, sed imbecilliozem, habet .

AESUSTVM, quod in officinis passim habetur, pauci sanè ualoris esse existimauerim, cum nigrum sit, et  
 plusquam oporteat, igne exolutum . Verum facile quispiam huic malo mederi poterit, si Dioscoridem secutus, ipsum  
 conficiendi laborem subierit . Quod si ærei clauis è nauigijs solutis exempti non adsint, æs aliud omne uetustate expur-  
 gat, commodè assumi poterit . Vsti æris meminit Galenus libro 1x. simplicium medicamentorum, his uerbis . Aes  
 ustum habet et acrimoniam quandam, sed et adstrictionis est particeps . Proinde si lauetur, pulcherrimum est me-  
 dicamentum cicatrici ulceribus inducendæ : quanquam id ipsum præstare, et antequam lauetur, possit, potissimum in  
 carne duriore : alioquin in molliore commodius est, quod ablutum est . Quod Aesustum Latinis, χαλκός κεκαυ-  
 μένος Græcis appellatur : Italis, Rame abbruscato .

Aeris usti co-  
 sideratio.

Vires ex Ga-  
 leno.

Nomina.

### Flos æris.

### Cap. XLVIII.

FLOS æris, quem nonnulli clauorum ueterum psegma, quasi resegmen aut segmentum, no-  
 minarunt, optimus est friabilis, in attritu fuluescens, milii effigie, & numero, breuis, ponderosus,  
 modicè splendens, atque constringens, qui delimatam æris scobem non recepit, qua saepe adultera-  
 tur . Sed id facile deprehenditur, cum dentium illisu dilatantur ramenta . Fit autem, cum æs fornacibus fustum, in receptacula delabatur, per cola fistularum ad ea pertinentium . tum huic negotio ad-  
 dicti ministri, sordes expurgantes, aquam clarissimam infundunt, refrigerandi proposito : itaque  
 repentino concretu, ac addensatione, uelut expuitur, & erumpit antedictus flos . Adstringit, & ex-  
 crecentia coercet : offusam oculis caliginem emendat, sed magnopere mordet . Quaternum obolo-  
 rum



rum pondere datus, crassum humorem extrahit, carnosam narium, & sedis nitia absomit: eruptiones papularum cum uino cohibet. Candidius contra diuturnas aurium grauitates tritus, in eas per fistulam flatu impellitur: uiam, tonsillasque reprimat, farina eius cum melle admota.

Floris æris  
historia.

**FLOREM AERIS** uerum ac legitimum in fornacibus, ubi æs ipsum funditur, in Tridentino agro, sæpius collegimus, in hunc modum. Cum æs fornaci liquatum, in paratum receptaculum extra fornacem diffunderetur, antequam omnino coiret in massam, frigidam super ipsum adhuc ignitum infundebam: statimque uapor magnus excitabatur, sub quo mox ferream laminam, & eam quidem amplam, subieci bann, tandiuque tenebam, donec cessabat uapor. Itaque demum æris flos, qui super lamina illa ferrea deciderat, mihi sese ostendebat granulis milio proximis, minoribus tamen, sed colore rubicundo splendentibus. Quandoquidem tenuissima æris pars, quæ à uapore in sublime fertur, aeris frigiditatem experta, facile in eiusmodi exigua grana concresecit. Is nusquam, quod sciam, in officinis reperitur, quapropter eius uice æruginē perpetuū utuntur. Florem æris paucis perstrinxit Galenus libro IX. simplicium medicamentorum, sic de eius uiribus differens: Flos æris tenuiorum partium facultatis est, quam aut æs ustum, aut squama. Merito itaque ex eo factis collyrijs, extergunt, auferuntque superciliorum magnas asperitates, quas uocant *sycofos*. *Χαλκοῦ ἀνθός* ita Grecis, Latinis uero Flos æris dicitur: Mauritanijs, Zar alnhas, siue Zer alnhas: Italis, Fiore del rame.

Vires ex Galeno.

Nomina.

## Squama Aeris.

## Cap. XLIX.

**SQUAMA** æris excussa ex Cyprijs officinarum clauis, crassa quidem ipsa præstantior, quæ helitis, id est, clauaris nominatur. sed ex uili promiscuoque ære, aut candido, vitiosa intelligitur: quam, utpote tenuem, & inualidam, damnamus, maximè approbantes crassam, rufam, præsertim si acetis repleto æruginem contrahat. Vim habet adstrictoriam, extenuantem, reprimentem, & erodentem: nomas coercet, vlcera ad cicatricem perducit. pota ex aqua mulsæ, aquam trahit. Aliqui farina subactam, dant in catapotio. Additur ad oculorum medicamenta: genarum namque scabritiam absomit, & fluxiones exiccat. Lauatur hoc modo. Siccæ æris squamæ expurgatæ selibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter conturbatur, quousque pessum icrit: abijcitur, quod subsidit, & effusa aqua, hemina cœlestis imbris adijcitur, & distenta manu, squama, quasi destringenda sit, uehementer confricatur: dumque lentorem emittere cœperit, aqua sensim ad sex heminas usque superfunditur, terendo validè: squama ad latus mortarii colligitur, ibique apprimitur. quo facto, expressus humor pyxide ex ære rubro facta, excipitur. Hoc est enim velut flos squamæ, valens uiribus, & ad ocularia medicamenta cum primis efficac. Inutile, imbecillumque quod superest, lauatur donec nullam prorsus lentitiam excernat: & linteo opertum biduo conualescere finitur, effusaque extante aqua, ubi siccatum erit, reconditur pyxidicula. Alii ut cadmiam lauant, & reponunt.

## Squama Stomomatis.

## Cap. L.

**SQUAMAE** ex acie, aut mucronibus decussæ, quam uocant stomoma eadem uis. Lauatur modo simili, & reconditur: sed ad moliendamalui deiectionem inefficacior est.

Squamæ æris,  
& stomomatis  
consider.

**AERIS SQUAMA** malleis ex eo decussæ, res sanè uulgaris notitiæ est: tamen si ea præstantior sit, quæ ab ære excutitur, quo clauis sunt, helitis propriè dicta. Siquidem cum huiusmodi æs rude impurumque sit, crassiorem, uegetiorēque squamam reddit, quam id quod pluries ignem expertum, in uaria uasorum genera conformatur. Eius præterea abluendæ ratio adeo Dioscoridi clara distinctaque traditur, ut nihil addendum supersit. Squamæ omnis in uniuersam meminit Galenus lib. IX. simp. med. ubi ita scriptum reliquit. Squama alia est æris, medicamen ad multa utile: alia ferri, et stomomatis. Quidam uero nominant & helitin lepida, siue squamā. Omnes sanè uehementer desiccant. At inter se diuersæ sunt, tum quod alia magis, alia minus exiccat: tum quod alia crassioris, alia tenuioris sit essentia: quodque plus, minusue adstrictionis sint participes. Helitis certè principem in desiccando locum obtinet. nam & tenuiorum partium, quam alie est, uinum quæ & æruginis nonnihil assumpserit. Maiorem obtinet adstrictionem squama ferri, & hæc etiam maiorem stomomatis. quamobrem ad contumacia ulcera, meliores sunt, quam squama æris. Detrahit, & liquat carnem potentius squama æris, & hæc etiam ualentius helitis. Omnes autem squamæ non inæstrenuè mordaces sunt. Ex quo clarum est, quod essentia ipsarum consistentia non admodum tenuis est, sed potius crassa: siquidem inter quæ eandem uim obtinent, minus est mordax, quod est tenuius, ut superioribus libris ostendimus. hæc Galenus. Ex quibus utique liquido constat stomomatis squamam, æris squamam esse nequaquam: etsi contrarium memoria prodiderit Plinius errore ductus, atque etiam idem affirmauerint recentiorum quidam, eius fidem magis fortasse secuti, quam quod altius rem hanc inuestigauerint. Quandoquidem non desunt, qui stomomatis squamam, æris squamam omnium tenuissimam esse contendunt, ut Marcellus Dioscoridis interpret. Sunt etiam qui putent eandem modò æris, modò ferri squamam tenuiorem designare, ut Brasauolus. quanquam hæc nullis, quod equidem sciam, rationibus, nullisque auctoritatibus probent. Brasauolus tamen, ut suam tueatur sententiam, Dioscoridem in medium citat. Sed qua ratione ego profectò nescierim, cum nusquam repererim scripsisse Dioscoridem, quod stomomatis squama promiscuè, æris & ferri squama esse possit. Verum ne quispiam fortè putaret, me hæc meo tantum arbitrio

Plinij, & recentiorum quorundam error.



bitrio proferre, id sanè quod sentio, primum non obscuris, ut puto, rationibus aperiam: mox probatissimorum aucto-  
rũ testimonio illud apertissime confirmabo, quòd scilicet stomomatis squama nec æris, nec simplicis ferri sit materia,  
sed chalybis tantum. In primis itaq; dicimus, quòd cum scribat Galenus æris squamã principẽ locũ in desiccado inter  
ceteras obtinere, ferri uerò maiore adstringendi ui quàm hæc pollere, & hæc etiam maiore stomomatis, manifestum  
prebet indicium, stomomatis squamam nec ab ære, nec à simplici ferro esse decussam, sed à duriore ac terrestriore,  
metallo, nempe ab ipso chalybe: quippe cum stomomatis squama longè magis adstringat, quàm ferri, huius uerò plus  
adstringat quàm æris, rationi minime consonum uidetur, stomomatis squamam esse aut æris, aut simplicis ferri sca-  
dem, sed potius (ut dictum est) purissimi chalybis. Ad hæc cum Galenus in capitulis fronte scribat, Squama alia æris  
est alia ferri, alia stomomatis, omnibus sanè palam facit, stomoma aliud esse metallum ab ipso ære, & à simplici ferro  
omnino diuersum. Nam si sensisset Galenus, quòd stomoma in æris genere, non autem ferri, fuisset reponendum,  
dixisset haberi squamam æris, stomomatis, ac ferri, neq; ita si eciem à suo genere disiunxisset. Sed quoniam rectè no-  
uerat stomoma genus esse ferri arte facti, ob id suo illud adscripsit generi, quemadmodum & Paulus ipsum secutus.  
Ceterum præter rationes adductas, stomomatis squamam à chalybe tantum decussam esse, nihilq; aliud Græcis sto-  
momatis nomine indicari, quàm chalybem, confirmatur Aetij & probatissimi, & Græci auctoris testimonio. quip-  
pe qui libro IX. cap. XLVII. de ijs agens, quæ in corpus sumpta dysentericos iuuant, quidnam Græcis esset sto-  
moma, his uerbis apertè declarauit. Deinde unum purum uetus, quantum satis uidebatur, in nouum uasculum infun-  
dito, & laminam ignitam ex ferro, quod stomoma uocant, non minorem libra in uino extinguito. Item libro X. cap.  
XI. ubi indurati lienis curam agit, sic inquit. Sit autem ferrum, quod in ipsis extinguitur, stomoma. Ipsi autem  
stomomatis ferri squama, quam in fabrilibus officinis ferrum, dum ignitur, & malleo tunditur, abijcit. Postea agre-  
stioribus hominibus utitur exhibetur. Et lib. XIIII. cap. XXIIII. idem ait. Squama ferri, præsertim stomoma-  
tis, amplioris adstrictionis particeps est. hæc Aetius. Ex quibus sanè perspicuum fit, nil aliud Græcis esse stomoma,  
quàm Latinis sit chalybs, qui è puriore ferri substantia, arte fit in fornacibus. Quo factum est, ut omnes in uniuersa  
sum medici Aetium, & reliquos uetustiores sectati, ad dysentericos, aliosq; affectus id expetentes, chalybem igne  
candentem, magis quàm ferrum, modò in aquam, modò in austerum unum, modò in lac extinguant, quòd chalybs  
maiore adstringendi ui polleat, quàm ferrum. Hinc itaq; omnino affirmare licebit, nil aliud extitisse uetustioribus,  
ac recentioribus Græcis stomomatis squamam, quàm quæ à chalybe decutitur, eiusq; præsertim, qui malleo ferra-  
rijs in officinis acuitur, dum gladijs ac telis aciem, uel mucrones coaptant artifices: qui etiam dum alia sunt instru-  
menta materiarijs fabris, & terræ cultoribus expetita. Porro hæc rem quoq; Actuarius abunde expressit suo de  
compositione medicamentorum libro in Aegypcia Andromachi, dum inquit. Multò reddetur utilior, si squamam  
acie, aut mucronibus decussam, quam appellant stomomatis, pari pondere sibi adseiscat. Id quod etiam idem paulò  
inferius repetijt. Hoc insuper confirmari potest ex Galeni scriptis libro primo, ac tertio de compositione me-  
dicamentorum secundum locos, ubi diuersis medicamentis, præsertimq; ad alopeciam facientibus, stomomatis fer-  
ri squamam immiscet. Sed si fortè reperiretur aliquis adeò ceruicosus, & perucax, ut tot clarissimorum uiro-  
rum auctoritatibus non acquiesceret, audiat quæso Aristotelem philosophorum omnium principem, qui libro IIII.  
Meteororum, chalybis siue stomomatis conficiendi rationem scitissime docuit ijs uerbis. Τὴν τεταμένην δὲ καὶ τὴν ἐν ἑργα-  
σίᾳ σιδῆρος, ὡς ἐν γὰρ γίνεσθαι, καὶ πάλιν πύγνυθαι, καὶ τὰ σώματα ποιοῦσιν οὕτως, ὑφίσταται γὰρ, καὶ  
ἀποκαθαίρεται κατὰ τὴν σκωρία. ὅταν δὲ πολλάκις πάθῃ, καὶ καθαρὸς γένηται, τὸ τὸ σώμα γίνεσθαι. οὗ  
ποιοῦσιν δὲ πολλάκις οὕτω, διὰ τὴν ἀπουσίαν γίνεσθαι πολλὴν, καὶ τὸν σάβαν ἐλάττω, ἀποκαθαίρουμένον. ἐπὶ  
δὲ ἀμείνων σιδῆρος ὁ ἐλάττω ἔχων ἀποκαθαίρεται. Quæ Latina redduntur in hunc modum. Porro & ferrum  
elaboratum liquefit, ita ut fluxum reddatur, & rursum concreseat, atq; in hunc modum faciunt stomomata: si-  
quidem scoria in fundum subsidet, & desecatur ferrum. Cum uerò id sepe factum est, & purum euasit, stomoma  
efficitur. Hoc autem non sepe faciunt, eo quòd repurgatum multum deperdat, & pondere imminuatur. Atqui  
ferrum illud melius est, quod minus excrementi retinet. hæc Aristoteles. Cuius nimirum doctrinam sequuntur  
in hunc usq; diem, qui ferrarijs fornacibus, & officinis è ferro prius elaborato, chalybem conficiunt in Italia,  
& in alijs uniuersæ Europæ regionibus. Quapropter eos prorsus hallucinari euidentissimum est, qui aliter sen-  
tiunt: nempe inter antiquos Plinium, & inter recentiores Marcellum, & Brasauolum. His omnibus accedit Se-  
rapionis auctoritas, magni inter Arabes Dioscoridis interpretis: quippe qui quadringentesimo tertio sui operis  
capite de simplicium medicamentorum historia & uiribus, id totum quod à Dioscoride proditum est de squama sto-  
momatis, de ferri squama posteritatis memoriæ prodidit, ferrum tanquam genus, chalybis loco accipiens. Nec  
obstat, quòd in Dioscoridis codice scriptum reperitur, stomomatis squamæ uim eandem esse, quæ æris squamæ,  
quæquam non adeò ualenter alium deiciat. Siquidem ego planè suspicor, eodẽm Dioscoridis hoc in loco esse depra-  
uatum, ut in alijs quoq; pluribus deprehenditur, præsertim cum nec à Galeno, nec ab alijs ueteribus recentioribusq;  
Græcis proditum sit, stomomatis squamam æris squamæ uiribus esse similem: hæc namq; alium deiecit, illa uerò con-  
tra eam cohibet. Ad hæc nusquam me uini apud quemquam legisse, alio metallo roborari posse ferrum in aciem uel  
mucronem elaboratum, nisi chalybe, qui Græcis stomoma dicitur. Quo fit, ut illorum pertinaciam mirari non de-  
sinam, qui aliter sentiunt. Ex his itaq; haud dubie credendum arbitror, non aliud esse stomoma, quàm chalybem,  
qui cum à primordijs semper fuerit expetitus ad ferreorum instrumentorum aciem roborandam, quam aciem Græci  
σώμαμα uocant, pariter chalybem stomoma uocarunt. Quapropter dicebat Aetius, sit ferrum, quod in ipsis ex-  
tinguitur, stomoma. Hoc autem uocabulum putauerim ego ortum esse à σῶμα, quod Latinis os sonat. Acies enim,  
itemq; mucrones, gladijs, & telis, alijsq; ferreis instrumentis usum nullum alium præbent, quàm oris. unde Latinis  
quandoq; dici solet, eos, quibus ob malefacta caput abscinditur, in ore gladij perijisse. Plinius quoq; licet ignorauerit,

Stomoma ef-  
se chalybis  
squamam cõ-  
firmatur au-  
thoritatibus.



rit, quid Græcis significaret stomoma; chalybē tamen aciē, quæ Græcis στόμα dicitur, appellauit lib. xxxiii. cap. xiiii. sic inquit. Ex omnibus autem ferri generibus Serico palma est. Seres hoc cum uestibus suis, pellibusq; mittunt. Secunda Parihico, neq; alia genera ferri ex mera acie temperatur: ceteris enim admiscetur. hæc Plinius. Ex quibus palam est, id hoc loco Plinio aciem uocari, quod chalybem etiam Latini appellant, quodq; nos corrupto nomine ab acie, uel ab acuendo uulgo uocamus acciaio, quemadmodum & Galli acier, & Hispani acciel suo idiomate dicunt. His igitur tum rationibus, tum auctoritatibus freti, στόμα potius à σῶμα, quam à uerbo σῶμα ortum habere putamus: quanquam etiam eorum opinio, qui à σῶμα στόμα dictum existimant, non sit omnino improbanda, quod id uerbum roborare, durum facere, aciem & mucronem inducere Græcis designet. Sed neq; illos quoq; prorsus aberrare crediderim, qui scobem ab acie, & mucronibus, dum super lapide rotante acuntur arma, derasam, stomomatis squamam esse censent. ueruntamen hæc, quod sit lapidis illius ramentis admista, non perinde ac sincera probanda uidetur. Squama, quæ Græcis λεῖς χαλκῶ Latinis Squama æris appellatur: Italīs, Squama del rame: Germanis, Kupfer schlag: Hispanis, Esquama de cobre. Quæ uero Græcè λεῖς σῶμα Latine Squama stomomatis dicitur: Arabice, Tubel, Batiture sabartam, & Cortex astas: Italicè, Squama dello stomoma: Hispanicè, Esquama de azero.

Nomina.

## Aerugo Rasilis.

## Cap. LI.

AERUGO rasilis ijs modis. In cadum, aut aliud consimile uas, acetum quàm acerrimum infunditur: superponitur inde inuersum æneum uas, præsertim concameratum, sin minus, planum: sitque obstructum, nullumque habeat spiramentum: exempto, quo doliolum obturaueris, operculo, decimum post diem insidens ærugo deraditur. Aut æris lamina in cadis super acetum ita suspenditur, ne ipsum attingat, & totidem post dies raditur. Aut massula æris, aut lamina una plurisque vineis non recentibus, sed iam acrescentibus conduntur, & simili modo uersantur. Quinctiam ex delinata æris scobe æruginem facere licet: necnon è laminis, quibus bractæ auri conclusæ malleo ducuntur, si quis eas aceto respargat, & ter aut quater uerset, donec æruginem contrahant. Tradunt æruginem in Cyprijs metallis gigni, lapidibus quibusdam nonnihil æris habentibus, quibus erugo efflorescit: adduntque per Caniculæ æstus è quodam specu manare: sed illam paucam, & optimam esse: hanc speluncis effluentem, copiosam quidem, & boni coloris, sed uitiosam, quod lapides multos colligerit. Pluribus autem modis adulterant. aliqui pumice admisto, alij marmore, alij atramento futorio. Sed deprehendemus pumicem, aut marmor, dum pollice sinistrae manus madefacto, æruginis portiunculam altero atterimus: siquidem eam diffundi constat: marmoris autem, pumicisque partes coeunt non dissipatae, demumque tractatione crebra, & humoris complexu dealbescunt. quin & dentium appressu: siquidem sincera cedit, leuis, & sine asperitate. Atramentum uero futorium igne coarguitur: nanque si fictile, aut lamina adulterata æruginè illinatur & feruenti cinere, aut carbonibus incalescat alterutrum, mutabitur, rubescetq; id, quod atramentum futorium acceperit: quod id uisum suapte natura talem sortitur colorem.

## Aerugo Scolecia.

## Cap. LII.

AERUGINIS, quam uocant scoleciam, duo sunt genera. quædam fossilis est, altera, factitia ad hunc modum. In mortario Cyprij æris dimidiam heminam aceti albi acrisq; pistillo cupreo conterito, donec strigmenti crassitudinem imitetur: deinde aluminis rotundi drachmam unam, cum fossilis strigenti translucentis, aut marini quàm albisimi, solidique, aut certè cum nitri pari pondere teritur in sole æstuosissimis diebus, sub sydu Caniculæ, donec colorem æruginis contrahat, & concretum strigmentosum fiat: ubi autem se in uermiculorum Rhodiæ similium speciem coegerit, recondito. Efficax, & ualde boni coloris redditur, si duas partes urinæ ueteris, cum una aceti adieceris, & alia, quæ dicta sunt, peregeris. Sunt qui æruginem rasilē, quæ in apparatu non respondit, gummi misto digerant in formas, & ita uendant. quod genus, ut uitiosum, improbat. Fit & quædam ærugo ab aurificibus, mortario, & pistillo Cyprij æris, cum urina pueri impubis, qua aurum ferunt ruminant. Antedicta æruginum genera uisum æri omnino respondent, sed magis effectu ualent. Scindum fossilem scoleciam præstantissimam esse: derasam sequi: postremo loco factitiam. mordacissima tamen est hæc, & magis adstringens. Aurificum autem ærugo rasilæ respondet. Aerugines omnes adstringunt, extenuant, excalfaciunt. oculorum cicatrices emendant, lacrymas cient, nomas sistunt, vulnera ab inflammatione tuentur: vlcera ex oleo ceraque ad cicatricem perducunt: callos, & sordida vlcera purgant, cum melle coctæ: callum fistularum erodunt cum ammoniaco, collyrii modo in eas adactæ. ad gingiuarum autem excrescentias, & extuberationem utiles. Magnopere extenuant genarum crassitiem, cum melle illitæ: verum post illitionem spongia ex aqua calida locus fouendus est. resina terebinthina exceptæ, cum ære, & nitro lepras abigunt. Vritur ærugo, quæcunque uelis, minutissimè fracta, comminutaque, in fictili patina, flagrantibus prunis superposita: versaturque donec se mutet, & colorem cinereum concipiat: postea refrigerata reponitur ad usum. Sunt qui crudam olla eam urant, uti dictum est: sed non prorsus eundem colorem cremata reddit.

AERUGINEM



**ÆRUGINEM**, quod colore sit uiridi, officinæ, ac medici in Italia æs uiride nuncupant, & uulgarī sermone uerde rame. Verum quanuis officinæ eo in uniuersum abundant; synceri tamen parum ostendunt. Scolecia ærugine, ac fossitia destituimur: quod altera, quod sciam, hoc tempore non paretur, altera uerò ab ærarijs fodinis, ubi fossisse plurima reperitur, à fossoribus non deferatur. Proinde cum harum copia non sit, ea tantum utimur, quæ ære in acetarijs cadis demisso, aut uinaceis iam acescentibus obruto, conficitur. Hallucinantur, qui credunt æruginem, & æris florem unam, & eandem rem esse, ut superius de æris flore differentes latius ostendimus. Aeruginum uires reddidit Galenus libro 1x. simplicium medicamentorum, sic inquit. Aerugo gustantibus acrem qualitatem offert, digerens, detrahens, & liquans, non teneram modò, sed & duram carnem. Porro suprà dictum est nonnullos eius generis medicamenta, epulotica, hoc est, quæ cicatricem inducant, appellare, cum ijs in tenuissimum pollinem tritis per specilli cuspidentem contigerint ulcera excrescentia, ac postridie contracta reperiant. tametsi illos haud lateat, si paulò plus impositum foret, sese ulcus non contractum, sed erosum inuenturos. Siquidem colliquat, & digerit carnem: cum medicamenta epulotica contrahant, constipent, constringant, & calli in morem illam indurent. Quin & gustum mordicat ærugo, non tantum ipsa ulcera. quod si pauculum eius cerato non pauco aduiscas, id quod ex ambobus mistum est, citra morsum extergit. Dictum uerò suprà est de talium medicamentorum natura, tum ut sese quidam fallunt ex talibus compositionibus, aut sarcoticam, aut epuloticam adscribentes facultatem medicamentis, quibus minime oportet: utpote cum ipsa id præstare uequeant, uerum ea, quæ ex ipsis composita sunt. Quæ ærugo id est ἔρως Græcis, Aerugo rasilis Latinis dicitur: Italis, Erugine rasilè. Quæ uerò Græcis ἰὸς σκῶληξ, Latinis Aerugo scolecia nominatur: Italis, Erugine scolecia: Arabibus, Ziniar, seu Zengiar: Germanis, Spangruen: Hispanis, Cardenillo: Gallis, Verderis & Verdet.

Aeruginum consideratio.

Aerugini vires ex Gal.

Nomina.

## Rubigo ferri.

## Cap. LIII.

**RUBIGO** ferri restringit: sistit scæminarum profluvia admota, potuque præstat ne concipiant. Illita ex aceto, ignibus sacris, & papularum eruptionibus medetur. Perquam utilis ad scabritias genarum, reduuias, & pterygia. Condylomatis prodest, gingiuas firmat, podagras illita lenit, alopecias replet. Vinum aquaue, in qua candens ferrum sit relictum, potu celiacis, dysentericis, lie-nosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliatur.

## Stercus ferri.

## Cap. LIIII.

**STERCUS** ferri, quam scoriam uocant, eadem potest, quæ rubigo, sed inefficacius. Aconito ex aceto mulso potum, opitulatur.

**FERRUGO**, quæ est ferri rubigo, uulgaris notitiæ est. Eius similiter scoria, quæ Latinis & stercus, & recrementum ferri, & nostris uulgo spuma di ferro appellatur, omnibus notior est, quam ut maiore indigeat declaratione. hæc nanque prope ferrarias officinas passim in aceruum congesta spectatur ab omnibus. Veruntamen ne aliquis fortasse decipiatur, illud nobis indictum non abibit, quod ferri, aut æris, aut argenti scoria non est squama, quæ mallo decutitur. Siquidem hæc ferrarijs fornacibus, quibus ferri metallum funditur, indita liquecit, & iterum in ferrum coit. Scoria uerò, quod inutile sit ferri recrementum, inane, & spongiarum modo spumofum, nunquam ferri efficere potest. Scoria meminit Galenus libro 1x. simplicium medicamentorum, sic inquit. Scoria omnis res ressecatoriū admodum medicamentum est, potissimum autem ferri. Siquid ad leuorem redigens ipsam in aceto quam acerrimo, posteaq; decoquens, ad aures, quæ longo iam tempore pure fluxerunt, ea utor, medicamento maxime excicatorio, adeo ut mirentur, qui præparantem me uident, & ante rei periculum fidem non habeant, aures tale posse ferre medicamentum. Porro argenti scoriam propriè helcysma appellant. Verum emplastris quibusdam ressecatoriæ facultatis commiscetur. Rubigo ferri Latinis dicta ἰὸς σιδῆρε Græcis appellatur: Arabibus, Seda albadid: Italis, Ruggine del Ferro: Germanis, Eysen rost: Gallis, Ruilleure de fer. Quæ uerò Græcis σκουρία σιδῆρε, Latinis, Scoria, Stercus & Recrementum ferri dicitur: Arabibus, Chab alhadid: Italis, Spuma de ferro: Germanis, Schalcken: Hispanis, Mozo de berrera, & Mozo de fragua.

Rubiginis, &amp; scoriz ferri consideratio.

Scoriz vires ex Galeno.

Nomina.

## Plumbum elotum.

## Cap. LV.

**LOTURA** plumbi sic fit. In mortarium plumbeum aquam injiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & limi modo crassescat, aut lutulenta reddatur: linteo deinde colato, aquam superinfundens, quod facilius quicquid est resolutum incerni possit. hoc iterum facito usque dum satis tibi habuisse videatur. ubi confederit priore aqua effusa, nouam adiiciens, ut cadmiam lauato, donec nulla extet nigritia: postea in pastillos cogens reponito. Quidam scobem mundi plumbi lima quæsitam, mortario pistilloque lapideis terunt, aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigrescat: mox ubi id pessum ierit, effusa aqua, colligunt in pastillos. nam tritum vehementer, cerussæ simile redditur. Alij elimatæ scobi modicam plumbaginem adiiciunt, affirmantes ita elotum plumbum præstantius esse. Potest refrigerare, adstringere, inducere, mollire, explere caua, sistere oculorum fluxiones, & vlcera excrescentia. Sanguinem supprimit: prodest contra sedis vl-

Kk

cera



ccra, condylomata, & hæmorrhoidas, ex rosaceo : item ad ea, quæ ægrè cicatricem ducunt : & in totum spodij effectus præbet, nisi quòd non obducit crustas. Syncerum plumbum affricu, marini scorpionis, draconisquæ plagis auxiliatur.

## Plumbum vstum.

## Cap. LVI.

VRITVR plumbum sic. Super quàm tenuissimas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur inspargito : additisquæ alijs rursus laminis, interiecto semper sulphure, vsquedum vas expleueris : succendito. flagrante autem plumbo, ferrea rude versato, donec perfectè redigatur in cinerem, nihilquæ è plumbo non vstum hæserit. tum demum obstructis naribus eximito : alioquin halitus plumbi noxius sentitur. Aut climatam plumbi scobem in olla sulphure vrito. Alij laminas in fictili crudo, vt dictum est, imponunt fornaci, aut foco, & circumlinentes operculum, dato exili spiramento, vrunt. Alij pro sulphure cerussam, aut hordcum inspargunt. Alij integras laminas imponentes, acri igne vtuntur, & rudicula ferrea continuè mouent, dum in cinerem soluantur. Sed difficilis huiusmodi vstio, & si vehementius vratur, contrahit spumæ argenti colorem. Magis tamen nobis placet prima vrendi ratio. Plumbum vstum lauatur vt cadmia, & reconditur. Eodem effectus habet, quos plumbum elotum, sed multò aciores.

## Recrementum Plumbi.

## Cap. LVII.

RECREMENTVM plumbi, quod scoriam vocant, optimum est, densum, fractu contumax, cerussam planè representans, nihil plumbosi habens, quod ad luteum colorem accedit, & vitri splendorem imitatur. Eadem, quæ plumbum exustum potest, sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs infusa aqua, & refusa summa aquæ parte, quæ luteum colorem duxit : idquæ sæpius, dum recrementum absumatur. Dein vbi confederit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos.

## Molybdoides, siue lapis Plumbarius.

## Cap. LVIII.

MOLYBDOIDES lapis à plumbi similitudine dictus, respondentem recremento vim habet, & eodem modo lauatur.

Scorix plumbi consideratio.

PLUMBI abluendi, atque etiam comburendi ratio, adeò lucidè constat à Dioscoride prodita, ut operæpretium non sit plura de ea referre. Veruntamen animaduertendum est, plumbi recrementum, quod Dioscoridi scorix vocatur, non esse plumbagineum, quæ excrementi instar, ubi plumbum igne liquecit, ab eo secedit. Quippe quòd hæc nil aliud sit, quàm purissimum plumbum, quod ignis ustione, cineris speciem induit. Hæc enim in plumbarijs officinis in purissimum plumbum facillè redigitur, quemadmodum & argenti spuma. Plumbi itaq; scorix sit tantum in fornacibus, ubi plumbi lapis metallicus funditur. Siquidem hoc probè fuso, artifices plumbum, quod inde effluxit, in scrobiculam extra fornacem delabi sinunt. Vbi uerò adhuc calens concreuit, aqua frigida persunditur, quousque scoriam exuat : quæ (ut Dioscorides inquit) densa admodum est, & fractu contumax, colore in luteū vergente, & vitri splendorem præ se ferens. Huius complures uidimus acervos in Tridentino agro, ac etiam in comitatu Tiroleusi, ubi innumera metallorum fornaces, die noctuq; ignibus aguntur. namq; in ijs locis metallorum recrementa, extra officinas abijciunt, monticulos ex his struentes. Quòd si accidat metallicos lapides ægrè igne in fornace liquecere, scorix huiusce partem aduiscunt, quoniam huius adminiculo citius metalla ignibus cedunt. Reperi ego sæpius plumbi, argentiq; scoriam adeò uersicoloribus lineis intersectā, pellucidamq; ut id vitri genus, quod uulgò Venetijs appellant Smalto, omni ex parte referret. Quare oportet eos, quibus in animo est, certan et exquisitam harum rerū cognitionem assequi, metallorum fodinas, & fornaces adire, nō autem ea in pharmacopolijs quærere, ubi omnia ferè metallica medicamenta spuria, & adulterijs uitata reperiuntur. Cæterum qui Lapidem plumbarium, siue molybdoidem hodie legitime ostendat, habeo profectò neminem, ni forte fossilis quoddam cadmiæ genus demonstrant, quod plumbum colore imitetur, qualis illa, quam uulgò uocant Marghesita di Stagno : quanquam hanc equidem molybdoidem esse non aui sim affirmare, quòd nullum latius Molybdoidis historiam scriptis mandasse compererim, quàm ipse fecerit Dioscorides. qui tamen eius historiam tam paucis perstrinxit, ut difficile admodum sit decernere, quinam lapis nobis legitimam molybdoidem representet. Et si fortasse non aberrarent, qui dicerent, plumbi lapidem ignem in fornacibus non experiri, ueram esse molybdoidem. quippe quòd hic colore, & pondere plumbum maxime referat. De plumbo diffusè satis differuit Galenus libro 1 x. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. Plumbum facultatis est refrigeratiæ. Siquidem non modò multum habet substantiam humidam à frigore congelatā ; sed & aerem, partem autem terream. Igitur quòd plurimum habet essentiæ humidæ à frigore coactæ, indicium tibi esto, quòd ubi ad motum est igni, celeriter fundatur, fluatq;. Quòd uerò & aeris sit particeps, hoc habeto signum omnium, quæ nouimus, unicum plumbum tum uole ipsa, tum pondere augetur, si condatur in edibus subterraneis, aerem habentibus turbidum, ita ut quæcunq; illic ponantur, celeriter situm colligant. Tum etiam plumbea statuarum uincula, quibus earum pedes annectuntur, sæpenumero creuisse uisum est, & quædam adeò intumuisse, ut ex lapidibus dependere crystalli

Lapis plumbarii consideratio.

Plumbi facultates ex Gal.



crystalli modo. Atq; hæ probabiles quidem sunt humiditatis eius, frigiditatisq; notæ, priusquàm experimētum fiat: ceterum scientifica, & certæ per experientiam cognoscuntur. Preparato igitur mortario, simulq; pistillo, utrisq; ex plumbo, infunde quenilibet liquorem: itaque terito, ut & pistillus, & plumbeum mortarium succum quandam reddant. Id quod ex utroq; constabit, multò erit frigidius facultate, quàm liquor ipse fuerat. Licet autem & aquam & uinū tenue aqueum, et oleum iniicere, aut quiduis eiusmodi. At si etiam plus efficere succum uoles refrigeratoriū, oleum omphacinum sit, aut rosaceum, aut melinum, aut myrtinum. Porro si succo, qui proueniet, uti uoles, optimū habebis remedium & ad phlegmonas in sede cum ulcere, aut rugis, & ad eas, quæ in pudendis, testibusq; & uberi bus consistunt: similiter aduersus cæteras omnes fluxiones incipientes, quæ aut in inguina, aut in pedes, aut in alium quemuis articulum decumbunt. Sed & ulceribus rebellibus utile est. Nam et ad cancrōsa eo utens, uirtutem medicamēti mirabere. Quòd si celeriter multum plumbei succi colligere uoles, conare in sole terere, aut quocunq; certè modo aere excalcato. Ad multa autem utile habebis medicamentum, si adfuso refrigerantium succorum quopiam teras, ceterum semper uiui, cotyledonis, intybi, lactucæ, chondryllæ, psyllij, omphacis, portulacæ. Porro si qua horum non facile in succum soluuntur, uelut portulaca, misceto illis aliorum succorum quempiam, uelut omphacis, qui & ipse per sese prædicto mortario inditus, medicamentum efficit refrigeratorium longè pulcherrimum. Quin & in la minam diductum plumbum absq; alio ullo, ipsum per sese athletarum sese exercitantium lumbis insternitur, ubi uene reis somnijs uexantur scilicet: nimirum haud obscurè eos refrigerans. Sed & bractea ex plumbo tenuis facta, probè ganglio illigata, planè ipsum dissipat. Illigabit autem probè quisquis ab Hippocrate didicerit, in ipsam noxam potius firmandum, quàm hinc uel inde. Mirum ergo non est, si plumbum crematum, ac rursus ablutum, refrigerantis efficiatur facultatis, cum ante lotionem miste fuerit. Et hoc ipsum medicamen, uenpe plumbum combustum, bonum est ad ulcerarebellia. Vbi uerò lotum fuerit multò optimum medicamentum est, & ad ulcerum impletionem, & ad eadem cicatrice obducenda. Conuenit & chironæis quæ uocant ulceribus, & cancrōsis omnibus, & putredinosis, tum ipsum per sese, tum medicaminum ad cicatricem perducuntium quibusdam commistum, quale est, quod ex cadmia con ficitur. Ceterum soluendum est principio, si copiosa sit sanies, quotidie: sin minus tertio, aut quarto quoq; die. Ve riorum foris spongiam imposito aquæ frigida, quæ si desiccet, rursum mergatur. Sed hæc fusius, quàm pro instituto diximus, plusculum sermonis affinitate prouecti. At tempus iam est sequentia deinceps persequi. hætenus Galenus.

Nomina.

Plumbum elotum sic Latinis, μόλιβδος παραμυμένος Græcis dicitur: Italis, Piombo lauato. Plumbum uerò ustū Latine dictum, μόλιβδος κακαμυμένος Græcè, Piombo abbrusciato Italicè uocatur. Quæ deinde σκαρία μόλιβδα Græcis; Latinis Plumbi recrementum, & plumbi scoriz appellatur: Italis, Spiuma del piombo. Quæ denique μόλιβδος Græcè, Molibdoides, & Lapis plumbarius Latine nuncupatur: Italicè, Pietra piombaria.

## Stibium.

## Cap. LIX.

STIBIUM optimum, quod splendidissimum est, modoq; nitedularum emicat, con fractu crusto sum, nihil terræ, aut sordidi habens, friabile, quod stibi appellant, alij platyophthalmon. Vis eius adstringere, meatus obstruere, refrigerare, ex crescentia in carne cohibere, vlcera ad cicatricem perdu cere, sordes, & vlcera oculorum expurgare: sistit & sanguinem è cerebri membrana profluentem & ut in uouerum dicatur, vis usto plumbo limilis est. Priuatim, ambusta igni in pustulas erumpere nō pa titur, cum ad pe recenti illitum. crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit, cum cera, & exigua cerussa. Torretur pinxita farina circumlitum, & carbonibus obrutum, donec carbunculetur crusta, exemptumq; restinguitur mulieris lacte, quæ marem peperit, aut uetere uino. Vritur etiam carboni bus succensis efflatum, quoad igni deflagret: si enim paulò magis concremetur, plumbum fit. Laua tur ut cadmia, & æs. Sunt qui ut plumbi recrementum eluant.

STIBIUM siue Stibium, recentioribus medicis, chymistis, ac seplastarijs, qui Mauritanorum doctrinam se stantur, Antimonium dicitur, quòd hoc nomine Serapio, & Auicenna Stibium appellauerint. Huius fodinæ pluribus locis habentur in nostro Senensi agro, sed præstantissimum foditur in maritimis nostris Massano solo, ac Suanensi: quinetiam in comitatu sanctæ Floræ prope Syluenam oppidum. Venetias adfertur ex Germania, fornacibus prius fu sum, & in massas concretum. Aiunt artifices, qui campanas conflant, has edere sonitum magis concinnum, magisq; auribus gratum, ac sonorum, si stibij nonnihil ceteris admisceatur metallis, dum una in fornace liquantur. Iis etiā expetitur, qui uasa è stagno conficiunt: item ijs, qui metallica faciunt, & poliunt specula: ijs præterea, qui chalcograpbis characteres, & typos effingunt. Id tantum differentia esse inter plumbum, & stibium ait Brasauolus Fer rariensis, quòd plumbum ignium uel liquefeat, stibium uerò nunquam sed facillè teratur in puluerem. Sed eius opinio nem falsam esse deprehendit experimentum. quandoquidem stibium igni adnotum, periude ac plumbum colliquescit, & fluuit. Cuius rei nos sæpius periculum fecimus: dum oleum nostrum ex stibio conficeremus, quo quidem magno suc cessu utimur ad contumaciā, sinuosq; ulcera sananda. ad id siquidem stibium pluries fundere oportet, ut syncerius, puriusq; reddatur. Ceterum admonitos lectores uolumus, oleum hoc nostrum è stibio paratum, non illud esse, quo chy mistæ argentum in aurum mutari fabulantur, sed aliud ab eo longè diuersum, tametsi hoc nostrum ex sese plus auri fundat, quàm illud chymistarum. Sed ut ad institutum nostrum reuertamur, mihi plane uanum uidetur asserere stibium igne haudquaquam liquefcere. Nam cum quolibet metallo, siue ferrum sit, siue chalybs, in fictili fusorio permistū, ea celerius eliquandi præbet materiam. Quam ob causam qui ferreos, sphericosq; globos bombardis immittendos è ferro conformant, nisi stibium ferro admiscerent, nunquam sanè (ut pro certo affirmant) id fluxum facerent.

Stibij con sideratio.

Brasauoli ex ratum.



Stibij vires  
ex Galeno.

Stibij vis de-  
ictoria.

stibij mentionem fecit Plinius lib. XXIII. cap. VI. ubi ita scribit. In iisdem argenti metallis inuenitur, ut proprie dicamus, spuma lapis candida, nitentisq; non tamen translucentis, stinmi appellant, alij stibium, alij alabastrum, alij larbason. Duo eius genera, mas, & scemina. magis probant sceminam. Horridior est mas, scabriusq; & minus ponderosus, minusq; radians, & arenosior. Scemina contra vitet, friabilis, fissurisq; non globis dehiscentis. hanc tenus Plinius. Stibij vires retulit Galeus lib. IX. simplicium medicamentorum, his uerbis. Stinmi ad facultatem desiccantem adiunctam habet hoc medicamentum adstrictionem: quamobrem & ocularibus medicinis commiscetur, & illis scilicet, quae conformantur in collyria quae uocant, & siccis, quae utique sicca collyria cognominant. haec Galenus. Ceterum stibium uim delectorian sortitur praestantissimam: quamquam nullus (quod ego sciam) antiquorum, neq; recentiorum, praeter unum Theophrastum Paracelsum, hoc literis memoriae mandauit. Quare non equidem grauabor in studioforum gratiam ea hic commemorare de huius medicamenti uiribus, quae uidi, atque etiam a medicis quibusdam fide dignis accepi. Etenim Andreas Gallus medicus Tridentinus, qui iam dudum honoratissime medicinam facit Serenissimo Ferdinando Archiduci Austriae, apud quem me nunc collegam habet, ex multis uigilijs magnisq; laboribus, quos in India & seruitum insumpserat, inciderat in malam ualitudinem, nempe in pulmonum, cordis, & uentriculi inflammationem: unde uehemens admodum sitis consequbatur, quae nullo quidem potu extingui poterat. Praeterea epiglottidis tumore, & tanta palati siccitate uexabatur, ut uix loqui posset. Quinetiam cordis palpitacionem patiebatur adeo magnam, ut nocte repente expergefactus putaret per cubiculum aliquem obambulasse. His denique malis accesserat capitis distillatio, a qua saepius suffocari metuerat. Porro metum mortis augebant nires, quae tot morbis quasi hostibus obsesse, facile poterant deficere & opprimi, ex eo praesertim quod nullus esset cibus, qui appetitum languiscentem excitaret, atque ita vires instauraret, uel saltem conseruaret. Addam quod os, et guttur eius saporem tetrum & carbonibus similem reddebant. quae sane omnia dictae inflammationis erant indicium non obscurum. Cui igitur res sua per aliquot dies ita se haberet, atque in maximo uersaretur discrimine, neq; ullum perciperet leuamentum suarum aegritudinum ex multis medicinis factis, ad stibium, quod Mauritanii Antimonium uocant, me nesciente, cofugit: quoniam saepe audiuerat medicamentum hoc sibi mirifice commendatum fuisse a Georgio Hansdschio medico familiari suo, qui illius experimentum fecerat in morbis difficillimis. Hac itaq; ratione ductus stibij in tenuissimum puluerem redacti, & rhodofacchari exiguo admisti, tria tantum grana sumpsi. atque paulo post temporis spatio sensit medicamentum illud uentriculi subuersionem moliri, ac leuem quendam calorem excitare. Mox erupit uomitus, quo solum quasdam cibi particulas reiecit, etsi superiore die non coenasset. Hunc paulo post alius secutus est uomitus similis: cui succedit bilis flauae reiectio ad unciarum fere quatuor pondus. Haec autem omnia eueniunt horae tantum dimidia spatio. Ex quibus nimirum illud cepit iuuamenti, quod statim omnis uentriculi labor sedatus est. Ex eo uero quod hora post ter biliosa inferne excreuit, in quibus crassa quaedam residebant (haec simul duarum librarum pondus aequare poterant) factum est, ut ab illa cordis palpitacione, capitis fluxione, & epiglottidis tumore statim sit liberatus, qui praeterea neque sitim molesta habuit, neq; cibi fastidium perpassus est. Quamobrem is corporis salutem ipsamq; uitam in tot morbis deploratam, Deo primum, deinde huic medicamento acceptam retulit. Alius quoq; stibij intus assumpti effectum silentio non dissimulandum mihi narrauit idem Georgius Hansdschius, cuius prius memini. Is enim cum esset pestilentia correptus, ob idq; maxima totius corporis imbecillitate affectus, cordis tremore, spirandi difficultate, capitis dolore, & sinistri inguinis abscessu, circa noctis crepusculum stibij rhodofaccharo admisti tria grana sumpsi. atque post horae dimidium uomitionibus reiecit magnam pituitam, bilisq; tum flauae, tum porraceae quantitatem, cum prospero admodum successu. Siquidem ex uomitu (sic ille dicebat) statim sublata est spirandi difficultas, ac cordis tremor cessauit. Vomitus deinde subsecuta est copiosa alui deiectio sine ulla aegrotantis molestia. post quam reliqua pestis symptomata prorsus euauerunt, atq; adeo breui is fuit integrae sanitati restitutus. Id quod etiam alijs contigisse scio, qui hoc admirabili medicamento sunt usi. Praeterea stibium opitulatur omnibus in uniuersum morbis, quos atra bilis excitauit, siq; praesertim qui hypochondriacam obtinent inflationem. Huiusdem uidi Pragae Bohemorum parochum, qui melancholicus factus plane despiciebat, multaq; stulte loquebatur. Huic sane exhibitum fuit stibium granorum duodecim pondo: quod paulo post copiose atram bilem per alium eduxit, cui erant admista (ut ego qui uidi uocatus tanquam ad miraculum, testari possim)amenta ueluti carnis, quae magnos uarices in particulas dissectos praese ferebant. namque excrementa illa sanguinem nigerrimum representabant potius, quam ullum ex alijs humoribus. Hoc utiq; illi tanta opem tulit, quod postera die uisus est belle pristinae mentis suae sanitatem recuperasse. Et quoniam is erat corpore robusto, & animo forti; ideo non est mirum, si facile & sine ullo incommodo tulerit tantam illius medicamenti quantitatem. quamquam audax nimis fore habendus est ille, qui ea exhibuit. Datur etiam stibium utilissime diuturna febre consumptis, & ijs qui spirandi difficultate laborant, praecipue asthmaticis. Prodest item conuulsis, comitialibus, ueternosis, resolutis, & ijs qui coli dolore cruciantur. Ceterum sunt qui asserunt stibium sumptum non secus humana corpora ab omnibus excrementis expurgare, atque idem reliqua omnia metalla, instrumentaq; metallica, quibus adijcitur, ab omni sorde purificare. Atqui in eius exhibitione diligenter animaduertere oportet, ut illud quod exhibetur, sit preparatum. Hanc ob causam nos hic eius praeparationem subiiciemus. Eligito stibium optimum, quod (ut Dioscorides tradit) splendidissimum est, modicoq; nitedularum emicat, con fractu crustosum, friabile, nihil terre aut sordidi habens. Id primum in puluerem facito: deinde in fistile uas, quod amplum sit, conijcito: tum demum carbonibus succensis ad calcinandum (ut chymistarum uerbo utar) sub dio exponito, atque interim cochleari ferreo continue moueto. Hoc uero dum fit, fumus exhalat tenuis, sulphur & auripigmentum redolens, qui si ore attrahatur, crebras interdum (ut audio) excitat uomitiones. quapropter qui uersant, uentis terga opponunt. Versare autem assidue expedit: nam si paulisper cesses, uel comburitur stibium, uel liquefit, atque iterum coalescit in glebas. Vix tamen fieri potest, etsi perpetuo uerses, quin aliqua parua gleba crescant.



creſcant. quas cū uideris, ſublato ab igne fictili, quod concreuit, rursus in puluerem redigito, atq; eidem fictili in-  
poſtum carbonibus reddito, aſiduoq; uerſato. Id quod toties repetendum eſt, quoties coaleſcentes glebulæ poſtula-  
uerint. Ita quoq; tandiu uerſare conuenit, quoad corpuſcula illa, quæ emicant, ſplendorem ſuum amiſerint, uapor  
omnis ceſſauerit, fœtor obſoleuerit, & Stibium in calcem conuerſum ſubalbicans cineris colorem contraxerit. per-  
fecti autem operis ſignum erit, ſi prunis ardentibus inſpergatur, nihilq; prorsus fumi emittat. Poſt hæc ſumito huius-  
ſce calcis, exempli gratia, libram mediam: ſtibij crudi, hoc eſt, non calcinati, unciam: chryſocollæ factitiæ, ſemun-  
ciam. Deinde chryſocollam & ſtibium terito in tenuem puluerem. Mox omnia ſimul miſceto, atque in fictili fuſorio,  
quo utuntur aurifices, igni uehementi admoueto: uas ſuper laterem prius collocatum, carbonibus accenſis circunda-  
to. Veruntamen operæpretium eſt in hoc magnam adhibere diligentiam, ne res illæ comburantur. Quocirca habenda eſt rudicula ferrea, & cū uas fictile candefcit, eā immiſſa, an Stibium liqueſcat, periculum faciendum eſt. nam ſi  
rudicula aliquid hæſerit, certum liquefactionis erit indicium. Hoc cū uideris, ſtatim à rude illud quod hæſit, abra-  
dito. Id autem primum eſſe ſolet coloris pallidi. Sed paulò poſt eodem experimento utendum eſt, idq; repetendum,  
uſq; dum illius, quod abraditur, color appareat flauus, uiuidior ac pellucens. Quare perſpecta nulla eſt trahenda mo-  
ra, ſed ſtatim uafe ab igne exempto cum forcipe igniario, res liquefactæ ſunt ſuper lapidem porphyreum uel marmo-  
reum guttatim proijciendæ. quamprimum enim concreſcent in lapillos, qui colore & nitore chryſopatios, atq; etiam  
nonnunquam granatos referunt. Hos autem repones in uſum, & cū ijs uti uolueris, in puluerē redigito, datoq; triū  
uel quat uor granorum pondere: id tamen pondus in robuſtioribus nonnihil augeri poteſt. Stibium ita præparatū com-  
modiſſimè admixcetur rhodoſaccharo, cui etiā maſtiches modicum adijcitur. Atq; hætenus de Stibij non uulgari ef-  
ficacia ac præparatione. quæ equidem omnia (ut ingenue fatear) in primis debeo Andræ Gallo uiro clariſſimo, cuius  
ſuprà mentionem feci. Stibium quod Latinis, *ſtiuum* Græcis uocatur: Arabibus, Aitmad, ſeu Atimad: Italis, *Nomina*.  
Stibio, & Antimonio: Germanis, *Spießglasz*, & *Roßſpießglasz*: Hiſpanis, *Piedra de alcohol*.

## Molybdæna, ſeu Plumbago.

## Cap. LX.

MOLYBDAENA optima eſt flaua, argenteæ ſpumæ æmula, modicè ſplendens, cū teritur ruſa, co-  
cta cum oleo iecinoris colorem trahit. Vitioſa eſt, quæ aerem, aut colorem plumbeum refert. Gigni-  
tur ex auro, & argento. Eſt etiam quædam foſſilis, ad Sebaſtiam, & Corycum inuenta. Quo in genere  
probat, quæ lapidoſa non ſit, aut recrementoſa, ſed nitens, & flaua. Vim habet ſpumæ argenti,  
aut recremento plumbi ſimilem. Vritur, lauaturq; eodem modo. Miſcetur conuenientiſſimè medi-  
camentis, quæ liparas vocant, atque emplatris minimè mordentibus. Carnem recreat, & vlcera ad  
cicatricem perducit: glutinantibus tamen medicamentis, aut abſtergentibus non conuenit.

MOLYBDAENA, ut Dioſcorides teſtatum reliquit, factitia eſt, & feſilis. Factitia ſit in fornacibus, ubi  
auri, & argenti metallum funditur. quandoquidem ubi auri, uel argenti uena, ſiue materia, plumbi tantum ſibi admi-  
ſtum non habet, quantum ad eius liquationem moliendā ſatis eſſet, qui operi præſunt, aut lapidem, à quo plumbum eli-  
citur, aut plumbum ipſum ſuperaddunt: quod tamen ignium ui partim cum admixtis metallis coit, partim uerò argenti  
ſpumæ modo fornacis ſolio coheret, & in molybdænā uertitur. Hoc itaque cū probè noniſſet Plinius, libro  
XXXIII. cap. XVI. de hac Molybdæna diſſeruit ijs uerbis. Plumbi nigri origo duplex eſt: aut enim eſt ſua proue-  
nit uena, nec quicquam aliud ex ſe parit: aut cum argento naſcitur, miſtisq; uenis conſtatur. Eius, qui primus fluit  
in fornacibus liquor, ſyucerum appellatur plumbum: qui ſecundus, argentum: qui remanſit in fornacibus, galena,  
quæ portio eſt tertia addita uenæ. Hæc rursus conſtata dat nigrum plumbum, deductis partibus duabus. Idem præ-  
bet argenti ſpuma, quæ Græcis lithargyros dicitur. hætenus Plinius. quamobrem facile aſſerere auſim, nil aliud eſſe  
ſe Molybdænā, quàm lithargyri ſpeciem, quæ poſtquàm eſt fornace fluxere metalla, in ipſius fornacis fundo concre-  
ta, peruſtaq; reſidet. Proinde non ab re dixiſſe uidetur Galenus, quòd Molybdæna iſdem polleat uiribus, quibus &  
argenti ſpuma. Quæ autem in terræ uiſceribus foſſilis naſcitur, nil aliud ſanè fuerit, meo iudicio, quàm metallicus  
ille lapis, qui plumbum, & argentum ſimul continet. Hunc equidē teſtari poſſum uaria ſe facie oſtendi: quippe quòd  
alius ſit colore luteo, alius cinereo, alius cæruleo, alius uerò ſcintillans cernatur, atque nitorem præ ſe ferens, pro  
uarijs, ac diuerſis terræ uaporibus, qui in metallicos lapides feruntur. Quòd autem eiufmodi ſit Molybdæna foſſitia,  
teſtis eſt Plinius lib. XXXIII. cap. XVI. ubi ſic inquit. Eſt & Molybdæna, quam alibi galenam uocauimus  
plumbi & argenti uena communis. Et libro XXXIII. cap. VI. ita ſcribit. Argenti metallum terra eſt, alia ruſa,  
alia cinerea. Excoqui non poteſt, niſi cum plumbo nigro, aut cum uena plumbi, quam galenam uocant. hæc Plinius.  
Cæterum palam eſt, Molybdænā factitiā nihil à lithargyro diſſerre. Hoc non latuiſſe Galenum, eius uerò  
ba declarant libro IX. ſimplicium medicamentorum, dum ait. Molybdæna ſimilem lithargyro uim poſidet tantum à  
media temperie ad frigidum paululum quid recedens. Sed nec abſtergentis facultatis eſt particeps. Vtraque autem  
hec medicamina liquari poſſunt: ac non ut lapides, & cadmia, & arena liquationem reſpuunt, ſed celerrimè liquan-  
tur, ubi oleo additum nonnihil aceti eſt: liquantur tamen etiam admixta aqua, ſed diutiſſima coſtione. Porro ceu in  
Cypro cadmiam, quæ in montibus, & riuis naſcitur accipiebam, quæ & ipſa lapidis, ut dixi, ſpecies eſt: ad eundem  
modum molybdænā multā, cum alijs proiectā lapidibus conſpexi in uia, quæ ad Ergaſteria ducit à Pergamo.  
Vocatur autem Ergaſteria pagus quidam, in quo & metalla ſunt inter Cyzicum, & Pergamum quadringentis, &  
quadraginta ſtadijs diſtans à Pergamo. Molybdæna ſic Græcè, ut etiam Molibdena Latine dicitur: Italice, *Nomina*.  
Piombaggine.

Molybdæne  
conſideratio.Molybdæne  
vires ex Gal.



## Argenti recrementum.

## Cap. LXI.

RECREMENTVM argenti, quod scoriam vocant, aut helcysma, aut encauma, molybdæna vim habet. quare emplastris, quas phæas appellant, additur, ac medicamentis, quæ cicatricem obducunt, utpote cum adstringat, extrahatque.

Argenti scoriam consideratio.

Vires ex Gal. Nomina.

COMPLURES argenti scoriam acerui, quam vulgò Loppa uocant artifices, extra fornacum domos uisuntur in agro Tridentino prope Perzenum, & Lauisum, & in comitatu Tirolensi, ubi perpetuò argenti metallum in fornacibus uritur, ut in præcedentibus diximus de plumbi scoriam differentes. Facie hæc uirum, quod Veneti ab inditibus quibusdam vulgò Smalto dicunt, adeò refert, ut perdifficile sit alterum ab altera dignoscere. Varijs hæc coloribus conspicitur, pro admistorum (ut opinor) fossilium uarietate. nigricat tamen cum plurimum, & quibusdam exartur lineis cum ceruleis, tum etiam uiridibus. Nec deest etiam quæ uiridi tantum, & quæ solum ceruleo spectetur colore. Huic vires reddit Galenus lib. IX. simplidum medicamentorum, his uerbis. Argenti scoriam propriè helcysmam appellant. Emplastris quibusdam resicatoriæ facultatis commiscetur. Quod Latinis Argenti recrementum, Græcis ἀργύρεα σκωπία uocatur: Italis, Scoriam dell'argento.

## Spuma Argenti.

## Cap. LXII.

SPUMA argenti quædam gignitur ex arena, quam molybdein vocant, in fornacibus conflata, donec perfectè igni incandescat: altera ex argento: tertia ex plumbo. Probatissima est Attica: secunda Hispaniensis: has sequitur, quæ sit Dicæarchiæ, id est Puteolis, Baijs, in Campania, & Sicilia. pluri enim hisce locis è flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, chrysis appellatur omnium optima: quæ in Sicilia, argyritis: quæ ex argento, calabritis. Vis autem adstringere, mollire, explere caua, excrescentia in carne reprimere, ad cicatricem ducere, refrigerare, & occludere. Vritur argenti spuma, confractis partibus ad magnitudinem iuglandium prunæ superpositis: ita accensa foliis, ut conflaret, abstergitur insidens spurcitia, & reconditur. Aliqui ter aceto, aut vino restinguentes, rursus vrunt, & eadem profecti, reponunt. Lauatur ut cadmia. Ut argyritidi nominatæ, aut, si desideretur, alteri candor detur, ea in partes magnitudine fabarum confracta, chænicis Atticæ mensura, fictili nouo superfusa aqua, addito candidi tritici pari pondere, priuatimque pugillo hordei, linteolo puro, raro, ansulis uasis alligato, coquitur, donec hordeum fractum diluiliat. deinde omnia in nouum craterem oris ampli transfunduntur: triticum abijcitur, spuma argenti vehementer manibus affricando, infusa aqua lauatur, assiccataque in Thebaico mortario teritur, affusa feruente aqua, donec soluta fatiscat. Excolata aqua, iterum tota die teritur, & uespere infusa calida aqua finitur: mane colis excernitur, alia infunditur, atque ter die excolatur. Id septem diebus fieri solet: postea additis ad singulas minas spumæ argenti, quinis salis fossilis drachmis, infusaque calida aqua, ter die teritur, & addita aqua excolatur: cumque inaluerit, calida infusa, idem facito, dum nullam prorsus falsedinem resipiat. demum ardentissimo sole siccata, eiecto prius humore reconditur. Sin minus mina spumæ argyritidis diligenter teritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, inficibile nouum conijcitur, aqua infunditur, ita ut superemineat: mouetur quotidie mane & uespere, aquaque superinfunditur, priore nequaquam effusa. hoc fit triginta diebus: nanque nisi moueatur, acratesscit usque ad duritiem testæ. Post hæc effusa leniter muria, in Thebaico mortario spuma argenti teritur, coniectaque in fictile aquam continens, manibus diligenter agitur, mutata subinde aqua, donec nullum falsuginis indicium præbeat. deinde quod ex argenti spuma candidum apparet, in fabarum aliud transfertur, & reductum in pastillos, plumbea pyxide conditur. Alii spumam argenti in fabarum magnitudines confractam, in ventre suillo crudo ex aqua coquunt, dum viscus eliquescentis contabescat, exemptamque cum sale pari terunt, & ut supra dictum est lauant. Sunt qui salis libram unam, & spumæ argenti tantundem, in sole terant, aqua continuè mutata, dum candor ei detur. Alia ratio. Sin mito quantam vis argenti spumam: ubi lana candida inuolueris, fictili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum recentium, repurgatarumque decoquito: cumque fabæ disruptæ dehiscant, lanaque non denigretur, exemptam argenti spumam, & altera lana inuolutam, iterum coquito, cyathum aquæ, & parum fabarum modum adijciens. eadem tertio, quæ supra, facito: in summa tantisper, dum lana iam non inficiatur. Insuper transfundens in mortarium, ad singulas salis fossilis libras, adijcitur octogenas spumæ argenti drachmas Atticas, & terito: intermittensque nitri quam albisimi cum aqua diluti drachmas quadraginta septem indito: iterum terito, donec satis candoris contraxisse videatur. Ita autem fundens eam ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, ubi confidere desiderit,colato: tum nouam superadijciens aquam, manibus probè versatam, finito ut confidat, ac rursus per colum trajcito. Alternis eadem proficere, dum pura aqua, dulcisque effluat, & nullam falsedinem præ se ferat. Postremò in fictile nouum translata, colato sensim omni humore, soli quadraginta diebus sub Caniculæ sydus exponito, & siccata utitur. Elotam autem constat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum fœditates tollendas, ad rugosas facies, & cicatricosas, laceratasque, & macularum plenas.



**FIT PLERVNQVE** Argenti spuma, quam Græci lithargyrum uocant, ea inquam, cuius hodie apud se-  
 plasmarios est usus, in metallorum fornacibus, ubi repurgatur argentum, è plumbo argenti recrementis admixto. Si-  
 quidem cum artifices argenti massam à sua uena defluxam à commixtis metallis, nempe plumbo, æreque repurgare uo-  
 lunt, in alueum è cinere suo more paratum, plumbi multum conijciunt, adeo ut ui subditi ignis colliquatum, balnei  
 speciem referat. In hoc demum argentum repurgandum immittunt, quod plerumque (ut diximus) aut plumbum, aut  
 æs habet admixtum. Dum autem hæc perficiuntur, uisitur plumbum in liquefcentium metallorum superficie, ignium  
 ui solium statu continuè excitata, olei modo supernatans. quod tandem postquam æs, aut plumbum, quod prius ar-  
 gento fuerat admixtum, in se contraxit, eorundem solium statu ad cinerei alui oras pedetentim expellitur. Hoc cum  
 uident artifices, alueum in latus secant, labiq; sinunt in humum: fitq; hoc modo lithargyrum, coctionis diuturnitate,  
 & metallorum aliorum mistione, ea forma concepta. Huic, postquam refluxit, quandoque aureus, quandoque ar-  
 genteus emicat splendor. Quo factum est, ut hunc argenteum, illum aureum passim seplasmarijs ac medicis dicatur, o-  
 minino existimantes, alterum ex auro, alterum ex argento conuari. Caterum coloris huiusce uarietatem lithargy-  
 rum haudquaquam ex auri, uel argenti spuma contrahit, sed quod plus, minusue ærei uaporis ab argento detracti, in-  
 tra se receperit. Siquidem (ut ego pluries experientia comperi, & ipsi quoque testantur artifices) argentum depu-  
 randum si plurimum sului æris contineat, huius & plumbi mistione, lithargyrum aureus redditur: sin minus, argen-  
 teus efficitur. Quare nobis affirmare licebit, nil aliud esse lithargyrum, quam plumbum æris uel argenti uaporibus  
 commixtum. Non itaq; temere prodidit Dioscorides fieri argenti spumam aut ex arena, quam molybditum uocant, aut  
 ex argento, aut ex plumbo. Cui subscribit Plinius libro xxx. cap. vi. Meminit argenti spumæ Galenus lib. ix. Lithargyri  
 simplicium medicamentorum, sic de eius uiribus scribens, Lithargyrum desiccatur quidem, uelut alia omnia metallica,  
 lapidea, terrenaq; medicamenta, uerum omnium id efficit moderatissime: & secundum alias tum qualitates, tum fa-  
 cultates, quodammodo in medio est, neque manifestè excalfaciens, neque refrigerans, modica tamen adstringendi, abster-  
 gendiq; facultas ei inest. quamobrem inferior est & sarcoticis medicamentis, quæ mediocriter extergentia ostendi-  
 mus, & contrahentibus, atq; adstringentibus. Caterum ad intertrigines femorum utilis medela est: quandoquidem  
 utriusq; iam dictæ facultatis leuiter est particeps. Iure itaque medijs ordinis in metallicis habebitur. Proinde ea fre-  
 quenter utimur ceu materia ijs miscentes, quæ ualentem facultatem obtinent, siue mordicantem, siue adstringentem,  
 uel aliud quippiam efficientem, sicut in liquefcentibus ad pleraque medicamenta ceram adhibemus tanquam materiã,  
 quia scilicet & ipsa quodammodo medium tenet eorum, quæ ualentem facultatem possident. *Λιθάργυρος* sic Græ-  
 cè, ut Lithargyrum item & Spuma argenti Latine dicitur: Arabice, Martech, siue Merdasengi: Italice, Spuma  
 d'argento: Germanicè, Glett: Hispanicè, Almartaga, Lithargirio, & Yezes de oro.

Spumæ argē-  
ti confid.Lithargyri  
res ex Gal.

Nomina.

## Ceruſſa.

## Cap. LXIII.

**CERUSSA** fit hoc modo. infuso in urceum oris lati, aut fictile labellum quàm acerrimo ace-  
 to, laminam plumbeam supra fictilis spiraculum, subiecta prius arundinea tegete, firmato: super-  
 iectisq; uelaminibus, ne halitum expiret acetum, ubi resoluta fuerit, defluensq; deciderit, hu-  
 morem purum ad summa delatum colato, crassamentumq; transfundito. debet quoque sicari in  
 sole, mox trusatili mola teri, aut alias tritum cribrari. postea quod superest duri, in tenues partes  
 redigendum, cribrandumq; uicissim eadem tertio, quartoq; facienda. Melior, quæ primò cri-  
 brata est, & medicamentis oculorum assumenda. Secundum locum tenet sequens, & reliquæ suo or-  
 dine. Nec desunt, qui ligneas rudes in medio uase appendant: & deraſo ceu situ imposito, ita ut ace-  
 tum non contingat, inditoq; operculo circumlinentes dimitunt. Post dies decem laxato obtura-  
 mento uisunt: cumq; resoluta materia fuerit, reliqua, ut supra diximus, exequuntur. Si autem quis  
 in pastillos uelit digerere, aceto acri subacta, diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. Aestate ta-  
 men supra dictum opus obeundum est: ita enim candida, atque efficax redditur. Quinetiam hyeme  
 paratur, urceis supra furnos, balnea, aut fornaces impositis: ascendens enim calor idem, quod sol  
 præstat. Laudatissimam fieri putant Rhodi, & Corinthi, aut Lacedæmone: proximam Puteolis.  
 Torretur hoc modo. Flagrantibus igni carbonibus, fictili nouo, maximè Attico, tritam cerussam  
 imponito, & assidue uersato: cumq; cinereum colorem traxit, eximens refrigerato, & utitor. Est  
 & aliud urendi genus. Trita patinis nouis supra prunas imponitur, & ferulacea rude mouetur, do-  
 nec colore similis sandarachæ fiat, extractaq; ad usus ministratur. Que uerò ita parata est, Sandyx  
 à quibusdam dicitur. Lauatur cerussa cadmiæ modo. Vis ei refrigerare, occludere, emollire, explere,  
 extenuareq; insuper excrescentia leniter reprimere, & ad cicatricem perducere. Miscetur cera-  
 tis, & emplastris, quæ liparæ uocantur, pastillisq; . Est autem lethalis eius potus.

**CERUSSA** medicamentum est omnibus notum. Factitia tamen res est. Venetijs plurima conficitur, sicuti &  
 in alijs compluribus Italiæ locis: quod non solum in medicamentorum usus expetatur seplasmarijs, ac medicis; sed  
 etiam pictoribus, qui ea frequentissime in suis operibus utuntur. Paratur ex cerussa (ut Dioscorides inquit) Sandyx,  
 quod officinæ Serapionem secute minium appellant, non autem Sandaracha, auripigmenti genus, ut libro de compo-  
 sitione medicamentorum existimat Fuchsius. Siquidem Sandaracha, ut suo loco dicitur, fossilis res est, non autè fa-  
 ctitia. Cerussæ meminit Galenus libro ix. de simplicium medicamentorum facultatibus, ita scribens. Psimmythiū,  
 id est Cerussa, & hoc medicamen testimonium præbet modò dictæ facultati. Nam si ex acri aceto soluatur, gustu ta-  
 men

Cerussæ, &  
sandycis con-  
sideratio.Cerussæ uires  
ex Gal.



men neque acre erit, neque mordax, neque discussorium, sed emplasticum, & refrigeratorium: facultatis ærugini dissimilima, tametsi & illa conficiatur aceto & dissolvente. Porro cerussa adusta in Sandycæ, quam uocant, transit, medicamentum seipso tenuius, nondum tamen excalfaciens. hæc Galenus. Ex quibus liquidò patet, Sandycem, & sandaracham, maximè inter se facultatibus pugnare. hæc nanque Galeni, & Dioscoridis testimonio arsenici modo carnem exurit, & crustas sua uehementi uredine, ac caliditate, morsuq; uiolento excitat: illa uero nulla sui parte excalfacit, sed potius refrigerat. Id quod in uulgari officinarum minio faciliè deprehenditur. Sandycis meminisse uidetur Vergilius in Bucolicis, dum his uersibus cecinit

Ipse sed in pratis aries iam suauè rubenti  
Murice, iam croceo mutabit uellera luto.

Sponte sua Sandyx piscentes uestiet agnos.

hactenus poeta. Cerussa, quæ ita Latinis, *Κυρίον* Græcis appellatur: Arabibus, Affidegi, seu Affidagi: Italis, Cerusa: Germanis, Bley uueisz: Hispanis, Alualyalde, & Blanquet: Gallis, Ceruse. Quæ uero *σάνδυξ* Græcè, Sandyx item Latine uocatur: Arabicè Afrengi, Sarchon, Sandicon, Sandax, Syrengi, siue Serengi: Italicè, Sandice: Vulgus, Minio.

## Chryfocolla.

## Cap. LXIII.

**CHRYSOCOLLA** laudatissima Armeniaca, colorem porri quàm simillimè reddens. Secundum locum sibi uendicat Macedonica: & proximum Cypria. quo in genere præfertur pura: damnatur, quæ terram, aut calculos collegerit: Ratio lauandi hæc est. Tusam infusa aqua, mortario expassa manu ad pilam uehementer fricato, & statim quàm confederit, colato. Alteram infundens aquam, rursus terito. hæc uicissim prosequere, donec pura, synceraque spectetur. dein siccato in sole, & ad usum recondito. Quod si urere uolueris, ex ea terens quod satis esse uidebitur, patinis supra carbonem adposito: & alia facito, quæ supra diximus. Dos chryfocollæ ad purgandas cicatrices: excrestem carnem coercet, adstringit, purgat, excalfacit, & modicè corpus mordendo exest. Inter medicamenta intelligitur, quæ uomitiones concitant, & necem inferre possunt.

Chryfocollæ  
historia.

**CHRYSOCOLLA**, ut Plinius est auctor lib. xxxiii. cap. v. naturalis historie, humor est in puteis, per uenam auri defluens, crassescente lino rigoribus hybernis, usque in duritiâ pumicis. Laudatiorem eandem in ærarijs metallis, & proximam in argentarijs fieri compertum est. Inuenitur & in plumbarijs, uilior etiam auraria. In omnibus autem ijs metallis fit & cura, multum infra naturalem illam, immisus in uenam aquis leuiter hyeme tota, usque in Iunium mensem. Dein siccatis in Iunio, & Iulio: ut planè intelligatur nil aliud chryfocolla, quàm uena putris. Natiua duritiâ maximè distat, luteam uocant. & tamen illa quoque herba, quam luteam uocant, tingitur. Natura est, quæ lino lanæue ad succum bibendum. Tunditur in pila, deinde tenui cribro secernitur, postea molitur, ac deinde tenuius sic cribratur. Quicquid non transmeat, reperitur in pila, dein molitur. Pulvis semper in catinis digeritur, & ex aceto maceratur, ut omnis duritiâ soluiatur. Ac rursus tunditur, dein lauatur in conchis, siccaturq;. Hactenus de chryfocolla Plinius. Ceterum seplastarij, quemadmodum aurifices, Chryfocollam uulgo Borræce uocant, Mauritanos secuti: cum tamen pauca admodum in officinis reperiatur, quæ syncerissima dici possit, & quæ colore sit uiridi porraceoq;, ut Dioscorides inquit, et præstantissima exposcit. Siquidem subnigricat hæc, nec ulla ex parte uirescit. Quæ saturato colore uires (ut mea fert opinio) in ærarijs tantum metallis foditur: quæ nigricat, in plumbeis, quæ albicat, in argenteis: & quæ pallescit, in aureis. Vnde mihi faciliè persuasum est, Chryfocollam sibi uarium colorem uendicare, pro metallorum, in quibus foditur, ratione. Porro factitiâ ex alumine rupeo, sale nitro, ac etiam alijs quibusdam admistis, copia non deficit. Idcirco aurifices, qui ea ad aurum ferruminandum frequentissimè utuntur, ipsam magna quidè diligentia seligunt. quanquam & ipsi plerunque decipiantur: tanta in omnibus est impostorum astutia. Præferunt auro ferruminando illam, quæ lutea est: tametsi in medicamentorum usu, præstantior sit uiridis. Fit etiânum chryfocolla (ut Dioscorides prodidit libro secundo in urinae mentione) ex puero rum urina in æreo mortario, pistillo item æreo subcalenti sole tandiu ducta, ut unguenti modo crassescat. Quod præriter literis memoriæq; mandauit Galenus libro ix. simplicium medicamentorum, sic inquit. Chryfocolla, & hoc medicamentum ex ijs est, quæ carnem liquant, non tamen ualenter mordicat, quanquam sit facultate admodum digerente, desiccanteq;. Igitur quidam id modò, quod in metallis inuenitur, ita nominant: alij uero id, quod in æreo mortario, pistilloq; æreo, ex pueri urina præparatur: id quod quidam inter æruginum differentias numerant. Satius uero est ipsum præparare tempore æstiuo, aut certè acre prorsum calido, urinam in mortario terrentes. Præstat autem, ex quo mortarium pistillumq; conficias, rubrum sit. Nam quo æs tenerius fuerit, eo plus circumagendo pistillo deteritur. Hoc medicamentum aptissimum est ulceribus contumacibus, tum per se, tum alijs mistum, ut in opere de componendis medicamentis referetur. Nunc autem id nouisse sat est, quod quanto plus quàm Chryfocolla metallis ea desiccet, minusq; mordicat, tantò etiam ipsam excellit tenuitate. Ipsam tamen Chryfocollam illam si uras, multò tenuiorem efficies. Ut Græcis *χρυσόκολλα*, ita etiam Latinis Chryfocolla, & Auri glutinum appellatur: Arabibus, Tincar: Italis, Chryfocolla: Germanis, Borrass: Hispanis, Atincar, & Borrax.

Chryfocollæ  
uires ex Gal.

Nomina.



## Lapis Armenius.

## Cap. LXV.

ARMENIVS lapis præfertur lævis, colore cœruleo, perquam æquabilis, calculo carens, & friabilis. Eadem, quæ chrysocolle præstat, sed inefficacius. Quinetiam usum habet ad pilos in palpebris alendos.

ARMENIA, ut lib. XXXV. cap. VI. testatum reliquit Plinius, lapidem mittit, qui eius nomine appellatur. Lapis est hic quoque chrysocolle modo infectus: optimumque est, quod maxime uiride est, communicato colore cum cœruleo. Plinio subscribit Auicenna sic inquit. In lapide Armeno est aliquantulum azuli coloris, non tamen est in colore azuli, & non est in eius soliditate, sed est in eo arenositas quædam: & quandoque utuntur eo pictores loco azuli, & est lenis tactus. Ex horum sanè uerbis perspicuum fit, lapidem Armenium colore esse uiridi, ad cœruleum inclinante. Talis autem esse comperitur, qui in argenti fodinis, in compluribus Germaniæ locis foditur: & è quo cœlorem illum ad pictorum usum parant, quem uulgo uocant uer de azzurro, ac si diceres uiride cæsum, uel uiride cœruleum. Nanque is colore chrysocolle refert, sed duritie præcellit. Quamobrem crediderim ego, eos non longe abesse à ueritate, qui dicerent, Germanicum hunc lapidem illi congenerem esse, quem Armenia mittit, siquidè patrium Armenij nomen genus non immutat. neque etiam obstat, quin & in alijs regionibus, lapis hic gigni possit. Quippe Phrygius lapis à Phrygia regione dictus, optimus in Cappadocia foditur, ut Dioscorides est auctor. Id quod facile ostendit, Armenian præter Armeniam, alias quoque regiones gignere posse. Nec refert, quod scripserit Manardus Ferrariensis libro III. epistola III. Armenium lapidem hodie non facile inueniri posse. Quandoquidem cum certè sciam, multa in officinis fieri omnibus deesse medicamenta, eaq; præsertim, quæ ex metallorū fodinis expetuntur, quæ tamen suo natali solo, ubi proueniunt, copiosa reperiuntur, mirum certè non fuerit, si Armenio etiam lapide careat seplasiarj. Hac itaque ratione ductus, haudquaquam dubitauerim affirmare, quin & hic in Germaniæ metallis proueniens, in Armenij lapidis genere legitime recenferi queat. quemadmodū in Gagatis, Phrygijs, Asijsq; genere nobis recipiantur, qui alibi, quàm in Gaga flumio, in Phrygia, & Assio inueniuntur. præsertim cum notis omnibus ac uiribus Armenio per omnia similis hic habeatur. Notis quidem, quod summe uireat, & ad cæsum colorem proxime accedat. Viribus autem, quod (ut equidem testari possum) atra bile uexatis maxime conferat, ijs uomitum, & aluum ciens. Porro seplasia (ut omnibus constat) non modo multis destituuntur substitijs medicamentis, sed continue alterius loco supponunt: nempe cadmia pompholygis loco, spodij uice complura antispodia, & pro flore aris rasilem æruginem subiiciunt: cum tamen & pompholyx, & spodium, & flos aris copiosa, legitimaq; reperiuntur omnibus in fornacibus, ubi argentum, & æs funduntur. Nam ex hoc, quod in officinis non reperiatur Armenius lapis, quemadmodum alia complura, haudquaquam colligere licet, quod hæc omnia suis in fodinis fornacibusq; non habeantur. Præstat mirum in modum Armenius lapis (et si id Galeno, Paulo, alijsq; ueteribus incognitum existimetur) ad atram bilem deiciendam, ut testis est Alexander Trallianus clarissimus auctor, libro primo capite de melancholia, ubi sic inquit. Quod si hiera data melancholiæ imaginationes nihilominus infestare uideantur, tunc sine ulla cunctatione lapidem Armeniacum dare festinato. Noui enim ex ueteribus antiquiores ad ueratrum album properasse, ubi affectum ab alijs purgationibus nihil penè imminui conspicerent. Verum ego lapidem Armeniacum ueratro albo præfero, atque licet utentem ipso experientia cognoscere, quomodo præterquam efficaciter, etiam sine molestia, & periculo purget. quorum nihil album ueratrum habere nouimus. Si igitur res postulat, non modò infra per aluum, sed etiam per uomitum purgationem fieri, lapidem illotum exhibere conuenit. Sit autem modus ipsius scrupuli tres, aut tiam per uomitum purgationem fieri, lapidem illotum exhibere conuenit. Sit autem modus ipsius scrupuli tres, aut quatuor, aut paulò amplius, minusue, pro uirium simul, & copię humoris noxij ratione. At si æger purgatione per uomitum non admodum indigere uideatur, sed per inum uentrem totum uitiosum humorem exire conducat, tunc lapidem eluere oportet usque ad duodenas (uetus legit quinquagenas) uices. Vbi enim sic fecerimus, neque turbationem stomachi, aut compressionem lapis excitare potest, sed etiam minori cum molestia nigrum terrestremq; humorem nem stomachi, aut compressionem lapis excitare potest, sed etiam minori cum molestia nigrum terrestremq; humorem uacuabit, ut paucis præteritis diebus adiumentum ex eo nobis accessisse percipiamus. Dato autem ex eo scrupulos quinque, aut sex, ut plurimum ex aqua tepida, semper ex cognatis dictis coniectura deprehendens an plus, minusue exhibere debeas. Quod si ægrum etiam bis adhuc requirere suspiceris, cum fiducia rursus exhibeto. neque enim cælorem habet, aut siccantem admodum, aut aliam quampiam ipsi insidentem, amarā, & uenenosā qualitatem, ut æger ideo medicamentum bibere detrectet. Sin autem nonnulli humidum aliquod medicamentum sumere aduersentur (multi enim in totum non sustinent liquidum medicamentum assumere) in catapotia lapidem redigere oportet. Si uero libet, etiam picræ aliquem insignem partem admisceto, aut etiam ex alijs quibusdam, quæ purgationem magis promoueant, & non renitantur. Ne autem is, qui parare uelit horum confectionem, inquirendo laboret, uisum mihi est ea de causa etiam horum compositionem meminisse. Habet autem in hunc modum. Picræ semuncia, epithymi semuncia, agarici scrupuli quatuor, scammonie uncia, garyophyllorum grana uiginti. Contusa excipiantur rhodomelo, aut succo citrij, aut rhodomelite. Dentur scrupuli duo, plurimum quatuor. Notandum uerò est, præterquam quod uentriculum corroborant, simul etiam uarios humores, præsertim terrestrem, & melancholicum, citra molestiam purgare posse. hætenus Alexander. Cæterum Armenium lapidem deiectoria facultate pollere in atrabiliarijs morbis, nouit etiam Aetius. quippe qui lib. II. cap. XLVII. ex Nicheffonis medici auctoritate, sic de eo scriptum reliquit. Armenium, quo pictores utuntur, duodecima drachmæ parte melancholicis, & crassum sanguinem habentibus dato. Datur & pueris pectoris morbo infestatis: reuomunt enim, nam uomitorium existit. Datur & morbo sacro obnoxiiis, ac furiosis, hoc modo. Centaurii fasciculos manipulares tres in aquæ marinæ heminis tribus coquito, donec

Armenij lapidis confide ratio.

Armenij lapidis uites ex Alexandro.

Vires eiusdē ex Aetio.



donec una supersit, & cum excolato decocto, Armuthei lapidis, quem Græci Armenium uocant, tertiam drachmæ partem terito, ac confidenter exhibeto. nihil enim periculi est. Itaque nosse operæpretium est, quod Armeniū peccatus reuomitur, nihil memorabile sursum efferens, sed, & infernè modicum quid paulatim, & in pluribus secessibus effert. hæc Aetius. Nouit præterea Armenij uires deiectionarias inter recentiores Græcos Actuarius, ut uidere est, in suo de compositione medicamentorum libello. Verum alias ab illis Armenio lapidi uires reddidit Galenus libro IX. simplicium medicamentorum, his uerbis. Armeniacum uim habet extergentem, cum leuicula acrimonia, & leuissima adstrictione. Itaque tale cum sit, ocularibus miscetur facultatibus. Et ipso per sese quoque ad pollinis leuorem redacto, utimur sicco ad pilorum in palpebris incrementum: nempe ubi præ humorum acrimonia partim excedunt, partim uerò nec crescunt, nec aluntur. Siquidem depastis his acrimonijs, in bonum naturæ habitū pars reductur: cuius cum alia sint munera, tum etiam producendi, incrementum præbendi, ac roborandi, qui in palpebris sunt pili. quippe cum prima, & ex professo, quædam sint medicamentorum opera: quædam uerò mediante natura, quæ animantium corpora dispensant, eduntur, uelut quæ in his ipsis calliblephara nuncupant. Ipsa enim partes modè ratè læsas mediocriter deficcant, pilos corruptentem humiditatem absorbendo. quæ ubi abolita est tum natura ad proprias redit actiones, nimirum sublati, quæ hæcenus ipsi impedimento fuerant. Lapis, qui Græcis Ἰνδός & Ἀρμενίος, Latinis Lapis Armenius cognominatur: Mauritanis, Hagiar Armeni: Italis, Pietra Armenia.

## Cœruleus Lapis.

## Cap. LXVI.

COERULEI origo ex ærariis metallis in Cypro. copiosior ex arena litorali secundum quosdam subcauatos specus maris inuenitur, qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vritur ut chalcitis. lauatur ut cadmia. Vim habet reprimentem, & modicè erodentem. crustas gignit, & exulcerat.

COERULEVM officinæ Auicennæ doctrinam secuta, lapidem Azuli, uel, Lazuli uocant. Probatissimus, qui scintillis aureis emicat. Lapis hic (ni fallor) cum Armenio non obscuram habet cognationem, quod non modò utriusque simul in iisdem proueniant metallis, promiscueq; oriantur; sed quod etiam iisdem ferè uiribus præditi sint ad atramentum deiciendam. quo factum est, ut Mauritanorum quidam alterum cum altero ineptissimè confuderint. Ceterum quoniam tradidit Auicenna, cui subscribit Mesues, cœruleum siue (ut eorum nomine utar) Azulum septice, ac putrefacientis esse facultatis, non desunt & recentioribus, qui eum detestentur, quemadmodum & catapotia, quæ ad atrabiliarios affectus ex lapide ipso cœruleo passim in pharmacopolis parantur: è quorum numero est Euchsus medicus nostræ ætatis celebris, in suis paradoxis. Verum quantum confuse satis de Cœruleo, & Armenio scriptum uerint Mauritani; non tamen obstat, quin iij bilem atram pellere queant. Id quod priores ueteresq; Græci ignorauerunt, uel silentio dissimulauerunt. Porro Galenus, etsi non explicuerit cœruleū atrabiliarios humores ducere; tamen scripsit deijcentem habere facultatem. Quod cum fortasse perpenderent Arabes, qui multorum medicamentorum, quæ Græcis incognita fuisse uidentur, diligentissimi fuisse indagatores, inuenere tandem facto pluries perituro, cœruleum atram bilem peculiariter deijcere. Sed si (ut in præcedenti capite ostensum est) usq; ad Alexandri ætatem è ueteribus nemo nouerat Armenium in detrahenda, citra noxam, atra bile facultatem habere albo ueratro parum mirum quidem non fuerit, si etiam longo post tempore, id scripserint Arabes, uel quod ab eo fortasse acceperint, uel quod ex se ipsi id facultatis Armenio inesse adinuenerint. Præterea cum Armenium, & Cœruleum non modò in iisdem proueniant metallis (ut in pluribus Germaniæ locis nos ipsi uidimus) sed simul, promiscueq; oriantur, adeo ut Cœrulei frustum, Armeniū nou modicum contineat, sicut è conuerso, rectè quidem existimari potest, pari ferè facultate, uel nò admodum dispari hosce lapides esse præditos. Hinc itaq; fit, ut mihi plaue Mauritani à Fuchsij, & aliorum calumnia uindicandi uideantur. Quippe cum cernerent naturam hos lapides promiscue, indistincteq; progignere, quid mirum si ipsam iuitati, eorum historiam, & facultatem indifferenter tradiderunt: cum pro certo ex his existimandum sit, nil aliud esse Armenium, quàm cœrulei materiam, nondum à calore in terræ uisceribus ad summum perfectæq; coctam. quemadmodum chalcitis, misy, sory nil aliud esse creduntur, quàm chalcanthi materiam. Hæc igitur cum accuratè perpenderit clarissimus Manardus Ferrariensis, ubi in simplicia medicamenta à Mesue conscripta diligenter adnotauit, eorum sententiam refellit, qui cœrulei usum sua tantum ducti opinione tam acriter uituperat, his uerbis. Cœruleo Græci nullam uim deiectionariam adscribunt, sed uidentur hæc uires ab Armenio deriuatæ. Arabes enim utrunque confundunt. Serapio quidem, & Auerroes sub lazuli nomine de Armenio tractantes, Auicenna de Azulo scribens, ferè ei omnes uires attribuit, quas Græci utriusque. De Armenio uerò ea scribit, quæ Græci: solum addens, quod atram bilem magis purgat, quàm cyaneus. Quæ omnia licet uera sint, non tamen ego his accesserim, qui uò secus ac perniciosissimum uenenum hunc formidant. Experientia enim certa scio, quod si bene abluatur, multum iuuat, & uel nihil, uel parum ledit. hæc ille. In cuius certè sententiam unusquisq; medicus facillè deueniet, qui potius rationalis sit, quàm pertinax. Nam etsi dixerit Auicenna cœruleum exedentis esse facultatis, hoc quidè non impedit quin haustum atram bilem deijcere possit absque noxa, si diligenter fuerit ablutum. quandoquidem eius peracuta septicaq; facultas pluribus lotionibus ab eo facillè tollitur. Præfertur in hunc usum, quod aureis maculis pellucet: namq; id, quo seplaste abundat, & quo in Germania pictorios colores parant, tum facultate inbecillius, tum ignobilius habetur. Memini me ad nouissimas tam æris, quàm argenti fodinas accessisse, in quibus & cœrulei, & Armenij in æceruos congesti plurimum uidi: attamen nullum nubi in ijs locis cœruleum repertum est, quod aureis fulgeret scintillis, eo quod non proueniat hoc nisi tantum in auri fodinis. Idcirco cœruleus ille color, qui uulgo nobis dicitur Azurro oltramarino ab omnibus magno aestimatur pretio. Fit enim is ex cœruleo lapide, qui tantum in auri metallis in oriente

Armenij lapidis uires ex Galeno.

Nomina.

Cœrulei lapidis confid.

Mauritanorum tutela.



orientalibus regionibus foditur, omnium præstatiſſimus. De illo autem, qui ex arena in maris litoribus inuenta conſicitur, quid plura dicam non habeo, quam ſcripſerint Dioſcorides, & Plinius. Cærulei uires retulit Galenus lib. Ix. ſimplicium medicamentorum, ſic inquit. Cyanos medicamentum acri facultate eſt, tum detrahendi, quam uarietates ex Gal. uocant, tum digerendi, potentiore quam cinnabari. Ineſt quoq; ei nonnulla adſtriſſio. hæc Galeni uerba. Quæ ſanè uel non legiſſe, uel non animaduertiſſe Manardus ex eo deprehenditur, quod cæruleo Græcos nullam vim deieſtoriam tribuiſſe ſcriptum reliquerit. Κόρυς λίδος ſic Græcè, Latine uerò Cæruleus lapis uocatur, Nomina. Arabicè, Hager alezard, Lazuard, ſeu Azul: officinis, Lapis lazuli: Italicè, Pietra cerulea: Germanicè, Laſur ſtein: Hiſpanicè, Azul.

## Indicum.

## Cap. LXVII.

INDICI duo genera. unum ſua ſponte naſcitur, tanquam ſpuma, germinatione Indicis arundinibus exiens. Alterum infeſtoriarum dant officinæ: & eſt ſpuma purpurea innatans cortinis, quam detractam artifices ſiccant. Optimum exiſtimatur, quod cærulei ſpeciem præbet, ſuccum ſuum ſorbet, & læue. Inter medicamenta eſt, quæ leuiter adſtringunt, & inflammationes, tumoresque rumunt. purgat, & reprimiſt ulcera.

INDICVS color, quo hodie pictores utuntur, tametiſi in ſeplasijs ubique uenalis habeatur; ſit tamen in infeſtorij officinis ex glaſti recremento, & ſpuma, cum læue glaſto ipſo inſciuntur. Quod autem ſponte naſcitur. Indici conſideratio. tanquam ſpuma germinatione arundinibus exiens, quod ſciam, ad nos non deſertur. Plinius libro xxxv. cap. vi ſaſtitium Indicū in purpurarijs officinis fieri ait, ex purpurea ſpuma cortinis innatante. Quæ in re Dioſcoridis uerba nō rectè accepiſſe uidetur Plinius. Siquidem auctor non ex purpurarum ſpuma fieri Indicū ſcribit, ſed ex purpurea ſpuma (talis etenim eſt quæ ex iſatide provenit) innatante cortinis in infeſtorij officinis. Nulla nanque, quod nūbi compertum ſit, ex purpurarum ſanguine, quo regum uestes olim tingeantur, ſpuma proferebatur. Quod Græci indixov, Latini quoq; Indicum uocant: Itali, Indico. Nomina.

## Ochra.

## Cap. LXVIII.

OCHRAM leuiſſimam, & omnino luteam eligere oportet, ſaturatam, non lapidoſam, friabilem, natione Atticam. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. Vis eius adſtringere, erodere, collectiones & tubercula diſſipare. Excreſcentia in carne reprimiſt, caua cum cerato explet, & articuloſum toſos comminuit.

OCHRA ſoſſilis, qua pictores utuntur, cur legitima non ſit, quid obſtet non uideo: quāquam hæc (quod ſciam) Ochre conſideratio. ex Athenis laudatiſſima non adſeratur, quemadmodum nec Vitruuij tempore, qui ochræ Atticæ uſum in Italia iam exoleuiſſe ſcribit. Eſt itaq; Ochra terra, quæ in plumbi ſodinis aureo colore reperitur. Quæmobrem qui rerum cauſas perſerutantur, arte etiam ochram ex plumbo ipſo conſciunt, quæ coloris nitore ſoſſitiam ſuperat. Præſtantiſſima ochram non longè à Tridēto eſſoſam, miſit ad me hoc anno Martinus Guidottinus Tridentinus, ſeplasiarius hærum rerum diligens inquiſitor, qua nullam hætenus uidimus meliorem. Ochra in libris ſimplicium medicamentorum non reperiſt meminiſſe Galenum: tametiſi eius mentionem ſecerit commento Ii. in Hippocratis prognoflica de uomitione agens, cum inquit. Ochra enim genus quoddam terræ eſt, cuius potiſſimum Attica probatiſſima eſt. Quæ Nomina. Græcè, ochra item Latine & Italicè appellatur.

## Cinnabaris.

## Cap. LXIX.

HALLVCINANTVR qui cinnabarin minio eandem eſſe exiſtimant. Minium enim in Hiſpaniis ex lapide quodam argenteæ arenæ permixto, temperari ſolet, alioqui non dignoſcitur. Fornacibus autem in florentiſſimum, ſagrantiffimumque colorem permutatur. In metallis uerò ſtrugulantem halitum eructat. itaque facies incolæ ueſicis obuelant, ut per illas ſpectent, nec reſpirando noxium aerem attrahant. Eo pictores ad ſumptuoſa parietum ornamenta utuntur. Cinnabaris uerò ex Aphrica deſertur, & magno conſtat. hætenus inuenitur, ut uix uerſicoloribus pictorum lineis ſatiſfaciat: intento colore, nec diluto præditum: quare quidam ſanguinem eſſe draconis exiſtimaueſunt. Vim habet cinnabaris hæmatitæ lapillo eandem. Conueniſt ad oculorum medicamenta, uerum efficacius: magis enim adſtringit, & ſanguinem cohibet. Ambuſtis igni, & papularum eruptionibus, cerato excepta medetur.

CINNABARIS, qua officinæ, & pictores utuntur, longè ſanè differt (ut planè conſtat) à Dioſcoridis Cinnabari. quandoquidem noſtri uſus cinnabaris res factitia eſt ex ſulphure, & argento uiuo diu arte quadā igne torrefactis. Eſt & aliud cinnabaris genus ſoſſile, & ſponte per ſe naſcens, ut poſtea dicetur, uerum non ut factitium copioſum, nec adeo colore præcellens. Quæ autem à Dioſcoride deſcribitur, ex Aphrica deſertur, eadem facultate pollens, qua hæmatites lapillus, quem nō modo prætulit ipſe ſoris appoſitum ad plures oculorum morbos; ſed etiam intus Cinnabaris conſid.



intus assumptum, ad urine angustias, muliebrium locorum defluxiones, & cruentas exputiones. Quibus utiq; affectibus vulgaris usus cinnabaris nullo pacto competere potest, quod propria ui erodat, exulceret, & haustum perniciosum adferat, & proinde sit oculis, & internis uisceribus inimica. Caterum quidam inter ea, quae hac etate in usum medicum ueniunt, Dioscoridis cinnabaris esse possit, non equidem ausim decernere, sed potius quod sentio, adducor, ut coniecturis quibusdam assequar. quippe quod Dioscorides Cinnabarin nullis notis descripserit, neq; tradiderit an factitia res sit, aut fossilis, an ex plantarum materia proueniat. Sed antequam coniecturas eas afferam, quibus constare uidetur Dioscoridis cinnabri seplasis nostrates non destitui, Plinij sententia cognoscenda est, qui lib. xxxiii. cap. vii. affirmat scribit, nul aliud esse cinnabarin, quam draconis saniem, elisi elephantorum morientium ponderem, permisto utriusq; animalis sanguine: quodq; nullus alius sit color, qui in picturis proprie sanguinem reddat: & quod ea etiam antidotis inedicamentis sit utilissima. Id quod pariter affirmat Iulius Solinus in uaria historiarum lectione. Ad haec scire conuenit, gummi cuiusdam arboris in Aphrica nascentis ad nos deferri, quod etiam hoc euosanguinis draconis lacrymam officinae uocant, colore sanguinis, pellucidum, leue, & fractu minime contumax. Hoc nostrates officinae uulgo uocant Sanguem di drago in lagrime, alterius differentia, qui pluribus imposturis passim in orbiculos coactus uenditur. Priorem itaq; non ab re lacrymam appellant, quod scribat Aloisius Mustus patritius Venetus in suis in Aphricam nauigationibus, ex arbore quadam hoc gummi collacrymare, colore, & substantia, sanguini simili: inciso tamen ab incolis prius arboris cortice, ut fusus inde effluat. Hoc (ut idem subdit) aeneis cacabis excipiunt, & igni resinae modo decoquunt, quousque consistat, draconis sanguinem, nescio qua ratione ducti, ipsum appellantes: nisi id eueniat, quod fortasse sua lingua plantam, a qua defluit, draconem appellant. Ex his itaq; nobis iure coniectare licebit, gummi hoc Dioscoridi facile cinnabarin esse, quod primum non aliunde, quam ex Aphrica defratur, nec inde copiosum. quod item pictoribus expetatur, ut intento eius colore, purpureas, rubentesq; concinnent umbras, ubi prius picturas rubro, uel purpureo infecerint. quod deinde ob raritatem, etiam hoc tempore, quo frequentius in Aphricam nauigatur, non uili ueneat pretio. quod deniq; (ut Dioscorides inquit) uiribus hematitiae lapillo per omnia respondeat. Nam, ut periculum facientibus liquidum patebit, adstringendi ui pollet, & maiore quidem quam hematites. quo fit, ut felicius eo utantur medici ad muliebres, & dysentericas fluxiones, ad cruentas excretiones, ad firmandos commotos dentes, & roborandas gingiuas. His accedit, quod si Dioscoridis etate non deerit, qui Cinnabarin esse draconis sanguinem existimarent, mirum sane non fuerit, si per plures etates producta hac falsi opinio ad haec usq; tempora inualuit. At ipse, ne simplicium medicamentorum doctrinam sectantes hoc tenerent errore, inanem eorum sententiam silentio inuoluendum non duxit, qui cinnabarin draconis sanguinem appellabat, cum inquit. Haftenus inuenitur cinnabaris, ut uix uersicoloribus pictorum lineis satisfaciat, intento colore, uel diluto praeditum: quare quidam sanguinem esse draconis existimauerunt. Ex his igitur cum coniecturis, tum rationibus colligendum esse putauerim, hanc lacrymam, colore sanguinem praeseferentem, legitimam esse Dioscoridis cinnabarim. Caterum uidetur hac in re manifeste aberrasse Plinius. quandoquidem etsi asserat is cinnabarim nil aliud esse, quam draconis ferocissimae belluae sanguinem, elisi elephantorum morientium pondere; cum tamen dixerit nullum aliud reperiri colorem, qui in picturis magis ad uiuum sanguinem reddat, quam cinnabaris, facile deprehenditur error. Quippe necessarium sane fuerit, ut de hac lacryma omnino intellexerit, putaritq; falsus uulgari appellatione, lacrymam hanc illum draconis sanguinem esse, ab elephante (ut referunt) collisi. Nam consentaneum minime uidetur, ut huiusce belluae sanguis extra uasa in terram diffusus, puluere & lapillis commistus, situ & patredine obductus contabefactusq; uiuum, ac uerum sanguinis colorem referre possit. quemadmodum uel ille syncerum sanguinis colorem praebet, quem impostores suo arbitrio factitant, ex hircino sanguine, rubrica Sinopica, uel fabrili, confusis lateribus & sorbis, diutius insolatis, illius pro posse colorem, & substantiam imitantes, qui ex collisis simul draconibus, & elephantibus (si tamen uera narrant) emanare solet: quiq; iam longo tempore ad nos aduehi desijt. Quo postea factum esse opinor, ut in eius defectu factitium supposuerint impostores, & hanc fraudem excogitauerint: neq; solum ea ratione, quam modo diximus, ipsum parant; sed etiam modis alijs compluribus, resinas, rubiae insectoriae radices, brassae filij decoctum, tragacanthae lacrymam, rubricas, & alia permulta inmiscuentes, quae ne longior sit sermo, quam series ipsa exposcat, silentio diximus inuoluenda. Verum hic fortasse illud quispiam nobis obtrudet, quod cum hoc loco scribat Dioscorides de metallicis tantum, ac fossilis tum coloribus, tum medicamentis, consentaneum minime uideatur, ut his inseruerit arborum lacrymas, quarum historias, & facultates, diffusius libro primo pertractauit: & ob id omnino credendum sit, cinnabarim fossilis esse medicamentum. Haec obijcienti ita responsum uolumus, quod cum ea hoc loco recenset Dioscorides, quae ob colorum nitorem, in pictorium ueniunt usum, nempe cerussam, chrysocoliam, Armenium, caeruleum, Indicum, ochram, & alia pleraq; non mirum, nec praeter institutum mihi sane uidetur, quod his etiam cinnabarim adiunxerit, quanquam arboris fuerit lacryma. Videmus enim inter haec Indicum quoq; a Dioscoride connumeratum esse, quod tamen nec fossilis, nec metallicum est, sed in India spuma instar, ex arundinum quorundam germinatione sponte prouenit: atq; etiam arte quadam fit ex isatide herba insectoriae officinis. Ex his itaque omnibus palam fieri arbitror, quod communis usus cinnabaris, quam Dioscoridis Minium, quod in fornacibus fiat, & florentissimo, flagrantissimoq; colore spectetur, esse mihi semper persuasi, ab ea longe diuersa sit, de qua auctor noster hic mentionem facit. Est enim, ut supra dictum est nostri usus cinnabaris fossilis, & factitia: nota haec omnibus, & frequens: illa uero rara, nec multis cognita. Fossilis (ut proxima commentatione latius dicetur) uidimus frequens nos in argenti uiui fodinis, Hydria monte, qui una tantum dieta a Goritia distat, circa Carniola fines. Lapis est purpureus ad rubedinem declinans, hematitiae lapidi amulus, non admodum durus, impense tamen grauis, tantoq; plerumq; argento uiuo praegnas, ut per sese, nulla ignium ui guttatim exiliat. Factitiae eodem loco plurimum etiam paratur ex argento uiuo & sulphure, fictilibus quibusdam conclusis, & flagrantissimo igni admotis, donec ad saturitatem

Plinii error.

Obiectionis dilutio.



laturitatem rubescant. Id quod fieri à natura crediderim in ea, quæ fossilis fuerit, in terræ uisceribus. Nullus harum usus in medicamentis, quæ intus in corpus sumuntur, quod perniciosæ sint, & uenenosæ. Hinc fortè factum est, ut existimauerit Fuchsius medicus clarissimus, in Nicolai Myrepsici codice in Damasonij antidoto ab aliquo imperito additam esse cinnabarim. Sed in hoc alia planè à Fuchsto opinio nostra est. quippe quod putem Nicolaum eo in loco non de fossitia, uel factitia cinnabari intellexisse, sed de ea arboris lacryma, de qua scripsisse Dioscoridem, iam euidentissimum, ni fallor, à nobis factum est. Nam cum cinnabaris hæc, Dioscoridis testimonio, hæmatitæ lapillo pares habeat uires, probaueritq; is hæmatitæ ad urinæ difficultatem, dubitandum sanè non est, quin consultò antiquorum cinnabarim ea in antidoto addiderit Nicolaus, quam speciatim ad difficultatem, & stillicidium urinæ commendat. Cæterum quanuis communis usus cinnabaris in medicamentis, quæ sumuntur in corpus, omnino lethalis, & perimens sit; constat tamen ijs saluiter admisceri posse, quæ exterius adhibentur, nempe suffimentis, quæ sunt ad delendam Galliam luem, ubi cætera non profuerint remedia, unguentis item nonnullis ad idem facientibus, & ad contumacia ulcerum alijsq; medicamentis, quorum uires longum esset in præsentia recensere. Porro cum dicat Dioscorides hallucinari eos, qui cinnabarim minio eandem esse existimant, cumq; etiam scribat sequenti capite argentum uiuum ex minio fieri, quod abusiue cinnabaris dicitur, omnino mihi persuasum uolui, nil aliud Dioscoridi esse minium, quam fossile hoc, quod diximus cinnabarin fossitiam hodie appellari, à quo argenti uiui plurimū eliciunt in Hydrie fodinis. Auxit præterea opinionem ipse Dioscorides, quippe qui asserat Minium in metallis strangulantes halitus eructare, ob idq; fossiles, quæ sibi faciem obuelare, ut per illas spectent, nec respirando noxium uaporem attrahant. Quandoquidem ubi cinnabaris in Hydria monte foditur (ut ego uidi, & testari possum) artifices eam decoquentes fictilibus quibusdam ad id conflat, & conuerso simul ore argilla circumlitis, ut inde argentum uiuum eliciant, nares, & os linteis sibi obstruunt, ne noxio uapori liber pateat aditus: quod non modo huiusce halitus noxa, anhelosi fiant, qui hæsesunt, sed plerunq; dentes uniuersos amittant, putrescentibus circumquaq; gingiuis, ut quidam apertissime testantur, qui spreto narium, & oris uelamento, ut cæteris uiderentur fortiores, edentuli prorsus facti sunt, continuo tremore concussi. Accedit huc Vitruuij auctoritas, quæ sententiam nostram maximè tuetur. Ipse enim septimo uolumine suæ architecturæ, ita de Minio disserit. Ingrediar minij rationes explicare. Id autè agris Ephesiorum Cilbianis primum memoratur esse inuentum, cuius & res, & ratio satis magnas habet admirationes. Foditur in gleba, quæ ἀσβεστός dicitur, antequam tractationibus ad minium perueniat, uena uti ferro, magis subrufo colore, habens circa se rubrum puluerem. Cum id foditur, ex plagis ferramentorum crebras emittit lacrymas argenti uiui, quæ à fossoribus statim colliguntur. hæc Vitruuius. Nos equidem hoc idem uidimus in Hydrie montis fodinis: ubi plerunque euenit, ut uulnerata ferramenti uena, argentum uiuum fonticuli instar, in substratam defluat humum. Cæterum Plinio minium dicitur ferri generum, ut loco superius citato legitur, ubi cuncta eius genera retulit his uerbis. Inuenitur in argentarijs metallis minium quoq; & nunc inter pigmenta magnæ auctoritatis. Theophrastus tradit inuentum minium à Callia Atheniense initio superante aurum: posse excoqui arena rubente in metallis argenti: hæc fuisse originem eius. Reperiri autem iam tū in Hispanijs, sed durum & arenosum. Item apud Colchos in rupe quadam innaccessa, ex qua iaculantes decuterent: id esse adulterum. Optimum uerò supra Ephesum Cilbianis agris. Arenam cocci colorem habere, hanc teri, dein lauari farinam, & quod subsidat iterum lauari. Iuba minium nasci in Carmania tradit. Hermonus & in Aethiopia. Sed neutro ex loco inuehitur ad nos, nec ferè aliunde, quam ex Hispania. Sed adulteratur multis modis, unde præda societati. Nanque est alterum genus in omnibus ferè argentarijs, itemq; plumbarijs metallis, quod fit exusto lapide uenis permisto, non ex illo, cuius uomicam argentum uiuum appellauimus, sed ex alijs stigmul repertis. Steriles etiam plumbi suo colore, nec nisi in fornacibus rubescences, exustiq; tunduntur in farinam. Et hoc est secundarium minium perquam paucis notum, multum infra naturales illas arenas. Sincero cocci nitor esse debet. Probatur auri modo. Auro candente fucatum nigrèscit, syncerum colorem retinet. Inuenio & calce adulterari. Ac simili ratione ferri candentis lamina, si non sit aurum, deprehendi illico. hætenus de minio Plinius. Hinc igitur palam est antiquis minium & fossile, & factitium extitisse. Nec sanè dubitauerim, quin in factitij genere acceperint ipsi cinnabarim factitiam, quæ passim in seplastiariorum officinis inuenitur. Id minium hodie appellat phar-macopole, tum etiam pictores, quod ueteres Græci Sandycem uocauere, ex plumbo, aut cerussa in fornacibus perustis paratum, de quo etiam uidetur intellexisse Plinius. Κιννάβαρι sic Græcis, ut Latinis etiam cinnabaris appellatur: Officinis, Sanguis draconis in lagrime. Italis, Cinabro: Hispanis, Sangre de dragon.

Fuchsi opin. reprobata.

Minium Dioscoridi quid nobis.

Nomina.

## Argentum Viuum.

## Cap. LXX.

ARGENTVM uiuum fit ex minio, quod abusiue cinnabaris dicitur, patinis fictilibus imposita, ferrea concha cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt. Siquidem deterfa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in argentum uiuum coit. Quinetiam inuenitur in argenti fodinarum tectis stillatim concretum. Alij per se in metallis inueniri tradunt. Seruatur in vitreis, aut plumbeis, aut stagnis, aut argenteis uasis: siquidem aliam materiam omnem exedit, & defluere facit. Potum uim pernecialem habet: suo enim pondere interna exest. Remedio est lac multum subinde potum, & uomitionibus reiectum, aut uinum cum absinthio, aut apij decoctum, aut semen hormini, aut origanum, aut hyssopum cum uino. Auri limata scobs, id est, ramentum quàm tenuissimum epotum mirabili est auxilio.



Argenti uiui  
confidit.

Quorundam  
error.

Galenus no-  
tatur.

Argenti subli-  
mati confe-  
ctio.

Auri histo. &  
praestantia.

ARGENTVM uiuum omnibus notissimum, corpus est e fossilium genere, liquidum, & aquae modo fluidum, colore argenteo, liuescente, pellucidumq;: substantia uero lenta, tenui, in qua tam frigiditas, quam humiditas exuperat. Haec igitur symmetria (ut chymistarum, qui se philosophos existimant, fert opinio) res est sane admodum disposita ad metallorum omnium generationem. quamobrem ipsorum tum originem, tum semen argentum uiuum appellauerunt. Quinetiam non addensari putant, quod ei non insit caliditas, & siccitas tanta, quae ad id muneris obcunda sufficiant. Addunt temporis defectu id etiam euenire: ideoq; immaturum, indigestum, imperfectumq; reddi. Ceterum relicta chymistis disceptandi materia, an ipsum metallorum quorumcunq; prima fuerit materia, an aliter se res habeat, dicam, philosophorum tantum, qui de eo scripserunt, sententiam secutus, facile Argentum uiuum esse materiam ad metallorum generationem proximam. Quippe cum facillime omnibus se coniungat metallis, palam nimirum sit, ijs generandis aptissimam esse materiam, ijsq; praesertim, quibus facilius contactu inhaerescit: quandoquidem in habentibus symbolum (ut uulgata propositio est) & in consimilibus facilis est transitus. Hanc itaque ob causam eos hallucinari putauerim, qui dicunt, quod si argentum uiuum in terrae uisceribus usque adeo decoctum esset, ut in aliquod fixum, firnumq; uerteretur metallum, in ferrum potius, & in plumbum uerti deberet, quam in argentum, uel in aurum. Si quidem certum est, quod id facilius argento, auroq; contactu inhaeret, quam ceteris. Hic autem est chymistarum ludus, qui tempus conterunt, & oleum & operam perdunt, id arte reficere existimantes, in quo natura ipsa deficit: quam (ut liquido constat) nemo unquam ita ad unguem imitari potuit, quin ab eius mira solertia aberrauerit. Omnia metalla in argentum uiuum coniecta, supernatant, ut lignum in aqua, praeter solum aurum, quod si iniiciatur, statim petit fundum, quod hoc magis amplectetur, quam cetera. Amplissima argenti uiui metalla (ut etiam in superiori capite diximus) uisuntur in Hydria monte, qui quadraginta millia passuum a Goritia distat, ubi continuo copiosum elicitur e lapide quodam fragili potius, quam duro, colore ex nigro rufescente, & ad purpuram quadantenus uergente, ponderoso plumbi instar, & argento uiuo scintillante. Hanc uenam postquam effoderunt, conterunt, & in fictilia quaedam angusti orificij conijciunt, & recenti arborum nusco obturant: deinde fictile alterum huic simile, latioris tamen oris, in terram sepeliunt, & alterius pleni inuersum orificium, in illud inserunt, & argilla circumquaque inuolunt obturantq; oscula, & uasa simul coniectunt, & firmanunt, adeo ut uacuum fictile totum sub terra sedat, plenum uero totum superemineat. Itaq; in aperta area quam plurima seratim collocant fictilia, & deinde ignem in ambitu succendunt, cuius ui calefacta uena, argentum uiuum guttatim distillat in substratum fictile. Hinc suo tempore eximunt, & in utriculos quosdam reponunt, quod uasa fere cuncta exedat, ac dilaceret, praeter uitrea, uel fictilia uero circumlita. Quo fit, ut Dioscoridem mirari subeat, qui argentum uiuum in argenteis, aut plumbeis, aut uitreis tantum uasis seruari posse scribit, quod aliam materiam omnem erodat, nisi codex hic deprauatus sit. Si quidem id falsum deprehenditur: nam argentum uiuum exest, ac destruit omnia metalla, quibus inhaerescit. Ex quo potius, cum haec a Serapione non scribantur, qui tamen Dioscoridis omnia fere scripta bona fide reddidit, plane suspicandū fuerit, huic capiti plura subesse menda. id quod etiam uaria in hoc loco Oribasij lectio confirmare uidetur. Reperiuntur autem in argenti uiui fodinis inter ipsius uenam peculiare quaedam lapidis illius rufi zonae, quem siffores fossitiam cinnabarim uocant, de quo etiam in praecedenti capite diximus. Hic adeo argento uiuo scatet, ut siffores absque alio igne, inde per sese guttatim defluat. Euenit praeterea dum siffores micronatis instrumentis, uenam effodiunt, ut purum profiliat argentum uiuum, decurratq; celerius, ueluti e fonticulo quodam. Porro rari admodum sunt siffores, & huiusce materiae artifices, tametsi robustissimi fuerint temperamenti, qui eo in opere ad quarum uisum que annum incolumes perdurare ualeant: quippe ob noxium metalli halitum, partium omnium tremore concutiantur.

Ceterum Galenus libro IX. simplicium medicamentorum scribit, contra illud quod experimento comprobatur, Argentum uiuum ex sponte nascentibus non esse, sed ex ijs, quae preparantur, uelut cerussa, & rugo, & psoricum, lithargyros: fateturq; se nullum huiusce medicamenti fecisse periculum, an interimat, si deuoretur, uel ubi foris fuerit ad motum. Fit ex argento uiuo & sale, quod ammoniacum uocant, lethale illud medicamentum, quod officinae chymistae secutae Argentum sublimatum appellant, utrisque simul admixtis, & in uas uitreum coniectis, ac inde in fornacem deductis, ut haec ignium ui in uasis sublime tollantur, ubi salis modo concresecunt, lapidescuntq; sacchari colore. Fit etiam ex Argento uiuo, & aqua, quam ex chalcantho, alumine, & sale nitro conficiunt chymistae, arte quadam, & ignium ui, id quod recentiores quidam Praecipitatum uocant. Cui facultas inest sane admirabilis ad contumacia prostra sananda, eaq; praesertim, quae a Gallica lue emerferunt. Sunt etiam qui dimidij scrupuli pondere deuorandum propinent admixtis margaritis, alijsq; quibusdam, quae cor tueri non ambigunt, ubi quis Gallicis doloribus circa articulos conflictetur. Datur etiam melancholicis, Armenij lapidis modo, ut libello, quem de morbo Gallico scripsimus, abunde dictum est: namque eosdem praebet effectus, uomitionibus expurgans. Sunt praeterea qui purum sincerumq; Argentum uiuum hauriendum praebant non modo adultis, sed pueris, & infantibus aetate tenellis. Siquidem Brasauolus Ferrariensis uir sane hac aetate clarissimus, suo de stirpium examine pro certo scribit, sepius se dedisse Argentum uiuum infantibus deuorandum ui uermium seminortuis, qui illico sanati sunt: idq; fecisse ait in ultima desperatione. Sed quomodo, uel qua mensura, uel pondere dandum sit, silentio inuoluit. At Goritienfes obstetrices, ubi grauidae diu in partu laborauerint, statim Argentum uiuum scrupuli pondere nullis incommodis potandum exhibent. Quo fit, ut facile mihi persuaferim, Argentum uiuum potantes haud necare, nisi pondus, uel mensuram exceaserit. Non tamen crediderim, quod solo pondere interimat, ut quidam putant Dioscoridē tantum secuti, ut latius libro sexto disseremus. Sed quoniam Argentum uiuum nobis in mentem reuocauit AVRVM omnium metallorum pretiosissimum, praestantissimūq; cum eius nusquam, quod extet, meminerit Dioscorides, crederem profecto non paucam naturae rerum iniuriam a me illatam iri, si huius tam pretiosi metalli, cuius inextinguibili siti uniuersus aestuat mundus, historiam, & facultatem silentio praeterissem. Quandoquidem ob ipsius splendentem coloris nitorem, opinati



nati sunt naturæ operum indagatores, admirabiles auro inesse facultates, quibus homines non modò incolumes tueri possit, sed & longæuos reddere. Quapropter mirum non est, si ipsum tanti faciat mundus, & ante cætera extolant homines. Auri itaque materiam nil aliud esse scribunt, quàm substantiæ elementariæ sibi inuicem proportionem respondentes. Hæ autem simul commistæ, cum pari sint uirtute conformatæ, aliud sanè gignere nequeunt, quàm amicabilem quandam, & optimam mitionem, quæ fermentatione, & coctione perficitur. quo fit, ut inde tam indissolubili nexu uniantur, ut permanentes, & ferè indissolubiles fiant, adeò quòd, siue id eueniat cælestium corporum influxu, aut temporis ui, aut sagacissimæ naturæ opere, aut his omnibus unà concurrentibus, conuertuntur eadem substantiæ in hoc metallicum corpus, quod uocant aurum. Hoc enim (ut diximus) ob sui tum ingentem temperiem, tum unitatem, tum optimam mitionem, adeò densum euadit, quòd non modò quandam communem consequitur permanentem, sed incorruptibilem ferè temperiem, & causam quandam, ob quam superflui nihil continere possit. Hinc igitur est, quòd quanquam longioribus seculis aurum in terra, uel in aqua sepultum permaneat, nunquam ruginem contrahit: sicuti in igne diutius permanens, non modò aliqua ex parte non comburitur; sed & depuratus, & splendidus efficitur. Ad hæc ob optimam sui unitatem, nullo pblegmate, nulloq; pingui redundat: ita ut perpetuò fulgeat, splendidissimiq; perduret. Quinetiam tractantium manus nullo colore tingit, nempe croceo, aut uigro, quemadmodum cætera faciunt metalla: neq; etiam aliquo odore, aut sapore gustantium, aut olfacientium tum nares, tum palatum inficit. Aurum intus in corpus sumptum, siue ex industria, siue inscijs deuorantibus, nullam penitus infert noxam, ut complura faciunt metalla: sed mirum in modum cor, & uitalem facultatem roborat, quod solis influxui acceptum pleriq; sapientes retulerunt. Quamobrem iure quidem dici potest, aurum omnium metallorum præstantissimum esse, ductile, colore lucido, illiq; persimili, quo cuncta à sole illustrantur. Insuper propria quadam attractice ui pollet, qua respicientium animos allicit, & disponit, ut ab ipsis illico desideretur. unde quidam existimauerunt auro proprias quàm plurimas inesse dotes. In Italia propriæ sinceri auri fodinæ (quod sciam) nullibi extant. Atqui in Germania, Pannonia, ac Transylvania eæ pluribus in locis habentur. Auri uenam ijs omnibus locis crediderim gigni, ubi coelum id causæ elementaris influat, ac disponat, de quibus antea differuimus. Huius uenæ uarijs lapidibus impacta uisitur in asperriorum montium uisceribus. Verum ea omnium præstantissima auri uenæ censetur, cui cœruleus lapis fuerit admixtus: tantò enim melior hæc, quantò ponderosior, & colore uigentior: adeò ut illa cæteras præcellat, quæ pluribus auri guttis scintillet, uel in qua plures auri lineæ intercurstantes conspiciantur. Est etiam auri ferax diuersorū fluminum arena. Siquidem proculdubio constat in Hispania Tagum, in Thracia Ebrum, in India Gangem & Pactolum, in Pannonia Istrum, in Germania Rhenum, in Italia Padum & Ticinū, aureas ducere arenas, à quibus arte quadam aurum omnium probatissimum elicitur. ueruntamen non omnibus eorū litoribus auræ eadem sunt arenæ. Auri uires prodidit Auicenna secundo sui operis uolumine, sic inquit. Aurum in omnibus suis partibus æquale est. Inseritur medicamentis, quæ atrabiliarijs competunt morbis. Ad hæc ubi actuali cauterio sit opus, ignitum aurum cæteris præstat metallis, quòd ulcus inde exortum citius consanescat. In ore contentum, anhelitus graueolentiam tollit. Auri scobs porphyrite lapide læuigata in ea medicamenta additur, quæ ad alopecias, & lichenas parantur, tam intus in corpus sumptum, quàm extrà medicamentis exceptum. Hæc item eodem modo diutius læuigata, adeò ut tactum ferè effugiat, oculis immittitur ad roborandam eorum aciem. Bibitur autem & ad cordis affectus, & animi mœrores. Argentum uiuum quod Latinis, ὤσπαρυπος Græcis nominatur: Nomina. Mauritanis, Zaibar, seu Zaibach: Italis, Argento uiuo: Germanis, Quecksilber: Hispanis, Azogue. Aurum uero Latinis, χρυσός Græcè dicitur: Germanis, Guld: Italicè & Hispanicè, Oro.

Auri uires ex  
Auicenna.

## Rubrica Sinopica.

## Cap. LXXI.

RUBRICA SINOPIS maximè probatur grauis, densa, ad iecinoris imaginem uergens, calcolorum expers, concolor, cum diluitur, impendiò fusilis. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibusdam, expurgataque defertur in Sinopem urbem, in qua uenditur: unde cognomentum accepit. Vim habet exicatoriam, quasi inducendo obstruentem, & adstrictoriam. quapropter vulnerarijs emplastris, & pastillis exiccantibus, & adstrictorijs commisceri solet. Aluum fistit, in ouo sumpta, aut clystere infusa. datur iecinoris uitio laborantibus.

HODIE profectò uenimen inuenio, qui doceat, & explicet, quæ nobis legitima sit Rubrica Sinopica. Sed quantum ego conijcere potui (etsi id pro certo asserere non ausim) nullum è fossilium genere occurrit, quod magis Sinopicam rubricam nobis repræsentet, quam uulgarissimus bolus Armenus uocatus, is nimirum, qui in quadratas defertur massas, quiq; maximè uulnerarijs medicis expetitur ad sanguinis profluium cohibendum, & fracta ossa firmaminanda. Hæc rubrica (ut Georgius Agricola maximus fossilium indagator inquit) etsi iandudum ex Sinope Cappadociæ urbe, unde nomen inuenit, tantum importabatur; constat tamen alibi etiam reperiri, non modò in proprijs uenis; sed in aurarijs, argentarijs, ærarijs, ferrarijsq; metallis. Hanc omnino mihi opinionem illud auxit, quòd certò sciam plurimum pseudoboli Armenij ex ferrarijs illæ Tyrrheni insulæ fodinis ad nos quotidie conuehi: quòd deinde colore sit iecinoris, pondere grauis, substantia densus: quòd etiam in aquam coniectus facillè dissiliat: quòd deniq; sicut uis exiccat, adstringat, & cogat. Hæc enim gleba, cum uerus bulus Armenius non sit, nil aliud (meo iudicio) esse poterit, quàm rubrica Sinopica, quanquam à Sinope non deferatur. Species Sinopidis (ut Plinius est auctor libro xxxv. cap. vi.) tres, rubra, & minus rubens, & inter has media. Quæ sanè differentiæ uisuntur pariter in uulgari Armenico bolo. Porro Manardus Ferrariensis libro tertio epistola quarta, Sinopice rubricæ meminit, quæ albo

Rubricæ Si-  
nopicæ con-  
sideratio.

Manardi la-  
pus.



Nomina.

sit colore. Sed in hoc uirum aliqui celebrem mirari subit, quod non animaduertit non posse albam quamuis terree glebam Rubricam appellari. Rubrica, quæ Græcis *μῆλτος σινωπικῆ*, Latinis pariter ac Italis Rubrica Sinopica uocatur: Arabibus, Mogar, siue Magra: Hispanis, Almagra.

## Rubrica Fabrilis.

## Cap. LXXII.

RUBRICA fabrilis ad omnia Sinopide inferior est. Optima Aegyptia, & Carthaginensis, lapidum expers, friabilis. Gignitur etiam in Iberia, quæ ad occidentem spectat, ochra exulta, & degenerante in rubricam.

Rubricæ fabrilis confid.

Nomina.

RUBRICAM hanc ideo fabrillem appellauere ueteres, quod ea plerumque uterentur materiarii fabri ad lineas protrahendas infectis in ea funiculis. Nasci fabrillem rubricam in Lemno memorie prodidit Galenus, cum libro nono simplicium medicamentorum, tum etiam primo de antidotis, sed à Lemnia sphragide plurimum differre. Verum antiqui communis usus rubrica, quæ uulgo Italis proprie dicitur Terra rossa, ea sit fabrilis rubrica, de qua hic meminit Dioscorides, cur pro certo affirmem non habeo. Quæ Græcè *μῆλτος τεκτονικῆ*, Rubrica fabrilis Latine dicitur: Arabibus, qui nullam faciunt differentiam inter hanc & Sinopicam, Mogar & Magra: Italis, Rubrica fabrilis: Germanis, Roetelstein.

## Lemnia Terra.

## Cap. LXXIII.

LEMNIA terra cuniculoso in specu nata, è Lemno insula, palustri loco defertur, inibi electa & caprino sanguini permixta. quam incolæ cogunt in pastilos, & imagine capræ signant: unde & sphragida ægos, hoc est, sigillum capræ appellauere. Vim antidoti habet contra perniciofa uenena singularem: pota cum uino, & præsumpta euomi uenena cogit. Contra ictus morsusque animalium, quæ exitiale virus eiuculantur, prodest. Antidotis familiaris. Sunt qui hanc ad sacrificia utantur, est & dysenteriae utilis.

Lemniæ terre histor. ex Galeno.

LEMNIAE terræ amplam in Italiam notitiam suo tempore attulit Galenus medicamentorum omnium diligētissimus inquisitor. quippe qui, ut hac syncerissima tandem potiretur, atque ut omnem impostorum fraudem detegeret, qui eam adulteratam uendebant, bis in Lemnum insulam nauigauit, ut eius uerba testantur libro IX. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. At alie sunt terræ differentie ex diuersi generis corporum naturæ commixtione, qua ratione lapidose, & arenose habentur: atque admixtam talium substantiam segregant largæ aquæ effusione ac maceratione, dum totum humidum efficiatur. Cum enim id effectum est, id quod defertur, atque inest lapidosum, atque arenosum, id omne subsedit, & terra exacta supernatat. Tale quiddam & in Lemnia terra uisitur, quam cognominant quidam milton Lemniam, id est, rubricam Lemniam, & alij quidam sphragida Lemniam, hoc est, sigillum Lemnium, ob impressum uidelicet illi sigillum Dianæ sacrum. Siquidem hanc terram sacerdos cum patrio quodam honore sumens, haud mactatis animalibus, sed tritico, atque hordeo piamenti gratia loco redditus, in urbem comportat: quam deinde aqua maceratam, atque in lutum humidum redactam, ubi ualenter conturbauit, paulumque inde quiescere sinit, primum aquam, quæ supernatat auferit, & mox quod sub ea est lutum tollit, ac reliquum duntaxat, quod ad immum subsedit, lapidosum scilicet, & arenosum relinquit, ut inutile, ac superuacaneum. Porro lutum illud pingue usque, eò desiccatur, dum mollis ceræ consistentiam accipiat: huiusque, exiguis acceptis particulis, sacrum Dianæ sigillum imprimit. Ac postea rursum in umbra siccandum reponit, donec omnem planè humiditatem amittat, fiatque illud medicis omnibus cognitum medicamen Lemnia sphragidis, siue sigillum. Sic enim quidam illam cognominant, ut dixi, ob impressam illi sphragidam, hoc est, sigillum: ceterum etiam nonnulli ob colorem Lemniam milton siue rubricam appellant: eundem enim, quem rubrica, colorem habet. Verum ab ea differt, quod contactu non contaminet atque illa: & seorsum eundem collem in Lemno, qui totus colore fuluo est, & in quo neque arbor, neque saxum, neque planta nascitur, tantum huiusmodi terra uisitur. Porro tres eius signantur differentie: una quam posuimus terræ sacræ, quam alij nemini præter unam sacerdotem contingere fas est: altera uero eius, quæ re uera milton est, siue rubrica, utuntur autem ea potissimum fabri: demum tertia eius, quæ extergit, qua utuntur, qui lintea, & uestes lauant, quibus utique collibitum est. Ceterum cum & apud Dioscoridem, & alios quosdam scriptum legissem, Lemniæ terræ hircinum misticri sanguinem, atque ex luto, quod ea mixtione conficiebatur, sacerdotem quas uocant Lemnias sphragidas tum conformare, tum consignare, cupiebam profecto & ipse mixtionis modum inspicere, atque symmetriam. Itaque quendam admodum in Cyprum nauigaueram uidendorum, quæ in ea sunt, metallorum gratia, & in cauum Syriam Palestinæ partem profectus fueram, bituminis & aliorum quorundam inspiciendorum causa: ita nec in Lemnum enauigare piguit, ut quantum sanguinis terræ admisceretur, conspicerem. Nam cum iterum ex Asia Romam pedestri peterem itinere, per Thraciam, & Macedoniam, prius à Troade Alexandræa in Lemnum adnauigauimus, nactus illic nauem quæ ad Thessalonicam cursum destinabat. Conueniebam autem cum nauclero, ut in cursu Lemno appelleret. Et sane ille præstitit, sed non ad eam ciuitatem, ad quam oportebat. Antea enim nesciueram duas esse in insula ciuitates, sed credebam, ut Samus, Chius, Cos, Andrus, Tenus, & omnes adeo, quæ in Aegeo sunt mari, unam duntaxat ciuitatem habent, toti insule cognominem: ita & Lemnum unam nominis sui habere ciuitatem. Porro ut ex naui descenderam, intellexi ciuitati uerè esse Myrinæ, nec in regione ciuitatis illius aut Philoetæ templum esse, aut sacrum Neptuni.



ptum collem, sed in altera, quæ uocatur Hephestias, nec ciuitatem eam Myrinæ esse propinquam. Cùmque me nauelæ  
 rus expectare non posset, distuli, ut cum Roma in Asiam redirem, tunc Hephestiada uisercm: id quod feci, prout spe-  
 raueram, et proposueram. Nam ubi ex Italia in Macedoniam traiecissem, eamque penè totam pedestri itinere per-  
 transissem, peruenissemque Philippo, quæ ciuitas est finitima Thraciæ, inde ad mare descendi, quod proximum abe-  
 rat centum uiginti stadiis: primumque Thason transiissem, distantem plus minus ducentis stadiis, atque illinc in Lemnum  
 septingentis, ac rursus ferme septingentis in Alexandream Troada traieci. Ac proinde sanè ex industria tum de  
 nauigatione, tum de stadiis adscripsi, ut si quem eadem, quæ me caperet Hephestiada uisendi cupiditas, cognito eius  
 situ, sic nauigationem institueret. In tota nanque insula Lemno orientem spectat Hephestias, occidentem uero My-  
 rina. Et quod à poeta dictum de Vulcano est, qui Græcè dicitur Hephestus, Decidit in Lemnum, propter collis na-  
 turam occasionem sumpsisse fabulæ crediderim. Apparet enim combusto similis, tum colore ipso, tum etiam quia  
 nihil in eo nascitur. In hunc itaque collem sacerdos, quo tempore ego ad insulam accesseram, egressa, certo quodam  
 tritici, hordei que numero in terram coniecto, aliisque quibusdam pro religione patria perpetratis, plaustrum totum  
 terra impleuit. Atque ubi in urbem conuenisset, quo dixi modo, illas fama hominum adeo celebratas Lemnias spha-  
 gidas præparabat. Visum ergo mihi erat percontari, nunquid unquam antea hircinum, aut caprinum sanguinem huic  
 terre misceri solitum, memoriæ proditum acceperet. Quo audito, omnes in risum soluti sunt, nec ij sanè quiuis ex  
 uulgo, sed uiri oppido quam eruditi, cum in alijs, tum præcipuè in uniuersa patriæ historia. Quin et à quodam li-  
 brum accepi, quondam ab incolarum quopiam descriptum, qui omnem Lemniæ terræ usum edocebat. Quamobrem  
 nec me quoque piguit huius medicamenti periculum facere, acceptis sphafragidum uiginti millibus. Sed et his à quo  
 librum dono accepi, inter principes habitus, ad multa hoc utebatur medicamine: siquidem ad uulnera tum uetera,  
 tum cicatrici inducendæ contumacia: ad hæc ad morsus uiperæ, atque adeo omnes ferarum morsus, nec non aduer-  
 sus medicamenta lethalia, non autè modo exhibere, sed et post sphafragide uti consueuerat. Addebat porro sese pe-  
 riculum fecisse medicamenti, quod quia fructum iuniperi accipit, διὰ τὸν ἀπὸ τοῦ ἰσχυροῦ, nuncupatur, cui utique in-  
 debatur et terra Lemnia: uomitumque ciere aiebat, si quis cum etiamnum in uentre lethale uenenum haberet, ale-  
 xiterium siue amuletum ebibisset. Et sanè nos quoque huius fecimus periculum in lepore marino, et cantharidibus,  
 cum sese tale quippiam accepisse homines suspicarentur: uerum hausto, quod Lemniam sphafragida habebat medica-  
 mento, protinus omne euomuerunt, nec postea ullum illis accidit symptoma eorum, quæ ad leporem, et canthari-  
 des comitari consueuerunt: tametsi conuicta esset perniciosorum medicaminum exhibitio. Ceterum an ad alia mor-  
 tifera medicamenta hæc inquam, quæ uocant deleteria, eandem uim habeat medicamentum, quod ex fructu iunipe-  
 ri, et terra Lemnia conficitur, mihi utique ignotum est. At ille ab Hephestiade profecto afferebat, adeo ut et ra-  
 bientis canis morsum eam sanare diceret in uino diluto epotam: at ulcers ex aceto impensè acri impostam. Sed et  
 aliarum ferarum ictus, ex aceto sanare referebat, extrinsecus folijs herbarum insuper impositis, quæ putredini res-  
 istere didicimus. In primis uero prædicabat scordium, deinde centaurium exile, inde marrubium. Porro si quando  
 nos sanè ad ulcera cacoethe, et putrida terram Lemniam adhibuimus, magnifice profuit. Vfus autem est, pro præ-  
 uitatis ulceris magnitudine. Quippe id, quod grauius olet, impendioque laxum, inolleque est, ac sordidum, substat ut  
 uel per acerrimum acetum Lemnia terra in luto. Soluatur consistentiam, aliorum more pastillorum, quorum alius  
 alio nititur: dico autem Polyde, et Prastonis, et Andronis, et qui nunc dictus est, quem Betinum uocant. Siqui-  
 dem hi omnes ualenter desiccantes prosunt ulceribus contumacibus, soluti interim quidem in uino dulci, interim sapa,  
 interim œnomelite, nonnunquam etiam alborum uinorum quopiam, aut fuluorum, aut flauorum, prout nimirum usus  
 postulat. Nam de talibus alibi definitur. Similiter uero quandoque soluuntur aut ex aceto, aut uino, aut aqua, aut o-  
 xymelite, aut oxycrato, aut melicrato. Porro Lemnia terra ex aliquo comprehensorum soluta, medicamentum fit  
 idoneum tum recentibus glutinandis uulneribus, tum medendis inueteratis, ægrè ad cicatricem uenientibus, et con-  
 tumacibus. Hactenus de Lemnia terra Galenus. Ex cuius quidem uerbis facile conijci potest, Lemniam terram,  
 quam ad nos hoc tempore conuehant mercatores Turcicis characteribus obsignatam, illegitimam esse, et minime  
 sinceram. Quandoquidem constat Galeni testimonio, Lemniam sphafragidem impensè rufescere, non autem subrufes-  
 cere, qualis hæc uisitur, quæ passim præ legitima, sinceraque circumferunt impostores. Quamobrem eorum sen-  
 tentiam minime improbandam censemus, qui nil aliud esse Lemniam terram putant, quam bolum Armenium, qui ofe-  
 scinis seplastiarum Orientalis cognominatur: præsertim quod certò compererim, bolum huic non aduehi ex Ara-  
 menia, ubi legitimum sincerissimumque Armenium lutum nascitur, sed tantum ex insula Lemno, ex eodem sanè colle,  
 cuius meminit Galenus. Siquidem Armenium lutum, quod bolum quidam uocant, præterquam quod ex Armenia ad-  
 ferri debeat, si Galeno medicorum principi credimus, colore est pallido ochræ instar, non autem impensè rubro. Id  
 quod ipse Galenus libro nono simplicium medicamentorum in Samiæ terræ mentione testatur, his uerbis. Ceterum  
 durante hac inmani, et graui pestilentia, ex Armenia ea, quæ Cappadociæ finitima est, data nobis est terra, etiam  
 siccantior, colore pallido. Lapidem qui donarat, non terram appellabat: promptissimeque in leuorem soluitur, ceu  
 etiam calx: sic enim uidelicet nuucupo petram combustam. Verum uti nec in illa arenosum quippiam admixtum est, ita  
 nec in Armenia. Nam posteaquam in mortario pistillo comminuta est, adeo est leuis, nec plus est lapidea, quam aut  
 calx, aut Samius aster: tametsi non æquè ut aster leuis est. Itaque illo etiam magis conspissata est, minusque aeris: quæ  
 obrem opinionem, ac phantasiam præbet ijs, qui negligentius intuentur, quasi lapis esset. hæc Galenus. Ex quibus  
 sanè perspicuum fit, quod Armenia terra, siue lapis, uel lutum, ab Armenio bolo orientali uulgo uocato, quam ma-  
 xime dissidet. Atque ut fraus, et impostura detegatur, atque palàm fiat, non est silentio dissimulandum, quod quæ  
 Lemnum incolunt mercatores, cum sciant Armeniam terram ad nos non aduehi, lucri proinde dulcedine allekti, ex  
 una tantum terra duas faciunt. Quippe sincerissimam terram Lemniam extra insulam Constantinopolim compo-

Lemniz ter-  
 ra uires.

Lemniz ter-  
 ra quid cen-  
 scatur.

Fraus, & im-  
 postura dete-  
 cta.



tant, & pro Armeniaca uendunt, emptoribus suadentes eandem eò ex Armenia comportati. Quam uerò in Lemna pro Lemnia exhibent, ut colore ab altera differat, eam cuidam albæ terræ inibi nascentis admiscunt: quo fit, ut longè minus quàm syncera rufescat. Hanc itaque legitimæ sphragidis loco supponunt, hisce adulterijs permixtam: quam etiam sigillis obsignant, ut inde impostura maius lucrum accedat, signo magis, quàm medicamento fidentes. Ceterum cum hæc impostura à pluribus modò deprehensa sit, qui fraudem non ignorant, relicta uulgaribus medicis, quæ obsignata conuehitur, ubi Lemnia sphragide sit opus, Armenium bolum falsò uocatum sumunt, præstantissimum scilicet. quòd pro certò habeant, hunc legitimam esse sphragidem Lemniam, quam miris laudibus extulere ueteres ad uenena, & ueneno forum animalium ictus. Quare inuigilent diligentissimi medici; quibus cordi est hominum salus, ne hac in re decipiantur, cum perdifficile sanè sit (ut libro primo de antidotis memoria prodidit Galenus) synceram sphragidem cognoscere ab adulterina. Verum quandoquidè in ARMENIÆ terræ sermonem deuenimus, non alienum fuerit, eius etiamnum uires referre ex Galeno, qui eas loco nuper citato in simplicium medicamentorum consensu subdidit, sic inquit: Armenia terra, quòd summè desiccet, ad dysenterias, & uentris profluuium, tum sanguinis expuitiones, & catarrhos, ad hæc ad putrescentiam oris ulcera in primis competit. Quin & eos magnificè uisitat, quibus ex capite in thoracem fluxio decumbit: quamobrem illis, quibus ex tali occasione assidua difficilis est aua helitus, ualidè prodest. Sed & eos, qui phthoe laborant, adiuuat: ulcus enim eorum desiccatur, ut haud etiam tussiant, nisi in uictu peccetur non leuiter, aut ambiens de repente ad intemperiem recidat. Ac mihi uidetur, quòd sicut in fistulas sæpe conspeximus, non in alijs partibus duntaxat. sed in ipso etiam ano, ut citra collyrij immisionem, quòd foras dem, aut callum auferret, ipso duntaxat exiccante medicamine, contraheretur, ac clauderetur; ita quoque in pulmonis eueniat ulcere. Siquidem & ipsum ab exiccantibus iuuari medicamentis perinde conspicitur, utique cum medicamine ere est, non admodum magnum. Itaque uisi sunt quidam eorum, qui talia habebant, prorsum esse liberati. Ac quidam, qui Romæ in Libyam talem ob causam profecti sunt, planè se sanos esse credidere: & sanè usque ad annos aliam quot inculpate transigebant: postea uerò cum non pari degerent cura, & cautione, reditus morbi apparuit. Hos ergo, ut dixi, bolus Armenia euidenter adiuuit. Quin & eos qui Romæ agunt, qui assiduo difficultate spirandi discruciantur, magis etiam. Porro in magna hac peste, cuius eadem facies fuit, atque eius, quæ Thucydidis memoria grassabatur, quotquot hoc medicamen bibere, celeriter curati sunt. At quibus non profuit, omnes interiere, scilicet cum nec alio quouis iuuarentur. Vnde colligitur, quòd ijs duntaxat non fuerit auxilio, qui planè erant incurabiles. Ceterum bibitur ex uino consistentia tenui, modicè diluto, si aut planè febris careat, aut leuiter ea teneatur: sin grauius febrat, admodum aqueo. Non tamen calore uehementes sunt febres pestilenciales. Porro de ulceribus ressecari postulantibus quid attinet dicere, quantà uim habeat bolus hæc Armeniaca? Liberum est autem utcumque appellare uelis, siue lapidem, ut is qui mihi donauit: siue terram, ut ergo; quandoquidem humidis rigari patitur. Hæcenus de Armenia bolo Galenus. Sed quoniam Lemnia sphragis, & Armenia terra, quod uenenis maximè resistent, mihi in mentem redegerunt lapidem, quem Arabes suo idiomate Bezahar uocant, & contra deleteria medicamenta miris admodum laudibus celebrant, hic locus opportunus nobis uisus est, in quo de huius lapidis historia, ac uiribus aliquid differamus. Lapis itaque BEZAHAR, Mauritanorum testimonio, antidotum est omnium præstantissimum, sua speciali dote, contra omnia in uniuersum uenena: utpote qui non modò haustus; sed etiam adalligatus, ita ut nudam sinistri lateris carnem contingat, omnia superet uenena. Lapis hic plurium est generum, nempe flauus, puluerulentus, qui ex albo uirescat. Præstantissimus est flauus, deinde puluerulentus. Verum enim uero diligenter inspicere oportet, ne impostorum fallacijs decipiantur, qui hos lapides inquirent. Sunt enim nonnulli alij lapides, qui hoc facie representant, sed uiribus nullis præditi. Hunc Rasis experimento ductus, uiris extulit præconijs, ita de eo scribens. Lapis Bezahar est mollis, colore flauo, sapore nullo. Cuius peculiaris uis est, ut uenenis omnibus aduersetur. quandoquidem ego contra haustum napellum hoc lapide usus sum felici admodum successu. Erat autem hic colore flauo albicante, leuis, & luminis modo splendens. Equidem certò testari possum (hoc enim pluribus experimentis comperit habeo) lapidem hunc longè magis præstare aduersus deleteria uenena, quam cætera non modò simplicia huiusce facultatis medicamenta; sed etiam theriaca dicta, & alia quæuis antidota. Suddit præterea Abdalanrach. Lapidem, quem uocant Bezahar, iam ipsi uidimus apud filios Almira custodis legis Dei: pro quo lapide is magnificam, ac propè regiam ædem Cordubæ rependit, initio belli. Lapis hic (ut diximus) ita uiribus contra uenena omnia pollet, ut non solum haustus duodecim granorum pondere; sed uulneri impostus à mortiferis quibuscumque feris ictos, statim liberet, ueneno sudore expulso. Idem pariter iuuamenti adfert, si ore aliquo tempore sugatur. Verum lapis hic inuentu difficilis fuerit, quòd non desint paribus notis lapilli, qui tamen nullam uim habent aduersus uenena. Sunt etiam, qui memoriæ prodiderint, in ceruorum oculorum angulis lapidem gigni, uiribus Bezahar prædicto haud absimilem. Aiunt enim in orientali plaga ceruos longo senio confectos serpentes deuorare, quorum esu (si uera scribunt) reuiuescunt. At ueneni superandi causa, serpentibus deuoratis, in fluuiorum aquis ceruos illos mergi tradunt, capite tantum extra aquas exerto. Iis autem sic permanentibus, humorem quendam lentum ab eorum oculis deflui, qui tandem solis ardoribus in lapillos inibi concreuit, glandis imaginem referentes. Hic itaque lapis ipsis è fluminibus egredientibus, ab eorum oculis (ut aiunt) statim decedit in humum: ubi ab ijs facillè reperitur, qui rem omni diligentia obseruauerunt. Sed an hæc historia uel fabula dici mereantur, rerum naturalium studiosis, & peritioribus iudicandum relinquimus. Terra Græcis ληνία γη, seu ληνία μέγας, & σπαγίς; Latinis Lemnia terra, Lemnia rubrica, & Lemnium sigillum nominatur: Arabibus, Teri machtin seu Thim machtum: Italis, Terra Lemnia: Hispanis, Tierra sellada.

Armenia terre seu boli uires ex Gal.

Lapidis Bezahar historia, & uires.

Lapis in oculis ceruorum natus.

Nomina.



## Atramentum sutorium.

## Cap. LXXIII.

ATRAMENTVM sutorium genere quidem vnum & idem est, & molle, & concretum: sed in specie differentias tres habet. Vnum nanque humoribus stillatim in cuniculos quosdam colatis, concreuit: quare ab ijs, qui Cypria metalla conficiunt, stillatitium appellatur. Petescius ipsum pinarion vocat: alij stalacticon, id est, stillatitium. Alterum simplici ratione fit in speluncis: postea transfusum in excavatos scrobes, concrementum capeffit, quod pecton, id est, concretitium, propriè nominatur. Tercium dicitur coctile, & in Hispania fieri solet: sed inutile, ac inualidissimum esse constat. Ratio parandi hæc est. Aqua madefactum decoquunt, mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus coalescit, in complures formulas digestum, tesserarum speciem reddentes, quæ racematim inter se cohærescunt. Optimum esse creditur cæruleum, graue, concretum, translucens: cuiusmodi stillatitium est, ab alijs lonchoton nominatum. Proximum concretitium. Coctile uerò ad insectus, & denigrationes, aptius cæteris esse compertum est: sed ad medicinæ usum inualidius esse, experimenta docent. Valet adstringere, calfacere, & crustas inducere. latas uentris tineas necat, drachmæ pondere deuoratum, aut cum melle linctum: uomitus ciet. aduersus hausta fungorum venena, ex aqua potum auxiliatur. purgat caput aqua dilutum, & in vellere naribus instillatum. Vritur, vt paulò post in mentionem chalcitis ostendemus.

CHALCANTHVM, quod Latini Atramentum sutorium uocant, quoniã uitri modo pelluceat, Itali Vitreolum nominant. Duo eius genera in Hetruria. Vnum fossile, per sese in terræ uisceribus concretum, quod uulgò appellant Coppâ rosa. Alterum factitium, cuius passim est usus, insectoribus expetitur. Præstat hoc plus, minusue tam pro regionum, locorum, ac cœli dispositione, quàm ipsius fossilis materie, à qua arte conficitur. Veruntamen compertum est, Romanum cognomento (quanquam colore constat dilutiore) cætera factitij genera præcellere. Secundum locum obtinet Cyprium, tametsi huic apud antiquos palma. Quod autem è Germania adfertur, omnibus in Italia infirmius habetur: sed quòd sit colore cæruleo, nonnullos fallit. Cæterum chalcanti materiam, quoniam gustantibus linguam uellicet; aspero, adstringentiq; sit sapore, putauerunt quidam sulphureis, ferreis, ac æreis constare qualitibus, quinetiam aluminis, niri, salisq;. Chalcanti uena, quæ foditur in agro nostro Senensi pluribus sanè locis, præsertim maritimis in syluestribus plerunque uallibus, terrea potius, quàm saxea uisitur, colore subcinereo, maculis nonnullis respersa, quarum aliæ ferri rubiginem, aliæ æruginem, colore referunt. Hæc dum foditur, fœtidum, graueolentemq; halitum eructat, sulphuris fere instar. quam ob causam in conclusis, concameratisq; cuniculis nusquam foditur, sed aperto undique cœlo. Quippe si in subterraneis foderetur speluncis; metallorum modo, ob acerrimum, fœtidissimumq; uaporem, fossiores noxio concluso spiritu faciliè interirent. Effossam itaq; chalcanti uenam in acerrimâ longitudinem protractum, quandam super aream exaggerant, ubi aperto cœlo sex ad minus mensibus; imbris, roribus, pruinis, solibusq; die noctuq; macerandam relinquunt: quo tempore statutis quibusdam diebus lignonibus, & rastris aceruum dilacerant, subuertuntq; & iterum in eandem congerunt aceruatiorem, ut facilius hæc imbris maceretur, coquaturq; solis ardoribus. Post hæc testum aceruo superponunt, ne amplius in posterum pluuijs diluatur, neque solibus plusquàm par sit, inarescat: & ita alijs sex mensibus materiam hanc fermentari patiuntur. Eligunt deinde locum, quò facilius è propinquis fluuijs, uel fontibus ducantur aquæ: ibiq; sub constructo testò foditur alueus, qui ligneis asseribus, uel lateribus, & calce adeò stipatur, ut indita intus aqua nullo pacto prolabi possit. In hunc igitur alueum purissimam aquam deducunt, cui demum tantum illius chalcanti materie addunt, quantum huic negotio addicti ministri satis esse censent: postea miscent aliquo tempore ligneis quibusdã instrumentis ad id paratis, quousque aqua in se omne quod inest chalcanti receperit: deinde excrementa subsidere sinunt, donec aqua chalcanti prægnans claritatem concipiat. His peractis foramina quædam prope aluei fundum in latere facta, recluduntur: & inde exiliens aqua in magnum excipitur receptaculum. Hanc itaque sumunt, & in plumbeos alueos conijciunt (cætera enim metalla ab ea eroduntur) fornacibus quibusdam superpositos, & igne subdito feruorem excitant, statutis horis. Demum ferri frustum immittunt, uel aris: siquidem aiunt chalcanthum nunquam concreescere, nisi huiusmodi imponentur metalla, quæ iniecta paruo tempore colliquescent in aquam. Postquàm autem debito tempore coxerint, ignem quàm primum è fornace eximunt, permittuntq; quiescere decoctum, quousq; egelidum reddatur, ne plumbeus alueus, eo sublato, fornacis calore colliquesceret. Omnibus itaq; tepesactis, decoctam materiam eximunt, & in alueolos quosdam ligneos digerunt, ubi tandem concreuit, aluminis rupei modo, fitq; chalcanthum. Si uerò aliquid supersit decocti, quod concreescere nequeat, id totum iterum recoquunt, eadem seruata ratione. Sed longè aliter olim fiebat Cyprium chalcanthum, de quo Galenus libro ix. simplicium medicamentorum, in hunc modum scribit. Forte fortuna & chalcanthum in chalcitin transire conspexi. Assportauim enim ex Cypro & huius medicamenti ingentem copiam. Extimum eius omne post annos plus minus uiginti chalcitis effectum est, intima eius parte chalcanti speciem seruante. Quamobrem & usque in hunc diem quod sic mutatur, asseruo, obseruans dum ad inuum usque uno quoque anno procedat mutatio, ceu chalcitidis in misy, ut est antè positum. Cæterum mirari subit de hoc medicamento, quo pacto uehementissimæ adstrictioni admista est caliditas non instrenua. Constat ergo quòd omnium maxime condire, seruareq; carnes humiditas potest, nimirum caliditate humiditatem absumentis, atq; adstrictione substantiam contrahens, atq; constipans: hoc enim opere nonnihil etiam humiditatis ipsius exprimit. Constringit uerò, desiccatur, atq; contrahit in sese totius substantiam carnis. Porro quo tempore in Cypro diuersabar, hunc in modum me-

Chalcanti genera, & historia.

Chalcanti uires, & historia ex Gal.



dicamentum hoc colligi conspexi . Domus erat magna quidem, non tamen alta, ingressui in metallum obiecta . Ad parietem autem domus sinistrum, qui erat ingredientibus ad manum dextram, effossus erat specus in continentem colle, ea latitudine, ut tres sese uiri in eo contingerent, tanta uero altitudine, ut uiro summe procero recto liceret incedere . Specus hic decliuus quidem erat, sed non planus, & multis locis præruptus . Porro ad finem eius quasi in stadium pora recti, lacus erat aquæ uiridis, & crassæ tepentis plenus . At in toto descensu calor similis, qualis in primis balneariis ædibus percipitur : quas, quod in eis corpora præmolliri soleant, promalasteria appellare consueuerunt . Aqua uero quotidie guttatim ex pertuso colle destillans, quatuor & uiginti horis diei, ac noctis colligi assolet ad amphoras Romanas quasi octo . Eam aquam uincti quidam in urnas quasdam quadratas fictiles in domo ad ingressum posita sitas, efferebant, in quibus paucis diebus concresecbat fiebatq; chalcanthum . Mihi uero ubi ad terminum effossi specus descendissem, ubi uidelicet tepida hæc, uiridisq; aqua colligitur, aeris odor uisus est suffocans, & tolleratu difficilis, chalcithii, æruginisq; redolens . Hæc aqua quoq; gustu præferebat qualitatem eiusmodi . Ea propter, & nudi, & cū festinatione amphoras uincti exportabant, nec longiorem illic moram perferre poterant, sed celeriter recurrerebant . Accensi autem erant mediocribus in specu interuallis lychni, qui nec ipsi longo tempore durabant, sed celeriter exstinguebantur . Hunc ergo specum pedetentim excauatam multis annis ab ijs tunc audiui . Hæc enim, inqueiebant, aqua uiridis, quam uides ex colle in lacum manantem, sensim se ipsa minor effici solet . At ubi prope adest ut desinat, rursum uincti, quod continens est ipsius collis, perfodere pergunt : eueitq; aliquando olim, ut subito quicquid perfossum esset, concideret, omnesq; ad unum occideret, ac totam uiam corrumpere . Id ubi fit, alio foramine fodiendo eousque insistant, quoad rursum aqua illis adsit . Hæc habui, quæ tibi de chalcanto exponenda censerem, & sanè fortasse non necessaria, cæterum quæ scire præstaret, quàm ignorare . Memineris autem, quod ad sinistram manum ingredientibus conspectum nobis dixerim metallum foreos, chalciteos, & misyos . ut ex his conijcere liceat, aquam pluuiam totius collis terram illam colluere, atque abluere, ex qua sponte quidem fiebat sory, misy, & chalcitis : & per fornaces æs, cadmia, pompholyx, spodium, & diphryges . Hæc de chalcanti historia Galenus . Ex quibus palam fit, aquam uirescentem illam, quæ è monte in speluncam continuo stillicidio defluebat, nil aliud extitisse, quàm aquam annuis imbris in montem illum delapsam . Quandoquidem cū ob sulphureos, metallicosq; uapores, uniuersa montis moles rarsa effecta, undiq; innumeris meatibus scateret, non sanè mirum uidetur, si tractu tēporis laberetur in imum, secumq; deferret tenuiores chalcitis, misyos foreos, tum etiam ærariæ materiæ partes : ibidemq; calefieret, ac decoqueretur, sulphureis, bituminosis, alijsq; metallicis ignibus in terræ uisceribus cōclusis : adeo ut tandem in cauernā illam descēdens, naturæ opera id fuerit affecuta, quod factitium chalcanthum arte consequitur . Eam igitur ob causam in quædratis uasis extrā paratis proiecta ea uiridis aqua, in chalc anthum coibat nulla adhibita cōctionis ratione . Quinetiā opus non erat ferrum, uel æs in eam inijcere liquandum, ut concreseceret, quemadmodum in factitio fit chalcanto, quippe quod dum per ærarij montis meatus laberetur, æris innumera ramenta secum deferebat, quæ chalcitidis, & misyos, uel ab ipsa aqua contracta, in eandem liquecebant, argumento quod æruginis modo uiridi esset colore . Ob id itaq; statuendum fuerit, Cyprium chalcanthum concretum esse medicamentum ex chalciti, misy, sory, & ære conflatum . Id quod manifestè declarat Galenus, cū ait . Memineris autem, quod ad sinistram manum ingredientibus conspectum nobis dixerim, metallum foreos, calciteos, & misyos . ut ex his conijcere liceat, aquam pluuiam totius collis terram illam colluere, atq; abluere, ex qua sponte quidem fiebat sory, misy, & chalcitis : & per fornaces æs, cadmia, pompholyx, spodium, & diphryges . Hoc ego quoq; maxime obseruauī in quibusdam chalcanti fodinis in Tridantino agro, ubi chalcitin, misy, soryq; non ambigimus reperiri copiosa . Sed cū hæc non animaduertisset Brasauolus, uir alioqui huius ætatis clarissimus, dum imprudentiæ Galenum accusare cōtendit, eius sanè seipsum magis accusat . Quandoquidem ubi Galenum sibi exaninandum proposuit, eo scilicet loco, in quo scribit chalcanthum è Cyprio se aduectū, tractu temporis consensescens, factum esse chalcitin, dicit & factitium uulgare nostrum illud idem efficere : ueruntamen si in aqua resoluatur, iterum in chalcanthum concresecere, quod manifestè indicat in ueram non transiisse chalcitin : asserens hoc non expendisse Galenum . Verum in hoc uidetur Brasauolus Galeni uerba haud rectè percipisse, cū inquit, quod aqua, ex qua Cyprium fiebat chalcanthum, terram uniuersam diluebat, è qua chalcitis, misy, soryq; fiebant in terræ uisceribus . Siquidem nil aliud dixisse uoluit Galenus, quàm quod chalcanthum esset chalcitis aqua dissoluta . Nam si chalcitis sponte proueniens in aqua resoluta chalcanthum efficitur, mirum sanè non est, si ea quæ tractu temporis fit ex chalcanto, eundem præbeat effectum . Neq; his obstat, quod quis dicat Cyprium chalcanthum non solum ex chalciti fieri, sed ex misy simul, & sory . Quandoquidem ( ut in proximo commentario dicemus ) tria hæc chalcitis, misy, sory, ex ipsius Galeni sententia, eiusdem tum generis sunt, tum etiam facultatis . Chalcanthum sponte, & per se in terræ uisceribus conflatum, uisu sanè pulcherrimum misit nuper ad me Tridento Martinus Guizottinus diligens peritusq; pharmacopola, in plures laminas per uniuersam massam dissectum à misyos laminis aureis scintillis fulgentibus, quæ illas unam ab altera diuidunt . Quod sanè maximum præbet indicium, chalcanthum hoc nil prius extitisse, quàm chalcitin, quæ Galeno teste, misy semper superstat . Cæterum illud nil miri nobis adfert, quod commendauerit Dioscorides chalcanthum potum ac deuoratum ad latas alui tineas, & ad fungorum uenena, etsi medicamentum erodens, & septicæ facultatis habeatur . Siquidem ad eosdem, & alios usus hoc tempore non modò chalcanthum ipsum quidam potui exhibent in pestilentia ; sed etiam eius oleum, quod chymistæ uitreis organis magna ignium uel ab ipso chalcanto eliciunt, nullo sanè incommodo . Qui illud in peste propinant, quod uigō uocant, quod rosa, in aqua rosarum dissolunt, & iterum cogunt reiteratis tribus, aut quatuor uicibus : dantq; , obolum, uomitum & conicitantes . Quod Græci χαλκανθον, Latini quoq; Chalcanthum, & Atramentum sutorium uocant : Mauritanii, Chalcanthum, Calcant, Calcand, seu Alcalcadis : Itali, Vetriolo : Germani, Kupferwasser : Hispani, Caparo : Galli, Coperose .

Brasauoli uana accusatio .

Nomina.

Chalcitis



## Chalcitis.

## Cap. LXXV.

CHALCITIS præfertur similis æri, friabilis, nec lapidosa, nec inueterata, intercurfantibus oblongis venis, splendentibusque. Huic absterforia vis inest, exalfaciens, & crustas vlceribus obducens: purgat, quæ oculis, & eorundem angulis hærent. In genere leuiter erodentium est. Ad ignem sacrum, & vlcera, quæ serpunt, efficax est. Sanguinem è vulua, & naribus erumpentem, cum succo porri sistit. Gingiuarum vitia, depascentia ulcera, tonsillasque eius farina compescit. Vsta, & cum melle trita oculorum medicamentis longè vtilior redditur. Callum genarum, & scabritiam obsumit, abstergetque. Fistulas tollit, collirij modo in eas adacta. Fit ex chalcite medicamentum, quod Pforicon vocant, duabus eius partibus, cum vna cadmiæ additis, & ex aceto tritis. oportet autem in fictili obruere fimo diebus quadraginta, per Caniculæ ardores: sic enim fit acrius. idem quod chalcitis potest. Alij pares vtriusque portiones in vino terunt, & eadem prosequuntur. Vritur chalcitis fictili nouo, viuis carbonibus superposito. Modus autem vstionis in humidioribus est, dum ipsa chalcitis bullas excitare desierit, & perfectè inauerit: in reliquis uerò, dum mutata in floridum colorem fuerit, & sanguineum aut miniatum colorem contraxerit, tum demum eximenda est. Insidens autem spurcicia statu expellenda, mox reponenda. Torretur etiànum perflatis carbonibus, usque dum luteo colore palleat: aut fictili subditis candentibus prunis, subinde uersata, donec igni conflagret, & colorem mutet.

Pforicon.

## Misy.

## Cap. LXXVI.

MISY assumendum natione Cyprium, auri simile, durum, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ modo splendet. Vim habet, & vstionem, cum chalcitide eandem, præterquam quòd pforicon ex eo non conficitur, excessus, defectusque, ratione tantum differens. Aegyptium autem cæteris præstat, utpote quod efficacius habeatur, sed ad ocularia medicamenta multò, supradictò inferius.

## Melanteria.

## Cap. LXXVII.

MELANTERIA geminæ est originis. quædam in faucibus cuniculorum, quibus æs eruitur, salis modo concreuit. Alia uerò in summa facie supradictorum locorum coit, quæ terrena est. Qui- netiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibusdam regionibus, fossilis quædam. Præstat quæ sulphuris colorem trahit, læuis, pura, æquabilis, & quæ contactu aquæ confestim nigrescit. Vim causticam eam obtinet, quam & misy.

## Sory.

## Cap. LXXVIII.

SORY existimarunt aliqui melanteriam esse, aberrantes: siquidem sui generis est sory, ei non absimile. Verum forci uirus inest graue, & nauscam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto, & alijs quibusdam regionibus, ut in Libya, Hispania, & Cypro. Præfertur Aegyptium, quodque frianti nigrius apparet, in multa foramina dehiscens, subpingue, insuper adstringens, & olfactu deuorationeque magnum uirus olens, ita ut stomachus in vomitiones effundatur. Quod autem friatum scintillas misyos modo non emittit, & alterius generis esse, & inualidum, censendum est. Vim, & vstionem supradictis similem habet. dolori dentium cauernis inditum medetur: eosque labantes firmat: ischia- dicis ex uino infusum auxiliatur: illitum cum aqua, uaros extinguit. Medicamentis admiscetur, quæ capillos denigrant. Hæc autem ferè omnia, & alia, quæ vstionem experta non sunt, perustis ualidior esse existimantur: præter salem, & uini facem, nitrum, calcem, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt. combusta enim uiribus efficaciora redduntur.

CHALCITIS, Misy, & Sory, longis iam seculis latent, adeo ut perpauci, uel potius nulli sint in Italia, qui hæc legitima se uidisse affirmant. Et quanuis ego iandudum pluribus in specubus, cauernisq; ubi æris uena foditur, diligenti- sime inuestigauerim, atq; nullum ex his, præter melanteriam, fuerim consequutus; hoc tamen anno Misyos frustum sanè pulcherrimum, aureis emicans scintillis, quin & Chalcitidis, & Soryos, quibus etiam chalcanthum ad- iunctum erat, misit ad me Tridento Martinus Guidottinus pharmacopola rei herbariæ, & metallicæ studiosus. In- uenta autem hæc sunt in quibusdam chalcanti fodinis in Tridentino agro, quibusdam montibus non longè à Leuigo pago. Verum legitimam Melanteriam iandiu inuenimus in compluribus metallorum tumultis. Porro putat Musa Bra- fauoli, medicus nostri temporis celebris, chalcanthum nobis Romanum uocatum, uerum esse Misy, quod tamen ueritati, & rationi maxime repugnare uidetur. Quandoquidem præter id quòd aurum colore minime imitatur, mi- nusq; cum frangitur, aureis fulget scintillis, sed uitream tantum refert substantiam, palam certè omnibus est, Ga- leni testimonio, Misy factitium non esse medicamentum, sed sponte & per se factum in terre uisceribus. Ipse enim

Chalcitis, mi- syos, foreos, &amp; melâteriæ consider.

Brafauli error.



libro IX. simplicium medicamentorum, de chalcantio scribens inquit. Memineris autem, quod ad sinistram manum ingredientibus conspectum nobis dixerim metallum foreos, chalciteos, & misyos. ut ex his conijcere liceat, aquam pluuiam totius collis terram illam colluere, atque abluere, ex qua sponte quidem fiebat sory, chalcitis, & misy: & per fornaces as, cadmia, pompholyx, spodium, & diphryges. Præterea idem de sory, chalcitide, & misy differens testatur (ut latius inferius patebit) dum, in eorū ingrederetur metallum, quasdam intus se conspexisse ueluti zonas, alias super alias in longum porrectas, numero tres: quarum infima erat ipsius foreos, super quam erat altera chalciteos, suprema uero misyos. Id quod manifeste ostendit, tria hæc sponte in terræ uisceribus fieri, non autem ullo artificum ingenio, ut Romanum chalcalthum fieri nemo non intelligit. Constat præterea nullam factitij chalcantii speciem esse posse misy, quod scripserit Galenus chalcitin transire in misy, non autem misy in chalcitin. Idcirco cum Galeni testimonio, & uulgari experientia omnibus perspicuum sit, non tantum Romanum chalcanthum, sed omne, cuiuscunque generis tractu temporis degenerare in chalcitin, nullo pacto fuerit censendum, Romanum chalcanthum esse misy. Vnde rectius fortasse dicere potuisset Brasauolus, chalcanthum foreos magis speciem referre, quam misyos. Nam (si tantæ auctoritatis apud doctissimos quosque medicos fuerit Galenus) quemadmodum chalcitis uertitur in misy, ita & sory transit in chalcitin. Sed ut omnibus huiusce facultatis studiosis hæc admiranda naturæ uis clarius imotescat, audiant, quæso, Galenum de re hac differentem lib. IX. simplicium medicamentorum his uerbis. In metallo Cypri, cuius modo mentionem feci, in montibus Solorum, domus erat ingens, cuius ad parietem dextrum, sed ad nos utique, qui ingrediebamur, sinistrum, introitus erat in ipsum metallum, in quo quasdam conspexi in longissimum porrectas ueluti zonas, alias super alias numero tres: infima erat ipsius foreos, super quam erat altera chalciteos, suprema misyos. Cæterum id temporis præfectus metalli his commostraris: Sicut, inquit, nunc aduenis in cadmiæ fornacarie inopia, ita horum trium admirandas has uides diuitias. Itaque ego cum eius multum accepissem, primum quidem in Asiam, deinde Roman attuli, & usque modo habui, elapsis iam annis plus minus triginta. Et sorte quadam absolutum fuit hoc opus ad usque octauum librum, ante annos uiginti, nec adiectus fuit nonus hic, partim quod lapides quosdam nondum conspexissem, partim, ob alia negotia, quæ mihi interea temporis obuenerunt. Nunc autem cum nonum hunc librum cæteris addere pararem, interea fortè fortuna mihi accidit res spectatu longè pulcherrima, ac si quissimam eò studio, ac industria magno cum artificio effecisset. Nam cum misy opus haberem, ad medicamentum quoddam præparandum, bolum eius accepi, quam ferè plena manu teneas, qualem sanè consistentiam misy non admodum solet habere, cum in parua frustula diuidatur. Miratus itaque insolitam eius condensationem, bolo facta extimum quidem misy circumquaque reperi, eius quod intus erat, uelut efflorescentiam. Porro sub eo inter chalcitin uidelicet, & misy, quiddam erat medium uergens ex chalcite ad misy, ex dimidio iam commutatum: principio enim bolus fuerat chalciteos: cæterum quod in alto erat, perfecta erat chalcitis, nullam dum alterationem experta. Hoc igitur ubi uidissem, cogitatione repetens, & in metallo ita super chalcitin uasci ipsum misy, ut ærugo super as in mentem subijci inspicere, quod seruabatur adhuc apud me reliquum ipsius foreos, nunquid & ipsum ullam accepisset mutationem in chalcitin: & nonnihil certè apparuit suspicionis, ut uideretur & ipsum fortè longo tempore mutationem in chalcitin posse accipere. Itaque mirum non est tria hæc medicamenta eiusdem genere facultatis esse, sory dico, chalcitin, & misy, tenuitate, & crassitudine partium inter se diuersa. Crassissimum enim est inter ipsa sory, tenuissimum, misy, medianum utriusque facultatem habet chalcitis. Adurunt uniuersa hæc tria, & escharas quas uocant, efficiunt. Attamen etiam si urant, nonnihil quoque adstringunt. Cæterum misy adnotum carnibus duris, minus chalcite mordicat, tamen si ea non minus sit calidum: uerum id habet, quod tenuium partium essentia sit. Porro cum utraq; hæc in decoctionibus fundantur, & magis chalcitis, quam misy; sory tamen non liquefit, nimirum quod lapidosius sit, ac uehementius compactum: sicut rursum misy, quia à congenito calore elaboratius est, ac proinde siccius chalcite, idcirco merito quoque ægrius liquefit. Et libro IIII. de compositione, medicamentorum per genera, idem Galenus ita scribit. Misy, & sory, ut didicistis, chalcitidi genere cognata sunt, ex una ut dicam radice producta, tenuius tamen apparet chalcitis, ac minus mordax & urens, crassius sory est, & utroque siccit imbecillius. Χαλκίτις ut Græcis, ita etiam Chalcitis Latinis dicitur: Arabibus, Colcotar, seu Cholchotar: Italis, Chalcitis. Μίσυ uero Græcè, Misy item Latine uocatur: Arabicè, Zeg, siue Zagi: Italicè, Mist. Quæ deinde Græcis μελαντερία, Melanteria pariter Latine appellatur: Arabibus, Bitirias, & Maltina: Italis, Melanteria. Quod denique σωρυ Græcè, sory similiter Latine dicitur: Arabicè, Surie, Alsurie; seu Alsur: Italicè, Sori.

Misyos, & cognatorum historia, & uires ex Gal.

Nomina.

## Diphryges.

## Cap. LXXIX.

DIPHRYGIS tria genera esse creduntur. Quoddam enim metallicum est, quod in Cypro sola gignitur: lutosum nanque extrahitur, ex luto cuiusdam inibi specus: extractum sole siccatur, mox circumpositis sarmentis vritur. diphryges ideo uocatum est, quod & à sole, & à sarmentis vritur, arefeat, & ferme torreatur. alterum perfecti æris quasi subsidens fax est, siquidem post frigide aquæ offusionem, ut supra retulimus, cum de flore æris differeremus, sublato ære, fornacum ima parte cohærens id genus inuenitur, & adstrictionem, & gustum æris habens. Tertium sic fit. Lapidem pyriten, ut calcem multos dies cremant in camino: cumque colorem rubricæ contraxerit, eximentes recondunt. Quidam tradunt hoc ex sola materia, quæ lapidem æris gignit, fieri: quando in dictis arcibus affata, & in scrobes tumulata peruritur. tunc enim ambientem scrobis locum comprehendit, & exemptis lapidibus nihilominus inuenitur. Præfertur, quod saporem æris reddit, eruginisque, adstringens, & uehementer exiccans linguam: quod sibi exusta ochra non uendicat, quæ cremata diphrygis uice



vice uenit. Vis eius adstringere, perpurpare, extergere, siccare, excrementia consumere, ulcera serpentia, & quæ cacoethe uocant, ad cicatricem perducere. Suppurationes terebinthina, aut cerato exceptum discutit.

**DIPHRYGIS** genus illud, quod perfecti æris quasi subsidens fax est, post frigide aquæ offusionem, ut Dioscorides inquit, sæpe ac sæpius uidimus in ærarijs fornacibus, Tridentino agro, & comitatu Tirolensi, ac inde etiam nobiscum detulimus. Sed quod è luto in Cyprio illo specu foditur, uirurq; sarmentis: quod item è pyrite lapide calcis modo exusto conflatur: quod demum ex sola æris materia fit, cum in arcis assatur, & in scrobes translata perurit, hæcenus mihi uidere non licuit: nec eorum, quod sciam, speciatim meminit Galenus. qui libro IX. simplicium medicamentorum de Diphryge in hunc modum differuit. Diphryges mistam habet tum qualitatem, tum facultatem: habet enim in sese quiddam & mediocriter adstringens, & mediocriter acre. quæm obrem ulcerum rebellium optimum medicamentum est. Conuexi autem & huius medicamenti nim ingentem ex Cypri Solis, ubi metallum ab urbe abest, quasi triginta stadijs. Proiectum erat enim in medio spatio ædium. quæ autem metallum extructæ erant, & uicini, qui ei subiaceret. Caterum præfectus, ac procurator metalli, id quod post cadmiam reperiretur, esse dicebat inuita: itaque abijci, non secus atque ustorum in foco lignorum cinerem. Verum hoc mihi ad multa utile factum est medicamentum, tum ad putrescentia oris ulcera, siue per se, siue cum melle, cui detracta sit spuma, tum ad anginam, uel delict ubi iam per adstringentium medicaminum auxilium constitit, quod influebat. Præterea columellam ubi præsecissem, ipso solo, & statim, & usque ad cicatricem sum usus: ac frequenter exactè occlusam efficit cicatricem tum huius particule, tum omnium adeo exulceratorum: sic in ulceribus omnibus pudendorum, atque ani. Vfus autem similis est in oris ulceribus: siquidem eæ partes eisdem ferè medicamenti gaudent, uinum calidæ similiter, & humide. Et libro IIII. de compositione medicamentorum secundum genera, sic inquit. Porro diphryges appellatum pharmacum, ulceribus ægrè humiditatis uitio ad cicatricem uenientibus aptissimum est: ualidè namque siccatur, et si modicè mordeat. Enimuerò id quoque præter acrem tum qualitatem, tum potentiam uini habet adstrictoriam. Quod Græcis διφρυγίς, Latinis item Diphryges, Arabibus Diphrygis, Italis Diphryge nominatur.

Diphrygis  
confid.

Historia, & vi  
res ex Gal.

Nomina.

## Auripigmentum.

## Cap. LXXX.

**AURIPIGMENTVM** in eisdem metallis, quibus sandaracha, gignitur. Optimum existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli materiæ permistum, in squamas fissile: quale in Mysia Hellesponti nascitur. Huius duo genera fluxerunt. vnum supra dictum est. Alterum glandis effigie, palidum, & colore sandaracham imitans, glebosum ex Ponto, & Cappadocia deferitur, quod etiam secundum locum tenet. Torretur in testa noua, uiuis carbonibus subiectis, assiduoq; uersatur, donec igne flagret, & mutet colorem: deinde refrigeratum, tritumque reconditur. Vim habet adstrictoriam, & erodentem. Crustas cum uehementi uedine, & uolento morfu excitat. reprimat quæ excreuant, & capillos euellit.

## Sandaracha.

## Cap. LXXXI.

**SANDARACHA** probatur rufa, & saturatior, & aliena materia uacans, friabilis, cinnabaris colore, sulphuris uirus redolens. Dos eadem; & uisio, quæ auripigmento. Explet alopecias, resina excepta: & scabros ungues cum pice eximit: contra phthiriasin ex oleo efficax est: tubercula cum adipe discutit. Prodest ad narium orisque vlceres, & cæteras papularum eruptiones cum rosaceo: item condylomata. Datur ex mulso, purulenta extulsientibus. sufficit quoque cum resina, aduersus ueterem tussim raptò per fistulam nidore: uocem expedit cum melle delincta: suspensio cum resina in catapotio optimè datur.

**AURIPIGMENTVM**, & Sandaracha, medicamenta sunt eiusdem tum generis, tum facultatis, nec inter se in alio differunt, quàm quòd alterum magis, alterum uerò minus excoctum fuerit in terræ uisceribus, ubi gignuntur. Vnde etiam sequitur, quòd alterum altero tantum uirum tenuitate præstet. Quandoquidem nil aliud est sandaracha, quàm auripigmentum, quod maiori naturæ coctione colorem rubeum contraxit, & tenuius effectum est. Id quod periculo arte factò uerum deprehenditur. quippe si fictili, uel uitreo uase uratur auripigmentum, substratis candentibus prunis, breui (ut mihi pluries experientia compertum est) flammæ, & summè rubens contrahit colorem, perinde ac sandaracha: eoq; magis, quò plus calorifici ignis arte fuerit expertum, quàm ipsa sandaracha naturæ uicem affecit. Sandaracham summè rubens uidimus primùm Venetijs in officinis, ubi auripigmentum, & cæteri ueniunt colores pictoribus expetiti. Veruntamen animaduertendum est (ut superius libro diximus) quòd hæc illa uulgaris Sandaracha non est, quam Vernicem scriptoriam officinæ appellant: siquidem nil aliud hæc est, quàm gummi iuniperi. Errorem autem fecere neoterici illi, qui Mauritanorum nomina secuti (ijs enim gummi iuniperinum sandarax dicitur) idem gummi sandaracham nominauerunt: ita nomina turpiter confundentes, ut imperitis sæpe grauiter in rebus ipsis errandi præbeant occasionem. Quæm obrem ubi in Arabum monumentis, uel eorum, qui Arabicam factionem in omnibus sequuntur, medicamentum aliquod repertum fuerit, quod Sandaracham excipiat, de iuniperi gummi perpetuò intelligendum erit: ubi uerò id in Græcis codicibus inuentum fuerit, ea quidem sine controuersa

Auripigmen  
ti, & Sandara  
chæ conside  
ratio.



uerſa erit aſſumenda, de qua hic diſſerit Dioſcorides. Vocauerunt præterea recentiorum nonnulli Sandaracham quocumque Sandycem, quam è combuſta ceruſſa conficiunt, quod fortasſe hæc colore admodum rubefcat. Sed hæc ab il- la (ut ſuprà retulimus, cum de ceruſſa ſermonem haberemus) uiribus, & qualitatibus plurimum diſidet. Eſt & Sandaracha ceraginoſi mellis genus, ſi Plinio credimus, qui libro XI. cap. VII. eius meminit. Cæterum illud non eſt ſilentio prætereundum, quod Arſenicum officinis cryſtallinum uocatum, ideo quod cryſtalli modo pelluceat, non ſit per ſeſe, nec ſponte naſcitur in auripigmenti fodinis, ut ſcribit Vannocius cuius meus in ſua pyrotechnia, qui nos aliàs eius fidem ſecutos, in hunc ſuum errorem deduxerat, ſed arte ex auripigmenti ſcobe admiſto ſale. Sumunt enim artiſces auripigmenti ſcobem, & cum pari ſalis pondere miſcent, teruntq; ſimul, & ſubinde operculatis fictilibus huic operi inſeruentibus, ignium ui tandiu coquit, quouſque id omne in ſublime feratur, & operculo adhæreat, con- creſcatq; in lapidem: idq; toties repetunt, donec adeò purum efficiatur, ut cryſtallum referat. Auripigmenti uires reddidit Galenus lib. IX. ſimp. med. ſic inquit. Arrhenicum, ſiue arſenicum facultatis eſt cauſticæ, ſiue urentis idq; tam combuſtum, quàm uſtionis expers. Cæterum id conſtat uſtione reddi tenuiorum partium. Vtuntur porro eo, ceu adurète ad denudandam pilis partem quàmuis. Verum ſi diutius inhareat, nec enti etiam ipſi parceret. Idè de ſandaracha eodem libro ſcribens, inquit. Sandaracha urentis eſt facultatis, ceu arſenicum quod uocant. Merito itaq; que eam digerentibus facultatibus commiſcent, atque extergentibus. Metallicum, quod Græci ἀρσενικόν & ἀρσενικόν, Latini Arſenicum, Arrhenicum, & Auripigmentum uocant: Mauritani, Harneth, ſeu Zarnich: Itali, orpimento: Germani Auripigment, & operment: Hiſpani, Oropimente. Quæ uerò σαρδάρα Græcè, Sanda- racha Latine pariter & Italice uocatur: Arabice, non ſecus atq; auripigmentum, Harneth, & Zarnich.

Auripigmen-  
ti, & Sandara-  
chæ uires ex  
Galeno.

Nomina.

## Alumen.

## Cap. LXXXII.

ALUMINIS omne ferè genus in Aegypto, & in eiſdem metallis inuenitur: etenim ſciſſile quod- dam, quaſi ſlos gleboſi intelligitur. Gignitur & in alijs quiquſdam locis, in Melo, in Macedonia, in Liparis, Sardinia, Hierapoli Phrygiæ, Aphrica, Armenia, & plerisque alijs regionibus, ſicut & rubrica. Plurimæ eius ſpecies: verum ad medendi uſum ſciſſile, rotundum, & liquidum expetun- tur. Optimum eſt ſciſſile, præſertim recens, candidiſſimum, guſtu perquam adſtringens, graueo- lens, calculorum expers, nec glebuſoſè aut aſuloſè compactum, ſed ſigillatim in capillamenta quæ- dam caneſcentia dehifcens: quale eſt, quod trichites, quaſi capillare nominatur, in Aegypto natum. Reperitur quoque lapis huic alumini perſimilis, qui guſtus iudicio dignoſcitur, quod non adſtrin- gat. Damnatur in rotundi genere, quod manu conſectum eſt: ſed ex figura deprehenditur. Alumen- dum autem ſuapte natura rotundum, bullis turgens, albo propius, atque ualidius adſtringens, præ- terea nonnihil palloris cum quadam pinguitudine præ ſe ferens, ſine arenis, friabile, natione Aegy- ptium, aut ex inſula Melo. Liquidi probatio, ut ſit lympidum, lacteum, æquale, & ſemper ſucco madens, ſine lapidibus, atque quendam coloris igniculum expirans. Vim habent excalfaciendi, ſtringendi, & expurgandi, quæ caliginem pupillis oculorum oſtundunt, genarum carnem, cæteras- que excreeſcentias extenuant. ſciſſile rotundo efficacius intelligitur. Uri, & torreri chalcitidis modo debent. Putreſcentia ulcera compoſcunt: ſanguinis fluxiones inhibent: gingiuas humore prægnantes comprimunt: motus dentium cum aceto, & melle firmant. Proſunt cum melle ulceribus oris, eru- ptionibus papularum, & fluxionibus aurium, cum ſanguinalis herbæ ſucco. Lepris conueniunt cum braſſicæ folijs, aut melle cocta: item pruriti, & unguium ſcabritijs, pterygijs, & perſionibus, aſperſa cum aqua. Valent cum aceti fæce, & galla, pari pondere cremata, ad phagedænas ulcerum: & cum ſalis duabus partibus, ad uitia, quæ paſcunt. furfures, cum eruo, & pice illita abſtergunt: ad- lendes, pediculos, ambuſta, cum aqua illita auxilio ſunt. Contra tumores, & graue alarum, inguinum- que uirus illinuntur. Ex Melo autem aduectum, mulieribus præſtat ne concipiant, ante coitum ori- uulæ inditum: partus quoque extrahit. gingiujs, ſi caro excreuit, uis ac tonſillis accommodantur: ori, auribus, & uerendis, cum melle illinuntur.

Aluminū cō-  
ſideratio.

TAMETSİ ſcripſerit Dioſcorides plurima eſſe Aluminis genera; non tamen plura, quàm tria hoc loco ſtat- uit recensenda, nempe ſciſſile, rotundum, & liquidum: quod fortasſis ſuo tempore ijs tantum uterentur medici. Ver- runtamen hæc ætate officinæ complura habent genera, quannus rotundo, & liquido careant: nimirum Rupeum, quod uulgo uocant Alume di rocca: ſquamoſum, quod uulgo dicunt Alumne ſcagliolo: item è uini fæce conſectum: necnon illud, Catinum ijsdè uocatum: quibus accedit, quod plumeum appellant. quod tamen legitimum ſciſſile nō eſt, eſt iandudum cum cæteris rei metallicæ ſtudioſis crediderim ſciſſile alumen nil aliud eſſe, quàm quod uulgo officinis uocatur Alume di piuma. Sed hoc (ut poſtea dicetur) nil aliud nunc eſſe cenſemus, quàm lapidem amiantum: quod guſtu non ſit adſtringenti, ſed acri, quodq; igne nunquam comburatur, quod eſt amianti lapidis proprium. Legitimum alumen ſciſſile Piſis miſit ad me hoc anno clariſſimus medicus Lucas Ghinus, notis omnibus refertum, quas illi reddidit Dioſcorides, & guſtu admodum adſtringens. Quo poſtea factum eſt, ut diligentius exploratis plumei aluminis diſſe- notis, tum qualitatibus, facile deprehenderim plumeum hoc non eſſe ſciſſile. Cæterum Braſauolus de alumine diſſe- rens in ſuo ſimp. med. examine, nil aliud liquidum eſſe contendit, quàm rupeum. Sed ab eo, licet uiro eruditiſſimo, uariet opinio noſtra. Nā quod ego in Alumerijs Pontificis maximi in Romano agro prope Tofſam per bicinium mo- ram duxerim, eo nimirum tempore, quo Auguſtinus Chriſtus opulentiſſimus mercator cuius meus, illas aluminis fo- dinas

Braſauoli o-  
pinio repro-  
bata: item Fu-  
chi error.







tundum Græci uocant, tametsi non desint, qui sibi persuadeant, id esse quod officinæ à sacchari effigie zuchcharinum appellant, ex crudo alumine rupeo, ouorum albo, & stillatitia rosarum aqua paratum; cum tamen non inueniatur rupeum ueteribus cognitum fuisse, cur eorum iudicio subscribam non habeo. præsertim quod legitimū nunc apud nos sit. Quod præterea Catinum appellant, ex cuiusdam plantæ cinere, chali Mauritanis uocata, conficitur ad uitra in fornacibus expurganda. Plantam hanc nos uulgò uocamus Soda. Prouenit hæc (ut alibi scripsimus) in litoribus maris, salso admodum sapore. Ceterum quod ex uini fece paratur, fit conformatis cæ fecæ panibus, deinde sole siccatis, & igne tandiu perustis, quousq; candorem conceperint. Postremo Squamosum (sic enim uoco alumen illud, quod uulgò dicitur Alume scagliola) ex squamoso quodam fit lapide, & utri modo pellucido, qui nonnullis specularis appellatur, quod fortasse selenitis modo speculi præbeat effigiem. nos Asini speculum dicimus. Hunc itaque in ignem conijciunt, aut ferri laminis igne candentibus superimponunt. Incensus enim illico claritatem deperdit, dissilitq; in tenuissimas laminas, & gypsi modo albescit, eiusq; induit speciem. Quamobrem maxime falluntur, qui sibi persuadent, inter lapidem specularem, & Talcum uocatum nullam intercedere differentiam. Quippe (ut mihi quidem experientia compertum est) non sine magno labore, & flagrantissimo fornacis igne, Talcus inuri potest. Specularis lapidis pulvis nondum ignem experti, miris laudibus quibusdam effertur ad dysentericos, in uino austero potus: exustu enim non probauerim, quod gypsi specie induta, sumentes strangulet. Aluminium uires paucis perstringit Galenus lib. IX. simplicium medicamentorum, sic inquit. Stypteria, huius medicamenti nomen ab adstrictione deductum est: nam adest illi uehementissima. Ceterum cum sit crassarum partium, tenuior quodammodo est alijs aluminū generibus, quod uocatur sebiste, hoc est fossilis: proxima est strongile, id est rotunda, & astragalote. Admodum autem crassa est tum liquida, tum placites, & plinibites appellata. Et libro IIII. de compositione medicamentorum secundum genera, idem ait. Omnes aluminis differentie ulcera satis exiccant generose adstringentes: quare nouo solis ijs ad uul-  
cera utatur. hæc Galenus. Sed non desunt, qui Dioscoridem secuti, alumen omne non parum exalfacere opinentur: contra uerò qui contendunt id omnino esse falsum, potius frigesacere ipsum existimantes, Galeni auctoritate firmi. quippe qui lib. IIII. simplicium medicamentorum scripserit, omnia quæ adstrictoria sunt facultate, esse frigida, ac terrestria. Veruntamen si rectè diligenterq; expendantur aluminum quoruncunq; effectus, & facultates, quibus in corpus nostrum agunt, nemo quidem inficias ire poterit, quin aluminis omne genus non obscure exalfaciat, quemadmodum chalchantum, chalcitis, & nisy: quæ cum ualenter adstringant, non tamen refrigerant, sed maxime exalfaciunt, ut idem testatur Galenus libro primo de simplicium medicamentorum facultatibus, dum inquit. Quin uerò et Asclepiades Metrodorus tanquam illum etiam superare contenderet afferendis de sensu mendacij, cum alia quedam, tum resina, & bitumen exalfacere nos denegat, atq; adstringentia omnia refrigerare dicit, cum si nihil aliud saltem chalcitis, chalcanthos, & nisy, quæ ualenter adstringunt, tantam affecta sint caliditatem, ut uos etiam exalfarent. Nihil est ergo mirandum, si prolixa quedam nugentur, seipsosq; nonnulli fallant, cum de manifestò apparentis affirmant, his uerbis. Porro diphryges appellatum pharmacum ulceribus ægrè humiditatis uitio ad cicatricem nentibus aptissimum est: ualde namq; siccant, et si modicè mordeat. Enim uero id quoq; præter acrem tum qualitatem, tum potentiam uim habet adstrictoriam, quas tamen ambas fortiores, & chalcitis cruda, & chalchantum representat. Quin & alumen quodlibet ulcera satis exiccant generose adstringens. Ex quibus locis citatis palam est, etsi Galenus lib. IIII. de simplicium medicamentorum facultatibus, scribit omnia adstringentia esse frigida; non tamen eum inter ea recipisse chalchantum, chalcitin, nisy, diphryga, æruginem, & alia quædā, ut alumen omne genus: præsertim quod facile compertum habeam, aluminis cuiuscunq; stillatitiam aquam, maxime rupei, non modò carnem exedare, sed etiam metalla. Alumen quod Latiniis, *συμπία* Græcis appellatur: Arabibus, *Seeb*, siue *Seb*: Italis, *Alu-*  
me: Germanis, *Aluu*, & *Alaun*: Hispanis, *Alumbre*.

## Sulphur.

## Cap. LXXXIII.

**SULPHUR** optimum existimatur uiuum, quod apyron uocant, nitedule modo splendidum, perlucens, minimè lapidosum. Probatur in genere sulphuris ignem experti, quod virescit, ac præpingue spectatur. Plurimum in Melo, & Lipara gignitur. Supradictum sulphur calfacit, discutit, & celeriter concoquit. Prodest tussibus, suspiriosis, purulenta extusientibus in ouo sumptum, aut suffitum: præterea partus vlti nidore extrahit. Lepras, lichenas, scabros vngues, cum resina terebinthina mistum aufert: cum aceto autem illitum, ad lepras efficax est: vitilignes tollit. Scorpionis ictibus, addita resina, medetur: cum aceto verò, draconis marini, scorpionisque plagas sanat. Pruritus toto corpore erumpentes, cum nitro detersum sedat: regium morbum emendat, insparsum fronti cochlearis mensura, aut in sorbili ouo sumptum. Facit ad grauedinem, & destillationes: sudores quoq; conspersum inhibet. podagricis cum aqua & nitro illitum, conducit. grauitatem auditus, suffiti nido-  
re raptim per fistulam hausto, sanat. Lethargicos suffitu excitat: erumpentem vndeunque sanguinem sistit. Contusis auribus, cum vino & melle illicum, medetur.

Sulphuris cō-  
sideratio.

**SULPHUR** tam sponte & per se nascens, quod uiuum appellant, quàm arte in fornacibus factū, frequentissimum habetur in Italia: sed non omnibus unus tantum color. quippe aliud uiride, aliud lutum, aliud cinereum, aliud pallidum spectatur. Quod autem sponte fit, uiuum appellatum, exterius colore est sub cinereo, interius uerò cum frangitur, subluteo, nitedule modo splendens, ut Dioscorides inquit: iisdemq; oritur locis, ubi factitij uena foditur. Est autem



autem Sulphur fōssitium medicamentum ē pingui quadam terræ substantia prognatum, ut in compluribus uisitur locis, quæ impensè calida sit, & sicca: adeo ut à chymistarum auctoribus, igni natura simile Sulphur dicatur. Vocant id iij masculum semen, & primum naturæ agens ad omnia metalla procreanda. Cum autem calidum sit, & siccum, quinetiam pingue (ut diuturna constat experientia) maximam cum igne trahit cognationem: siquidem non flammæ ignium modò; sed prunis quoque adnotum, statim accenditur, nec unquam accensum extinguitur, quousq; pinguis, & oleosa eius substantia in uniuersum igni absumatur. Verum eninuero etsi præ se ferat Sulphur temperamentum non obscurè calidum, & siccum; non tamen credendum fuerit tam puram, sinceramq; id esse materiam, ut per se tantum consistere queat. neque etiam cogitandum, ei non esse necessarium, ut sibi humiditatem asciscat, qua formam congruam suscipiat, quemadmodum mista quælibet exposcunt. Id enim nobis indicat eius uelocissima, ac facillima diffusio, cum statim igni adnotum colliquecat, metallorum modo. Foditur aperto undique cælo, non autem in cuniculis, & subterraneis specubus. In his nanque tum uehementi calore, tum fœtidissimo terræ halitu, fossiores illico deperirent. Porro effossa Sulphuris uena, fictilibus quibusdam magnis imponitur Romanis hydrijs non ab similibus, longo ab ore dependente rostro, intus uacuo, ac in humum spectante, uitrei pilei instar, quo stillatitiæ aquæ conficiuntur. His itaque fictilibus sulphurea uena repletis, fictilibus pariter operculis ad id diligenter conflatis, continguntur, stipanturq; tenacissimo luto, creta, & equino stercore composito, ne tantillum quidem expirare possit sulphureus uapor. His peractis in fornacem crates duas ferreas intus habentem fictilia deferuntur, & in superiorem cratem firmanitur, eodem luto undique stipata, adeo ut ignis flamma, qui in infima accenditur crate sub fictilium fundo, nullo pacto in sublime ferri possit. Ad hæc fictilium rostrum in aliud uacuum fictile inserunt, per quoddam in latere orificium, & eadem creta quam diligentissimè circumlinunt, obducuntq; maxime. Demum ignem succendunt sub fictilium fundo, cuius ui depuratum sulphur in sublime fictilium fertur, & per rostri concauitatem in uacuum sibi annexum descendit receptaculum: à quo tandem fluens eximitur, aperto in fundo stramine, & alijs uasis excipitur, ubi in magnos coit globos. Hac sanè ratione Sulphur fieri conspeximus in agro nostro Senensi in montibus non longè à balneis diui Philippi, & in maritimis apud Petriolum. Sulphuris uires memoria prodidit Galenus libro IX. simplicium medicamentorum, sic inquires. Sulphur omne trahendi uim possidet, estq; temperamenti calidi, atque essentia tenuis, adeo ut ad multa uenenatorum animalium resistat. Siquidem ego aduersus pestinacam marinam, & draconem sepe numero eo sum usus, & cum id piscatores quosdam docuissent, reuerso post aliquantum temporis magnifice medicamentum hoc commendarunt. Vsus eius est, ut & siccum icthni inspergatur medicamentum, & cum salina mistum: nam cum & hoc excogitasset, ab experientia comprobari reperi. Sed & urina maceratum idem effectum excoGITAU. Docebam enim piscatores medicamenta maxime parabilia, dixiq; pulchrè illos & cum oleo ueteri, & melis, & resina terebinthina usuros. Et sanè horum omnium experientia iudicium præstitit. Quin & psoras, & lichenas, & leprās, non raro hoc medicamento cum resina terebinthina sanauit. Extergit enim omnes id genus affectus; absq; ut in profundum repellat, cum alia multa medicamenta, quæ illos curant, mistam habeant potentiam, nempe ut digerant pariter & repercutiant. Præterea, ut idem Galenus inquit libro VI. cap. II. de compositione medicamentorum per genera, in compositione emplastri δια σκίλλαν, Sulphur tanto calore præditum est, ut ubi diutius inhereat, procul dubio exulceret. Sulphur siue Sulfur Latinis dictum, Græcis θείον appellatur: Arabibus, Cribrit, & Ra-

Sulphuris faciendi ratio.

Sulphuris uires ex Gal.

Nomina.

## Pumex.

## Cap. LXXXIII.

PUMICIS probatio, ut magnopere leuis, spongiosus, scissilis, nec arenosus, item teri facilis, & candidus. Crematur flagrantissimis carbonibus obrutus, & ubi canduerit, extractus, vino restinguitur odorato: iterumque incensus, restinguitur: & tertia uisione exemptus, & per se refrigeratus, ad usum conditur. Vis eius adstringere, gingiuas abstergere, purgat cum calfactione, quæ pupillis caliginem offundunt: explet vlcera, & ad cicatricem perducit: excrecentia cohibet. Fit ex farina eius dentifricium. Corpori crustam obducit: auellendis capillis aptus. Theophrastus auctor est, si quicquam in bullientem uiceum vini pumicem iniecerit, feruorem statim sedari.

PUMICEM ambustum esse lapidem in montium concauitatibus, omnes frè fatentur naturæ operum exploratores. Ob id enim pumices sæpius eructat mons Aetna in Sicilia, & in Campania Vesuius, qui hoc tempore, annis nuper elapsis, non secus quam Plinij ætate, ingentibus flammis exarsit, cum magno Puteolorum, & adiacentium locorum detrimento, igne in terræ uisceribus genito, è sulphureis uaporibus, & bitumine, quo quam plurimè referti sunt montes, eoq; præsertim, quod Græci pissaspphaltum dicunt. Pumicis uires duobus locis reddidit Galenus libro IX. simplicium medicamentorum, ubi de eo primum ita scribit. Si pumex inter lapides recenseri potest, & ipse eiusdem est facultatis, quod certè ad absterfionem attinet, uelut etiam figulina testa, ac multo magis ea, quæ fornacium est. Sed sniris acrimoniæ quiddam obinet: proinde causticis, & desiccantibus facultatibus quidam ipsum miscent, eisq; quæ curant gingiuas laxas, ac mollitiæ fluidas. Pumex autem si comburatur, haud erit inferior eosdem ad usum snire. Secundo autem loco idem de pumice differit his uerbis. Pumicem si inter metallica recenseas, calumniabuntur, quibus animus prurit accusandi libidine: et si inter lapides ponas, lapidem esse negabunt: ac multo minus terram esse concedent, nec marinorum haberi quodpiam. Atqui alicubi tamen de illo dicendum est: quippe qui in sarcotica indatur medicamenta, & ea quæ dentes extergunt, partim ustionem non expertus, partim etiam ustus, quando uidelicet alijs omnibus combustis similiter substantiæ efficitur tenuioris. Ceterum ustione quiddam acquirit acrimoniæ, quam rur-

Pumicis consideratio.

Pumicis uires ex Gal.



Nomina.

*fus lotione exiit . Videri autem poterit splendorem conciliare, non tantum facultate ; sed etiam asperitate, uelut etiam si smirin, aut testam, aut hoc genus quippiam tritum admoueas . Quæ certè & ipsa splendorem afferunt, fortè utroque, tum quia detergendi habeant facultatem, tum quia asperitatem . Eundem in modum cornua densa dentes splendidos efficiunt . Pumex qui Latinis, Græcis *πίονις* uocatur : Arabibus, *Fanech* : Italis, *Pomice* : Germanis, *Einbins* : Hispanis, *Piedra pomez* .*

## Sal.

## Cap. LXXXV.

**SAL** fossilis efficacior est . communiter , si est candidus, calculis vacans, & perspicuus, densus, æquali compage . Peculiariter Ammoniacus natione laudatur, si modò findi facillè possit, & in recta segmenta diduci . In marino sale eligendus est candidus, æqualis, densus . Probatissimus in Cypro fit, & Salamine Cypri, & Megaris, in Sicilia, & Aphrica . Sed inter dicta salis genera lacustris præfertur : sed multò validissimus est Phrygius nomine tapeus, aut tritæus, aut gantæus . Salis natura in commune perquam utilis est : adstringit, absterget, expurgat, dissipat, reprimat, extenuat, & crustas inducit . sed hoc interest, quòd alius alio sit præstantior . Quin & à putredine vindicat . Admiscetur medicamentis psoras abstergentibus . excrescentia in oculis reprimat, & pterygia consumit, cæterasque carnis extuberationes tollit . Clysteribus infunditur : discutit lassitudines ex oleo illitus . Contra hydropicorum tumores auxiliatur : dolores in saccis fotu mitigat : & pruritus sedat, ex oleo & aceto infriectus ad ignem, donec sudent : item lichenas, lepras, psorasq; . Anginam ex melle, aceto, & oleo illitus leuat : tonsillis, vuæque cum melle tostus . Vlceribus in ore manantibus, gingiuis, quas humor vexat, & phagedænis vlcum, cum polenta crematus illinitur . Aduersus scorpionum ictus cum lini semine : contra serpentium morsus, cum origano, melle, hyssopo : aduersus cerasten cum pice, aut cedria, aut melle auxiliatur : contra scolopendræ morsus, cum melle, & aceto : aduersus vesparum ictus, & teredinei, albidasque capitis pustulas, thymos, & tubercula, cum seuo vitulino : furunculos, cum vua passa, aut suillo adipe, aut melle discutit : testium tumores, cum origano & fermento maturius concoquit . Crocodillorum moribus auxiliatur, tritus in linteolo, & intinctus aceto, ita ut vinculis loca constringantur . Prodest ad bestiarum morsus, & ad fugillationes in facie ex melle . contra haustum opium, & fungos, cum aceto mulso bibitur . Luxatis imponitur cum farina, & melle . ambustis igni cum oleo impositus, pustulas erumpere non patitur . Podagricis itidem imponitur, & aurium doloribus, cum aceto . ignes sacros, & vlcera, quæ serpunt, cum aceto, aut hyssopo illitus sistit . Vritur fictili, diligenter opertus, ne exiliat, conditusque prunis . vsquedum effervescat . Aliqui fossilem subacto polline obliniunt, & carbonibus subiiciunt, vsquedum eius crusta exuratur . Solet & sal communis hoc modo vri . Aqua semel abluitur, & siccatus in ollam coopertam mittitur subdito igne, moueturq; , donec iam non exiliat .

## Salis spuma.

## Cap. LXXXVI.

**SPUMA** salis spumosi maris lanugo, siue ramentum est, in exilibus petris inuentum . cui vis eadem, quæ salis .

## Muria.

## Cap. LXXXVII.

**MURIA** effectus salis præbet, abstergitq; : dysentericis infunditur, etiam si nome intestina corripit : & ischiadicis veteribus . Ad fatus, aquæ marinæ vsum præstat .

## Flos Salis.

## Cap. LXXXVIII.

**FLOS** salis flumine Nilo defluit : lacubus tamen quibusdam innatat . Assumendus qui crocei coloris est, odore ingrato, ceugari . interdum longè magis virus olet, gustuque mordacior, & pinguius lentus . Fucatus autem rubrica, aut scrupulosus, improbatur . Præterea syncerus non nisi oleo resoluitur : adulteratus nonnulla ex parte, etiam aqua, diluente . factitium colorem . Ad vlcera, quæ cacoethe vocantur, & phagedænas, genitalium nomas, & purulentas aures, efficax est : oculorum hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit . Emplastris, unguentisq; coloris causa, ut rofaceo, miscetur . Sudorem cit, aluum turbat, in vino aut aqua sumptus : stomachum malè habet . Additur acopis, & smegmatis, quæ albicandi capilli gratia componuntur . Et in vniuersum acris est, & feruentis naturæ, ut sal .

Salis omnis generis consideratio.

**SAL**, quo frequentissime in omnibus ferè cibis utimur, & sine quo uiuere nescimus, quo item ad annos asseruntur carnes, pisces, aliæq; complura, nullis sanè non cognitus est . Plures tamen in salis genere sunt differentie : quæ doquidem præter marinum, flumiatilis, lacustris, fossilisq; reperitur . Marino utitur vniuersa ferè Italia, exceptis Calabriis, qui fossitio quam pulcherrimo abundant . quo etiam utitur vniuersa Pannonia . In Germania hauritur & salis quibusdam



quibusdam fontibus, quorū aqua diu ignium ui excocta in salem cogitur. Fosfitium officinæ Arabas secutæ salem gemme vocant. Huiusmodi uidinus apud Calabros agentes, loco, qui uulgo dicitur Aliomonte, ubi lapidum modo exciditur, translucidus crystalli modo. Hic in ignem coniectus præter cæterorum naturam nec dissilit, nec crepitat, sed ut ferrum ignescit. Lacustrem hætenus non uidimus, nec fluuiatilem. quauquam Plinius lib. XXXI. cap. VII. tradit plures haberi lacus, ac fluuios, qui salem copiosum reddunt, ut eius uerba, quæ subiiciam, aperte testantur. Sal omnis, inquit, aut fit, aut gignitur. Vtrūq; pluribus modis, sed causa gemina, coacto humore, aut siccato. Siccatur in lacu Tarentino æstiuis solibus, totūq; stagnum in salem abit, modicum alioquin, altitudine genna non excedens. Item in Sicilia in lacu, qui Cocanicus uocatur, & alio iuxta Gelam. Horum extremitates tantum inarescunt, sicut in Phrygia, Cappadocia, Aspendi, ubi largius coquitur, & usq; ad medium lacum. Aliud etiam in eo mirabile, quod tantumdem noctu subuenit, quantum die aufertur. Omnis est talis sal minutus, atq; non gleba est. Sunt etiamnum naturales differentie tres. Namq; in Bactris duo lacus uasti, alter ad Scythas uersus, alter ad Arios, sale æstuant, sicut ad Cittum in Cypro, et circa Memphin, extrahunt lacu, deinde sole siccant. Sed & summa fluminum densantur in salem, anne reliquo ueluti sub gelu fluente, ut apud Cassias portas, quæ salis flumina appellantur. Item circa Mardos, & Armenios. Præterea apud Bactros amnis Ochus, & Oxus ex appositis montibus deferunt salis ramenta. Sunt & in Africa lacus, & quidem turbidi, salem ferentes. Ferunt quidem & calidi fontes, sicuti Pagasæi. Et hætenus habent se genera ex aquis sponte proueniencia. Sunt & montes natui salis, ut in Indis Oromenus, in quo lapicidarum modo ceditur renascens, maiusq; regum uestigal ex eo est, quam ex auro, & margaritis. Effoditur & è terra, ut palam est, humore densato, in Cappadocia. Ibi quidem ceditur specularium lapidum modo. Pondus magnū glebis, quas micæ uulgo appellat. Carrhis Arabiæ oppido muros, domosq; massis salis faciunt, aqua ferruminantes. Inuenit & iuxta Pelusium Ptolemæus rex cum castra faceret. Quo exempto postea inter Aegyptum, & Arabiam etiam squalentibus locis cæptus est inueniri, detractis arenis. qualiter & per Africæ sitientia, usque ad Ammonis oraculum. Is quidem crescens cum luna noctibus. Nam Cyrenæici tractus nobilitantur Ammoniaco, & ipso, quia sub arenis inueniatur, appellato. Similis est colore alumini, quod schiston uocant, longis glebis, neque perlucidis, ingratus sapor, sed medicine utilis. Hætenus de sale Plinius. Ceterum Ammoniacus sal, qui legitimus sit, ad nos conuehi desijt: quippe factitius, adulterinusq; est, qui passim in seplasiariorum officinis uenditur, plerunque è Germania allatus, nigricantibus exterius glebis. Non desunt tamen, qui credant constari hunc ex camelorum urinis, artificio quodā concretis. Sed cur his ad stipulari debeam, non equidem uideo, præsertim cum Germania, unde Venetias conuehitur factitius, camelos non habeat. Seplasiarij, pariterq; chymistæ Sal Arneniacum appellant, quod fortasse existiment ex Armenia adferri, ubi innumeri sunt camelorum greges. Sed isti, mea quidem sententia, hallucinantur. Serapio (Isach Arabici testimonio) scribit Salem Ammoniactum fieri è lapidibus durissimis, & translucidis. Sed & is fallitur, meo iudicio: siquidem Ammoniacti nomen non aliunde sibi comparauit, quam ab arena, quæ ἄμμος Græcis dicitur, sub qua in laminas concretus, inuenitur in Cyrenæica regione. Venit præterea in medicorum usum Sal, quem Arabes Alchali cognominant, item Alumen catinum, de quo superius in alumine diximus. Sal autem Indus appellatus (ut libro secundo retulimus) nil aliud antiquis exhibuit, quam saccharum in sacchariferis arundinibus in India gummi modo concretum, cuius nunc loco utimur supposititio, quod seplastiæ zuccharum candidum uocant. Verum tamen animaduertendum est, quod quauquam Paulus, & Auicenna eum fortasse secutus, concretum natura saccharum salem Indum appellant, non tamen fuerit putandum, quod Indi legitimum salem non habeant. Quandoquidem (ut Plinius est auctor) in Oromeno Indicæ monte lapicidarum modo feditur ingentibus glebis. proinde dicebat Mesues de sale scribens, Naphthicum, & Indicum cæteros sales præcellere. Quod autem Salnitrum uocant, tormentorū bellicorum pulueribus expetitum, uulgaris uotitie est, de quo tamen latius sequenti capite sermonem faciemus. Ceterum salis spumam pluries legi quibusdam in scopulis Tyrrheni maris: Cum enim procella exoritur, intumescitq; pelagus, effluuis caloribus, in salem album concresecant. Muria porro, quæ innumera afferuantur edulia, nota omnibus res est, ut quæ sale tantum, & aqua conficiatur. Sed quidnam ueteribus flos salis fuerit, decernere non ausim, neque plura quod scribam habeo, quam quæ à Dioscoride produntur. Eius tamen meminit Plinius loco supra citato, sic inquit. Salinarum sinceritas summam facit suam differentiam. Quædam enim fauilla salis, quæ leuissima ex eo est, & candidissima flos salis appellatur. Et flos quidem salis, in totum diuersa res, humidiorisq; nature, & crocei coloris, aut rufi, ueluti rubigo salis. Odore quoque ingrato, ceu gari, dissentiens à sale, non modò à spuma. In Aegypto inuenitur, uideturq; Nilo deferri. & fontibus tamen quibusdam innatat. Optimum ex eo, quod olei quandam pinguitudinem reddit. hæc Plinius. Porro color rufæ rubiginis instar pictoribus expetit, è Germaniæ salinis aduectus, qui fortasse flos ipse salis fuerit: nam colore, & sapore illi non obscure respondet. uulgo appellant Morello dictus, qui fortasse flos ipse salis fuerit: nam colore, & sapore illi non obscure respondet. uulgo appellant Morello dictus. Verum cur non hoc planè affirmem, illud mihi ob stare uideo, quod color is non sit liquidus, neq; oleosus, sed aridus. Quare potius inclinatur animus, ut ipsum credam esse salis rubiginem, de qua ex Plinio paulò ante mentionem fecimus. Fuchsius medicus ingenio & eruditione clarus, in libro de compositione medicamentorum, quem auctum secundo edidit, nihil aliud esse putat florem salis, qui Dioscoridi ἄλς ἄνθος dicitur, quam balenarum semen, quod Germanis medicorum officinis Sperma ceti nominatur. Quæ in re is fortasse secutus est sententiam Georgij Agricolæ rei metallicæ acerrimi indagatoris. Sed utcumq; sit, non equidem possum horum quauis eruditorum uirorū iudicio subscribere. nam res illa tantum abest, ut sit crocei aut rufi coloris, ut etiam candida conspiciatur. Adde, quod flos salis Dioscoridi & Plinio flumine Nilo destitit, & lacubus seu fontibus quibusdam innatat: hoc autem Sperma ceti uocatum in mari colligitur, atq; etiam in paludibus mariemmis inuenitur. Id fortè à maximis illis piscibus effunditur: quod tamen non ita liquidum apparet, ut de flore salis Galenus memoriæ prodidit. Salis autem meminit idem Galenus.

Sal Ammoniacus.

Fuch. opinio improbata.

Salis vires ex Galeno.



tum inter fossilia medicamenta, tum etiam inter ea, quæ in mari nascuntur libro IX. & XI. simplicium medicamentorum, sic inquit. Sal eiusdem genere facultatis est, siue fossilis sit, siue marinus: uerum hoc differunt, quod salis terra effossi substantia magis sit compacta: ac proinde in hoc maior est, & partium crassities, & adstringendi potentia. Itaque marinus affusa ipsi aqua protinus liquefit, at fossili hoc non euenit. Porro eiusdem speciei cum marino est, qui in stagnis quibusdam salsedinem habentibus nascitur, æstate uidelicet aquis aestu ex ijs assumptis, cuiusmodi est Tragastus non procul à Sminthio. Confluit enim illuc ante aquas spontaneas, quæ admodum sunt calidæ, copiosa æque stagnans, non amplo in loco: & ea æstate omnis absuntitur, à sole uidelicet arefacta. Porro quoniam locus ipse salsedinem natiuam continet, quod reliquum est eius omne, sal est, cognominationem à loco pariter & aquis sortitus. Nam spontaneæ & ipse illis in locis aquæ Tragastæ nuncupantur, potentia summè exiccatoria: & sanè, qui in ea regione sunt medici, ad hoc illas accommodant. Porro dictum est & de Sodomis in mari mortuo prouenientibus in quarto libro, quem si quis librum diligenter perlegerit, illi tantum reficere memoriam nunc opus est, ut exposita gustus qualitate, ipse medicamenti facultatem cognoscat. Igitur cum qualitas salsa digerat, simul & contrahat contactam ab ipsa substantiam, uocatum aphrolitron in hoc differt, quod in ipso unum modò saporem exuperantem expressit sit uidere, quem uocant amarum, uim habentem digerendi, haud etiam contrahendi, uti sal. Nam hic quicquid in corporibus humidum inest, id totum quodammodo absorbit; & quod reliquum est substantiæ solidæ, adstrictione contrahit: ac proinde etiam conditura sua corpora siccant, & à putredine tuerit. Quippe quæ putrescunt, excrementum continent humorem, substantiamque tum dissolutam, tum minime compactam. Quibus ergo corporibus nulla prorsus est humiditas superflua, ceu melli optimo, & corpus solidum, & compactum est, ceu lapidibus, ea ut putrescant est impossibile: ac proinde in his salis non probatur usus, uerum in ijs, in quibus suspecta est putredo. Spumosa autem salis efflorescentia multò tenuioris naturæ est, quam sal ipse. quare & extenuare, & digerere multò plus ipso potest: uerum quod substantiæ est reliquum, contrahere ut sal nequit. Caterum flos salis medicamentum liquidum est, tenuius etiam quam sal ustus: tum acris qualitatis, & admodum digerentis facultatis. hæcenus de sale Galenus. Sal Latinis dictus, ἅλς Græcis appellatur: Arabibus, Melec, seu Melha: Italis, Sale: Germanis, Salz: Hispanis, Sal.

Nomina.

## Nitrum, spuma Nitri.

## Cap. LXXXIX.

PRAEFERTVR Nitrum leue, roseo colore, aut candido, in foramina dehiscens, perinde quasi spongiosum quiddam, quale ex Bunis adfertur. Humores euocat, qui in alto concreuerunt. Spuma nitri optima esse putatur leuissima, glebosa, friabilis, colore penè purpureo, aut spumosa, & mordens, qualis ex Philadelphia Lydia defertur. secunda est Aegyptia. quin & in Magnesia Caria gignitur. Vim, & uisionem salis habet, tam niterum, quam spuma eius. Præterea nitrum tormina sedat, si tritum cum cumino bibatur in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus, quæ inflationes discutere possunt, uel ruta, uel anetho. Febribus circuitu redeuntibus illinitur, ante suspectam accessionem. Miscetur cum plastris, quæ extrahunt, & discutiunt, extenuant, & lepras abstergunt. Cum aqua autem calida, aut uino infusum, inflationes, purulentas aures, & sonitus earundem sanat: sordes expurgat, cum aceto instillatum. Canum moribus ex asinino adipe, aut fœculo medetur. resina terebinthina admixtum furunculos aperit: aquæ inter cutem cum fico illinitur: oculis ad claritatem uisus cum melle succurrit: & uenenis fungorum, ex posca potum: aut si buprestis momorderit, ex aqua: ijs uerò qui taurinum sanguinem biberint, ex laserpitio: ijsque qui cibum non sentiunt, utiliter obducitur: opisthotonisque iam remissioribus, & luxatis cum cerato: in linguæ resolutione, pani commodè permiscetur. Aliqui supradicta carbonibus vrunt, subiecta prius testa noua, donec incandescant.

Nitri, &amp; spumæ Nitri consideratio.

NITRUM, & nitri spuma, quorum antiquis maximus fuit in medicamentis usus, diu sanè est, quod ad nos conuehi desierunt. Proinde hallucinantur, mea quidem sententia, qui putant Salnitrum uocatum, quo ad tormentorum bellicorum pulueres utuntur, & ad fortissimas aquas conficiendas, quibus argentarii fabri aurum ab argento separant, uerum ac legitimum esse nitrum, cuius meminere Theophrastus, Dioscorides, Galenus, Plinius, & antiquorum alij. Siquidem id manifestè demonstrat Plinius lib. x. cap. x. ubi de nitro ita scriptum reliquit. Non est differenda nitri natura, non multum à sale distans, & eò diligentius dicenda, quia palam est & medicos, qui de eo scripsere, ignorasse naturam, nec quenquam Theophrasto diligentius tradidisse. Exiguum sit apud Medos, canescentibus siccitate conuallibus, quod uocant halmirhaga. Minus etiam in Thracia iuxta Philippos, sordidum terra, quod appellant agrum. Nam quercu crenata, nunquam multum facitatum est, & iam pridem in totum omissum. Aquæ uerò nitrosæ pluribus locis reperiuntur: sed sine uiribus densandi. Optimum copiosumque, in Clytis Macedonia, quod uocant calastriacum, candidum, purumque, proximum sali. Lacus est nitrosus exiliente è medio dulci fonticulo. Ibi fit nitrum circa Canis ortum nouenis diebus, totidemque cessat, ac rursus innatat, & deinde cessat. Quo apparet soli naturam esse, quæ gignat: quoniam compertum est, nec soles proficere quicquam, cum cesset, nec imbres. Mirum est & illud, scilicet tebra fonticuli semper emicante, lacum nec augeri, nec effluere. Iis autem diebus, quibus gignitur, si fuere imbres, falsius nitrum faciunt, aquilones deterius, quia ualidius commouent limbum. Et hic quidem nascitur. In Aegypto autem conficitur multò abundantius, sed deterius: nam fuscum, lapidosumque est. Fit penè eodem modo, quo sal, nisi quod salinis mare infundunt, Nilum autem nitrarijs. Excedente Nilo siccantur, decedente madent succo nitri quadraginta diebus continuis, non (ut in Macedonia) statis. Si autem imbres adfuerint, minus de flumine addunt, statimque, ut densari



sari est ceptum, rapitur, ne resoluatur in nitrarijs. Sic quoq; olei natura interuenit. Ad scabiem animalium utilis. Ipsum autem conditum in acernis durat. Mirum in lacu Ascanio, & quibusdam circa Chalcidæ fontibus, summas aquas dulces esse, potariq; inferiores nitrosas. In nitro optimum, quod tenuissimum, & ideo spuma melior. Ad alia qua tantum sordidum, tanquam ad inficiendas purpuras, tincturasq; omnes. Magnus & nitro usus, qui dicitur suo loco. Nitraria egregia Aegyptijs: nam circa Maucratin, & Memphin tantum solebant esse. Circa Memphin detiores: nam & lapidescit ibi aceruis, multiq; sunt tumuli ea de causa saxei. Faciunt ex ijs uasa. Nec non frequenter liquatum cum sulfure coquentes in carbonibus. Ad ea quoq; quæ inueterari uolunt, illo nitro utuntur. Sunt ibi nitraria, in quibus & rufum exit à colore terræ. Spumam nitri, quæ maximè laudatur, antiqui negabāt fieri, nisi cum ros cecidisset, prægnantibus nitrarijs, sed nondum parientibus. Itaq; non fieri incitatis, etiamsi caderet. Alij operimentorum fermento gigni existimauere. Proxima ætas medicorum Aphronitrum tradidit in Asia colligi in speluncis mollibus distillans, specus eos Calycas uocant: dein sole siccant. Optimum putant Lydium. Probatio, ut sit minimè ponderosum, & maximè siabile, colore penè purpureo. hoc in paellis assertur. Aegyptium in uasis picatis ne liqueat. Vasa quoq; ea sole inarescentia perficiuntur. Nitri probatio, ut sit tenuissimum, & quàm maximè spongiosum, fistulosumq;. Adulteratur in Aegypto calce. Deprehenditur gustu: syncerum enim facile resoluitur, adulteratum pungit. Calce aspersum, reddit humorem uehementem. hæc Plinius. Ex quibus liquido constat, nostri usus Salnitrum, antiquorum nitrum non esse, etsi inficias eundem non sit, quin aliquas nitri habeat qualitates. Veruntamen nemini unquam persuasum uelim, ut medicamentis, quæ intus in corpus sumuntur, nitri loco Salnitrum absque noxa imponi possit. Et quauis contrarium asserant, scriptisq; tradant Monachi illi reuerendi, qui Mesuem commentati sunt; non tamen credo, hoc id prius in se ipsis expertos esse. Quod nihilominus eos facere decebat, si fraterna charitate ducti sunt, ut alijs suaderent salnitrum tuto assumi posse; cum prima charitas (quod dictum frequenter usurpant) incipiat à se ipso. Nitri meminit Galenus lib. ix. simplicium medicamentorum, sic inquit. Nitrum dictum est sua præ in medio esse aphronitri, & salis uirium; ceterum istum propius ad aphronitrum accedit, utpote exustione tenuius redditum. Desiccet itaq; & digerit: & si intro in corpus sumatur, secat, & extenuat crassos lentosq; succos potentius multo quàm sal. Aphronitrum uero nisi grauis urgeat necessitas, nemo deuorabit, nimirum inuicem stomacho: quandoquidem plus etiam litro incidit. Sanè ad fungos suffocantes, rusticus quidam eo uti assolet, & semper profuisse probatum est. Ceterum nitro usto, simul & non usto, & multo etiam magis eius spuma, & nos in talibus uti consueuimus. hæc Galenus. Qui tamen uidetur ijs, qui codicis mendam non animaduertunt, maximam facere differentiam inter Aphrolitrum, & Aphronitrum, licet hæc re diuersa non sint. Nam ubi de Aphrolitro libro citato differit, uulgata exemplaria habent. ἀφρόλιτρον ἀφρονίτρον διαφέρει. hoc est. Aphrolitrum ab aphronitro differt. Verum in altera dictione latet uitium, ut quæ ἀφρόνιτρον, hoc est, à spuma nitri, duabus uocibus legendasit. Ita fiet, ut Galeno non aphrolitrum ab aphronitro, sed utrunq; à spuma nitri aptè distinguatur. Id quod & Augustinus Ricchus Lucensis, & Leonardus Fuchsius, medici ætatis nostræ celebres, doctissime adnotarunt. Ceterum cum Galeno aphrolitrum, siue aphronitrum spuma nitri non sit, quid aliud sit, ingenue fateor me ignorare: neque id aliud, quod sciam, hæcenus explicauit. Quod Græci νίτρον, & λιτρόν, Latini Nitrum nominant: Mauritani, Baurach: Itali, Nitro. Quod uero Græcis ἀφρόλιτρον uno uerbo dicitur: Arabibus, Baurach Africe: Italis, Nitro di Africa. Quæ deinde Spuma nitri Latine, ἀπὸς τοῦ νίτρον Græcè uocatur: Arabicè, Aphronitrum.

Monachorū error.

Nitri, & aphronitri uires ex Gal.

Nomina.

## Fæx.

## Cap. XC.

ELIGENDA Fæx maximè à uino uetere, Italico: sin minus, ab alio consimili. Fæx aceti uiribus longè acrior est. Crematur, ut alcyonium, antè diligenter siccata. Sunt qui noua testa igni largo urant, usquedum penitus incendatur. Alii uiuis carbonibus fæcis glebam obruunt, & idem opus prosequuntur. Experimentum est legitimæ ustionis, ut acrio nitore inalbescat, linguamque tactu urere uideatur. Eadem urendæ fæcis aceti ratio. Vis ei supra modum urens, & abstergens. ulcera ad cicatricem perducit, adstringit, uehementer exest, siccaturque. Sed recenti utendum est, quoniam celeriter exanimatur: proinde non nisi in reconditorio, & uase aliquo reponi debet. Lauatur ut pontholyx. Quæ ustionem experta non est, tumores & per sese, & cum myrto cohibet. uentris, stomachique fluxiones illita sistit: muliebre profluuium imo uentri, aut genitalibus imposita mitigat: panchinos discutit nondum exulceratos & tubercula: rigentes mammas, sui que lactis impatientes, cum aceto peruncta extinguit. Cremata uero, unguens scabros cum resina auferit. Addito lentiscino oleo, illita nocte tota, rufat capillum. Elota oculorum medicamentis, ut spodos, adijcitur: cicatrices eorum, & caligines eadem abstergit.

FÆX uini uulgaris notitiæ est, quin & ipsius adurendæ ratio nota, ijs præsertim, qui ex hac alumen, quod uocant fæcis, conficiunt. Porro uini recrementum, quod uinarijs cadis agglutinatum, crustæ lapidosæ instar inuenitur, officinarum uocabulo Tartarum uocatum, aluum non obscure subducit. Proinde nō desunt, qui sibi adstrictum aluum citè, hausto tartari puluere ex gallinæ uero iure addito mastice momento, & saccharo: nihil enim incommodi adfert hac ratione paratum. Additum in deiectoria diluta, quæ ex sena, uel polypodij radicibus, uel epithymo paratur, uim eorum deiectoriam adauget. Sunt qui album Tartarum faciunt, diu ipsum in aqua decoquentes, atque subinde despumantes. Τρῶς sic Græcè, Latine uero Fæx dicitur: Arabicè, Durdi: Italicè, Feccia: Germanicè, Heusen. & Vucstein: Hispanicè, Rasura de uino.

Fæcis, & tartari dicti consid. & uires.

Nomina.



## Calx uiua.

## Cap. XCI.

**CALX** uiua hoc modo fit. Marinorum buccinorum testas igni condito, aut feruenti clibano, nocte dimitto: postera die, si candidissimæ fuerint, extrahito: sin aliter, iterum urito, usque uel uoluntate in albuerint. Dein ubi in aquam frigidam demersæ fuerint, in fictile nouum coniecit, & exacte pannis operiens, noctem unam conuiescere finito: mane eam extrahens, ubi perfecto opere elaborata fuerit calx, recondito. Fit & è litoralibus calculis igne crematis, necnon è uili, & fusaneo marmore, quæ cæteris præfertur. Vis omni calci in commune ignea, mordens, adurens, & crustas inducens: quibusdam alijs immista, ut adipi, oleo, concoquendi uim assumit, molli, & dissipa- 10

Calcis consi-  
deratio.

**CALX**, cuius passim usus ad ædificiorum muros struendos, nota omnibus est. Præter hanc fit etiam priuatim ad uaria medicamenta è purpurarum, buccinorum, cochlearum, ostreorum, ouorumq; testis. Non desunt tamē, qui etiam eam, quæ fit ex calcario lapide, unguentis, & emplastris admisceant, eam primum demergentes in aquam, usque dum prorsus dissiliat, ac subinde lauantes diebus pluribus, affusa sæpius recenti aqua pluuiali, uel fontana. Valet enim sic elota ad contumacia ulcera, quod absq; morfu ualenter siccet. Ob id itaq; unguentis expetitur, quibus utitur ad pudendorum ulcera, eaq; præsertim, quæ uenerea lue contrahuntur. Quinetiam prodest ad ambusta, & alia, quæ non facili curationem admittunt. Sunt etiam qui extinctam prius calcem, lauent deinde diutius rosarum stillatitia aqua, ita ualentius effici medicamentum existimantes. Calcis uires descripsit Galenus lib. 1x. simplicium medicamentorum, his uerbis, Calx, uiua quidem, quæ ἀσβεστος Græcè dicitur, uehementer urit, adeo ut crustam efficiat: extincta uero, protinus etiam crustam molitur & ipsa: at post diem unum, aut alterum minus urit, minusq; inducere crustam potest. At uero temporis progressu prorsum nec crustam quidem gignit. tametsi etiamnum calfaciat, carnemq; liquet. Porro si lauetur in aqua, suam mordacitatem exuit, efficitq; nuncupatam xoviv, hoc est lixiuium: at ipsa absque morfu resiccat. Ac si bis, terq; aut amplius abluta fuerit, plane mordacitatis expers consistit ac strenue absque mordacitate exiccat. Calx uiua Latinis dicta, ἀσβεστος Græcis appellatur: Arabibus, Horach, Nura, seu Nure: Italis, Calcina uiua: Germanis, Vngeleschter, & Kalk: Hispanis, Cal.

Calcis uires  
ex Gal.

Nomina.

## Gypsum.

## Cap. XCII.

**GYP S V M** uim habet adstringendi, obstruendi: sanguinis eruptiones, sudoresque cohibet. sed potum, strangulationis modo iugulat.

Cypsi histo-  
ria.

**GYP S V M** quid sit, nemo est qui nesciat. Abundat gypso uniuersa fere Hetruria, ibique commodè frequenterq; expetitur cementarijs ad ædiū fabricas. Fit gypsum è quodam candido lapide, in laminas facile scissili: qui tamē non longa ignium ui torretur, & excoquitur. Quandoquidem in calenti furno coniectus, quatuor, aut ad summum quinque horarum spatio perurit. Tunditur deinde in puluerem, & incerniculis excutitur. Præstantissimum est recens: nam diu asseruatum, aqua immixtum ægrè lapidescit, ac coit. Fit etiam Gypsum è speculari lapide, qui Græcis σελανίτης dicitur. Item ex alio quodam lapide niuei candoris, è quo in Hetruria torno patinæ, & alia uasorum genera conficiuntur. Hunc alabastrū appellant, sed perperam. Gypso uires reddidit Galenus lib. 1x. simplicium medicamentorum, ita differens. Gypsum & ipsum ad communem omnium terrenorum, lapidosorumq; corporum facultatem, qua desiccare dicta sunt, insuper hoc adiunctum habet, quod est facultatis emplasticæ. Vnitur enim ipsum ad sese, & cogitur, lapidescitq; maceratum: Quamobrem sicis medicamentis, quæ ad sanguinis eruptionem accommodantur, commiscetur. Nam ipsum per sese lapidosum fit, & durum coactum, ac congelatum. proinde rigare, diluereq; illud excogitauit, tenui alboq; oui liquore, quod ad ophtalmias utile est, admisto quod in farina triticea est puluilli tenuissimi, qui in parietibus molendinorum residet. Excipere uero, quod sic subactum est tenellis leporis pilis, aut qui perinde sunt molles, expedit. Gypsum combustum non æquè emplasticam uim habet: cæterum temiorum est partium, & ualentius desiccet. Quin & percussorium est, maxime si maceretur oxycrato. Tούτος ita Græcis, ut Gypsum pariter Latinis appellatur: Arabibus, Gepsim, seu Giepsin: Italis, Gesso: Germanis, Gyps: Hispanis, Yeso, & Alges.

Gypsi uires  
ex Gal.

Nomina.

## Sarmentitius cinis.

## Cap. XCIII.

**SARMENTORVM** cinis urendi uim habet: cum axungia autem, uel oleo illitus, fractis neruis, articulorum collisionibus, & neruorum nodis prodest: cum nitro, & aceto excrescentias carnis in seroto reprimat. Serpentium, canumq; moribus illitus ex aceto medetur. crustas obducen- 60



CINIS omnis quid sit notius est, quàm ut pluribus explicari debeat. Quare ad eius vires properemus: de quibus in uniuersum differens Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Cinis combustorum lignorum reliquæ sic nuncupantur, compositæ ex contrarijs tum qualitatibus, tum substantijs. Habet enim in se partim terrenum, partim uelut fuliginosum, quod Græcè dicitur atbalodes, siue bygniodes, siue quomodocunque quis appellare uolet: atque hæc sanè partes sunt tennes, & quæ maceratis aqua cineribus, & percolatis, unâ asportantur, atque abeunt. Quod uerò reliquum est, terrenum est, infirmum, & morsu carens, calida facultate in lixiuium deposita. Sed non omnis cinis eadem temperatura præditus est, sed pro combustæ materiæ diuersitate uariatur. At nescio quo pacto Dioscorides omnes cineres adstringendi habere uim prodiderit, cum ficulneus eiusmodi omnis qualitatis sit expers, utpote cum & ipsa arbor nulla sui parte acerbam qualitatem præferat, ceu quercus, ilex, arbutus, fagus, lentiscus, hedera, & hoc genus alia: uerùm plena succo ualido tota sit, eoq; acri & calido. Ergo ex acerbis utique lignis factus cinis, non parum adstringit: meminiquè, me quandoque, cum aliud ad manum non esset medicamen, per hunc sanguinis suppressisse eruptionem. Verum nullus unquam ad tale uti ficulneo audeat. Siquidem hic acrimoniæ multum, adurentisq; facultatis obtinet, mista absterfioni: & utroq; differt ab eo, qui ex quercinis lignis conficitur, tum quod in eo fuliginem multo est acrius, tum quod in illis terrenum quodammodo subadstringens est, in hoc abstergens, uelut in cinere tithimalorum. Est & calx cineris quædam species, ceterum tenuioris essentia, quàm qui ex lignis fit: nimirum quanto lapides exactius torrerentur, ut cinis fiant, postulant: non tamen multum reliquum in se habet, uelut nature ignea, quod uocant ἐμπύρευμα. Proinde elota medicamen est citra morsum desiccans, magisq; si bis terue lauetur. Ceterum si marina aqua abluta sit, admodum digerit. Dicitur porro de ea, ubi de metallicis sermo habetur. Τέσσα Græcè dicta, Cinis Latine uocatur: Arabicè, Chamad, siue Ramed: Italicè, Cenere: Germanicè, Aeschen: Hispanicè, Ceniza: Gallicè, Cendre.

Cineris omnis vires ex Galeno.

Nomina.

## Alcyonium.

## Cap. XCIII.

ALCYONII quinque esse genera compertum est. Vnum enim spissum, acerbi saporis, spongiosa facie, item terti odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plurimum in litoribus inuenitur. Alterum pinnulæ oculorum, aut spongiæ simile, fistulosum, & leue, odorem algæ referens. Tertium uermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Milesium quidam uocant. Quartum succidis uelleribus non dissimile, multis inanitatibus hians, leue. Quintum figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodammodo pumicosum, foris læue, acre, quod plurimum in Proponide iuxta insulam Besbicon adpellatam gignitur, patrio nomine halos achnen uocant. Duo priora in foeminarum smegmata assumuntur, contra lentigines, lichenas, lepras, uutiligines, nigritias, & maculas in facie, reliquoque corpore. Tertium ijs, qui difficili urina uexantur, aut arenulas in uesica colligunt, idoneum est: item renibus affectis, aquæ inter cutem, leni. Vltimum autem, & ex uino illitum, alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est. in alia smegmata, psilothraque assumitur, cum sale mistum. Si quisquam alcyonium cremare uelit, cum sale in crudum fictile mittat, & oblinens uasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum figlinum percoctum fuerit, extrahens ad usus recondat. Lauatur ut cadmia.

ALCYONIVM (ut Plinius est auctor lib. XXXII. cap. VIII.) fit in mari ex uidis, ut aliqui existimant. Alcyonii historia, & consideratio. Alcyonium, & cæcum: alij ex sordibus spumarum crassescens: alij è limo, uel quadam maris lanugine. Quatuor eius genera. Cinereum, spissum, odoris asperi. Alterum molle, lenius, odore fere algæ. Tertium candidioris uermiculi. Quartum pumicosius, spongiæ putri simile, penè purpureum: quod optimum, hoc & Milesium uocatur. Quotum candidius hoc minus probabile est. hæc Plinius. Qui tamen quintum fungi figura, cuius meminere Dioscorides, & Galenus, silentio præterijt. Sunt præterea, qui Alcyonium ita appellari tradant, non quod ex alcyonium natus, sed quod alcyones super illud marinis undis simul congestum nidificent. Quorum sententiâ dis fiat, ut Plinius scribit, sed quod alcyones super illud marinis undis simul congestum nidificent. Quorum sententiâ magis probandam censemus. Alcyonium officinæ spumam maris uocant: quod sic idem uocent Arabes, Dioscoridæ secuti. quippe qui scripserit quintum Alcyonij genus in Besbico halos achnen, hoc est, maris spumam uocari. Ceterum rufum Alcyonium corallij instar, coaceruatis in globum ueluti uermiculis, lapidosaq; materie, Venetijs primum uidimus. Quartum uerò reperimus copiosum in Tergestino litore uelleribus simillimum, album, ac lenissimum. Pisciatores hoc cochlearum marinarum, quæ aculeis rigent, & uulgo appellantur Garuse, nidum esse affirmant.

Alcyonii historia, & consideratio.

Primum, & ultimum genus pluribus in seplasijs inuenitur. Porro in hoc capite in uulgatis Dioscoridis exemplaribus nonnulla (ut planè suspicor) uerba desiderantur, cum de uiribus quarti alcyonij nihil ijs scriptum legatur. Augest suspensionem Oribasijs, cuius lectio hoc habet. πρὸ δὲ τέταρτον, ἡ ὕστατον, hoc est. Quartum, & postremum & c. Idem confirmat Serapio, qui ex Dioscoride transcribens utriusque speciei meminit. De Alcyonijs differuit Galenus lib. XI. simplicium medicamentorum, hic uerbis. Alcyonia omnia detergunt, ac digerunt, qualitatem habentia acrem, & calidam facultatem: uerùm aliud alio non parum plus minusq; & in his ipsis, quæ diximus, secundum partium essentia totius tenuitatem. Est autem eorum unum densum, & graue, odoris prani: olet enim pisces putres, spongiæ in specie simile. Secundum uerò aliud figura longiore, leue, & rarum: odorem habens similem phycijs. Aliud tertium uermi simile est specie, colore purpureo, consistentia molli: uocant id Milesium. Post quæ quartum secundo quidem iam posito similiter & leue, & rarum, uerùm lanis succidis simile. Denique & quintum extrema superficie leui, ceterum interna substantia asperum, nullius odoris, gustu tamen apparens acre: & sanè omnium

Locus Dioscoridis suspectus.

Alcyonij vires ex Gal.



omnium alcyoniorum est calidissimum, adeo ut & pilos urere possit. Itaque cum duo prima lichenas, alphas, psoras, leprasque adiungunt, præterea cutem splendidiorem competentia uirium efficiant, idem præstare non potest hoc ultimo loco positum. Nec enim perinde ut illa, cutem duntaxat summam extergit, sed etiam excoriat, usque in profundum cutis penetrans, ut etiam ulcera moliatur. Porro quod tertio ordine recensuimus, omnium est tenuissimum. Itaqueustum alopecias curat illitum cum uino, colore quidem fuluo, tenui tamen essentia. Quartum autem eiusdem cum hoc speciei uires obtinet, uerum haud parum imbecilliores. Quod Græci ἀλκυόνιον, Latini quoque Alcyonium dicunt: Arabes, Zebothalbabar, seu Zebd albhbar: Itali, Alecionio.

Nomina.

## Adarces.

## Cap. XCV.

Fit in Cappadocia, quod adarces appellatur. Est autem tanquam concreta falsilago, humidis & palustribus locis siccitate emergens, & harundinibus, ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Asij similis, & omni forma molli alcyonio, & aliquantum cauo proxima, ut uideri possit lacustre alcyonium. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & uitia cutis in facie, similia, accommodatur. Et in summa uis ei acris. Humorem euocat, qui in alto concreuit, & ischiadicis prodest.

Adarces consideratio.

LEGITIMAM Adarcem, quæ Dioscoridis, & Plinij placitis respondeat, hactenus non uidimus, et si in Italia nasci tradidit Plinius lib. xvi. cap. xxxvi. Quam postea lib. xxxii. cap. xii. uocauit calamochnum, sic inquit. Inter aquatilia dici debet & calamochnum, Latine adarca appellata. Nasceitur circa arundines tenues, & spuma aquæ dulcis, ac marinæ, ubi se miscent. Vim habet causticam, ideo acopis additur contra perfrictionum uitia. hactenus Plinius. Porro uero eos hallucinari crediderim, qui sibi persuadent id esse Adarcem, quod uulgo Italis dicitur Palla marina. Siquidem hæc in mari tantum nascitur, non in paludibus aquæ dulcis: & ibi non arundinibus, neque herbis inherens uisitur, sed in sicco reperitur litore, undis simul cum alga proiecta, pile omnino similis, quæ in lætentium hedorum uentriculis, ex exuctis una cum lacte pilis, plerumque reperitur. Adde quod hæc, quantum gustauimus, nec acris, nec caustica (ut Plinius inquit) deprehendatur: neque etiam, quod sciam, in paludibus inueniatur. Huius tamen meminit Galenus libro primo de compositione medicamentorum secundum locos, referens quæ Crito ad conseruandos, augendos, itemque a defluuiis præseruandos capillos scripsit. Vbi cum interpres Cornarius uir alioqui doctissimus, ignorasset quid Critoni, & Galeno intelligeretur per σφακιαν θαλασσίαν, forte suspicatus, locum hunc in Galeno esse deprauatum, spongiæ marinæ perperam interpretatus est: quandoquidem lectio illa uera est, & uertendum erat pilam marinam. Id quod etiam Fuchsius doctissime adnotauit in suis de compositione medicamentorum libris. Marinam pilam addit Nicolaus Myrepsicus in quodam unguento ad lumbricos, ubi sic habet. Pile marinæ, quæ reperitur in mari rotunda, ut lana congesta. Cæterum Adarces uires retulit Galenus lib. xi. de simplicium medicamentorum facultatibus, ita scribens. Adarcion aliqui masculino genere adarcon, alij foeminino adarcen dicunt, essentia quidem sua uelut spuma est aquæ salis concreta, circa arundines, & farragines concreta. Acerum hoc est, simulque calidissimum medicamentum. proinde & per se utile est, uerum commiscetur ijs, quæ uim eius retundunt, itaque sit admodum utile in ijs affectibus, qui ex caliditate postulant. idque foris impositum, nam intro in corpus ipsum sumere est impossibile, nimirum ob uirium uehementiam. hæc Galenus. Ex quibus liquidò apparet, Adarcium a marina sphaera plurimum facie, & uiribus differre. Id Græcis ἀδάρκιον & ἀδάρκειον uocatur, quod Latine item Adarces: Arabibus, Adarchi, Atharachi, seu Adaraca, Italis, Adarce.

Cornarij lapsus.

Adarces uires ex Gal.

Nomina.

## Spongiæ.

## Cap. XCVI.

ESPONGIIS alias mares appellauere, tenui fistula, spissas: quarum duriores tragos nominarunt. Fœminas autem, quæ contrarias dotes habent. Vruntur eæ, ut alcyonium. Recentes sine pinguitudine uulnerariæ sunt, & tumores reprimunt. recentia uulnera ex aqua poscæue conglutinant: ueteris sinus ex decocto melle iungunt. Vetusæ autem inutiles. Aridæ ligatæ lino, si penicilli modo adigantur, occlusa ulcera, callosque laxant. Siccæ recentes, & uacuæ, senilia ulcera, & que fluxione laborant, aut cuniculati exedunt, impositu siccant. sanguinis profluuium sistunt. Crematarum cinis ex aceto, aridæ lippitudini auxiliatur: & ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Utilius in oculorum medicamentis lauare cinerem. Omnium cinis cum pice crematarum, profluentem sanguinem sistit. Candidæ cura sunt, & mollissimis recentes per æstus tinctæ salis spuma, quæ petris cohæret: insolantur innersæ, hoc est, parte cana sursum spectante, & qua abscissæ fuerunt, deorsum. Si uero æstiuâ serenitate ad lunam sternantur, perfusæ salis spuma, aut maris aqua, maximum candelam referent.

Spongiarum historia ex Aristotele.

SPONGIARVM genus (inquit Aristoteles lib. v. cap. xvi. de historia animalium) triplex statuitur: nam aliæ raræ, aliæ spissæ, aliæ quas nominant achilleas. Tenuissimum genus id tertium est, & spississimum, & ualidissimum, quod galeis ocreisque inseritur, eoque minus ciere strepitum posse notatum est. genus hoc inuentu perquam rarum est. Quæ autem in genere illo spisso præduræ sunt, atque asperæ, nomine hirci nuncupantur. Quæ quidam omnes aut ad saxa nascuntur, aut iuxta litus, lutoque aluntur. Cuius rei argumentum est, quod captæ limo refertæ omnes cernuntur. quod certe indicat cæteris quoque adherentibus cibum per ipsum adnexum hauriri. Imbecilliores propterea

10

20

30

40

50

60



propterea sunt spissæ, quàm raræ: quia minus albo radicis hæsu innituntur. Sensus etiam spongijs esse aiunt: argu-  
mento quòd ad cuulsoris accessum contrahuntur, ita ut euelli difficile sit. quod idem etiam faciunt, quoties flatus,  
tempestasq; urget, ne sua de sede pellantur. Sed sunt, qui de hoc dubitent, ut qui Toronā incolunt. Narrant tamen  
procul dubio bestiolas quasdam uelut tineas, lumbricòsue, & eiusmodi alias consistere intra spongas, atq; ali: quas  
& euulsis spongijs, pisciculi saxatiles deuorent, qui nel radices absument totas, quæ inherentes saxi remanserint.  
Si euenierit fortè, ut spongia abrumpatur, residuo item renascitur, & completur. Magnitudine amplissima soluta ille,  
& rare spongia, augentur plurimæ, quæ circa Lyciam sunt. Sed mollissimæ quæ spissæ: nam achilleæ torosiores ijs  
constant. Omnino quæ altis, tranquillisq; insunt gurgitibus, mollissimæ sunt: flatus enim, ac tempestates spongas  
quoque, ut cætera altitia reddunt duriores, & incrementum impediunt. Quamobrem spongia Hellesponti spissæ, ac  
duræ sunt, & omnino quas mare ultra Maleam promontorium, citraq; refert. Differunt inter se mollitie, duritiæq;  
nec calorem immodicum spongiæ patiuntur: fit enim eo, ut more pullulantium putrescant. Quocirca optimæ iuxta  
oras comperiuntur spongiæ, si gurgite alto demersæ sunt: commodè enim temperatur propter altitudinem gurgitis.  
Color illotis, uinisq; nigricans est. Adherent nec parte, nec toto: intersunt enim fistulæ quædam inanes, sed pluribus  
passim particulis besitant, & quasi membrana extenta subesse radicibus earum uidetur. Superne autem cæteri mea-  
tus concreti propemodum latent: at uerò quaterni, aut quini patent, per quos pasci existimantur. Hactenus de spon-  
gijs Aristoteles. Cui quidem Plinius suam de spongijs historiam acceptam referre potest, quam libro IX. cap. LXV.  
scriptis tradidit. Spongiarum uires memorie prodidit Galenus lib. XI. simplicium medicament. his uerbis. Spongia  
usta acris est, & digerentis potentie. Vtebatur ea præceptorum meorum quidam ad sanguinis eruptiones, quæ ma-  
nuali opera indigent. In quem usum semper eam paratam habebat siccam, & exarefactam: cum uerò res posceret:  
bitumine in primis imbuebat, sin eo careret, pice. Porro admouebat eam partibus sanguine profluentibus etiamnum  
aridentem, ut & crusta parti induceretur, & ipsum spongiæ ustæ corpus, cum operculum quoddam acciperet. Cæ-  
terum spongia ipsa noua per se, non sicut lana, aut linamentum (quod ποτὸν τιπτόν, id est, carpinatum uocant)  
terrum duntaxat est, quæ humores infundendos excipiat, sed etiam manifestè desiccet. Id quod scies, si ea sola utaris  
materia duntaxat est, quæ humores infundendos excipiat, sed etiam manifestè desiccet. Id quod scies, si ea sola utaris  
in uulnere, cum aqua, aut oxycrato, aut uino, pro diuersitate uidelicet corporum, uti est antè dictum. Glutinetur si-  
quidem ea similiter atque medicamenta, quæ uocant enema. At si non noua sit, sed usui accommodata, palam cogno-  
scas, quantum à noua superetur, siue uulneribus eam imponas, siue aqua proluens, siue oxycrato, siue uino. Nec mi-  
nus est, cum in spongia noua seruetur etiamnum ea, quam à mari accepit, facultas modicè corpora exiccandi. Atq;  
hæc quidem præstare potest. cum etiamnum seruat maris odorem. Nam temporis spatium, etiam si nunquam usui ac-  
commodata sit; tamen & odorem maris amittit, neque æquè desiccare potest. Spongia quæ Latine, σπόγγος  
Græcè dicitur: Arabicè, Asfengi albairi, seu albar: Italice, Spogna: Germanice, Badschuuam: Hispanicè, Spon-  
gia: Gallicè, Esponge.

Spongiarum  
uires ex Gal.

Nomina.

## Corallium.

## Cap. XCVII.

CORALLIVM, quod aliqui lithodendron appellant, marinum esse fruticem constat, qui  
alto extractus duratur statim atq; emergit, tanquam offuso acre protinus concrescat. Plurimum in-  
uenitur ad Syracusas, in promontorio, cui Pachyno nomen est. Laudatissimum rubens, colore an-  
therici, aut sandycis saturatæ, nec secus terenti facilè cedens, æquabili usquequaque concremento,  
rursus algæ, aut phuci marini odore, quàm ramosissimum, forma fruticis, cinnamomi æmulum.  
Quod autem in lapidis duritiam coit, scrupulosum, inane, & lacunosum, uitiosum existimatur. Ad-  
stringit, & refrigerat mediocriter: excrescentia coercet: oculorum cicatrices abstergit: ulcerum ca-  
ua, & cicatrices explet. Contra sanguinis reiectiones magnopere efficax est: urinæ difficultati auxi-  
liatur. quin & potum ex aqua lienem absumit. Quod antipathes uocant, corallium esse arbitran-  
tur, specie tantum distans. Est autem colore nigro, arboris figura, ramosum magis. Vires supra-  
dicti habet.

CORALLIVM, quo usque adeò abundat Italia, ut ferè ulli ibi reperiantur infantuli, nullæq; puellæ, qui-  
bus non gestentur Corallij monilia aut collo, aut brachijs suspensa, quo item utuntur fœminæ in templis ad suas pre-  
ces numerandas, ex Tyrrheno, & Siculo mari extrahitur, atq; inde ad nos deferitur. Cæterum etsi rubri tantum, &  
nigri meminerit Dioscorides; reperitur tamè quod uinci sit candoris in iisdem pelagis, non autem ut rubrum compa-  
rati, ponderosumq; sed lenius ac rarius, & spongiarum modo inane. Creditur hoc rubro lōgè magis refrigerare: pro-  
inde eo utuntur medici, ubi opus est maiore refrigeratione. Corallij meminit Plinius lib. XXXII. cap. II. ubi de  
eo ita scriptum reliquit. Quantum apud nos Indicis margaritis pretium est, tantum apud Indos in Corallio: uanque  
ista persuasione gentium constant. Gignitur quidem & in rubro mari, sed nigrius. In Persico uocatur Iace. Landa-  
tissimum in Gallico sinu, circa Stæchadas insulas, & in Siculo, circa Heliam, & Drepanum. Nascitur & apud Græ-  
uiscas, & ante Neapolin Capaniæ maximeq; rubens, sed molle, & ideo uilissimum Erythris. Forma est ei fruticis,  
color uiridis. Baccæ eius candidæ sub aqua, & molles. exemptæ confestim durantur, & rubescunt, quasi corna sa-  
tina, specie, atq; magnitudine. Aiunt tactu protinus lapidescere, si uiuat. Itaq; occupari, euelliq; retibus, aut acri  
ferramento præcidi. hæc de causa corallium uocatum interpretantur. Probatissimū quàm maximè rubens, & quàm  
ramosissimum. nec scabrosum, aut lapideum, uel rursus inane, aut concauum. Auctoritas baccarum eius non minus  
Indorum uiris quoq; pretiosa est, quàm fœminis nostris uniones Indici. Aruspices eorum, uatesq; in primis religio-  
sum

Coralli con-  
sideratio.



Plinij lapsus.

sum id gestamen amolendis periculis arbitrantur. Itaq; & decore, & religione gaudent. Galli gladios, scuta, gleas adornabant eo. nunc tanta penuria est uendibili merce, ut perquam raro cernatur in suo orbe. Surculi infantie adalligati, tutelam habere creduntur. hæc Plinius. Quæ tamen mirari subit, quod tam facile sibi persuaserit, corallium per se baccas ferre, quasi corna satiuæ specie atq; magnitudine, perinde ac ceteræ arbores suos proferunt fructus. Quandoquidem, ut fatentur ij, qui corallia expiscantur, & in ijs mercaturam exercent, nullas per se baccas edunt. Baccæ enim, quæ in coralliorum monilibus cornis, ac cerasis similes uisuntur; ex ipsorum truncis tornantur, & lima prius parantur: mox smyridis lapidis puluere, & terra quadam, quæ è Tripoli Africæ adfertur, expoliantur, & lucidum leuorem contrahunt, cum ijs diutius fricantur. Ad hæc Corallia è mari circumquaque muscosa eximuntur, nec tunc ulla ex parte rubescunt, uerum inde artificibus tradita, derafo cortice rubent, & perpolita nitescunt. Nigrum Corallium, quod Dioscorides Antiphathes uocari ait, primum uidi ego Neapoli eburnum colore referens. Corallium comitialibus commodè adalligatur, hauriendumq; præbetur. Corallium ædes (ut aiunt) à fulminum iniuria tuetur. Idem mensium abundantiam cohibet, dentes commotos firmat, desquamatas gingiuas emendat, itemq; oris ulcera sanat. Potum dysentericos iuuat, seminis profluuium in uiris, nocturnasq; pollutiones, & in mulieribus albos uteri fluores reprimat. Recensetur inter ea (Auicenna teste) quæ cordi bilaritatem adferunt. Auxiliatur præterea (ut Plinius inquit) contra torminum ac uesticæ calculi mala in puluerem igne redactum, & cum aqua potum. Simili modo ex uino potum, aut si febris sit, ex aqua somnum conciliat. ignibus diu repugnat. Sed eodem medicamine sæpius poto, tradunt lienem quoque absumi. Sanguinem reijcientibus aut excreantibus medetur. Cinis eius miscetur oculorum medicamentis, spissat enim ac refrigerat, ulcera caua explet, cicatricesq; extenuat. Corallij meminisse Galenum in libris legitimis de simplicium medicamentorum facultatibus, hætenus non reperi: tamen si libro septimo de compositione medicamentorum plura describat medicamenta ad incipientem phthisin, hæmopticos, & suppuratos, quæ corallium excipiunt: Quod Græci κοράλλιον, & λιθόδεσπον, Latini Corallium nominant: Mauritanii, Bassad, Mergen, Besd, siue Morgian: Itali atq; etiam Hispani, Corallo: Germani, Coraln: Galli, Coral.

Corallii facultates.

Nomina.

## Lapis phrygius.

## Cap. XCVIII.

PHRYGIUS lapis, quo infectores in Phrygia utuntur, à qua nomen accepit, nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modicè grauis, non solida corporis compage, intercedentibus albis segmentis, ut in cadmia. Vritur autem uino optimo perfusus, uiuisque carbonibus obrutus: perflatur assiduè follibus, donec mutato colore rufescat: rursus extractus eodem uino restinguitur. Hoc iterum, & trinis uicibus faciendum: attendendum tamen ne minutim confringatur, & in fuliginem euanescat. Vis crudo, ultoq; adstrictoria, expurgans: ulceribus crustas quadantenus inducit. ambustis cum cerato medetur. Lauatur, ut cadmia.

Phrygii lapidis confid.

Phrygii lapidis uires ex Galeno.

Qui mihi Phrygium lapidem ostenderit in Italia, hætenus neminem inueni. quippe cum nec nostratibus medicis, nec lanarum infectoribus, ullo sit usui, ex Cappadocia ad nos deferri desijt. Plinius, cum ignorasset, Phrygium lapidem medicamentis etiãnum expeti, tingendis tantum uestibus commendauit. De huius lapidis uiribus disseruit Galenus lib. 11. simplicium medicamentorum, his uerbis. Pyritæ facultatem habere existimatur & Phrygius, quem uocant. Sed eo semper utor combusto quidem ad ulcera putrida, idq; aut ipso per se, aut ex aceto, aut ceno melite, aut oxyerato: ad oculos uerò medicamentum siccum efficiens: quod multi nunc acceptum à me obtinēt. Miscentur ei & alia quæpiam. Dicitur autem de ipso in opere de componendis pharmaciis. Nunc satis est de generali eius facultate explicuisse: ualidè enim desiccatur, habens quiddam adstrictionis, simul & mordicationis. Dicitur uerò superius est, ea esse omnia optima medicamina, plurimiq; usus, quæ mistas in sese hæc duas facultates habent, nempe percutientem, & digerentem. Alios ἐφρύγιος Græcis, Lapis Phrygius Latinis appellatur: Italis, Pietra Phrigia.

Nomina.

## Lapis asius.

## Cap. XCIX.

ASIUS lapis assumi debet pumicis colore, leuis, fungosus, item friabilis, scissiles uenas lutei coloris ad imum actas habens. Eius flos falsugo subflaua est, summo lapide insidens, compage tenui, colore in aliquibus albo, in aliis pumici simili, ad luteum uergente: admotus linguæ aliquantum mordet. Vim habet uterque adstrictoria, & modicè erodentem. admixtus liquidæ pici, aut terebinthinæ, tubercula discutit. Longè ualidior flos existimatur. De cætero siccatus flos uetera ulcera, & cicatrici repugnantia sanat. excrecentia cohibet: tetra ulcera, & fungis similia, cum melle expurgat: ulcerum caua explet, & expurgat cum melle: depascentiaque cum cerato fistit. Fit cataplasma ex eo podagris, misto fabæ lomento: & lienosis ex aceto, & uiua calce. Prodest flos ex melle phthisicis linctus. Podagrici iuuantur: pedibus in folio ex eo lapide excauato inditis. Fiunt quoque ex eo loculi, qui corpora erodunt: & luxuriantem carnem, & corporum crassitiem absumunt, cum uice nitri in balneo sparguntur. Si lauare libet, cadmiæ modo lauatur.

Asii lapidis confid.

TAMETSI in commentarijs nostris superioribus annis Italica lingua conscriptis, Asium lapidem mihi innotuit esse ingenue confessus fuerim; legitimum tamè nuper Tridento ad me misit Martinus Guidottinus seplasiarius diligens



diligens æquè ac peritus : qui quidem lapis, ui fallor, nullis prorsus notis ac uiribus Dioscoridis descriptioni reclinat. Foditur in Tridentino agro quibusdam chalcantibi fodinis, quodam in monte non procul à pago, quem Leuigum nominant. Est enim hic pumicis instar leuis, fungosus, friabilis, lutei coloris intercurfantibus uenis. Hoc, quod carnes absumat, utebatur antiquitas ad defunctorum sepulcra, ut absumptis ab eo carnibus, corpora non computrescerent : ob idq; Græci appellauere sarcophagum. Quod manifestè declarat Dioscorides, cum inquit, *καὶ σαρφὰ σαφὰ* *καὶ σαρφὰ σαφὰ*, id est, loculi defunctorum carnes absumentes ex eo fiunt. Hunc locum nullus, quod sciam, ex interpretibus ita ut nos accepit : sed omnes ad aliud respicientes uocem *σαρφὰ* puluerem uerterunt. In quo mihi plaue nou uidentur mentem Dioscoridis affecuti. Quam probè affecutus, nostræq; sententiæ adstipulari cognoscitur Plinius lib. x. xxvi. cap. xvii. ubi de lapide Asio sarcophago ita scribit. In Asio Troadis lapis sarcophagus fisisili uena scinditur. Corpora defunctorum condita in eo absumi constat intra quadragesimum diem, exceptis dentibus. hæc Plinius. Cæterum Asij lapidis historiam, & uires descripsit Galenus lib. ix. simplicium medicamentorum, sic inquit. Est & alius lapis in Asio proueniens, quem ob id ipsum Asion cognominant, non durus ut petra. Siquidem color illi est, pariterq; consistentia ceu topbi, friabilis, & laxus. Innutritur ei quiddam farine tenuissimæ adsimile, qualis in pistrinarum parietibus adherere uisitur. Appellatur hoc medicamentum petra Asia florem. Est uero & subtilium partium, ut sine morsu nimis molles carnes, ac fluidas cliquet. Petra uero, in qua nascitur, tamen si uinum habeat illi similem, actionis tamen uehementia inferior est. Hoc enim ea potior est flos, non tantum quod magis colliquet, ac digeratur, & uelut sale condita scruet; sed & quia hæc præstet absq; uehementi mordicatione. Habet & salsedinem quandam in gustu hic Asia petra flos : ut coniectura sit, illum nasci ex eo quod ros ex mari in petram residens, postea sole desiccetur. hæcenus Galeui uerba. Quæ quidem si paulò diligentius examinasset Fuchsius medicus alioqui nostræ ætatis celebris, non tam facillè fortasse suam protulisset sententiam libro de compositione medicamentorum : quod scilicet Asia petra flos sit illa mollis, alba, & tenuissima materia, quam parietibus molarum inhæret, similem exudant ueteres muri, rupes, saxaq; montium : ex qua fit quod Salnitrum uocant. Porro quod hæc non uerè sit Asij lapidis flos, omnibus ijs perspicuum fiet, qui rem hanc accuratius expendent. Nam præterquam quod ea diuersorum lapidum flos est, nullam habet cognationem cum Asio lapide. qui solus, Dioscoridis & Galeni testimonio, florem sui nominis gignit. Lapis, qui *λίθος ἄσσιος* & *ἄσσιος* Græcè, Lapis Asius, & Asius Latine uocatur : Arabice, Hager Afos; Italice, pietra Asia.

Asij lapidis  
historia, & ui  
res ex Gal.

Fuchsij error.

Nomina.

## Lapis Pyrites.

## Cap. C.

PYRITES lapidis genus est, à quo æs conflatur. Eligi debet æris similitudine, facillè scintillas edens. Uritur sic. Melle irrigatus, molli pruna continuè flatur foliis, donec rufescat. Alij in multos carbonis igni candentes, lapidem copioso melle perfusum deiciunt, & ubi ad fuluum colorem vergere cœperit, extrahunt : efflatoq; cinere, rursus madefactum cremant, donec æquabiliter assiccatus, friabilis redatur : siquidem sæpe facies summa solum uritur. ita crematus, siccatusq; reconditur. Si eloto opus sit, lauari debet, ut cadmia. Tam crudi, quam uisti uis est exalfacere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duritias concoquere, & concoctas discutere. Resina exceptus excrescentia in carne cohibet, sed calorem quendam, & adstrictionem parit. Ita ustum nonnulli diphryges appellant.

LAPIDEM, quem Græci Pyriten dicunt, officinæ cum Mauritanis Marchesitam uocant. Verum quanquam uniuersi lapides, à quibus ignis chalybe excutitur, pyritæ appellari possunt; cum tamen Marchesita appellata ceteris magis scintillet chalybe aut ferro percussa, per antonomasiam ipsa sola uocatur Pyrites, tanquam ceteris præstantior. Foditur hæc in omnium metallorum ferè fodinis, genere, & colore diuersa, plerunque tamen (ut Plinius inquit lib. xxxvi. cap. xix.) aureis scintillis, uel argenteis respersa. Gignitur, ut rei metallicæ periti tradunt, ex impuro metallorum halitu. quo fit, ut ferè semper reperiat in montium cacuminiis, ubi auri, & argenti uena, in profundo delitescit. Sterilis hæc magna ex parte, quod (ut chymistæ existimant) ex impurissimo sulphure, alijsq; inconcoctis partibus metallorum sit conflata. quamobrem fossiores in Germania, extra cauernas Pyriten tanquam inutilem proijciunt. Veruntamen quandoq; Pyriten inueniunt, qui aurum, argentum, uel æs intra se continet. Idcirco rectè prodidit Dioscorides, Pyriten lapidis esse genus, ex quo æs conflatur. Quod cum ignorasset Albertus, omnem Marchesitam inutilem esse asseruit. Pyritæ uires reddidit Galenus libro ix. simplicium medicamentorum, his uerbis. Vires eorum, qui ualidam facultatem possident, est & pyrites quem uocant. quo utimur digerenti emplastro admisto : adijcitur ei & schistos. Ab hoc medicamine, & pus se penumero, & consistentia grumosa in spatijs intermedijs musculorum nata, per halitum digesta sunt. Cæterum ubi in usu uocantur lapides omnes admodum uehementer contusi, atq; ad leuiorem redacti sint oportet, similiter atque ea, quæ in ophthalmicas facultates admiscuntur. Etenim nisi pollinis instar comminuantur, adeo ut in profundum corporum, quibus applicantur, subeant, assimiles manent istis marinis, & fluuiatilibus arenis, quæ & ipsæ communè omnium lapidum uim possident. Siquidem exiccant tumentè ex hydrope carnem, uidelicet laborante in eis exalfactis decumbente. Non tamen ad aliud quippiam eis utimur, tanquam prædictis, ad ophthalmicas, & sistentes tum sanguinem, tum muliebre profluiuium facultates, præterea ad glutinanda ulcera, cicatrice claudenda, carne implenda. Nam qui ex eis acres non sunt, ad hæc omnes sunt utiles, uelut & acres, quorum posterius mentionem faciam, ad detergendum, abstergendumq; tum detrahendum, extenuandum, digerendum, ualenterq; siccandum, & colliquandum. Qui lapis Græcis *λίθος πυρίτης*, Latinis lapis Pyrites nominatur : Arabibus, Hager al, sine Alrusenai : Italis & officinis, Marchesita : Germanis, Kis : & Ertz stuoß.

Pyritæ lapidis confid.

Pyritæ uires  
ex Galeno.



## Lapis Hæmatites.

## Cap. CI.

**HAEMATITES** optimus habetur friabilis, saturato colore niger, durus, & suopte ingenio æqualis, nulla sorde admixta, nulloque zonarum discursu. Vim habet adstringentem, & excafcatoriam aliquantum, extenuantemque. Oculorum cicatrices, & scabritiam cum melle purgat: cum lacte autem muliebri, lippitudini, fractis, & oculis cruore suffusis conuenit. Bibitur contra difficultatem urinae, & fluxiones mulierum in uino: & ab ijs, qui sanguinem reiecerunt, cum succo punici mali. Fiunt ex eo coticulæ, & collyria oculorum vitijs apta. Vritur ut Phrygius, sine uino duntaxat. Modus vitionis est, ut modicè leuis fiat, & bullis quibusdam intumescat. Sunt qui hæmatiten ita adulterant. Densam glebam, rotundamque schisti lapidis, cuiusmodi sunt, quæ eius radices vocantur, in urceum figlini operis, qui feruentem cinerem contineat, condunt: paucaque interiecta mora eximunt, experienturque si tria ad cotem hæmatitæ colore reddat. quod si ita res se habet, reponunt: sin minus, iterum obruunt, & subinde conspicientes, periculum faciunt: siquidem in cinere diu dimissus, colore mutato diffunditur. Coarguitur malè confectus, primum scissilibus uenis: quippe in rectos uenarum discursus refringitur. At hæmatites longè secus se in colore habet: nanque hic floridum reddit, hæmatites verò saturatiorem, atque cinnabarin imitantem. Inuenitur in Sinopica rubrica. Fit & electromete lapide, vehementer ambugto. In Aegypto sponte naturæ cum metallis enascitur.

Hæmatitæ lapidis confid.

**HAEMATITES** Lapis, quo omnes in uniuersum medicæ officinæ abundant, quoque pictores, & lignarij sibi utuntur, uulgo uocatus Lapis, legitimus non est, de quo meminere Dioscorides, & Galenus. Quippe hic falsitius est, ex uilissimo uulgari Armenio bolo, alijsque admixtis imposturis. Legitimus enim fossilis est, & sponte naturæ nascens in metallorum cuniculis: qui fractus, sanguinem colore imitatur, unde & nomen, cum Græcis sanguis dicitur ob cognationis uinculum. Foditur hæmatites non modò in Aegypto, sed in pluribus Germaniæ, & Bohemiæ montibus, præsertim in Hercynia sylua: quin & in Italia Erixienfi agro, sed peregrinis bonitate cedentes. Variat tamen huic lapidi color, quoniam & niger, & flauus, & ferruginis instar, quibusdam instar peritissimus æquè ac doctissimus Agricola in suis de fossilium natura libris diligenter adnotauit. Hæmatitæ uires memoria prodidit Galenus lib.

Hæmatitæ uires ex Gal.

IX. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Porro talium quoque unus est hæmatites, quem uocant, à coloris similitudine id appellationis sortitus: sicut & galactites, quædo & ipse in succum solutus, lacti similis conspicitur. Habet lapis hæmatites tantum frigiditatis, quantum habet adstrictionis. Merito itaque ausi sunt medici ocularibus facultatibus lapidem miscere hæmatiten. Ac solo eo uti possis palpebris exasperatis: si quidem cum phlegmone asperæ sint redditæ, ex ouo ipsum diluens: ac si magis etiam, per fœni graci decoctum. Sin uerò citra phlegmonem, ex aqua. Incipito uerò semper à modicè humidis, per specillum infundens. Vbi autem, quod uires eius ferat, conspexeris, magis ac magis crassum efficies, ac tandem adeo crassum facies, ut specilli nucleo inungas, secundum subiectionem, aut euerfionem palpebræ. Hic idem lapis similiter in cote contritus, sanguinis expuitioni conuenit, omni busque ulceribus. Porro siccus, si ad tantum redactus fuerit lenorem, ut puluillum referat, reprimat excrefcentia, atque eo nullus solo, atque per sese utitur. Ego uerò ad ea, quæ dixi, usus sum facultate eius ex gustu qualitate comperta, cum mox experientia periclitari uellem, nunquid rectè coniecisssem. Et ipsa quidem oculorum ulcera, solus per se cicatrice includit (ut paulò antè comprehensum est) attritus, cæterum aut affusus, aut inunctus. nam & id experientia exploratum habeo. hætenus Galenus. Miris item laudibus extulit hæmatiten lapidem Alexander Trallianus, sic inquit. Ego sanè noui frequenter me sine theriaca, alijsque pretiosis antidotis multos curasse, lenibus usum medicamentis, & præsertim lapide hæmatite. Vsus autem eo sum in his, qui largius sanguinem reiciebant, cum succo punici mali, & granis, uel cum succo polygonij: in quibus autem sanguis non copiose euacuabatur, etiam ex aqua sola egelida. At lenigare ipsum curiosè oportet, ut in tenuissimum puluerem redigatur, sitque aerens, & uento persimilis. Dedi ego ex eo scrupula quatuor, & paulò amplius minusue. Exhibui etiam ijs, qui pus expui inceperant, ac mirum est, quomodo ulcus exiccarit sanaueritque, ut non amplius pus generaretur, neque æger tussi infestaretur. Spectaui autem & aliquid ex his, quibus uas exesum erat, non modò particulas quasdam ex faucibus, sed etiam asperam arteriam exapuentem, ac mirum quomodo in hoc quoque lapis hic maximam efficaciam indicauerit. Nam & hic curatus est nobis non admodum etiam spernentibus. Exhibui autem ægro potui medicamentum frequentius, ut commodius distribueretur. Quare cum crebrò ipsum bibisset, tandem sumere ipsum fastidiuit. Excogitaui autem huiusmodi rationem, redactum in tenuissimum puluerem panniculo lineo imposui, & diligenter ipsum undique, constrictum, colligatumque in poculo, quod uinum odoratum modicum haberet, suspendere permisi, idque per totam noctem iam inde ab ipso uespere extraxi autem tenuem æreanque eius partem, ut æger solam uini qualitatem perciperet. Ex hoc bibere quantum maxime libenter habebat, ei præcepi atque hoc sanè agendo, bibendoque continuè, sanitatem recepit. Hoc autem morbo liberatus, idem præseruationis causa facere pergebat, bibebatque, donec etiam corpore probe permutato, consueta agendo uiribus se constare sentiret. Hec de lapide hæmatite à me uisa, & usu comprobata conscripsi. Hætenus Alexander lib. VII. cap. primo. Hic lapis Græcè ῥόδος λίθος, uocatur: Latine, Lapis hæmatites: Arabicè, Sædenegi, Sædenegi, seu Alsadenegi: Italicè, Pietra hematite: Germanicè, Blutstein.

Hæmatitæ uires ex Alexandro.

Nomina.



## Lapis Schistus.

## Cap. CII.

SCHISTOS lapis in Iberia Hispaniæ gignitur. Probatur maximè, qui croci colorem æmulatur, friabilis, suapte natura fissilis, concremento, & alterno cohærentium venarum discursu, pettinum modo, Ammoniaco sali similis. Vim exhibet hæmatitæ, sed ad omnia infirmiore. quin & caua replet muliebri lacte perfusus. ad procidentia, rupta, item genarum crassitiem, & uuas oculorum, magnopere efficax est.

SCHISTVM lapidem, quem tradidit Dioscorides gigni in Iberia, hætenus allatum in Italiam non uidimus. Foditamen hunc in pluribus Hercyniæ syluæ locis in Germania, quin & in Bohemia auctor est clarissimus Agricola. Ceterum cum de uiribus cum hæmatite certet, hic eius uires nobis supplere poterit. Meminit Schisti lapidis Gale- nus lib. IX. simplicium medicamentorum, sic de eius uiribus differens. Lapidis hæmatitæ persimilem uim obtinet, ue- rum infirmiore, is qui uocatur schistus ac post eum galactites. At melitites caliditatis etiam nonnihil, ut dixi, adiun- xit. Ut itaque unusquisque ipsorum leuiter, ac sensim ab hæmatitæ facultate recedit, ita ad oculos similiter in usum ducitur: est tamen mitior. Porro mitiora remedia partibus etiãnum phlegmone afflictis semper gratiora sunt, atque iucundiora: ceterum liberis iam phlegmone partibus infirmiora, quàm quæ persanare ualeant. λῖδος χιςός Nomina. ita Græcis, ut Latinis Lapis schistus, & Italis Pietra scissile appellatur.

Schisti lapi-  
dis considera-  
tio, & uires.

## Lapis Gagates.

## Cap. CIII.

IN GAGATARVM lapidum genere, præferendus qui celeriter accenditur, & odorem bitu- minis reddit. Niger est plerumque, & squalidus, crustosus, perquam leuis. Vis ei molliendi, & dis- secutiendi. deprehendit fonticum morbum suffitus: recreatque vuluæ strangulationes: fugat serpen- tes nidore, podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, quæ influens amnis in mare effunditur, proximè oppidum, quod Plagiopolis dicitur, vocatur autem & locus, & amnis Gagas, in cuius faucibus ij lapides inueniuntur.

LAPIDEM, quem Gagaten uocant, in comitatu Tirolensi Germaniæ non longè ab Aeniponte (Germani Spruch dicunt) in quodam torrentis alueo repertum, ostendit mihi primum clarissimus medicus Ioannes Petrus Me- rinda Brixianus, nullis prorsus notis à Gagatæ historia disidentem. Nam præterquam quod igni admotus confestim accenditur, flammamq; contrahit, ac bitumen redolet, squalidus est, & niger, crustosus, & perquam leuis. Hoc scætet in uniuersum Flandria, Cimbriæq; ubi lignorum penuria incolæ hoc tantum lapide ignem sibi comparant. Fo- ditur hoc tempore etiam in Italia Brixiano agro, è cuius fodinis nuper ingentem glebam misit ad me Tridento San- tus Santinus diligens pharmacopola ad Corallij insignium. Fuchsius uir alioqui eruditissimus magno errore putat (ut libro primo retulimus, cum de pissasphalto differeremus) Gagaten in Tirolensi comitatu repertum, esse pissasphal- tum. Verum cur ego in hoc ab eo dissentiam, citato nuper loco latius ostendimus. Porro idem in libro de componen- dis medicamentis, quem nuper auctum edidit, Gagaten censet esse succinum illud nigrum, quod nobis uulgò Ambra ne- ra uocatur. Sed in hoc similiter euni (pace sua dixerim) hallucinari clarius esse opinor, quàm ut pluribus demonstretur. Nam ut omittam absurdum mihi planè uideri, quod succinum lapidis nomine dignetur, illud non est squalidum, neq; crustosum; sed in superficie potius læue, & lucidum satis apparet. Sunt qui existiment fossiles quosdam carbo- nes, quos in pluribus locis effodi in Germania tradidit Georgius Agricola uir doctissimus, & in fossilibus medicamen- tis indagandis hodie facilè princeps, esse lapidem Gagaten, quod carbonibus ij non aliter quàm è ligno parati igne ac- cendantur. Veruntamen cum hi flammam non edant, nisi follibus excitentur, nec ullum bituminis odorem spirent, eo- rum opinio planè resellenda uidetur. Siquidem Gagates adeò bitumine prægnans est, ut accensus picis ferè modo fla- gret, & nigerrimum emittat fumum. Quin & oleum copiosum reddit, ubi uitreis organis conclusus, ignium ui peru- ritur. Hoc commendauit Mesues demoniacis, epilepticis, paralyticis, spasmicis, tetanicis, arthriticis, ab utero suf- focatis, & conceptum non admittentibus. Quod tamen à carbonibus ijs elici non potest, cum omni penitus humore destituantur. Gagatæ historiam, & uires tradidit Galenus lib. IX. de simplicium medicamentorum facultatibus, his uerbis. Est & alius lapis colore atro, qui ubi igni admotus fuerit, persimilem bitumini odorem exhibet, quem Dio- scorides, nonnulliq; alij in Lycia inueniri prædiderunt, ad fluuium nomine Gagatem, unde & ipsi lapidi nomenclatu- ram inditam dicunt. Ego tamen eum fluuium non uidi, tametsi parua nauicula totius Lyciæ litora legerim, quò uide- licet, quæ in ea sunt, inspicerem. Crustaceos uerò lapides nigros, & qui in ignem additi exilem flammam ederent, complures Cæle Syria asportant, natos in colle, mari mortuo, quod uocant circundato, quæ orientem spectat, ubi & bitumen est: cratq; lapidum odor similis bitumini. Vtebarq; eis ad flatuosos tumores in genu diuturnos, & egre cu- rabiles, mistis uidelicet facultatibus, quæ ad hoc symptoma probate fuerant. Planeq; uisum est mihi euidentioreni earum facultatem reddidisse. Miscui uerò ipsum & Barbaro quam uocant, & palam medicamentum effectum est exic- cantius, adeò ut & sinus contraheret, nequum cruenta uulnera glutinaret, ad quæ competere maximè creditur. hæ- tenus Galenus. Ceterum Plinius lib. XXVI. cap. XIX. existimasse deprehenditur, quod quemadmodum in medi- camentis sibi uiribus nutuis respondent Thracius lapis, & Gagates; ita uterque in aqua demersus accendatur, & conflagret, restinguatur uerò in oleo. Quod tamen falsum est: quandoquidem Dioscorides ubi memorie prodidisset Thracium lapidem iisdem uiribus esse præditum, quibus & Gagates; subdidit Thracio illud peculiare adscribi, quod

Gagatæ lapi-  
dis considera-  
tio.

Fuchsi error.

Gagatæ histo-  
ria, & uires  
ex Galeno.

Plinij lapsus



aqua demersus accendatur, & oleo restinguatur. quod tamen in Gagatē non accidit. Vim Gagatē admirandam esse Aëtius testis est lib. II. cap. XXIII. quippe si igne inflammetur, meroq; restinguatur, exhibeaturq; id uinum cardiacis potandum, confestim leuantur, represso sudore, excitatoq; arteriarum pulsu. Nonnulli Gagatē ad pollicis tenuitatem terunt, septemq; continuis diebus colicis ē uino propinant drachmē unius pondere, & integram restituant ualeitudinem: poculum interim, quo laborantes bibunt, eiusdem uapore suffientes. Sed quoniam Gagates ob quandam nominis similitudinem, lapidem **ACHATEN** ita ueteribus appellatum, mihi in mentem redegit, cum is laudetur ad uaria humani corporis incommoda, merito hic aliquid de eo nobis dicendum esse duximus. Repertus primū Achates est in Sicilia, iuxta Achaten fluiuium, à quo nomen sibi uendicauit. Lapis hic uarijs constat coloribus, & se inuicem incurfantibus zonis, lineisq; adeo ut quandoque uarias effingant imaginum formas, naturæ tantum penicillo. Id quod maxime testatur Plinius lib. XXXVII. capite primo, ubi sic habet. Post hunc anullū regiam famā est gemmæ Pyrrhi illius, qui aduersus Romanos bellum gessit. Nāque habuisse traditur Achaten, in qua nouem Musæ, & Apollo citharam tenens spectarentur, non arte, sed sponte naturæ, ita discurrentibus maculis, ut Musis quoq; singulis sua redderentur insignia. Hinc igitur creditum est antiquos uocasse Achaten uarijs, ac diuersis nominibus. Vocatur enim phassachates, cerachates, dendrachates, leucachates, hamachates, corallachates, & id genus alijs: quod quidam columbos, quidam cornua, alij arbores, alij sanguinem, nonnulli corallium coloribus præ se ferant. Prodest Achates (ut Plinius est auctor) contra scorpionum ictus. Quod in Siculis utique crediderim, quoniam primum eius prouinciæ afflatu scorpionum pestis extinguitur. Et in India inuenti contra eadem pollent, & alijs multis miraculis. Spectasse etiam prodest oculis. Sitim quoque sedant in os additi. Leoninæ pelli similes, potentiam ceteris ualidiorem habere contra scorpiones dicuntur. In Persis uero suffitu earum, tempestates auerti, & præter ea flumina sisti. Argumentum esse, si in feruentes cortinas additi, refrigerent. Sed ut prosint, leoninis iubis alligandos. Abominantur hyenæ pelli similes, quod domibus discordiales sint. Sed qui unico tantum colore notatur, inuisctos athletas reddit. hætenus Plinius. Lapis, qui Græcis λίθος γαγάτης, Latinis lapis Gagates uocatur: Italis, pietra Gagatē.

Achata lapidis historia, & uires.

Nomina.

### Lapis Thracius.

### Cap. CIIII.

**LAPIS** Thracias dictus, nascitur in flumine quodam Scythiæ, cui Ponto nomen est. Vis ei gagatæ. Traditur aqua accendi, & oleo restingui: quod in bitumine accidit.

**QVI** THRACIVM lapidem ostenderet in Italia, hætenus profectò neminem inueni: nec qui illum alijs in regionibus se uidisse, aut inuenisse testetur, compertum habeo. Eius mentionem fecit Galenus una cum gagatē lib. I. de simpl. medic. facultatibus, ubi ita scribit. Est & alius lapis, cuius meminit Nicander hunc in modum.

Si lapis uratur caudenti Thracius igne, &  
Post made fiat aqua, flagrabit totus: at idem  
Mox oleo affuso, penitus restinguitur. adfert  
Thracius hunc ad nos pastor de flumine, nomen  
Cui Pontus.

Verum nullus eius in medicina usus: neq; Nicander præter graueolentiam, quæ suffitu feras fugat, quicquam ei adscripsit. hæc Galenus. Ceterum nos Thracij lapidis historiam potius fabulosam, quam ueram censemus. Eius nomen Græcum λίθος θρακίας: Latinum, lapis Thracius: Italicum, pietra Thracia.

Thracij lapidis mentio ex Galeno.

Nomina.

### Lapis Magnes.

### Cap. CV.

**MAGNES** lapis optimus est, qui ferrum faciliè trahit, colore ad cæruleum uergente, densus, nec admodum grauis. Datur cum aqua mulsā trium obolorum pondere, ut crassos humores eliciat. Sunt qui magnetem crematum pro hematite uendant.

**MAGNES** lapis Heraclius, & Sideritis quoque dicitur. Magnes quidem ab inuentore (ut Nicander est auctor) nomine Magno, qui primus in Ida monte lapidem hunc adinuenit: aut à Magnesia regione, ut Lucretius suis in poematibus scribit. Heraclius uero, uel ab Heraclia urbe, uel ab Hercule: ut enim Hercules immanes domuit beluas, uiribusq; subegit: ita Magnes ferrum uicttricem rerum materiam ad se trahens, subigit, & tenet. Quas ob uires Sideritis quoque dicitur. quippe ferrum Græcis σιδῆρος appellatur. Nos autem uulgari idiomate appellamus pietra Calamita. Foditur in Cantabria Hispaniæ, & in uarijs Germaniæ, ac Bohemiæ locis, etsi sæpe casu inueniatur in ferri fodinis. Prestat, qui ex Macedonia, & Magnesia illi contermina conuehitur: sed omnium præstantissimus est Indicus, & Aethiopicus. Differunt Magnetes colore, qui in ijs aut niger est, aut cæruleus nigricans, aut in nigro rufus, aut contrā. Optimus est mas, qui non modò celerrimè trahit ferrum, sed etiam uim suam in id adeo transfundit, ut possit alterum inherens ferrum ad se trahere. quo fit, ut sæpius acus acum trahat, adeo ut altera alteri subpendeat, nullis appositis adminiculis, ad duodenum usq; numerū. Quod item ferreis fit anulis, qui alter alteri inherentes catenæ instar dependent, tametsi postremus non tam pertinaciter inhereat, uti primus, & secundus. Ratio autem cur Magneti tantum facultas instat trahendi ferrum, nulli sanè, quod sciam, adhuc comperta est, nec ulla eam philosophorum inuestigatio unquam assequi potuit. Proinde necessarium fuerit dicere, illi uim hanc peculiari tribuisse.

Magnetis lapidis historia.



tribuisse cœlum, & rerum omnium parentem naturam, ut Rhabbarbo vim detrahendū bilem, & Torpedini marinæ stupidam reddendi manum, quæ ipsam uiuentem tetigerit. Nec sanè aliud quicquam inueniri putauerim, quod uiribus Magnetem magis emuletur, quàm Torpedo piscis. Quandoquidem ut Magnetis admiranda facultas ex una pendente acu in aliam transit acum, & ex anulo in anulum; idem similiter efficit Torpedinis uirtus. Quippe hamo capta, obstupefaciens eius facultas adeo confestim per setas uirgamq; excurrit, ut statim piscatoris manum miro sanè stupore corripiat. Idemq; efficit retibus comprehensa, ui per funem auræ instar excurrente. Ceterum Dinocrates Alexandrinus (Plinius auctor est lib. xxxiiii. cap. xiiii.) Arsiões de Magnete lapide templum concamerare inchoauerat, ut in eo simulacrum eius è ferro pendere in aere uideretur. Cuius forsitan rationem secuti Arabes, Turcarumq; sacerdotes (si tamen uera referunt, qui talia scribunt) Mahumeti sacellum è præstantissimo Magnete concamerari iusserunt, ut inposita in eo Mahumeti arca è purissimo ferro conflata, tanquam diuino quodam miraculo in aere penderet, ita deceptis populis. Trahit itaq; Magnes propria ui ferrum, excepto eo, quod rubiginem cōtraxerit, uel ubi lapis is alio fuerit confricatus, aut ubi adamas propè adferatur. Magneti uim sanè contrariam habet Theamedes lapis in Aethiopiæ montibus nascens, non procul à monte magnetis; quippe quod appositum sibi ferrum confestim abigat respuatq;. Quo fit, ut qui calceis ferreis per magnetis montem pergunt, pedes submouere nequeant: per alium uerò ambulantes, nunquam pedibus consistant, & ueluti tripudiantes fiant. Magnetis breuiter meminit Galenus lib. ix. simpl. med. sic inquit. Ex lapidibus unus est & magnites, & heraclea, quam uocant, ad similem hamæ uim obtinens. Lapis, qui Græcis λίθος μαγνήτης, & ἡράκλειος, Latinis lapis Magnes, Magnetes, & Heracleus appellatur; Arabibus, Hager almagritos, seu Magnathis; Italis, pietra Magnete, & Calamita.

Theamedes lapis.

Magnetis uis ex Galeno.

Nomina.

### Lapis Arabicus.

### Cap. CVI.

ARABICVS lapis maculoso ebori similis. Is tritus illitus hæmorrhoidas exiccat. Eius cinis dentifricio optimus.

NVLIVM hætenus uidi, nec reperi lapidem, qui eburneam mihi ostenderit faciem. quapropter non crediderim Arabicum lapidem hoc tempore conuehi in Italiam. Eius tamen nomen Græcum est λίθος ἀραβικός, Latinum lapis Arabicus; Italicum, pietra Arabica.

Nomina.

### Lapis Galactites.

### Cap. CVII.

GALACTITES appellatur, quod lacteum succum refudet: cinerei tamen est coloris, & gustu dulcis. Ad oculorum fluxiones, & vlcera conuenienter illinitur. Oportet autem in aqua tritum, pyxide plumbea recondere, propter vim glutini, quod ei obhæret.

### Lapis Melitites.

### Cap. CVIII.

MELITITES omnia galactitæ similis, hoc tantum interest, quod dulciorem succum remittit. Eiusdem uel galactites effectus.

GALACTITEN, item Melititen qui mihi ostenderet, hætenus non reperi. Alter tamen (ut Galenus inquit lib. ix. simplicium medicamentorum) Galactites uocatur, quod in succum solutus lactis speciem reddat. quem admodum alter melitites, quod succi dulcedine mel gustu representet. Galactitæ meminit Plinius lib. xxxvii. cap. x. sic inquit. Galactites ex uno colore lactis est. Eandem dicunt leucam, & leucographiam appellant, & synæphiten: tritam lactis succo, & sapore notabilem. In educatione nutricibus lactis fecunditatem: infantium quoq; ad alligata collo, saluam facere dicitur: in ore autem liquefcere. Eandem memoriam adimere dicunt. Mittit eam & Achelous amnis. hæc Plinius. Ceterum, ut testatur Agricola, non solum reperitur Galactites in quibusdam Saxonie montibus, in Germania; sed etiam in quorundam fluminum alueis, pariterq; Melitites. Lapis ille Græcè λίθος γαλακτίτης, Latine lapis Galactites, Italicè pietra Galactite uocatur. Hic uerò Græcis λίθος μελίτης, Latine lapis melitites, Italis pietra Melitite nominatur.

Galactitæ, & melititæ historia.

Nomina.

### Lapis Morochthus.

### Cap. CIX.

MOROCHTVS lapis, quem aliqui galaxiam, aut leucographida uocauerunt, in Aegypto nascitur. quo, utpote molli, & facili liquefcente, linteones dealbandis uestibus utuntur. Spiracula corporis obstruere uidetur: conueniens ijs, qui sanguinem expuunt, cœliacis, & uesciæ doloribus, cum aqua potus. itidem fluxionibus uulux, & impositus uelleri. Mollihus oculorum collyrijs miscetur: explet enim caua, atque delacrymationes sistit. Idem cerato exceptus, vlcera, quæ fiunt in teneris partibus corporis, ad cicatricem perducit.

MOROCHTHVM lapidem nonnullis galaxiam uocatum nasci, fodiq; in Saxonia Germaniæ testis est Georgius Agricola maximus fossilium indagator. Veruntamen cum nec inde, nec ex Aegypto, quod sciam, in Italiam de-



Morochthi la-  
pidis uires ex  
Galeno.

ferat, cur plura de eo dicam, non habeo. Morochthi meminit Galenus una cum scissili lapide lib. ix. de simpli-  
cium medicamentorum facultatibus, sic inquit. Sunt et alij lapides in succum solubiles, ut qui in Aegypto nascitur,  
quo utuntur ad splendorem linteis conciliandum. Est autem omnium dictorum minime qualitatis particeps, nec adstri-  
ctiorem, nec morsum, nec absterionem præ se ferens, quocirca hoc ipsum duntaxat lapidi huic inest, quod desiccet  
uidelicet: proinde cerato eum miscentes ad cicatricem ulceribus inducendam in mollibus corporibus usurpant. Sed  
et ocularibus miscetur facultatibus, perinde ut modo dicti. At quāto est maiore emolliēdi ui, quā prædicti, quod  
nullam uidelicet effectricem qualitatem habeat; tantò etiam moderatior est, magisq; dolorem leuat. Hunc lapidem  
quidam moroxum, nonnulli leucographida nuncupant. hætenus Galenus. Sed certè nescio qua ratione, aut aucto-  
ritate ductus sibi persuaserit Plinius lib. x. xvi. cap. xi. hunc non esse lapidem, sed herbam, ubi una cum leuca de  
leucographide differuit, nisi fortasse fuerit uocabulorum similitudine deceptus. Lapis Græcis λίθος μορόχθος,  
Latinis Lapis morochthus appellatur; Italis, pietra Morochtho.

Nomina.

## Lapis Alabastrites.

## Cap. CX.

ALABASTITES vocatus onyx, crematus, resina aut pice exceptus, duritias discutit. sto-  
machi dolores cum cerato leuat: gingiuas comprimit.

Alabastrites  
consider.

ALABASTITES notissimus lapis est is, qui Romana inuenerunt ædificia. Hallucinautur tamen, qui  
credunt lapidem illum Alabastriten esse, quò hac tempestate torno uaria finguntur uasa, quibusdam subnigricantibus  
uenis discurrentibus, pellucido læuore, materie uerò adeò imbecilli, ut parum collisa faciliè frangantur. Quando-  
quidem lapis hic Alabastrite species non est, sed potius gypsæ materia. Alabastrites enim, quem antiqui ad uasum  
guentaria cauabant, quò diutius unguētā à rancore uindicarēt, nascitur (ut Plinius inquit lib. x. xvi. cap. viii.)  
circa Thebas Aegyptias, et Damascum Syriæ. Hic ceteris candidior. Probatissimus uerò in Carmania, uox in In-  
dia, iam pridem et Syria, Asiaq;. Viliissimus autem, et sine ullo nitore in Cappadocia. Probantur quā maxime  
mellei coloris in uertice maculosi. hæc Plinius. Huius facultates memoriæ prodidit Galenus lib. ix. simplicium me-  
dicamentorum, sic inquit. Et alabastrites uocatus unguis in medicina usum ingreditur combustus. Quidam enī bi-  
bendum dant stomachicis. Is Græcè λίθος αλαστροίτης, Latine Lapis alabastrites dicitur: Italice Alabaastro.

Alabastrites  
vires ex Gal.  
Nomina.

## Lapis Thyites.

## Cap. CXI.

LAPIS nomine thyites, in Aethiopia gignitur, subuiridi colore iaspidem imitatus: cum di-  
luitur tamen, lacteum succum reddit. Vehementer mordet: tenebras, quæ pupillis obuersan-  
tur, expurgat.

Fuch. opinio  
reprobata.

THYITEN lapidem neq; ipse hætenus inueni, neq; ab alio conuictum scio. Qui fortasse ex Aethiopia tan-  
tum petendus est, ubi eum gigni prodidit Dioscorides. Veruntamen Fuchsius medicus singularis doctrine, libro il-  
lo de compositione medicamentorum, quem locupletatum secundo edidit, lapidem Dioscoridi Thyiten dictum, ni-  
hil aliud esse censet, quā lapidem illum cœruleum, qui Italis uulgò Turchina, alijs uerò Turcicus lapis appellatur,  
ut eius uerba, quæ subiiciam, apertè declarant. Iaspis, inquit, Galeno duplex est. Vna subuiridis, quæ Dioscoridi  
Thyites, ut alibi diffusè monstrauimus, dicitur. Thyites autem non est nisi ea Iaspidis species, quæ quod aeri et cœlo  
matutino autumnali similis sit, hoc est, cœrulea; lacteq; suffusa, ἀπειζουσα Græcis, iunioribus Turcica, Germanis  
Turckes nominatur. Quam certè appellationem uerisimile est ex Thyitis deprauata uoce promauasse, originemq;  
suam duxisse. Altera uiridis, quæ sic dicta est, quia uiret. Eius duodecim sunt genera, quæ alibi à nobis sunt ordine  
explicata. Quintum autem genus est Turcica uocata Iaspis, de qua iam diximus. Hætenus de Thyite lapide Fuchsi  
sententia. Quæ sanè mihi nonnullis rationibus refellenda uidetur. Primum nanq; non inuenio, quod Galeno eodem  
duo genera digeratur, in uiridem scilicet, et subuiridem, ut illi Fuchsius adscribit. Sed ipsum uiridis tantum memini-  
se constat lib. ix. simplicium medicamentorum, ubi de eius facultatibus differuit. Nec obstat, quod Galenus eodem  
libro in commemoratione Thyitis lapidis ex Dioscoride, hunc coloris esse scribat subuiridis quodammodo, ut iaspis.  
siquidem Galenus eo in loco Dioscoridis uerba refert, ut ex capitis illius titulo quisq; certior fieri potest: id enim ita  
inscriptum legitur, Περὶ τῶν Διοσκωρίδου θυϊτῶν, hoc est, De Dioscoridis Thyite. Præterea equidem nescio, quo  
pactò lapis ille Turcicus possit esse Thyites: quoniam hic tum Dioscoridum Galeno coloris est subuiridis, non au-  
tem saturati cœrulei, ut ille. Ad hæc si lapis, qui ἀπειζου Græcis uocatur, et qui uerè Turcicus est, Iaspidis generi-  
bus assignatur (quod ipse quoq; Fuchsius asserit) non uideo, quo modo fieri possit, ut idem sit Dioscoridi Thyites: qui  
à nemine, quod sciam, inter iaspidium genera recensetur. Postremò mihi quidem non uidetur uerisimile, quod Turcica  
lapis à Thyitis deprauata uoce nomen acceperit. quam enim, quæso, illæ uoces habent inter se similitudinem  
certè nullam. Quare potius adducor, ut credam eam appellationem fluxisse ab Italica nostra lingua. nam quemad-  
modum in Italia cœruleus color, quem propriè cœli colorē esse uolunt, uulgò turchino uocatur; ita etiam inibi la-  
pis is, de quo sermo est, à colore, quem cœruleum habet, Turchina nominatur. Ex qua nomenclatura postea facile  
factum esse arbitror, ut eundem lapidem iuniores Turcicum appellauerint: atq; adeò simili imitatione fortasse ducti  
Germani ipsum Turckes dixerunt. Lapis, qui Græcis λίθος θυϊτης, Latinis item Lapis thyites appellatur.

Nomina.



Lapis iudaicus.

Cap. CXII.

IVDAICVS lapis in Iudæa nascitur, glandis effigie, candidus, scita admodum configuratio-  
ne, lineis æqualiter inter se distantibus, quasi industria detornatis. Solutus nullam qualitatem ma-  
nifestam gustui repræsentat. Potest ciceris magnitudine tritus ad cotem, ut collyrium, cum calidæ  
aquæ cyathis tribus, potu difficultati urinæ auxiliari, & calculos in vesica comminuere.

LAPIS ē Iudæa allatus, unde & illi nomen, passim in officinis habetur. Utuntur eo medici nō modō ad uesticæ calculos; sed etiam ad eos, qui in renibus fiunt, Galenum secuti, qui libro nono de simplicium medicamentorum facultatibus, eius faciem ac vires descripsit, his uerbis. Est & alius lapis uiribus ualentioribus in Palestina Syria promouens, colore candido, specie concinna, lineas habens ceu torno ductas. Appellitant eum à loco, in quo nasci consueuit, Iudaicum, utunturq; ad uesticæ lapides in cote soluentes, & ex aquæ calidæ tribus cyathis potui præbentes. Scimus in quibus nos experti sumus, profecit nihil, quod ad lapides uesticæ pertinet: uerum ad eos, qui in renibus hærent, efficax est. λίθος Ιουδαϊκός ita Græcis, Latinis uerō lapis Iudaicus nuncupatur: Arabibus, Hager alyeudi, seu Hagiār aliheud: Italis, pietra Giudaica: Germanis, Indenstein.

Lapidis Iu-  
daici uires ex  
Galeno.

Nomina:

Lapis amiantus.

Cap. CXIII.

AMIANTVS lapis in Cypro nascitur, scisso alumini similis. quo, utpote flexili, telas & uela tantum spectaculi gratia texunt, quæ ignibus iniecta ardent quidem, sed flammis inuicta splendidiora exeunt.

LAPIDEM Amiantum (ut in alumine retulimus) officinae ac medici Alumen plumeum uocant, id esse existimantes, quod Græcis sciſile dicitur. Sed, meo quidem iudicio, falluntur, cum plumeum alumen ijs uocatum nulla adstringenti ui polleat, sed acri, nec in ignem coniectum comburatur, quod Amianti est proprium. In hac uulgari opinione, ego quoq; una cum plerisq; rei metallicæ studioſis iam pridem uerſatus ſum, donec clariffimus medicus Lucas Gbinnus legitimum alumen ſciſile Piſis ad me miſit, facie adeò Amianto ſimile, ut niſi adſtrictoria uis, qua pollet, ipſum ab Amianto plurimum differre guſtui indicaffet, alterum ſanc ab altero diſcernere neſciuiſſem. Nihilominus ex eo diſcrimen cognoscitur, quòd hoc in ignem proiectum ſtatim exurit, ille uerò nequaquam. Hinc itaq; fit, ut haud dubiè credendum ſit Alumen plumeum uocatum legitimum eſſe Amiantum. Caterum non deſunt impoſtores (ut auctor eſt Braſauolus Ferrarienſis) qui lapidem Amiantum ſimplicibus mulierculis oſtendant, uendantq; ſæpenu-mero pro ligno Crucis Seruatoris noſtri. Id quod faciliè credunt, cum igne non comburatur, quòdq; ligni modo plurimis conſtet lineis intercuſſantibus. Meminit Amianti Plinius libro xx xvi. cap. xix. ubi ſic inquit. Amiantus alumini ſimilis nihil igni deperdit. Hic ueneficijs reſiſtit omnibus, priuatim magorum. Eius nomen Græcum λίθος ἀμιάντος: Latinum, Lapis Amiantus: Italicum, pietra Amianto.

Amianti lapidis confid.

Fraus impo-  
storum.

Nomina.

Lapis sapphirus.

Cap. CXIII.

SAPPHIRVS lapis percussis à scorpione, potu prodesse existimatur. Contra intestinas exulcerationes bibitur. Excreſcentia in oculis, uasq; & pustulas inhibet, & ruptas membranas cogit.

SAPPHIRVS gemma colore constat cyaneo, perquam translucido. Lapis est omnibus notus, quod annulis, & torquibus, quæ collo gestantur, frequenter inseratur. Plinius Sapphiros aureis punctis collucere scribit libro XXXVI. cap. IX. Veruntamen hac ætate nullum hæcenus uidi Sapphirum, qui aureis colluceret scintillis, sed colore tantum cyaneo, adamantis modo translucido. Quo fit, ut putandum sit aut nostri usus sapphiros esse cyaneos gemmas sapphiri æmulas: aut hac in re errasse Plinium fatendum, quod fortasse cæruleum lapidem peculiariter uocatum, quem Mauritani azulum, uel lazulum dicunt, pro Sapphiro acceperit. Nam nullus præter hunc inter gemmas aureis emicat scintillis. Sapphiri uires perquam breuiter perstrinxit Galenus cum tantum ad scorpionum ictus haustum prodesse scripserit. Cæterum adduntur hoc tempore in medicamenta ad cor facientia, & in antidota, quæ aduersus uenena, & pestiferos affectus parantur, non modò sapphiri, sed smaragdi, carbunculi, granati, sardonij, hyacinthiq;: tametsi præter medicorum spem, potantes plerunq; fallunt: quòd rarè admodum sint seplaste, quæ huiusmodi gemmas agnoscant, & legitimas habeant. Caueant itaq; medici, ne decipiantur. Id enim fiet, si ubi ijs opus fuerit, peritissimos probatq; fidei consuluerint gemmarios. quippe gemmarum ramenta, quæ in seplasijs habentur, adulterijs, & imposturis non uacant. Adde, quòd plerunq; alterum alterius uice supponunt. Putant enim chrysopaios aureo colore nitentes hyacinthos esse, qui tamen amethystum colore referunt. Præterea obseruandù est, ut gemmarum ramenta, siqua legitima, præclaraq; inueniuntur, quin & margaritæ, & corallia super lapide porphyrite tandiu atterantur, usquedum redigantur in puluerem tenuissimè pollinis instar. Et sanè aduertant medici, quibus cura est, ut plus honoris, quàm auri lucrentur, ne corallia in æneis mortarijs conterantur. Nam si id inconsultè fiat, deperdis delinatisq; æneis mortarijs, ferreisq; pistillis, æris, & ferri scobs corallijs admista, noxium & uenensum reddet medicamentum, magna egrotantium iactura. Quandoquidem uidi ego sæpius mulierculas, quæ corallia & margaritas

Sapphiri con  
fideratio.

Cautiones  
quædam.



Nomina.

margaritas in æneis mortarijs contriuerunt, & subinde suis ægrotantibus propinarunt, qui ijs degustatis in maximū deducti sunt discrimen. Qui lapis λίθος σάπφειρος Græcis, Lapis sapphirus item Latinis dicitur: Italis, Saphiro.

## Lapis memphites,

## Cap. CXV.

MEMPHITES in Aegypto iuxta Memphin inuenitur, calculorum magnitudine, pinguis, uersicolor. Tradunt trito, & illito, quæ urenda, aut secanda sunt, sine periculo obstupefcere, ita ut non sentiant cruciatum.

## Lapis selenites,

## Cap. CXVI.

SELENITES lapis, quem aliqui aphroselenon appellarunt, quoniam noctu inuenitur lunæ imaginem reddere, quæ cum ea quidem augetur, & decrefcit. Nascitur in Arabia, candidus, translucens, leuis. Huius ramenta comitialibus in potu dari iubent. Eo ceugeftamine ad amuleta mulieres utuntur. Arbores adalligato eodem frugiferæ redduntur.

Memphitæ,  
& Selenitæ  
consideratio.Crystalli hi-  
storia.Plinii senten-  
tia explosa.Crystalli ui-  
res.

Nomina.

MEMPHITES lapis hodie, quod sciam, ad nos ex Aegypto non adfertur, tametsi uulnerarijs medicis sepius desideretur, ubi integra partium sectione sit opus. Seleniten uerò et si antea non uideram; emi tamen hoc anno à peregrino quodam, qui è Galitia Hispaniæ, ubi diui Iacobi templum inuiserat, in patriam reuertebatur. Hic lapis uitri modo translucet, & facile in tenues finditur laminas. quo fit, ut ijs in locis, ubi frequentissimus habetur, uitri uices expleat, ad concludendas ædificiorum fenestras. Quidam, quod speculi imaginem reddat, Specularem lapidem uocant. Ceterum quoniam hic translucidus lapis Crystallum nobis in mentem redegit, cum expetatur id sepius in medicum usum, silentio inuoluendum non duximus. CRYSTALLVM itaq; (ut Plinius inquit lib. XXXVII. cap. II.) gelu uehementiore concrefcit, nec aliubi certè reperitur, quàm ubi maximè hyberniæ niues rigent, glaci- enq; esse certum est, unde & nomen Græci dedere. Hæc Plinij de crystallo sententia. Nos uerò contrà rationibus nō obscuris inuixi (quod etiam peritissimus Agricola sentit) Crystallum censemus nec glacie, nec niue fieri unquam: sed ex humore omnium purissimo sanè constat, quod omnium gemmarum clarissimum, translucidissimūq; sit. Probatum sic gigni, noui autem (ut Plinius inquit) ex glacie, uel niue: quoniam unaquæq; glacies quantumuis longo tempore concreta in algidissimis montibus, à quibus nec hyeme, nec æstate uiu unquam recedit, etiam si è profundis partibus eruatur, liquefcit tamen in calidis locis reposita, non modò ignis, sed solis etiam calore. Namq; id ipsum Crystallo eueniret, igni uel solibus admoto, si è niue aut glacie concrefcere: reperireturq; tantum in montibus perpetuo niuosis. Verum enim uero cum reperiatur etiam in marmorum, aliorum lapidum, & uetallorum fodinis in Hispania, Germania, Scythia, Cipro, Carmania, & in Nerone, & Chiti rubri maris insulis, quin & in agris, ubi seges feritur, ubi aratro sepius magnas crystallo glebas fodere bubulci, liquidò sanè cōstabit, ex alia materia gigni crystallum quàm glacie. Siquidem id, quod in præruptis montium scopulis inuenitur, superficiè tenuis cohærens, ex purissimo lapidescente humore in uisceribus terræ concrefcere non dubitauerim: quod tamen tractu temporis à pluuiarum impetu, quæ in præruptis montium uniuersam deradunt terram, deuudari crediderim. Quapropter non temerè dixit Plinius, liquidò se affirmare posse in cautibus alpium nasci adeò inuijs, ut plerunque fune pendentes id extrahant homines. Huic alia accedit ratio, quod glacies per aquas innatet, crystallum uerò illico subsidat. Præstantissimum illud existimant, quod album & aquæ clarissimæ modo pellucidum uisitur. Vis crystallo adstrictoria: proinde datur in puluerem tenuissimum tritum utiliter dysentericis ex uino austero. Alba uteri profluvia sistit, lac uerò nutricebus auget. quod à Tridentinis mulieribus didicimus. Fiebat quondam antiquis è Crystallo pila, quæ aduersis solis radijs exposita, medici corpora urebant, igne inde concitato. Sed ijs tantum id cauterij genus admoueabant, qui candente ferro perterriti curari reformidabant. Sed & nos huiuscæ cauterij periculum fecimus, non sine ægrotantium, & astantium admiratione. Lapis, qui Græcis λίθος σεληνίτης Græcè, Lapis selenites Latine, Pietra selenite Italicè appellatur. Qui uerò λίθος σεληνίτης Græcè, Lapis selenites Latine, Pietra selenite Italicè appellatur.

## Lapis iaspis.

## Cap. CXVII.

IASPIDVM quædam smaragdum imitatur: alia crystallum, colore similis pituitæ: alia non dissimilis aeri, ob id uocatur aerizusa: alia ueluti fumo infecta, quæ capnias ex argumento uocatur. quædam lineis albis resplendentibus præcingitur, Assyrios appellata. alia terebinthinæ similis, quæ terebinthizusa dicitur. alia colore callaida gemmam æmulatur. Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare partum femoribus appensæ.

Iaspidum ge-  
nera.

IASPIDVM genera longè plura recensentur, quàm quæ à Dioscoride describuntur. Quandoquidem quædam uisitur cœruleo copioso, aut glauco pingui similis, id est, uiridis lacte suffusa. Alia purpurea, qualis nascitur in Phrygia. Alia rosea, & quasi floribus tincta, qualis in Ida monte profundissimis specubus foditur. Alia ex purpura cœrulea, qualis inuenitur in Cappadocia. Alia ex rubro uigra. Alia iecoris imitatur colorem, quæ si saturatiore colore reperiatur, lineis eiusdem coloris diluti, & nigri cingi solet. Quædam niuem imitata rutilis punctis respergitur. Quædam



Quædam onyx punctitur, aut ex altera parte iaspis est, ex altera onyx; proinde iasponyx uocata. Alia cuius altera parte sit purpurea, altera uiridis, nec utrinque pellucens, sed qua parte uirescit. In summa uaria est Iaspidum natura. Suspendas ad plura ualere aiunt, nempe ad omnem sanguinis fluorem, ad protegendum conceptum, & partum iuuandum, ueneremque inhibendam, & febrem, & hydropem fugandam. Nec desunt superstitiosi, qui dicant Iaspides homines reddere gratos, potentes, ac tutos, si quibusdam magicis uerbis admurmurentur, priusquam suspendantur.

Iaspidum natura.

Ex tot Iaspidis generibus uiridis tantummodo meminit Galenus lib. 1 x. simplicium medicamentorum, ubi de facultatibus eius ita differuit. Proprietatem nonnulli lapidibus quibusdam testimonio suo adscribunt talem, qualem reuera habet Iaspis uiridis, nempe stomachum, uentrisque os adiuuans appensa. Ac nonnulli quoque ipsam annulis inserunt, scalpuntque in ea draconem radios habentem, uelut rex Nechepsos scripsit in quartodecimo libro. Sanè huius ego quoque lapidis abunde periculum feci. Torquem enim ex huiusmodi lapillis confectum à collo suspendi, ita ut lapides os uentris contingerent. Apparebant autem nibiloninus prodesse, etiam si sculpturam non haberent, quam descripsit Nechepsos. hætenus Galenus. Qui lapis Latinis Iaspis, Græcis λίθος ιασπίς dicitur: Italis, Diaspro.

Iaspidis uires ex Gal.

Nomina.

## Lapis ætites.

## Cap. CXVIII.

ÆTITES lapis est ueluti prægnans, cum quatitur, alio in utero sonante. Grauidis continet partus, cum lubricæ sunt vuluæ, & parum tenaces, sinistro brachio adalligatus: sed parturientibus è brachio amoueatur, & feminibus alligetur, ut sine doloribus pariant, Furem deprehendit, si quis in pane conditum offerat: fur enim mansum deuorare non poterit. Quinetiam concoctus furem coarguit: quippe decocta cum eo deuorare non poterit. Tritus, & cerato exceptus, cyprino, aut gleucino, aut alio excalfaciente, comitiales magnificè iuuat.

ÆTITEN Græci, Latini Aquilæ lapidem dicunt, quod aliquando in earum reperiatur nidis. Variat lapis hic tum colore, tum magnitudine. Meminit huius Plinius libro xxxvi. cap. xxi. his uerbis. Aetite lapides ex argumento nominis magnam famam habent. Reperiuntur in nidis aquilarum, sicuti in decimo uolumine diximus. Aiunt binos inueniri, marem, & foeminam: nec sine ijs parere, quas diximus aquilas, & ideo binos tantum. Genera eorum quatuor. In Aphrica nascentem, pusillum, & mollem intra se, ac uelut in aluo habentem argillam suauem, candidam: ipsum friabilem, quem foeminei sexus putant. Mareni autem, qui in Arabia nascitur, durum, gallæ similem, aut subrutilem, in aluo habentem durum lapidem. Tertius in Cypro inuenitur, colore illis in Aphrica nascentibus similis, amplior tamen, atque dilatatus. cæteris enim globosa facies. Habet in aluo arenam iucundam, & lapillos: ipse tamen mollis, ut etiam digitis frietur. Quarti generis Taphiusius appellatur, nascentis iuxta Leucadem in Taphiussa, qui locus est dextra nauigantibus ex hac ad Leucadè. Inuenitur in fluminibus candidus, & rotundus. Huic est in aluo lapis, qui uocatur callimus, nec quicquam tenerius. Hætenus de aquilinis lapidibus Plinius. λίθος æτῖτης Græcis dictus, lapis Aetites Latinis uocatur: Arabibus, Hager achtamach: Italis, pietra d'Aquila.

Aetite lapidis historia, &amp; uires.

Nomina.

## Lapis ophites.

## Cap. CXIX.

OPHITAE genera multa. quidam ponderosus, & niger. alter cinereo colore spectatur, punctis distinctus. tertius lineis quibusdam candidis intercinctus est. Omnes alligati contra capitis dolores, & serpentium ictus profunt. Feruntur, qui lineas habent, lethargo, & capitis doloribus auxiliari.

OPHITAE lapidis meminit Plinius libro xxxvi. cap. vii. sic inquit. Ex ophite columna, sed parua admodum inueniuntur. Duo eius genera, molle candidum, nigricans durum. Dicuntur ambo capitis dolores sedare adalligati, & serpentium ictus. Quidam phreneticis, ac lethargicis adalligari iubent candicantem. Contra serpentes autem à quibusdam laudatur, præcipue ex his quem tephriam appellant à colore cineris. hæc Plinius. Verum Ophites marmor, quod uulgo uocamus Serpentino, porphyrite fræ lapidis instar durissimus est, colore nimirum nigricante, nec candido, nec cinereo, ut in suo requirunt Dioscorides, & Plinius, sed uiridi saturato dilutis eiusdem coloris maculis resperso. Ex quo sanè constat antiquorum Ophiten à nostrate maxime fuisse diuersum. Ophite lapidis uires tradidit Galenus lib. 1 x. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Ophites quem uocant lapis ustus extergendi confringendi que uim possidet, ceu etiam uitrum. Admodum enim & ipsum ex uino albo ac tenui epotum lapides uestica comminuit. Verum ipsum in lapidibus quispian forte non numeret. Et infra in Iaspidis uiridis mentione de Ophite ita scribit. Porro lapidem ophiten (deprauati sunt Græci codices, qui habent, οφειτιν) uir fide dignus reuera iuuare morsus à uipera suspensum retulit. Sed eiusmodi facultates extra usum sunt methodo constantem: uelut etiam Hieracitis, & Indici, cum profluentem ex hemorrhoidibus sistunt sanguinem. Lapis Græcis λίθος οφίτης, Latinis Lapis ophites, Italis pietra Serpentina uocatur.

Ophite lapidis historia.

Ophites marmor.

Nomina.

## Lapides in spongijs.

## Cap. CXX.

LAPIDES in spongijs inueniuntur, qui uestica calculos rumpunt, in uino poti.

LAPIDES



Lapidū spon-  
giarum uires  
ex Gal.

**LAPIDES** in spongijs reperti, omnibus notissimi sunt: quippe quod rarissima sint spongiæ, quæ hisce lapidibus uacent. Horum uires retulit Galenus lib. IX. simplicium medicamentorum, his uerbis. Lapidēs, qui reperiuntur in spongijs, frangendi uim obtinent, non tamen ita ualidam, ut lapidem in uestica comminuant, unde qui id scriptum reliquerunt, mentiti sunt: uerum qui in renibus consistunt rūpunt, uelut qui ex Cappadocia conuehantur, quos in Argeo nasci aiunt. Soluuntur autem hi in succum colore lacteum, ex quo liquet, quod extenuandi uim obtinent, absque ut insigniter excalsfaciant. *λίθοι ἐν τοῖς σπώγγοις* Græcè, Lapidēs in spongijs reperti dicuntur: Arabicè, *Hagiar alsefengi*: Italicè, *pietre delle spugne*.

Nomina.

### Lithocolla.

### Cap. CXXI.

**LITHOCOLLA** glutinum, quo lapides coniunguntur. conflatur autem ex marmore, lapide Pario, & taurino glutine. Potest candente specillo admotum, incommodos oculos pilos replicare.

### Lapis ostracites.

### Cap. CXXII.

**OSTRACITES** testæ similitudinem habet, crustosus, & in laminas fissilis. quo mulieres ad detrahendos pilos, pro pumice utuntur. Menses drachmæ pondere potus ex uino sistit. Si quatuor diebus à purgatione bibatur sicilici pondere, fœminis præstat ne concipiant. Cum melle autem impositus, mammarum inflammationes lenit, & nomas cohibet.

Ostracitæ la-  
pidis confid.  
& uires.

**OSTRACITEN** lapidem, quo pumicis uice usa est antiquitas, hætenus mihi uidere non licuit, quamquam reperiri hunc in Hildesheimio circa antrum à nanis appellatum, colore subrubeo, & ostracorum testis similem, libro quinto de natura fossilium scribit Agricola. Eius uires tradidit Galenus lib. IX. simplicium medicamentorum, sic inquit. Porro ostraciten uocatum lapidem prædicare quosdam audio, quasi desiccandi ualenter facultatem obtineat, temperatam ex adstrictione, & acrimonia, uelut & Gedcon non uine, pupillas expurgare, & uberum testiumque phlegmonas sanare, ex aqua uidelicet inunctum. Lapis Latinis ostracites, Græcis *λίθος ὀστράκινος* dicitur: Italicè, *pietra ostracite*.

Nomina.

### Smyris lapis.

### Cap. CXXIII.

**SMYRIS** lapis est, quo anularij scalptores lapides expurgant, ad erodendum, & urendum utilis: gingiuis, quas humor uexat, prodest: dentifricio commendatur.

### Arena litoralis.

### Cap. CXXIII.

**ARENA** è litoribus sole feruefacta, hydropicorum tumores exugit, si capite tenuis in ea obruantur. Torreris solet ad aridos fatus, pro milio aut sale.

Smyridis cō-  
sider. & uires  
ex Gal.

**SMYRIS** uulgò nobis Smeriglio, notissimus est lapis, præsertim quod eius puluere expoliantur gemmæ, & arriorum omne genus. Vitrum quoq; Smyride lapide finditur, quemadmodum & adamante, tanta inest ei durities. Huius uires Galeno lib. IX. simplicium medicamentorum, his uerbis describuntur. Sed & Smyris uocata, quod multum abstergentem habeat facultatem, clarum est, uel ex eo quod dactyloglyphi, hoc est, qui anillos exculpunt, eum in usum illo utantur. Quinetiam quod dentes pueros efficiat, experti sumus. Lapis, qui Græcis *λίθος σμυρῖνος*, Latinis lapis Smyris appellatur: Italicè, Smeriglio. Quæ uerò Latinis Arena litoralis, Græcis *ἀμμος αἰγιαθίνης* Italicè Arena marina dicitur.

Nomina.

### Lapis naxius.

### Cap. CXXV.

**E COTE** Naxia, quod exacuendo ferro deteritur, illitum alopecias ad pilum reducit. uirginum mammas cohibet, nec increfcere patitur. Potum ex aceto lienem absūmit, & comitialibus prodest.

### Lapis geodes.

### Cap. CXXVI.

**GEODES** lapis adstringit, siccat, caligines oculorum discutit. Illitus autem ex aqua testium, mammarumque inflammationes sedat.

Nomina.

**NAXIVM** lapidem, itemq; Geoden, nullus est, quod equidem sciam, qui hodie cognoscat ostendatq; in Italia uel ibi inuentos, uel aliunde allatos: tametsi in Misnia, & Saxonia nasci hos scribat Agricola. Naxius autem, Galeni testimonio, non solum uirginibus mammarum incrementum prohibet: sed & pueris testes crescere non patitur, tanquam uidelicet particeps facultatis refrigeratorie. Lapis, qui Græcis *νάξια*, Græcis, Latinis lapis Naxius.



*xius, ut etiam Italij pietra Naxia nominatur. Qui uero λίθος γεωδης Græcè, lapis Geodes Latine, pietra Geode* Nomina.  
*Italicè dicitur.*

## Terra omnis.

## Cap. CXXVII.

OMNIS terra, ad medendi usum recepta, summam & primam uim habet refrigerandi, meatusque obducendi, occludendiq; sed specie distat, cum alia adiunctis quibusdam ad alia sit utilis.

## Terra eretria.

## Cap. CXXVIII.

ERETRIADES duæ sunt, una uehementer alba est, altera cinericia. Optima habetur ad cinereum colorem uergens, perquam mollis: quæ si per æramenta tractim ducatur, lienem uiolaceam refert. Lauatur, ut cerussa, aut hunc in modum. Teritur seorsum, & cum aqua, & ubi pessum ierit, humor leuiter excolatur: siccata solibus, iterum teritur interdum, adiecta aqua, ut uespere confidat: antelucanis colo excernitur, & demum in sole trita, si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si tosta desideretur, pastilli magnitudine ciccris in fictile perforatum conijciuntur, oreque uasis diligenter obturato, supra carbones candentes continenter follibus perflantur: ubi uero cinis in fauillas se conuertit, aut aerum colorem contraxit, exempti reconduntur. Vim habet adstringentem, & refrigeratorem, leuiter mollientem: caua explet, & sanguinolenta conglutinat.

## Terra samia.

## Cap. CXXIX.

SAMIA præfertur candida, leuis, tangenti linguæ glutinis modo adhærescens, mollis, succosa, friabilis: cuiusmodi est, quam aliqui collyrion uocant. Duæ enim species eius: unam antè diximus, altera aster appellatur, crustacea, & cotis modo prædensa. Vritur, ac lauatur, ut eretria, uimque consimilem habet. Sanguinis reiectiones sistit: scæminis fluxione vuluæ laborantibus, cum flore syluestris punicæ datur. Testium, & mammarum inflammationes, illita ex rosaceo, & aqua, refrigerat: sudores arcet. contra serpentium morsus, & uenena pota ex aqua auxiliatur.

## Lapis samius.

## Cap. CXXX.

SAMIUS lapis in Samia terra inuenitur, quo aurifices utuntur poliendo auro, ut resplendeat. Probatur candore, & durtia. Vis ei adstrictoria, & refrigerans. prodest stomachicis potus. sensus hebetat: verum ad fluxiones oculorum, & ulcera, cum lacte efficax est. Partus, ut tradunt, adligatus accelerat, & conceptus scæminarum custodit.

TERRA, quam Samiam uocant, an ex Samo deferatur in Italiam, non equidem ausim affirmare: tametsi hæc usum in medicina maximum præstiterit Galeni tempore, qui ea, quæ aster appellatur, tanquam præstantiore semper usus est: huic tamen Dioscoridi præfertur illa, quam aliqui collyrion uocant. Sunt qui putent Samium astra illum esse lapidem, quem seplasse Talchum nominant. Sed ij, meo quidem iudicio, hallucinantur. quandoquidem Talchus lingue contactu nunquam glutinis modo adheret, attritu contumax est, nec cotis instar prædurus uisitur. Adde quod Talchus non sit crustosus, sed squamosus, translucidus, ut vitrum, ac leuis: & quod non nisi magno labore, & diutino igne comburi possit: nec id quidem per se fieri potest, nisi quibusdam admistis. quod tamen Samio aperi non euenit, utpote qui facile, teste Dioscoride, eretria terra modo comburatur. Ad hæc sciant medici Talchum ebibitum strangulare, non secus ac gypsum: cum tamen Samius aster perinde atq; Lemina terra, contra uenena, & uenenosorum serpentium ictus maxime auxiliatur, & ut illa labijs & lingue inhereat. Id quod aliquando animum traxit ad credendum, eam terram uel Samiam, uel Samiæ similem esse, quam magnificiunt circulatores, qui serpentes circumferunt, à Melita insula allatan: quamque uulgò uocant Pietra di san Paolo. Siquidem hæc colore candida spectatur, lingue tangenti pertinaciter adhærescit, mollis est, & succosa, facileq; friabilis: & aduersus uenena, & serpentium ictus Lemniæ uicem explet. Cæterum neq; illud ausim asserere, quod lapis Samius uocatus ad nos conuehant mercatores, quo aurifices aurum, & argentum antiquitus poliebant: etsi hunc quoque in Germania reperiri scribat Agricola. Terra Samia sic Latinis, atque Italij, ut γῆ σαμία Græcis appellatur. Lapis uero λίθος σαμῖος Græcè, Lapis Samius Latine, & pietra Samia Italicè nominatur.

Terræ Samiæ consider.

Nomina.

## Terra chia.

## Cap. CXXXI.

CHIA eligi debet candida, uergens ad cinereum, Samiæ similis. Est autem crustosa, albaque, sed fictitij formis differens. Vis eadem, quæ & Samiæ. extendit faciem, & erugat, atque splendidam reddit: colorem in facie, & corpore toto commendat. in balneis pro nitro deterget.

Terra



## Terra selinusia.

Cap. CXXXII.

E A D E M præstat Selinusia. maximè laudatur, quæ uehementer resplendet, candida, friabilis, & humore dilui celerrima.

## Terra cimolia.

Cap. CXXXIII.

CIMOLIAE duo genera, candida, & ad purpureum inclinans. Optima existimatur, quæ innatam habet pinguitudinem, tactuque frigida sentitur. Vtraque aceto diluta, parotidas, & alia tubercula discutit. Ambusta igni, si statim cimolia oblinantur, pustulas non sentient: testium duritias, & totius corporis collectiones cohibet: igni sacro imponitur. In summa, utraque multum in medicina commendatur, si incorruptæ originis, nec spuria assumatur.

## Terra pnigitis.

Cap. CXXXIII.

QVÆ pnigitis dicitur, colore ferè eretriæ similis est, grandioribus tantum glebis: manum si quis admoueat, refrigerabit: tactu linguæ usque adeo glutinosa, ut pensilis hæreat. Cui effectus idem, qui cimoliæ, paulò tamen infirmior. Hanc aliqui pro eretriade uendunt.

## Testæ fornaceæ.

Cap. CXXXV.

FORNACEAE testæ uehementer tostæ, crustas ulceribus obducunt: quare prurigini, & pularum eruptionibus, medentur. Podagricis prosunt: strumas discutunt, cerato exemptæ.

## Terra fornacum.

Cap. CXXXVI.

FORNACVM terra, quæ retorrida fuluescit, eiusdem cum testa effectus.

## Terra melia.

Cap. CXXXVII.

MELIA colore cineream eritream imitatur, aspera tactu: ea digitis friata, derafi pumicis modo crepitat. Vim habet aluminosam, sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur: modicè linguam siccit: purum corpus reddit, & colorem commendat: pilos extenuat: vitiligines, & lepras abstergit. Pictoribus usum præbet, ut colores diutius perennent. Emplastris uiridibus, quæ chloræ dicuntur, efficaciter inferitur. Ex omni melia terra, & omni alia in uniuersum, eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attigerit, faciliè resoluatur.

QV ANVIS terra Eretria, Chia, Selinusia, Cimolia, Pnigitis, & Melia antiquis notissimæ fuerint, & in usu medico frequentissimæ, ut auctor est Galenus; tamen ab his, qui nos præcesserunt, adeò neglectas fuisse constat, ut nulla amplius, quod sciam, ad nos adferatur. Quamobrem non operepretium duxi, ut in singulis moram traherem, ac de earum historia & uiribus latius differeremus. Quæ terræ γῆ χία, σεληνισία, κιμωλία, πνιγίτις, μελία Græcis, Latinis, terra Chia, Selinusia, Cimolia, Pnigitis, Melia: Italis, terra Chia, Selinusia, Cimolia, Pnigite, Melia uocantur: Arabibus uero terra Cimolia Teri chimolea, seu Thin chimulia. Pnigitis, Teri hanem.

## Terra ampelitis.

Cap. CXXXVIII.

EX AMPELITIDE terra, quæ pharmacitis nomine in Seleucia Syriæ nascitur, laudatur in primis nigra, piceæ longos carbones referens, modicè assulosa, æquabili splendore, quæ detrита, accepto oleo, statim eliquescit. Vitiosa censetur candida, & cinerea, quæ in liquorem non resoluitur. Vim dissipandi, & refrigerandi habet. ad calliblephara additur, tingendis capillis idonea. Vfus eius ad illinendas uites, sub germinationis tempus, utpote cum innascentes uermiculos enecet.

Ampelitis  
terre confid.

AMPELITIS, ut auctor est Galenus libro nono simplicium medicamentorum, hoc sibi nomen iure uendit, cauit, quòd antiquis in frequenti haberetur usu, ad præseruandas ab erucis uitium gemmas prima earum germinatione, quemadmodum nos uisco circumlito nostras tuemur in Hetruria. Pharmacitis uero dicitur, quòd medicamentosa maximè sit. Siquidem non modò uermiculos ad uites ascendere inhibet, sed etiam eos interficit. Hæc usque adeò bitumine referta est, ut Plinius, & Posidonius, bitumini similem ipsam fecerint. Cuius experimentum est, si faciliè in olea impoita, liqueat. Quamobrem credidere nonnulli Ampelitim terram crustosum illum fuisse lapideum, quem scribit Galenus se inuenisse in Lyciæ litoribus, & in Cœle Syria, qui in ignem coniectus leuiusculam edebat flammam. Hoc argumèto nixi, quòd idem scripserit se reperisse lapidè illū in quodam colle omni ferè ex parte circumdato ab Asphaltite



*Sphalite lacu, quem Sodomeum uocant : ex quo bitumen in ipsum labitur lacum . Quapropter non desunt, qui dicant, Galenum haudquaquam nouisse, eos lapides nil aliud esse, quam terram ampelidem . quæ cum piceum referat carbonem, ut Dioscorides ipse testatur, non mirum, si potius lapidis, quam terræ speciem præ se ferat . Non ab re itaq; credendum fuerit, Ampelitim terram non admodum à Gagete lapide differre . quippe quod utræque ex terra & bitumine suam traxerint originem . Ampelitis imperriniè è Carniola, ubi foditur, ad me allata est, nullis reclamantibus* Nomina.  
*notis . Hæc, quæ ἡ ἀμπελίτις Græcis, Latinis terra Ampelitis appellatur : Arabibus, Thin alcharin : Italis, Terra ampelite .*

## Fuligo Pictoria.

## Cap. CXXXIX.

*FULIGO, qua pictores vtuntur, ex vitrijs officinis colligi solet : siquidem ei palma tribuitur . Vis ei ad adstringendum, & erodendum efficax . fracta, cum rosaceo cerato ad cicatricem perducit .*

## Atramentum Librarium.

## Cap. CXL.

*ATRAMENTVM, quo scribimus, fuligine è tedis coacta colligitur . In singulas libras gummi, ternæ fuliginis uncia adijciuntur . Fit etiam è resinarum, & pictoria fuligine, de qua paulo antè diximus . Assumitur autem fuliginis mina, gummi sesquilibra, glutinis taurini, atramenti sutorij, singulorum fescuncia . Additur conuenienter erodentibus medicamentis . ambustis, ex aqua comodè crassius illinitur, sed non antè soluatur, quam cicatricem induxerit : sanatis siquidem vlceribus, sua sponte decedit . Cæterum habes, amicissime Aree, ferè quæ tradenda duximus pro operis modo, quem destinaueramus, & materiæ, auxiliorumq; medicinalium copia .*

*DE FULIGINE pictoria, atque etiam de Atramento librario latius & apertius à Dioscoride scriptum est, quàm ut de his plura nobis supersint dicenda, uel declaranda . Quare iam unà cum auctore nostro, huic quinto libro finem imponamus . atque insuper DEO, cui omnia, quæ à nobis sunt, aut dicuntur, accepta ferre par est, imensas agamus gratias . Ea fuligo, quæ ἀσβόλη ζωγραφικὴ Græcè, Latine Fuligo pictoria dicitur, quemad-* Nomina.  
*modum Italis Fuligine de pittori . Quod uerò μέλαν γραφικὸν Græci, Latini Atramentum librarium, Itali Atramento librario, aut Inchiostro nominant .*

## LIBRI QUINTI FINIS.



# PETRI ANDREAE MATTHIOLI MEDICI

## Senensis Commentarii,

IN LIB. SEXTVM PEDACII DIOSCORIDIS  
ANAZARBEI, DE LETHALIBVS VENENIS,  
EORVMQVE PRÆCAVTIONE,  
ET CVRATIONE.

### Præfatio Dioscoridis.



UPERIORIBVS, amicissime Arce, libris tradidimus de Aromatibus, oleis, vnguentis, arboribus, & earundem fructibus, lacrymisq; : item animalibus, melle, lacte, seuo, frumentis, oleribus, herbis, radicibus, liquamentis, vinis, metallisq;. In hoc verò totius operis vltimo, facultates medicamentorum recensebimus, quæ prodesse nobis, aut officere possunt. Vitata igitur orationis prolixitate, opus institutum prosequamur. Huiusmodi autem tractatus cum bifariam distributus sit, in partem venena præcauentem, ita vt ne fallant sumentes, aut si quando per imprudentiam dentur, vt tum quoque innoxia fiant, irritaq; : & in rationem ijs succur-  
rendi, qui iam noxam sentiunt : primum differam de præcauendi modo, quem esse difficillimum plerique maiorum arbitrantur, quòd dantes clam venena ita insidias temperant, vt peritissimum quenq; decipiant. Siquidem venena sua amaritudine, permistis dulcibus, spoliant, & graue odoris virus mistura odoramentorum eximunt. Aut medicamenta immiscet, quæ tuendæ sanitatis gratia dari putantur, & præsertim in valetudine, vt absinthium, tragoriganum, satureiam, aut hyssopum, quinetiam thymum, irim, origanum, abrotonum, castorium, aut si quid medicamentis purgatorijs cognatam habere qualitatem videatur. Aut potionibus inserunt, vt vinis asperis, iuribus, passo, mulsæ aquæ, multo : succis, ut in cremore lentis, polentis : aut medicaminibus, aut alijs, quæ assumuntur, edulij speciem referentibus. Quare qui in ea suspicione sunt, conditos cibos vitare debent, omniq; intenso sapore dulcium, aut salforum, aut acidorum abstinere : nec sitibundi affatim bibere, aut esurientes voraciter comesse, semperq; ad saporem horum diligenter attendere, præsertimq; potu frigidam aquam præsumere. Satiato enim appetitu, qualitates ægerrimè postea concoquuntur. In ægris quidem facile cauemus potiones auxilij prætextu dari solitas, quas offerunt improbi veneficiorum artifices : itaque ob id laborantes morbo non perinde audentium iniurijs patent. Et hæc quidem ne facilè incanti seductiq; homines capiuntur dolis veneficorum, ratio est, & facultas. Sed alia superest expeditior, vt suspiciosi aliqua præsumant, quæ venenorum vires hebetent, & inefficaces irritasq; reddant : cuiusmodi caricæ sunt cum iuglandibus nucibus manducatæ, & quæ cedromela vocant, id est citria, seminisq; napi drachma cum vino. Item folia calaminthæ, aut creta, quæ Lemnia sphragis appellatur, pondere pari cum vino : aut rutæ folia, & nucis iuglandis nucleum : aut caricæ duas, & salis callum ieiuni sumant, & nullo veneni genere ledentur. Antidota ex vino sumpta, eundem effectum præbent : inter quæ intelligitur magnum Mithridatium, & quod scinco, & quod sanguine temperatur. Quin & sepe venenis obsistunt peculiares quidam corporum affectus certo quodam modo constitutorum, cum quadam cibi, potusq; qualitate, tum vini copia ita temperatorum, vt cum venenis dissentiant. si quidem ingesti veneni vires frangunt, atque iam priore alimento factis, præclusisque meatibus, obstant, ne membratim per digestionem insinuetur. Verum enimvero, quoniam fortunæ necessitas interdum similia discrimina peregrè agentibus adfert, absque vllis insidijs hominum, non nihil differendum mihi de hac re necessarium duco. Jam primum igitur culinam apparare loco subdiali conuenit, cibosq; & potus in huiusmodi loco struere. Si id fieri commodè nequit, secunda erit conditio hæc, apparandi, apponendiq; sub tecto. Sed tum diligenter laquearia animaduertenda : frequenter enim à superioribus contabulamentis animalia decidunt exigua quidem, sed quæ non modicam perniciem moliantur, vt phalangia, stelliones, & alia quædam reptilia. Porro vinaria vasa diligenter



diligenter intueri oportet: namque reptilia odore vini illiciuntur, quæ interdum sorbendo, noxium virus eructarunt, interdum verò delapsa immerſaq; expirarunt, & exitij cauſas haurientibus attulerunt. Sed hæc hæcenus dicta ſint, ne cauti, & prouidi inſidijs pateant. Quòd ſi qui ſua ſponte, aut ex quorundam inſidijs ſumpſerunt, auxiliari primo quoque tempore oportebit. ſiquidem dum comites ſingulorum venenorum notæ expectantur, immedicabile fit venenum, & pauliſper neglectum, medicamentis ægrè cedit. Quare ſi qui pro comperto ſe virus ſumpſiſſe intelligunt, & fateantur, aut eorum, qui aderant, teſtimonio conſtet, protinus ad idonea remedia tranſeunt, faciliè peculiari, natiuæq; conſtitutioni reſtituimus. Neque enim ijs aſſentimur, qui prorſus auxilia in huiusmodi fruſtrà adhiberi contendunt. Quo enim modo morbi, quorum cauſæ cæcæ, latentesque corporibus inſident, medicinam admittunt, & quæ forinſecus incurrunt venena, medendi rationem aſpernantur? Acquè verò omnes morbi pro cauſarum ingruentium magnitudine, proque antecedentibus affectionibus, qualitatibusque, quibus ſit opportunum corpus, vel medicabiles ſunt, vel nullis cedunt medicamentis. Quòd ſi qui forſan obmutefcentes, aut remulenti, aut nolentes alioqui venenum à ſe egeri, nullam nobis eius cognitionem præbeant, tum protinus accedendum ad ea, quæ communiter epotis quibuſcunque venenis opitulari conſueuerunt. Atqui nullum magis in omnia ualens auxilium dari poteſt, quàm vt proximo loco virus foràs exauriatur, priuſquàm inualeſcat. Quare ſine mora calidum oleum ex aqua, aut ſeorſum, vt vomitare cogantur, dari conuenit. Aut ſi oleum naturali loci negat, butyrum cum aqua calida, aut malua, aut lini ſemine, aut trago, vrtica, fœno græco, aut halicæ decocto, vicem eius exhibebit. Hæc enim non modò vomitionibus exigent vi illa ſua laxatrice, aut nauſeam ciente; ſed aluum quoque ſubducent, & corporum inanitione ita aduerſabuntur, vt acrimonias venenorum hebetent. Id quod euidenter huiusmodi argumento deprehendere licet. Eſto, vt quiſquam viua calce, vel fæce, aut cantharidibus, aut alio quouis acri, corpus exulcerare ſtatuierit, iſ ſi ipſum oleo leniter illinat, exulcerationem non accipiet. Atqui neque vehementer adſtringi corpus, neque refrigerari poterit, ſi antea perungatur. Quinetiam vomitis non ob id modò, quòd vacuet, & noxium humorem excernat, iuuamentum adfert; ſed quòd aſumptum virus nonnunquam odore, coagulatis grumis, aut colore prodat. quippe cum odore, & amaritudine, meconium: colore, ceruſſam, gypſumve: grumis, lac aut ſanguinem animalis recens iugulati oſtendat. Nam grauis odor regeſtorum, leporis marini, aut rubetæ veneficia deprehendit: ita vt nonnulla ab ijs remedia peti poſſint, ad idonea ſingulorum auxilia tranſeuntibus. Oleo etiam maluæ decoctum admifcetur, aut glaucium, aut adeps anſerinus, aut pinguium carniū iura, aut lixiuium lignorum cinere factum. Vbi verò vomitus diligenter citatus fuerit, ne quid in ventre coierit, quæ hæſerunt inteſtinis reliquæ, clyſtere acri deuocentur. Facit & nitrum tritum cum hydromelite ſumptum, & vina vetera liberalius epota, gallinacea iura, præpingues piſces, vetuſtæ carnes pingueſq; & quæ adipe aut recenti butyro parantur. Aluum nanque ſubducunt, uti diximus, & ſtomachum reſoluentia, prouocant ipſum ad vomitum reddunt: & venenorum acrimonias hebetant, atque meatus obſtruentia, celerem virium penetrationem inhiſcent. Quinetiam medicamenta dantur, quæ comuni dote proſunt, vt Lemnia terra, agaricum, abrotonum, irio, radix eryngij, ſemen paſtinacæ, & calaminthæ, nardum Gallicum, caſtorium, ferulæ virentis medulla, ſlos rhododendri, ſuccus marrubij, laſer, aut laſerpitium, ſagapenum, peucedani ſuccus, aut panacis, & radix, quam magudariū appellant, ariſtolochia longa, ſylueſtris rutæ ſemen, & betonicæ, quam celſtron nominant, folia. ſingula cum vino drachmæ pondo ſumi debent. Effectum præbet polij decoctum, & ſeſeli, & liquida pix linctæ. Magnificè ferunt opem antidota, quæ in calce operis ſcripta reliquimus. Communis ratio præſtandi auxilij ita ſe habet. Cæterum ab ijs, quæ conſueuerunt euenire, communia remedia ſumptitari poſſunt. Ferè enim vires venenorum quàm plurimorum in aſſectus conſimiles corpus tandem redigunt. Quam ob cauſam plerisque communia conducunt auxilia. varia etenim ſunt uenenorum genera, communes tamen, nec multi iſdem aſſectus oriuntur. Neque fieri poteſt, ut omnes concurrenteſq; caſus, quæ ſymptomata uocant, vnum uenenum ſequatur. alioquin ſuperuacanea fuiſſet uenenorum ſingulorum traditio, cum ſuis remedijs ab auctoriſus deſcripta. Neque uerò in uno eodemque promptum eſt inuenire, ut quis ſtomachi, alui, inteſtinorum, iccoris, renum, & ueſicæ dolore uehementer crucietur, ut ſingultiat, erodatur, contremiſcat, refrigeretur, obmutefcat, conuellatur, pulſus elangueſcat, ſpiritus difficilis fiat, ueterno prematur, uertigo obuereſcet, caligent ſenſus, ſtranguletur, ſitiat, ſanguis erumpat, febre conſiſcet, ægrè lotium reddat, torminibus vexetur, crebrò uomitet, nauſea prematur, rubefcat, liuore ſugilletur, paleſcat, deſipiat, ſtertat, uiribus deficiatur, & pleraque alia faciat, patiatuſq;. ſingula enim in generalibus aſſectibus deducta, pauca numero, & communia ea demonſtrant, quæ euenire conſueuerunt. Quare in ſingulis, quæ ſuprà diximus, non faciliè fuerit deuoratum uirus cognoscere. Nam oris & lingue eroſio, ſtomachi, uentris ueſicæ ac renum inſtammatio, uehemens urinæ difficultas, & interdum cruoris cum eo exitus, lacinatio, & in pluribus partibus quidam aduſtionis ſenſus, non in cantharidibus modò potis reperiuntur; ſed in erucis quoque pinorum, & bupreſte, & ſalamandra. Porro non modò eos, qui meconium hauſerunt, ueterno, aut ſopore premi, ſtertere, liuore ſugillari, torpere, refrigerari, ſtupeſcere toto corpore pruritum ſentire, ſenſu priuari conſtat: ſed eos etiam, qui man-



dragoram, aut cicutam deuorant. Delirium non hyoscyamus tantum infert; verum etiam, quæ toxica appellantur: itidem aconitum, & mel, quod in Heraclea Pontica gignitur. Strangulatio non minus in fungis, quam in sanguine taurino, lacte, aconito, cerussa, gypso conspicitur. In summa, difficile vnum vni veneno proprium inuenire signum, quod hauustum, gustatumque virus prodere possit: maxime, quod hæc cæterorum etiam vitiorum, quæ in corpore exoriuntur, communia sequi solent. Cæterum in his, quæ celeriter enecant, noxam signis forsitan indicare possis, si ad ea respueris, quæ sumus dicturi. Sed in ijs, qui ad longas ægitudines spectant, nihil ad medendi rationem difficile, duntaxat quod pertineat ad indicia noxæ, utpote cum venena statim, atque præsentaneam vim illam perdididerunt; transmutata in longos affectus, communia reliquorum vitiorum remedia, compositionesque flagitent, cum uenefica proprietas non amplius insit. Si uero longa sit affectio, in aliquod diuturnorum morborum genus recidet, à quibus facile fuerit medendi rationem assumere. Sed de ijs, quæ generaliter auxiliantur, hæc tenus. Consequenter quæ priuatim singulis profunt, scriptis mandabimus, si prius sigillatim exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitialem, aut maleficam vim fortiantur, ut medicinarum studiosi ea cautè obseruent, quæ ad rationem salutis scripta inueniuntur: quod nonnulla eorum, quibus utuntur, uenenis sint commista. Incuria enim magnas adfert noxas, & sæpe continuo usu eorum, homo in perniciem agitur. Proinde animalia, quæ exitiosam vim habent, hæc sunt: cantharides, buprestis, salamandra, pinorum eruca, lepus marinus; rubeta, & rana palustris muta, deuorata hirudines. Semina sunt, hyoscyamus, coriandrum, cicuta, gith, psyllion. Liquamenta, meconium, opo carpason, thapsiæ succus, elaterium, mandragoras. Radices, quas mittit chamæleo, aconitum, thapsia, ueratrum, ixia, agaricum nigrum, ephemerum, quod aliqui Colchicum uocant; quod in Colchide nascitur. Arbores, herbæ, olera: smilax, quam aliqui cithymalum appellant. Romani taxum: solanum manicum, quod & dorycnium dicitur: fardonia herba, quæ ranunculi genus est: corniculatum papauer, pharicium, toxicum, ruta syluestris, fungi. Ab animalibus, taurinus sanguis recens, lac intus coagulatum, mel Heracleæ in Ponto genitum. Metalla, gypsum, cerussa; calx, auripigmentum, duo sandarachæ genera, spuma argenti, adarce, plumbum, & quod argentum uiuum dicitur. E liquoribus domesticis, uinum abunde post balneas potum, aut passum, & frigida aqua similiter.

## COMMENTARIUS MATTHIOLI.

Beneficium à  
Diosc. in pos-  
teros colla-  
tum.



AGNUM SANE; & immensum beneficium acceptum referre debent sapientissimo Dioscoridi non solum medici orbis uniuersi; sed etiam uniuersa simul humana natura. quippe quod is artem medicam illustrauerit quinque superioribus libris, in quibus infinitorum simplicium medicamentorum historiam, ac facultates miro ordine tradidit: sine quibus nullo quidem pacto ægitudines propelli possent, nullaque earum noxa deleari, quibus uita nostra conflictatur, ac tollitur. Sed longè plura adhuc beneficia eidem accepta referri debent, quod deinceps in hoc sexto uolumine, exactissima scientia, mirabiliq; doctrina, ac ratione explicauerit, & quo modo quisque lethalia omnia uenena præcauere possit, & qua etiam ratione succurrat, ut eadem perniciem, uel aliquam inferant noxam, quæ prius per imprudentiam, aut malitiam, uel dolum intus in corpus assumpta fuere. Nam etsi medicamenta tam ad uniuersales, quam ad particulares morbos, qui quotidie inuadunt, affliguntque humanum corpus, necessaria plurimum semper extiterint, apprimèque utilia; innumeri tamen habentur morbi, qui seruata tantum uictus ratione, naturæ diutaxat ope pelluntur. Secus autem euenit ijs, quibus uenenum exhibitum sit. quandoquidem nisi prius haustis præstantibus admodum antidotis ueneno præuenerint, uel post ipsum assumptum remedia non admiserint, rarissime uel nunquam naturæ uiribus seruantur. Quin potius eos plerumque uita deficit, qui uenenum hauserunt, nisi quam primum succurratur remedijs. de quibus ita abunde, accuratèque scripsit Dioscorides, ut Galenus & grauissimus auctor, & medicorum facile princeps, necnon tota posteriorum Græcorum, & Mauritanorum schola, ipsum in hoc adeo diligenter sint imitati, ut ab eo omnem huiusce facultatis doctrinam didicerint. Cuius rei amplissimus testis est Galenus libro primo de antidotis. Quamobrem omnibus perspicuum esse potest, Dioscoridem in hac uenenorum, æque ac in illa medicamentorum facultate, omnium facile principem, et magistrum extitisse. Itaque cum in alios eius quinque superiores libros, commentarios (ut puto) non inutiles conscripserim, me equidem operæpretium facturum putauim, si libro quoque sexto commentarios adderem: præsertim cum nouerim quam utile sit, ac necessariū homines in uniuersum assequi tum modum, tum rationem tam præcauendi, quam curandi uenena, non solum ea, quæ intus in corpus sumuntur; sed etiam quæ uenueosorum animalium morsu, uel ictu eiulantur, & relinquuntur. Siquidem malefica uenenorum uis, adeo grauis, & potens humanæ naturæ semper extitit inimica (huic enim magis, quam cæteris aduersatur) tantaque uelocitate suum exequitur munus, ut sepenumero eundem præstet effectum in corporibus nostris, quem præstat uoracissimus ignis, si quando ad aridissimas peruenerit paleas. Fit enim, ut plerumque uenena, dum iubent qui sumpserunt, uel icti languent, medicos accersiri, eosque corporis humores inficiant, atque etiam principes partes, ut subinde nihil, uel parum prosint remedia, & quam præstantissima antidota. Quapropter rectè Galenus lib. III. de simplicium medicamentorum facultatibus cap. XXIII. scriptum reliquit, quod quando uenenum putredine, & erosa

Ratio com-  
mentariorum  
in librum sex-  
tum.

stione enecans, grauem corpori intulerit noxam, fieri quidem non potest, ut amplius uincatur, supereturque, uel ui-



ctus ratione, uel generosorum medicaminum ope. Ex hoc itaque accepi, clareq; cognoui, quod si in hunc quoque li-  
 brum sextum commentarios non scripisssem, præstantiorem, magisq; uitæ humanæ necessariam medicamentorum par-  
 tem, intactam silentio præterisssem. Quæ quidem pars, cum præterea à nobis ex Dioscoride pluribus antè annis in  
 Italicam linguam uersa habeatur, ac etiam his nostris commentarijs enarrata, causa nimirum erit, qua potissimum in-  
 numeri homines, non modò à mortiferis se tueantur uenenis; sed à morte quoq; liberentur. Nam quicumq; in hos no-  
 stros incidit commentarios, qui Italici, aut Latini sermonis non fuerit prorsus ignarus, quanquam non fuerit me-  
 dicus, non tantum sibi ipsi; uerum etiam alijs adiumento esse poterit. Nempe quod usus medicamenti tum simplici-  
 bus, tum compositis ad uenenorum noxam facientibus, quorum inferius præstantiora, ualentioraq; referam: quinetiã  
 conuenientibus usus cautionibus, faciliè aliquando ueneno prorsus medebitur, aliquando autem tandiu ægros uiuos tra-  
 ducet, quandiu diligentissimis medicis accersitis, qui non semper præstò sunt, sed magna ex parte uel longè distant,  
 uel absunt, integrum medendi locum relinquet. Sed antequam modum, ac rationem præcauendi uenena in medium  
 asseram, non alienum duxi ad ampliorem huiusce rei doctrinam, nonnulla in uniuersum præmittere scitn, ut arbitror,  
 necessaria, ut sine quibus tractatio hæc diminuta, et imperfecta uideri posset. Primum itaque dixerim (ut etiam  
 Conciliator inquit in libro, quem de uenenis edidit) uenenum omne intra corpus nostrum assumptum omnibus suis fa-  
 cultatibus prorsus opponi cibo, quo nutrimur. Nam quemadmodum cibus in nostri corporis sanguinem uertitur, fitq;  
 in omni sui parte membris, quæ præcipuè nutrit, similis, locum illius, quod continuo in nobis exoluitur, subin-  
 trans; ita uenenum contrario modo se habens, corpus, ac membra, quibus primò adhæret (ut infra latius dicetur)  
 in libi peculiarem uenenatam naturam transfert. Vnde quemadmodum animalia omnia, omnesq; fructus, quæ terra  
 parens gignit, quæq; in nutrimentum uerti possunt, si à nobis edantur, in nostrum transeunt alimentum; sic per oppo-  
 situm modum, uenenata intro in corpus sumpta, uniuersa corporis nostri membra uenenata reddunt. Quippe cum  
 omne agens suo passo sit fortius, uenenum ui sua agendi ualida, nostram nincit substantiam, uertitq; in suam uenena-  
 tam naturam, ea sanè ratione, qua ignis sua ui agendi potentissima paleas celerrimè in se ipsum conuertit, et confi-  
 cit. Ob id itaq; dixere antiqui rerum naturalium exploratores, quod uenenum homines interficit corrupta corporis  
 temperie, et compositione. Id quod maximè comprobatur Galenus lib. III. de simplicium medicamentorum facultatibus,  
 ubi in hoc, inquit, differt alimentum à medicamento, quod hoc nostrum corpus alterat suis qualitatibus, illud  
 uerò conuertitur, fitq; substantiæ corporis simile. Porro scire conuenit (ut Auicenna, et Auerroes posteritatis  
 memoriæ prodiderunt) uenena in uniuersum trium esse generum: ut enim aut à plantis, aut ab animalibus, aut à me-  
 tallis exitiosam uim habent; ita inde discrimina sortiuntur. In plantis igitur cæ omnes inter uenenata recensentur,  
 quæ ciborum naturæ omnino repugnant, et aduersantur: quæ natura non eiusmodi sunt, ut esitate in alimentum con-  
 uerti possint. quinimo contrariam obtinent facultatem, ita ut membra iam nutrita in se ipsas conuertant. Cuiusmo-  
 di est elleborus, aconitum, cicuta, napellus, Sardonias herba, nerium, et alia quàm plurima plantarum genera, de  
 quibus in processu pluribus seorsum agemus. In animalibus ea omnia ueneno inficiunt, cuius natura humanæ prorsus  
 aduersatur. Patet id in uiperis, aspidibus, basiliscis, lepore marino, rubeta, scorpio, phalangio, salamandra, ra-  
 bidis quadrupedibus: item in morticinis carnibus, aut à fulmine occisis, aut à uenenosis, et rabidis animalibus. Cæ-  
 terum hac in re, licet nonnulli dicant uenenum cum uita animalis consumi, eo ducti exemplo, quod cerui, lupi, apri,  
 et reliquæ feræ, quæ uenenatis sagittis conficiuntur, innocuè comedantur; scire tamen oportet, hanc regulam desi-  
 cere in his, quæ pestis, aut rabies, aut fulminis ictus, aut uenenosorum morsus enecat. Quandoquidem complures ui-  
 di mortuos esse, qui tantum boues peste confectos excoierant, haud aliter toto corpore tumentes, ac si in hydro-  
 pem incurrissent. In metallicis denique illa omnia produntur uenenata, quæ malefica, ac lethali constant facultate.  
 Quæ sunt argentum uiuum, auripigmentum, sandaracha, magnes, et similia. Ad hæc sciendum est uenena non  
 solum interficere per os sumpta, sed interdum etiam extrinsecus applicata, uarijs ac diuersis rationibus. Porro quæ  
 per os sumpta uenena uitam adimunt, sub ciborum, aut medicinarum specie plerumq; propinquantur. Quæ uerò exte-  
 rius tantum adnota inficiunt, ut plurimum à uenenatis, et mortiferis animalibus desumuntur. Siquidem hæc homines  
 non morsu modò, uel ictu necant; sed uisu quoque, sibilo, et tactu (ut quidam scribunt) interimunt. Quinetiam non  
 desunt uenena, quæ gustatu, olfactuq; tantum statim hominem in perniciem agant nulla temporis mora. quæ quidem  
 inter cætera malitiæ, et atrocitatis principem locum obtinent: quippe quod secum deferant præsentaneum interi-  
 tum, ex quo nullum subinde fiat reliquum infelicibus moribundis succurrendi tempus. Cæterum morsu, ictuq; inter-  
 ficiunt uiperæ, aspidēs, scorpiones, phalangia, pastinacæ pisces, rabidi canes, et alia id genus plura. Visu autem, et  
 sibilo (ut auctor est Galenus libro de theriaca ad Pisonē, si tamen Galeni legitimus est liber) statim inficit basiliscus.  
 Tactu alius serpens enecat, de quo agens Auicenna lib. III. fen. VI. narrat, quod is à milite quodam hasta infixus  
 uirulentam uim per hastam transmisit ad manum, quam primò infecit, et deinde totum corpus corruptum. Ad huiusce  
 rei probationem illud sanè compertum habeo, quod in agro Tridentino euenisse scio. Nempe cum rusticus quidā  
 suis esset in uinetis, paruum quendā collem sæpius ascendebat, ut ibi uuarum custodiam ageret. Hinc quadam die ad  
 collis pedem magnum, et horrendum uidit serpentem, cuius capiti supernè hastam satis longam infixit: at dum fixam  
 feram se hinc inde fortiter contorquentem, et hastæ circumuolutam, pro uiribus teneret, magno statim tremore cor-  
 reptus est, quo maximè deterritus uociferans, uiatores, et circumstantes colonos ad se ire rogabat. Quam uociferan-  
 tiam audientes, qui non longè aberant rustici, eo cursu uelociter contenderunt, et ipsum ferè semimortuum inue-  
 nerunt. Cognita tamen ex occiso serpente sui infortunij causa, ad theriacam, et alia antidota confugerunt, quibus  
 eum ad uitam reuocarunt. Veruntamen duobus annis postea is uniuersi ferè corporis stupore in lecto semper decum-  
 bens egrotauit, et eo præsertim brachio, quo perniciosum animal hasta occiderat. Nec admodum mirari rem han  
 nobis licet, cum uideamus (ut etiam literis mandauit Galenus lib. VI. de locis affectis) torpedinem marinam dere-

Veneri ope-  
ratio qualis.

Venenorum  
genera unde.

Venena quot  
modis mortē  
adferant.



pentē piscatoris manum obstupefacere, ac torpidam reddere, ubi primum is tridente eam tetigerit. Id quod similit-  
 ter efficit, transmissa per funem retis qualitate, dum trahitur in litus. Proinde id experientia docti piscatores, si dum  
 retia trahunt, manus torpescere, tremereq; præsentiant, certò torpedinem captam sciunt, et si longo admodum fune  
 trabatur. Vnde illud perspicuum est, quòd si huiusce piscis qualitates per tridentis hastam, & retis quàm longissimū  
 funem transmissæ ad manum, inficiunt & corrumpunt homines, eò magis id ipsum fieri poterit, si animalia ipsa, aut  
 nuda manu, aut alia corporis parte tangantur. Idcirco manifestè constat nullum esse brachium tam ualidum, & ro-  
 bustum, quod torpedinem adhuc uiuentem diutius sustinere possit. Quare admirandum sanè non erit (ut testatur Ga-  
 lenus libro nuper citato) quòd sputum canis rabidi, si humanum corpus contigerit, perinde ipsum rabie afficiat, ac si  
 ab ipso cane esset demorsum: nam & huiusce effectus hac nostra ætate plura afferri possent exempla. Neque etiam  
 alicui mirum esse debet, quòd sputum aspidis cognomento Ptyas, omnes ueneno inficiat, quos contigerit. Hoc idem se-  
 militer efficiunt quædam senissima uenena arte conflata, tanta perueniendi & penetrandi uis prædita, quòd illitis (ut  
 ferunt) sellarum pediferis, insectorum ocreas penetrant, donec ad iudas pedis plantas peruenta, & inde per cutis spi-  
 racula in corpus ingressa, uniuersa eius membra corrumpunt, & absument. Horum usus (ut audio) frequens apud  
 Turcas, & alias ferinas gentes. Ex hac autem re nullam quis capiat admirationem oportet. siquidem arteriæ cor-  
 poris nostri (teste Galeno lib. 111. de simplicium medicamentorum facultatibus, ac alijs in locis) ad se intus trahunt  
 quodcumque proximè circumdat eas, dum continuè dilatantur. Id quod quotidie liquet ex inunctionibus, ac suffitibus  
 ad morbum Gallicum paratis. quippe eadem ab arterijs attractæ, ubi argenti uiui, cinnabaris, uel sublimati officin-  
 uocati plurimum admiserint, senissima sepe pariuut symptomata. Sunt & alia uenena, quæ olfactu tantum (ut quo-  
 rundam fungorum meminit Rasis) præsentaneam afferunt mortem ijs, qui ea naribus admoerint. Huius summe  
 malitiæ sedem illud sanè tenere debebat, quo florem recentioribus uenonicum uocatum, Senis quidam circumforaneus  
 infecerat, ex his qui innocuè uenenum deuorare profitentur. Quem cum olfaciendum exhibuisset suo concurrenti in  
 publico Senensi foro, is ex solo olfactu derepente concidit mortuus. Præterea uenena quædam sunt, quæ solo gustu  
 tu, quanquam non deglutitur, perimunt: idq; præstat aspidis surdi sputum. Quo memini quosdam imprudenter in-  
 fectos esse. Inter quos uidi ego rusticum in ualle Anania, qui dum fœcum secaret in pratis, firam falce per medium  
 secuit, & cum postea capitis truncum manu cepisset, ut socijs astantibus ostenderet, utpote qui iam firam demortuam  
 fortasse censebat, suspensus manu truncus caput retorfit, & rustici manum seuiens momordit. At ille credens suc-  
 culneri succurrere, os statim morsui admoit. Quo facto derepente in terram cecidit, ubi illico mutus factus depe-  
 rijs. Insuper sciendum est, quòd uenena non uno eodemq; modo, neq; ab una eademq; causa suos pariunt effectus.  
 Siquidem (ut sapientes quidam memorie prodiderunt) quædam agunt excessu qualitatum elementorum, quarum mix-  
 stione constant. Quædam uerò propria tantum qualitate aut forma, quàm occultam proprietatem medicorum quæ-  
 dam appellant, in mistis inferioribus introducta ex influxu linearum rectarum radicalium, quæ ex siderum fixorum  
 splendore proueniunt, pro materia mistorum proportionem seu constitutionem. Alia deniq; utroque modo simul agunt,  
 nempe & qualitate elementari, & propria, quam formam specificam nominat. Porro uenena, quæ excessu tantum  
 suarum qualitatum operantur, suas uariant actiones, pro uarietate ipsarum qualitatum. quippe quòd unum sit calidum,  
 aliud frigidum, aliud siccum, aliud humidum. Quæ igitur caliditate excedunt, duobus modis perimunt. Vno  
 quòd intus in corpus sumpta, excalfaciant, urant, corrodamq; usq; ad cor. Alio, quòd extrinsecus apposita corros-  
 dant, & exedant carnes usque ad ossa: id quod lepori marino adscribitur. Vel quòd summe calæscientia tam intus,  
 quàm extra corpus adurant, quemadmodum euphorbium, & elleborus, donec inflammato tandem corde interimant.  
 Frigida similiter bifariam necem adferunt. Vno modo, quòd exuberante frigiditate sua, usque adeò corpus gelidum,  
 stupidumq; reddunt, quòd simul etiam cor congelascit, ut ijs euenire sæpius compertum est, qui opium deuorant.  
 Altero, quòd obstructis ingenti frigiditate meatibus, aubelium intercipiunt, & proinde suffocant, & strangulant:  
 id quod præstant exustum plumbum, & fungi uenefici. Duplicem & siccum uenenum habet operandi modum, quan-  
 doquidem uel humidum sanguineum cordis absument, ut calx uiua: uel separent ac diuidant partes abinuicem, quoniam  
 quæ omnia membra ad cor usq; in minimas diuidantur partes: quem effectum præbet risagallum uocatum. Huius-  
 dum postremo, etsi aliqui tradant non inueniri, quoniam nullum sit humidum reperire, quòd ad quartum humiditatis  
 excessum peruenierit: oppositum tamen declaratur exemplo illius, qui nocte dum dormiret, à serpente quodam de-  
 morsus (ut Gilbertus Anglicus narrat) mortem obiit: cumq; mane à puero per brachium traheretur (sic enim arbit-  
 rabatur dominum à somno excitare) caro iam uniuersa putredine confecta, tractu illo concidit, ossibus remanentibus  
 carne prorsus exutis. Quod certè non alia de causa contigisse potuit, quàm ab excedente ueneni humiditate, quæ  
 summa sanè inerat feræ illius dentibus. Eundem effectum præstat etiam salamandra, si in puluerem redacta bibatur,  
 ut in processu suo loco docebit Dioscorides. Nec secus illi accidit, quem cenchris serpens momorderit. Quocirca re-  
 ctè proditum est à Galeno ex auctoritate Hippocratis libro primo de temperamentis, quòd cum anni constitutio plu-  
 uialis, humida, & australis fuisset, ea potissimum humiditas fecit, ut succedente æstate carbunculi oriretur: quibus ob  
 corruptam uenenatamq; humiditatem eousque in aliquibus brachia putruerunt, quòd deniq; tota hac ipsa putredine  
 correpta, à cubitis diuisa deciderunt. In alijs uerò tantam coxarum, crurium, & pedum caro putredinem sensit,  
 quòd planè ossa carue destituta remanserunt. In alijs denique non caro solùm computruit: sed simul etiam nerni, ossa  
 eorum compagine, nexuq; contabuerunt. Ex hoc itaque aperte ostenditur reperiri uenena, tanta humiditate exibe-  
 rantia, ut homines interimere possint, utpote quæ membra putrida efficiunt: sicut argentum uiuum, quod sua humidi-  
 tate modum excedente, instum cordi natura humidum sepe corrumpit, ut quotidie uidemus in ijs, qui eo unguetis ex-  
 cepto se inungunt ad luem Gallicam delendam. in quibus præterquàm quòd semper gingiuas, dentes, palatum, aliasq;  
 uicinas partes putredine afficit; sepe etiam ubi uberius quàm par sit, inunctum fuerit, eos in perniciem ducit: quippe  
 quod

Venenorum  
effectus à di-  
uerfis causis.

A qualitib;  
excedētib;.

10

20

30

40

50

60







ferant: exempli gratia in uno mense, uel pluribus, uel ad annum usque, non celerius, neq; tardius determinato tempore. Qua in re in primis auscultandus est Theophrastus grauiissimus, & antiquissimus auctor, qui libro IX. cap. XVI. de historia plantarum de aconito differens, ita scriptum reliquit. Componi autem ita ferunt, ut certis occidere temporibus possit, uidelicet bimestri, trimestri, semestri, anno completo, nonnullum etiam biennio. Pessimè illos de uita discedere uolunt, qui plurimum temporis resistere possint: paulatim enim tabescat corpus, & languore pereat diuturno esse necesse. Facillimè illos, qui confestim obeunt. hæc Theophrasti sententia. Veruntamen omnes ferè rei medicæ studiosos in hanc conclusionem conuenire reperio, quod quauis in uenenorum ueneno inueniantur (ut Theophrastus inquit) quæ celerius, & quæ tardius interficiant; non propterea tamè præsciri potest terminus certus, & dies, quo mortem inferre debent, ut quidam existimant. Nam quod uenena citius, aut serius occidant, non tantum ex immita & propria eorum ui provenire censent; sed etiam quod magis, uel minus resistat eius natura, qui uenenum assumpsit. Id autem planè docet experientia: siquidem constat idem uenenum eodem pondere, uel eadem quantitate diuersis natura exhibitum alios in hora tantum perire, alios in quatuor horis, alios in die, & nonnullis nisi paruum afferre noxam. Id quod etiam quotidie experimur in medicamentis, quæ ad deiciendam aluum exhibentur. quandoquidè idem medicamentum eodem pondere, uel quantitate à diuersis hominibus acceptum, in aliquibus summi celeriter præstat effectum, in alijs tardè, in aliquibus parum efficit, in alijs plurimum, in alijs nihil, in aliquibus citra omnem molestiam deiecit, in alijs uerò magno cum labore. Neq; tamen id alia de causa accidere manifestum est, quàm ex uario, dispersiq; agrotantium temperamento: quod non ita ad unguem deprehendi potest, ut certò sciri possit, quandiu inuictus eorum calor ueneno resistere ualeat. At quauis concedi possit, quod quis adeò peritus ueneficus reperitur, ut ex longa experientia, ac pariter scientia tam exactè naturam, & robur uitalis facultatis calleat in unoquoq; homine, ut conijcere possit, quousque perdurare ualeat, ubi uenenum illi sua arte præparatum exhibuerit; non tamen propter hoc is determinatè scire poterit diem, neq; horam mortis illius, qui uenenum assumpsit. non enim fieri potest, nisi diuino iudicio, aut afflatu, ut aliquis medicus, uel philosophus adamusimè expendere possit, ac metiri, quantum humidi substantifici, quantumq; caloris innati in quocunq; sit corpore, præsertim quod non semper in eodem statu persistant principes facultates: quo fit, ut quispiam modò plus, modò minus fortis appareat. tum etiam quod corporis temperamentum plurimum immutent causæ extrinsecæ, quas Græci τροχεταιριὰς uocant. Adde etiam quod quod antidota, quæ à medicis huiusmodi uenenatis continuè propinantur, etsi ueneni uim ob sui contumaciam superare nequeant; impediunt tamen, ne id tam breui tempore perimat. Vanum igitur crediderim esse, quod internas nostri corporis facultates, ac functiones possint (ut quidam rentur) iudicio duntaxat ita exquisitè expendi, ut læce expenditur crocus. Atqui scire etiam oportet, quod etsi hoc magna ex parte euenire possit naturæ ipsius robore, in hoc magis, in illo minus existente; eo etiam tamen prouenit, quod aliqui constent arterijs, quibus uenenum in cor fertur, admodum angustis, alij contrà admodum amplis. Namq; uenenum ubi uias latas expeditasq; inuenerit, non solum celeriter permeat; sed longè etiam facilius unà cum aere prouehitur, qui cordis refrigerio continuè ingreditur. Id quod ijs minimè contingit, qui propterea quod cor minus calidum obtineant, arterijs potiuntur longè angustioribus, quin & spirituum uitalium facultatem ualde imbecilliores habent. Quocirca Galenus tum tertio simplicium medicamentorum censu, tum libro secundo de alimentorum facultatibus, tradidit cicutam hominibus in cibo lethali esse, sturnis autem nutrimentum. Quandoquidem hi arterijs adeò angustis præclisisq; constant, ut nullo pacto per eas ad cor lethalis cicutæ uis, progredi possit. quanquam hoc de frigidis potius, quàm de calidis uenenis intelligi debeat. Huc illud scitu dignum accedit, quod persuasum difficillimum est, uenena, quæ ab impijs ueneficis in diem exhibentur, alterius generis esse ab his, quæ suarum tantum qualitatum excessu perimunt. Nam quæ propria forma ac ui necant, in minima etiam quantitate exhibita (ut Galenus inquit) difficilè cohibentur, quin breuissimo tempore lethale munus obeant suum. Non desunt tamen, qui pro certo affirmant, quæcunq; uenena adeò temperari posse, ut illa celerius, hæc tardius interficiant. quibus equidem refragari non ausim, cum sciuerim admiranda admodum esse secreta naturæ.

Verum quis assue fieri possit, ut uenena innocuè summat.

Quæri præterea solet, num fieri possit, ut quis ita ueneno assuescat, minimè quid de eo quotidie assumens, ut eo tantum ratione, ut reges quosdam, & principes (quod formosissima esset) qui secum rem haberent, inficeret. Quia in re dixerim ego, quod etsi non desint, qui hoc fieri posse asserant: nunquàm tamen ipse adduci potero, ut credam humanum corpus nutriri posse ueneno, & præsertim napello, quo pleriq; rem exponentes eam puellam nutritam esse interpretantur. Siquidem ea historia Arabicæ potius fabulas imitatur, quàm rem aliquam, quæ omnibus naturalis philosophiæ rationibus comprobari possit. Quamobrem constat Gentilem Fulginatè in hoc Auicennæ loco adnixum quidem fuisse, ut hanc opinionem seruaret integram. quod nimirum fidelis cuiusq; expositoris esse debet. Nam postquam eam sententiam ualidis, uerisq; rationibus primum improbasset, denuo (ut assolent) Auerrois, Diniq; auctoritate innixus Auicennæ, & Rufi opinionem probare non dubitauit quibusdam argumentis, quauis nudis, & infirmis. Quorum illud uidetur fortius esse, ubi auctoribus magis, quàm rationibus addictus inquit, Aequum non esse, quod auctores tam graues, tamq; sapientes mendaces uocentur, uariq; habeantur. quippe quod certò crediderit ipse Gentilis Rufum, itemq; Auicennam in ueram historiam hanc rem recepisse, non autem in fabulam. Sed quoniam superuacaneum duco in hoc contere tempus, longa contradicendi oratione, præsertim quod uenenorum medelæ ea nullam aut paruum afferat utilitatem: ideo relictis alijs, in Galeni sententiam facile deuenio. Qui tertio simplicium medicamentorum censu cap. XVI. tradidit uenena calida, & sicca (qualem esse napellum, quo puellam illam nutritam uolunt, non ambigo) nullo modo posse in nutrimentum redigi, etiam quod in quantitate minima sumantur: tametsi frigida uenena quandoq; in alimentum uertantur. Quandoquidem hæc (ut idem auctor est exemplo cicutæ, papaueris, hyoscyami, & mandragoræ) non sui natura interficiunt, sed qualitate duntaxat frigida. Quibus adiicit ipse Galenus hanc historiam



storiam anus cuiusdam Atheniensis, quæ cicutâ in cibo sumebat nullo sanè detrimento accepto. Ea enim (ut idem scribit) modicæ primum quantitati assuevit, mox indies pluri, donec ex magna etiam quantitate, quæ illi in nutrimentum conuertebatur, nullam percipiebat noxam. Ex quo palam fit, Galenum non admittere, quod uenena calida nutrimento esse possint. Id quod minus etiam illis concedit, quæ propria specie, aut occulta causa, ueneni naturam sortiuntur. Inter quæ principè locum obtinet napellus. Quare longè aberrant nonnulli interpretes, utpote qui illud napello tribuant, quod planè cicutæ reddidit Galenus: itaq; fit, ut (quæ eorum inscitia est) historiæ hanc confundant, Galeni uerba peruertant, atq; rem malè interpretentur. Quo etiam in errore deprehenditur Auicenna: nisi interpreti error fuerit adscribendus. Quod postremo ueneni facultas (ut quorundam opinio est) iam concocta, & in illius adolescentulæ substantiam conuersa, potuerit ex anhelitu in alios transire, ac eos subinde inficere, sanè perridiculū uidetur, atque euidentius falsum, quàm ut pluribus explodi mereatur. Ceterum quoniam non desunt animalia, quæ natura cibis uictitant uenenosis, atq; ex eis nutrimentum capeffunt, sicut (Galeno auctore lib. II. de alimentorum facultatibus, & III. simplicium medicamentorum) sturni cicutam depascuntur, & coturnices ueratrum, & ut nos quoq; quotidie uidemus, auates, quæ in stagnis, & paludibus uiuunt, bufones aquaticos deuorant, & iisdem nutriuntur, ciconiæ uenenosis, & mortiferis serpentibus, & gallinæ interdum scorpionibus, araneis, serpentibus, & alijs id genus uenenatis animalibus; ideo inutile non fuerit scire nunquid huiusmodi animalia, quæ uenenosis uescuntur, ab hominibus cibo accepta, inde uenenum inferant, eoque inficiant. Hac in re plerosq; inuenio, imò ferè omnes recentiores, qui de uenenis scripserunt, firmiter asserere, quod si huiusmodi animalia edantur, non modò ueneno non inficere possunt, sed nullam prorsus inferre noxam, quin potius corpus nutrire; non secus atq; alia. quippe quod constat (ut dicunt) ea in suam naturam uenenatos cibos reddere. Quæ ratio, & opinio etsi non absurda, neq; incongrua uideatur; tamen crediderim, quod licet uenenum concoquatur, & transmutetur in eorum animalium substantiam, quorum id perpetuus cibus est, non tamen esse possit, quin caro quæ ex eiusmodi fit alimento, si edatur, omni prorsus careat nocumento. Quinimo putauerim, quod si ea in frequentiore cibum uenerint, possint quandoque morbos sæuissimos excitare, & subinde necem inferre. Siquidem huius rei nobis testimonium præbent Dioscorides, & Galenus. quippe qui pariter affirmant, lac, quod nil aliud est, quàm sanguis bis coctus, ex animalibus emunctū, quæ scamoniam, aut ueratrum, aut tithymalum depascantur, potum mirificè uentrein deicere. Ex quo omnibus perspicuum est, quod omnes in uniuersum plantæ, quibus nis deiectiona, & perniciofa inest, quamuis sæpius concoctæ fuerint, non prorsus tamen suam deiciendi, ac necandi facultatem deperdunt. Id quod similiter manifestum deprehenditur in turdis, qui iuniperi bacis uescuntur: item in gallinis, quæ deuorant absinthium. Quandoquidem illorum caro iuniperum non mediocriter redolet gustatu: harum uerò non paruam absinthij amaritudinem refert. Ab his itaque edocti medici diligentissimi mandant nutriendas esse capellas herbis accommodatis, ubi animus fuerit earum lac exhibere heceticis, aut alijs a lio morbo affectis, quibus tamen conueniat. Hoc quoq; testatur Galenus de uipera sermonem habens lib. XI. de simplicium medicamentorum facultatibus. Ibi enim de dipsade differens, se non ignorare memoriæ prodidit, animantium carnes alterari à cibo, & alimento, quod capiunt. Quare ut summatim quod sentimus dicamus, nullo modo huiusmodi animalia in cibos admittenda esse putauerim, quamuis à nonnullis frequenter recipiantur. Illud porro sciendum relinquitur, quod nonnunquam uenena, quin & medicamenta uenenata tam interius sumpta, quàm exterius apposta morbis succurrunt, qui aliud curationis genus non admittunt, interdum etiam aduersus alia uenena theriacæ uiscem supplent. Namq; apertè uidemus, quod ubi quispiam afficiatur diuturnis uigilijs, aut suffocanti destillatione, aut emensum profluuium, aut dysenteria, aut coli dolore, aut renum, aut uteri, ubi alia non contulerint medicamenta, si opium, mandragora, hyoscyamus, uel antidota aliaq; composita medicamenta, quæ hæc exceperint (sunt enim talia in officinis semper parata) exhibeantur, sæpenumero ægros à morte uindicant. Quenadmodum etiam si scammonium, colocyntis, turpetum, ueratrumq; & alia id genus deiciantibus pharmacis addantur. Nam quamuis hæc omnia mæficio qualitate polleant; in contumacibus tamen morbis & curationi refragantibus, tantam asserunt utilitatem, ut ægris deperditam ferè salutem reuocent. Cantbarides præterea ad morsus canum rabidorum utilissimè exhibentur. Euphorbium scorpionum ictibus medetur, & scorpiones ipsi suis ictibus remedio sunt. Sicut etiam uipera, dempto capite, & cauda, contusa, & inposita suos sanat morsus, ut latius infra à suis locis dicemus. Sed priusquàm ad particulares curationes descendamus, differemus Dioscoridem secuti, quomodo, quouè artificio à ueneno ij præseruari possint, qui perpetuò ueneni timore premuntur. Quin & rationem docebimus succurrendi ijs, qui iam uenenum hausissent. Atq; huc omnia præstantiora remedia asseremus, tam quæ simplicia sunt, quàm quæ composita, nò solum à uetèribus inuenta, atq; experimento comprobata, sed etiam à clarissimis quibusdā recentioribus. De quibus probatis antidotis, etsi pollicitus sit Dioscorides se omnino traditurū in ultima huiusce uoluminis parte, pollicitis tamè non stetit, ut XXXIII. huius libri capite conspicitur, ubi excusatione usus, mutati consilij rationem reddidit. Verum ut iam ad rem nobis propositam accedamus, primò modum aperiam, quo homines suspiciosi ueneficia præcauere possint. Pleriq; igitur sunt, qui putant, non paruam esse principibus cautionem, mandare ministris, ut edulia, quæ præponuntur edenda (mos iste hodie frequentissimus est) prius degustent. Quæ tamen res in suspitione ueneni tribus manifestis de causis nihil, aut parum estimanda uidetur. Siquidem si pincerna, siue qui cibos suis dominis apponunt, ueneficiū committere decreuerint, se ipsos faciliè prius præparare possunt ualentissimis antidotis, ueneno illi accommodatis, quod exhibere in animo est. Vnde sibi ipsi præcauebunt, dominum autem interficient. Ex quo satis liquet nihil prodesse ad præcauendum, quod pocillator in seruatiæ fidei signum domino præbeat, & eduliorum dissector præcomodat. Adde deinde, quod quamuis ille, qui edulia ministrat, mensæq; apponit, à coquo ueneficium faciente deceptus, cibos uenenatos prægustando assumat; eorum tamen adeò modicam quantitatem prægustat, ut nullam, aut paruam eo temporis momento possit molestiam percipere. Vltimà accedit ratio, quod ferè omnia uenena, quæ ut interimant ci-

Vtrū animalia, quæ cibis uenenosis uictitant, exitio sam uiam retineant.

Venenū quādoq; morbis, & alteri ueneno remediū est.

modus præcauedi uenena.

præcautio uulgaris exposita.



barijs admiscerentur, ea arte, eoque ingenio parata sunt ab impijs, & scelestis ueneficis, ut non nisi temporis interuallo suum triste perficiant opus. His igitur de causis illud libere proferre non dubitauerim, quod nullam meliorem, ac tutiorem precautionem sibi comparare possunt principes, quam curare, ut uitam christianam, & integram ducant, iustitiamque regant, ita ut populi eos uenerentur, pariter & timeant. Curent deinde, ut ministros habeant, quorum manibus edulia administrantur, non ignobiles, nec obscuro loco natos, sed preclara estirpe genitos, fideles, nec auaritiæ addictos, neque inuidos, & qui diu antea uita ac moribus probati sint. In quos præterea debent frequenter non parua conferre beneficia: ita enim semper gratos & fideles ministros habebunt. Quin & medicos sibi adiungant, qui medicæ materiæ peritissimi habeantur, ut antidota, quæ contra uenena parantur, quemadmodum sunt theriaca, & antidotus Mithridatica, ex legitimis, non ex adulterinis simplicibus medicamentis, per se ipsos (ut ipse faciebat Galenus) componere ualeant: nam si hæc legitime parata fuerint, haud dubie poterit unusquisque facile uenena præcauere. Ex his certè maius percipient emolumentum, quam si mille alijs precautionibus uterentur. Nec minor sanè cautio adhiberi debet, ut uasa ex auro & argento conflata, munda, nitidaque seruentur, & hominum fidelium manibus committantur. quandoquidem in eiusmodi pretiosis uasculis, quorum apud principes quosque præcipuus est usus, uenena facilius abduntur, quam in uitreis aut fictilibus uitro circumlitis. Sunt nonnulli ex recentioribus, rerum prorsus imperiti, qui (si uerum fateri liceat) eò dementiæ deuenerunt, ut præceperint in liquatū igne aurum, uel argentum, ex quo uasa confici debent, theriacam, aut Mithridatis antidotum, & alia adiungi debere, ut ascita inde antidoti facultate, uenenis repugnent. Sed quam absurda, ridendaque sit horum opinio, iudicet (ea enim est, quæ non indigeat clariori reprobatione) qui mediocrem etiam rerum naturalium, ac metallorum præcipuè peritiam sunt assecuti. Ceterum suppellectiliū non negligenda cura, ut scilicet uasa, quibus ciborum condimenta reponuntur, clausa, & cooperta seruentur, ut neque aranei, neque scorpiones, nec aliquod uirulentum reptile, uel insectum ingredi possint. Admonet Dioscorides, ut etiam uasa uinaria diligenter clausa custodiantur. namque uiperæ semper uini amore alliciuntur, quæ si uasa aperta offenderint, eò facile contendunt. Quo fit, ut interdum bibendo exitiosum uirus eructent, interdum uerò in uino immerse expirent. Quamobrem Aristoteles lib. VIII. cap. IIII. de historia animalium, quosdam uiperas uino in fictilibus ad sepes disposito uenari, & eas ebrias capere, memoria prædidit. Galenus item libro XI. simplicium medicamentorum, eam narrat historiam, quam nos libro secundo in uiperarum mentione retulimus. nempe de illis uiperis, quæ sponte se uino immerferunt, unde etiam sibi mortem consciverunt. Quo uino duos homines elephantis affectos sanitati restitutos esse, idem est auctor. Quibus ex uerbis palam est Galeni testimonio, uinum in quo sint extinctæ uiperæ, noxium non esse, quin potius adeo saluterum, ut efficacissime elephantiasin curet. Quod tamen Dioscoridis sententiæ refragari uidetur. nisi dicamus uiperarum uenenum elephantis laborantibus præstans esse auxilium, cæteris autem exitium. Qui item in ueneni suspitione uersantur, cibos uitare debent, qui candido, uel oleraceo colore fuerint: nec non etiam ab his abstinere, qui ex animalium sanguine parantur. Siquidem albedine, uenena quædam metallica facile occultantur: cibus herbaceo colore, uariæ lethales plantæ commodè admiscerentur: sanguini etiam animalium, quibus uestimur, commodissime uenenatorum sanguis inseritur. Illud etiam uinum apprimè utile atque necessarium esse duco, ut coqui, & reliqui culinae inseruientes, non modò fideles sint, & incorrupti, sed etiam mundi, cauti, ac providi, ne ullus ueficatorum insidijs relinquatur locus: tum etiam ut sciant rectè diligenterque custodire cibaria, uel aliud unumquodque, quod in ciborum usum reponitur. Sed præcipuè diligenter animaduertant, ne in culinaria uasa, quæ super, uel circa focum edulij referta resident, uenenatum aliquod animal à recto per caminum decadat, ut quidam exigui aspides, qui sub tectorum tegulis, & contabulamentis se recipiunt, phalangia, stelliones, scorpiones, & similia. Namque Florentiæ (ut Niccolus est auctor) cœnobium monachorum ueneno infectum est, quod araneus niger admodum in olla decidisset, dum coquerentur in scula. Ad hæc principes maxime curent oportet, ut perquam fideles habeant cubicularios. Nam (ut superius dictum est) quodam ueneni genere cubilia, interula, cæteraque uestimenta infici possunt. Quare nonnulli facere solent, ut diu, priusquam uestes induant, eas manibus pertractent serui. Quin & pueris similiter iubent, ut sepe equis insideant, ijs super sellis, quibus ipsi uti consueuerunt. Tum etiam stabuli præfectis mandant, ut tam cautè sellas, habenasque recondant, ut ignotis, & his quibus fidendum non sit, eas non intueri, ne dum tangere liceat. Insuper illud scire conuenit, quod quædam res simplices sunt (ut plerique inculpatæ fidei medici fatentur) quæ sua peculiari naturæ dote præsens uenenum signis manifestant. Inter quas cornu, seu lingua, quam serpentis linguam uocant, refertur, quæ (ut Conciliator Petrus Aponensis tradit) præsentem napello, aut uiperam, aut pardis felle, exudat: quod tamen non prodit, cæteris uenenis præsentibus. Sunt alij, qui pro certo tradunt, præsium lapidem, quem Plasma uulgus appellat, statim splendorem amittere, ubi in præsentia ueneni cuiusque fuerit. Addunt præterea, quod si lapis rane terrestris anulo aureo inseratur, ita ut is digiti carnem contingat, quam primum præsenferit adesse uenenum (si credimus his, qui hoc scriptum reliquerunt) tanta digiti afficit caliditate, ut carbonem accensum, ipsumque digitum urentem præ se ferat. Quibus sanè et si parua, mea quidem sententia, sit adhibenda fides; ea tamen, quod omnibus satisfiat quantum potest, non duxi silentio dissimulanda. Non desunt etiam, qui contra lethalia uenena pollere contendunt sigilla quædam, siue characteres, siue imagines, quomocunque eas appellare libeat, præcipuè si collo suspensa gestentur, uel digitorum anulis inserantur. Quocirca prodidit Albertus libro imaginibus dicato, quod si Serpentarij imago cum suis stellis cuius lapidi pretioso insculpatur, eam utilissime gestari aduersus omnia uenena, eaque præsertim, quæ uenenosorum animalium icu uel morsu relinquuntur. Proinde Petrus Aponensis scriptum inuenisse tradidit in quodam libro, quem res Persarum olim habuisse refert, quod si in hamatite lapide sculpatur homo genibus flexis serpente cinctus, cuius caput dextra teneat, caudam uerò sinistra, & lapis ille anulo ex auro purissimo confecto inseratur, gestatu huminem à quocunque ueneno tuetur. Quæ imago si modò aliquem præberet effectum (non enim hæc in re certi quicquam proficere ausim) mea fert opinio,

Absurda quod  
fundam opi-  
nio.

Quæ res ue-  
nena prodāt,  
quæque suspen-  
sæ eidem ad-  
uersentur.



opinio, quòd tempore, quo sculpsit, necessaria sit quarundã stellarum obseruatio, à quibus ea uis influat in sculptã imaginem. Porro tradidere sapientum ueterum nonnulli, reperiri pretiosos lapides, quibus solis à natura largitum est, ut uenenorum malitiam efficacissimè dissoluant, & destruant. Ob id itaq; scriptum reliquit Albertus cognomèto Magnus adamantem orientalem gestatum brachio sinistro inter humerum, & cubitum adnexum, omnium uenenorum uim demoliri. Id quod etiam idem tribuit achatæ, hyacintho, & sapphiro orientali. Alij eandem facultatè assignant smaragdo, alij lapidi, quem in capite draconum inueniri tradunt, unde draconitis nomen accepit. Ceterum (ut ingenue fatear quod sentio) parum fidendum esse crediderim his suspensionibus. quippe quòd nunquam uiderim huiusce rei experimentum tam clarum, ut sincera fides adhiberi possit: quanuis illud facilius persuaderi possim, quòd smaragdus, hyacinthus, achates, sapphirus lapides in tenuissimum puluerem redacti, possint per os sumpti ueneno infestos sæpe liberare: utpote qui eam sortiantur naturam, ut cordis uiribus subueniant. Sed quòd gestati lapides ueneni assumpti nimis atq; actionem inhibere ualeant, non ita facile adduci potero, ut credam, sicut credunt aliqui, & ita imaginantur esse: nisi prius notabile ex his experimentum uiderim. Nemo præterea non poterit (ut in hac præfatione scriptum reliquit Dioscorides) innoxia irritaq; uenena reddere, si medicamenta tam simplicia, quàm composita præsumpsit: quæ uiribus præstantissimis polleant, quibus post assumpta uenena facile ualeant superare. Simplicia autem medicamenta Dioscoridi comprobata, sunt caricæ cum inglandibus nucibus estiatæ, citria mala cruda manducata, napiq; semen ex uino potum. Item calamintæ folia, & Lemnia sphragis, quam summis laudibus extulit Galenus, sed quæ pro singula uice drachmæ pondus non excedant. Idem similiter summis laudibus commendauit rutæ folia, cum nucis inglandis nucleo accepta: quæ & duas caricas, salisq; momentum. Ex compositis autem non immerito cæteris antidotis Mitbridatium antecellere scribit. quòd quidem ex frequenti eius usu (ut ex antiquorum monumentis accepimus, atq; etiam à Galeno libro primo, & secundo de antidotis memoriæ proditum est) usque adeo se innoxium præbuit ueneno Mitbridates Ponti rex, ut cum uellet sibi necem ueneno consciscere, ne se Romanis dederet, nullum ex assumpto ueneno percepit incommodum. Quæ in re postea Galenus theriacam præstantiorem esse tradidit, asserens fieri non posse, ut ijs uenenum ullum noceat, quæ eam quotidie fabæ Aegyptiæ pondo sumere consueuerint, quomodo suo tempore Aurelius Antonius Imperator facere solebat. Ceteri posteriores, qui Dioscoridem, & Galenum secuti sunt, præsertim Arabes, & ipsi ad idem castaneas plurimum ualere tradiderunt: quin & mespila, pistacia, salinum, raphanum, & nuces Ponticas addiderunt, omnibus his tamen optimam theriacam præferentes. Et hæc hætenus dicta sufficiant de modo præcauendi uenena. Reliquum est, ut curandi ordinem, ac rationem incanus, quæ ijs succurrere possimus, qui cibo aut potu uenenum sumpserint. Primum igitur (ut paucis etiam superius dictum est) scire conuenit, quòd ingestum intus uenenum, non statim, ut quidam uolunt, ad cor ipsum contendit, quin prius alias internas partes percurrat, & lædat, & sanguinem inficiat. Sed quia maxima pollet agendi uis ob propriam sui formam, uel temperamentum, quam obtinet atrocissimam, quancunque corporis humani partem contigerit in suam uirulentam conuertit naturam, & ita eonsequitur procedit multiplicando, inficiendo, atq; sanguinem cum reliquis humoribus in uenenum uertendo, quousq; accessoria quantitate aduictum, cor ipsum attingat, quod tandem breui tempore in uenenatam speciem transmutat. Hinc deinde fit, ut spiritus uitæ fouentes, loco proprio ac naturali expulsi, suam sedem cedant ueneno: atq; ita subinde corpus spiritibus, & uita simul destituatur. Illud præterea non ignorandum, quòd arteriæ unà cum cordis uentriculis (quibus natura datus est motus dilationis, & constrictionis, ut ex illo quidem attrahatur aer circumdans, quo indiget cor ad refrigerandum summum spirituum uitæ calorem: ex hoc autem pars aeris fuliginosa expellitur, pro cordis item refrigerio) quemcunque statum extrà offenderint, intus attrahunt, ita ut arteriæ, quanuis minutissimæ, quæ per totum corpus disperguntur etiam sub cute per meatus quos habent, aerem nos circumdantem attrahant, ipsumq; prouehant ad cor, quod quidem postea per easdem uias calorem fumumq; superfluum reiecit. Quo fit, ut si nos circumdans aer fuerit infectus, uenenatus, & perniciosus, ea ratione dicta cor ipsum inficit, atq; corrumpit. Idq; non euenit propterea quòd arterijs atq; cordi natura insitum sit, ut uenenum attrahat, sed quòd aerem continuò inspirant, quo mediante natura etiam repugnante sua, uenenum quoq; trahunt. Hinc itaque est, quòd quidam, dum (ut contingit) somnum caperent sub arboribus uenenatis, seu taxo ac nerio: uel humi cubarēt super plantis noxijs, uelut napello, & aconito; uel propter uirulentorum serpentium specus quiescerent, imprudenter uenenum contraxerunt, non alia de causa, quàm ex aere loca illa ambiente, plantis illis uenenatis infecto, & specuum uirulento spiritu. Ceterum iam tempestiuum erit ad generalem eorum curationem accedere, qui ueneno infecti sunt, eorumq; præcipuè, in quibus non adeò manifesta signa conspiciuntur, ut quòdnam sit assumpti ueneni genus, dignosci possit. Nullus itaq; medicus ingenio præditus est, qui non protinus uideat & intelligat ex seuis accidentibus incommodis, quæ sequuntur, cum quis uenenum cibo, aut potu sumpserit. Siquidem ijs, quæ propria forma agunt (quam etiam proprietatem occultam appellare liceat) statim semper succedit uirium & roboris totius corporis prostratio: ægri ex magna cordis molestia frequenter animo deficiunt: facies liuescit: quæ & lingua, & labia nigricant: item extrema corporis, præsertim ungues, plumbeo colore liuescunt. Ad hæc qui hauserint, uertiginosi sunt, uocem edunt cum murmure, & oculos toruè mouent. His frigidus accedit sudor circa frontem, & tempora erumpens. Quæ omnia assumpti ueneni manifestissimum præbent indicium, maxime autem si statim sequantur post assumptum cibum, ijsq; contingant qui sibi rectam quotidiani uictus rationem adhibeant. Quandoquidem tam mala esse posset in aliquo uictus ratio, quòd humores inde geniti, tractu temporis usque adeò corrumperebuntur, ut contracta ueneni natura, uim naturæ inferrent, & eadem iam dicta cicerent symptomata. Id quod maxime testatur Galenus libro sexto de locis affectis, tum etiam libro de cibis boni ac mali nutrimenti. Quapropter medicos cautos, ac prudentes esse oportet, quo in huiusmodi accidentibus diligenter singula perquirant. Sua similiter accidentia inferunt, quorum etiam manifesta præbent indicia, uenena illa, quæ suis manifestis qualitatibus agunt. Nam quæ caliditate excedunt,

Præcautio ex medicamentis

Ratio curandi uenena.

Indicia in com mune ueneni sumpti.



dunt, omnia membra interna celeriter inflammant, sitim ingentissimam excitant, oculos inflammatione male habent, inquietudinem continuam inducunt, & continuum sudorem cient. Si uero præterquam quod calido excessu polleat, excellent etiam uim erodendi, tum putrefaciendi, ut arsenicum sublimatum, auripigmentum, sandarach, & id genus alia, punctione, atque dolore intolerabili uentriculum & intestina afficiunt, in quibus etiam frequenter murmuræ sentiuntur. Hæc autem accidentia sæpe sequuntur uomitus, fastidia, sudores modo calidi, modo frigidi, uariæ deniq; coloris mutationes. Quæ uero nimia frigiditate excellent, plerumq; somnum inferunt adeo profundum, ut sæpe non sine magno labore excitari possint affecti. Numquam uero cerebrum obtuse faciunt, ita ut affecti cogantur quam plurimos in compositos edere motus, tum corpore toto, tum etiam oculis, ore, manibus, reliquisq; corporis partibus, non secus ac stulti facti essent, uel temulenti. Huc illa præterea accedunt, frigiditas scilicet totum corpus occupans, frigidi sudores, & color in facie liuidus admodum, & terrificus. Ad summum totum corpus torpidum efficitur. 10

Ex siccis autem uenenis lingua arefcit, guttur siti inextinguibili afficitur: aluus adstricta redditur, ægre redditur urina: omnia deniq; membra fiunt arida, & uigilie instant longissimæ. Postremo humida inexpugnabilem somnum adferunt, alui fluxiones, articularum, ueruorumq; luxationes. Ita quod quandoq; oculorum nerui, ac nexus in tantum laxantur, ut sponte sua e cauitatibus exeant, capitiq; propendant. Plerumque etiam extremæ corporis partes putrescunt, ut in præcedentibus dictum est. Porro & illud adnotandum est, quod uenena, quæ & manifesta, & occulta qualitate agunt, si fuerit hæc uiribus altera imbecillior, in fine suæ actionis eadem pariunt accidentia, quæ proueniunt ab his, quæ occulta duntaxat proprietate munus suum obeunt. Vis etenim qualitatis elementarium, quæ illis inest, uim illam propriam occultamq; quam hæc pariter sortiuntur, antecellit. Proinde primum qualitatis elementaris excessus effectus præbent, eosq; subinde, qui propriæ eorum formæ attribuuntur. Sed huius rei clariorē notitiam trademus, ubi speciatim singulorum meminerimus. Hæc igitur sunt omnium uenenorum indicia uniuersalia, cæteris quæ explicari possint, certiora, ac manifestiora. quibus peritissimi medici tuto diiudicare possunt. Nam cum constet accidentia prædicta non solum perdurare; sed etiam augeri, ac continuè in deteriora labi, nulloq; modo auxilijs cedere, neq; naturæ repugnanti obsequium præstare, clarum profecto mortis indicium est. Contra salutis, si quando remitti remedia, quæ postea dicentur adhibita fuerint, ex his rebus, quæ non solum uim habent nutriendi corpus; sed quæ etiam uenenorum noxiæ resistere ualent. Quo in genere lac asinum summopere laudatur: item caprinum, ouillum, bubulum, atq; etiam humanum, præsertim si recenter emunctum bibatur. quauquam lac omne efficacius exhibetur contra uenena calida, & erodentia, quam ad reliqua ueneni genera. Ad hoc & butyrum facit. Faciunt & iuscula tum caninum pinguium, tum piscium, quibus addi possunt, ut pinguiora reddantur, butyrum crudum, & pinguedo animalium, quorum est usus. Siquidem pinguia hæc ideo conueniunt, quod uias obstruant, ex quo ueneni transitus inibitur. 20 Quinetiam ubi uenena excalfaciunt, & erodunt, pinguia hæc acrimoniam eorum habent. Idcirco hoc in casu, animalium cerebrum, atq; osium medullæ aptissimæ pariter censentur. His similiter herba quam plurimæ opem ferre possunt cibis admixtæ: è quarum numero probatur calaminiha, origanum, serpyllum, sisymbrium, ruta, buglossum, echiium, filipendula, sonchus, pimpinella, aliæq; quam plurimæ: quarum uim uenenis, superioribus libris, aduersari retulimus, quarum etiam catalogum paulo infra recensebimus. Locus deinde, in quo resistere debent, qui uenenum sumpserint, lucidus sit oportet: ubi ac quoq; sit ulla mala qualitate affectus. Paretur autem eorum cubiculum odoramentorum suffitu, quibus uis inest propulsandi uenena. Id eum præstant santalum omne, myrrha, styrax, aloë, lac serpentij lacryma, agallochum, scordium, casia odorata, citrei mali cortex, iuniperi bæcca, eiusq; lignum siccum, & id genus plura. Insuper affectu uenenos Galeno auctore lib. 11. de antidotis nihil aut parum dormire sinuntur. Somnus namq; uenenum retinet in internis partibus, & facilius ad cor deducit. Contra uero uigilie, quippe quæ id ad 40 centro ad corporis superficiem, nempe ad externas partes, retrahunt. His ita institutis in primis omni industria ac diligentia curandum est, ut deuoratum uenenum foras exhauriatur. Quæ in re nullum sanè ualentius auxilium perhibetur, quam ut sine ulla mora ægri uomitum ciere cogantur: si tamen uenenum adhuc in uentriculo residet. Quod si iam in intestina descenderit, illud quam primum clysteribus infusus extrahatur. Atqui in hoc omni diligentia ordinem ac modum inire debemus, quem in huiusce uoluminis præfatione nobis reddidit Dioscorides. Siquidem is de hac re ita exquisitè differuit, ut posteriores omnes omnia ferè quæ de ea scriptis tradiderunt, illi accepta referre possint. Verum hoc unum ipse addiderim, quod si forte is, qui uenenum sumpisset, ex omnibus uomitum cientibus auxilijs uocare nequiret, tunc (ut Rasis auctor est) medicamentis soluentibus, itemq; clysteribus erit procedendum. Medicamenta autem, quæ deiectoria potiuntur facultate, ad hoc idonea sunt agaricum & rhabbarum. Quandoquidem utrunque præterquam quod deiectoria ui præditum est, facultatem etiam uenenis maxime repugnantem sortitur. Id 30 quod etiam quidam minori centauro attribuunt. Neque prorsus ab re esset ad idem Aegyptiæ silique atram medullam, aloemq; usurpare. hæc namq; præter deiectoriam facultatem, seorsum plurimum pollet aduersus humorum putredinem, quæ semper, uel plerumq; ingesta sequitur uenena: illa uero quod aluum mirificè emolliat, uenenum uentriculi tunicis adhærens abluit & abstergit. quin & erodentium acrimoniam obtundit, & ea deniq; per alium secum educit. His autem peractis, ea certè clysmata competere uidentur (ut Dioscoridi placet) quæ acria sunt & trahendi ui prædita. Quibus si ea successerint, quæ è iuribus pinguibus, adipe, aut pinguedine, aut butyro, aut lacte parantur, ne ulterius uenena penetrent, ut in dysenteria fieri solet, nequaquam ea inuitilia fore putauerim, præsertim ubi comperit haberi uenenum intestina exulcerasse. Quamobrem lac copiosius epotum post uomitiones, & clysteria utilissimè esse prodidit Auicenna: nempe quod ueneni noxiam frangat, & sanet. Quinetiam summopere prouidentur, præmissis tamen uomitionibus, & clysteribus, fortes, ac ualidæ diuersiones, utpote quæ non modo prohibeant ne uenenum petat cor; sed etiam ipsum trahant à membris nobilibus internis, ad ignobilia externa. Ob idq; plurimum 60 prodesse

Victus ratio  
eorum qui ue-  
nena sumpse-  
runt.

Remedia con-  
tra uenena.



prodesse crediderim cucurbitulas, si ex igne natibus, & crurium pulpæ applicentur. Ferunt similiter opem frictio-  
 nes ex asperis linteaminibus, quin & fibulæ strictim factæ, ita ut dolorem excitent, manuum, pedumq; digitis, item  
 brachijs, & cruribus. Mirificæ etiam uenenum auertitur à partibus intrinsecis, si patientes in balneo aquæ calidæ ex  
 medicamentis accommodatis confecto, uel in laconico sicco sudorem ciente imponantur. Quandoquidem huiusmodi  
 calor extraneus efficacissimè uenenum ad cutim trahit. Balnei ac laconici uicem illud sanè supplere poterit, si disse-  
 cto uiui muli, aut equi aluo exertis statim intestinis, æger in animalis cadauer intromittatur: & cum refrixerit cada-  
 uer, idem etiam de alio fiat, quousq; sat fuerit. Ad hoc autem muli, muleq; (ut uulgi fert opinio, fortasse quod hæc  
 animalia plurimum caloris habeant) cæteris præpollent animalibus. Hoc enim auxilio à ueneno liberatū narrant Va-  
 lentinum Alexandri sexti summi Pontificis filium. Is enim (ut ferunt) cum in quadam cona aliquot Cardinalibus ue-  
 neni exhibere uellet, sibi ipsi, ac patri id imprudenter exhibuit. Cæterum scire etiam conuenit, quod quamuis præ-  
 dicta remedia omnia communiter uenenis opitulentur, non propterea est dimittendum, quin continue infectis propinen-  
 tur omnia probata antidota, tam simplicia, quam composita, quæ cuiuscunque ueneni noxam auferre possunt. Sim-  
 plicia quidem medicamenta, quæ ad hoc idonea Dioscoridi, reliquisq; Græcis posterioribus celebrantur, sunt uinum  
 uetus copiosus epotum, Lemnia sphragis, agaricum, abrotonum, irio, eryngij radix, napi & pastinacæ semen, ca-  
 lamintha, nardum Celticum, castorium, ferule uirentis medulla, flos rhododendri (quanquam is Galeno, alijsq; ipsum  
 secutis in antidotum minimè recipiatur, sed potius inter uenena annumeretur) succus marrubij, laserpiij, & panacis,  
 sagapenum, aristolochia longa, semen rutæ syluestris, betonica, pix liquida delincta, polij, & seselis decoctum, phu-  
 cinnamomum, cassia, iuniperi bacca, citria mala, & quæ limonia, & aurantia uocant, & eorum semen. Item glan-  
 des, præsertim quernæ ex humano lacte epotæ, quinguesolij radice succus, leporis coagulatum: mustellæ caro sale inue-  
 terata, & in umbra seccata, cum uino pota, lac canis ex primo foetu acceptum, capparis, chameleonis albi radix,  
 apij decoctum, polemoniæ radix, tribuli terrestris succus, smilacis asperæ acini, scordium, thlapi, & Crætense dicta-  
 mnum. His Arabes, & recentiorū nonnulli castaneas addunt: item ponticas nuces, mespila, pistacia, zedoariam, lau-  
 ri baccas: gentianæ radicem, quin & dictamni albi, tormentillæ, iridis Illyricæ, hastulæ regie, helenij, & millesolij:  
 rhabarbarum, hederæ corymbos, bolum Armenium, hypericum, sabina, mumiam, pimpinellam, Imperatoriam, cen-  
 taurium maius, angelicam, uerbenacæ succum: mures, qui napelli radices depascuntur, & muscas grandiores, quæ  
 eius folijs uiscitant, filipendulam, carpobalsamum, musci odoratum, ambarum, os in corde cerui repertum, & cer-  
 uinum cornu, quin & monocerotis, ursi testes, & arietis, origanum, smaragdum, lapidem bezahar, & carduum,  
 quem sanctum, uel benedictum appellant. Et hæc de censu omnium simplicium medicamentorum, quæ contra uenea  
 na pollent, quæ nobis tum ueteres, tum recentiores scripta reliquerunt, dixisse sufficiant. De compositis autem  
 medicamentis illud proferre non dubitauerim, quod si theriaca legitime parata reperiretur, non essent aliunde peten-  
 da auxilia contra uenena. Sed quoniam mihi planè difficillimum esse uidetur, ut ea reperiatur, quæ quemadmodum  
 eius exigit apparatus, confecta sit, etiam nobis desint cinnamomum, balsamum, petroselinum Macedonicum, myrrha,  
 folium, chalcitis (quam tamen iam nobis compertam putamus) amomum, aspalathus, & calamus odoratus, quæ om-  
 nia perquam maximi sunt momenti; idcirco uinquam adducar, ut credam uenalem theriacam posse sibi locum &  
 usum illius antiquæ legitime uendicare: præsertim cum constet tempore usq; Galeni, quo Romani summo imperio po-  
 tiebantur, theriacam omnibus numeris absolutam confici non potuisse (ut ipse Galenus testatur libro primo de anti-  
 dotis) nisi ab Imperatoribus. quanquam non deessent tempore Antonini Cæsaris diuites primates, qui eam confice-  
 rent, etiam quod multa eis desiderarentur. Quare illud dixerim, quod si ulla theriaca ex ijs, quæ nostra ætate con-  
 sciuntur, in usum admitti debet, dent operam medici diligentissimi, ut illa saltem utantur, quæ omni studio ac dili-  
 gentia parata sit, clarissimorum & peritissimorum uirorum testimonio: quæq; eo modo experientia comprobata  
 sit, quo docet Galenus libro, quem ad Pisonem scripsit: quin & alio, quem Pamphiliano dicauit. Hoc item faciant de  
 Antichridatio, quod nihil minus quam theriaca præstat aduersus uenena, quodq; & facilius parari potest. Quæ in re  
 caueant homines ab adulteratis theriacis, quas in publicis foris uendunt circulatores, etsi plerumque ab his, quos eo-  
 rum adulteria fraudesq; latent, cæteris meliores, atque efficaciores habentur: quippe quod nihil ultra uideant astan-  
 tes, quam quodij frustum integrum arsenici, nel risagalli officinis uocati, deuorent: quodq; subinde deuorata theria-  
 ca, quam postea circumstantibus uendunt, nullum ueneni incommodum sentiant. Quod cum Galenus optimè nonisset,  
 libro Pisoni dicato, ita scriptum reliquit. Multæ à subdolis improbisq; in hoc quoque fraudes fiunt, ac uulgi sola  
 antidoti opinione deceptum, ab ijs quibus ars est mercenaria, plurima pecunia medicamentum, uel prauè confectum  
 redimit. Cæterum ut quisque flagitiosorum impostorum fallacias, & dolosas merces euitare possit, & debeat, nunc  
 mihi in animo est ad commune rei publicæ beneficium eorum ingens, ac scelestum facinus posteritati prodere. Nā cum  
 isti suggesta ascendunt coram populo, quem dolis capere intendunt, ostensuri quod uenenum æquè ac panem innoxie  
 sumunt, multis cauillationibus, atq; insidijs utuntur. Inter quas has duas habent fraudes, quas modò omnibus aperiā,  
 quasq; retinent illi in suos chariores (ut ita dicam) lenones. Primus itaque dolus, quo nituntur huiusmodi fraudulenti  
 impostores, est quod cum sciant uenena non posse nisi parum nocere, ubi uenterculus fuerit cibis ualde repletus (ut in  
 præfatione huius libri tradidit Dioscorides, & libro quarto sen sexta retulit Auicenna) priusquam suggestum ascen-  
 dant, ad saturitatem usque, præsertim estate, lactucas crudas deuorant sale, aceto, & oleo conditas: uerum olei tan-  
 tum imponent, ut ferè in eo innatent lactucæ. Et quia hyeme, maxime urgente bruma, tenellæ lactucæ difficile passim  
 inueniri possunt; ideo earum uicem his præbent interanea boum præpinguium, quorum tantam comedunt copiam,  
 quoad uenterculus ueluti tympanus extendatur. Id autem eo consilio faciunt, ut hæc quidem iurium pinguedine, co-  
 rumq; substantiæ crassitudine, illæ uerò frigiditate sua, oleiq; multitudine, quam illis adiiciunt, præterquam quod ue-  
 neni penetrationem inibent, cum internas uias obstruere possint, erodentem quoque ingesti arsenici, uel risagalli se-

Simplicia me-  
dicamenta,  
quæ pollent  
aduersus ue-  
nena.

Cōposita me-  
dicamenta.

Fraudes, qui-  
bus utuntur  
circūforanei,  
qui uenena in-  
noxie sumen-  
te proficiunt.



placis uocati, acrimoniam obtundunt, & hebetant. Cum igitur uenenum sumpserint, quod illis ob præassumpti alimen-  
 menti uim, nullam, aut paruam noxam adfert, nempe quod uenterculus sit tensus, & pinguedine imbutus, mox suum  
 adulteratum antidotum, quod omnino legitimam theriacam mentitur, assumunt, idque impune. Quo fit, ut facile po-  
 stea populo astanti persuadeant, id esse antidotum omnium præstantissimum contra omnia uenena, quod in uniuerso  
 orbe reperiri possit. His leues uulgi animi persuasi accensique, maiori multitudine, ac impetu feruntur, ut adultera  
 tam inualidam, ueramque mentientem theriacam emant, quam ij qui in maxima annonæ penuria eo cateruatim concur-  
 runt, ubi plurimum panis gratis omnibus exhibetur. Itaque cum temporis momento capsulam hac impostura exbau-  
 serint, statim è suggesto descendunt circumforanei, seseque in hospitium recipiunt, ubi cum primum fuerint, arsenici  
 cum paulo antè sumptum unâ cum lactucis aut bubulis interaneis arte quadam euomunt, neque aliud illa die assumunt,  
 quam lac, quod tamen sæpius alternatim potant, uomuntque, & reuomunt. tantum potest in improbis hominibus auri  
 cupiditas, ut sponte consultoque in manifesta uite discrimina ferantur. Fraus altera, quam isti facinorosi perpetrât,  
 ita se habet. Ii una, aut duabus horis anteaquam suggestum ascendant, in foro pharmacopolium petunt, illudque foro  
 in quo sermonem populo habere uolunt, propinquius eligunt. Atque ubi iusserint pharmacopola sibi arsenici capsula  
 dem capsula reponi mandant. Quo facto pharmacopolam rogant, ut cum in suggestum ascenderint, arsenicam illud  
 repositum dare uelint puero, quem ad eum miserint. Porro in forum abeunt uerba facturi, ubi eorum spuriam theria-  
 cam, ad cælum usque miris laudibus efferrunt admentientes. Ad hæc ut rem magis uerisimilem reddant, puerum uel è cir-  
 cumstantibus quenpiam ad pharmacopolium mittunt, qui uenenum antea ab ipsis selectum deferat. Interea ingentem  
 capsulam in suggesto stantes aperiunt, quam habent uasculis præuæ illius theriacæ plenis refertam, cuius operculo in-  
 tus adherent cera subposita, uaria cuiusdam miscellæ frusta ex saccharo, quod candidum uocant, amylo, alijsque inno-  
 xijs medicamentis miro quodam artificio confectæ, quæ prorsus et facie, & magnitudine referunt illa ueri arsenici fru-  
 sta, quæ prius ij in pharmacopolio selegerant. Leuant autem isti hominum proditores operculum à capsula, quo fraus  
 dem melius occultent, in suggesto stantes. siquidem summo cum artificio internâ operculi partem, cui adherent illius  
 miscellæ frusta arsenicum mentientia, uersus se trahunt, ne quis suam fraudem deprehendere possit. Deinde statim  
 in manu socij, aut pueri, quos doli ministros habent, capsulæ operculum collocant: quod eorum alter aperta manu per  
 quam eleganter sustinet, parte pseudoarsenicum continente cælum uersus respiciente: idque ne quis dolum intueri pos-  
 sit. Interea redit nuncius arsenicum legitimum à pharmacopolio deferens. Atqui istud accipiens artis captiose magi-  
 ster, statim illud populo ostentat longa atque mendaci oratione. Qua perfecta ad experimentum transit, perpetuo do-  
 lose procedens. Quandoquidem simulans sibi opus esse expeditis manibus, manicas ex murice, uel serico proditore,  
 quo plerunque uestiuntur, ad cubitum usque conuoluit, ea tantum ratione, ut arsenicum uerum, dum hæc agit, super  
 operculo prædicto pseudoarsenicum continente, reponat, abdatque: quod ob operculi circuli altitudinem nullo pacto in-  
 fernè à circumstantibus uideri potest. Obuolutis itaque manicis, brachijsque denudatis, ac tenui linteolo humeris in-  
 posito, iubet aquæ uel uini poculum adferri, & relicto in operculo arsenico uero, factitium innoxium fraudulenta ma-  
 nu capit. quod gladio minutim incidit, & uino, uel aquæ parati cyathi commiscet, & denique tutissime bibit. Atque  
 ita fraudem hisce coloribus exornatam spectantibus persuadet, ut nullus dubitet, quin ille mortiferum arsenicum hauri-  
 serit, quod ex medica officina delatum fuerat. Meminime olim unum ex his uidisse, qui uenenum simili modo adu-  
 ratum puero exhibuerat suo: & cum simularet se ei opem ferre nolle, donec pulsus amississet, & in mortis discrimi-  
 ne uersaretur, ut suæ falsæ atque adulterinæ theriacæ maiorem compararet existimationem: cum præterea prius uer-  
 sum puerum admonuisset, ut anhelitum compesceret, idque ut facies eius colore mutaretur, quin & interim oculos  
 obuerneret, & os ac cernicem contorqueret; ad se uocauit astantem medicum haud acris callidique ingenij, in ea ciuitate  
 te, ubi id mihi contigit uidisse, receptum habentem, qui pueri pulsus tangeret, ut omnibus testaretur, quod pulsus  
 amississet. Quod cum fecisset bonus ille medicus iam imprudenter factus circulatoris leno, omnibus testimonium perhi-  
 bebat, se nullum pulsus in eo inuenisse: quippe qui nusquam fortè legerat, quod arte etiam possit intercipi pulsus, cum  
 tamen id scriptum reliquerit Galenus lib. vi. de placitis Hippocratis, & Platonis, ubi sic inquit. Eadem natura in  
 arterijs cernitur, nam etiam ipsæ perinde ac nerui, aut incisæ, aut laqueo interclusæ pulsui omni, micationeque orbata  
 tur. Ex quibus sanè uerbis tunc comminisci potuisset, quod facile hæc puero laqueata essent brachia, & proinde in-  
 terceptus arteriarum pulsus, quæ per brachium ad manum excurrunt. Siquidem adstringentes laquei ab ijs nebulonis  
 bus adeo callide subdoleque aptantur, ut uersato quodam ferreo globulo supra cubitum extra manicas latente, strin-  
 gantur admodum, ac relaxentur. Id quod facile ab eo fieri potest, qui puerum semimortuum se simulantem, brachijs  
 ad spectaculum sustinet. Tali igitur fraude adstringebantur fibule, ubi pulsus interciperi animus esset, laxabantur  
 autem lentè, cum iam uersutissimus puer ex theriaca illa assumpta, in pristinam suam constitutionem restitui simula-  
 set. Hactenus de fraudibus horum carnificum, quas pluribus prosequi libuit, ut quisque eas euitare sciat, ac possit.  
 Qua de re morbo Gallico quam plurimum certe debeo: siquidem unus isque insignis, ex his qui uenenum innoxie deno-  
 rare profitentur, cuius ossa lues illa non inmerito depascebatur, cum à me in sanitatem redigi exoptaret, inter cura-  
 dum mihi id ab eo expetenti, omnes has fraudes, quibus hoc flagitium hominum genus utitur, ut pecuniam extor-  
 queat, libentissime patefecit. Ceterum fraudes, ac mendacia, quibus ij pariter utuntur, qui è diui Pauli prospicia ora-  
 tos se prædicant, qua tamen de re mentiuntur, hic consulto dimittam. uerum intactas eas non relinquam, ubi in proces-  
 su de ijs differemus uenenis, quæ morsu, uel ictu relinquunt innumera exitiosa animalia. Sed ne aliquod præstas anti-  
 dotum desideretur in his nostris commetarijs, me prohi, ac fidelis medici munere functum existimauerim, si hoc in loco  
 quædam antidota mihi longo labore comparata, magni ad uenena momenti, descripsero. quæ non modò ijs, quæ per os  
 assumuntur; sed ijs etiam, quæ animalium morsu, uel ictu ciijuntur, summo, ac presentaneo fuisse remedio comperi.

Altera im-  
 portum fraus.

Historia frau-  
 dis.

Antidota no-  
 stra præstati-  
 sima contra ue-  
 nena.

Licet



Licet autem hac ætate rari admodum habeantur medici, qui sua pandere arcana uelint, si quod uacti sunt pulchrum & singulare auxilium; tamen cum mihi consilium ab initio fuerit, mea opera quantulacunque sit omnibus generatim prodesse, alienum quidem inhumanumq; foret, si modo uel inuidia, uel auaritia compulsus, aliquid silentio inuoluerem, quod in arte medica usui futurum putem. Primum igitur antidotum, cuius admirandas in uenena uires sapius expertus sum, hoc modo conficitur. Recipit enim rhabarbari, rhapontici ex Ponto aduecti, radicis pbi, acori quem falso calanum odoratum uocant, cyperi, quinquefolij, tormentillæ, aristolochiæ rotundæ, pæoniæ, helenij, costi, iridis Ilyricæ, chamæleontis albi, cuiusq; drachmas tres. Item galangæ, Imperatoriæ, dictamni albi, angelicæ, millefolij, filipendulæ, daronici, zedoariæ, gingiberis, singulorum drachmas duas: agarici drachmas tres: libanotidis maris, gentianæ, morsus diaboli sic herbarijs dicti, cuiusq; drachmas duas & semis. Ad hæc seminis citrei mali, uiticis, cocci insectorij, fraxini, oxalidis, pastinacæ sylvestris, napi, nigellæ, pæoniæ, ocimi, irionis, tblasps, sceniculi, anmi, singulorum drachmas duas. præterea baccarum lauri, iuniperi, hederæ, asperæ similacis, cubebæ, singulorum sesquidrachmam. Foliorum scordij, chamædryos, chamæpityos, centaurij minoris, stœchadis, nardi Celtici, calami thæ, rutæ, mæthæ, betonicæ, uerbenacæ, scabiosæ, cardui benedicti, melissophylli, singulorum sesquidrachmam: dictamni Cretensis drachmas tres. sampsiuchi, hyperici, iunci odorati, marrubij, galegæ, sabina, pimpinellæ, cuiusq; drachmas duas. Caricarum, nucum iuglandium, pistaciorum, singulorum uncias tres: myrobalanorum empellicorum drachmas quatuor. Florum utriusq; buglosi, rosarum, lauendulæ, saluiæ, roris marini coronarij, cuiusq; scrupulos quatuor: croci drachmas tres. Cassiæ odoratæ, quam hodie cinnamomum uocant, drachmas decem. Caryophyllorum, nucis myristicæ, mæcis, singulorum drachmas duas & semis. Piperis nigri, ac longi, santalorū omniū, agallochi, singulorū sesquidrachmam. Cornu cerui crudi drachmas quatuor: unicorni drachmam unam. ossis cordis ceruini, ramentorum eboris, uirgæ ceruinæ, castorij, singulorum scrupulos quatuor: terræ Lemniæ drachmas tres: opij sesquidrachmam. margaritarum orientalium, ramentorum sinaragdi, hyacinthi, corallij rubri, singulorum sesquidrachmam: caphuræ drachmas duas. mastiches, thuris, styracis, myrrhæ, gummi Arabici, resinæ terbinthina, sagapeni, opopanaxi laserpitij, singulorum drachmas duas & semis. moschi odorati, ambari, cuiusq; drachmam: olei è chalcantio confecti unciam mediam. Pulueris cordialis temperati, diamargariti, diamoschi, dianibari, electuarij è genimis, pastillorum caphuræ, scillæ, singulorum drachmas duas & semis: pastillorum uiperæ uncias duas. Succi oxalidis, jonchi, scordij, echij, buglosi, melissophylli, singulorum selibram: hypocistidis drachmas duas. Theriacæ electæ, Mithridatij optimi, cuiusq; uncias sex. Vini ueteris albi odorati libras tres: sacchari è Medera insula, uel optimi mellis libras octo & uncias sex. Ex omnibus his summa diligentia, & ratione inquisitis, atq; selectis fiat electuarium, eo modo quo theriacæ, aut Mithridatis antidotum conficiuntur. Sumendi quantitas est à drachma una usque ad tres pro ætate, & constitutione patientis. Atque ita omnibus persuadere poteris, antidotum hoc non solum præstantissimum esse (ut antè diximus) contra omnia uenena, quæ per os sumuntur, itemq; aduersus ea, quæ morsu uel ictu relinquuntur; uerum etiam in pestilentia, cui mirificè opitulatur, quotidie assumptum, & præcipuè ad præseruandos sanos. At si cui in animo fuerit, ut præsentaneum adferat auxilium, hæc faciat oportet. Antidoti præscripti libram accipiat, libram item syrapi è citrei mali cortice parati, & libras quinque aquæ uitæ uocatæ, ex optimo, odoratoq; uino confectæ, totiesq; uitreis organis repurgatæ, ut quintæ essentiæ speciem præ se ferat. Deinde omnia hæc in uas uitreum iniiciat: duplè à rebus inditis capacitatis. postea uasis ore ita obturato, ut nullus spirandi meatus relinquatur, magnam cum dexteritate aquam in uase cum electuario tandiu agitet, donec totum dissoluatur. Atque tum uas ore cera, uel pice obducto in mensem integrum reponat. Quod tamen bis in hebdomada agitari conuenit eo modo, quo antea dictum est: sit enim, ut electuarium facile residat in fundo, si dimittatur. Exacto denique mense claram aquam auream, quæ colore nitentem, electuario supernatare inueniet, & quæ iam omnem illius uim in se contraxerit. Tum itaque uas ipsum aperiat, & in uas aliud item uitreum lympidam aquam paulatim effundat, cuius os cum cera, & membrana accuratissimè obturet. Nam si illud diei spatio apertum sineret, omnis conclusa aqua in auram euanesceret. Tanta hæc aqua uirtute pollet (quod millies expertus sum) ut quatuor drachmarum pondere pota uel per se, uel cum pari odorati uini quantitate, uel stillatitiæ cuiusuis aquæ ad cordis robur facientis, ubi quis ictus, uel demorsus à quocunque uenenato animali, in tanto mortis discrimine uersaretur, ut uocem, uisum, ac reliquos ferè sensus amisisset, egrum ingenti adstantium admiratione à longo ueluti somno excitat. Quin & uomitione plerumq; plurimam insectorum humorum copiam exhaurit. Cuius rei exemplo (præter alia innumera) nuper mihi fuit præfecti oppidi Vipacini uxor, quam à uipera in dextra manu demorsam, & iamiam de naulo rationem cum Charonte inituram, hæc aqua in uitam à morte reuocauit. Id quod etiam paulò post contigit cuidam miserræ Sclauæ ab alia nō dissimili uipera in manu demorsæ. Hæc idem similiter præstat contra uenena, quæ per os sumuntur: siquidem ea adeo tenuis essentiæ, effracax, & penetrans est, ut momento ui sua in omnes corporis uenas permeet. Quin & eosdem præbet effectus in alios quàm plurimos morbos, quos breuitati studens prætereo. quandoquidem prudentes, & periti medici, habita huiusce uirium exacta ratione, eam adhibere poterunt, ubi legitime conuenire censebunt. Porro antidotum alterum Generosum, pariter & singulare, oleum illud est, cuius superius libro secundo capite de scorpionibus, item quarto capite de aconito à nobis facta fuit mentio. Id pulsibus extrinsecus patentibus illitum, nempe temporum, manuum, ac pedum, quinet iam extimæ cordis parti ad sinistram manillam, repetita alternis tribus horis illinitione, efficacissimè succurrit omnibus uenenis per os sumptis, quæ tamen ex erodentium genere non fuerint. Similiter uiperarum, aspidum, & cuiuscunque deniq; uenenati animalis morsibus singulari auxilio est, ut in processu latius explicabimus. Ut autem omnes intelligant quàm maximum sit in me iuuandæ posteritatis studium, modum, quo illud conficitur, hic describere non grauabor. Sumantur itaq; ineunte mense maio, quo tempore confici debet, olei communis centum annorum, sin minus sui temporis uetustissimi libras tres: foliorum hyperici uirentis manipuli tres. Oleum in uas uitreum

Primi antidoti descriptio.

Potio ex prædicto antidoto.

Alterius antidoti descriptio, & vires.



duple à contentio capacitatis imponatur, in quo hypericum aliquantulum antea contusum infundatur, deinde uas ce-  
 ra, & membrana obturetur, & medium in tenuissimam arenam condatur, loco ubi tota die insolari possit, atq; inibi  
 sinatur ad decimum, uel duodecimum diem usq; . Quo exacto tempore, mergatur uas in calentis aque balneo ad uigin-  
 ti quatuor horas: mox oleum ab herba exprimitur. Hoc facto sumatur hyperici, chamaedrys, calamintæ, cardui be-  
 nedicti, singulorum manipulus. Quæ omnia prius diligenter contusa oleo admisceantur, ac subinde uas in prædictum  
 mergatur balneum tribus continuis diebus. Extrahatur deinde, & ab incoctis herbis exprimitur. Post hæc accipian-  
 tur florum hyperici manipuli tres, qui à caulibus probe repurgati, & contusi in prædictum oleum infundantur, ac  
 in idem balneum per triduum reponatur. Post id tempus eximantur, & ut prius exprimantur. Idem fiat ter, aut qua-  
 ter, usque dum oleum sanguineum colorem referat. His peractis sumatur hypericum, quod iam defloruerit, & ab eius  
 cacumine grana illa uiridia excerpantur, quæ hordeaceis granis similia deprehenduntur, in quibus semen continetur. 10  
 Ex ijs itaq; tres confertim manipuli decerpantur: qui postea tusti, & uino meraco albo aliquantulum perfusi in oleum  
 prædictum infundantur, & cum eodem uitro, in arena sepulto, octo diebus continuis insolentur. Quo tempore trans-  
 acto tridui spatio in balneum immittantur, post colentur, & modo prædicto exprimantur: tertio, aut quarto simili-  
 ter dictum semen in oleo macerari debet, donec id obscuri sanguinis colorem representet. Ad hæc sumatur scordij re-  
 centis, calamintæ, centaurij minoris, cardui benedicti, uerbenacæ, dictamni Cretensis, singulorum medius manipu-  
 lus: tundantur omnia, mergantur in oleum prædictum, & uas in balneum iterum imponatur per biduum continuum,  
 dein colentur, & exprimantur, ut supra. Postea sumantur zedoariæ, radicum dictamni albi, gentianæ, tormentillæ,  
 aristolochiæ rotundæ, singulorum drachmæ tres, scordij manipulus. Tundantur item omnia, infundantur, & immitt-  
 untur in balneum, ibiq; permaneant tribus diebus continuis: colentur deinde, & exprimantur. Infundantur demum 20  
 styracis calamiti, laseri, cuiusq; drachmæ sex, baccarum iuniperi drachmæ quatuor, melanthij drachmæ duæ, cassiæ  
 odoratæ (cinnanonum officinæ uocant) drachmæ nouem: iunci odorati, cyperi, singulorum sesquidrachma: santæ-  
 lorum alborum semuncia. Tundantur omnia (ut pluries de alijs dictum est) & in idem oleum infundantur, & per tri-  
 duum continuum in balneum macerentur, demum colentur, & exprimantur, modo quo antè dictum est. Postremo  
 adsint oportet trecenti scorpiones uiui diebus canicularibus collecti. Ii in uase uitreo conclusi, cineribus calidis su-  
 perponantur, & cum eos præ calore sudare, atq; irasci constet, omne iam dictum oleum calidum superinfundatur.  
 Sed aduertendum est, ne id adeo seruens sit, ut uas disrumpat. obturato statim uasis ore in balneum tribus continuis  
 diebus continueatur: deinde coletur, & exprimitur. Proiectis interea scorpionibus, rursum in oleum infundantur rha-  
 barbari laudatissimi, myrrhæ communis usus, aloes hepaticæ, singulorum drachmæ tres: nardi Indici drachmæ duæ,  
 croci drachma una: theriacæ electæ, electiq; Mithridatij, cuiusq; semuncia. Quæ ex his tunda sunt, terantur, mox 30  
 ultimo infundantur in oleum, quod per triduum continuum continueatur in balneo. Quo facto oleum non amplius per-  
 coletur, sed deinceps recondatur, perinde ac opobalsanum. quippe quod mirandum sit remedium ad iam dicta uene-  
 na, & precipue contra napellum, quo infecti suere, ut experimentum fieret, Corsi illi duò uiarum obsessores, quor-  
 um historiam supra retulimus libro quarto in aconiti mentione: ad cuius lectionem, ne idem bis repetamus, eos reijci-  
 cinus, qui eius desiderio capiuntur. Præter autem Mithridatium, antidota alia duo generosa Dioscoridi probantur  
 in præsentis præfatione, unum scilicet quod è scinco, alterum quod è sanguine nuncupant: sed quod is eorum confici-  
 dorum rationem tradiderit, uisquam hætenus reperi. Quamobrem illa duo in multorum gratiam hic adscribere, non  
 alienum fore duximus, eo tamen modo, quo lib. II. de antidotis à Galeno seriatim describuntur, ubi hæc scripta reli-  
 quit. Antidotus δια τῶν αἰμάτων, id est, ex sanguinibus, ad uenena, uenenatorumq; omnium morsus idonea, sic  
 habet. Piperis longi, piperis albi, acori, croci, pbn, mei, dictamni Cretici, ammoniaci, agarici, singulorum drachmas  
 duas: amomi, opobalsami, seminis rutæ syluestris, cymii Aethiopici, anisi, sanguinis anatis maris, & femine sicci, 40  
 sanguinis hædini, sanguinis anserini, seminis napi syluestris, singulorum drachmas tres: gentianæ, trifolij, florum iun-  
 ci odorati, thuris, rosarum siccarum, singulorum drachmas quatuor, petrosilini, drachmas quinq; , polij Cretici tan-  
 tundem, cinnamomi drachmas sex, florum scordij drachmas octo: myrrhæ, nardi, singulorum drachmas decem, cro-  
 ci drachmas duodecim, cassiæ drachmas octo. Omnia hæc diligenter contusa, ac per excussorium cribrum triaecta  
 melle Attico despumato, commiscebis, commistaq; in argentea pyxide repones, atq; hæc ut maximo medicamento ute-  
 ris. Cæterum quæ è scinco temperatur antidotus, à Galeno hunc in modum redditur. Antidotus Mithridatis Eupa-  
 toris δια σκίους cognominata, faciens ad uenena, omnemq; uenenatorum materiam mortem inferentem, omniumq;  
 uenenosorum animalium ictus, conficitur hac ratione. Scinci, sagapeni, acori, pbn, hyperici, acaciæ, iridis, mei, gummi  
 mi, singulorum drachmæ duæ: rosarum siccarum, gentianæ, cardanomi, singulorum drachmæ quatuor, opij oboli  
 duo, styracis drachmæ octo: polij, cassiæ nigrae, seselis, bdellij, balsami, piperis albi, singulorum drachmæ quinq; , & 50  
 oboli duo: succi hypocistidis, opopanacis, myrrhæ, thuris masculi, castorij, piperis longi, cyphæos, foliorum malaba-  
 thri, singulorum drachmæ sex: scordij, costi, florum iunci odorati, galbani, resinae terebinthinæ, singulorum drach-  
 mæ sex & oboli duo: nardi Syriacæ, opobalsami, thlaspis, dauci Cretici, singulorum drachmæ sex & oboli tres: cro-  
 ci, cinnamomi, zingiberis, singulorum drachmæ sex & oboli duo: succi glycyrrhizæ, agarici, singulorum drachmæ  
 septem & oboli tres. Construitur autem hoc modo. Cyphi, hypocistis, sagapenum, gummi, opium, styrax, opopa-  
 nax, uino Chio macerantur die noctuq; , quoad penitus dissoluta sint. Reliqua uero interim contusa tenui cribro exa-  
 cutiuntur, illisq; iam maceratis, ac dissolutis commisceantur, commistaq; Attico melle ad crassitiem usq; despumato exa-  
 cipiuntur, opobalsamoq; superinmisso. demum in uas argenteum transferuntur. atque ad multos usus reponuntur.  
 Datur autem ex hac antidoto quantum æger tolerat. Hæc de duabus antidotis, quas non immerito quidem probauit  
 Dioscorides, quasq; ut efficacissimas in aliarum censum retulit Galenus, atque descripsit. Sed quoniam (ut supra in 60  
 theriacæ mentione dictum fuit) multa nobis desunt simplicia medicamenta, quæ in eis expetuntur; idcirco non uideo  
 quomodo

Antidoti è sā  
 guinibus de-  
 scriptio.

Antidoti è  
 scinco descri-  
 ptio.



quomodo possint legitime confici, nisi ijs uti uelimus, quæ eorum uicem suppleant, ita ut unum simplex medicamentum in alterius locum succedat. Id quod medicorum, ac seplastiariorum plerisque fieri adsolet. Quorum sententiæ et si cuiuspiam uideretur Galenus adstipulari, quippe quod scriptis tradiderit in cinnamoni defectu duplum cassiæ subijci posse; non tamen propterea inde colligi potest, quod idem fieri possit de quocumque alio simplici medicamento, quod desideretur, ut quidam existimant, non recte, meo quidem iudicio, Galeni mentem assecuti. Siquidem is secus de hac re disserit libro primo de antidotis, ubi sic inquit. Quod ad cassiam uero attinet, ea me commemorare nunc opus est, quæ in multis de medicina libris scripta sunt, duplum cassiæ si quis cinnamomo egeat, iniiciendum. Hoc dictum irridens Satyrus magister meus, unam ex Quinti facetijs ipsum esse dicebat, asseuerans eos, qui duplum cassiæ imponere iubent, si cinnamomo careamus, similia illis facere, qui nos censent, si quando Phalerno caruerimus, illius quod in cauponis uenit, duplicata mensura bibere: si quis panis siliginis desit, fursuracei duplum comedere. Mihi uero hæc Quinti facietas, si de re una quapiam, quæ per se sola uti uelimus, afferatur, uera irreprehensibilis uidetur: si de re, quæ in societatem multorum ueniat, non est eodem pacto uera. Nam cuiuscumque, quod solum corpori admoueri debet, ut puta rhus, absinthium, iris, gentiana, uel id genus alia aliqua medicina, si quis minus boni duplum loco præstantissimi accipiat, et corpori uel extra, uel intra admoueatur, duplicato etiam nocebit: at si multis aliquod optimum commiscendum fuerit, quod se aucturum aliorum uires spondeat, si præstantissimum desit, peius nihil erit uti duplo illius, qui prietates eiusdem generis habeat, etiam si deterius hoc illo uideatur. Cassia quidem cinnamomo genere proxima usque adeo est, ut ex ipsa quandoque cinnamomum oriatur, spectenturque; nonnunquam cassiæ arbores integra, in quibus aliqua cinnamomi uirgulta et cassiæ ramis prodeant. Simile autem istud est non uino aut pani, sicuti Quintus dicebat, sed uitæ functionibus, in quibus quod peragendum erat ab uno homine robusto, si absit, à duobus imbecillioribus perficiatur. hæc Galenus. Ex quibus uerbis omnibus palam est, Galenum non assentire, ut in compositis medicamentis unum simplex pro alio supponatur, nisi ex ijs sint, quæ eandem naturam sortiuntur, ut cassia, et cinnamomum. Quare illud inde colligendum esse putauerim, quod perperam faciunt ij, qui rem hanc aliter intelligunt. Porro et illam antidotum, quæ iuniperi baccas, terramque Lemniam recipit, summo opere laudauit Galenus, eamque lib. 1. de antidotismo moriæ prodidit, hisce uerbis. Antidotus, quæ exhibita accipientem tutum à uenenis reddit, sic habet. Baccarum iuniperi drachmas duas, terræ Lemniæ drachmas duas et obolos duos. Hæc ubi in puluerem redegeris, oleo, aut melle commiscebis, et repones: atque cum opus fuerit, ex aquæ mulsæ cyathis duobus quantum est auellana dabis. Hac antidoto Nicomedes rex utebatur, si quando suspectos habuisset, qui se uocarent. Nam si uenenum non subsistat, quieta manet: si adsit, nauseam concitat, et euomere cogit, ita ut uenenum quoque cum antidoto reijciatur. Sed hæc hæcenus dicta sufficiant, quantum ad uenenorum omnium in uniuersum rationem. quandoquidem de ijs priuatim, eorumque auxilijs, et antidotis in singulorum mentione diffusius agemus.

Succedanea  
quando ad-  
mittenda.

Antidotus ex  
terra Lemnia

## Cantharides.

## Cap. I.

QUIBUS datæ sunt Cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad uesicam usque cuncta erodi sentiuntur: picem, aut simile quiddam cedriæ resipiunt: dextra præcordia inflammantur. urinam ægrè reddunt, & subinde cum lotio sanguinem emittunt: strigmenta non secus atque dysentericis, aluo deferuntur: fastidia urgent: animo linquntur, obortaque vertigine concidunt. postremo mente abalienantur. Ergo antea quam tale nonnihil accidat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, vomere cogantur. mox ubi uomitione plurima reiecerint, halicæ aut oryzae, tragi aut ptisanæ cremor, aut decoctum maluæ, aut seminis lini, aut fœni græci, aut radicum althææ, quam Latinus sermo ibiscum appellat, clystere infundatur. Præterea nitrum eisdem dandum, ex hydromelite, ut quæ stomacho adhuc, aut intestinis adherent, eluendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in aluum ex nitro aqua mulsæ vacuari debent. Detur deinde uinum, aut passum, in quo pineoli nuclei, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsæ aut anserinus adeps in passo liquefactus. Inflammatae autem partes, hordei farina cum mulsæ decocta perungantur. Ab initio admota cataplasmata nocent, quod citatus ab eis calor, illapsus uirus ita remoratur, ut in principibus se partes insinuet: ipsa tamen interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulatur, utpote quæ dolores & permulceant, & leniant. Tum ubi corpus calfaciente oleo inunctum fuerit, in solum descendere oportet, ac lauare, ut per cutem summam, quæ corpori noxia inhæserunt, etiam excernantur. Et deiectiones multifariam moliri oportet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capestat. Gallinaceis carnibus, & hædinis, aut suillis catulis, maximè pinguibus, & tenerrimis, ac cum lini semine coctis, uesci debent: siquidem aluum cient, atque uenenorum acrimonias hebetant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodest thuris cortex, & Samia terra, quæ aster appellatur, si quaternæ singulorum drachmæ cum passo fumanur. item pulegium ex aqua tritum: irinum, aut roscum, cum rutæ decocto: recentes vitis ramuli, cum passo detriti. Longè omnium potentissimè antidota auxiliantur, cum aqua mulsæ, drachmis quatuor pota.

CANTHARIDVM tum historiam, tum etiam facultates superius libro secundo, ubi et earum picturam exhibuimus, adeo diffusè lateque tradidimus, ut superuacuum ducerem hoc in loco plura de eis rememorare, nisi nunc de earum malefica et noxia ui nobis differendum esset. Cum igitur Cantharides excalfaciant recessu quarto, et exica-

Cantharidus  
malefica, &  
noxia vis.



Symptomatum  
causæ.

Catharidum  
veneni cura-  
tio.

Controversia  
inter Græ-  
cos, & Ara-  
bas.

cent secundo, nil sanè mirum fuerit, si erodant, ulcerent, & denique sumentes interimant. Nocent priuatim uesticæ, omnibusq; urinae inferuentibus membris, non modò haustæ; sed quandoque etiam exterius illitæ, ubi exulcerare sit opus: præsertim cum amplis admiscantur cataplasmatibus, locisq; illinuntur uesticæ propinquioribus: nempe coxendia cum articulis dolore diutius tentatis, uel pubi, uel renibus, uel testibus. Quo fit, ut qui has hauserint, exulcerata in de uestica, magnis in urina reddenda excrucientur doloribus. quanquam præter id omnia in uniuersum lædant uiscera, quòd suapte natura erodant, & postremo necem inferant: namq; sua uenefica, & perniciosa ui deradunt inter nos meatus omnes, quibus obuiant. Proinde nec mirum si cum lotio sanguinem extrahunt, erosio ab eis uasis: neque sit quando (ut recentiorum quidam dixerunt) penis ipse, testes, pubes, & uesticæ ceruix intolerabili inflammatione uexentur. Hinc enim plerumque euenit, ut qui hauserint, urinae stillicidio afficiantur nò sine intollerabili ardore angustiaq;: Cæterum picis, & cedriæ odor, quem à cantharidibus malè affecti gustu, & olfactu percipiunt, aliunde, meo quidem iudicio, non prouenit, quàm à uaporosis humoribus in uentriculo, & iecinore adustis, intensa huiusce ueneni caliditate. Ab ea siquidem dum exuruntur humores, quædam inuicem fit commistio, quæ propriam tum gustum, tum odoratum inficiendi facultatem adipiscitur. Inflammantur præterea dextri lateris præcordia. quippe cum ueneni uis in iecur facilius, quàm in lienem excurrat, mirum utiq; non est, si concitatis ibi inflammationibus, potius dextrum quàm sinistrum ægrotet latus. Nec alia ratione fit inde fluxio dysentericæ similis, secum deferens intestinorum menta, quàm quòd cantharides ipse ad intestina descendentes acerrima sua ui, ea exulcerent, & abradant. Defectus uerò animi, ingens anxietas, cordisq; angustia partim eueniunt, doloris, ardoris, intolerabilisq; inflammationis exuperantia: partim uerò deleteria ui pharmaci, quæ usque adeò resoluit uitales spiritus, & imbecillos reddit, ut in affectu corde, hæc tam seuera oriantur symptomata. Quin & ob id uertiginosi fiunt, delirio, anentiaq; capiuntur, qui eas sumpserint, quòd uenenoſe exhalationes, quæ à collatis humoribus in inferioribus membris sursum in cerebrum feruntur, adeò ipsum inficiunt, ut facillè animales facultates corrumpantur, ratioq; ipsa pereat. Sed ut his oculis succurratur incommodis, primum sanè necessarium fuerit (ut etiam Dioscorides inquit) cantharidas ipsas extra corpus ducere, crebris excitatis uonitionibus, ijs nimirum medicamentis, quorum in huius libri præfatione meminimus Dioscorides, atq; etiam nos mentionem fecimus in nostra in eam longa commentatione. Quinetiam acribus clysmatis opus est, ut per hæc deuocentur, quæ ad intestina descenderunt. Fit enim ut exhaustis è corpore cantharidibus, non magno postea negotio accidentibus, incommodisq; præſidia adhibeantur. Quandoquidem exulceratæ uesticæ, cui suapte natura plus nocent cantharides, quàm cæteris internis uisceribus, succurritur refrigerantibus, lentis, & pinguius simulis mistis medicamentis. frigida nanque inflammationes extinguunt, mulcentq; earum dolores: pinguius ueneni acrimoniæ obtundunt: lenta uerò, ac uiscosa cum internis partibus pertmaciter inhereant, non modò diu medicamenta in exulceratis retinent locis; sed etiam sanas partes muniunt, ne ueneni uim admittant. Idcirco ad hoc mirificè præstat lac humanum ab ipsius uberibus exuctum, crudum, recensq; butyrum eclegmatis modo linctum: psyllij, cydoniorum malorum, & maluæ seminis spissamentum: item serapium ex nymphææ floribus, & purpureis uio-  
lis, quin & quod ex papaueribus conficiunt: necnon lactuca, & portulacæ, & cucumeris, & cucurbitæ succus: præterea cremor, lactis speciem referens, qui è papauerum, melopeponum, cucurbitæ, cucumeris, angurie, & lactucæ semine exprimi solet assuſa uiolarum aqua, aut radicis alibæ, aut solani, quod uesticariam, & halicacabum uocant. cuius etiam rubentes bacæ decem, uel duodecim numero fractæ, & ex aqua portulacæ, uel ptisana hordecia cea potæ, hoc in negotio præsentaneo remedio prosunt. Facit ad hoc & amygdalinum oleum, quod scilicet ex dulcibus elicitor nucibus, unciarum sex pondere haustum. Huic autem præfertur, quòd è recentibus pineis nucibus exprimitur. Sed omnium præstantissimum est, quòd è semine albi papaueris eximitur. quandoquidem hoc præter id quòd tanquam pingue plurimum conuenit, potest suapte natura inflammationes extinguere, ueneni acrimoniæ retundere, & dolores quantumuis uehementes sedare. Sunt etiam qui præferant aquam, quæ feruentis balnei calore uitæ instrumentis elicitor è maluæ folijs, ibisci radicibus, & recentibus cucurbitæ ramentis, quòd propria ui urinae ardoribus opem ferat, & intestinorum inflammationes repellat. Porro succurritur exulceratis intestinis, iisdem sanè medicamentis, quibus ad dysenteriam utimur: nempe pinguium carnum iuribus clystere infusis, addito hirci, ceruicis, adipis: & omphacino rosaceo, plantaginis aut portulacæ aqua prius eloto. Prohibentur halitus cerebrum petentes, dissoluunturq; assumptis antidotis, quæ ueneni resistunt, & humores putrescere non sinunt. quinetiam cataplasmatibus ex frigidis, repellentibusq; succis, sincipiti, & coronali futurae illitis. In summa frangitur, atq; demolitur ueneni uis, Dioscoridis testimonio, ualentibus antidotis, ueluti theriaca, aut Mithridato, aut (ut scribit Galenus lib. i. x. simplicium medicamentorum capite de terra Lemnia) eo antidoto, de quo & nos superius locuti sumus, quòd fit ex ipsa Lemnia ssthragide, & iuniperi baccis. Prosunt insuper epithemata cor roborantia, itemq; inunctiones, quæ ex odoriferamentis constant ualentioribus: præsertim oleum nostrum de scorpionibus superius descriptum aduersus uenena. Refert Galenus libro secundo de antidotis Asclepiadis auctoritate, cantharidas proprio ueneno remedium & antidotum esse, si earum pedes, & alæ tritæ cum melle eclegmatis modo paulatim assuuantur. Id quòd etiam asseruit libro xi. simplicium medicamentorum, ut superius libro secundo in earum quoq; mentione retulimus. Hoc idem scribit Aetius à Galeno fortasse mutuatus lib. xiii. cap. xlix. sic inquit. At uerò contrarie affectionis rationis quantum nihil aliud his auxiliantur cantharidum alæ, & pedes cum passo potæ. hæc Aetius. Veruntamen cum huiusmodi remedium suspitione non uacet (non propterea Galeni testimonium reiiciendum putauerim) cumq; à multis improbetur, atq; ipse nullum adhuc eius periculum fecerim; ideo nec ipsum damnare, nec probare ausim. Arabes namq; pro certo habent, omne uenenum, quòd cantharidibus insit, earum tantum alis, pedibus, & capitibus inesse. Quare cum cantharidas suis immiscet medicamentis, tam intus sumendis, quàm extra adhibendis, iubent contra Græcorum sententiam, ut capita, alæ, ac pedes abscindantur. quanquam credendum arbitror Arabas Hippocratem peram



peram intellexisse, ut ultimo commentario de ratione uictus in morbis acutis scribit Galenus. Sed quoquomodo res se habeat, ambarum partium placita in medium attulimus, ut unusquisque suam in hac re sequatur sententiam. Nos tamen suspecta medicamenta semper dimittenda iudicauimus, atque his utendum, de quibus inter probatos auctores, et doctos uiros conuenit. Sunt et uulgaribus, qui ad epotas Cantharidas acetum commendent. Sed id equidem probare non ausim, quod atiquorum, recentiorumque repererim neminem, qui scripsit tradiderit acetum contra cantharidas auxiliari. Quinetiam medentur urinae ardoribus, et pudendorum inflammationibus, non tantum ea medicamenta, quae per os sumuntur; sed ea quoque, quae exterius illinuntur. Praestant igitur ad hoc rosaceum, omphacinum oleum, uiolaceum, et quod fit ex nymphæa floribus: item quod ex papauerum semine conficitur, quodque ex ijs paratur fructibus, quorum plantam appellant aliqui Balsaminam, alij uero Caranzam, cuius historiam, ac facultates superius libro quarto descripsimus, cum de uite nigra differeremus. In quem usum hæc non modo exterius illinuntur pubi, peni et testium; sed etiam in pudendi meatum clystere injiciuntur, praesertim addito oui albo diutius rudicula agitato, aut sedi succo, aut hyoscyami, aut portulacæ, aut lactucæ. Maxime etiam prodesse compertum est, si ad umbilicum usque duabus aut tribus horis sederint patientes in aquæ tepentis balneo, cui ibisci radices, maluæ folia, et semina, uiolarum flores, psyllij, cydoniorum malorum, foenigræci, et lini semen, hordeum, et hyoscyamum, et id genus alia fuerint incocta. Postremo ad omnes huius ueneni reliquias, quæ corpori hæsisent, eradicandas, læsaque membra roboranda, et ad pristinum temperamentum restituenda, probatissimum erit medicamentum bis in die mane, et uespere, electarium mox describendum, uncia pondere ex humano, uel caprillo, uel asinino lacte potum. Fit autem hoc modo. Accipe nucleorum pineorum uncias tres: nucis Indicæ recentis uncias duas: pistaciorum fescunciam, seminum melopeponum, cucurbitæ, cucumeris, papaueris albi, maluæ, singulorum uncia dimidium: corticis arboris thuris, drachmas tres: margaritarum, coralliorum amborum, santalorum alborum, singulorum sesquidrachmam: succi glycyrrhizæ drachmas duas: baccarum iuniperi drachmam unam: gummi Arabici fescunciam: terræ Lemniæ drachmas sex: succi baccarum halicacabi, portulacæ, singulorum uncias sex: diluti uiolarum uncias octo: spissamenti è seminibus malorum cotoneorum, aqua uiolarum maceratis, uncias sex: serapij uiolacæ uncias quatuor: de floribus nymphææ, de papauere, cuiusque uncias decem, quæ terenda sunt, conterito, deinde commistis omnibus secundum seplasiariorum regulam, electarium facito: quo utitor, ut antè diximus.

Electarii descriptio.

## Pinorum erucæ.

## Cap. II.

II S qui crucas pinorum hauserint, illico dolor in ore & palato exoritur: uehemens alui, linguæ, ac stomachi, inflammatio torquet: intestina dolor excruciat, ita ut pruriginem sentire uideantur: corpus totum exæstuat: fastidium urget. Quibus est succurrendum remediis, quæ deuoratis cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro simplici oleo & irino, melinum, quod è cotoneis pomis & oleo temperatur, accipiemus.

## Buprestis.

## Cap. III.

QVI buprestin biberunt, non dissimile nitro uirus sapiunt: stomachi, uentrisque uehemens dolor insequitur: tam uenter quam stomachus minus in modum, ut in aqua inter cutem, diffusus, inturgescit. Uniuersa corporis facies contenditur: urina supprimitur. Quibus eadem, quæ potis cantharidibus auxiliantur. Priuatim post uomitus, & uacuationes, quas clysteribus molimur, aridæ fici profunt: item earum decoctum, ex uino. Vbi uero iam ferè pericula inclinantur, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulso, aut lactis potu, iuuantur. Pyrorum etiamnum omne genus esse, & lac humanum bibere, conuenit.

DE BUPRESTIBVS, et pinorum erucis superius libro secundo satis differuimus, quantum ad earum historiam attinet: nunc harum uim ueneficam prosequimur. Hæc igitur animalia etsi pota, aut alias in uentriculum ingesta, quædam symptomata, et incommoda pariant, ab his planè diuersa, quæ ab epotis cantharidibus inferuntur; tamen et ipsa eandem expetunt curationem, eademque postulant medicamenta, quibus in epotis cantharidibus utimur. Verum aduersus hæc quoque nonnulla propria, peculiariaque habentur antidota, quorum cum latius meminerit Dioscorides, non est cur nos de ijs plura dicamus.

## Salamandra.

## Cap. IIII.

SI SALAMANDRAM hauserunt, linguæ inflammatio consequitur: mens, & sermo præpeditur: tremor cum torpore, aut horrore quodam, ac exolutione accedit: partes nonnullæ corporis liuoribus circumquaque sugillantur: sæpeque, diutius immorante ueneno, putrescentes desluunt.

Quibus præstabimus cuncta, quæ potis cantharidibus. Pecularia uero remedia, resina pinus, aut galbanum ex melle linctum, & aiugæ decoctum, in quo nuclei pinei conterantur: urticæ quoque folia, cum liliis & oleo decocta. Profunt etiam oua testudinis marinæ, aut terrestres cocta: item ranarum ius, cum quibus eryngii radix incocta sit.



Salamandra  
uenefica natu-  
ra.

NON solum ueneno inficit, & nec em adfert Salamandra sicca, & in puluerem pota, uel clam cibus admista; sed etiam morsu, uiperarum modo, ceterorumq; serpentium uenenum ei aculantiū. Quin & fructus, & herbas inficit tum salua quadam, tum mucosa specie, quæ è toto eius corpore sudat, magno degustantium discrimine: siquidem plerique reperti sunt, qui hoc tantum ueneno periere. Proinde mirum non esse uidetur, si recentiorum quidam tradiderunt, integras quandoq; interisse familias: quòd aquas bibissent, in quorum puteos fortè Salamandra ceciderat: uel quòd panem tantum comedissent furno incoctum, qui lignis ea infectis concaluerat. Quibus tamen non usquequaque credendum existimo, cum ignium ui uenena omnia absumentur. Sed potius adstipulandum fuerit Plinio, qui libro *xxix. cap. iiii.* non ex pane furnis incocto, in quibus ligna salamandræ ueneno infecta, accensa fuissent, quosdam iam fuisse necatos prodidit, sed ex panis crusta lignis inassata pede tantum salamandræ contactis, ut eius uerba testantur, cum inquit. Inter omnia uenenata salamandræ scelus maximum est. Cætera enim singulos feriunt, nec plures pariter interimunt, ut omittam, quòd perire conscientia dicuntur homine percusso, neq; amplius admitti ad terras. Salamandra populos necare improuidos potest: nam si arbori irrepsit, omnia poma inficit ueneno, & eos, qui ederint, necat frigida ui, nihil aconito distans. Quinimo si contacto ab ea ligno uel pede, quo crusta panis incoquatur, idem ueneficium est, uel si in puteum cadat. Quippe cum salua eius quacumq; parte corporis, uel in pede imo resperasa, omnis in toto corpore defluat pilus. hæc tamen Plinius. His igitur, qui hauserint (ut Aetius est auctor lib. *xiii.*) præter ea quæ à Dioscoride scribuntur, macula in totum corpus exoriuntur albæ, deinde rubæ, postremo nigre, quæ tandem putrescentes, uniuersum deglabrant corpus. Sic uenenatis succurritur (ut Dioscorides ait) iisdem remedijs, quæ ad cantharidas præstant. Quod tamen aliquibus minime uidetur rotationi consonum. quandoquidem cum salamandræ uenenum maxime frigidum, humidumq; sit, cantharidum contra calidissimum, & exiccans, nullo quidè pacto consentaneum censent, quòd iisdem utrisq; succurratur medicamentis. Verum his illud rectè, mea quidem sententia, responderi potest, quòd ubi Dioscorides salamandris cantharidum commendat medicamenta, de generalibus, quæ in uniuersum fiunt, duntaxat intelligit, nempe ut quàm citò fieri possit, uenenum è uentriculo, & intestinis extrahatur crebris uomitionibus, & clysmatis acrioribus: in cordisq; præsidium dentur theriaca, Mithridatium, aliq; generosa antidota, quæ pota cor ipsum à uenenatis omnibus tuentur. Siquidem in cantharidum capite, quod omnium primum habeatur, generalis methodus Dioscoridi tradenda fuit, ne eadem per singula capita sæpe frustra & ineptè repeteretur. Quare scitè cum ad cantharidum remedia legentes reiecit, de generalibus tantum intelligit. Anicenna eandem salamandris adhibet curationem, quam opio, quòd tam hoc, quàm illæ frigidissimo sint temperamento. præfertq; cæteris theriacam, Mithridatis antidotum, resinam terebinthinam, styracem, urticæ semen, & cupressi frondes. Cæterum quoniam salamandra sui corporis forma **STELLIONES** mortiferi etià morsus animalia mihi in mentem reuocauit, cum eorum peculiarem mentionem non fecerit Dioscorides, non alienum fore duximus, eorum primum historià describere, deinde uenenati morsus remedia in medium adducere. Sed an lacertarum generi legitime stelliones adscribi possint, profectò non ausim decernere: quanquam non desunt, qui asserant, maiores lacertos, quos uulgò appellamus Ramarri, alij Liguri, alij uerò Lucerti, ueros esse stelliones. Quorum tamen sententiæ non possum subscribere. quandoquidem Plinius libro *x. cap. xxv. & xxvi.* Stelliones inquit esse lacertarum figuræ, & chameleonum quodammodo naturam habere, ut qui rore tantum uiuant, præterquam araneis. Ex quibus fateri licebit, stelliones non esse nostrates lacertos, namq; hi cochleas, cicadas, locustas, & papiliones deuorant, & id genus animalcula. Ad hæc copiosum in uenis continent sanguinem, & amplo referti sunt iecinore, hominibusq; haudquaquam inimicantur, quin potius eos amant. Contra uerò ijs aduersantur stelliones, Plinio auctore lib. *xx. cap. x.* ubi nullum animal fraudulentius inuidere homini tradidit. Præterea (ut idem eodem loco scribit) stelliones hyemant in domibus in locis ostiorum, & fenestrarum, aut caneris, sepulcrisue. quapropter uenenatores obseruant cubile eorum æstibus. Ibi uere incipiente fisis harundinibus textas opponunt casus decipularum modo, quarum angustijs etiam gaudent. Veniunt autè eos, ut eorum senectam, qua ut serpentes quotannis exuuntur, facile consequantur; quòd nihil ei remedio in comitialibus morbis præferatur: ex more enim exutam senectam illico deuorant. Hinc igitur sanè perspicuum fuerit, stelliones à maioribus Italicis lacertis differre: hi siquidè in campestribus, in frutetis, sepibus, & macerijs degunt, illi uerò in sepulcris, & domibus nostris oberrant. Proinde iubet Dioscorides, ut qui in uenenorum timore uersantur, & culinam subdiali loco apparare nequeunt, sub testis apparent. Sed tum diligenter laquearia animaduertenda, quòd frequenter à superioribus contabulamentis animalia decidunt, exigua quidem, sed quæ non modicam perniciem moliantur, ut phalangia, stelliones, & alia quædam reptilia. Quòd autem stelliones in Italia proueniant, testis est Aristoteles lib. *viii. cap. xix.* de historia animalium, asserens in quibusdam Italiæ locis stelliones morsu homines perimere. Sed qui sint, nullam habeo historià clariorem. Quanquam his coniecturis iandiu existimauerim ea lacertarum genera esse stelliones, quæ in Hetruria in nostris morantur domibus, præsertim quibusdam prope terram foraminibus, à nobis uulgò Terrantola appellata, de quibus superius libro secundo latius diximus, de lacerta Calcidica differentes. Quandoquidem hoc animal lacertis persimile nistur, & araneos maxime uenatur, ut Plinius inquit, item Aristoteles lib. *ix. cap. primo* de historia animalium. Dorso præterea maculis quibusdam nitet stellarum modo radiantibus, unde & fortasse nomen. Quinetià, quòd uenenum morsu relinquunt, cum è cauernis exeunt, statim in Hetruria necantur. His (ut audio) abundat Syria in caminis potius, quàm aliubi conuorantibus. Varia sanè sunt huiusmodi animalium genera, de lacertis, chameleonibus, scincis, crocodilis, stellionibus, & salamandris loquentes, quippe quoniam in unoquoq; horum genere habentur differentiæ tum formæ, tum coloris, tum magnitudinis. Obseruaui ego salamandras in quibusdā Germaniæ syluis uniuerso dorso nigerrimas, pectore uerò, & uentre admodum rubentes. Sunt & in Vtinenfibus aquis degentes, cauda anguillarum modo lata, & rotundo rostro, aluo admodum rubente, nigricante dorso, nullis maculis resperfo. Quod etiam scincis euenit: nam

Salamandræ  
uenefici cura-  
tio.

Stellionũ cõ-  
sideratio.

60  
& hi



Stellionum  
morsus reme  
dia.

Cap. V.

1. The first part of the paper is devoted to a review of the literature on the topic of the paper.

Ephemeride  
neni curatio.

Anacardiorū  
ueneni signa,  
& curatio.

. Staphidis a-  
græ noxa, &  
curatio.



## Dorycnium.

## Cap. VI.

**DORYCNION**, quod aliqui manicon solanum appellant, epotum, lactis saporem in gustu refert: continentes singultus ciet, humor linguam uexat, sanguis confertim reiiicitur: mucosa quædã perinde quasi dysentericis, aluo egeruntur. Itaque antequàm aliquid ex ijs eueniat, auxilio sunt antedicta, uomitus, clyster, & quæcunque potum uenenum expellere possunt. Priuatim ijs opitulatur, aqua mulsa, lac caprillum, aut asininum, dulce uinum, quod tepidum cum aniso bibatur, amygdalæ amaræ, gallinacea pectora decocta. quinetiam conchylia omnia, tam cruda quàm tosta esse, salutare est. conueniunt & locustæ marinæ, & gaminari, & pota eorundem iuscula.

Dorycnij ueneni confid.

Solanum manicum ueneni noxa, & curatio

**DE DORYCNIO** satis differuimus libro quarto, quantũ quæ nostra esset de eo sententia, ingenue dicendum erat. Hoc tamen loco non tacebo, quod idem esse non arbitror Dorycnium, & manicum solanum. quandoquidẽ duobus capitibus libro quarto, de his tanquã de diuersis disseruit Dioscorides. Verum enim uero etsi hoc in loco dixerit is reperiri quosdam, qui Dorycnium manicum solanum appellant; non tamen id esse uerum asserit, sed aliorum tantum refert opinionem, quam nec probandam censet. Ceterum Solano manico ueneficam uim inesse constat, utpote quod eos, qui ipsum hausserint, maximis efficiat incommodis, ut ipse Dioscorides testatur loco citato, cum inquit. Solani manici radix drachmæ unius pondere pota ex uino, facit species uanas, imaginesq; non iniucundas obuersari: sed duplicatus hic modus, ad tres usque dies mentis alienationem adfert. quadruplicatus uerò interimit. Remedio est aqua mulsa copiosius pota, & uomitione reiecta. Has perniciosas facultates, earumq; remedia loco dicto reddidit Dioscorides Solano manico: cuius tamen hic inter uenenatas plantas postea non meminit. Ibidem libro quarto non aliam uim maleficam Dorycnio assignauit Dioscorides, quàm quod copiosius haustum mortem adferat. Hinc itaque conijcere ausim, quod eadem utrisq; medicamenta facile competere possint. Dorycnium Anicenna uiam uulpinam uocat, nec tamen plura de eo retulit, quàm scripserint Dioscorides, & Paulus. Idcirco hoc in negotio à Dioscoride minimè discedendum erit, nec ab ijs præterea medicamentis, quæ à nobis inferius in opij curatione describuntur.

## Aconitum.

## Cap. VII.

**ACONITVM** statim in lingua inter bibendum, cum adstrictione quadam dulcescit: & subinde potissimum cum exurgere conantur, uertigines offundit: lacrymas ciet: grauitatem pectori, & præcordiis adfert, simulque crebri spiritus deflantur. Quare uenenum uomitione abigi, aut clystere per aluum egeri opus est. Vtimur inter propinandum, origano, ruta, marrubio, uel absinthij decocto, cum uino absinthite, uel semperuino, uel abrotono, chamaelea, aut aiuga. Prodest etiamnium coagulum hædi, leporis, aut hinnuli cum aceto: ferri quoque stercus, item uinum in quo aurum, ferrum, argentumue candens restinguatur, potum: lixiuiæque cum gallina, & uino decocta, aut carnium bubularum præpinguium iura, cum uino sumpta. Fertur & aiuga priuatim ipsis subuenire.

Aconiti ueneni confid. ratio.

Scillæ uenenosæ noxa, & curatio.

**TAMETS I** plura sint, ut superius libro quarto retulimus, Aconiti genera: nempe tria, quæ cynostona, lycocotonaq; appellantur, & quartum pardalianches uocatum, quæ omnia ueneficam uim sortiuntur; unam tamen, & eandem exposcunt curationem. Refert Aetius, præter Dioscoridem, eos qui hausere, post dulcedinem, & adstrictionem amaritudinem percipere: adstringuntur deinde maxillæ, subsequuntur morsus, & erosiones stomachi. Quibus nisi illico succurratur, caligant oculi, & subruenti uisuntur. Oboriuntur tremores, corpusq; uniuersum intumescebat, fiuntq; ægri hydropicis similes. Medendi ratio à Dioscoride petenda: quippe qui usque adeo præstantia descripsit medicamenta, ut Aetio, & Auicennæ plura non reliquerit addenda. Attamen Conciliator Aponensis, qui inter recentiores de uenenis luculenter scripsit, aconitum bibentibus sphragidem Lemniam commēdauit drachmarum duarum pondere ex calida potam: dein uomitum excitari iubet: à uomitu theriacam eodem pondere exhiberi, ex uino in quo incocta fuerit gentiana. Atq; adeo putat Aconiti præcipuum esse antidotum longæ aristolochiæ radicem. Ceterum dum hæc scriberem, mihi in mentem uenit nonnunquam inter uenenatas plantas haberi scillam, flammulam, urticam, & dracunculi semen, quæ cum hic silentio præterminissa fuerint à Dioscoride, optimum institutum esse putauimus, nunc de singulorum ueneno, eiusq; remedijs nonnulla commemorare. Sunt igitur in **SCILLARVM** genere, quæ suapte natura uenenosa proueniant: sunt etiam contrà quæ nullo imbutæ ueneno in medicum ueniant usum. Hæ potest, uel alias ingesta, nullam pariunt noxam, nisi earum plus, quàm par sit, assumatur. Illæ uerò sua malefica uim, etiam quàm parce deuorentur; illico tamen hominem torquent, quemadmodum fungi. Venenosa autem scilla (ut Mesues, ac ceteri Mauritanorum tradidere) sola nec alteri annexa prouenit, locisq; oboritur sædis, ac graueolentibus, ut apud thermas. Discant igitur diligentissimi seplasiarij ijs uti scillis, quæ simul conuascuntur, sapore amaro, acris, si mul & dulci, splendentibus undiq; laminis. Quandoquidem nulla his f: cultas inest, qua corpus ledi possit: nisi fortasse, ut dictum est, plus earum assumeretur, quàm ferre posset natura. Quamobrem de his differens Auicenna inter uenenatas plantas sen septima quarti uoluminis, sic inquit. Scillæ male, aut probatæ longior usus, quàm par sit, uentriculum exulcerat, & intestina, ipsasq; mesaraicas uenas, aliosque meatus, qui è uentriculo in iecur permeant. Quo fit, ut in uisceribus oriantur punctiones, acutiq; cruciatus, & inde dysenteria. Quibus incommodis succurritur lactis



lactis potu. in quo ferrum, quod Græci stomoma, nos uero chalybē appellamus, pluries restinctum fuerit, deuoratis-  
 que ororum uitellis, in aceto decoctis. Quinetiam ijs fixa cibaria conferunt, pingua carniū iura, recens, crudumq;  
 butyrum, & extrema iuuenum quadrupedum membra, aliq; permulta, de quibus latius egimus, cum de cantharidi-  
 bus sermo haberetur. Nec minora facit incommoda FLAMMULA uocata, cuius historiam scripsimus libro  
 quarto in alterius clematidis mentione. Ipsa enim præter uenenosam, quam possidet facultatem, excalfacit ordine  
 quarto, adeo ut ualentissime corpus exulceret, ubi fuerit imposita. Ingesta uero fauces, guttur, uentriculum, & in-  
 testina magnis afficit ardoribus. Quin & intolerabilem excitat sitim, & aridam reddit linguam: intestina deradit, et  
 ardentem pellit urinam. nam quandoque tam altè excoiat, ut erosus uasorum tunicis, mictu sanguis reddatur intole-  
 rabili suæ dolore. Ad hoc facit, auxiliaturq;, excitatis prius uomitibus, & clysteribus infusis, luc bubulum suo cum  
 butyro potum, aut alio recenti admistum, item amygdalinum oleum, aut è pineis nucleis, aut Indicis nucibus, aut pa-  
 papaueris semine expressum. Quippe (ut iam sæpenumero diximus) huiusmodi acutorum curatio, non est aliunde pe-  
 tendenda, quàm à pinguibus, & seminum quorundam crassamentis. Præstat hoc in negotio & iecur sōuere, lactucæ, por-  
 tulacæ, & intubi bortenensis succo: item sintalis aqua rosacea maceratis: quin & halicacabi baccas deuorare prodest.  
 Quod si cruenta cum lotio reddantur, illinantur statim renes, pubes, testes, & ipsa demum uirilia, rosarum, polygo-  
 nij, plantaginis, cynoglossi, papaueris, lactucæ, & hyoscyami succo. Opitulantur etiam clysteres è bubulo, aut capri-  
 ni, lacte, aut è pinguibus carniū iusculis infusi, addito rosaceo, & uino è myrtinis baccis confecto, ut diffusius in can-  
 tharidum curatione retulimus. Sequitur VRTICÆ SEMEN, id præsertim, quod lini semen refert, quo ex-  
 citandæ ueneris gratia quidam utuntur. Sed cum & ipsum in medicum ueniat usum, ac etiam quorūdam cibis admiscea-  
 tur, animaduertendum est, ne largius ingeratur, præsertim solum; sed ijs adiiciatur cibus, uel medicamentis, quæ e-  
 ius acrimoniam excedentemq; feruorem obrundere, & extinguere queunt. cuiusmodi sunt pistacia, nuclei pinei, dul-  
 ces amygdalæ, nuces Ponticæ, & priuatim deglubitum sesami semen. Nam cum urticæ semen affatim deuoratur,  
 non solum (ut Auicenna est auctor) omnes scillæ malos præbet effectus; sed priuatim etiam continentem excitat tus-  
 sim. Curatio eadem quæ scillæ. uerim ad finiendam tussim, quæ priuatim ex urticæ semine prouenit, ea non sunt  
 omittenda, quæ suapte natura pectoris asperitates mulcent: qualia sunt amygdalinum oleum, serapium uiolaceum,  
 & ex zizyphis, saccharum quod candidum uocant, diatragacanthum frigidum, hordeacea ptisana saccharo inspera-  
 ta, & id genus alia. Præstant præ cæteris (ut scribit Conciliator) ad epotum urticæ semen, malorum cydoniorum  
 semina contusa, & ex calida aqua pota. Calidissime porro, accerrimeq; facultatis est etiamnum DRACVN-  
 CULI semen, utpote quod potum, aut in cibis sumptum, guttur asperitate afficiat, adurat, ac pungat: linguam itē,  
 & dentes uexat: quin & corpori uniuerso ingentem calorem inducit. His noxis auxiliatur recens buty-  
 rum haustum. Priuatim tamen præcipuum remedium adfert hordeacea farina in pultem conformata, additis pinidijs,  
 aut saccharo, amygdalino oleo, uel recenti butyro.

Flammulæ  
 ueneni noxa,  
 & curatio.

Vrticæ semi-  
 nis noxa, &  
 curatio.

Dracūculi se-  
 minis noxæ,  
 & remedia.

## Mel heraclia.

## Cap. VIII.

MEL IN Heraclia Ponti, ubi aconitum gigni solet, inuenitur. quod qui edunt, bibuntue, non  
 secus affliguntur, quàm qui aconitum ebiberunt. Iis eadem, quæ poto aconito conueniunt. Adi-  
 uantur in primis continuo uini mulsi potu, cui rutæ folia sint adiecta.

MELLIS Heracleotici historiam, & uires fusius libro secundo retulimus. Quo in loco tradidit Dioscorides  
 (et si id postea hic silentio inuoluerit) eos mente abalienari, ac sudore diffuere, qui illud comederint; remedio autē  
 esse rutam esitatum, & salsamenta, aut epotum mulsam. Sed cum iandiu in Italiam non adferatur; ideo nec curæ e-  
 ius insistentium est, præsertim quod eandem cum aconito uenenatam sortiatur facultatem, & curationem.

## Coriandrum.

## Cap. IX.

CORIANDRVM ob odorem latere non potest. epotum autem uocem exasperat: insaniam ad-  
 fert, à temulentiis non abhorrentem. qui sumpserunt, pudenda dictu blaterant, totiusque corporis  
 odore, uenenum fatentur. Quibus post uomitionem irino oleo concitatum, uti retulimus, merum  
 & per sese, & ex absinthio potum auxiliatur: item oleum: nec secus oua in eodem exinanita, si lique-  
 facta in muria sorbeantur: & epota muria, & ius falsum ex gallina, & anser: passum quoque cum li-  
 xiuia sumptum.

DE CORIANDRO libro tertio abunde disputauimus. Et quia non solum de facultatibus coriandri, quæ  
 humano corpori prodesse possunt, controuersa est inter auctores medicine, sed etiam de ijs, quæ eidem officere pos-  
 sunt, idcirco loco antedicto quid de prima difficultate sentirem, & cui potissimum adhaererem, dixi. Cæterum de  
 secunda difficultate nunc equidem secus sentio, atq; olim. Alias enim multorum sententiam secutus, coriandrum ab  
 usu prorsus abdicandum esse scripsi, quod onnenti eius usum nocuum esse existimarem. Nunc uero eius usum tantum  
 immoderatum (quod ita mentem commoueat, & mortis periculum adferat) euitandum censeo: idq; non leuibus, ut  
 puto, rationibus. Quas quoniam libro superius citato retulimus, ideo ab eis hic supersedebimus, & ad remedia ac-  
 cedemus. Iis igitur, qui Coriandrum largius sumpserint, præter illa quæ à Dioscoride produntur, opitulatur the-  
 riaca ipsa ex mero pota: quin & herba uinctoxicum uulgò uocata, de qua libro tertio scripsimus in Asclepiadis  
 mentione:

Coriandrū ue-  
 nefica natura

Coriandrū ue-  
 neni remedia



entionem : namq; hæc proprium coriandri antidotum est . Subueniunt præterea raucedini , uociq; exasperata gargarizationes ad id expertæ : item ea , quæ pectori conueniunt . Ad cerebri uerò noxam præstat diamoschum , & diamborum , & id genus alia , quæ cordi , & cerebro auxiliantur .

## Psyllium .

## Cap. X.

PSYLLION epotum , corpori toti frigus , & torporem cum exolutione , & mœrore quodam adfert , ita ut animum despondeant . Cui omnia , quæ exhausto coriano auxiliantur .

Psyllii uene  
ni noxa , & cu  
ratio .

PSYLLIVM , & eius semen , cuius in pharmacopolijs frequens est usus ( ut superius libro quarto diximus ) notum omnibus est . Hoc in potionibus hausto præter ea , quæ à Dioscoride illi assignantur indicia , consequitur anhelitus difficultas , alui tumor , & tanta deniq; cordis anxietas , ut plerunque oborto sudore frigido commoriantur ægri . Curantur qui hauserint primum uomitionibus , & clysinatis . Post hæc antidota illa exhibenda sunt , quæ in uniuersum omnibus uenenis aduersantur . Sed & ea omnia ijs maxime subueniunt ( ut Dioscorides est auctor ) quæ & ijs , qui coriandrum exhauserint .

## Cicuta .

## Cap. XI.

CICUTA pota uertiginem excitat , oculisque caliginem offundit , ita ut ne minimum cernatur : singultus ciet , mentem turbat , extremi artus gelantur : denique conuulsi , suppresso arteriæ spiritu , strangulantur . Quare inter initia , uti in reliquis , cicutam uomitu , excutimus : postmodum deiectionem molimur , ut quodad intestina prolapsum sit , excernamus : tum demum in meracam potionem , quæ maximo est auxilio , deuenimus . repetendum per interualla , in quibus proderit , lac asininum , aut bubulum potui datum , ut absinthium cum pipere & uino , castorio , ruta , mentha cum uino , aut amomi , cardamomi , aut styracis uncia , aut piperis , cum semine urticæ & uino , aut lauri folia . Item lafer ex oleo , & passo , & passum per sese largius potum proficit .

Cicutæ uene  
fica uis .

Historia cu  
iusdam casus .

CICUTAE historiam , & facultates , quibusq; in locis magis exitialis proueniat , ita copiose retulimus libro quarto , ut opus non sit , ea hoc loco repetere , nec plura nobis restent addenda . Sed iam ad uires eius ueneficas transseundum est . Pota hæc , uel in cibis sumpta ( ut Dioscorides inquit ) uertigines excitat , uisum adimit , oculis caligine offusa , & mentem usque adeo perturbat , ut in furorem agi uideatur , qui hauserint . Quæ omnia experimento nobis comperta sunt . Quippe cum rusticus quidam magnifici Ioannis à Turri uinitor non longè à Goritiæ arce suas comederet uineas , ligone forte fortuna erutis cicutæ radicibus , secumq; domum delatis , pastinacæ radicis loco decoxit , comeditq; in cœna unâ cum uxore : mox statim ( quæ rusticorum cōsuetudo est ) ambo iuere cubatum . Media autem nocte , à somno expergefacti , omni penitus amissa ratione , huc atq; illuc per domum in tenebris uagabantur , amentia , & furore ducti , unde adeo caput , faciem , & oculos in parietes percusserunt , ut mane accurrentibus uicinis , partim percussionibus tumidi , partimq; effuso sub cute sanguine liuentes , tumentibus admodum oculorum palpebris , horrendâ ac monstruosam ostenderent faciem . Vocor ego statim , ad curam , percontatisq; domesticis , quibus edulijs in cœna uiuissent , reperi hos cicutæ esitasse radices , quas pastinacæ esse crediderant . Quandoquidem mihi in propinquam uiciniam adeunti , ostenderunt alij locum , ubi rusticus ille radices effoderat , ibiq; inueni alias cicutæ radices , quæ iam folia emittere incipiebant . Qua re perspecta celeriter ad ægros redij , quos quidem non multo post tempore , Deo adiunante , in pristinam mentem & sanitatem restitui . tametsi percussionum curatio multò longior fuerit , quàm ueneni . Decepta quoq; hisce radicibus est superioribus annis quædam nobilis matrona à Coloreto Vtinensts , quæ cicutæ radices proprio in horto effossas toti familiæ decoxit , præbuitq; esitandas carotarum loco . Quinetiam monachum Franciscanum curauimus , qui pluribus mensibus modò amentia , modò furore agebatur , quod cicutæ folia hortensis petroselinii uice piscium quorundâ in sculis imposita comedisset . Caueant igitur omnes , ne in hæc ueniant discrimina . Exhibet Aetius , præter Dioscoridis antidota , cicutam haurientibus apij semen , ex uino potandû , aut iridis radicem , aut seseli Masiliense : item nitrum ex aqua copiosiore potum . Totum præterea corpus calefacere conducit , & præsertim præcordia . quamobrem ad uehementiorem motum , ac cursum ( ut ipse inquit ) cogendi sunt ægrotantes . Conuulsior tamen theriacam maximo opere commendat , duarum drachmarum pondere , ex dictamni decocto potam : aut gentianæ radicem ex uino . Namq; hoc cicutæ uerum esse antidotum putat .

Cicutæ sum-  
ptæ curatio .

## Taxus .

## Cap. XII.

SMYLLAX , à quibusdam tithymalum , à Latinis taxus appellatur . frigus uniuerso corpori , strangulatus , & celerem interitum infert . Cui eadem , quæ cicutæ conueniunt .

Taxi uenefi-  
ca natura .

TAXVS arbor , cuius historiam superius libro quarto retulimus , ubi & eius plantæ picturam adiecinus , non solum eos perdit homines , qui folia & fructus esitauerint , uel biberint foliorum succum : sed etiam ( ut aiunt quidam ) quadrupedum omne genus , quod præsumptum pabulum non ruminat : cuiusmodi sunt equi , asini , muli , & id genus alia . quanquam scribit Plutarchus , tertio sympositorum commentario , Taxum eo tantum tempore noxiam , quo iam florere



florere inceperit, quòd succo sit maximè prægnans. Dioscorides libro quarto de taxo agens, inquit, Narbone tam præsentis est ueneni, ut si qui dormiant sub ea, aut in eius umbra subsideant, ledantur, & septennumero moriantur. Id quod Sestius (auctore Plinio lib. XVI. cap. X.) in Arcadia quoq; euenire scribit. Vasa etiam uiatoria ex ea uinis in Gallia factis mortifera fuisse compertum est; & in Hispania lethales esse baccas. Prouenit arbor hæc frequens in Tridentinis montibus, præsertim Anania uallis, & Elemarum, ubi ea inter ingentes abietum, picearum, pinorum, & laricum syluas, numerosa conspicitur. Iis in locis nobis compertum est, quòd non modò iumenta, quæ non ruminant, deuorata taxo, moriuntur; sed etiam quæ ruminant, quandoquidem boues complures uidimus à rusticis deplo-  
ratos, qui taxum depasti fuerant. Quapropter cum in montanis, syluosisq; pascuis boues morbofi fiunt, conculant rustici, animaduertendum esse, ne Naxum degustauerint: ita enim taxum corrupto uocabulo nominant. Nihil minus eius bacca iisdem in locis noxiæ ac perniciosæ deprehenduntur: quippe quòd curauerim ego pastores, aliosq; in syl-  
uis ligna cædentes, qui saporis dulcedine allekti, baccas ipsius comederant, ex quarum esu non modò in ardentibus febres inciderant; sed & in alui profluuio, adeò ut in maximo uersarentur discrimine. Ceterum non parum dubi-  
tandum uidetur, an inter plantis calidas, uel inter frigidas Taxus sit reponenda. Dioscorides quidem, & eius sequa-  
ces omnes existimarunt Taxum esse frigidi temperamenti, argumento quòd asseruerint, iisdem remedijs taxi uenenum superari, quibus & ci cutæ. Quorum tamen sententia, omnium pace dixerim, mihi plane non probanda uidetur, nan-  
que amaror, qui cortici, & frondibus inest: coma perpetuò uiuens, pinorum, abietum, & picearum modo, quibus fronde similis spectatur; baccarum tum dulcedo, tum acrimonia quedam; & quòd auiculæ eas depastæ nigrescant; manifestè indicant insignem temperamenti caliditatem. Atq; hinc est, quòd & febribus, & alui profluuio tentantur,  
qui baccas esitarunt, inflammatis eo cibo spiritibus, & sanguine. Verum quanuis aliquis respondere posset, accendi in  
his febres, gigniç; alui profluuio, ex humorum putredine, quemadmodum in æstate eueniunt hæc ex frigidorum fru-  
ctuum esu: nigrum uerò colorem in auiculis contrahi posse non minus à frigido, quàm à calido; ex eo tamen adhuc  
suspecta & improbanda relinquitur eorum sententia, quòd frondium, & corticis amaror, baccarum dulcedo, &  
acrimonia, perpetuòq; uirescens coma, nulla prorsus repugnantia contrarium præ se ferant, nempe quòd & febres,  
& alui profluuia oboriuntur potius calores primum exuberantia (ut accidit deuoratis anacardijs) quàm humorum  
putredine. Neq; præterea potest nigredo illa à frigido pabulo in auicularum pennis suboriri: nam si frigiditate ni-  
grescerent, illico perirent. Quandoquidem nimis excedens frigus baudquaquam nigredinem inducit, nisi membrisi  
nihil confectis ac deperditis. At non ita sit ea nigredo, quæ perustis humoribus gignitur, quemadmodum accidit Aë-  
thiopibus, hæc sanè dixisse uolumus, non ut quicquam tam celebratorum uirorum auctoritati detraherem, neq; etiam  
quòd ausim temere eorum sententijs refragari; sed ut meam in medium proferrem sententiam, atque ut hæc à nobis  
proponerentur alijs discutienda, & studiosis diligentius æstimanda. Ceterum quoniam taxus NERIUM, quod  
Græci rhododendrum, & rhododaphnen uocant, Mauritiiani uerò oleandrum, mihi in mentem redegit, cum sciam  
scripsisse Galenum, & ipsum secutos, non modò brutis; sed etiam hominibus esse uenenum, cumq; eo quàm plurimis  
in locis referta sit Italia, prætereundum non duxi, quin hic de Nerio aliquid dicerem. Et quanuis non absque ratione  
fortasse scripserit Dioscorides libro quarto, itemq; in huius præfatione, quòd Nerij folia & flores, si deuorentur, ho-  
minibus contra mortiferos serpentium morsus præsidia sunt, atq; in hac re ideo possit ei fides adhiberi, quòd etiam can-  
ibaries dentur potandæ à cane rabido demorsis, & euphorbium ictis à scorpione; cum tamen nec Galenus, nec qui  
eum sequuntur, nec Auicenna, ceteriq; posteri id probent, aut admittant, Nerium potius dimittendum putarem,  
quàm cuiquam exhibendum, præsertim quòd alia non desint antidota, quæ à serpentibus demorsis magnopere opitu-  
lantur. Nerium igitur, Galeni & Auicennæ testimonio, tam potum, quàm in cibis sumptum, quanuis non largius in-  
geratur, homines & quadrupedes interficit. Primum enim intolerabiles excitat angustias, intumescit inde aluus, &  
subsequitur uniuersi corporis inflammatio; quòd temperamento calidum sit, & siccum, dissecans, & exulcerans. Ob-  
id enim non tantum noxam corporibus infert, intra corpus sumptum; sed etiam eos afficit, qui in eius umbra subsede-  
runt, taxi (ut antè diximus) modo. Quinetiam aquæ fluuiorum, & lacuum, in quorum ripis Nerium crescit, umbra,  
frondibus, floribusq; deciduis infectæ, nonnunquam in magnum discrimen bibentes ducunt. Succurritur noxæ epo-  
to sceni græci decocto, aut deuoratis palmulis, aut uiticis semine, aut frondibus, aut hausto horum decocto. Confe-  
runt & carica ex melle, aut saccharo aut iulapio sumptæ. Præterea defrutum, & pinguis, & quæ crassum dant a-  
limentum auxiliantur, non omnis tamen clysteribus, & uomitionibus, ut in alijs omnibus septennumero dictum est.  
Conuenit & diacastoreum (ut Conciliator est auctor) potum duarum drachmarum pondere. Pro sunt item iuniperi  
bacca eodem pondere. Porro illa quoq; lethifera est arbor, quam perperam quidam Sicomorum appellant, quæ fru-  
ctus profert loti arboris instar, quorum osculis funiculo traiectis, suas preces Deiparæ uirgini numerant infimæ gē-  
tis mulieres, quæ illos uerticillos à monachis sepe dono accipiunt. quòd in eorum monasterijs arbor ea frequens repe-  
riatur. Hanc Auicenna uocat AZADARACHT sen VI. quarti uoluminis, sic inquit. Folia Azadaracht, quem-  
admodum & lignum, animalia necant. Tollitur noxa ijs medicamentis, quæ in uniuersum omnibus succurrunt uene-  
nis. priuatim uerò ijs, quibus & nerij uis exitialis aufertur. Caueant itaq; omnes, qui hanc arborem suis in uiridarijs  
alunt, ne fortè imprudenter se ipsos, & domesticos omnes in perniciem agant. Sed si aliquis fortasse dubitaret hanc  
arborem non esse Azadaracht Auicennæ, fidem illi manifestam faciet Andreas Bellunensis, qui in Arabicorum no-  
minum interpretatione, ita esse aperte declarat.

Taxus utrum  
calida, uel fri-  
gida.

Nerij malefi-  
ca natura.

Nerij ueneni  
curatio.

Azadaracht  
arboris uene-  
num, & reme-  
dia.



## Carpasi succus.

## Cap. XIII.

ΕΡΟΤΥΣ carpasi succus soporem, citamque strangulationem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt, epotæ cicuta remedij.

Carpasi, & opocarpasi consideratio.

Vana quorundam opinio.

QVOD NAM hodie plantæ genus nobis Carpasum dici possit, omnino fateor me ignorare. nec quenquam reperiri crediderim in Italia, qui plura quam nos de Carpaso referre possit. Quandoquidem etsi hic inter uenenatas plantas illud descripserit Dioscorides; unquam tamen in præcedentibus libris quicquam de Carpaso retulit, quemadmodum nec posterius tam Græci, quam Arabes, ex quo coniectari possit, quidnam antiquis fuerit carpasum. Hoc Paulus Dioscoridem secutus lib. v. carpesiam uocat. Quamobrem credere nonnulli carpasum, carpesiam, & carpesium, de quo primo libro latius diximus, unam & eandem esse plantam. Sed uanam prorsus horum sententiam esse arbitror. Siquidem à nemine posteritatis memorie proditum inuenitur, deleteriam uim ullam carpesto inesse, uerum eandem (ut Galenus, & Paulus testantur) quæ ipsi phu. quiaimo ita aduersus uenena commendari compertum est, quod Quintus carpesium cinnamomi loco in theriacam addere non dubitauerit, quod tantum id præstare existimauerit, quaatum potest laudatissima cassia. Verum si quis fortasse assereret opocalpasum, de quo scribit Galenus, dum præbatissimæ myrrhae notas expendit, libro primo de antidotis, & opocarpasum hoc loco à Dioscoride descriptum unum & idem esse medicamentum, is meo quidem iudicio, rem (ut aiunt) acutè tetigisset, quod opocalpasum Galeno mortiferum omnino sit & lethale. Licet idem Galenus non opocalpasi, sed ο ποδ καρπάσου, hoc est, succi carpasi mentionem faciat tum libro primo de compositione medic. localium, ubi ex Archigene ea recenset medicamenta, quæ capillos crispos reddunt: tum etiam lib. v. de compositione eorundem in quodam molari emplastro. Ceterum cum huius usus, & notitia apud omnes penitus exoleuerit, non est cur alia à nobis frustra de eo sit instituenda curatio.

## Sardonio herba.

## Cap. XIII.

SARDONIA ranunculi herbæ generi assignatur, quæ uescentibus mentem adimit, & quadam neruorum distentione labia in rictum contrahit, ut risus speciem præbeant. à qua quidem affectione, de Sardonio risu adagium in vulgus infaulto omine manauit. Post uomitum peculiariter conuenit aqua mulsa & lac, liberalius epota: irrigatio, perunctioque à pinguibus medicamentis, totum corpus ex-calfacientibus: in calidam aquam, oleumque descendant, sed tum multum perfricare, & inungere expedit. & in summa, curam omnem, quæ conuulsioni neruorum adhibetur, exequi oportet.

Sardonie herbæ uenenum, eiusque curatio.

QVOD inter Ranunculi genera ea annumeretur planta, quæ à Sardinia, ubi plurima nascitur, uonnullis uocatur herba Sardonio, abunde docuit Dioscorides libro secundo. Tradidit huiusce curatione Aetius lib. xiii. qui præter ea medicamenta, quæ huic curationi à Dioscoride redduntur, declarat quibus auxilijs hoc conuulsionis genus prius curari debeat. Quippe cum diuersa sint conuulsionum genera, diuersa etiam exposcunt remedia. Præfert tamen castoreum in puluerem contritum aut per se, aut è dulci uino potum. Ceterum, ut Conciliator est auctor, adiuuantur qui hauserint Apium risum (sic enim Sardoniam herbam appellauerunt Mauritani) uino dulci potentiq; adeo largè epoto, ut inde ebrii facti diutius dormiant: item melissophylli succo, ex aceto sumpto: is enim, ut idem ait, Sardonie herbæ uerum ac singulare est antidotum. Sed quoniam (ut Dioscorides prodidit) in hac cura, balnea, & laconica admodum profunt, ea utique paranda sunt medicamentorum decoctis, quibus uis inest ex-calfaciens, tum etiam desiccans, & quæ propria facultate neruos tum roborent, tum iuuent. Cuiusmodi sunt, stæchas, hyssopum, salvia, ruta, betonica, chamæpitys, amaracus, origanum, calamintha, pulegium, dictamnium, anthenis, satyria, acorum, Syriaca & Celta nardus, asarum, phu, cyperus, rosmarinus, & id genus alia. Ad hæc præstat inungere occipitium, ceruicem, & uniuersam spinalem medullam, fusino oleo, aut è castoreo, aut è terrestribus lumbricis, aut è costo, aut ex hyperico, aut uulpino, aut unguento aragone, aut agrippino, aut deniq; alijs his similibus.

## Hyoscyamus.

## Cap. XV.

HYOSCYAMVM potum, aut comestum, similem ebrijs abalienationem mouet: sed facillè medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulsa copiosè data, lacque, præsertim asininum: si id desideratur, caprillum, uel bubulum, uel aridarum ficuum decoctum. Faciunt ad id etiam nuclei pinci, aut cucumis semen ex passo sumptum, & uinum salsum, cum adipe suilla recenti, passoque: itidem urticæ semen, aut nitruri ex aqua, & intubus erraticus, & sinapis, & nasturtium, radix, cepa, & allium: & hæc singula cum uino sumantur. Postea sinendi quiescere, quemadmodum qui uinum bibunt, ut excoquant.

Hyoscyami ueneno uis.

SVCCVRRITVR facillè Hyoscyami noxiæ, cuius historiam cum Dioscoride tradidimus libro quarto, ubi eius quoque effigiem dedimus, si antea, quam ueneno uis inualescat, superetq; corporis uires, confrentia propinentur medicamenta. Sed præter indicia, quæ epoto, uel comesto hyoscyano à Dioscoride assignantur, alia plura eidem reddidit Aetius libro xiii. nempe quod insequatur iactatio corporis cum distortionem: quibus succedit exolutio animi deliquio



deliquio similis, oculorum rubor, pruritus, deinde tremor: præterea omnino delirant ægri, & putant se flagris corpore cædi. Proinde meritò Ananienſes hyoſcyamum uulgò uocant Diſturbio, utpote quod mentem, & omnes corporis ſenſus diſturbat. Meminit utriusq; hyoſcyami inter deleteria pharmaca etiam Auicenna, ſic inquit. Epoto hyoſcyamo albo, oſium compagineſ luxantur, lingua in abſceſſu tranſit, ſpumat os, caligant & ruſcunt oculi, ſpiritus difficulter redditur. Hinc ſunt uertigineſ, ſurditateſ, gingiuarum, & totius corporis pruritus: ebrietas, amentia, furor, comitialis morbus, uociſq; diuerſitateſ: nam quandoque rudunt affecti, aſinorum mulorumq; more, & equorum modo hinniunt. A nigro autem corporis extrema confrigeſcunt, obtenebrantur oculi, oboritur delirium, atq; adeò conſtringitur peſtus, ut impedita prorſus reſpiratione, ſuffocentur, conuellanturq; ægrotanteſ. Verum hæc omnia cicutam facere tradiderunt Dioſcorideſ, & Pauluſ. Quo fit, ut ſuſpirari liceat, in hoc cæcutiſſe, craſſeq; Auicennam, quemadmodum & in aliſiſ quam plurimiſ ſimplicibuſ medicamentis, quorum nomina ab eo ſæpenumero conſunduntur. Ceterum in albi hyoſcyami curatione idem Auicenna præfert cæteriſ medicamentis theriacam, & Miſthridatiſ antidotum. Sed iſiſ, qui nigrum hauſerint, poſt uomitum, & clyſtereſ, meracum præbet potandum: quin & bubulum lac, abſinthium, caſtoreum, rutam, laſeris lacrymam, baccas & folia lauri, deſutium, urtica ſemen, maguſdarim, cardamomum, & ſtyracem: ſed quæ ſingula ex uino ſumantur. Hiſ præterea addit mori radicis decoctum, & opobalſanum ex lacte potum. Ad hæc inſuper farinam triticeam uino ſubactam, emplaſtri modo uentriculo utiliter imponi promittit. Sunt porro ex recentioribuſ nomine præclaris, qui longum piper in hoc magnopere cõmendant, atque etiam piſtacia largiùſ manducata, cæteriſ præferunt antidotiſ.

Auicennæ er  
ratum.  
Hyoſcyami  
utriuſque cu  
ratio.

## Mandragora.

## Cap. XVI.

MANDRAGORA ſi bibatur, conſectim ſopor inſequitur, exolutio, ac uehementiſ ueternuſ, nihil temerè diſtans à lethargo. Cui, antequàm aliquid ex iſiſ accidat, uomituſ & aqua mulſa proderit: poſtea nitrum, & abſinthium, ex uino dulci, aut paſſo ſumantur. caput roſaceo, & aceto perfundatur. Proſicit excitatio, & motuſ corporiſ, & olfactuſ eupatoriij, & piperiſ, ſinapiſ, caſtorij, & rutæ, triſtorum in aceto: & liquidæ picis, & odor è lucernarum exuſtione, & extinctu. Quod ſi ægrè iſ reuocentur, ſternutamenta mouere, aliſq; communibuſ auxiliijſ uti conueniet.

QUANDO QV IDEM Mandragoræ hitoriã latiuſ proſecuti fuimur libro quarto, ubi utrũq; eiſ ge-  
nus depinximus; ideo nunc tantum indicia primũ, & acidentia reſeram, quæ ab epotiſ uel deuoratiſ eiſ tum radice,  
tum fructu euenire ſolent: deinde horum curationem aggrediar. quoniam ſi diutiùſ malefica uis ſerpere, augeriq; ne-  
gligenter dimittatur, nulliſ adhibitiſ remediijſ, facile iſ qui hauſerint, emori poterunt. Quamobrem dixerim, Aetiũ  
ſecutuſ; eam uix fallere bibentem, aut comedentem poſſe, quod odore ſit admodum graui, ac nauſeabundo, amaro iniũ-  
cundoq; guſtu. Certa itidem copia, & meſura ad lædendum requiritur. De cætero uerò moleſtiã quidem facit, ſed  
ſeriuſ interimit. Huiuſ potuſ facile ægrotanteſ (ut Dioſcorideſ inquit) in ueternoſum ſoporem delabuntur: quin &  
ſegneſ, & languidi, & triſteſ, & exoluti ſiunt, adeò ut clamoribuſ, ac torſionibuſ excitati, repente ruruſ tanquam  
amentieſ recidant. Remoueri noxam ſcribunt, præter ea quæ Dioſcoridi produntur, coriandri ſemine, aut pule-  
gio ex calida aqua, aut alui deiectione cum deiectione medicamento, quo ad ueternoſoſ utimur. Quod ſi à uomitu, qui  
malè habent, non excitentur à ſomno, origanum potandum ex frigida, tanquam expertiſſimum medicamentum offer-  
ri uolunt. Proſunt item acria clyſmata, frictioneſ aſperſiſ linteaminibuſ in totum corporiſ membra torquenteſ: quin et  
ſtamina appoſita tum occipitiũ, tum ſcapuliſ, tum etiam natiſ; ſibulæ extrema corporiſ membra torquenteſ: quin et  
ſternutamenta, quæ ueratri albi puluere nariſ indito cienda ſunt: & ſeptica medicamenta uſicæ excitantia, ut  
cantharideſ, & ramunculũ, occipiti, & poſt aureſ emplaſtri modo impoſita, maximopere auxiliantur. nanque hæc  
omnia ualentiffimè reuocant, quæ cerebro officiunt. Porro animaduertendum eſt, quod iubet Dioſcorideſ ægro-  
tantium caput ad repellendũ uaporeſ eò petenteſ, roſaceo, acetoq; perfundi. Id quod etiam Galenuſ lethargicis con-  
mendat uidetur lib. XIII. methodi medendi. Sed hoc certè, ſi quiſ rem accurate expendat, rationi reſragari de-  
prehenditur. Vnde nil mirum, ſi Pauluſ, Aetiũ, Alexander Trallianuſ, & aliij, qui Galeni uſtigia ſequuntur, cum  
rectè nouiſſent æternũ morbum à frigidis tantum humoribuſ prouenire, & roſaceum cum aceto illi haudquaquam  
conuenire, quod magiſ refrigerare ualeant, caſtorium, chamæpityn, pulegium, calamintham, ſerpyllum, thymbram,  
& thymum huic medicamento addiderint, ne eo ſolo admoto, morbum ſouerent, atq; demum ægriſ mortem adſerrent.  
Verum enimuero putandum eſt, Galenuſ roſaceum ex aceto tantum imponere, ubi frigiduſ humor, quo ueternuſ ex-  
citatur, bili (ut plerunque accidit) fuerit admixtuſ, quæ tamen bilis maxima ex parte in ipſo duntaxat morbi princi-  
pio nexare ſolet: nam cum tenuiſ ſit, facile reſoluitur, & ſuperatur à frigido. Hinc itaq; quiſq; expendere & cogno-  
ſcere poteſt, an iſiſ, qui à deuorata mandragora ueternoſi ſiunt, purum illud medicamentum ex roſaceo, & aceto ad-  
mouere liceat, nulliſ additiſ excalfacientibuſ, cum (ni fallor) ab aſſumpta mandragora caput nullo afficiatur calore.  
Ad hæc tametſi mandragoræ poſtea matura comedantur à nonnulliſ detractò ſemine, citra ullam prorſuſ moleſtiã; im-  
matura tamen, & cum ſemine deuorata, mortifera ſanè inferunt ſymptomata. Siquidem exoritur intolerabiliſ ardor,  
qui uniuerſam corporiſ ſuperficiẽm adurit: lingua, & oſ areſcunt, quam ob cauſam ore perpetuò hianti cernuntur  
affecti, frigidum trahenteſ aerem. Quibuſ niſi illico ſuccurratur, conuulſi pereunt: contra uerò facile liberantur ſi  
ſtatim hauſerint, quæ openi ferre poſſunt. Id autem commodè, & efficaciter præſtat Andromachi theriaca, ex aqua  
pota: quippe hæc ſola momento omnem auferat moleſtiã. Curantur (ut Conciliator inquit) qui huiuſce radicem, uel  
pomũ, uel ſuccum ſumpſerint, uniuſ tantum diei inedia, ſi tamen ſubinde præſtantiſſimum meracũ uinum largiùſ  
bibant

Mandragoræ  
uenefica na-  
tura.

Mandragoræ  
noxæ reme-  
dia.

Roſaceum u-  
trum hic con-  
ueniat.



Metellarum  
nucum vene-  
ficium, & re-  
media.

libant ægri, & acetum olfaciant, cui admistum sit castoreum. Sed horum omnium peculiare scribit esse antidotum domestica radix triduo cum pane, & sale deuorata. Cæterum cum mandragoræ poma METELLAS NYCES quas uocant, mihi in memoriam reuocauerint, quarum historiam superius libro primo descripsi, sciuerimq; non modo, si edantur, suapte natura canes necare, sed etiam homines, cum nihil de his, quod extet, posteritatis memoria prodiderit Dioscorides, nec antiquorum cæteri, non alienum duxi hoc loco earum indicia referre, atq; etiam medicamenta commemorare, quæ harum ueneno opitulantur. Eæ nuces igitur cum intus in corpus sumuntur, uertigines, & faciei ruborem inducunt: quin & oculorum caligines, temulentiam, inexpugnabilemq; somnum: postremo oboriuntur frigidos sudor, uicinæ mortis præsagium. Auxiliatur noxæ excitatus pluries uomitus aqua calida, & oleo: post uomitum datur conuenientissimè butyrum, & uinum meracum copiosum, additis pipere, pyrethro, lauri baccis, cumamomo, & castoreo. Prodest, & ægotantium extremas corporis partes, nempe manus, & pedes calida aqua fouere, ac inde frictionibus rudi linteamine factis calorem in uniuersum corpus excitare: cum eo tamen, ut subinde balanino, aut costino oleo perungantur affecti. Præstat item exercitatio, proinde ad celerem gressum cogendi sunt, ut uniuersum corpus iualecat: pinguibus postea cibus, dulciq; uino refocillandi. In summa & his ea maxime conueniet cura ratio, quam epotum requirit opium, de quo proxima commentatione differemus.

### Meconium.

### Cap. XVII.

ΕΡΟΤΟ papaueris succo, quem meconion uocant, consequitur ueternus cum perfrictione, & pruritu uehementi, ita ut sæpe inualecente ueneno, tanta erumpat prurigo, ut hominem excitet: corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo uomitionem, acres clysteres auxiliantur, acetumque mulsum cum sale potum, aut melle cum rosaceo calido: merum cum absinthio aut cinnamomo copiosum, aut calidum per sese acetum: nitrum ex aqua, & origanum cum lixiua aut passo: & rutæ syluestris semen cum pipere, uino, & panace: piperque cum castorio, & aceto mulso, vel cum satyreæ aut origani decocto cum uino. Hi olfactibus excitandi: & ob enatam pruriginem in balneas descendant, & foueantur. Post lauacrum prodest iurium pinguium usus, cum uino, aut passo: medulla etiam ex oleo pota,

### Papauer corniculatum.

### Cap. XVIII.

QVOD corniculatum papauer appellant, & potu, & cibo eadem inferre consuevit, quæ papaueri fuccus: nec alijs expugnatur auxilijs.

Opij uenefi-  
ci natura.

INGRATVS Opij odor, perinde atque mandragoræ, facile obstat, ne in cibus, aut medicamentis inferi possit, quin ueneficium pateat gustantibus, præsertim cum necem non inferat, nisi certa quadam sumatur quantitate. Quamobrem raro contigit, ut homines uenefici opio utantur, qui quenquam ueneno tollere uolunt, uimirum ueritatis ne fraus odoris grauitate deprehendatur. Tametsi quandoque accidat, aut forte medicorum imperitia, aut phar- macopolarum negligentia, ut ebibitis medicamentis, quibus opium admistum sit largius quam par sit, sumentes in ea incurrant discrimina, quorum meminit Dioscorides. Atq; illa quoque sequantur, quæ in suis alexipharmacis Nicander ijs uerbis representauit. Animaduerte, inquit, c sumpto papaueris in capite suo semina gerentis liquore dormientes: nam illi in summa corporis cute frigent: nec oculi eis aperiuntur, sed enim palpebræ eorum immobiliter colligantur, eiq; labore eo, odoratus sudor distillat una collectus, adeoq; ipsum corpus pallefcit ac labia ardent, eiq; genis nexu demittunt, id est flaccidæ maxillæ sunt. Languidus item & frigidus è gutture anhelitus expirat: sæpe & liuidus unguis, uel obtortus nasus mortem non procul abesse nunciant, ipsiq; oculorum, qui in caua recesserunt, radij. Nicandro subscribit Aetius libro XIII. ubi sic inquit. Quando uoluntariè meconium aliqui biberint, siue nisi stare noluerint, siue uolentes non possint, his cognoscuntur indicij. Sequitur enim eos, qui opium acceperunt, in somnum grauem collapsio cum frigidityte & pruritu intenso, ut aliquando ob ipsum excitentur: odorq; opij per totum corpus effertur, & exhalat: inferior maxilla laxatur, tumescunt labra, irruit singultus, distorquetur nasus, pallor adest, liuor unguium, præcordiorum diuulsio, respiratio parua, & frigida, oculorum offuscatio, & ad postremum mortifera conuulsio. Hæc de notis, quæ opium sumptum consequuntur. Quibus ualentissimè illa remedia auxiliantur, quorum hic meminit Dioscorides: neq; enim plura apud posteriores Græcos reperi. Auicenna autem præfert laserpitij lacrymam, & castoreum. Sed præstantissimum dicit esse medicamentum, theriacam, sagaxenæ, & Mithridatis antidotum ex uino potum. Excitandi etiã sunt ægotantes sternutamentis, fibulis, fritionibus, odoramentis, nempe moscho, castoreo, lasere, ambaro, naribus inditis, quin & sulphuris fumo. Succurritur conuulsioni, si uniuersum corpus perungatur susino oleo; ac etiam costino, alijsq; remedijs, quorum in præcedenti capite memimus. Verum longè omnium potentissimè proficit antidotus nostri usus, scilicet quinta essentia theriacalis, de qua superius in præfationis commentatione diximus, quod præsentaneo remedio non modo his omnibus opituletur; sed etiam omnibus in uniuersum uenenis, quæ frigidityte nimia interimunt. Nec aliter curantur, qui corniculatum papauer deuorauerint.

Opij ueneni  
curatio.



## Pharicum.

## Cap. XIX.

QVOD Pharicon vocant, sapore sylvestre nardum imitatur. Resolutionem neruorum potum adfert, cum conuulsione & delirio. Oportet autem post vacuationes vinum absinthiten potui dare, cum cinnamomo, aut myrrha, aut nardo gallico, quod serinen aliqui vocauerunt: aut spicæ nardi duas drachmas, myrrhæ totidem obolos, cum passo: aut irim cum croco ex vino: derafumque caput illinire hordeacea farina cum aceto, & trita ruta.

NON equidem hactenus apud quenquam scriptorem consequi potui, quid Pharicum antiquis fuerit, an simplex, aut compositum medicamentum. Quin neq; etiam certò inuenire licuit, unde id nomen traxerit, cum uaria sit de nomine eius apud auctores sententia. Porro is qui in Nicandri alexipharmaca scholia scripsit, hæc protulit. Præxagoras memorie prodit pharicum lethale medicamentum sic uocatum à Pharico uenefico quodam Cretensi, qui hoc reperit. Sunt qui primum Pharis Arcadiæ repertum uelint: appellant autem etiam Medicum. Nec desunt qui in Thessalia in Pheris, alij Lacedæmone, quòd ibi fortasse proueniat, hæc ille. Cæterum cum iam id meritò deperditum sit, neq; hoc tempore à nemine, quòd sciam, cognoscatur, superfluum sanè esset plura de eo scribere: nam institutum nostrum non est, in re incerta diutius immorari.

Pharici uene-  
ni confid.

## Toxicum.

## Cap. XX.

TOXICVM ex eo nominari videtur, quòd barbarorum sagittæ eo illinebantur. Qui biberint, labiorum, & linguæ inflammatione torquentur. Incoercitus furor varias ijs imagines obuersat: quare vix medicinæ locus est raroque qui hauserunt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, aut vinum dulce cum rosaceo bibere, & reuomere cogantur: rapi semen bibendum cum uino. Priuatim ijs conuenit quinquefolij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus: roboris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte tritus: malaque cotonea trita esse, aut cum pulegio, & aqua bibere, conueniet: amomum & balsami semen ex vino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decumbunt: & ubi surrexere, stupidi reliquum vitæ tempus degunt.

QVID antiquis fuerit Toxicum, quo Barbari sagittas inficiebant, ut ijs uulneratos inimicos haud dubiè perderent, nec à Dioscoride, nec ab alio aut Græcæ, aut Arabicæ familiæ auctore memorie proditum esse, mihi hactenus compertum est. Ideoq; difficile admodum fuerit decernere an Toxicum hodie sit, uel cognoscatur in Europa, cum pro prièbi Barbari antiquis dicantur, qui Troglodyticam Aethiopiæ regionem incolunt, apud quos fortasse tantum natus situr. Verum enim uero putauerunt quidam, ut Manardus Ferrariensis uir nostræ ætatis celebris, id antiquis fuisse Toxicum, quod Arabes Napellum uocant. Quæ quidem sententia non omnino ijs uidetur refellenda, qui plura de se Toxicum non inuestigarunt, quandoquidem (ut Auicenna est auctor) non defuere, qui sagittas napello inficerent: constatq; napellum haurientibus linguæ, & labiorum inflammationem excitari, & raros admodum esse sumentes, qui euadant: id quod omnes Græci toxico adscribunt. Ad hæc cum asserat Auicenna, quòd si qua cura toxico adhiberi possit, ea fiat uomitionibus, hausto antea rapi semine, & sumptis subinde glandium putaminibus, hoc omnino illorum opinionem auget. Siquidem Dioscorides quoque ijs, qui toxicum hauserunt, rapi semen ad ciendum uomitum ex uino potandum præbet, ac deinde quercus, fagi, aut ilicis corticem, arborum nimirum, quæ omnes glandes profuerunt. Quæ sanè omnia facile ad credendum trahunt Græcorum toxicum, & Arabum napellum unum & idem esse uenenum. Sed diligenter rem expendentibus contrariæ profectò sese offerunt rationes. etsi enim ex notis prædictis toxicum, & Napellum unum & idem esse uideantur; tot tamen aliæ habentur notæ, quæ alterum ab altero discriminant, & contrarium arguunt, ut aliter existimandum non sit, quàm quòd deleteria hæc medicamenta plurimum inter se disideant. Nam nusquam, quod legerim, tradidere Mauritani eos, qui Napellum hauserint, in tantum furorē agi, ut uinculis sint coercendi, quemadmodum eos, qui toxicum deuorauerint. Equidem illud pro certo testari possum, quòd Corsi illi latrones, sicarijque nequissimi, quorum historiam libro quarto prodidimus, cum de aconito differeremus, quanquam ab assumpto Napello ea omnia dederint indicia, quæ ab Auicenna napello assignantur; in nullum tamen furorē adducti fuere, neq; ullum etiam sensere delirium. Præterq; Auicennæ, nostroq; testimonio, qui experimentum uidimus; epoto Napello, oculi exterius prominent, oboriuntur uertigines, animi defectus, & in ægens crurium imbecillitas. Quorum tamen symptomatum nihil de toxico agens meminit Dioscorides. Quinetiam (ut ipse perhibet Auicenna) qui Napelli pericula euadunt, plerunq; aut ad hæcticam febrem, aut ad tabem, aut ad comitalem morbum desciscunt. id quod Toxicum sumentibus non euenit: horum siquidem qui superuixerint, stupidi tantum reliquum uitæ tempus ducunt. Ex his itaq; omnibus liquidò apparet, quòd hæc inter se maximè differunt. Longè enim seuiora sunt Toxicum incommoda, quàm Napelli, ut abunde constat ex Nicandro in alexipharmacis, ubi Toxicum descripsit ijs notis. Protenus etiam lethalis toxicum dolorem, & malum abigere discas, quando suis cruciatibus hominem comprehenderit. Lingua eius, qui Toxicum hauserit, infernè crassior redditur. Sed labia intumescunt, os planè pondere suo degrauant, ac aridum prorsus sputum regerit, inferioriq; parte gingiue diffunduntur, & suis stationibus mouentur. Sepe etiam cordi stuporem iniecit, onnisq; sensus consternatus est, fontico isto malo perturbatus. Ac laborans eo, & balat, & mugit, innumeras nugas fabulasq; præ insania edens: ac sine intermissione

Toxici confi-  
deratio.

Manardi opi-  
nio reprob.

Toxici notæ  
ex Nican.



dolens, uehementer uociferatur, instar hominis, cui caput, totum corpus compingens, ense amputandum sit. Vel quemadmodum craterifera sacras res tractans ipsa Rheæ sacerdos, noua mensis publico appropinquans itinere, longum ore suo rumorem, & clamorem edit, quem horrendum in montanis latratum audientes sibi metuunt. Sic ille rabie, mente sua turbatus errans eiulat, ac lupi instar fugitiue ululat, obliquisq; pupillis taurino more inspicies, alabrum dentem acuit, dentibusq; suis despinat. haecenus Nicander. Ceterum differunt toxicum, & napellus in curandi quoque ratione. Toxicum nanque Dioscoridi curatur rosaceo ex passo potu, quinqueseptem radicibus, caprillo, & bircino sanguine, cotoneis malis, amomo, & balsami fructu. Auicenna uero Napello succurrit cum uini potu, butyro, moscho, capparis radice, & eo deniq; mure, qui napelli ipsius radices depascitur. quæ utiq; medicamenta omnia ab ijs admodum discrepant, quæ in Toxicum curatione commemorauit Dioscorides: quem tamen penè ad uerbum reddidit Auicenna in ceteris uenenorum auxilijs. Hæc igitur apertissime ostendunt, conuincuntq; Napellum & Toxicum esse diuersa uenena. Nec illa obstant sententiæ nostræ, quæ superius in Manardi fauorem adduximus. quandoquidem (ut facile colligi potest ex uniuersa huiusce libri materia) alia etiam habentur uenena, quæ quod eadem excitent accidentia, & paribus curentur antidotis, uidentur unam, & eandem rem esse, cum tamen longè diuersa ceruantur: cuiusmodi sunt mandragora, opium, hyoscyamus, corniculatum papauer, & id genus alia. Sed ut iam de Toxicum meam in medium proferam sententiam, cum haudquaquam falli crediderim, qui dixerit, id esse Auicennæ Toxicum, quod idem Tusom appellat. Nempe quod asserat eo epoto labra, & linguam inflammari, sequi delirium, & incoercitum furorem. quæ propria toxici sunt indicia. Attamen hoc uidetur illi omnino fuisse incognitum. quod nec minus fortasse Dioscoridem latuit. Nam si toxicum uouisset Dioscorides, eius certè historiæ libro quarto silentio non dissimulasset, ubi de ceteris mortiferis differuit medicamentis. Illud porro indicium quodammodo facit, Mauritanorum tusom esse Dioscoridis toxicum, quod nomen illius licet corruptè, ab hoc Arabes traxisse uideantur, quasi toxicon tusom nominauerint. Verum cum toxicum de NAPELLO loquendi nobis occasionem dederit, non alienum fuerit, ut nostrum sequamur institutum, hoc loco eius tum uenenum, tum remedia describere, præsertim cum nascatur in Italia. Napellus itaque, ut Mauritanorum testantur monumenta, & nostra adstipulatur experientia, si potu uel cibo in corpus ingeratur, sæua statim adfert discrimina: nempe illico labia inflammantur, & adeo intumescit lingua, ut exeri extra dentes, & oris amplitudine capi non possit: oculi item pariter intumescunt, ita ut promineant: uertigines, & animi deliquia frequentissime inuadunt, & crura imbecillitate affecta immobilia redduntur: subinde uniuersum liuescit corpus, intumescitq; & confestim malo occupatur habitus. Quo fit, ut breui temporis spatio, qui sumpserint, miserabiliter intereant. Sed id mirum non est: quippe quoniam tanta est huiusce lethiferi ueneni uis, ut nisi statim proprijs antidotis succurratur, nullis subinde expugnatur medicamentis. Imò quauis etiam in ipso principio ualentiora dentur remedia, pauci tamen superuiuant, qui aut hectica fibri (ut diximus) aut tabes, aut comitiali morbo tandem non conficiantur. Succurrendum igitur illico fuerit, excitatis prius uomitibus (ut Auicenna inquit) epoto rapi, aut napi semine. Prodest deinde butyrum bubulum coctum, & sæpe ac largè cum uino sumptum: item glandium putaminum decoctum ex uino potum. Auxiliatur diambri, & diamoschi puluis: quin potius amborum & muschus præ ceteris per se, & cum Lemnia terra, ex uino pota. Quod si hæc non proficiant, nihil sane præterea sperandum relinquitur, quod parum, uel nihil possint in huiusce ueneni noxa theriaca, & Mithridatis antidotus. Proinde dicebat Auicenna, theriacam Napello non prodesse, nisi certo tempore, & termino. Faciunt ad hoc & cappari radices, quod dixerint quidam antiquorum, has uerum Napelli esse antidotum. Conciliator Manardi puluerem duarum drachmarum pondere magno remedio ex uino potandum pollicetur. Sed hoc dari tantum potest Pontificibus, Imperatoribus, Regibus, alijsq; opulentis principibus. quandoquidem parua, uel nulla est ad bibenda fides prætoriorum lapidum fragmentis, quibus hac ætate seplasse utuntur. Ad hæc recentiores ferè omnes, qui uenenorum materiam pertractant, Auicennam secuti, uerum securumq; Napelli antidotum putant nurem quendam, qui Napelli radices depascitur. Hunc uidimus nos, cepimusq; in quibusdam altioribus uallis Ananie montibus. Sed non omnibus datur ipsum inueniendi, uenandiq; modus: ad hoc nanque multa patientia, & uigilantia opus est. Quamobrem mihi mirum non est, quod scripserit quidam recentiorum clarissimus, magnificum quendam uirum ac principem, philosophum tamen, & medicum, cum diu hos mures quæsiuisset, neq; eos inuenire potuisset, ut demum suum conficeret antidotum, horum uice magnas quasdam cepisse muscas, quas folijs, & floribus Napelli uictitare obseruauerat. Eo autem antidoto, quod constabat ex prædictis muscis numero uigintiquatuor, uncijs duabus Lemniæ sphaeragidis, & pari pondere baccarum lauri, atq; Mithridatis antidoto, omnibus oleo & melle sufficienti exceptis, admixtos fecit effectus, non solum aduersus Napelli uenenum, quod ut periculum faceret, diuersis dederat animalibus, & ipsemet experiundi antidoti gratia sumpserat: sed etiam in omni alio ueneno. Sed quid dicam (si tamen licet sine uitio sua quæq; laudibus efferre) de admiranda ui olei nostri de scorpionibus, cuius componendi rationem tradidimus in præfationis huius libri commentatione, cum à tam sæuo exitialiq; ueneno, qui biberint, breui admodum tempore liberentur, eo tantum exterius inuncti: nihil certè aliud, nisi quod aduersus hoc uenenum, & cætera quæ uisceera non erodant, sicut & uenenosorum omnium morsus & ictus, inter omnia remedia (pace aliorum dixerim) id primum sibi locum uendicat. Vbi enim uehementissima, ferociasq; fuerint uenena, singulis horis inungi postulat: ubi uero minus uehementia, minusq; sæua fuerint interposito trium horarum spatio, pluribus continuis diebus. Inungi autem debet non modò cordi ad sinistram mamillam; sed temporum quoque, manuum, & pedum arterijs.

Napelli uenenum, eiusque remedia.



## Ixia.

## Cap. XXI.

**I X I A**, quæ vlophonon appellatur, inter potandum aliquid ocimo simile gustu & odore redollet: vehementem linguæ inflammationem excitat: mentem mouet: omnes excrementorum exitus suppressit: strepitum cum animi deliquio ciet: ijsque intestina latrant, nec egeritur quicquam. Post uomitionem aluumque resolutam, auxilium præstat aqua, in qua absinthium maduerit, ex uino largiore, aut aceto mulso pota: rutæque, syluestris semen, aut laseris radix. item tragorigani decoctum, cum aliquo supradictorum, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut laserpitio, quorum singuli oboli conueniunt. quin & nuces iuglandes ex uino, cum resina, castorio, & ruta tritæ, ita ut singula drachmæ pondus æquent. Itidem chamelææ, aut thapsiæ, aut absinthij succi sicilicus cum aqua mulsâ, & acetum calidum potum.

**I X I A**, ut superius libro tertio retulimus, leuta, & uisci modo tenax est lacryma, quæ in chameleonis albi radicibus agglutinata reperitur. Hæc (ut Nicander, quem Dioscorides est secutus, in alexipharmacis inquit) gustata ocimo similem saporem præbet: hausta extremum linguæ tractum exasperat, interiora adurens. quinetiam corde suo turbatur ad insaniam usque qui sumpserit, ac linguam penitus dentibus lacerat. Porro mente attonitus redditur, aluique temere ambos utrinque meatus & liquidiorum, & esulentorum obdurans, quæ & intrinsecus spiritum suffocâs, submurmurat, ac modico tractu uolutatur. Qui item hoc malo angitur, ægrè magnâque difficultate resistit, adeoque uenenata illa ixiæ potio protenus excrementa eiecit onorum similitudine. hætenus Nicander. Ceterum Mauritani ixiæ aldabac uocant, quod propriè uiscum significat. Cuius nimirum incommodis in primis succurrunt, Auicenna teste, excitatæ uomitiones, & infusi clysteres, qui ijs maxinopere auxiliantur: sed mitiores lenioresque esse oportet. Præstant deinde auxilium theriaca, & Nithridatis antidotus, ex absinthij Romani, aut santionici decocto pota. Prosumunt item epithemata, quæ cordis imbecillitati dicantur: quin & utriusque buglosi flores saccharo asseruati, additis margaritis, corallijs, pretiosorum lapidum fragmentis, moscho, ambaro, & alijs quæ cordi opem ferunt. Conuenit insuper rosaceum aceto adnistrum, & sincipiti ubi sutura interfecat, linteis illitum. Quæ sanè remedia non modò remorantur, franguntque ueneni uim; sed omnibus etiam incommodis ab eo excitatis mirificè subueniunt. Porro cum in frequenti recentiorum medicorum usu sit albi chameleonis radix ad arcendam pestilentiam, & ad interaneorum tinea necandas; ideo caueant qui ea utuntur, ne agglutinatam lacrymam, si qua forte fortuna inhaerit, præbeant deuorandam. quod faciliè cauere poterunt, si cum primùm radix è terra fuerit effossa, eius corticè cultello deraferint, & uino subinde lauerint. Verùm ego in radice albi chameleonis, qui in Italia prouenit, nullam hætenus Ixiâ reperi. At tamen quidâ Cretensis rei herbariæ studiosus mihi pro certo affirmauit, è carlinæ uulgò uocatæ radice in Creta Ixiâ ab ijs colligi, qui sagittas conficiunt, ut pennas sagittis conglutinent. Nec modò eam reperiri mihi retulit in eo carlinæ genere caule uiduo; sed etiam quandoque in altero, sed rarius. Quæ certè omnia opinionem auxerunt, ut hoc obiter dicamus, carlinas uocatas Dioscoridis esse chameleones. Quod autè plus ueneni insit CHAMAELEONI nigro, quam albo, ut Galenus scriptum reliquit, & post ipsum Paulus, & Aetius eius doctrinam secuti (de qua resuperius libro tertio differuimus) non ita faciliè crediderim, cum albo tantùm Ixiâ innasci scribat Dioscorides. Non ob id tamen præteribo, quin hoc loco ea referam, quæ de Chameleonis nigri ueneno, & eius remedijs memoriæ prodiderunt Paulus, & Aetius: ita enim scribunt. A chameleonis nigri potu morsus uentris, & linguæ tumor, cum rugitibus intestinorum sequitur: facies distorquetur, & uomitus spumofus, tremores, concussiones, & totius corporis conuulsiones, ac uocis interceptio concomitantur. Ceterum curantur ex his, quæ ad fungos sunt relata. Datur eis & thlaspis, & betæ succus, & triticeæ ptisanæ cremor ex passo, absinthij dilutum, & nitrum cum aceto mulso. Vbi uerò euomuerint, lac recens multum sæpe exhibeto, & aluum cum lubricis infusis eluito, uelut est fœni græci & althææ decoctum. Præcordijs etiam fomenta, ac calfactoria exhibeto.

Ixiæ uenefica natura.

Ixiæ ueneni curatio.

Chameleonis nigri uenenum, & remedia.

## Cerussa.

## Cap. XXII.

**CERVSSA** suo colore proditur: sumpta enim, mox palatum, gingiue, lingua, & commissuræ dentium, candore quodam insciuntur: singultus, tussim, ac linguæ ariditatem excitat: ijs extrema frigescent, mens labat, membra torpescunt. Quibus dare conuenit aquam mulsam, aut ficuum, aut maluæ decoctum, aut lac calidum, aut sesamam ex uino tritam, uel lixiuiam ex sarmentis factam, amaracinum oleum, aut irinum, persicorum ossa cum hordei decocto: columbina oua cum thure, aut hordei decocto, aut prunis: aut gummi, quod ulmus plorauit: aut humor, quem ulmea folia reddiderunt, cum tepida aqua: sed tum quoque uomant. Conuenit etiam thapsiæ succus, aut scammoniæ, cum aqua mulsâ potus.

**CERVSSAE** faciundæ rationem tradidimus superiore libro. Hæc tametsi ad ulcerum medicamenta, quæ exterius illinuntur, salubre plerumque sit medicamentum; si tamen sumatur intus in corpus, interficit, quemadmodum cætera deleteria pharmaca, de quibus iam plura retulimus. Epotæ cerusse incōmoda pluribus notis, quàm fecerit Dioscorides, eleganter carminibus reddidit in alexipharmacis Nicander, quorum carminum hæc erit paraphrasis. Cerussa per omnia spumanti adhuc lacti, cum uerno tempore, pingue & recens in mulctram emulsum fuerit, colore st-

Cerussæ leu-  
thalis natura.



milis est. Porro cerusse spuma super gingiuas adstringente ui scandit, quæ spumosi medicamenti frigore arescunt, & contrahuntur in rugas. Lingua, & fauces asperitate languent. Vexantur ob id, qui haerent, arida tussi, oculisq; nutantes grauitate, dñm crebros ructus egerunt, non sine labefactione sui opplentur. Hinc fit, ut capite non parum turbentur: quinetiam animo suo nauseabundi præ trisli labore gemunt. At sæpius in ipsa luce uanum phantasma, quod re ipsa nullum sit, cernunt, aliàs somnolenti toto corpore frigent, neq; ut antea membra, potissimum manus, & pedes, suum officium faciunt, adeo ut ni eis succurratur, eo tandem dolore laceßiti, succumbant pereantq; hæcenus Nicander. Ceterum Auicenne testimonio cerussam haurientibus alia adueniunt incommoda, nempe animi deliquium, faucium asperitas, uentriculi, & alui compunctiones, præcordiorum tensio, anhelitus difficultas, præfocatio spirituum, & albedo totius corporis: quin & urina modo nigra, modo cruenta redditur. His auxilium præstant (ut ipse, & Aetius tradidere) scammonium ex mulsâ potum, aliq; medicamenta, quæ suapte natura urinam ualenter pellunt. Post hæc clysteribus uti conueniet, ac subinde providere, ne dormiant affecti, sed uigilantes sæpius euomant potu prius hydromelite, susino, & narcisino oleo admistis. Præferunt quidam uomitiones ab atriplicis, & rapi semine concitatas: item clysteres ex brasicæ decocto cum oleo, absque sale: insuper theriacam ex uino, & Mithridatis antidotum, & album meracum uinum largius potum.

Cerussæ mali auxilia.

## Fungi.

## Cap. XXIII.

FUNGORVM alij genere, alij copia lædunt: omnes tamen strangulatus suspensio similes concitant. Quibus confestim succurrendum: communiter ex oleo uomere cogendi: mirificè iuuat lixiuua ex farmentis, aut pyrastri furculis, epota cum sale, posca, & nitro. Fructus, aut folia pyrastri cum fungis decocta, strangulantem illam uim auferunt, elitataque eisdem auxiliantur. Aduersus fungos gallinacea oua cum posca proficiunt, adiecta aristolochiæ drachma: item absinthium cum uino melleque sumptum, & ex aqua potum: apiastrum ex nitro: panacis radix, & semen in uino: fex uini cremata, cum aqua: atramentum sutorium ex aceto: radix, uel sinapis, aut nasturtium esu profunt.

Fungorū uenefica natura.

NON modò nocent in uniuersum Fungi, quòd in eorum genere aliqui habentur lethales, & suapte natura ueneno imbuti; sed etiam quòd ex his, qui perniciosi non sunt, plus quàm uentriculi robur ferre possit, quandoq; ingeratur, ita ut tunc non malefica ui: sed copia lædant. Quippe cum natura humidi admodum, & frigidi sint, & lentore non modico scateant, superato sua quantitate corporis calore suffocant, strangulant, & deniq; interimunt, nisi citius remedijs succurratur. Cognoscuntur qui mortiferi sunt (ut superius libro quarto tradidimus) si frangantur, quòd illico uarios mutant colores, statimq; computrescant. Proinde dicebat Auicenna, in fungorum genere eos esse lethales, qui uirides, & cæsi deprehenduntur. Sed certè magnopere admirari licet, quòd tanta in hominibus inualuerit gula libido, ut etsi sciant fungos esse plerunq; necis hospitium; tamen sui ipsius obliti, magno sanè apparatu eos in cibis auidißimè deuorent. Verum postquàm tantam cum palato fungi iniere gratiam, ut ab his abstinere homines non possint, saltem discant uelim, ut se ipsos à morte uindictent, fungos nunquam esse sumendos, nisi prius cum syluestribus pyris decocti fuerint. Quòd si syluestria pyra desiderentur, ex domesticis ea supplere poterunt, quæ cæteris austeriora habentur. in quem usum adhiberi possunt tam recentia, quàm sole siccata. Præstant idem arboris tan folia, quàm cortex, præsertimq; syluestris: siquidem fungorum antidotum pyra sunt. Dioscorides libro quarto præter medicamenta hæc ad fungos assignata, prætulit origani, & satureiæ decoctum, gallinaceorum fumum, ex aceto aut melle potum: quòd tamen (ut Philagrius explicat) album esse oportet. Sed primum medicamenti sapius enarratis eliciendus est uomitus, & subinde acria infundenda clysmata, ut extra corpus trahatur uirus. Ceterum ignorandum non est, eos incommoda asferre longè maiora, qui propria natura uenenati nascuntur, quandoquidem non modò suffocant, strangulantq; comedentes; sed etiam intestina exulcerant, uentriculum inflant, singultum, & punctiones excitant, corpori uniuerso pallorem inducunt, & urinam remorantur. Præter hæc alia uerenda, & lethifera oruntur symptomata, nempe frigus, tremor, interceptio arteriarum, animi deliquium, perfrigidus sudor, & mors ad postremum immatura. His primum auxiliantur uomitiones omni celeritate excitatæ: quibus etiam conuenit epotus domestici raphani succus, aut deuorata rutæ folia, aut origanum, aut mel. Prodest deinde mirum in modum theriacæ, & Mithridatis antidotus ex acerrimo aceto pota, aut ex oxymelite, aut ex aqua uitæ uocata. quonobrem quinta essentia postea theriacalis, in his fungorū malis mirificam fert opem. Prætulit adhuc Auicenna calida quæcunq; aromata: cuiusmodi sunt diapipereos, diacyminum, diagalanga, dyamoschum. Conciliator potandum exhibet magno in uamento uinum optimum, in quo conferbuerit piper, offertq; subinde allium crudum deuorandum. Id quòd facit uniuersa ferè rusticorum turba, qui (ut Galenus inquit) allio theriacæ uice plerunq; utuntur.

Fungorū præparatio.

Fungorū ueneni remedia.

## Gypsum.

## Cap. XXIII.

LAPIDES CENS gypsum strangulationem creat. Quare eadem proferenda sunt, quæ manifestis fungis, auxilia: & adhuc malux decoctum, quòd etiam olei uicem pensat: utpote cum pingue sit, euomendo lubricas uias, & faciles reddit, deradique corpora non finit. quòd ubi duratur in lapidem, gypsum efficit. Quinetiam prodest oleum ex aqua mulsâ, aut ficorum decocto: & lixiuua è ficulneo cinere, aut farmentis facta, cum uino copiosiore pota: & origanum, aut thymum cum lixiuua, aut aceto, aut passo: hique decocto malux proluendi.

GYP SVM



**GYP S V M** omnibus notum, si bibatur, aut comedatur, strangulat (ut Dioscorides inquit) quod respirationis meatus ualenter adstringat, & obstruat. Meminit huius inter uenenata medicamenta Auicenna, sic inquit. Eadem sunt gypsi indicia, quæ & cerussæ, præterquam quod illud citius, & atrocius strangulat. quæm obrem ijs, qui hauserint, ea conueniunt medicamenta, quæ cerussæ, & fungis opitulari diximus. Postea lubrica danda sunt, cuiusmodi est malua, albæ, foeni græci, & lini seminis decoctum. Conciliator egelidam aquam cum butyro primum potandam iubet, & deinde uomitum excitandum, à uomitu calidam item cum melle præbet, ut iterum uomant: postremo Mithridatis antidotum uino meraco mistum, drachmarum duarum pondere. Quod si alius ab hoc adstricta fuerit, citetur oleo, & anatis adipe clystere infusus, & illinatur uenter ricino oleo. Quin & murium stercus (ut ipse ait) ex uino potum, proprium est gypsi antidotum. Auicenna autem ultimo purgari iubet scammonio, & alijs pharmacis, quæ aluum desiccando ad rem faciant.

Gypsi uenefici-  
cium, eiusque  
remedia.

## Sanguis Taurinus.

## Cap. XXV.

**T A V R I** recens iugulati sanguis epotus, spirandi difficultatem, strangulatūque concitat: faucium, tonsillarumque meatus cum neruorum distentione præcludit: lingua rubescit: dentes inficiuntur, & quædam concreti sanguinis uestigia, inter eorum commissuras restant. Quare uomitum vitabimus: sanguinis enim globi attractu illo in sublime relati, magis gulæ inculcantur. Dari ergo opus est quæ concretum sanguinem discutiant, & aluum subducunt. Grossi lacteo succo turgentibus ex posca, & nitrum per sese, auxiliantur: nec secus coagulatum omne cum aceto, & laserpiti radice, aut lasere, itidem & brasicæ semen, & è cinere ficulneo lixiuia: conyzæ folia cum pipere, & rubi succus ex aceto. alius resoluenda. Iis qui seruantur, stercorosa, & fluida per sedem egeri consueverunt. Stomachum, aluumque hordeacea farina ex aqua mulsâ perungere oportet.

**N E M O** tauri sanguinem clam potandum exhibere potest: nam unusquisque sanæ mentis sanguinem cognoscet: quare, mea quidem sententia, fieri non potest, ut uenefici eo quæquam decipiant: quippe nisi largius bibatur, & adhuc calens ab ipsis desluens uenis, antequam concresecat, noxam non infert, aut leuem. Quo fit, ut eos tantum taurino sanguine interire crediderim, qui aut atra bile tæti, aut cacodemonibus irritati, uel ut aliquod seuum mortis genus ab legibus pro suorum facinorum pœna luenda institutum effugiant, uel ut inmedicabiles & grauissimos morborum cruciatus finiant uitam peritæ (quod Plinius lib. xx. cap. xvi. fecisse ait epoto opio Licinij Cecimæ patrem ciuem Romanum) mortem sibi uoluntariam consciscunt. Proinde scitè Nicander in alexipharmacis ita scriptum reliquit. Si ex insipientia quispiam atrum tauri sanguinem hauserit, mœrore adeo ingemit, ut nimio cruciatu tandem conficiatur. quando cordi appropinquans sanguis illè condensatur, ac in medio alui receptaculo in grumos coagulatur: hinc & meatus spirituum obdurantur, & halitus suffocatur impleto gutture. Atqui tractibus, & singultibus iste afflictus, crebro humi spuma co inquinatus palpitat. hæc ille. Ceterum si forte fortuna euenierit, ut quis tauri sanguinem potauerit, & ad eum domestici, quibus factum constet, medicos aduocent, tunc medici ijs uti poterunt remedijs, quorum hic abunde meminit Dioscorides. Sed quoniam taurinus sanguis menstruum sanguinem mihi in mentem redegit, atque etiam hic nobis occurrit fel pardæ, uiperæ & canis piscis: item cerebrum filis, quem Græci ælurum uocant, cerui extrema cauda, quorundam quadrupedum sudor, & malum denique inprobaturum; castoreum, quæ omnia inter lethalia medicamenta annumerantur, cum hæc à Dioscoride in hoc uenenorum censu prætermissa depressendantur, et nobis propositum sit, singulorum uires maleficas, earumque auxilia describere, hic locus opportunus uisus est, in quo de ijs differeremus, & nostrum institutum, quantum possumus exequeremur. Sanguis itaque **M E N S T R U U S** mulierum, præsertimque biliosarum, & facile rixantium potus, adeo bibentes effascinat, & inficit, ut lûnaticos & amentes efficiat. Id autem detestabilis facinoris quandoque perpetrant maleficæ ueneficæque mulieres cacodemonibus ductæ ipsum exhibendo proprijs maritis, uel alijs, quos odio prosequuntur. Huius tamen noxæ succurritur contritis margaritis drachmæ pondere ex melissophylli aqua potis: auxiliatur & tepida balneum. Confert ad hæc (ut Conciliator inquit, si tamen id absque diuine legis iniuria fieri possit) ut affecti bilari frequentique mulierum consortio latentur, cum eisque cocant, præcipue cum iuuenibus, quæ raro nuptias celebrent. Prodest & theriacæ drachmæ pondere ex fumarie aqua quotidie pota. Prosunt & uiperæ pastilli scrupuli pondere, additis tum margaritis, tum theriacæ eodem pondere. Epoto autem **P A R D I** felle excitatur uomitus, seu aloes amarore, os & uires inficiens: post uomitum uniuersum corpus flauescit, ictericorum modo: postremo ea omnia consequuntur incommoda, quæ ab assumpto napello, & à uiperarum moribus eueniunt, cum tam seuum lethiferumque sit, ut tribus tantum horis potantes perimat: quod si hoc temporis spatium non interficit, prorsus desperandum non fuerit. Expugnatur primum uomitionibus illico excitatis, subinde ijs utique antidotis, quæ napello, uel uiperæ morfu infectis opitulatur. Auicenna huic ueneno peculiarem conficit theriacam ex Lemniæ terræ, & lauri baccarum, singulorum drachma una: capreoli caguli drachmis quatuor: myrrhæ, & rutæ seminis, cuiusque semidrachma. quæ omnia melle excipit. Hanc inglandis quantitate exhibet, excitatis deinde uomitionibus, ductisque, demum laborantibus in calidæ aquæ balneum, cui infirbuerint odorata medicamenta. Sed **V I P E R A E** fel adeo perniciosum existit, ut statim animi deliquium adferat: quare rarissime antidotis succurri potest, quod nullum detur ea præparandi spatium. Veruntamen si quid est, quod tam breui temporis momento quicquam opis ferat, id erit quàm celerrimè excitatus uomitus, epoto prius cocto butyro, igne colligato: quo uomitiones iterum, atque iterum mouere oportet. Post uomitus nihil salubrius, quàm theriacæ, & Muhridatis antidotum, moschus, & ambarum, & eorum composita medicamenta, quæ dia

Sanguinis tau-  
ri uenenata  
natura.

Sanguinis mē-  
strui uenenu-  
m, eiusque cura-  
tio.

Pardi fellis ue-  
nenum, eius-  
que remedia

Viperæ fellis  
uenefica uis,  
& auxilia.

moschum.



Canis piscis  
fellis uene-  
& cura.

Felis cerebri  
maleficiū, &  
remedia.

Caudæ cerui  
uenenum, &  
eius curatio.

Sudoris ani-  
maliū uirus,  
& remedia.

Castorei viru  
lēta uis, & cu  
ratio.

moschum, & diambārum appellantur, Vbi autem animi deliquit perseverant, & corporis uniuersi angustia, uinum quidem offerendum est, aut caporum, & gallinarum carnum succus ex aqua feruentis balneo in uase uitreo distilla- tus, Huic equidem noxae crediderim magnifice aduersari oleum nostrum de scorpionibus, cuius componendi ratio- nem tradidimus in huius libri præfationis commentatione: itidem & quintam essentiam nostram, quod istū oculi suis perquam tenuissimis partibus in totum deferatur corpus. Porro fel, quod à CANE pisce eximitur, lethiferum est, quippe quod potum, uel esitatum lentis tantum quantitate, septenis diebus interficiat. Curantur tamen qui hauserint, epoto bubulo butyro cum gentiane radice, cinnamomo, & leporis coagulo. Prodest & corpus uniuersum odo- ratis oleis illinire, & uictu tenuissimo uti. Ceterum qui FELIS CEREBRVM cibis ederint, crebris affi- ciuntur uertiginibus, fiuntq; subinde stolidi, & amentes, Quibus etsi subueniri possit, id tamen non nisi temporis tra- ctu, & admodum difficulter fieri potest. His danda est Lemnia sphaeragis, & uomitiones inde sunt excitandæ, fieriq; id oportet ter, aut quater in mense. Præstat item auxilium, si quotidie mane sumant ægri diamoschi confectionem, tri- bus uel quatuor horis ante cibum. Quinimo moschus per sese sufficienter auxiliatur: namq; ut quidam tradiderunt, moschus tantum huiusce cerebri proprium est antidotum, si dimidij scrupuli pondere ex uino bibatur. Sed illud non est ignorandum, quod non modò Feles deuorato eorum cerebro homines inficere possunt, sed pilis quoq; respiratio- ne, & oculorum intuitu. Nam etsi pili omnes imprudenter in cibis sumpti, præficare possint, anhelitus meatus obstruen- tes; tamen felium priuatim exitiales censentur. Eorum præterea spiritus tabifico quodam ueneno infectus deprehen- ditur. Etenim noui ego quosdam, qui cum felis adeo delectarentur, ut nunquam sine ipsis dormitum peterent, attra- ctō inde diutius aeris uehiculo eorum spiritu, in tabem, & marasimum incidere. quibus postremo confecti diem suum obierunt. Nec diu est, quod in quodam monachorum cœnobio uniuersa periit familia, magno felium numero, & con- tubernio. Lædunt item suo (ut diximus) oculorum intuitu, adeo ut quidam reperiuntur, qui his uisus, aut auditus, pa- uore quodam illico capiuntur, terreanturq; maxime, quod non modò ex eorum ueneno provenire existimauerim; sed etiam propria eorum natura, qui eos uel intuentur, uel audiunt, quandoquidem ij sua natura talem à cœlo qualitatē influxam habent, quæ uinquam ad propriam mouetur actionem, nisi obijciatur id, quod natura sibi contrarium fue- rit. Horum plures in Germania diutaxat uidimus, & quosdam ex ea natione Goritiæ commorantes. Quod autem uerum sit id aliunde euenire non posse, quàm à congenita qualitate, quæ paucis admodum inest, apertè sanè ostende- runt eorum aliqui. Quippe cum huius gentis quidam hyemis tempore in hypocaustum nobiscum cœnaturus intras- set, quod plurium amicorum sodalitas conuenerat, mulier quedam huius uiri naturæ conscia, ne is, uiso felis catulo, quem educauerant, iratus discederet, illum in arcula quadam eodem in cœnaculo concluderat. Sed quamuis nec uidisset ille, nec audisset catulum, cum pauco post tempore aerem felis halitu infectum inspirasset, irritata statim ea tempera- menti qualitatē felium inimica, emisso sudore, pallida admodum facie, omnibus sanè admirantibus, tremebundus con- clamare cepit, hic aliquo in angulo latet felis. His autem eadem opem ferre putauerim, quæ cerebrum comedenti- bus remedio esse diximus. Inuenitur etiānum in CAVDÆ CERVI extremis partibus porraceus quidam, humor fellæ bili admodum similis, qui si fortè deuoretur, præsentaneum est uenenum. Adfert enim illico intolerabiles angustias, animi deliquia, & omnia tandem symptomata, quæ epotum napellum consequuntur. Succurritur his, ut cæteris, primū uomitionibus, epoto butyro excitatis. Postea dandus suaragdi puluis ex uino dimidij scrupuli pon- dere. Quin & pistacia prosunt, & ponticæ nuces in cibis largius sumptæ. Ad hæc uniuersum corpus inungi præ- stat, oleo à citri semine expresso. Item theriaca proficit ex uino pota duarum drachmarum pondere. Magna quoq; infert incommoda quadrupedum quorundam SVDOR, præsertim equi, asini, & muli, quamuis etiam cæterorum sit malus. Is igitur potus uiridem tumidamq; reddit faciem: sudorem foetidum in uniuersum excitat corpus, præsertim sub alis. Perturbat præterea tum uentriculum, tum aluum uniuersam, genitis excitatisq; flatibus in intestinis. Quod si bibatur ex uino, delirium facit. His tepidam largius præbendam scribunt, ut concitato inde uomitu puluerulentus sudor reijciatur. Post uomitū confert uinum cum rosaceo potum: item rhabarbarum semidrachmæ pondere sumptū, addito fossitij salis momento. tamen si propria huiusce sudoris antidotus ea sit theriaca (ut Auicenna est auctor) quæ ex Lemnia sphaeragide, & lauri baccis conficitur, cuius componendæ rationem paulò superius retulimus, de Pardi selle differentes. Venenosum æquè ac lethiferum aiunt esse etiam CASTOREVM, quod iam putredine nigredinem contraxit, uel illud potius, quod à Ponto fuerit allatum. Hoc enim (ut Strabo inquit) uenenosum est propria sui na- tura. Animaduertant igitur tum seplastarij, tum medici, cum plurimi usus sit medicamentum, ne malum exhibentes castoreum, aliquem interimant. Quandoquidem non modò furore aguntur, qui hoc medicamentum hauserint; sed et- iam intumescens linguā exerunt, atq; tam seua febre corripiuntur, ut uno tantum ferè die intereant. Aduersus hoc uenenum mirum in modum iuuant uomitiones, quas toties butyro, & hydromelite potis citare conuenit, quod nullum ea, quæ reijciuntur, castorei odorem referant. Post uomitiones conducit diamuron potum, aut limonum, aut citrei mali succus saccharo admixtus. Verū peculiariter huiusce castorei antidotum est coriandri semen tostum, dra- chmarum duarum pondere sumptum.

## Lac intus coagulatum.

## Cap. XXVI.

Eos, qui coagulatum lac hauserunt, frequens illico strangulatio inuadit, quod in globulos quosdam lac coalescat. Quibus iuuandis pro antidoto, coagulum ex aceto damus, & bibere sapius cogimus. Damus & calaminthæ folia arida, item succum: aut laserpitij radicem, aut laser cum posca: thymumque ex uino, & cum luto suo lixiuiam. Sed nulla salisago obijciatur: quoniam magis lac



lac coiret, & in caseum densaretur. Neque illos vomere conuenit: siquidem concretum lac sese in gulæ angustias insinuans, strangulat.

**CREDIDERE** quidam Dioscoridis interpretes, auctorem hoc in loco de eo coagulato lacte differere, quo frequenter in cibis utitur. E quorum numero fuere Ruellius, & Manardus Ferrariensis ea epistola, in qua uniuersam Marcelli interpretationem corrigit. Sed ij alioqui uiri eruditissimi, in hoc haud dubie falluntur, meo iudicio. Siquidem lac ea ratione coagulatum, nutrit, non autem strangulat, ut omnes in uniuersum homines testari possunt, sed præsertim ij qui in montibus degunt, cum Maio, & Iunio mensibus huiusmodi lactis plurimum deuorent. Ideo uil aliud nobis asserendum esse putauerim, quam quod de eo tantum lacte intellexerit Dioscorides, quod cum admixto coagulo bibitur, antequam coalescat, ita ut intus, non extra coagulatum sit. Quo factum est, ut in hoc à Ruellij interpretatione in aliam descinerimus & hic, & in huius libri præfatione prope calcem. Magis enim Dioscoridis sententiam exprimi censuimus, si lac intus coagulatum, uel (ut Marcellus) lac cui coagulum admixtum sit, uertantur uerba illa γάλα ἀμυγνισθὲν. Nam quod iam coagulatum estur, non magno labore coquitur, ac digeritur, transitq; in nutrimentum. Illud uero, quod ubi coagulum ei admixtum sit, subinde hauritur, priusquam coalescat, cum aliquantisper in uentriculo resederit, ui admixti coaguli illico inibi concreuit, sitq; concoctrici facultati adeo contumax, ut superato caloris robore strangulet, non secus ac taurinus sanguis. Proinde asserit Dioscorides, tauri sanguinem minime suffocare, nisi recens calidusq; è iugulati tauri uenis defluxus bibatur, antequam concreuit. quandoquidem is non necat aliqua propria ueneni facultate, sed concretionem tantum, quam in uentriculo consequitur. Id quod euidentissimum est in epoto lacte, cui admixtum sit coagulum: aut in eo quoq; quod sine coagulo bibitur, & per se alijs de causis in uentriculo coalescit. Euenit enim quandoq; hoc, cum lac bibitum crassius fuerit, & uentriculi, & iecoris temperatura calida, & sicca nimis. Nam ingens horum uiscerum tum caliditas, tum siccitas, consumpta breui lactis humiditate, reliquum, quod crassum est, facile cogit, & cōspissat. Quinetiam illud idem ingenti sit frigidityte: nimirum expresso ab ea, quod tenuium est partium, reliquum, crassioris substantiæ facile congelascit, haud secus quam de glacie, & niue fieri libro quarto meteororum tradidit Aristoteles. Quamobrem est Galeni consilium libro tertio de alimentorum facultatibus, ut nemo lac potaturus ipsum bibat, nisi mellis, aut salis tantillum prius admisceat, ne in uentriculo concreuit. Sed non propterea mirari licet, quod Dioscorides scripserit, lac concretum in uentriculo habentibus nihil salis salsine esse offerendum. Quippe quemadmodum coagulum primò lac coagulat, contrariumq; deinde efficit, si iam cōcreto lacti superaspergatur; ita sal prius lacti commixtum, id concretum prohibet, mox contrarium effectum præbet, si iam concreto aspergatur. recens enim caseus sale respersus, illico duritiem contrahit. Sed iam ad curationem accedamus. Eadem autem erit lactis in uentriculo coagulati curandi ratio, quæ sanguinis tauri, quando ijs tantum sit utendum medicamentis, quæ suapte natura concreta liquant, & discutunt. Quæ in re auxiliu præstant ipsa coagula, acetum, præsertimq; scillinum, lixiuium, & ea omnia, quæ incidunt, & disgregant. Porro illud non prætereundum esse arbitror, quod ubi in hoc capite legitur καὶ τὴν ἀλοποιτικὴν κοίαν, id est, & figlinam lixiuiam, non ut uertit Ruellius, & cum luto suo lixiuiam, Gesnerus in primo suo de animalibus tomo, de tauro agens, legendum rectius putat καὶ τὴν ἀλοποιτικὴν κοίαν, hoc est, & pilopæcorum lixiuiam: reprehenditq; in hoc Cornarium, quod putauerit figulos ad lutum lauandum sibi lixiuiam conficere. Sed mihi, ut ingenuè dicam, magis placet Gesneri, quam Cornarij opinio. siquidem cum figlinum lutum nunquam lixiuiâ lauari aut parari audierim, uiderim, aut legerim, ueritati consonum non uidetur, ut de figlina lixiuiâ intellexerit Dioscorides: sed de ea potius, quæ ad lanam expurgandam, ut insecturæ magis idonea reddatur, utuntur pilopæci, hi sunt, qui pileos conficiunt. Eorum namq; lixiuiâ, quod è combusta uini facie plerumq; fiat, ea quæ ad caput capillosq; abluendos communiter paratur, acrior, fortiorq; efficitur: & proinde ad lac dissoluendum in uentriculo coagulatum, est longe ualentior. Error præterea facilis esse potuit librariorū, ex unius duntaxat literæ uariatione, n pro scribentiu. πῶς enim per n scriptum, lutum significat, unde ἀλοπλάζον, & ἀλοῦργον aliqui figulum interpretantur: ἀλοποιός autem per n artifex est, qui pileos ex lana conficit. Hac itaq; ratione putandum fuerit, ἀλοποιικήν, non autem ἀλοποιτικὴν in Dioscoride hoc loco esse legendum. Ceterum Fuchsius in suis doctissimis annotationibus in Nicolaum Myrepsicum ea sectione, in qua de unguentis tractat, capite xxviii. uil aliud hanc lixiuiam esse putat, quam aquam quæ lutum lauerit, uel per lutum transferit, non autem cum cinere, & calce factam. Sed cum figlinum lutum potius adstringat, contrahatq; quam laxet, ac digerat, nesciuerim profectò, qua ratione is eam lixiuiam è tali luto confectam, ijs potandam daret, quibus lac in uentriculo concreuisset.

Lactis coagulati consideratio. Quorundam interpretu error.

Lactis in uentriculo coagulati curatio. Dioscoridis lectio castigata.

## Argenti Spuma.

## Cap. XXVII.

**SPUMA** argenti pota, stomacho, uentri, & interaneis grauitatem cum magnis torminibus adfert, & nonnunquam pondere suo intestina vulnerat, urinamque suppressit: corpus intumet, plumbamque deformitatem concipit. Quibus subuenit secundum uomitionem, potum syluestris homini semen, myrrhæ drachmæ octo, absinthium, hyssopum, apij semen, aut piper, aut ligulstri flos ex uino: aridum palumbis fimum, cum nardo & uino.

**POTA** argenti spuma, cuius historiam libro quinto tradidimus, lethifera (ut Dioscorides inquit) adfert incommoda. Sed præter hæc, Aetio, & Auicenna auctoribus, alia etiam eueniunt mala. nempe compaginum, & articulorum incendium, seu ardor: alui suppressio, quanuis quandoque ex accidenti alius ipsa deiciatur: sermo item præpeditur,

Spuma argenti mala.



Spumæ argē  
ti curatio.

Plūbi scobis  
noxa, & cu-  
ratio.  
Ferri scobis,  
squamæ, & re-  
crementi no-  
xa, & cura.

Magnetis ue-  
nifica uis, &  
auxilia.

Squamæ æris  
lethifera uis,  
& remedia.

peditur, & sedis intestinum prominet: postremo inualecente malo ægri suffocati moriuntur. Nicandro uero in alexipharmacis auctore, ijs qui argenti spumā sumpserint, alui molestia accedit: quin & flatus sese reuoluentes per medium uentrem, & iuxta umbilicum murmurant, iuxta torminum curatu difficiliorum, quæ hominem afficiant duris cum cruciatibus impetentes. Nec iam urinae eicienda patet exitus: membra totius passim corporis ardent, placentque iam plumbeum, seu liuidum colorem induerunt. hæc ille. Ceterum illud animaduertendum est, quod ubi in hoc capite legitur, dandam esse myrrham octo drachmarum pondere, non deest suspicio, quin ea lectio sit deprauata, quod hæc myrrha nimia uideatur esse quantitas. Auget suspicionem Nicander, qui duos tantum myrrhæ obolos exhibet, totidem exhibet Aetius, Auicenna uero tres drachmas non excedit. Curatio in uniuersum fit citatis primum uomitibus, & infusis deinde clysmatibus (ut Conciliator tradit) ex hydromelite, gallinarum, & anatum adipe. Post hæc prodest amygdalinum oleum potum & dulcibus nucibus expressum, Conferunt item caricæ in cibis sumptæ: præterea uentriculum apij succo, & aluum butyro illinire utile est. Proprium uero huiusce ueneni antidotum (ut idem ait) est lathyris semen duarum drachmarum pondere potum. Veruntamen cum hoc facultatis admodum deiectionis sit medicamentum, drachmam ego non excederem. Eadem quoque infert mala PLUMBI SCOBIS tenuissimè contrita, & iisdem pariter curatur medicamentis, Siquidem argenti spuma nil aliud est, quam plumbi argenti, aut æris recrementum, tametsi omnia hæc prius diutius aceto macerata nulla prorsus molestia in medicum ueniant usum, denique potanda dysentericis, mulieribus uteri defluxione tentatis, & in eclegmate ad lienis infarctus, itemque ad enterocolas. Sed de his uel non infrænatis, uel plusquam par sit sumptis, fortasse intelligit Auicenna. Itaque excitatur ab his intestinorum cruciatus, oris & lingue scabrities, aestuatio uniuersi corporis, capitis dolor, marasmus, & membrorum omnium arefactio. Succurritur noxæ potu lactis recenter mulsi, ac subinde datis alium ualenter soluentibus medicamentis. secundum quæ butyrum tandiu potandum dare oportet, donec intestinorum dolores amoueantur. Hæc dum fiunt, perfundatur eorum caput oleo rosaceo, uiolaceo, & e nymphæ floribus parato. Tollitur deinde adueniens marasmi intemperies, & corporis uniuersi arefactio, demersis in balneo laborantibus, in quo testudines, ranæ, & maluæ folia inferbuerint: quinetiam clysteribus ex pedum hædorum iure, aut althææ radicum decocto: item butyro largius in cibis sumpto, & epotis pinguium carniū iuribus. Sed (ut idem Auicenna scribit) proprium huiusce ferrei pharmaci antidotum, est lapis magnes drachmæ pondere potus, ex mercurialis, uel betæ succo. Veruntamen hoc haudquaquam fieri posse uidetur absque manifesto sumentium discrimine. quandoquidem etsi magnes suapte natura ferum trahat; non tamen affirmauerim, quod hanc ob causam eius quoque destruat facultates, & impediat noxam, sed potius quod eam augeat crediderim. Quippe cum is ferrum ad se traxerit, id sanè diutius in uentriculo retinebit, ex quo noxa fouebitur. Adde præterea, quod cum & ipse MAGNES deleteriæ sit facultatis, adeo ut eos, qui hauserint, lunaticos, & melancholicos efficiat, eum haudquaquam ore sumendum esse duxerim. His itaque, qui Magnetem sumpserint, commendant quidam auri tenuissimam scobem ex uino potam, & smaragdorum ramenta eodem pondere. Laudant etiam clysteres ex lacte, & dulcium amygdalarum oleo infusos. Sed cæteris præferunt smaragdum ternos ueni diebus potum, tribus semper intermissis diebus. Lethifera & non parum formidanda est etiam AERIS SQUAMÆ uis. Ea siquidem pota, intolerabiles alui defluxiones mouet, aut noxas uomitiones concitat, obortis inde molestissimis alui, & uentriculi punctionibus. His auxiliantur citatæ primæ uomitiones: deinde ægri in balneum mittendi sunt, in quo hircorum conferbuerint capita, aut iugens cochlearum numerus. Prodest & mentha succus potui datus: insuper aluum, & uentriculum calido rosaceo perungere expedit. Verum ad hoc præ cæteris polulent acori radices trium drachmarum pondere potæ, aut earum succi tantundem. Sed nobis acori succum dare perdifficile fuerit, cum legitimum in nostris non proueniat regionibus, nec nisi siccum afferatur. Lituani tamen, & Tartari eo abundant, ut superius libro primo prodidimus.

## Argentum Viuum.

## Cap. XXVIII.

ARGENTVM viuum potum eadem quæ spuma argenti infert, eisdemque utendum auxilijs. Lac copiosè potum auxiliari constat: sed postea euomant, qui hauserunt.

Argentī uiui  
perniciālis na-  
tura.

VERAM omnino & exquisitam argenti uiui cognitionē non habuisse Dioscoridem & Galenum, illud maximo indicio esse uidetur, quod hic paucis, ille uero perplexè eius historiam, & facultates tractauerit. Hoc, ut in præfationis huiusce uoluminis commentario tradidimus, interimit, si largius bibatur, excessu summe frigido & humido. Putrefacit enim hoc suo exuperante temperamento inuatum cordis humorem, ac subinde congelat sanguinem, vitales spiritus, & ipsam denique cordis substantiam. quandoquidem id medicis experientia compertum est, ut Conciliator testatur reliquit. Nam cum seplasiarius quidam ardentissima febre correptus, siti intolerabili uexaretur, & delirio oberrans in pharmacopolium descendisset, ut aliquid ad potandum inueniret, fortè fortuna in argenti uiui uas incidit, multumque ex eo potauit, aquæ fortasse uice: postea statim in suum cubiculum se recepit, ubi paucis post horis congelatus interiit. At cum eius domestici sub cadauere magnam argenti uiui quantitatem inuenissent, iam per sedem egressi, aduocarunt medicos, ut eius rei, quam miraculum existimabant, diligenter causam inuestigarent. Ii statim ex pharmacopolio argenti uiui uas adferri iusserunt, quod ubi ferè uacuum reperissent, rem uti se habueratprehenderunt: auxiliūque fidem, quod euiscerato homine, adhuc argenti uiui libram in eius uentriculo inuenerunt: quin & sanguinem circa cor concretum. Quo argumento palam fit, magno admodum recessu frigidum esse argentum uiuum. Verum enimuero in eius curatione illud inquirendum est, an purum sit quod potum fuerit, an salina alioue liquore extinctum, aut



aut acerrima aqua, qua chymistæ utuntur, aut per se tantum præcipitatum, aut unâ cum arsenico, uel chalcantho sublimatum. cum enim aliud alio perniciosius habeatur, proprium quodlibet exigit remedium. Pernicialius est sublimatum: secundum hoc præcipitatum: proximè sequitur quod saluum, aut aliquo liquore fuerit extinctum: minus uero cæteris nocet, quod purum, uiuumq; fuerit: utpote cum fluidum admodum sit, & ponderosum, non difficulter clysteribus extrahitur. Id quod cæteris generibus non euenit, quæ cum uentriculo inbæcant, illum faciliè erodunt, & exulcerant. Argento uiuo puro, aut extincto, aut præcipitato epotis, eadem consequuntur symptomata, quæ argenti spuma pota infert, sed cum magno anhelitus fœtore, quem & ij resipiunt, qui Gallica lue affecti eo illinuntur. Quod maximum præbet indicium, quod sua exuperante humiditate, omnes humores, qui uentriculo alijsq; circumstantibus partibus hæserint, computrescere faciat. Cæterum epoto sublimato, illico lingua, & fauces non aliter exasperantur, quam si quis immaturorum sorborum succum hausisset. Quod sanè incòmodum nullo lenientium gargarizatu, nisi difficile, & longo tempore tolli potest. Id enim quàm primum in uentriculum descenderit, ei pertinaciter inbæret. quare statim erodit, & exulcerat: tum inextinguibilem sitim excitat, et inexplicabilem angustiam inducit. His succedit lingue tumor, animi deliquium, urine suppressio, anhelitus difficultas, & uentriculi, & intestinorum tormina, tam uehementi erosione, ut nisi confestim succurratur, pereant affecti, erosio, perforatisq; uentriculo, et intestinis. Purum Argenti uiui sumpti curatio.

curatur (ut Dioscorides, Aetius, & Paulus memoriæ prodidere) auxilijs, quibus argenti spuma: nam nisi copiosius ebibatur, non interficit, quod ob sui tum pondus, tum fluxilem substantiam faciliè per inferna secedat, nulla in uentriculo, & intestinis protracta mora. Ex quo nil mirum, quod scripserit Auicenna, non deesse qui bibant argentum uiuum, & nullam inde sentiant noxam, quod faciliè labatur è corpore, dumodo qui hauserint, continuè huc atq; illuc deambulant. Goritienses mulieres ægrè parturientibus ultimo remedio, argentum uiuum potandum præbent, scrupuli pondere. Nec desunt qui ad interimendasalui tineas, pueris etiam propinent, ad duorum granorum milij quantitatè, citra nullam molestiam. In aliorum autem curatione alia requiruntur remedia, nempe clysteres, uomitiones, pingua in potu sumpta: & ut in uniuersum dicam, his opem ferunt omnia medicamenta, quæ uenenis erodentibus cõueniunt, quorum latius superius meminimus in cantharidum curatione, ad quam breuitatis studio lectorem reijcimus: namque ijs efficaciora non plura hæctenus nobis comperta sunt. Nec alijs utendum est remedijs, ubi quis cinnabarin sumpisset.

## Calx, Sandaracha, Auripigmentum.

## Cap. XXIX.

**CALX**, Sandaracha, & Auripigmentum, pota aluum, & intestina cum uehementi erosione ex-cruciant. Præbenda cuncta, quæ suo admistu illorum acrimoniam hebetant, ac soluunt, & facilem lubricamque aluum reddunt, cuiusmodi ibisci, & maluæ succus est: natura enim utrique perlubrica. Dandum decoctum seminis lini, vel semen tragi herbæ, vel oryzæ, lacq; cum aqua mulsacopiosum, iura pingua, & boni succi.

**NON** modò Calx, Sandaracha, & Auripigmentum, quorum historiam superiore libro tradidimus, hausta uehementissimos uentriculi, & intestinorum cruciatus, & erosiones excitant, ut Dioscorides inquit; sed etiam sitim inextinguibilem, faucium, & gulæ asperitatem, tussim, spirandi difficultatem, urina suppressionem, & dysenteriam. Cæterum hæc omnia adiuuantur (ut scitè docet Dioscorides) pinguibus acrimoniam obtundentibus, & potionibus lenientibus, aluumq; lubricam reddentibus, tum etiam cremoribus, atq; seminum quorundam spissamentis, ut in cantharidum curatione latius, diffusiusq; prodidimus. quandoquidem medicamentorum omnium erodentium curatio à cantharidum curatione non differt: neq; ijs sanè ualentiora nobis sese offerunt remedia. Quare ex eo loco illa medicamenta petenda erunt ijs, quibus usui futura sunt. Eisdem quoq; effectus malos, & noxios præbent **ARSENICVM** sublimatum, Aerugo, & quod officinæ Risagallum appellant: quin & Saponis lixiuium, quod uulgò uocant Itali la mæstra, & Aqua ea omnium acerrima, qua aurifices, ac chymistæ aurum ab argento separant. Sed aquæ huius, & lixiuij difficilis est cura, quod illico in totum diffundantur corpus. Vniuersalis tamen curandi ratio eadem erit, quæ calce, & auripigmenti: tametsi alterum altero sit uehementius, & erodentius. Qui autem priuatim Arsenicum sublimatum hauserunt, eos frequenter uomere oportet, potò semper prius butyro, aut per se tantum, aut addito rapi seminis decocto. Profunt his & clysteres ex pingui iure, aut ptisane alicuè cremore, aut spissamenti ex psyllij, maluæ, & cydoniorum semine factis. Auxiliatur amygdalinum oleum, & ius pinguium gallinarum in cibis sumptum. In præstantissimum uero antidotum censetur fossile crystallum, in tenuissimum puluerem contritum drachmæ pondere, ex dulci amygdalino oleo potum. Porro **AERUGO**, præter alia eius mala antè dicta, adeo spirandi meatus occludit, ut magno impetu suffocet affectos. Succurritur noxæ crebris cum butyro, & calida excitatis uomitionibus, ut in arsenico, & insusis subinde clysteribus ex asinino lacte, & dulci amygdalino oleo. Prodest & Lemnia sphragis drachmæ pondere ex uino albo pota. Præstat item in olei balneum laborantes ad uentriculum usq; demittere. Sed primum huiusce pharmaci antidotum (ut ait Conciliator) est, ut qui hauserint, bibant ex uino corallia rubra in tenuem puluerem contrita senorum scrupulorum pondere. Cæterum **RISAGALLO** uulgò dicto, quod quidam Realgal appellant, cum maxime extremeq; siccat, & neruos contrahat, non alia conuenit curatio, quam quæ argento uiuo, & arsenico sublimatis, & ærugini adhibetur. quanquam priuatim non obscure iuuat uniuersum corpus dulci amygdalino illinire, & uiolaceo iulapio, & ptisana hordeacea sitim extinguere. Proficit & pinorum nucleorum oleum, aut è magnis nucibus, quæ ex India aduehuntur, expressum, semilibra pondere potum. In summa ea omnia efficaciter adhibentur, quæ cantharidibus conferre diximus.

Calcis, sandarachæ, & auripigmenti uenifica uis, & curatio.

Arsenici sublimati, & aliorum quorundam uenenum.

Arsenici sublimati curatio.

Æruginis ueneni remedia

Risagalli curatio.



## Lepus marinus.

## Cap. XXX.

QVI leporem marinum biberunt, piscium uirus olent: procedente tempore, alius dolore afficitur, & vrina sistitur: et si quando eam reddere contingat, purpureum colorem referet. omne piscis genus auersantur, & odio habent: foetido, ac graui sudore manant: biliosus vomitus, interdum sanguini promiscuus, subsequitur. His dandum lac asininum, uel passum continuè, aut radices maluæ foliorumque decoctum, aut trita cyclamini radix cum vino, aut veratri nigri, aut scammonij succi drachma, cum aqua mulsa, punicique mali acinis. Cedria contrita cum vino efficax est: anserinus sanguis, ut tepebit, potus. Sed cum pisces omnes respuant, aspernenturque, solis fluuiatilibus cancris vesci possunt, bibuntque eos admisto vino, adiutique ab his percoquunt. cumque appetere & comesse pisces coeperint, suæ salutis indicium habent.

Leporis marini veneni signa.

DIXIMVS de Lepore marino libro secundo, de quo ita scribit Nicander in alexipharmacis. Sin marini leporis malè perdentis potionem deprehenderis, perniciem asserentem, odorem eius senties, qualis est squamarum, & piscium purgamenti. Porro gustus, & sapor eius piscosus est; qualis putrefactorum piscium esse solet: uel cum nondum ablutorum squamæ polluant corpus. Sequitur huiusce potionem uiridis fellis suffusio, cum obtenebratione uisus & caro paulatim in homine contabescit. Accedit his ciborum omnium abominatio, malus habitus, & talorum ardor: oculi in concauum occultantur, & genæ ac maxillæ florido colore rubent. Vrina ægerime redditur: quæ tamen reddatur, purpurea apparet, & plus æquo sanguinea. Adhæc si pisces ægris offerantur, eos illico nauseabundi exacerantur. hæc ille. Cui subscribunt Aetius, & Auicenna, qui præter relata indicia, alia adhuc lepori marino epoto assignant, his uerbis. Marinus lepus adeo icterum inducit, ut totius corporis habitus croceo admodum colore inficiatur. Postea facies liuens intumescit, pedum plantæ incenduntur, adest spirandi difficultas, pectoris & pulmonis angustia, rufescuntque oculi. Dehinc tussis emergit sicca, sputus eruentus, renum dolor, uiriliumque inflammatio, adeo ut perpauci euadant, qui non labantur in tabem. Quare Galenus libro de theriaca ad Pisonem, proprium marini leporis esse ait, ut pulmonem exulceret, & erodat. Succurritur noxæ (ut Dioscorides inquit) asinino lacte ex passo poto, & maluæ decocto. Neque id aliam ob causam, ut Aetius declarat, quam ad eliciendum uomitum, & ueneni acuitatem retundendam, quemadmodum elieborum, cyclaminum, & scammonij exhibet, partim ad citandas uomitiones, partim ad aluum deiciendam. Cætera uero, ut incommotis subueniatur, quæ internis infert particulis. Præfertur quibusdam aduersus hoc malum humanus sanguis calens & uenis potus: humanum item lac, ab ipsis uberibus exuctum, & uulpis caro inassata: quin & theriaca diatesseiron tribus diebus pota.

## Rubeta, &amp; palustris Rana.

## Cap. XXXI.

RUBETA, aut Rana palustris assumpta tumores ciet: pallor corpus vehementer decolorat, ut plañe buxum spectetur: spirandi difficultas torquet: & grauis halitus oris, singultusque, inuita interdum genituræ profusio consequitur. Adiuantur secundum vomitionem multo meri potu, & arundinis radices binis drachmis, aut cyperi totidem. Breuiter, cogendi sunt, ut vehementi ambulationi & cur sui se credant, ob torporem, quo corripiuntur. quinetiam quotidie lauandi sunt.



Rubetæ, palustrisq; Ranæ venenum.

RUBETAE Ranæ, quam quidam bufonem uocant, diuersa reperiuntur genera. Terrestris tamen, quæ Græcis phrynos dicitur, Latinis uero rubeta, quod in frutetis & sepibus inter rubos degat, nocentior, magisque lethifera est, quam quæ in paludibus, & aquosis scrobibus uiuit (id quod non rectè, meo iudicio, intellexit Aloysius Mundella, Brixianus octaua sui uoluminis epistola.) tantoque magis noxia, lethiferaque fuerit terrestris, quanto in opacioribus, frigidiorebusque



gidioribusq; locis uitam duxerit. Quamobrem in hoc genere eæ omnium pessimæ creduntur, quæ in umbrosis conual-  
lium syluis, & in hærundinibus morantur. Adultæ crassa tenaciq; conteguntur cuti, adeo ut acutissimo palo quan-  
doque difficile à rusticis, qui ita eas interficere solent, perfodantur. Hæ cum circumnascentes herbas, siue aliquod de-  
pascens animal, ueneno insicere uolunt, contrahunt sese in tumorem, ut uenenum per urinam longius eiacularentur in  
plantas, & circumstantes quadrupedes. Quare admirari non licet, si nonnunquam repente interimant homines, qui  
fraga, fungos, aliasq; plantas harum ueneno infectas inscijs deuorauerint. Quippe quod non modò ueneni mictu hæc  
omnia insiciunt; sed etiam salua ea sæpius conspuunt: quæ sanè non minus mortifera est, quàm napellus. quinetiam  
earum sanguis uipereo scatet ueneno. Proinde mirum non est, si in puluerem potæ mortifera inferunt incommoda,  
quemadmodum & morsu. Nam etsi dentibus careant; tamen compressa scabris gingiuis particula, & subinde ingres-  
sa per cutis spiracula salua, deorsos uenenant, ut in præfationis huiusce libri commentario tradidimus. Sicca et  
in puluerem potæ, ut Auicenna refert, præter mala quæ à Dioscoride redduntur, faucium, & gutturis tum inflama-  
tionem, tum siccitatem excitant: item oculorum caliginem, uertigines, conuulsiones, dysenteriam, fastidium, uomi-  
tus, animi deliquium, delirium, amentiam, & plerumque edentulos faciunt homines, quauis euadant, qui hauserint.  
Nec minora etiam pericula adferunt fructus, & herbe earum ueneno infectæ, & epotus earundem sanguis. Curan-  
tur ijs malis affecti theriaca, uel Mithridatis antidoto tribus continuis diebus ex uino potis. Idem præstat testudinis  
marine sanguis, additis cumino, leporis coagulo, & uino. Datur potanda præsentaneo remedio quinta essentia no-  
stra theriacalis. Quin & oleum nostrum de scorpionibus exterius commodè iungitur. Præfert Conciliator smaragdi  
pulnerem ex uino potum serpulæ pondere, cum eo tamen, ut subinde intret æger nudus in mulum recenter exentera-  
tum, inibiq; conclusus moretur, donec desinuat cadaver, totiesq; sic exenteratum mulum aut equum, si mulus non  
adfit, permutet, donec effuso diutius sudore cedat noxa. Actius mulis, & equis parcens, in clibano, quantum tolera-  
ri possit, calidissimo affectos, nel alio in loco arte calefacto detinendos ad sudandum iubet, quemadmodum curantur  
aqua inter cutem laborantes. Quorum medicamenta curatioq; ut Auicenna est auctor, hoc in negotio non parum  
conueniunt. Proinde prodest ijs maxime rhabbarbarum, diacurcumæ, & dialaccæ confectio: tametsi Conciliator la-  
pidem his omnibus præferat, qui in earum capite reperiri solet.

Ranæ malefi-  
cæ signa, & cu-  
ratio.

## Hirudo.

## Cap. XXXII.

DEVORATAE cum aqua hirudines, si ori ventriculi adhærent, tractione partium, nonnullam  
suctionis imaginem præbent: eo enim argumento hausta hirudo deprehenditur. Has muria sorbitio-  
ne excutit, & Cyrenæicus succus, aut laserpitij folia, aut betæ, cum aceto, aut potauiuis glebula, cum  
posca. Nitrum ex aqua gargarizatur, aut atramentum sutorium aceto dilutum. Si faucibus hæreant, in  
aquam calidam ingressis, aqua frigida ore contineatur, & ad eam hirudines exilient.

HIRUDINES raro in alijs aquis inueniuntur, quàm in palustribus, lacustribus, & stagnantibus: quando-  
quidem in probatissimis sentibus, & arenosis, & saxosis fluuijs non nisi rarissimè uiuunt, cum suapte natura coeno, ac  
limo delectentur. Quamobrem caueant, qui palustres, uel stagnantes aquas bibunt, ne hirudines simul ingerant, quæ  
admodum inexpertis natioribus nunquam euenit. nancque æstatis tempore calore, & siti defatigati, dum aquam,  
cuiuscunque in itinere obuauerint, auidè potant, sæpe imprudenter hirudines hauriunt. Quo fit, ut subinde non modò  
sibi sanguinem exugi sentiant (ut tradidit Dioscorides; ) sed etiam (ut Auicenna inquit) cruenta expuant, ac præ ti-  
more melancholici fiant. Verùm anteaquàm aliquod offeratur uedicamentum, inuestigandum est, an animal ori uen-  
triculi, an gulæ adhaferit, an ipsi faucibus. Id quod facillè intelligi potest ex eorum, qui hirudines hauserint, relatio-  
ne: quoniam ubi suctionem sentiunt, nimirum ibi hirudinem fixam esse significatur. Quod si ori ventriculi affixa fue-  
rit, auxilium præstat muria leniter epota, foetida item laserpitij lacryma, quin & lixiuium cum sale & aceto, aut ra-  
phani domestici succus cum aceto, aut oleum crudum haustum, quod per se tantum hæc interficit animalia. conferunt  
insuper ea omnia, quæ alui tinea, & limbricos necant. Si nerò guttur medium ab hirudine oblideatur, proderit acre  
lixuium gargarizare, aut aquam, in qua alumen cum aceto inferbuerint, uel calchanthum, aut muriam cum lixiuium,  
aceto, & sinapi simul commistis. Sed si ea faucium ambitui hæreat, opem mirificam feret (ut Dioscorides docet) ca-  
lide balneum, aqua frigida in ore contenta. Siquidem hirudo ab aquæ calore propulsata, ad frigidam in ore conten-  
tam decurrens, facillè unà cum ipsa aqua expnetur. Interdum contingit, quod statim sub linguæ radicibus, uel in pri-  
mis faucium partibus adhærescit, ita ut depressa lingua uideri possit: tunc rostratis forcipibus facillè extrahi poterit,  
uel quouis alio instrumento, quod cuique in promptu fuerit.

Hirudinum  
deuoratarum  
noxa.

Hirudinum  
curatio.

Veratrum album, Thapsia, Elaterium, Agaricum  
nigrum.

## Cap. XXXIII.

PROVIDENDVM etiam ijs, quæ etsi ferendi auxilij gratia tradantur; non minora tamen ex-  
teris uenenis pericula sæpius adferunt. Qualia sunt album veratrum, thapsia, elaterium, agari-  
cum nigrum: siquidem ea strangulatus concitant, aut immodicas deiectiones mouent. Quibus ea  
medentur, quæ in fungorum mentione, & similibus retulimus. Nimios autem deiectionum imp-  
tus, medicamentis, quæ excrementa supprimunt, coercebimus. Neque negligenda quæ parum qui-  
dem

Rr z dem



dem nocere videntur, interim verò vitam in discrimina agunt. Quo in numero sunt sylvestris ruta, gith, nouæ glacies, pappi recentes: flores autem sunt eius spinæ quæ cactos dicitur. Eos qui sumperint, sola vomitio recreat.

Diuisio capi-  
tis castigata.

EXTANT quàm plurimi Dioscoridis codices, in quibus caput hoc de Veratro albo, Thapsia, Elaterio, & Agarico nigro, à precedenti capite seiunctum non legitur. Verum cum antiquissimus manu scriptus codex, hæc proprio, & peculiari capiti dicauerit, videaturque absurdum de his differuisse Dioscoridem unà cum hirudinibus, cum quibus nullam habent cogitationem, neque iisdem curantur remedijs, non temere facturos duximus, si illa à nobis seorsum proprio capite ab hirudinibus distincto, tractarentur. Sciendum itaque est, quòd cum hætenus scripsisset Dioscorides omnium uenenorum indicia, quæ pota, uel deuorata, homines necant, uel saltem egros efficiunt, qui uersalia & particularia antidota tradidisset, quibus illorum uis fraugi, ac destrui possit, cum præterea sciret aliqua in medicum usum haberi medicamenta alium ducentia, quæ simplicitate pota, & nullis antidotis infrenata, uel maiori mensura, uel pondere, quàm par sit sumpta, non minus homines iuterimunt, quàm quæ propriè uenena uocantur, medicos illud hoc loco admonere uoluit, quòd in propinandis hisce medicamentis minime cæcutiant, sed in hoc omne suum studium, omnemque diligentiam impendant. Verum quannus, inter ea omnia, quæ in medicum usum ueniunt, paucorum tantum meminerit, nempe thapsiæ, albi ueratri, elaterij, & agarici nigri; non tamen ob id fuerit insimulandus, quòd nesciuerit præter hæc, alia plura esse medicamenta, quæ noxam inferre possunt, aut maiorem quàm illa, aut æqualem. Quippe quòd illi satis uisum sit, si tantum horum exemplo imperitos medicos discrimen, noxamque docuisset, quæ omnia in uniuersum medicamenta alium cum labore ducentia plerumque sumentibus adserunt, cum (ut modò diximus) uel largius quàm deceat, uel suis antidotis exuta sumuntur. Sed ut harum rerum studiosis in omnibus, quantum possumus, satisfaciamus, præter ea quæ à Dioscoride tradita sunt, nos alia quoque plura addere decreuimus, quibus quotidie passim utuntur medici. Cuiusmodi sunt cyclaminus, ueratrum uigrum, euphorbium, turpetum, tithymali omne genus, scammonium, colocynthis, bryonia, lathyris, ricinus, thymelæa, & chamelea. Quandoquidem cum hæc omnia medicis in frequentissimo sint usu, ad corporis excrementa exigenda, & ad uomitum quandoque ciendum, in quàm plurimis hominum affectibus, mihi sanè negligentie adscribi posset, si hæc prorsus silentio inuoluissim, præsertim cum sæpius eueniat quorundam circumsoraneorum imperitia, ac temeritate (pharmacopolas nunc prætereo, quòd eorum errata sæpe, ac sæpius improbauerim) ut uulgaribus, & rusticis, necnon & quandoque nobilibus, innumera propinentur pharnaca alium ducentia, quæ plerumque sumentes in magnum discrimen ducunt, quoniam nec medicamenta ponderant, nec infrenata exhibent, nec ad ægotantium temperaturam, ætatem, sexum, consuetudinemque respiciunt. Quò fit, ut ægotantes, qui in eorum manus incidunt, præcipue ij qui natura sunt imbecilles, magnis nonnunquam afficiantur inconuolantibus, quibus nisi periti proprijs succurrerent remedijs, facile interirent. Albi itaque Veratri potior nem, aut Thapsiæ, aut Elaterij, aut Agarici nigri, aut Cyclamini sequuntur uomitus, ingentia alui profluvia, intestinorum tormina, strangulationes, & respirationis angustia. quibus dehinc tanta succedit principum facultatum imbecillitas, ut paruo temporis momento ægri animi deliquio corripiantur, grauiter spirent, & frigido sudore madescant. Postremo, nisi citius succurratur, oborto singultu, illico uel suffocati, uel conuulsi intereunt. His primum auxiliantur uomitiones (ut multoties diximus) crebro concitata, & insusa clysmata, quorum sæpissime superius meminimus. Post hæc remedio sunt antidota, quæ in uniuersum omnibus aduersantur uenenis, præsertimque theriaca, cui (ut Galenus pluribus in locis testatur) uis peculiaris inest, modò adulterio uacet, ut sumpta post medicamenta deiectoria, adeo eorum superet uires, ut nihil per alium exigant. Caterum priuatim Albo ueratro confert aqua malsa largius sumpta, & nymphææ flores duarum drachmarum pondere poti, uel deuorati, traduntque hæc propria albi ueratri esse antidota. Cyclamino deinde conducunt lauri bacce, duarum drachmarum pondere, sed propria facultate nigrum piper in puluerem contritum, & eodem pondere potum. Elaterio præterea opem fert Andromachi theriaca ex baccarum lauri decocto, aut melle pota senum scrupulorum pondere: uerum proprium eius remedium est menthæ succus. Thapsiæ denique nigri agarici noxa tollitur, ijs medicamentis, quibus albo ueratro subuenimus, cum eadem sint huius, quæ illorum incommoda. Fiunt quoque à NIGRO ueratro (ut scribit Auicenna) interdum horrenda symptomata, nempe intollerabiles alui fluxiones, suffocationes, conuulsiones, animi deliquia, palpitatio cordis, linguæ arefactio, dentium constrictio, frequentissimi ructus, & uniuersi corporis inflammatio: & nisi illi co succurratur, tremor consequitur, uniuersum occupans corpus, cum quo postremo commoriuntur ægri. His auxilium præstat absinthium ex uino potum: quin & cumini, & anesi semen, nardus, castoreumque aquis ponderibus in puluerem contrita & ex uino pota: appositis, ubi intumuerit uenter, linteolis igne calefactis, itemque sacculis flatus discutiendis. Cibandis autem sunt ægri recenti caseo, melle, butyro tam crudo quàm cocto, pinguium carniū iuribus, ac etiam passo. Sed non propterea parcendum fuerit antidotis in uniuersum iuuantibus, nec etiam nymphææ floribus, utpote qui non modò albi ueratri uires demoliantur; sed etiam nigri. Porro EUPHORBIVM fauces, & guttur uehementi admodum incendio uexat. Corpus uniuersum inflammat, uentriculum, & intestina magno dolore erodit, singultum excitat, & continuas alui fluxiones. Quæ itidem omnia mala inducunt TURPETVM, Scammonium, Colocynthis, Bryonia, Tithymali omnes, Lathyris, & Ricinus. quauquam non tam acriter nocent, ueluti Euphorbium. At THYMELEA autem, & Chamelea pituitosæ spumantesque excitantur uomitiones, alui profluvia, intollerabiles intestinorum, & uentriculi erosiones, angustia, inflammationes, et uniuersi corporis cruciatus: quin & sitis implacabilis, singultus, conuulsio, præpedita locutio, & alia seua accidentia, quæ quandoque ea excedunt, quæ ab epoto euphorbio proueniunt. His omnibus in uniuersum primum opitulantur uomitiones & clysmata, seruata uniuersali methodo, ac etiam communis usus antidota. Priuatim uerò profunt oleosa, ac pingua: item quæ ualenter sunt frigida.

Albi veratri,  
aliorumque; no-  
xa, & auxilia.

Nigri veratri  
noxæ, & cura.

Euphorbij,  
& quorundam  
aliorum vene-  
rata potio.

Euphorbij, &  
aliorum om-  
niū curatio.



frigida, ut hæc ingentem feruorem extinguant, illa uero ut exuperantem acrimoniam obtundant. Proinde prætulit Auicenna acidum lac, caphuram ex rosacea aqua potam, punicorum austerorum uinum, angurie, cucumeris, cucurbitæ, & acidorum malorum succum: item hordei ptisanam niue, uel glacie refrigeratam. Sed proprium (ut ait) euphorbij antidotum est citri semen ex uino, in quo helenij radix inferbuerit potum. Scammoni uero lac, à quo demptum fuerit butyrum, malorum, cotoneorum, rhois, ribisq; succus. Colocynthidis deinde antidotum fuerit sanè bubulum lac, & butyrum recens, Lennia sphragis, & smaragdi puluis, pluries pota. Turpeti præterea, & Tithymalorum omnium, Andromachi theriaca ex uino pota, in quo Cretense dictamnium incoctum fuerit: item mumia sepulcrorum in puluerem ex uino meraco pota drachmæ pondere. Bryoniæ porro, theriaca ex uino hausta, in quo helenium conferbuerit, itemq; nigrum piper contritum. Lathyrus adhæc, & Ricini proprium antidotum est hyperici succus, aut herba ipsa in puluerem pota. Thymelææ deuiq; & chameleæ rosaceum serapium, ex hordei ptisana potum, & subinde origanum Cretense igni tostum. Sed hæc omnia præstant tantum ad supradictorum medicamentorum uim deleteriã superandam. Ceterum cum plerunq; eueniat, ut hæc, quæ modum excedunt medicamenta, uaria ac diuersa adferant incommoda, quæ etiam ob sui repentinam uehementiam præsentanea exposcunt remedia, neipe continentes uomitus, perpetua alui profluvia tam cæterorum humorum, quam puri sanguinis, cum uasorum oscula uenientibus ui referantur, conuulsiones, præfociones, animi deliquium, & uirium omnium imbecillitatem; idcirco non modò attendendum fuerit, ut medicamentis uis antidotis superetur; sed etiam ut ipsis grauib; symptomatibus omni diligentia succurratur. Quandoquidem hæc sæpius tanti sunt ponderis, ut maiorem, celeriolemq; expetant curationem, quam cætera. Inhibentur itaq; uomitus modum excedentes (si tamen medicamentum cum humoribus reiectum sit) adstringentibus medicamentis, quæ uentriculum roborant, exterius præsertim illitis: quin & uinculis, ac fibulis, extremis membris obtortis. Faciunt ad hoc in corpus sumpta flaua myrobalana, tam sicca, quam saccharo asseruata: item nuxces cum putaminibus saccharo similiter conditæ, diacytonites, saccharum rosaceum diutius inueteratum, addita Lennia sphragide: præterea cydoniorum, & punicorum malorum uinum, syluestrium prunorum succus, myrti bacce, rhus, rosa sicca, syluestrium rosarum semen, cornu ceruinum combustum, santala, corallia, omphacium, acetum, & id genus alia. Sed eorum quæ exterius illita prosunt, hæc sese offerunt, Indica uidelicet, & Celtica nardus, mentha, glandes, lentiscina resina, thus, flaua myrobalana, myrti folia, & bacce, rhus, melinum, nardinum, lentiscinum, & myrtinum oleum. Nec tantum pollent hæc ad uomitiones compescendas; sed etiam pari facultate ualent ad sistendas alui fluxiones, quæ modum excedant: uerum ijs uniuerſa aluus est illinenda, ab ipso uentriculi ore ad pubem usque. Præstat & brachia ab scapulis ad manus, & crura à coxendicis articulo ad pedes usq; fascijs constringere, offusis subinde austeris plantarum succis. Confert item sudoris excitatio, aut detentis ægris in calido cubili, aut laconicis arte calefactis, in quibus ægros caput emittere oportet, aut brachijs, & cruribus, in calidæ balneo demersis. Ab his dare conuenit, quæ adstringunt, & roborant. Principes in uniuerſum facultates roborant odorata medicamenta, cuiusmodi sunt rose sicce, caphura, garyophylla, agallochum, styrax, laserpitij lacryma, iuniperi bacce, santala omnia, & id genus plura. Prætulit in huiuscemodi alui fluxionibus Auicenna nasturtij semen tostum, trium drachmarum pondere, ac subinde in lacte decoctum, quousq; lac concreuerit, & postremo potum. Si uero hæc non profuerint, soporiferis uti licebit, nimirum Philonis medicamento, athanasia, requie, & alijs quibuscunq; quæ opium, aut meconium exceperint. Nam etsi hæc quoque noxa haud uacent; tantum tamen adferunt iuuamenti (si tamen recta ratione exhibeantur) ut ijs tutò in tam magno discrimine medici uti possint. In summa si optimam haberemus theriacã, quæ ex adulterinis & supposititijs non esset confecta medicamentis, omnibus præponeretur antidotis in superanda ui medicamentorum aluum ducentium. Siquidem testatur Galenus (ut paulò superius diximus) pluribus in locis, suis in libri de theriaca ad Pisonem, & Pamphilianum, illud optimæ theriacæ indicium esse, ut à præsumpto deiectione pharmaco pota humorum deiectionem inpediat, citra ullam ægrotantium noxam. Id quod nobis experientia compertum est præstari ab antidoto nostro, cuius descriptionem tradidimus in præfationis huius libri commentario. Prodest non parum præter hæc uomitionibus, & fluxionibus prædictis etiam uictus regimen ex adstringentibus & austeris institutum, quæ deinde niue uel glacie refrigerari conuenit, aut in altum aquæ puteum fune suspendi. Adiuvantur conuulsiones, quæ ab ingentibus, laboriosisq; alui profluuijs eueniunt, ijs duntaxat cibis, quibus ad refocillanda exinanita corpora, uiresq; roborandas utuntur medici. Quo in negotio præfertur humanum lac ab ipsis exutum uberibus: quin & dulcium amygdalarum cremor, & earum pariter oleum, ciborum condimentis admixtum. Prosunt & nuclei pinei, pistacia, Indica nuxes, & mesopeponum semen, omnia in mortario contusa, & caporum iure colliquata, addito candidiori saccharo. Opem similiter fert caporum, & phasianorum exenteratorum carniū eliquatus succus, carniū ipsi tenuiter incisi, uitreo uase conclusis, & in aquæ balneum eodem in uase decoctis, quousq; uniuerſus ab his exudauerit succus. Is uanq; frequenter potus cochlearis mensura (ut libello de uiribus cordis prodidit Auicenna) magis succurrit imbecillitati cordis, quam alius quicunq; cibis. Conducunt præterea recentium ouorum uitelli carniū iuribus admixti, & iure, & saccharo temperata. Præfocationibus porro subuenimus iisdem tum auxilijs, tum medicamentis, quorum superius mentionem fecimus, cum de mortiferis fungis differe remus. Ceterum meminit hoc capite Dioscorides præter prædicta, melanthij, sylvestris rutæ, & earum plantarum lanuginis, quæ in aculeatarum genere quibusdam casti uocantur, Quorum omnium historias, & facultates superius proprijs locis tradidimus, quæ tamen non semper nocent. At si noceant, curantur excitatis uomitionibus, cibisq; prius maluæ decocto, aut lacte, aut recenti crudo butyro. Post quæ proficiunt pingui iura, & cætera, quæ aluum emolliunt. Dent igitur operam, diligenterq; animaduertant seplasiarij probi, ac fideles, ne in ponderandis hisce medicamentis, aut manu aut oculis imprudenter decipiantur. Quinetiam eos admonitos uelim, ut imperitos, ac teme-

Remedia ad  
varia sympto  
mata.

Remedia ad  
cōuulsiones.



arios circumforaneos à pharmacopolijs suis excludant, reprehendant, & missos faciant: ac si opus fuerit, protomedicis & rectoribus ciuitatum eos denuncient, ne miselli ægotantes sub publica omnium fide ab hoc improbo ac pestifero hominum genere prodantur, atque in perniciem agantur.

## Domestica nobis.

## Cap. XXXIII.

AQUA frigida abunde pota, aut meracum vinum liberalius epotum, aut passum, præsertim à balneo, aut cursu, aut uehementi exercitatione, strangulatus, & dolores infert. In quibus sanguinis misio protinus, & vacuatio, imminetia soluunt pericula. Sed de notis veneficiorum, ac remedijs, & cauendi modo, hæcenus dicta sint. Subiungeremus etiam antidota necessaria, quæ præclare auxiliantur, qui bus utimur, quale Mithridatium est præsertim, & quod sanguine, & quod scinco temperatur. Verum quoniam alijs in locis diligentissime scripta sunt, hæc ab eorum descriptione supersedemus.

Rerū dome-  
sticarū noxa.

NON modo aqua frigida, & uinum meracum, aut passum inter ea, quæ nobis domestica sunt, & quotidiano usu alimentum præbent in humanæ uitæ subsidium, eo modo pota, quo Dioscorides scribit, maxima adferunt discrimina; sed etiam carnes, & pisces. Etenim hæc utraq; cocta, & adhuc feruentia humidis locis diutius asseruata, subindeq; frigida deuorata, eosdem malos pariunt effectus, quos à maleficis fungis creari tradidimus: tametsi quandoque non nisi duobus, aut tribus post diebus appareat noxa. Tostæ præterea carnes, uenenatorum subeunt naturam, si calidæ inter duas suffocentur patinas, obuoluanturq; linteis, ne exhalare possint. Eadem etiãnum mala inferunt mortici- næ carnes esitate, quemadmodum & ea, quarum animalia aut à uenenatis serpentibus, aut à rabidis brutis demorsæ, aut fulmine icta interi-<sup>20</sup> ere. Quandoquidem sæpius harum esu coli oritur inflammatio, mœror, alui profluium, furor, obliuio, ueternus morbus, & ad postremum mors insequitur. Quamobrem hæc sanè negligenda non sunt, quin potius summa cura uitanda. quippe aliquos uoui, qui his deuoratis nullo medicamento adiuti, intumescere inde toto cor- pore, tandem uitam misere finiuerunt. Nec minus euitare oportet oua barbi piscis: nam adeo uenena sunt, ut si lar-<sup>30</sup> gius simantur, eos qui hauserint, in magnum periculum adducant. Piscium curatio eadem est, quæ fungorum. quanquam non existimat Conciliator, ut piscibus sicut mortiferis fungis conueniant syluestria pyra. Carnium uerò suffocatarum malis succurritur excitatis prius uomitionibus, & infusis clysteribus: mox uini optimi & odorati pos-<sup>40</sup> tu, admisso cydoniorum malorum succo. Præstat à uomitu Lemniam sphragidem bibere, unã cum agallocho, & mastiche. quanuis eadem sit harum cura, quæ coli affectibus adhibetur.

Piscium, & car-  
niū noxæ re-  
media.

## De uenenatis animalibus.

## Venenata.

## Cap. XXXV.

DE BESTIIS, quæ virus eiaculantur, & exitalibus uenenis, ideo scribere aggredimur, ut tota curationis remediorumq; ratio ad umbilicem perducatur. Siquidem pars hæc non minus quam cæteræ alię, necessaria est ijs, qui artem medicam exercent, utpote cum adminiculo eorum, quæ inibi traduntur, doloribus, periculis, & cruciatibus, plurimisq; alijs malis homines liberari conueniat. Hæc autem in summa fastigia duo, sicuti ab initio relatum est, distribuitur. Nam qui de<sup>40</sup> feris virus inspuentibus sermo differit, theriacus dici solet: qui uerò de amoliendis ueneficijs, alexi-<sup>50</sup> pharmacus: quo prius tradito, simul quæ sequi signa consueuerunt, præmonstrabimus: tum quæ non-<sup>60</sup> nihil auxilijs ferunt. Omnia autem in promptu, & ad manum habere artificem oportet, propter vr-<sup>70</sup> gentem sæpenumero necessitatem. Siquidem pauca è uenenis & virulentis animantibus, tarda & gra-<sup>80</sup> fantia sensim pericula cient, ita ut dilationem admittant: pleraq; uerò præsentaneam perniciem affe-<sup>90</sup> runt. Hominum autem partim malè alijs cogitantes, ingenta prauitate maleficium ita temperant, ut spatium curanti liberum non relinquunt: partim sceleris admissi conscientia, aut tristi aliquo euen-<sup>100</sup> tu oppressi, hausto sponte ueneno, mortem sibi consciscere conantur. qui postea deprehensi, aut re-<sup>110</sup> spicientes, & uitæ cupidi, præsentaneam opem poscunt. Non desunt qui hostiles sagittas illinentes, aut<sup>120</sup> fontes aquasq; pitcanas hac labe polluentes, certam & inuitabilem addersarijs perniciem moluntur. In quibus ipsis etsi maleficium non subito, sed aliquantò post grassari natura sua comparatum<sup>130</sup> est; tamen nisi primo quoque tempore coerceatur, & remedijs subinde excipiat, frustra tandem succurritur, occupatis iam corporibus exitali vi ueneni. Proinde non vulgari industria diligentibus<sup>140</sup> in ea re utendum est, ut quod in alijs incommodis ars consueuit, in his quoque salutem mortalibus præbeat. Quin & apud præcos genus hoc unum existimabatur esse eius partis, quæ medicamentis præ-<sup>150</sup> gnat: sed recentiores id ipsum discreuerunt, nominantes præcautionem, & modum præcauentem, sa-<sup>160</sup> lubris sanantisq; medium statuentes, parua & leui supra modum persuasione decepti. Siquidem tres<sup>170</sup> in humanis corporibus constitutiones esse contendunt. vnã, qua sani degimus: alteram, qua sinistra<sup>180</sup> valetudine corpora laborant: tertiam, quæ medium inter utrasque locum sibi vendicat. In qua positi,<sup>190</sup> sanitatem specie mentiuntur, facileq; in morbos & pericula concidunt, ob vim corruptricem, quæ cor-<sup>200</sup> poribus nostris incumbit: quemadmodum in ijs videre licet, quos excandescens rabie canis memora-<sup>210</sup> deris.



derit, necdum tamen aquam horrent: in ijs quoque qui cantharidas hauserunt, sed nondum urinæ tormento cruciantur. Tripartitò igitur artem digeri, triplicique corporis constitutioni meritò respondere tradunt. Salubrem partem esse uolunt, quæ sanitatem tuetur: præcauentem, eandemque prohibentem, quæ obstat, quo minus in morbos incidant: & sanantem, qua uitia discutiuntur.

Quibus ita responderi potest, quòd primùm ex ista ratiocinatione non tres corporis tantùm, sed quatuor haberi constitutiones fatendum esset. quippe ut aliqui sunt, qui necdum morbo laborant, morbo tamen maxime ob impendentem causam sunt obnoxii: ita sunt, qui iam priore morbo defuncti, nondum tamen secundæ ualeitudini restituti sunt. id quod in ijs qui à morbo proximè sese recolligunt, cernere licet, qui uirium recreationem & robur desiderant. Sed quemadmodum curandi ratio

ad partem medicamentariam pertinet: ita præcautionem eidem subiici par est. Ad arcendas enim ualeitudines uehementibus utimur auxiliis, altiore scarificatu, uisionibus, amputatione, derodentibus epithematis, potionibus pernicipi occurrentibus, & plerisque alijs. Verùm enim uero sunt usque eò rudes nonnulli, ut ne remedia quidem appellent, quæ morbos arceant. Cuius sententiæ inire rationem haud promptum est: etenim cum uerbum ipsum, præcauere, tum agendi modus, omnino auxiliarem remediariamque uim præferunt. Mirum uerò nisi etiam sua illa distributione partium eos complectuntur, qui in pestilentis cœli statu morbo nondum correpti sunt: pesti tamen, propter obuersantes aeris occasionem, opportuni, & in morbum proni redduntur. Dicere forsitan quis posset, salubris institutionis præcepta non aliud esse, quàm arcendorum morborum rationem: quippe cum firma reddere corpora, & minus uitijs obnoxia nitamur, ut inoffensa ualeitudine degant, nec morbis conflictentur.

Neque id silentio prætereundum, quod maxime præcipuum, & tanquam caput rei est, non oportere medicinæ partium distributionem, totidem corporis constitutionibus respondere, sed naturas singulorum suis notis seorsum scrutari, ac explorare, ut suis locis ostendimus. Cum ijs igitur non pluribus agendum. Illud magis adnotare conuenit, affectus, qui à uirulentis animalibus, uenenisque contrahuntur, uocari cæcos, id est, quorum ratio minimè iniri potest. Quin & ea, quæ eisdem auxiliantur, nulli pariter sunt addicta causæ. quapropter quæstionibus obseruatoriæ artis, & eius quæ ratione fulciatur, annumerari solent. Neque prorsus uerum deprehenditur, affectus huiusmodi cæcos esse. nam quod semper se protrahit, & nullum in quibusdam necessarij usum exhibet, haud facili coniectura colligi potest: etsi naturæ proprietate prorsus cæcos eos affectus concedimus, qui ab exitiis uenenis, & animantibus, quæ uirulento morfu sæuiunt, contrahuntur.

Nam quod ad opus nonnullum usum præbet, datque medendi occasionem, neque imperceptibile, neque cæcum, nullius causæ obnoxium reputatur: sed magis ab ipso quis impulsus, demonstrationem se habere, & opinionem de abditorum cognitione confirmare poterit. Nam etsi sæpe minora sunt, quàm ut sensibus percipiantur; euidenter tamen ex ipsis inter se collatis deprehenduntur. Dio-cles autem in eo commentario, quem Plutarcho dicauit, satis modos perstrinxit, ad uerbum ita scribens. Nosse quis hoc potest cum in alijs non paucis, tum in uiperis, & scorpionibus, & reliquis id genus, secum animo reputans, ut quauis exiguo sint corpore, uixque conspectui subiiciantur; magnorum tamen discriminum ac dolorum causas inferunt: quorum nihil præter quandam corporis exiguitatem, uimque præ cæteris animantibus datam illis, facile fuerit spectare. Quanta enim ea moles corporis est, quæ à scorpionis ictu, & aliorum id genus uenenatorum, quæ nos morfu conficiunt,

attingitur? quorum aliqua uehementes cruciatus excitant, alia erodunt, & putredines cient, nec desunt quæ præsentaneam pernicipem moliantur. Aut quantulum est quod à phalangii morfu ingeritur, & uniuersum corpus excruciat? neque enim quis magnitudinem ipsorum deprehendere posset, cum prorsus exigua mole constent. Ergo quòd hæc ad affectus referantur, constitit inter omnes. Verùm quòd exactè deprehensum sit, uim quandam ipsis inesse mortiferam, quæ insinuata corporibus, molestiarum, quæ exoriuntur, nobis causa sit, in confesso est, & omnium consensu persuasum.

Nec quisquam inuenietur usquedè contentionis studio flagrans, qui aliunde exoriri molestias asseueret, quàm à materia mortifera parte corporis attingente. Porro id erat, quod inter utilia artis operum in omni opere dicere oportuit, quænam res opus hoc efficiat, ut nihil prorsus nos lædat, incomprehensa communis causæ quæ proprijs inest ratio: quandoquidem tum euidenter indicari posset, cum deprehensa est. Ideo Erasistratus empiricorum pertinaciam graui cauillatione incessens, cæcis affectibus causas assignauit, inficiatus hic communem, & supremam morborum causam incomprehensibilem esse: & hanc in eo, quem de causis scripsit, commentario aptissimè prodidit, candido signatam lapillo. Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicant in quibusdam, ut in uenenis, serpiente signatam lapillo. Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicant in quibusdam, ut in uenenis, serpente signatam lapillo. Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicant in quibusdam, ut in uenenis, serpente signatam lapillo. Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicant in quibusdam, ut in uenenis, serpente signatam lapillo.



intima pernicipi repugnarent. Hæc itaque, quæ differuit Erasistratus, ueritati consentanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodicos demirari licet, qui mortiferam uim corporibus illapsam, negotiorum, quæ ipsa facessit, esse causam diffiteantur: uerum rudiusculè nomini attendunt. Nam apud ipsos palàm immissa uis φθοροποιός, id est mortifera, nominatur: φθοροποιόν autem nullius officij alius esse potest, quàm causæ. Aiunt hæc nomina, μάρσιππος, & ἀνακαλύπτειν, esse reliquis omnibus similia, in quibus partes quædam dictionum non pro uirtute, sed nuda enunciatione comprehenduntur. Enimuero quemadmodum in his uocibus μάρσιππος, & ἀνακαλύπτειν, partes neque certos, neque principes retinent significatus; sic in hoc uerbo φθοροποιόν, partes productionis gratia, non pro uirtute coaluerunt. Hinc ad causarum differentias transeunt, affirmantque causarum aliquas euidentes esse, quæ dum aduersam ualeitudinem creant, separantur: cuiusmodi sunt frigus, labor, æstus, & similia. quasdam continentes, quæ permanent, postquam morbum excitant, hoc est, quibus præsentibus, & effectus eorum adsunt: incrementibus, affectus augentur: decrecentibus, minuntur: & cum desinunt, iidem finiuntur: quibus solis ac per se manentibus, effectus quoque ipsi manent. Talia quidem receptissima sunt causarum discrimina, quorum nulli phthoropœon subiici potest. Euident enim causa non est, quoniam morsus ipse permanet, nec ipsa à corpore separatur. Nec continens causa dici potest, cum magna ex parte hic adsit: quemadmodum accidit ijs, qui à rabioso cane sunt demorsi. Quod si neque euident causa, neque continens fuerit, neque per se, neque alterius consortio causa erit. Quod si à nulla causarum differentia phthoropœon deducere possumus, consequitur, ut neque causam esse fateamur. Quod autem asserunt, uocabula quædam in se non habere partes rerum significatrices, sed nuda & simplici pronunciatione ficta esse, fieri necesse est. Verum non omnia, sed per pauca talem nancisci conditionem existimandum est: neque enim ποιόν in hoc nomine φθοροποιόν, perinde atque assumptitia profertur, sed longè principem obtinet significationem. Quemadmodum enim φθοράς, id est corruptionis, nomen mutationem in peius significat, sic hoc uerbum ποιόν sumi debet, ut nihil amplius ex eo quod hanc dictionem φθοράς secum habeat, declaret. neque prorsus id significat, quod omnes palàm audiunt, & huic simile redditur, παιδί ἔχειν δίψος. Si dant à corruptione sanis fieri morbum, concedunt utiq; uim in huiusmodi uerbo ποιόν subesse: siquidem aliquid est, quod corruptionem efficiat. Omne autem quod aliquid efficit, ostenditur per singulas causas, quæ corporibus subiiciuntur, idque tam in lethalibus uenenis, quàm in ijs quæ corporibus ingeruntur. Verum non nihil subiacere causarum differentiis produunt. Quinetiam aberrarunt, non exactam diuisionem assumentes. Qui uerò se dogmaticos profitentur, causam esse partim præparantem, partim continentem asserunt, ut inguinum ulcus, & inguinarum febrim, & quæ effectui tum assint, tum etiam separetur, ut à fractis præcipitatio. In summa quoties quidpiam suapte natura causa fuerit, nec ulla diuisione comprehenditur, uitiosum est, neque causæ adferibitur eorum, quæ idem genus sortiuntur. Sed quod phthoropœon causa sit, nomen ipsum argumentum est, & in ijs quæ contingunt, apertius ostenditur. Quid aliud causæ arbitrantur esse post impressum à serpentibus ictum, quàm ex animante uim, & illapsam in corpora uirus? Neque enim frigus, neque æstus, neque sectionem corporis, neque crudatam, neque aliud quicquam simile causari possunt. Verum quoniam causarum differentiis gaudent, & aliquas continentes, alias euidentes appellant, ipsis dicendum, utroque istorum modorum euidentem quidem causam esse, quod affectum præcedit, & quod corporis substantiam præoccupat: continentem uerò, quod morbis præsentibus adest, qua separata recedunt, quæ cum ipsa euenerant. Sed de ijs hæcenus. Statuendum itaque mortiferam uim intrinsecus manifestissimam esse causam, ipsamque principem facere scopum oportet. Et ante quàm ad ima decumbant morbi, uarijs modis est certandum, donec uis tota corporibus exeatiatur. Modò enim reuocari debet ea parte, qua pestis intrauerit: modò aliqua alia, præsertim principatum non obtinente, antè coerceatur, quàm altius irrepens uiscera tagant: aut eius pernicipes eluatur, retundaturque, eum iam membratim peruagatura est. Itaque uenena si hausta sint, crebris uomitionibus: si morsu impressa, scarificatione, affixis cucurbitulis, exuctu, carnis circumscriptione, nonnunquam amputatione extremæ partis, euocantur. Retinentur uerò infusione, & imposito medicamentorum aerium cohibentur. hæc simul utiq; arceere uirus, & eluere possunt. Restinguuntur, & euineuntur meraciore potu, aut passo nulla aqua diluto, uel contrariorum esu, quæ acrimonia sint prædita. Postremò deiectio alui, euocatus sudor, & alia quædam in commune, quæ membratim demonstrabimus, auxiliantur. Verum enimuero non lethiferam modò materiam; sed & magnitudinem, & tempus, pro scopo considerare oportet. etenim ab ijs remedia quàm plurimum discrimen capeffunt. A magnitudine quidem, cum nonnulla ex uenenis, & uirosis animalibus pericula minantur: alia putredines altas, aut exteriores excitant: alia uehementissimos dolores, aut cæcos eient: alia uix medicamentis cedunt, & magis minusue molestias excitant. Oportet autem ea quæ pericula ferunt, peruiacioribus auxiliis expugnari: & minus infesta, mitioribus. Quippe absurdum fuerit in grauioribus, segnioribus medicamentis homines in discrimen adducere: in minoribus uerò, uehementium auxiliorum iniuria corpus lacerare. Finitio à temporibus in promptu est: hoc enim subito in pericula, & præsentibus molestias adducit: illud uerò sensim, & dilatas in diem longam, aut breuiorem producit. Itaq; in acutis quidem confestim multa simul auxilia representari oportet, reliquis, paulatim. Hæc quædam artis formula breuiter definita sint. Iam membratim rem prosequamur.



CVM hætenus tradiderit Dioscorides de his priuatim uenenis, quæ epota aut in cibis sumpta, corpora nostra permutant, corrumpunt, deseruunt, & deniq; in perniciem agunt, ut hæc in re nihil amplius desiderari possit, statuit deinceps de his etiam sibi esse differendū, quæ uirulenta animalia ictu, uel morfu relinquunt. Quod utiq; probè sciret, hæc non minora, quam illa representare discrimina, imò etiam maiora: quandoquidem eueniant hæc ex tempore, & præter opinionem, plerumq; in campestribus, & montibus, ubi nullum auxilium, nullaq; uel rara remedia. Quamobrem de his non minus diligenter differuit, quam de alijs, quæ corporibus ingeruntur, argumento satis manifesto, quod uniuersalia horum remedia nō una tantum præfatione, sed pluribus scriptitauerit. Quod cum animaduertent recentiorum quidam, haud dubiè existimarunt, hoc sextum uolumen in quatuor libros esse diuidendum, nempe in sextum, septimum, octauum, & nonum. Veruntamen ijs mihi non rectè (pace semper eruditorum dixerim) ea expendisse uidentur, quæ in huiusce libri præfationis initio à Dioscoride scribuntur: is enim apertissimè hunc sextum librum totius operis ultimum declarauit. Quapropter ipse Dioscoridem secutus relictis aliorum opinionibus, asserere non dubitauerim, hunc uniuersum de uenenis, & uenenatis animalibus tractatū, unum tantum, non plures esse libros: tametsi pro cuiusq; arbitrio in plures sectiones diuidi possit. Quarum prima ijs dari poterit, quæ ore sumuntur in corpus: secunda canis rabidi moribus: tertia indicijs ac symptomatibus, quæ à uenenatis moribus oriuntur: postrema uerò eorum curationi. Verum enim uero cum hæc diutius examinauerim, ut Dioscoridis doctrina ad maius omnium commodum in unum congeratur, & ne tot huius libri fiant sectiones, uenenosorum animalium tum indicia, tum accidentia, quæ proprijs capitibus tradidit Dioscorides, ijs coniunximus, quibus ipse egit de eorundem curatione, & remedijs, ut unusquisq; iunctim nulla temporis iactura, uno tantum capite indicia, accidentia, & curationem consequatur. Quod & ipse fecit Dioscorides, ubi superius de uenenis differuit, quæ in corpus sumuntur. Ibi enim indicia à curationibus non distinxit. Nam si in uno tractatu indicia, in altero uerò curationes querantur, maius temporis dispendium fiet, maiorq; menti molestia inferetur, quam si hæc omnia in unum redacta legentibus sese offerant. Neq; hoc nobis uitio adscribendum esse putamus, quando res eo magis placere soleant, quò commodius fieri possunt, cum præterea illud (ut aiunt) si ustrà fiat per plura, quod fieri potest per pauciora. Neq; etiam ob id quis calumniari poterit, quod Dioscoridis codicem aliqua ex parte deprauauerim: quod nusquam à me deprauatum, sed tantum in meliorem formam, & ad priorem auctoris doctrinam ipsum redactum, & restitutum putem. Porro non aliud super hæc præfatione nobis dicendum uidetur (quæ multis intellectu difficilis extitit, ut Marcellus ipse fatetur, quod fortasse Dialecticam ignorauerit) nisi quod aliud sanè hæc præfatio non sit, quam Dioscoridis Aristotelem secuti disceptatio, aduersus eos omnes, qui superficie tenus in medica facultate, super nuda ac simplici uocabulorum interpretatione altercantur, eorumq; præsertim, quæ ex uarijs, ac diuersis uocibus componuntur. Quandoquidem hæc interpretationis uocabulorum distractio, potius ad sophistas, & nugatores attinet, quam ad expertos, & probatos medicos, ut facile uidere est in pluribus irreprehensibilibus uocabulorum exemplis ex pluribus uocibus compositorum, quæ in lib. peri hermenias ab Aristotele assignantur. Quippe quoniam nouerat ipse Dioscorides, quod tam methodicorum, quam dogmaticorum quidam in ipsis compositis uoculis declarandis expertorum, exercitatorumq; medicorum sententiā, proprijs uoculis denominatam, haudquaquam secuti fuerant. Cæterum & eos non parum reprehendit, qui absque aliquo Dialecticæ fundamento, diuisione in causas facere audent. nam cum in diuisionibus errorem committant, in ijs quoq; quæ sequuntur, errent necesse est. Proinde qui hæc latius uberiusq; noscere cupiunt, Aristotelem consulant libro secundo physicorum: illis siquidem inibi amplissimè satisfiet. Potuissimus quidem & nos rem hanc pluribus prosequi: sed cum nostrum institutum non sit, nunc in aliam materiam digredi, hæc silentio prætereunda duximus.

Ratio tractatus de uirulentis animalibus.

Nouus ordo huius libri.

## CANIS RABIOSVS.





## Signa rabiosi canis, &amp; demorforum ab eo.

## Cap. XXXVI.

DE RABIOSI canis morfu sermonem alijs præposuimus, quòd id animal domesticum, ac frequens esse consuevit, & in rabiem sæpius agitur, ac perit, ab eoque cauere difficile. inde periculum inuitabile hominem manet, nisi multis utatur auxilijs. Canis plerunque flagrantissimis æstibus in rabiem efferatur: interdum quoties frigora inceserunt. Rabiosus autem potum & escam auersatur: largam spumantemque pituitam naribus, & ore proiicit: toruè & solito tristius intuetur: in omnes passim sine latratu irruit, & æquè feras hominesque, tam familiares, quàm ignotos mordet: nec protinus infestum quicquam infligit, nisi, ut uulnus, dolorem: exinde morbus ille qui ab aquæ metu hydrophobicus Graia est uoce appellatus, contrahitur. Euenit autem cum distentione neruorum, totiusque corporis rubore, præsertim faciei, cum sudore, & languore quodam. Aliqui auræ splendorem fugiunt: alij sine ulla doloris intercapedine uexantur. Sunt etiam qui canum more latratus ædant. & obuiam factos morfu adoriuntur, ac mordendo simili uitio labefaciunt. Proinde ex iis, qui hoc uitium senserint, neminem seruatum uidimus, nisi forsitan ex historia unum aut alterum euasisse audiamus. siquidem Eudemus superasse quendam affirmat. Themisonem aliqui demorsum in hunc furorem incidisse, & euasisse fatentur. Alij ipsum cum amico aquam expauescenti morem gereret, & officium exhiberet, quadam naturarum concordia, similem contraxisse affectum: sed post multos tandem cruciatus seruatum extitisse. Molestissimum itaque genus morbi, à quo multos, antequàm ipsum experirentur, uindicauimus, & complures ab alijs medicis seruatos nouimus.

canis rabiosi  
uenefica natura,  
& signa.

N V L L V M in uniuersum animal homini tam domesticum, familiareq; reperitur, nullumq; quod tam multiplici, uariòq; genere constet, quàm canis. Hinc est, quòd uiri, mulieres, ac pueri ijs magis delectantur, quàm cæteris animalibus, quæ in domibus nostris aluntur, tanta quidem intercedit canibus cum homine societas. Qui tamen in rabie affecti, quos non morderint, in maximum discrimen plerunq; deducunt. Cum itaq; canes à continuo hominum consortio nunquam absint, qui propterea illorum moribus magis subiiciuntur, quàm cæterorum, quæ morfu pariter, uel ictu uenenum eiiculantur; ideo merito quidem de his prius, quàm de reliquis bestiis uenenatis tradidit Dioscorides. Cæterum quànquam ipse causas non scribit, cur magis æstate Canicula ardoribus, itidem hyeme frigoribus uehementissimis in rabiem aguntur, quàm reliquis anni temporibus, cum tamen palàm sit, canum rabiem non aliunde provenire, quàm ab atrabiliarijs excrementis, facile cognosci potest, id æstate euenire perusto à caloribus eorum sanguine, hyeme uerò frigoribus concreto. Rabidi canis indiciâ describit Galenus libro de theriaca ad Pisonem (si tamen liber is Galeni legitimus est) his uerbis. Si audieris canem, qui aliquem non morderit, gracilem corpore, & siccum, oculis rubentibus, cauda demissa, spuma ex ore fluente, præterea lingua foras porrecta, & tanquam bile colorata obuium, quæquam infligisse, citraque rationem cucurrisse, deinde rursus subito consistentem cum ira quadam magis furenti non ipsi præuissos non mordisse, hæc inquam si in eo scire habere audieris, statim rabiosum canem fuisse intelligas. hæc ille. Incedunt præterea (ut quidam asserunt) lento gradu, demissis auribus, abscissa uoce, stupido capite, & obuios non modò homines nullo delectu; sed & bestias demordent. Nec mirum si proprium mordeant dominum, aliosq; domesticos omnes, nullius habito discrimine, uel ratione. siquidem cum proprium atræ bilis sit sensus omnes inficere, omnium & sui ipsius obliti, domesticos ipsos cognoscere nequeunt. Id quod etiam pluribus hominibus accidit, qui melancholici effecti, non modò patrem, matrem, uxorem, & proprios filios; sed etiam se ipsos quandoq; occiderunt. Verum et nimis non tantum æstiuis caloribus, & hyemis frigore canes in rabiem aguntur, sed etiam morticinarum, putridarum, uermibusq; scatentium carniū esu: quin & marcescentis earum sanguinis. Quòd si fuerint hæc carnes eorum animalium, quæ pestilentia, aut ictu fulminis, aut uenenosorum moribus interierint, eo facilius maioriq; afficiuntur rabie. Quæ etiam excitari solet computrescentibus aquis frequentius ebibitis, quòd hæc omnia atrabiliarios succos augeant, & putredine corrumpant. Eoq; magis his de causis in rabiem aguntur, quânto alter altero suapte natura magis atræ bili obnoxius fuerit. Aduertant præterea nobiles mulieres, ne suis catellis, quos in delicijs habent, et quibus maxime oblectantur, cibum uel iusculum edendum præbeant, quibus aromata, præsertimq; piper & gingiber, fuerint admixta. Quippe cum hæc caliditatis, siccitatisq; modum excedant, eadem reione, qua ingens æstatis feruor, canes rabidos efficiunt. Caueant ideo eas libenter moneo, ne ipsi forte fortuna id mali accidat, quod Tridenti euenisse scimus clarissimo Baldo utriusq; legis doctore, is siquidem inter ludendum cum quodâ suo catello iam rabie affecto, leuiter in inferiori labio demorsus fuit. Sed ipse bulus rei ignarus quarto post mense rabidus factus, & tandem hydrophobicus miserabiliter mortem obiit, nullo adiutus medicamento. Ad hæc sciendum est, quòd nō canes tantum (quànquam ijs magis, quàm cætera animalia in rabiem agantur) rabidi fiunt; sed etiam alia pleraq; animalia, nempe uulpes, mustelæ, uiuerræ, martes, simie, & id genus alia. Quapropter nesciuerim, quo argumento dixerit Galenus libro sexto de locis affectis, solum canem inter cætera animalia corripi rabie: nisi uoluerit dicere (ut equidem reor) canes cæteris animantibus rabiei magis esse obnoxios. Refert Aristoteles libro octauo de historia animalium, camelos etia, & equos in rabiem agi. Id quod ego quoq; asserere possum: etenim memini, cum ruri degerem, me uidisse equum rabie furentem, qui fracto capistro obuiam quadam uetulam per capitis, & crinium uitam morfu comprehensam, decem pluresq; passus à terra suspensam pertulit, nullo tamen uulnere illato, sed magno sanè terrore. Hoc affectu capiuntur (ut Auicenna est auctor) etiam muli, qui suis aliquando moribus dominos, & stabularios rabidos, & ueluti

canes quibus  
causis rabie  
exagitantur.

Animalia  
alia rabie ten-  
entur.



ti arrepticios reddiderunt. Verum huiusmodi animalia non nisi raro, uel nunquam per se rabie tentantur; quando= quidem ferè semper id illis eueniat, cum à canibus, seu lupis, aut uulpibus rabidis mordentur. Cæterum (ut ipse Dio= scorides inquit) rabiosorum canum morsus infestum quicquam protinus non infligit, nisi, ut uulnus, dolorem. Sed ne= glecta curatione, demorsi aliquo post tempore rabidi fiunt, & aquam expauescunt. quod etiam fatetur Galenus li= bro de theriaca ad Pisonem, alijsq; in locis. Idcirco diligenter aduertant, qui à canibus mordentur, si aliqua sese of= ferant indicia, quibus conijci possit, canem, qui momorderit, rabie laborasse. Siquidem neglectis remedijs (ut modo diximus) in id discriminis demorsi adducitur, ut nullus subinde relinquatur salutis locus. Tradidere Oribasius, Pau= lus, Aetius, Auicenna, alijsq; probatissimi auctores, quod illitis per integram noctem contritis iuglandibus canum mor= sibus, & postmodum gallis, aut gallinis in escam exhibitis, gallinaceos ipsos sequenti die interire, si à rabido cane illa= tum fuerit uulnus. Sunt etiam qui asserant, si panis emanante è uulnere sanguine inficiatur, & cuicumque cani quan= tumuis famelico offeratur, canem non modo illum non mandere: sed nec olfacere quidem. Attamen his tantum expe= rimentis (meo cõsilio) non plane fidendum fuerit: quanquam ea à probatissimis prodantur auctoribus. quapropter alia indicia iam dicta diligenter fuerint perquirenda. Cum autem rabidorum canum morsus negliguntur, post aliquod temporis spatium demorsi præter morem cogitabundi fiunt, eaq; mente reuoluunt, quæ illis insueta sunt, quod iam ue= neni uis in cerebrum repens imaginatricem occupet facultatem. Si uero adhuc in longum protrahuntur nullis reme= dijs adiuti, ijs frequentius nocte interruptitur somnus, sapiusq; pauore expergiscuntur: exinde hominum, & dome= sticorum consortia uitant, & cum serino quodam aspectu secum submurmurant: solitudinem deligunt, lucem & can= dida omnia odere maxime, rubent quandoq; facie, ijsq; extremarum partium nerui conuelluntur: postremo eò deducuntur, ut aquam expauescant. Quod certissimum mortis, & inexpugnabilis ueneni præbet indicium. Proinde dice= bat Dioscorides ex ijs, qui hoc uitium senserint, neminem seruari posse. Allata itaq; in eorum conspectu aqua, cu= ius potu facile sanarentur, si tamen bibere possent, ingentissimis clamoribus, & canum latratu astantes terrent. Quod si diutius ante eos aqua ipsa dimittatur, tremunt, sudant, deficiunt animo, delirant, pauoreq; concutiuntur, ac si in i= gnem illico se proiciendos cernerent. Id uero accidit, quod melancholici effecti, corruptis, infectisq; inde animalibus facultatibus, recusant nifelli, metuntq; aquam, qua sola sanari possunt. Nec alia de causa id euenire censent medici, quam huius inexpugnabilis ueneni prauitate. Nam cum humorum omnium, & totius corporis dispositiones sibi similes reddi= derit, mouentur uniuersi corporis uires, irruuntq; contra id, quod sibi contrarium existimant, hoc est, contra ipsam aquam, si ea in medium afferatur. Quocirca Galenus libro de theriaca ad Pisonem, ita scribit. Non enim corpus duntaxat ipsis inarescit, & conuellitur interdum, febriq; acri intus uritur, sed animus etiam delirat, & grauissimæ ipsius affert symptoma. Quippe aqua timent, ac propter multam siccitatem humidi tenentur desiderio, & potu abstinent, quia mente alienati, id quod auxiliari possit, non considerant. Fugientes enim aquam, pauentesq; misera= rimo mortis genere intereunt. hætenus Galenus. Hæ itaq; rationabiles sunt causæ, quibus in aqua timorem deueniunt. Veruntamen quidam testantur, ut Aetius, Posidonius, & Rufus, id etiam accidere posse, quod rabidi canis imaginem uidere in aquis imaginentur, cuius speciem recolentes, protinus ingenti terrore corripuntur. quod quidem nimiam ob siccitatem perpetiuntur. Nam philosophus quidam (ut Aetius refert) morsus à cane rabido, & egregia animi uir= tute affectioni resistens, dum phantastici canis imago sibi obuersaretur in balneo (ea enim ipsi quoque quemadmo= dum & reliquis eodem morbo affectis apparebat) diu intra se meditatus, ecquid tandem inquit commune est cani cū balneo? quod effatus balneum intrauit, & imperterritus bibit, atq; ita morbum superauit, & incolumis euasit. Vnde postea in prouerbiū manauit, quid cani cum balneo. Refert Auicenna quod si quis à cane rabido demorsus, aqua Salutis indi=

40 timens in speculo respiciens, se ipsum cognouerit, huic salutis spem non deesse. Quod utiq; arguit hydrophobicis quo= cium.

50 que sanari posse, cum ueneni uis non adeo uniuersum occupauerit corpus, & cerebri facultates, ut omnino ratioci= natrix facultas ablata sit. Quamobrem mirum non est, si philosophus ille, cuius historiam refert Aetius, curatus eua= serit, cum manifestò appareat eius ratiocinatricem facultatem parum fuisse affecta. Ad hæc scribit Auicenna euenire interdum, ut à cane rabido demorsi quedam frusta carnis ingenti cum dolore mingant, quæ forma propè canes, paruulos referant: quod etiam ab alijs recentioribus accepimus, quin & ab ijs, qui huiusmodi catulos se minxisse fa= tentur. Cæterum cum hoc potius fabulosum, quam rationi consentaneum uideatur, atq; ab ipsa natura penitus alie= num, si qui id uerum esse rationibus, & auctoritatibus comprobatum uidere cupiunt, Gentilem Fulginatem consulant Auicennæ interpretem: item Conciliatorem differentia 179. Quandoquidem ex ijs nimirum intelligent, quo pacto hæc præter naturæ institutum quandoq; eueniant. Postremo asserit in hoc capite Dioscorides fateri aliquos Them=

60 sonem, cum amico aquam expauescenti morem gereret, & officium exhiberet, quadam naturarum concordia simi= lem contraxisse affectum. Sed id potius ego euenisse crediderim, quod Themison medicus amicum laborantem excitans di causa ad aquam, & cibum, secum manducasset, aut bibisset ex eodem sanè poculo, eius sortasse saliuam infecto, aut alio quouis modo oris spumam contigisse. Nam si, ut Galenus tradit libro sexto de locis affectis rabidorum canum saliuam, nuda corporis membra contingens, non aliter homines rabidos efficit, quam si demorderetur, quid mirum, si rabidi hominis saliuam id ipsum effecerit? Proinde eos admonet Auicenna, qui rabidorum curam agunt, ne eorundem ci= borum reliquias comedant. Nec paruipendat aliquis spumæ contactu infici posse homines: quippe quod duos uide= rim ego, qui spuma tantum perfusi, nullo quidem ex morsu accepto uulnere, rabiem contraxerunt. Legitur in Ari= stotele lib. viii. cap. xxi. de historia animalium, quod omnia animalia à cane rabido demorsa rabiunt, excepto homine. Quæ tamen sententia aperte falsa deprehenditur, ut millies experimento compertum est. Quamobrem po=

70 tius adducor, ut credam Aristotelis codicem eo in loco deprauatum esse, quam ut in clara, & omnibus cognita, ipsum Aristotelem ignorantia accusare uelim.



## Remedia demorforum à cane rabioso.

## Cap. XXXVII.

**RATIO** medendi duplex. una communis, qua utendum in omnes morsus, quos uirulentæ animantes impresserunt: alia peculiaris priuataque, eorum duntaxat quos rabiosi canes momorderint: quæ nonnullis quidem summam opem ferre consuevit: alijs uerò inutilis, maximè qui ex multo iam tempore istum acceperunt. Quæ ad hanc pertinent, primùm exponemus, deinde cursim perstringemus, quæ ad communem medendi rationem pertinent. Cancros itaque fluuiatiles in sarmentis albæ uitis cremare oportet, & cinerem eorum, quàm minutissimè tritum habere reconditum: itidem gentianæ radicem tusam, cribratamq; reponere. Quoties autem canis rabiosus morsum intulerit, in quaternos cyathos meraci uini, bina cineris cancrorū cochlearia, unumq; gentianæ coniiciantur: hæc in polentæ dilutioris modum subacta, quatrinduo bibantur. Inter principia medicamentum hoc modo detur. Atqui si ab illato morsu bini terniue dies fluxerint, curatio nē auspicabimur à triplicato pondere, supra id quod ab initio retulimus. Optimum hoc aduersus rabiosorum morsus auxilium, quod & plerisque unum satisfecit, eoq; cum fiducia uti licet. Sed ut alijs etiānum auxiliis contra inuitabile periculum muniamur, nihil cæteris uti prohibet. Satius autem multò fuerit, etiamsi in uanum recidat, medicamentorum inhumanos tolerare cruciatus, quàm per inertiam, ac desidiam in discrimen adduci. Nec ita in demorsis à rabioso animali maiora uulnera uereri oportet, uti minoræ, & ulcusculis cutis similia: quippe maiori uulnere confertim copiosus sanguis emanans, potest nonnihil uirulenti liquoris exhaurire: quod in minoribus non accidit. quin à maioribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scalpelli circumscribere, & prehensam hamulo aut uulsella carnem amputare oportet. In utrisq; circumstantia loca altioribus ulcusculis scarificanda, ut copiosior sanguinis uacuatio arceat, ne uenenum membratim insinuetur. Cucurbitulæ cum multa flamma agglutinata id iuuamenti præstant, ut ueneni uis extrahatur.

Curatio demorforum à cane rabioso.

**TAM** accuratè exquisteq; tradidit hoc capite Dioscorides rabidi canis curationem, nihil planè silentio prætereans, ut mihi superuacuum esse uideatur quicquam addere. Verùm ut nostrum sequamur institutū, utq; etiānum lectoribus fiat satis, qui nouis semper rebus inhiant, non alienum fuerit hic nonnulla commemorare, quæ multos fortasse delectabunt, quòd ea in hac re non inuilia, neq; scitu iniucunda putem. In primis itaq; illud animaduertendū est, quòd alia utiq; ratione cæcorum fluuiatilium cinerem præparabat Galenus, quàm Dioscorides, ut constat apertè ex uerbis ipsius Galeni lib. xi. simp. medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit. At fluuiatilium cancrorum cinis, quam similiter prædictis exiccatorius est, substantiæ tamen totius proprietate, mirificè contra rabiosorum morsorū efficax est, isq; tum solus, tum cum gentiana & thure multò præstantior. Thuris sane partē esse unam oportet, quinque autem gentianæ, porro cancrorum decem. Et rarò equidem aliter illis uestis nos sumus usi: cæterum ad eum modum plerumque, quo utebatur Aescrion empiricus, medicamentorum peritissimus senex, conciuus, ac præceptor meus. Patella erat æris rubri, in quam impositos cancros uiuentes, hætenus urebat, donec in cinerem redigerentur, ut faciliè ad leuorem redigi possent. Hic Aescrion sic paratum promptum semper in ædibus hoc habebat medicamen, tēpore æstiuo urens cancros ipsos post ortum Canis, quando sol in Leonem transisset, luna decima octaua. Porro bibendum hoc medicamen ijs, qui à cane rabido fuissent morsti, præbebat quotidie usque ad diem quadragesimum mensura cochlearij satis magni, aquæ inspersum. At si non protinus ab initio, uerùm aliquot post dies à morsu curam coepisset demorsus, tunc quotidie duo cochlearia aquæ inspergebat. Ad ipsum uerò uulnus emplasticum applicabat medicamentum, quod ex pice brutia, & opopanace, acetoq; conficitur, habens picis libram unam, unum aceti acerrimi sextarium Italicum, opopanacis uerò uncias tres. hæc Galenus. Cæterum sciendum est, eos maximè, meo iudicio, hallucinari (ut latius libro secundo prodidimus) qui gammaros Latinis uocatos, cancrorum fluuiatilium loco, à cane rabido demorsis potui exhibent. Nanque aliud Græcis animal esse censemus *καρίον*, aliud uerò *καμπαρίδα*. Scripsit & Damocrates carminibus huiusce cancrorum antidoti componendi rationem (ut libro secundo de antidotis refert Galenus) eo saue modo, quo ipsum fortasse secutus eam reddit Dioscorides. Attamen antiquorum quidam resnam terebinthinam imposuerunt thuris uice, quod Aescrion Galeni præceptor huic semper inseruit medicamento. In summa huius antidoti uires miris laudibus ab auctoribus celebrantur, adeò ut scripserit Galenus, neminem unquam mortuum esse, qui hoc antidoto rectè fuerit usus. His non dissimiles uires ueteres assignant Abyssò, si siccum quadraginta diebus continuis detur ex hydromelite potandum: sed à prima statim die incipiendum erit. Huius experimenti meminit Galenus libro secundo de antidotis, ubi alia quoq; ualentiora remedia ad rabidorū morsus ex Asclepiade retulit. Verùm nobis difficile admodum fuerit decernere, quænam hodie planta sit, quæ ueterum Abysson representet, ita ut potius de hoc diuinaudum esset, quàm aliquid certi statuendum, ut latius superius libro tertio disseruimus. Commendauit Aetius secundo, & sexto uolumine, ad morsus rabidorum canum bitumen Iudaicum, sive Asphaltitis lacus, asserens si drachmæ pondere ex aqua bibatur, non id modò aquæ pauorem arcere; sed & eos sanare, quos iam primùm timor inuaserit. Memorauit etiam marinos hippocampos ex aceto nigro & melle subactos, tam potu haustos, quàm uulneri illitos. Confert præterea his maximè acutus runnex; quare idem scripsit se nouisse senem quendam, qui demorsos à cane rabido hoc solo runnice curabat. Primò enim ulcus eius decocto fovebat: deinde herbam ipsam illinebat, eandemq; potandam exhibebat. quod quidem medicamentum tanquam efficacissimum summopere

Multorum error.

Curatio ex Actio.



summo opere commendabat. Plurima autem, & turbulenta qui illam assumpserint, mingere solent: id quod maxime hac in curatione confert. Quo fortasse argumento extulit Anicenna propria quædam medicamenta, quæ cantharidas admixtas habent, ut ualentissimè non modò urinam excernerent denorsu; sed etiam sanguinem ipsum, asserens paulò post securu esse salutis indicium, cum post medicamenta sanguinem mingunt affecti. Porro Galenus libro de theriaca ad Pisonem, theriacam præfert tam intus in corpus sumptam, quàm exterius supra morsus illitam. Sed cum hæc quæ nostro tempore conficitur, non adeò præstet, quemadmodum ea, quam ipse conficiebat Galenus, illi sanè fidere non possumus, nisi factò prius de ea periculo in gallis à uipera demorsis, ut ipse docet Galenus. Prodest item potumogetum cum sale exterius illitum: itidem caprisici cortex contusus, & ex aqua potus: quin & absinthium, & allium minus centaurium, aristolochia, artemisia, scordium, chamædrys, bryonia, pulegium, & laser, tam exterius illita, quàm interius sumpta. Sunt qui credant securissimum esse remedium ipsius rabidi canis, qui momorderit, iecur totum, & à demorsis in cibis deuoratum. quod etiam scribit Dioscorides: quamuis id non affirmauerit, ut libro secundo capite de diuersorum animalium iecinoribus legitur. Proinde scribit Galenus libro xi. simplicium medicamento- rum, iecur canis rabientis alijs ualentioribus antidotis admixtum quàm plurimos sanasse, sed eos tamen interiisse, qui solum nullis alijs adiectis medicamentis illud estarunt. Sunt etiamnum qui credant, ut loco antè citato tradit Dioscorides, arceri aquæ pauores dente eo, qui caninus dicitur, si is à cane, qui momorderit, exemptus, & folliculo inditus, pro amuleto brachio adnectatur. Sed nemini his fidendum esse persuaserim, ut in nostra huius sexti libri præfatione de pretiosorum lapillorum suspensione diximus: satius enim esse semper existimaui certis ac tutis uti medicamentis. Ceterum curationis summa manuum maxime operam exposcit. Quandoquidem uulnus diducere oportet, laniatq; per ambitum carnem rescindere: ita enim latior sit ueneni exterius euocandi aditus, demitur quod tabefactum est, & ex sanguinis fluore ab excidentibus cultris excitato, repens affectio non parum reuellitur. Quod etiam facere expedit scalpello circunquaq; profundius adacto, & subinde appositis scalpto loco cucurbitulis sanguinem fortiter extrahentibus, aut hirudinibus. Medicamenta autem, quæ aluum citant, & humores deiciunt, in principio omnino uitanda sunt, sicuti etiam sanguinis missio. quippe cum hæc à circumferentijs ad centrum trahendi facultatem habeant, faciliè ægros in mortis traherent discrimen. Tametsi in curationis processu, & ubi præsertim medicorum negligentia citius quàm expetat ratio conclusum fuerit uulnus, irrepsitq; uenenum (ut postea dicitur) medicamenta aluum ducentia, pariterq; sanguinis missio in sanguineis temperaturis admodum quandoq; proficiant. Verum enim uero perniciosa nostra hæc ætate habentur à rabioso cane demorsu, qui medicos consulant. Nam tanta est religionis uis, ut omnes, quos canes rabiosi momorderint, partim ad diui Donini templum confugiant, partim uerò ad diui Bellini sacellum, ubi quibusdam exorcismis, & panibus characteribus obsignatis à sacerdotibus perquam faciliè curantur, ut plurimum testimonio equidem fateri possum. Sed cogitanti mihi quonam pacto hoc tam faciliè eueniat, nonnullæ sese obtulerunt rationes, quas liberè dicam. Haud dubie in primis diuina auxiliatur gratia: quippe cum non parum molestiæ maliq; morsu canis rabiosi affectis inferre possint cacodæmones, ut qui in atrabiliarijs humoribus suam habeant sedem, ij quidem exorcismis cedentes abeunt, & afflictorum corpora munda relinquunt, sublato secum ueneno. Illud præterea addiderim, quòd fortasse sacerdotes ipsi aliquod nobis occultum habent antidotum, quòd panibus illis admiscentes, ægris deuorandum: uel id aliquo in potu bibendum exhibent. His deniq; accedit magna laborantium fides, quàm suscipit Deus optimus maximus, cuius solius munere omnia nostra delentur incommoda, atque omnes auferuntur ægritudines.

Remedia suspensa.

Auxilium religiosum.

## Vstio demorsorum à cane Rabioso.

## Cap. XXXVIII.

CONTRA virulentos ictus, vstio expeditissimum est auxilium, utpote cum ignis cætera viribus præstet, simul quòd virus domet, & ferri penitus non patitur: simul quòd pars ignem experita, postea non vulgare fundamentum curationi futuræ præbeat, manente diutius exulceratione. Animaduertendum ex eo tempore, cum crustæ decident, ne vlceris oræ coalescant, & cicatrice indurantur, sed si fieri potest ad multum, idque præstitutum tempus, vlcerationes, & sordidas adhuc & inflammationem minantes prorogari conuenit. Quod inditum ijs salsamentum optimè præstabit, & syluestre allium deritum, item cepæ, succusve, præsertim Cyrenaicus, aut qui Medicus, aut Parthicus appellatur. Tritici grana tam mansa, quàm non mansa imponantur: siquidem subacta pistæve à perfusione vulnera dilatant. Sunt qui à mandentium ieiunio, sibi aliquid asciscere arbitrentur, quod si apte natura resistat: verum id certum non est. cæterum tempestiuus eorum usus minimè est commendendus. Si verò, quod sæpe accidit, ante dies præfinitos cicatrices coirent, committerenturq; manum postulabunt: nanque eas diducere, carnemque scalpello circinare, aut iterum inurere expedit. Vbi uerò propositum tempus præterijt, vlcus ad cicatricem ducendum, & emplastro, quod è salibus conficitur, locus comprehendendus: nec multò post sinapismo vtendum.

CAUTERIVM, quod ferro igne candenti, aut auro, aut argento fit, non modò salutiferum est ad rabidi canis morsum; sed etiam aliorum quoruncunq; animalium uirus ei aculantium, quin & ad alios insanabiles fere morbos. Proinde mirum non est, quòd hoc loco dixerit Dioscorides ustionem, siue cauterium contra uirulentos ictus aut morsus expeditissimum est auxilium. Fiat itaq; cauterium intrepidè, tantæq; amplitudinis, ut vlceris cicatrices breui committi non possint. Quòd si timidus quispiam ustionem ignis terrore recuset, septicis & exulcerantibus medicamentis

Vstionis, siue cauterii utilitas.

Sf utendum



Præcipit  
vocat uis.

utendum erit. Quæ in re cæteris præstat, quod uocant argentum sublimatum. admiscetur id unguentis refrigeranti-  
bus, ut minus doloris inferat. Probatum hoc, quod non modo ualentissime inurat; sed quod etiam exusta ab eo caro,  
obductaq; crusta duobus tantum diebus post decadat, si tamen recenti butyro assidue illinatur. id quod in aliorum exu-  
sione non euenit, nisi largiore temporis tractu. Quod si igne, aut adurenti medicamento (ut multis de causis quan-  
doq; accidit) id effici nequeant, diligenter prouidendum est, ne uulnus coeat, sed diutius maneat diductum & apertum  
superimpositis emplastris ualide attrahentibus, cuiusmodi sunt quæ è brutia pice, resinis, uario gummi genere, &  
id genus alijs parantur. Si uero cauteria fiant, diligenter procurandum, ut relicta quam primum excidat crusta, quod  
ueneno pateat exitus. quippe ea diu in uulnere retenta, omnes obducit meatus magno ægroyum detrimento. Porro  
non magno equidem negotio decideret apposta continuè liquida uernice oui uittello, & recenti butyro permista: quin  
& butyro solo igni liquato, & madefactis in eo splenijs superimposito: præstat enim hoc cæteris. Vbi uero è  
uulnere crusta deciderit, salutiferum quidem fuerit remedium plagæ quotidie puluerem præcipitati (sic enim uocant  
chymistæ argentum uiuum in puluerem rubicundum conflatum) inspergere: siquidem id eximum præstantissimumq;  
medicamentum, præter id quod uulnus occludi prohibet, diuq; patens seruat, attrahit etiānum ex alto ad superfi-  
ciem potenter uenenum. Quæ in re cætera huiusce facultatis præcellit medicamenta. Commode etiam, nec minus  
efficaciter idem puluis attractorijs emplastris sine unguentis admisceri, & subinde uulneri admoeri potest. etenim  
sandum certior sum, in uniuersa medicæ facultatis materia, nullum haberi medicamentum, quod ualentius ab alto  
reuocet extrahatq; uirus, quam præcitatum dictum. Ad hæc tametsi (ut omnibus ferè placet) in quadragesimum  
diem apertum uulnus dimittere sit satis; non tamen errauerit, qui diutius prorogauerit, ut quicquid mali residuum  
fuerit, exhauriatur.

### Ratio victus in morsu Rabiosi canis.

### Cap. XXXIX.

Quæ ad partem istam pertinent præsidia, ita se habent. Cæterum uictus rationem ex ijs,  
quæ ueneno aduersantur, coniectura quadam colligere oportet, simul ut ueneni vires hebetet restin-  
guatq; simul ut arceat, quod minus ad intima perniciēs illabatur. Etenim assumpta perniciosarum  
virium penetrationi resistunt. Quorum utrunque præstare potest uini meracioris, passi, & lactis po-  
tus, quippe qui hæc omnia capiunt ad curam, nonnihil ueneno obijciunt, quod omnem eius acrimo-  
niam obtundat. Simili modo aliorum, porrorum, ceparumq; cibis: quod ea difficulter confician-  
tur, vixq; aboleantur. Nam multos dies huius cibi qualitates remanent, quo tempore nec euincun-  
tur, nec permutantur à mortifera vi, sed contrarijs illa vis expugnatur. Cui rei antidotum usus ac-  
commodatur, & theriacæ, Mithridatij, & eius quod eupatorio temperatur, deniq; omnium quæ ma-  
gnam aromatum partem sibi vendicant. quippe aromata omnia viribus & substantijs ægrè permu-  
tantur: quare in corporibus euincunt. Victus ratio hoc modo se habet. Nosse conuenit, pauorem  
aquæ non statim, definitoq; tempore exoriri: plurimum tamen ad quadragesimum usque diem ne-  
glectis differri consuevit: post semestre etiam nonnullos inuadit: quendam post annum aquam hor-  
ruisse constat. quæ nobis visu comperta fuere. Narrant & aliquos post septennium aquæ metu fuisse  
tentatos. Inter principia demorforum à cane rabioso curandi ratio talis est. Verum enimvero si ea  
quæ retulimus auxilia, primis diebus prætermissa fuerint, nec scalprio carnem circinare, nec uisionem  
experiri operepretium est. non enim quod pertransit, satis euocare possent. Nulla utiq; istius rei oc-  
cassio aut utilitas, sed incassum corpora doloribus sternentur. Alter uero curationis modus accedat.  
Deiectio magnum præbet iuuamentum, utpote cum mouendo, corporis habitum transmutet: & quæ  
colocyntidem recipit hiera. item lac schistum, quod simul deiectionem moueat, & uenenum doma-  
re possit. cibi acres, & meraculi potus, quibus uis ueneni vehementer retunditur, quotidie sumi de-  
bent. Cæterum sudores ante cibos, & post etiam ciendi. Dropacismi sinapismi; alternatim per cor-  
pus totum adijciendi. Sed longè omnium efficacissimum auxilium helleborismus cognoscitur: quo  
cum fiducia non semel atque iterum, sed frequentius ante quadragesimum diem, vel post hoc tempus  
uti licet. Tantam enim uolentiam hoc auxilium habere fertur, ut quidam qui iam aquæ metum  
sentirent, sumpto helleboro, simul ac primum morbi impetum experirentur, fuerint seruati. nam &  
iam vitio tentatos nemo vnquam seruare potest. Itaque primum curam contra rabiosi canis morsus  
breui sermone exposuimus. iam ad alia, quæ uenenatis morsibus sequi consueuerunt, transeundum.  
Notas vno contextu, deinde communem in edendi locum, qui omnibus conuenire possit, explicabi-  
mus. Cursim deinceps subiungemus ea, quæ sua proprietate nonnullis auxilium præstare possunt.  
Postremò subnectentur etiam uenenata, quæ nullis cedunt remedijs.

Ratio victus  
demorforum à ca-  
ne rabioso in-  
stituenda.

INSTITVENDA demorforum à cane rabioso diligenter est ratio uictus, nec ea tantum regula, cuius hic memi-  
nit Dioscorides; sed etiam ut ea sit ciborum quantitas, quæ ijs rectè conueniat. Siquidem huiusce curationis regimen  
tenuem uictum non expedit, sicuti nec plenior, ut Aetius est auctor libro vi. ubi sic inquit. In uictu indigentia, &  
satietas euitanda, magis tamen indigentia: hæc enim succorum prauitatem adauget, quod nequaquam expedit malefi-  
co ulcetri. Ergo alimentum moderari oportet, ut & rectè conficiatur, & optimum succum corpori præbeat. Nec  
minus egestionem, & urinarum prouocationem studendum. quod quidem tum ea, quæ prædiximus, tum fœniculum, &  
scandix



scandix comesta efficiunt. Plus uerò simul & aluum, & urinam ducit, ac cichorium agreste crudum oblatum stomacho confert, quem nonnulli serin, nonnulli ab amaritudine picrim appellant. Prosumt & brassicæ cimæ, & palustris asparagus, & hortenſis, & agrestis rumex: & è piscibus qui carnem teneram habent, & canumari, cancri, & erinacei recentes cum uino mulso: & carniū extremitates, auiculæq; omnes montanæ, quæ facillè coquuntur, boni q; sunt succi. Vinum album tenue, neq; ualde antiquum. hæc ille, Ex quibus conijci potest, hæc in curatione ea plurimum conferre, quæ urinam ualenter mouent. Idcirco Auicenna (ut proxima commentatione diximus) quædam profert medicamenta, quæ cantbaridas excipiunt, ut unâ cum lotio sanguis etiam reddatur. Proinde mirum non est, si quandoq; præualens natura, per instrumentum urinae, magno cum dolore parua ueluti liquidæ carnis frusta catulorum formæ, uenenum propellat. His itaq; ea uictus ratione uti licebit, quæ urinam ægrè excernentibus à medicis institui solet. Verum si fluuiatiles cancri, quibus uniuersa abundat Hetruria, haberi poterunt, ijs tam in prandio, quam in cœna uescantur demorſi: quòd ijs mira insit facultas, aduersus rabidorum canum uenenum. Præbet Auicenna præter dulce uinum etiam aquam, in qua candens ferrum, uel chalybs reſtincta fuerint. Cæterum nosse conuenit (ut scribit Dioscorides) aquæ pauorem non statò definitòq; tempore exoriri: plurimum tamen ad quadragesimum usq; diem neglectis differri consuevit: post semestre etiam nonnullos inuadit: quendam post annum aquam horruisse constat. quæ nobis uisū comperta fuisse. Narrant & aliquos post septennium aquæ metu fuisse tentatos. Sed cogitanti mihi unde id eueniat, nulla sanè alia hætenus sese obtulit ratio, quàm quæ ex demorſorum temperamento, ac uiribus sumi potest. Quandoquidem nonnulli habentur, qui uiribus ualidissimis præstant: quidam qui debiles, & infirmi sunt: alij qui corporis meatus angustissimos habent, alij uerò contrà: quidam syncerissimis reſerti sunt humoribus, nonnulli uerò succis ichoribus scatentibus, ac facillè putredini obnoxij. Ex quo fit, ut in his citius, in illis uerò serius hæc appareant symptomata. In Hetruria abstinent demorſi per integrum annū à quorundam lignorum contactu, præsertim corni arboris, & sanguinæ uirgæ uocatae. Siquidem (ut testantur ij, qui rem experimento compertam habent) si harum arborum uirgæ tandiu manibus teneantur, quousq; concaleſcant, illico demorſi rabie exagitantur. Quod cuiquam minime fabulosum uideri debet: etenim memini me uidisse in ciuitate nostra Illicinensi amicū quendam meū rabie correptum, quòd corni arboris uirgis (dabat enim lanificio operam) lanam diu excussisset, qui eorum oblitus, quibus sibi à medicis interdictum erat, rabidus interijt. Postremò sciendum est, aquæ pauorem haudquaquam curari posse, cum ueneni uis omnes corporis occupauerit facultates: quanuis in ipso pauoris initio, aut anteaquam uenenum illapsum fuerit in uniuersum corpus, aliqui curati euaserint, ut philosophus ille, cuius historiam superius enarrauimus. præsertim cum pro uiribus in morbum nituntur malè affecti, & qui eorum curationem agunt: His ad stipulari uidetur Dioscorides: quippe qui quosdam asserit, qui iam aquæ metum sentiebant, sumpto cum fiducia helleborismo non semel atque iterum, sed frequentius ante quadragesimum diem uel post, fuisse seruatos. Proinde scribit Auicenna eos, qui aquam expauescunt, deploratos non esse, quousq; in speculo intuentes se ipsos cognoscunt, arguameto quòd non adhuc uenenum uniuersas infecerit cerebri facultates. Hoc igitur tempore medicamentis utendum est deiectionijs, & si nihil obſtet, sanguinis missio non aspernanda. Ex medicamentis autem in hoc cæteris præstat album uel nigrum ueratrum, ijs adiectis, quæ eorum infranant feruorem. Conuenit etiam epithymum, ſena, fumaria, myrobalana, elaterium, agaricum, rhabarbarum, centaurium minus, genistæ semen, thapsia, confectio Amech, & hiera colocyntidis, & Armenius lapis: siquidem hæc in atra bile deiicienda principem tenent locum. Proderit item Syriacum bitumen frequentius ex aqua potum: quin & Mithridatis antidotum, & ipsa theriaca, & cancrorū fluuiatiliū combustorum puluis, Galeni modo paratus. Confert præterea his leporis, uulpis, & capreoli coagulini. Sed semper in primis omni studio curandum, ut aquam malè affecti bibant. Verum ne ipsam intuentes pauor inuadat, longigissimis tenuibusq; metallicis fistulis è longinquo ducenda erit, aut ex superioribus contabulamentis: nanq; ipsa sola seruari poterunt. Refert Aetius, quòd si catuli coagulum ex aceto semel tantum ederint hydrophobici, statim eos capit potus aquæ cupiditas, & bibunt: ob idq; medicamentum hoc miris laudibus extulit. Sunt qui nigrum cicer aquæ incoquendum esse uelint: sic enim aqua claritatem amittit, nigraq; efficitur: & præter id quòd haurientibus pauor non adfert, quemadmodum quæ syncera, pellucidaq; spectatur, urinam ualenter ducit. Nec desunt qui suadeant urentia cataplasmata occipiti esse apponenda, pariterq; post aures. Quæ etsi ad rem facere non uideantur, quòd ualentissimè exiccent; ubi tamen deplorati sunt ægri, ualentissimis etiam medicamentis uti licebit.

Aquæ pauor  
ad quod usq;  
tēpus exoriat-  
tur.

Aquæ pauor  
quādo, & qui-  
bus curetur.

## Communis curatio in omnes ictus virulentos.

## Cap. XL.

ADVERSUS quidem omnem animalis ictum, quod uenenum vibrat, oris ſuctio conuenit. Sugentem uerò oportet ieiunum non esse, sed & cibum sumpsisse, & uino os abluisse: postea exiguum olei in ore continens plagam exugat. Locus ipse spongia fouendus, deinde scarificandus: sed vlculum altius imprimere expedit, quòd viroſa materies profundo euocetur. Circinatio autem carnis, & sectio, scarificatione longè potentius opitulantur: nanq; ab ijs duo peculiaria præſidia fiunt. vnum, quòd virus è loco tollitur: alterum, quòd eius ueneni pars, quæ ad interiora grassatur, cum multo copiosoq; sanguine excernitur. Quòd si locus sectionem non admittat, cucurbitulae cum largiori flamma adſigendæ sunt. Sed iam de ſtione ſuprà in rabioſorum morſu diſcruimus. Si uerò icta pars, utpote extrema, eam sectionem commodè non reſpuat, præſertim in omnibus ſerpentium ictibus, ut aspidis, cerastæ, ſimiliumq; procul dubio amputanda est. Conuenientiora ſuprà dictis auxilia ſunt, quæ epithemata vocant. Imponatur ſarmentitijs cinis, aut ficulneus, cum lixiuio ſtillatitio



subactus, garo, & acri fassamento: porri, cepæ, & allia modò minutissimè contrita illinuntur, modò cremata vulneribus injiciuntur. Quinetiam dissecti gallinarum pulli, cum maximè tepent, percusso loco applicentur. Nec desunt qui hisce tanquam discordia quadam naturali pugnantibus vtantur: verùm huius rationem inire facillimum fuerit. Gallinæ enim calida natura præditæ sunt, argumeto, quòd deuoratum insigne uirus conficiunt, & aridissima quæque semina consumunt: item nonnunquam arenas lapillosque ingluuie sua deuoratos, dissoluunt. Itaque animantis admoti calore adiutus spiritus, ab ista parte impetum capeffens exiliensque secum venenum exigit. Nec me fugit, quid in Aegypto fieri soleat. Cum spicas Aegyptij metunt, ollam picis paratam habent, & appensam fasciam: tunc enim maximè serpentium iniurias expanseunt, tum propter spicilegij tempus, tum quòd opacis simul abditæ speluncis, & cauernis, densoque aruorum cespite delitefcunt. Molestissima enim animalia & virus eructantia, Aegyptus in campis ferre consuevit. Vbi ergo aut in pedem, aut partem aliam, morsum intulerunt, qui adsunt, fasciam in ollam picis conijciunt, & semel aut iterum brachium aut crus paulum supra vulnus obligant, & arctissimè duo è præsentibus dstringunt, locumque secantes qua circumactus est laqueus, picem instillant: cumque satis vulnus excepisse videtur, laqueum resoluunt, & cepis alijsque supra memoratis illinunt. Præterea pix liquida cum sale trito & feruente illita, præsentaneo est auxilio, si iugiter innouetur. Conuenit & cædria, & simum caprarum ex uino decoctum. Locum aceto calido, calamintha in lotio, maris aqua, aut acida muria decocta, foueri salutare est. Quinetiam non desunt emplastra vehementissima, & calidissima, quæ venenum elicere, expugnare, & discutere possunt. Cuiusmodi sunt quæ ex sale, aut nitro, sinapi, & cachrye componuntur, de quibus consequenter erit tractandum. Erasistratus autem non iniusta reprehensione eos incesit, qui incognitas ad hunc usum facultates conscripserunt, vt elephantis fel, crocodilivæ sanguinem, ouaque testudinis, & consimilia. Nam cum iuuantia quædam literis tradidisse videntur, planè in hæc sola incidentibus imposuerunt. Quare talia deuitanda sunt, cum difficilè, nisi regia facultate, peruestigari possint: neque, quòd nostra fides ijs obstringatur, frequenti obseruatione, sufficiens experimentum præstiterint. Quæ autem ad communem omnium usum pertinent, quæque facillè suppeditari, & omnibus à serpente percussis auxilium ferre queunt, subiungenda videntur. Intubus itaque, & erica, & astragalus, cum aceto pota, contra omnes serpentium morsus auxiliantur. Item bitumen, & virentes platani pilulæ in vino diluto coctæ, & paliuri decoctum: radix aristolochiæ, & eryngij: decoctæ etiam lauri bacce, & deuoratæ, piperque largius esitatum, ruta, anethum, & cyclaminus: coma porrorum priuatim ex pane, aut alium, aut cepe, fassamentaque quàm accerrima: origani decoctum cum vino potum, sceniculi, pulegij, calaminthæ, porrorumque succus cum melle desorptus. hæc quidem à plantis conquiruntur. Ab animalibus verò quædam vtiliter peti solent, gallinaceorum cerebella in cibo, leporinum coagulum cum uino, itidem castorei sextans: testes marinæ testudinis sumpti multum prodesse traduntur: mustela sale inueterata inter auxiliaria medicamenta est. Commendatur in primis exenterata, quæ sale siccescens inueteratur: ex qua binas drachmas cum vino bibisse satis. Sed de simplicibus, quæ dari solent, hæcenus. Percussis à serpente prodest alui deiectio, disfluens sudor, vrina copiosè reddita. Sunt & compositæ quædam potiones, quæ mira remedia polliceri traduntur, vt & opij & myrrhæ singuli oboli, piperis sicilicum: ea melle excipiuntur, & instar Aegyptiæ fabæ dantur cum vino. Itidem syluestris rutæ seminis, gith, cumini Aethiopici, aristolochiæ, galbani, singulorum partes portiones trite, & cum eruce succo subactæ, digeruntur in paltillos, qui drachmæ pondus equent: dantur ex ijs terni cyathi cum uino. Hæc habui de communibus auxilijs quæ dicerem. De peculiaribus remedijs contra bestias, quæ venena vibrant, consequenter est dicendum.

Ordinis Dioscoridis inueneri ratio.

**VENENOSORVM** animalium ictus, morsusque doctrinam, curandi que rationem, duabus sectionibus tradidit Dioscorides. In quarum altera cuiuscunque ictus indicia exposuit: in altera uero curationes diligentissimè conscripsit. Ceterum præfationem hanc illi sectioni præposuit, quæ curandi rationem docet: in qua præfatione omnium uirulentorum ictuum curationem in uniuersum profecutus est. Verùm quoniam (ut superius diximus in commentatione, quam in caput xxxv. huius libri conscripsimus) rati sumus illud non parum legenti negotium faceffere, quòd ex diuersis locis indicia, & curationes conquirantur, ut id molestiæ quisque effugeret, utque citius commodiusque nulla temporis iactura omnia in unum redacta haberentur, ubi prius illa in duobus locis legebantur, nos omnia in unum locum congestimus, atque ex duobus capitibus unum tantum fecimus, singulis uirulentorum ictibus sua peculiaria remedia subiicientes. Hanc uero Dioscoridis præfationem præfiximus, in qua tametsi adeò exactè doctæque tradiderit is uniuersalem uirulentorum omnium animalium ictibus medendi methodum, ut nihil planè addi possit; tamen ne ab instituto nostro defecisse uideamur, in eorum gratiam, qui semper plura proferri expectant, uonnulla modò differam, quæ, ut arbitror, non inutilia, neque scitu inuicunda erunt. Dicam itaque, primum animalium, ferarumque uirus, non in omnibus esse idem, sed in hoc uehementissimum, & oninium perniciosissimum, adeò ut una tantum hora hominem conficiat, ut in aspidæ, cerastæ, & basilisco: in alio uero minus uehemens minusque lethale, uno uel duobus diebus interimens, ut in uiperæ: in alio denique his longè inbecillius, ut in scorpione, & phalangio, longiore tempore necans. Verùm quanquam id plerumque euenit, quòd animalia quæ mordent, uel icunt, diuersorum sint generum, & proinde diuersa etiam eorum uenena; accidit tamen, ut ab aspidæ, uel uiperæ demorfi quandoque tribus tantum horis, interdum uno duntaxat die, nonnun-

Venenorū diuersi gradus, & effectus.



nonnunquam pluribus diebus superuiuant, Quod à diuersis causis prouenit: siquidem in aspidum, & uiperarum genere longè perniciosiores sunt foemina quàm mares, inuenes quàm senes (quanuis non desint, qui contrarium putent) adultæ quàm adolescentes. Quinetiam fere omnes, & insecta in montibus, & aridis locis inter uepres, & saxa degentes, ijs citius hominè perdunt, quàm quæ palustres, uliginososq; tractus incolunt. Citius præterea necant, quæ oriẽtalem, & meridionalem inhabitant plagam, quàm quæ septentrionalem. Ad hæc famelicæ depastis nocetiores sunt, & irritata uenenosiores sunt, quàm dimissæ. quanuis omnium in uniuersum ictus perniciosiores sint æstate, quàm hyeme. Hæ itaq; causæ esse possunt, cur citius, uel serius demorsu intereant. Id tamen etiam plerunq; fit ex fortiori, uel imbecilliori demorsorum temperamento, aut uasorum latitudine, uel angustia. quandoquidem (ut superius pluribus in locis diximus) ueneno non tam facilis patebit aditus, ubi uasa suapte natura angusta fuerint, quàm ubi latiora.

Cæterum errant, Auicennæ testimonio, qui serpentium uenenum frigidum esse statuunt, quod ab ijs demorsu illico frigidi fiant, quodq; serpentes ipsi, ut frigoris impatientes, appetente hyeme in subterraneis cauernis latitent, uel sub lapidibus, sub quibus priuatim se condunt uipere, ubi nonnunquam adeo frigore correptæ reperiuntur, ut stupide & immobiles reddita, tanquam congelatæ persistant. Frigiditas enim toti corpori ex ictu uel morsu adueniens, non utiq; euenit ex ueneni frigiditate; sed quod inuatus calor ab extremis, & ultimis corporis partibus ad cor se confert, quodq; etiam ueneno superetur, & extinguatur. Nec eo argumento frigidi temperamento serpentes sunt iudicandi, quod scilicet hyeme immobiles, & fere examines suis in cauernis reperiuntur. quippe nulla alia de causa de illis accidit, quàm quod eorum natura, quæ calidissima est, id maxime refugiat, quod sibi contrarium sentit. Visitur hoc pariter in piscibus, qui cum frigidi natura sint, quàm primum ex aqua extrahuntur, aeris calore necantur. Quin & uespæ, quæ temperamento calidæ sunt, & siccæ, eadem ratione hyeme conficiuntur, nisi calidissimis recondantur locis. Sed iam ictuum, uel morsuum uirulentorum curationem aggrediamur. In qua Dioscoridem, Paulum, Aetium, & alios æterni nominis scriptores imitati, dicimus efficacissimum esse remedium, morsu uel ictu illatum uulnus continuè ore sugere (sugentem tamen prius præparatum esse oportet) & subinde uenenum, uel uenuatam sanguinem expuere. Veruntamen id opus, meo quidem iudicio, perfici non potest, absq; magno sugentis discrimine. Nam si in aliqua oris parte, aut gingiuarum, linguæ, palatiq; ulcusculum aliquod fuerit, quanquam adeo insensibile, ut cutim tantum occupet, ubi uenenum in os suctione reuocatum ulceris locum contigerit, & sanguini se admiscuerit, qui fortis suctione facile è gingiuis per dentium connexus manat, dubitandum non est, quin illico sugenti perniciem inferat: itaq; fiat, ut qui alteri mederi uelit, sibi ipsi necem pareat. Quin nec minus periculi immineret, si uenenatæ saluæ tantum illam in stomachum descenderet. Neq; temerè hæc dicimus. etenim iam nos uidimus (ut superius in nostra in primâ, & uniuersalem huius libri præfationem commentatione retulimus) rusticum, qui cum foenum quodam in prato secaret, fortè fortuna falce median secuit uiperam: & cum à trunco, quem manu imprudens sustulerat, in digito morsus esset, os uulnere statim admouit, & uenenatum exuxit sanguinem. quo facto repente mortuus concidit. Proinde scite admouet Aetius, ut caueant, qui sugunt, ne os habeant ulceratum. Porro ad hæc uitanda discrimina, recentiores galli uel gallinæ sedem plumis exuunt, & uulnere consultissime applicant, & demortuo primo, alterum substituant, idq; tandiu prosequuntur, quousq; uniuersa ueneni uis extrahatur. Cuius rei certum indicium habent, cum gallus postremo appositus non moritur. Aetius Dioscoridem secutus, non modò gallinaceos, gallinasq; uiuentes distingas, & adhuc palpitantes his morsibus commodè applicari tradidit; sed etiam quodlibet uolatilium genus, itè iuuenum, tenellorumq; quadrupedum. Dehinc idem iubet, excitatis calidæ aquæ potu uomitibus, ualentiora dari antidota, nempe theriacam, & Mithridatis antidotum. Mirificam uim in hac curatione habent, quantum equidè experientia comperi, quinta nostra essentia, pariterq; oleum de scorpionibus, quorum parandi rationem in præfationis huius libri commentario tradidimus: siquidem his tantum antidotis, imò nonnunquam solo oleo, nonnullos à uiperis demorsos sanauimus, paucis admodum horis, qui cum nullum uitæ signum præberent, tanquam deplorati iacebant. Nam tanta est horum partium tenuitas, ut momento uniuersum corpus percurrant, & subinde omne superent uenenum. Propterea est horum partium tenuitas, ut momento uniuersum corpus percurrant, & subinde omne superent uenenum. Propterea est horum partium tenuitas, ut momento uniuersum corpus percurrant, & subinde omne superent uenenum. Propterea est horum partium tenuitas, ut momento uniuersum corpus percurrant, & subinde omne superent uenenum.

Prota est horum partium tenuitas, ut momento uniuersum corpus percurrant, & subinde omne superent uenenum. Propterea est horum partium tenuitas, ut momento uniuersum corpus percurrant, & subinde omne superent uenenum. Propterea est horum partium tenuitas, ut momento uniuersum corpus percurrant, & subinde omne superent uenenum. Propterea est horum partium tenuitas, ut momento uniuersum corpus percurrant, & subinde omne superent uenenum.

Sunt & qui nigri ueratri recentem radicem in uulnus figendam consulant: quod hæc (ut equidem me experientia cognouisse fateri possum) uirus ualentissime extrahat. Quamobrem Tridentina rura cum iumentum aliquod à serpente igitur, statim perforato ibidem corio, præstantissimo remedio ellebori nigri radices in uulnus inserunt. Por sunt etiãt num magno iuuamento cepa, allium, porrum, asphodeli, & dracunculi radix elixa, contusa, & subinde theriaca, aut Mithridatio, & oleo de scorpionibus subacta, & illita. Non secus auxiliantur, iridis, ari, phu, utriusq; chamæleonis, lilij, hemerocallis, helenij, foeniculi, smirni, gladioli, scillæ, spargani, cyclamini, bryoniæ, utriusq; raphani, & bulbaseorum omnium radices, concisæ, ac decoctæ, & morsibus illitæ: quæ omnia sæpe à nobis experta sunt. Conferunt præterea bdellium, Syriacum bitumen, pix liquida, castoreum, montanarum caprarum finum, euphorbium, sulphur uriuæ admistum, sal, nitrum, taurinum fel, oleraceæ cruce, utrunq; laser, galbanum, sagapenum, panacis lacryma, erica, hyssopum, origani omne genus, dictamnium Cretense, & Italicum, calamintha, conyza omnis, uerbenaca, haliacabum, satiuæ, & agrestis ruta, sonchus tam aspera: quàm leuis, sisymbrium, sinapi, nasturtium, lepidium, iberis, thlaspi, aut in emplastris, aut in fementis exterius adhibita. Quæ uerò pota, uel deuorata ualentissima censentur, ea omnia erunt, quæ in nostro in huius libri præfationem commentario longiori catalogo recensimus.

Quorundam  
opi. explosa.

Virulætorum  
ictu, uel morsu  
suâ curatio.



suimus. tanetsi priuatim ad uenenatos ictus præferantur Medica mala, & eorum semen: quin & echij, & uiticis, & ligustici, & peonia, & hyacinthi: prætera uirides platani pensiles pilulæ, iuniperi bacca, conyza, chamaedrys, scordium, chamæpitys, echini terrestres caro, gallinaceorum & gallinarum cerebrum, leporis & equi coagulum ex uino potum, marinæ testudinis sanguis cum cymino, porri succus ex melle, nasturtium, maioris centaurij, gentianæ, albi dictamnii, & superior gladioli radix, thlaspi, pulegium, Cretense dictamnium, elichrysi coma, ranæ oleo incoctæ, & sale consperse, earundem ius, oleo & sale adiectis, & cerui genitale siccum, & in puluerem potum. Mirificum ac singulare remedium præstat illius herbe radix, quam Goritienses, ex eo quod serpentium moribus celeriter, & efficaciter medetur, Serpentinam uocant, cuius historiam descripsimus libro secundo in coronopi mentione: hæc siquidem in puluerem ex uino hausta cochlearis mensura, à ueneno quouis serpente demorsos breui tempore sanat: neque ea solum ualet aduersus uirulentos ictus: sed etiam contra epota uenena. Iis ferè uiribus pollent (ut quidam recentiores fatentur) flosculi illi syluestres roseo colore micantes, quos nonnulli syluestres garyophyllos uocant.

Theriaca laudibus à Galeno celebrata.

Porro Galenus libro de theriaca ad Pisonem, cæteris antidotis tam simplicibus, quam compositis ad uirulentorum morsus Andromachi theriacam prætulit his uerbis. Theriaca est procul dubio apud uniuersos homines celebratissimum antidotum, tum quod pollicito neminem frustretur, tum ob ipsius actionis efficaciam. Siquidem nullum unquam à feris, quæ hominem solent interimere, commorsum, hac statim epota periisse memoria est proditum. Nullus eadem præsumpta haud multo post morfu impetitus, belluæ ueneno ceu illam superate interijt. Quod subinde nonnulli prætores etiam, penes quos uitæ, & necis potestas est, experiuntur: atque medicamentum probare uolentes, an quod promittat præstare quoque possit, in omnibus iam ob praua quædam, & illegitima facinora ad mortem iudicatis, de ipsa faciunt experimentum. Nos autem cum in hominibus id non possumus, in alijs quibusdam animantibus idem facientes, ueram medicamenti probationem inuenire conuemur. Nanque gallis, qui domi non enutriti, neque nobis sunt cõtubernales, sed potius agrestibus, & sicciore præditi temperamento, captis, feras obijcimus, & qui inter illos non biberint ex medicamento, protinus intereunt: qui uerò biberint, conualescunt, & à morsu uitam retinent. Interdum uerò medicamentum nun adulteratum sit, hoc quoque modo probare conuenit. Si epota theriaca, non purgetur, qui purgans sumpsit medicamentum, hoc ipso iudicamus antidotum esse præstantissimum, quoniam purgationem, ei qui medicamento usus sit purgante, impeditur, ut tali experimento à ueri medicaminis inuentione nunquam aberrauerimus. hæc tenus Galenus. Cuius nimirum ætate qui prætorium in facinorosos exercebant iudicium, facile probare poterant num theriaca probate esset facultatis, an adulterina. Nanque pluribus in locis qui ob sua facinora mortis supplicio damnabantur, non semper capite, aut laqueo, aut quouis alio pænæ genere necabantur, prout leges statuebant: sed sæpius in theatrum ducti, ut mitiori supplicio è medio tollerentur, aspidibus, & uiperis offerebantur demordendi. Huius rei testis est Galenus eodem libro ad Pisonem, ubi post enarratum Cleopatæ interitum sic inquit. Pluries in magna Alexandria sum contemplatus, quam celeriter aspidēs homines perimant. Cum enim aliquem hac pænæ lege damnatum, humaniter, citòque uolunt occidere, adijciantes ipsius pectori feram, iubentēque paululum ambulare, ita sine mora hominem tollunt è medio. Probanda igitur fuerit theriaca, præsertim quæ sit hoc tempore, antequam emittatur, uel alicui propinetur, in gallis agrestibus à feris sæpius enarratis demorsis, ut docet Galenus, aut in alio quouis animali: etenim in simijs (ut opinor) tutius & certius id experiri possent, quod simiæ magis cæteris hominem refectant. Narrant quidam antiquitus fuisse gentes in pluribus orbis partibus, quæ suapte natura cum serpentibus degabant, tractabantque manibus, nullo unquam ab his morsu accepto. Cuius rei testis est Plinius libro VII. cap. II. ubi ita scriptum reliquit. Crates Pergamēnus in Hellesponto circa Parium genus hominum fuisse tradit, quos Ophiogenes uocat, serpentum ictus contactu leuare solitos, & manu imposita uenena extrahere corpori. Varro etiam nunc esse paucos ibi, quorum saluæ contra ictus serpentum medeantur. Similis & in Aphrica genus Psyllorum fuit, ut Aetharchides scribit, à Psyllo rege dicta. Horum corpori ingentum fuit uirus exitiale serpentibus, ex cuius odore sopirent eas. Mos uerò liberos genitos protinus obijcendi seuissimis earum. eoque genere pudicitiam coniungē expectandi, non profugientibus adulterino sanguine natos serpentibus. Hæc gens ipsa quidem prope interemptione subacta est à Nassomonibus, qui nunc eas tenent sedes. Genus tamen hominum ex his, qui profugerant, aut cum pugnatum est, abfuerant, hodièque remanet in paucis. Simile & in Italia Marforum gente durat, quos à Circes filio ortos fuerunt, & ideo inesse ijs uim naturalem eam. hæc Plinius. Veruntamen, ut auctor est Galenus libro de theriaca ad Pisonem, Marsti qui suo tempore extabant, contra serpentium uenena nullam utique propriam habebant facultatem: sed fraude quadam uniuersam decipiebant plebeculam. Ipse enim loco citato ita scribit. Circulatores hi nunquā congruo tempore uiperas uenantur, sed multo post uernationem, cum non amplius uigent. Captas autem ipsas crebro sibi ipsis assuefaciunt, & cibis non solitis enutriunt, imò carnes ipsis permittent, & continue mordere cogentes, ut uirus ex earum ore uacuetur efficiunt. quinetiam mazas quasdam obijciunt, quæ dentium foranina obstruant. Atque hac ratione morsus fiunt imbecilles, ut uidentibus magnum sit miraculum, talis ipsorum ad fraudem parandam artificij imperitis. hæc Galenus. Cæterum id fraudis doliue genus, nostro etiam tempore locum habet, in his præsertim circulatoribus, & circumforaneis, qui ex diui Pauli stirpe (quod tamen planè mentiuntur) se prognatos prædicant. Quippe quod ferè omnes Apuli sint ex Leccia urbe oriundi, aut ex circumstantibus locis. quanquam facile possunt originem duxisse à Marfis eorum uicinis, qui sexcentenis, aut fortasse nullenis annis ante diuum Paulum extitere. Cauendum igitur fuerit ab eorum nugis: uam quicquid loquuntur, pollicenturq; id omne fraudulentè, & dolose agunt. Capiunt enim uiperas abeunte iam hyeme, & ut magis ab earum moribus se tutentur, manus sibi perquam diligenter inungunt quodam unguento hæc in uenatione ab ipsis experto. Unguentum illud conficitur ex oleo syluestris raphani semine expresso, dracunculi radicis, & asphodeli succo, leporis cerebro, sabinae folijs, lauri baccis, & alijs quibusdam ad ditis. Affirmant eo unguento perunctos à serpentibus ici non posse. Quod ego facile crediderim, cum etiam apud

Nicandrum

Gentes tuta à serpētib; eo rumq; ictibus medentes.

Fraus circumforaneorum, qui diui Pauli stirpē mentiuntur.



Nicandrum in theriacis unguentum repperim, quo qui fuerit perunctus, à feris ici non possit. Nicandri uerba subijciam, quæ soluta oratione ita redduntur. Quòd si in triujs mista reptilia iam recens generantia sese, & rem secum habentia, in ollam mitas, repones aduersum perniciosas noxas remedium. Inijcias autem in ollam illam cerebri, seu medullæ cerui recens cæsi drachmas triginta: cotylas quatuor rosacei, cuius primam, mediam, & tertiam expressio- nem unguentarij præcipuas, & solas numerant. Olei splendentis curdi totidem cotylas infunde, & cotylam ceræ unam, atq; hæc in rotundo uase celeriter calefacito, donec liquefactæ serpentium squamæ mollescant. postea arte pa- ratam molam recipies, & hæc omnia in unum mista turbabis, teresq; cum serpentibus. Longè autem spinas separa: quandoquidè maleficum illis uenenum adhaereat. Omnia porro membra ex hoc unguento inunge, tumq; uel in quadam uiam, uel grabatum etiam te tuto conferes, uel cum arentis æstatis tempore ad arcæ opera cinctus, tridentibus pro- fundum manipulorum acerrimum disquisueris. hæc ille. Capiunt igitur qui Marsos se faciunt, uiperas, aliudq; quòd- uis serpentium genus hoc modo: captisq; statim caput salina perfundunt, cuius contactu non parum uilescunt, & ue- neni feritatem deponunt, quòd hominis salina facultate sit illis prorsus contraria. Cum autem in foro, ut miraculo- sum de se spectaculum præbeant, ab his nullo ueneni incommodo demordi se facere uolunt, oblato prius illis duræ car- nis frusto, id dentibus dilaniare cogunt, ut uirus, quod prope dentes quosdam uesiculis continetur, in mansam effunda- tur carnem. Non desunt tamen qui etiam uesiculas illas forcipibus abscindant, ne amplius ueneno repleantur. Itaque hæc fraude uniuersam gentem decipiunt. Verum pulcherrimè horum fraus quandoq; detegitur, cum simul in eodem foro plures eiusdem prauis generis homines contendunt, ut alter alteri primum locum præripiat, & summam apud populum auctoritatem consequatur. Nam ij, ut quisq; se legitime ex diui Pauli familia ortum ostendat, uiperis, qui- bus uenenum exemptum non sit, seinuicem dilacerant, præsumptis tamen suis fallacibus antidotis: quibus tandem fru- strati, à ueneno uicti relictis uexillis, tanquam moribundi, suis è pulpitis in terram cadunt. Et certè nisi statim periti medici illis opem ferrent, mortem sæpe inuolutam oppeterent: licet etiam interdum occumbant, & animam caco- demonibus, corpora uerò suis serpentibus deuoranda relinquunt. Equidem meminimus, cum essem Perusijs, me duos hu- iusce generis circumforaneos uidisse in foro, qui in tribus corporis partibus à uiperis demorsi erant: & ij sanè ambo periissent, nisi Carautus ille Bononiensis chirurgicus, & præceptor meus, oleo nostro de scorpionibus eos inunxisset: nec suus illis profuisset lapis, quem uendunt, & omnibus præferunt, aduersus omnia uenena. Quemadmodum idem non profuit ijs, qui Tridenti inuicem in foro demorsi, & ueluti mortui in hospitium delati, prædicto oleo sanitati re- stituti fuere, magno quidem amborum discrimine, ac dedecore. Sunt qui dicant eum lapidem, uel potius terrā obsigna- tam à Melite insula allatam, quam omnibus præponunt antidotis, uim omnino aduersus serpentium uenena efficacem habere, quemadmodum & ea, quæ à Lemno insula Lemnia uocatur. Veruntamen ubi ab aspidē, uel uipera quis fue- rit demorsus, parum uel nihil proficit. quomobrem credendum minimè fuerit, panem uel uinum, quibus suas ijs ad- murmurant cantilenas, eos qui sumpserint, tutos à serpentibus, & alijs id genus uenenum eiacularibus, ad integrum usq; annum seruare posse. Quandoquidem nouimus nos, qui hoc pane deuorato se tutos à serpentibus existimantes, serpentium uenationi se dedere: sed ab ijs tandem demorsi huius admurmurati panis opinione falsi interiere. Non tamen eam inficias, quin aliqui reperiuntur, quibus quædam eadē à cælo facultas tributa est, ut à serpentibus non mor- deantur. Siquidem noui ego plures qui simpliciter, nulloq; artificio aut uerbis aspides, & uiperas quotidie capiebant, nec unquam ab ijs icti fuere. quauis serpentes ab ijs modo pedibus calcati, modò manibus compressi fuerint, ac diu- tius in nudo eorum sinu gestati. Neq; præterea negauerim, serpentes non posse carminibus, & incantationibus com- pelli, quòd plurimis id constat experimentis. Ceterum, ut nihil quòd ad curationem ictuum uirulentorum facere possit, à nobis prætermittatur, qui omnia quæ scimus, ingenuè docemus, non uerebor prodere uemoria (et si sciam

ad medicos non spectare, neq; ab ipsis recipi) quoniam pacto in Romano agro senex quidam cremita amicus meus, à feris ictus sanabat, ipsis absentibus agris. Cum enim quis è circumstantibus populis à serpente demordebatur, id per nuncium eremite significabant: tum is interrogabat nuncium, an medicamentum icti loco ebibere uellet. Quòd si id se facturum respondebat, iubebat ille, ut dextrum pedem calceò denudatum solo sisteret, & cultello totius pedis uesti- gio lineam circunducebat: deinde iubebat pedem auferri, & intra spatium lineæ signatæ cultelli cuspide hæc uerba in- scribebat. CARO CARVE, SANVM REDVE, REPTA SANVM, EMANVEL. PARACLETVS. mox terrā eodem gladio abra- debat, ita ut omnes abolerentur characteres: abrasum pulue- rem fictili quodam paruo aqua pleno excipiebat, ibiq; tantisper dimittebat, donec terra subsideret: demum nuncij interula aquam percolabat, & cruce signatam illi bibendam præbebat. Sed certè mirum est, quòd eadem hora ictus sanabatur, qua nuncius potionem illam sumpserat, ut mihi planè compertum est, & omnibus illius regionis incolis. Hæc est curatio in uirulentos ictus, qua utebatur ille eremita. qui mihi sæpius dixit, hoc esse maius secretum, effica- eiusq; remedium, quod habeant ij, qui suam originem in diui Pauli familiam falso referunt.

Vnguentum  
Nicandri.

Curatio secū  
dum quædam  
eremitam.

## Vespa, & apes.

## Cap. XLI.

INTER ferientium venenatorum notas, nihil de vespis, & apibus articulatum digessimus, quòd conspicuè omnibus sint, & nihil excellens, aut notatu dignum in his obseruetur: inter remedia ta- men earum meminisse, non fuit alienum. Igitur aduersus vtrarumque ictus prodest illita malua, & hordeacea farina cum aceto, ficulneum lac in vulnus instillatum, & muria, aut aquæ marinæ fots.

ET SI uesparum, & apum ictus nemini unquam attulerit necem; cum tamen dolores molestissimi inde quando- que oriantur, non alienum, neque inutile fuerit ea nosse medicamenta, quibus facile idem mulceri possint. Quomob-

Vesparum, &  
apum ictus, &  
remedia.



rem iam dictis à Dioscoride remedijs ea addenda duximus, quæ priuatim scribit Aetius lib. XIII. sic inueniens. Si quis ab apibus, & uestis illæsus permanere uelit, cum maluæ folia cū oleo illita, & eruca, siue bruchus cum oleo illitus asseruabunt. Quandoquidem uerò quidam ab his clauiculum percussi, ob dolorem perturbantur, putantq; se à maligno aliquo animante petitos esse, necessarium existimo prius ostendere quæ signa horum ictus comitentur. Hos itaq; qui ab apibus punguntur, dolor ictus consequitur, & rubor loci, cum tumore partium in ambitu sitarum; stimulus autem omnino in percusso loco reperietur. Eadem etiam hos, quos uestra pupugit, concomitantur, sed intensiora: uestrum stimulus uestra in percusso loco non relinquit. Auxilium autem utriq; ferunt luto, aut stercore bubulo eis illito cum posca, aut maluæ folijs impositis cum posca: aut cimolia cum malua & posca: aut sesamo cum posca. Naturaliter autem opitulatur ueneranda, & uiuifica strombi conchylij imago in sigillo ferreo exculpta, & loco ictus appressa: non enim permittit amplius inflammationem generari. In potu præterea ipsis foliorum lauri tenerorum drachmas duas cum uino austero præbeto. hæc Aetius. Cæterum compertum est, dolorem statim sedari illitis muscis prius contritis. Id quod similiter præstant thymbra, melissophyllum, & sisymbrium.

## Phalangia.

## Cap. XLII.

DE MORBIS à phalangijs locus quidem ipse, quasi ab impacto aculeo rubet, non intumescens, nec per ambitum calidus est, sed medio ceter humescit: ubi uerò contrariorum occursum refrigit, consequitur corpore toto tremor, distentiones poplitum, & inguinum, conuulsionibus non dissimiles, in lumbis collectio exoritur, & perpetua urinae libido lacessit, multaque reddendis excrementis colluctatio. vniuersa cutis frigidus sudor emanat, collacrymant oculi, offusisque nebulis caligant. Horum ictibus ficulneum cinerem adiecto sale trito, & uino imponere oportet: aut radicem syluestris punice quam tenuissimè tritam: aut aristolochiam cum hordei farina, & aceto subactam. Vlcera aquæ maris proluenda, aut apiastri decocto, foliaque eiusdem illinenda. Lauacris perpetini vrendum, & propinandum abrotoni semen, anisum, aristolochiam, cicer syluestre, cuminum Aethiopium, cedrides tritas, platani corticem, & trifolia herbæ semen: priuatim autem, singulorum ex ijs binas drachmas dare cum uini hemina conuenit, item myricæ fructus, & chamæpityos, & uiridium cupressi pilularum decoctum, admisto uino. Sunt qui fluuiatilis cancri expressi succum cum lacte, assumpto apij semine, confestim molestijs liberare prodant.

Phalangiorum genera ex Aëtio.

PHALANGIORVM genera quanquam plura à ueteribus describuntur, tamen Aëtio libro XIII. cap. XVIII. sex tantum numerantur, his uerbis. In phalangiorum genere primum quidem rhagium, alterum lupum, tertium formicarium, quartum cranocolaptes, quintum sclerocephalum, sextum scolecium appellant. Ac primum quidem Rhagium, id est, acineum, figura rotundum est, colore uerò nigrum, acini uuae nigrae similitudine, unde etiam appellationem accepit: & os quidem iuxta medium uentrem habet, pedes uerò ex utraque parte quam breuissimos. Alterum uerò Lupus appellatum, muscas perdit, eisq; pascitur: ac corpus quidem habet latum, & uolubile, partes uerò circa collum ipsis incisæ sunt, amplius autem & os eius eminentias tres habet. Tertium autem Myrmecium, hoc est, formicarium dictum, formicæ maximè assimilatur, colore fuliginoso: corpus uerò eius uelut astris quibusdam insignitum est, maximè circa dorsum. Quartum deinde Cranocolaptes, sublongum est, & uiride, stimulusq; iuxta collum habet, atq; si in quem irruat, locos circa caput petit. Quintum Sclerocephalum dictum, caput habet saxum, & obduratum: lineamenta uerò per omne corpus similia animalibus illis, quæ circumuolitant noctu lucernas. Sextum autem Scolecium siue uermicarium appellatum, sublongum est, & submaculosum, maximè circa caput. Atque hæc quidem species phalangiorum enumerantur. hæcenus Aëtius. Qui tamen cuiuscunque phalangij notas, & indicia seorsum non descripsit (genus enim diuersum diuersa quoq; parit symptomata) sed omnia in commune simul collegit.

Phalag. genera, & morbus notæ ex Nicandro.

Quamobrem si particulatim cuiusque phalangij indicia per se scire cupimus, Nicandrum consulamus. Is siquidem in theriacis præter id quod plura, quam fecerit Aëtius, phalangiorum genera reddit, singulorum etiam priuatim indicia describit suis uersibus, qui ita paraphrastice in Latinum uertuntur. Opera iam nunc noxij considera phalangia, signaq; eius morsus. Primus itaq; splendidus Rhox appellatur, niger planè, accumulatis pedibus prorepens, mens dium uentrem ore, & dentibus septum habens. Cui ab hoc inflatum fuerit uulnus, perinde corpore apparet atque si nihil quicquam sauciatus foret: oculi uerò inferiori parte rubescunt, frigus iuxta in corpore adheret, infigitur, statimq; color, & membra hominis à supernis ad ima uergere uidentur: neque penis semine unidus demittitur, sed lumbos occupans ita frigus genuum nexus dissoluit. Asterion iam secundum obserua, in cuius dorso pingua quædam res lucent, ac lucidæ in corpore uirgule. Percussus ab hoc inexpectatus horror cum flamine quodam adoritur, caput uerò somnus grauat, genuum & membrorum nexus, & imbecillitas fit. Cyaneum aliud sublime, erinitum, & asperum æqualiter est. Difficilem corpori infert illud puncturam, quodcunque labefactauerit, corq; graui languore succumbit. Nox & caligo tempora circumstant, uomitumq; edit è collo lubricum, ab araneis telis non multum distantem, adeoq; tandem interitum subministrat. Ab hoc alius est Agrostes, qui specie sua lupo similis est, muscarum interemptor, qui apum obseruator est, culicum qui pænes dicuntur, & æstrorum, & omnium quæ ad telam ipsius peruenierint. Hic imbellè plagam, & uanum uulnus homini infligit. Quod autem Dysderi, siue spheceum appellant, rutilum satis, uestra crudis uescenti persimile. Hic si quempiam uulnerarit, ingens è uulnere tumor erigitur: morbi etiam quidam ad genua, aliàs etiam neruorum cordis, & uenarum languentium trepidatio, aliàs uirium destitutio, ut percussus sæpius domet, atq; interimat. Extremi maleficij animal, somnum adferens, qui hominem quiescere ab huius sculi



culi laboribus faciat. Est præterea Formicarium dictum, quod formicis planè simile sit, collo quidem rutilum, reli-  
quum corpus nigredini ex putredine factæ, par est, undique latum, stellatum dorsum, punctisq; distinctum gerens, cui  
subcinericium tempus ad modicam ceruicem attollitur. Atque ex hoc phalangio dolores priorum similes uenenatorũ  
ueniunt. Sunt & alia parua phalangia scarabeis similia, quæ in agris iter legumina sua carpunt pascua. Horum cir-  
ca cruciantem morsum tubercula, & pustula exurgunt, cor oberrans furit, lingua inconditè obmurmurat, oculi  
etiam subuertuntur. Educatur in Aegypto in perseæ folijs, quem Cranocolapten dicunt, phalænæ similis, quæ cir-  
cum lucernas cum impetu uolitat nocte. Eius horribile semper caput incessanter nutat, uterus autè grauatur. Hic ubi  
cuiuspiam stimulum infixerit, quem ceruice tenus gerit, facilè sanè citra omnem laborem ad interitum ducit. hæc Ni-  
cander. A quo tamen in hoc dissentit Aetius, quòd sclerocephalum ijs simile ficerit bestiis, quæ noctu lucernas  
circumuolitant, Nicander uerò huic cranocolapten comparauerit. Sed iam ea prosequamur, quæ de phalangiorum  
ictibus tradidit Aetius, qui loco superius citato sic habet. Quæ percussos à phalangijs concomitantur, communia sunt  
iuxta magnitudinem, & paruitatem discreta. Morsus porro tenuis est, ut uix conspici possit: tumor autem liuidus,  
quibusdam etiam rubicundus: frigiditas adest circa genua, lumbos, & scapulas, nonnunquam uerò totum corpus ag-  
grauatur. amplius & dolor asiduus adest, tremor, pallor, uigiliæ. Quibusdam uerò pudendi tentigo, & circa caput  
pruritus, aliquando etiam circa suras: oculi humecti, & lacrymantes, ac caui, & uenter inequaliter eleuatur. In-  
tumesceit autem uniuersum corpus, faciesq; & maximè circa linguam partes, adeò ut impedito sermone balbutiant  
demorſi. Quibusdam uerò urinae emittendæ difficultas adest, cum pudendi tentigine, & dolore. Si uerò minxerint,  
quoſe ipsorum sunt urinae, quadam aranearum telis similia in se habentes, & uomitus quoq; similis. aliquando uerò  
& per uomitum, & per uentrem talia excernuntur. Cæterum in calidam aquam demissi, dolore leuati sibi uidentur:  
post uerò è balneo egredientibus intentum dolet pudendum. Senioribus uerò pudendum plurimum laxatur, ac mini-  
mè intenditur. Atque hæc quidem communiter ad omnium ictus sequuntur. Si uerò cranocolaptes aliquem percussæ-  
rit, caput magis dolet, & uertigines consequuntur, frigus continens, delirium, corporis iactatio, & uentriculi pun-  
ctiones. Omnes autem à phalangijs percussii iuuantur asiduis balneis: ictus etiam locus ex trifolij bituminosi decocto,  
cum oleo proluatur. totum uerò corpus ex cerato liquidissimo pinguescat. luuantur etiam somento spongiarum in ca-  
lido aceto tinctarum, & plagæ contiue adhibitarum. Cataplasmata autem eis conueniunt: bulbi, sanguinariæ, por-  
rum, furfures aceto incocti, hordeacea farina incoctis cum ea in uino aut melle lauri folijs, ruta, grossi, caprinum  
stercus cum uino, amaracus cum aceto, syluestris ruta cum aceto, & cyperus. hætenus Aetius. Cæterum Diosco-  
rides uarijs in locis huius totius operis de medica materia plura alia medicamenta intus in corpus sumenda aduersus  
phalangiorum morsus commemorauit, præterea ea quæ hoc capite speciatim retulit. Ea autem sunt, si summam colli-  
gantur, myrti baccarum succus ex uino potus, succus item foliorum mori cyathi mensura, lixiuum è fici uel caprisfici  
cinere paratum, asparagi radicum decoctum, agrestis lactuca, coris semen, hederæ succus ex aceto potus, ruta ex  
uino hausta, hieracium, dauci semen, melanthium drachmæ pondere ex aqua potum, aparine, melisophyllum, &  
phalangium herba ex uino pota, pentaphyllum, hyacinthi radix, & sedum minus. Quæ uerò ad idem exterius illi-  
nenda commendauit, hæc sunt, nullus piscis dissectus, maluæ decoctum, aqua marina, & marinorum iunctorum te-  
nella folia. Nec desunt composita medicamenta ab authoribus tradita. quæ si quis uidere & habere cupit, Galenum  
consultat libro secundo de antidotis, ubi ualentissima describuntur antidota ad phalangiorũ ictus, è pluribus ueterum  
clarissimorum medicorum monumentis excerpta. In summa tamen legitima theriaca, & Mithridatium contra pha-  
langiorum uenenum cæteris præstantiora censentur. Sunt etiãnum in phalangiorum genere recensenda, quæ nos  
bis in Hetruria TARANTULÆ uocantur. Quarum historiam, & admiranda symptomata superius libro se-  
cundo abundè retulimus, cum de phalangijs differeremus. Quinetiam inibi docuimus, quo modo ab ijs icti curentur,  
muscis instrumentis, ductisq; quàm longissimis tripudijs. quare eò se conferrè poterunt, qui hæc scire desiderant.

Phalágiorum  
ictuum signa,  
& curatio ex  
Aetio.

Tarantulæ ue-  
nenum, & re-  
media uide li-  
bro II.

## Scolopendra.

## Cap. XLIII.

SI SCOLOPENDRA, aut dicta ophiostene, morsum intulit, locus per ambitum liuore su-  
gillatur, & computrescit: interdumq; licet rarò, sæculentus, atque ruber cernitur. A morsu ipso  
exulcerari locus incipit, ulcusq; id negotium exhibet, ferè remedijs inuictum: præterea toto corpo-  
re prurigo sentitur. Hæc ubi morsum infixit, sal quàm leuissimè tritus, ex aceto uulneri inspargen-  
dus, aut ruta syluestris superponenda. Locus acida muria fouendus, & danda in potu aristolochia cum  
uino, aut serpyllum, aut calamintha, aut ruta syluestris.

TERRESTRES Scolopendras Hetrusci centipedas uocant. Sunt enim in Hetruria omnibus uulgaris noti-  
tie uermes, innumeris utrinque pedibus refertæ, colore subrufo: diuerso quoq; genere constant. Cæterum ea tantum  
ictu uenenum relinquunt, quæ quòd morsu serpentes interficiant, ophiostone appellantur, quarum tantum existima-  
mus hoc loco meminisse Dioscoridem. Veruntamen quæ in uniuerso genere ea sint hætenus compertum non abeo.  
Quibusdam in regionibus tanta copia increuere scolopendræ, ut fugati ab eis populi, proprios deseruerint lares.  
quod Arerietis contingisse scribit Theophrastus. Progreditur scolopendra tam in anteriorem, quàm in posteriorem  
partem. Idcirco scribit Aristoteles lib. IIII. cap. VII. de historia animalium, quòd dissecta Scolopendra altera  
parte in caput, altera in caudam mouetur, & serpit. Vnde uidetur existimasse Nicander, hanc bicipitem esse, ut eius  
uerba in theriacis inuunt, cum inquit. Modicæq; pemphredon, bicepsq; scolopendra. Cuius euntis alæ, ut remi nauis,  
festinant. Non inepta quidem Nicandri comparatio: nam scolopendræ pedum multitudine uelociq; motu triremem  
repræ-

Scolopendræ  
uenenosæ cõ-  
sideratio.



Scolopendræ  
morsus reme-  
dia.

representant. Harum moribus (ut Dioscorides ait) auxiliantur asphodeli semen, & flores ex uino poti, Quinetia (ut scribit Aetius) ea omnia scolopendræ ictibus medentur, quæ priuatim muris aranei moribus conueniunt, de quorum curatione paulò inferius dicemus. Præferunt antiquorum nonnulli cinerem aceto subactum, & uulnere illium, item scillam: præterea pulegium, rutam, & mentham ex uino potam. De marinis Scolopendris tradidimus superius libro secundo. Nec tamen mihi compertum est, aliam noxam ab ijs inferri, quam ingentem pruritus ijs tantum partibus, quibus inhaerint (ut scribit Aristoteles, & Dioscorides) earum erucarum more, quæ pilis horrent, & quæ præsertim in pinu uitam agunt.

## Scorpio.

## Cap. XLIII.

SCORPIONIS morsu inflammari statim incipit locus, & indurefcit, ac intentus rubet vicissimque dolore premitur: modò siquidem exæstuat, modò frigore occupatur. Labor repente fatigat, & aliquando meliusculè habet, aliquando recrudescit. Consequitur sudor, horroris sensus, & tremor. Extremæ corporis partes refrigescunt, inguina extolluntur, per sedem flatus exeunt, capilli eriguntur, pallor membra decolorat, & dolor, tanquam ex pungente acu, per vniuersam cutem sentitur. Percussis præsentis est auxilio ficulneum lac in vulnus instillatum. Scorpius ipse, qui ictum vibrauit, tritus, & percusso loco impositus, suæ plagæ remedium est, ob cæcam quandam naturarum (ut constat) discordiam, quæ antipathia appellatur. Præterea tritus, & impositus cum sale, lini semine, & althæa, scorpius conuenit. Sulphur ignem non expertum, resina terebinthina exceptum, & emplastri modo adiectum, auxiliatur. Itidem galbanum ad splenij formam ductum, & calamintha, quæ trita illinatur, & farina hordei in vino parata, in decocto rutæ. Semen trifoliæ herbæ tritum, & vulnere iniectum opitulatur. Hæc ad affectum locum pertinent. Post hæc quàm efficacissimis potionibus vtendum, cuiusmodi sunt aristolochiæ, præsertim corticis binæ drachmæ cum vino, tula gentiana, & pulegium decoctum, & baccae lauripauco numero tritæ, & calamintha cum posca, in qua magnopere discoqui debet: cupressus cum vino, & ruta, nec secus ficulneum lac: laserpitium, si adsit: sin desideretur, peucedani succo utendum. efficax est potum trifolij, & ocimi semen. Horum autem omnium uicem pensat iugis lauacri usus, euocatus sudor, & diluta uini portiones,

Scorpionum  
genera ex Ni-  
candro.

PLURA, ac uaria antiquis numerantur Scorpionum genera, ut latius libro secundo diximus, quorum alij multum, alij parum suo ictu efficiunt. Porro Nicander in theriacis scribit eorum octo reperiri genera, his uerbis. Age dum aculeo dolorifico armatum scorpionem canam, eiusq; tetricum genus. Quorum primus albicans, neque fonticus, neque lethalis est. Sed cui rutila genæ micant, calorem flagrantemq; mortalibus furorem incussit, quo malo homines horrore concutiuntur, & frigore, perinde ac qui febre diuexantur, & acris ita incenduntur. Qui liuidus est, malam trepidationem, & motionem tribuit hominibus, quos percusserit, qui ceu attoniti, & uani, & stulti rident. Alius uiridante colore, qui simul ac corpus hominis concusserit, tremores, & frigora illico admittit, acrisq; grando talibus uidetur circumstare, etiam si sol ardentissime radijs suis flagret. Talis tantæque eius stimuli afflictio, cuius uertebrae nouem (lego septem, cum non plures scorpionum caudis inesse comperiantur) iuncturis connexæ apice suo nocent. Alius liuido colore, ingentem aluum gestat, latumq;: herba enim uescens, semper insaturabilis manet, corpus etiam hominis exedens, inguini insolubili ictu nocens: tam uehemens eius generis, & ori morsus instus, infixusque est. Deprehendes itidem similem scorpionem litorali seu marino cancro, qui albentes algas fluctumq; maris decerpit pascendo. Alij rursus incuruis æquales planè paguris uidentur, corpore grandes, chelis, & forcipibus æquè solidi, atque paguri, qui in saxosis cauernis demorantes sibi timent. quinetiam è paguris tales scorpiones, genus & ortum suum ducunt. Nam cum rupes, tenuesq; multum strepentis maris reliquerint algas, eos ex mari inescantes piscatores extrahunt. At paguri se peti ea uenatione sentientes, murium rimas, & nidos subeunt, ubi prolem perditricem habent, ibiq; è mortuis tandem paguris scorpj nocentes per foramina ista generantur. Postremo melichlorus tibi animaduertendus, cuius summum uerticillum prænigrum est, inextinctumq; noxam infligit, hominibus certè insensissimus ille obliquo gressu corpus flammæ simile commouens: pueris uerò, & natu minoribus celerem interitum adduxit: quibus & circum terga deuse alæ expanduntur locustæ fruges rodenti non dissimiles. hæcenus Nicander.

Scorpionum  
ictus, & cura-  
tio ex Aetio.

Ceterum scorpionum ictuum indicia, & curationem conscripsit diligentissimè Aetius lib. XIII. cap. XIX. sic inquit. A Scorpio percussos uehementissimus plagæ dolor consequitur, frigiditasq; ac tensio, & stupor: circaq; plagam, & totum corpus frigidus sudor: his, qui iuxta infernas partes percussi sunt, inguina excitantur, ac intumescent: qui uerò circa supernas, locus sub alis. Et hæc quidem leuiter percussis adsunt. Validius autem ictis ardor circa plagam adest, quemadmodum in ambustis, & uerrucarum instar formicarum eruptio circa labra, & totum corpus, ut grandine se impeti putent. Facies distorquetur, sordes circa oculos adsunt glutinosæ, & lacrymæ uiscosæ: durities articularum, anusq; procidit, cum egerendi cupiditate: spuma circa os est, & uomitus largus, singultus, conuulsiones opisthotonicis similes. His igitur serpyllum, althææ radicem, & elaphoboscum bibendum præbeto. Præter opinionem autem facit elaphoboscus, tum uiridis comestus, tum sicca pota. Cochleam item hortulanam maxime accipito, eamq; unā cum operimento tritam, plagæ imponito, & confestim sedabis dolorem. Idem etiam uermes terreni facere dicuntur. Prodest præterea fluuiatilis cancer tritus, addito lasere, in uino potus. Confert uerbena recta, aut uiridis cataplasmatis modo imposita, aut sicca in puluerem pota. Conducit etiamnum puluis ex æqualibus partibus



partibus cumini, melanthij, & uiticis seminis confectus, & drachmæ pondere ex uino potus. Datur, & pastinacæ semen, quin & ponticæ nuces: quippe hæ non modo in cibum sumptæ; sed in cingulo quoque gestatæ, gestantem ab omni scorpionum ictu tutum reddunt. hæc ex Aetio. Commune & uulgare remedium est plagam perungere ipsorum scorpionum oleo. Proinde oleum nostrum de scorpionibus, cuius antea sæpenumero mentionem fecimus, hæc in curatione maximopere conueniet. Scorpionū ictibus Dioscorides præterea ea medicamēta, quorum hoc capite meminit, hæc quoque sparsim in superioribus libris mederi tradidit: nempe amomum melle subactum, fluuiatiles cochleas, nullum piscem recentem, smaridem muria asseruatam, diuulsas lacertas, domesticos mures concisos, tritici farinam uino aut aceto subactam, sonchi & intubi succum, ocimum polentæ admistum, anaracum ex sale & aceto, hieracium, laserpitij lacrymam, melissophyllum, chamæpityn: uerbasci illius folia, quod tantum aureum florem gerit, leucoij aurei semen: & polemoniæ radicem, cui tantam uim contra scorpiones inesse quidam tradunt, ut ij ab his non feriantur, qui eam gestauerint: quos, si fortè percussi fuerint, nihil tamen molesti passuros affirmant. Et hæc omnia prosunt tantum uulneri illita. Quæ uerò pota, uel deuorata auxilium præstant, eiusdem testimonio, hæc erunt: fluuiatiles cancri tritici, & cum asinino lacte poti: asinorum & equorum, qui in pascuis degunt, simum liquatum in uino, & potum: oxylapathi, & oxalidis semen ex uino aut ex aqua potum, agrestis lactuca: abrotoni hortensis, pastinacæ, hyacinthi, & urticæ semen: quin & olusatrum, & heliotropium, & cardamomum, & myrrha, & myrti baccarum uinum. E quibus omnibus cum plura possint confici antidota, pro uaria medicorum intentione, non operæpretium putato, uos hæc in re longiorem moram ducere, ut quæ potius peritissimæ cuiusque iudicio sit relinquenda.

Remedia a-  
lia ex Diosc.

## Pastinaca marina, scorpio & draco marini.

## Cap. XLV.

SI MARINA pastinaca percussit, protinus accidunt molesti dolores, assiduæ conuulsiones, lassitudo, & imbecillitas, mens percussis labat, postea obmutescunt: oculi caligant. Percussus autem locus in ambitu cum uicinis partibus denigratur, & ita obstupefcit, ut tangentem non sentiat. hunc si quis premat, atra sanies crassa, & malè olens exernitur. Ei qui marina pastinaca icitur, omnia, quæ de uiperarum morfu paulò pòst referemus, simili modo conueniunt. Peculiariter autem ictus à marino scorpione, & dracone inferuntur, qui molestos cruciatus cient: interdum autem, sed rarò, nomas excitant. Quibus absinthij, saluæ, aut sulphuris ex aceto tritici potio subuenit. Ipsi etiam disse-  
Eti, vulneribusque impositi, sui cuiusque ictus remedio sunt.

QUI à marina Pastinaca percussi sunt (ut testatum reliquit Aetius) his uulneris locus manifestè apparet. Sequitur autem dolor pertinax, & totius corporis stupor. Acutum enim, & firmum habet aculeum, quo uehementissimè ui in altum impulsio, nerui sauciantur. quapropter in aliquibus mors derepentè totum conuellens corpus comitatur. Narrant quidam, quòd si quis caudam pastinacæ, quæ ictum intulit, auferat, & in arborem maxime quercum, suspendat ac figat, ipsam quidem arborem arefcere, ægrum autem sanari, atque id iuxta contrariæ affectionis, & remediij rationem contingere. Id quod etiam asserit Nicander in theriacis, his planè uerbis. Trygonem, hoc est, pastinacam, itidem maleficum, mareque uastatē draconem accerere noui. Doloꝛe autem sic hominem afficit trygon, cum ob longis sageris defatigatum piscatorem aculeo suo ceciderit: uel etiam ramis arboribus infixus fuerit. nam tum arbor ea fit obscurior, ignobiliorque. Siquidem ab huius morfu, ceu solis æstu, eius & radices perditæ unà cum folijs flaccidæ redduntur, & arefcunt: homini uerò caro o putredine imminuitur. hæc Nicander. Ceterum auxilium sentiunt percussi, ut Aetius inquit, ubi stupor, & refrigeratio totius corporis consequatur, ex calidis illitionibus, & consini-  
libus cataplasmatibus. Proprie autem surfures aceto incocti, & pro cataplasmate impositi eis auxiliantur, & ipsum adeo acetum pro fœtu affusum maxime prodest. Magis autem conueniunt eis attractoria, & quæ tenuium partium sunt, ac calida. quo nimirum per attractoriam facultatem ueuenum ex profundo attrahatur, & per calorem frigiditas mitigetur, & quæ tenuium sunt partium, in altum proreptent. Ad hanc igitur rem in promptu habebis apta, sulphur uiuum urina ueteri subactum, marrubium, lauri folia, echium, radicem panacis, saluiam, & similia. At uerò si hæc desiderentur, fermentum acidum cum liquida pice emollitum inponito: mirabiliter enim auxiliatur. Dato item lauri decoctum, aut succum Cyrenaicum cum myrrha magnitudine fabæ, ac modico pipere terito, ac dato cum uino: aut silphium, aut laser ex uino: aut succi fici guttas quinque, cum tribus serpylli granis bibendas præbe. Hæc Aetius aduersus pastinacæ marinæ ictus auxilia reddidit. Ad quos præterea commendatur saluæ decoctum continuè pluribus diebus potum: quin & scordium in puluerem tritum, & ex sui ipsius decocto potum, itemque uerbenaca. Non tamē id prætermittenda est theriaca, aut Mithridatis antidotus, aut quinta nostra essentia, cuius iam sepe meminimus. Porro Nicander quoque nonnulla remedia protulit, quæ hæc sunt. Anchusæ folia, quinquefolium, rubi flores, arctium, oxalis, lycopstis, tordilum, chamæpitys, fagi cortex, agrestis pastinacæ semen, terebinthi fructus, phycus marinus, adiantum, synyrnium, eryngium, libanotis, cachry, & utrunque papauer.

Pastinacæ ma-  
rinæ ictus li-  
gna.

Pastinacæ ic-  
tus remedia.

## Mus araneus.

## Cap. XLVI.

AMVRE araneo percussis, circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigraque pustula, diluta sanie turgens, exurgit: proximæ partes liuent. Rupta pustula, depascens ulcus, non ei dissimile, quod serpit, occupat. Intestinorum quoque tormina, difficultas urinae, & frigida asperginis of-  
fusio



fusio consequuntur: Huius moribus auxiliatur ex galbano splenium, per se vulneri exterius impositum, vt medicamenti modo aceto tritum, & hordeacea farina cum aceto mulso illita. Quinetiam mus ipse, qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus sui veneficia luit. Resistunt quoque acini dulcis punici decocti, & illiti: item porri, & alia contrita, necnon aquæ calidæ fots: sed hæc ad locum pertinent. Prodest potum abrotoni decoctum, maximè si in uino detur. præterea serpyllum, & galbanum, & eruca vino madefacta: recentes cupressi pilulæ cum aceto, & cyclaminus ex aceto mulso, & pyréthrum cum vino, & chamæleonis herbæ radix. Nec desunt, qui literarum monumentis tradiderunt, tritum murem araneum contra suos ictus commodè bibi. Quam historiam apud alios inuentam, dignam duntaxat censuimus, quæ adnotaretur. Alij asseuerant, demorsum non aliàs exulcerari, nisi prægnans mus araneus fuerit: tum sanè auxiliari ferunt.

Muris aranei  
morsus notæ,  
& curatio.

Q V A N Q V A M Mus araneus, qui, quod colore mustele sit similis, Græcis μυζαλν dicitur, ab omnibus inter uenenata numeratur; attamen in agro Tridentino is nullam morfu infert noxam, quemadmodum nec scorpio. Historiam eius superius libro secundo retulimus. quare iam ad eius morsus notas, & remedia progrediamur. Demorsus itaq; ab eo (ut Aetius inquit) uulnera manifesta sunt: quadrifido enim ordine illata uulnera conspiciuntur: & sanguis quidem primum purus promanat, paulò post uerò saniosus. animal enim ipsum putrefactione occidit. Consueuerunt etiam bullæ insurgere, quas si quis disrumpat, carnem subiacentem seculentam offendet, & fistulis disparatam. Inflatio autem sequitur demorsos. Cæterum hoc animal frequentius ad testes insilire solet, eosq; uerbere impetere, non hominis modò; sed cuiusque etiam bruti animantis. Auxilium autem ferunt cum ob putrefactionem periclitantur demorsi, post prædicta communia remedia, lauri tenella folia, unius aut duarum drachmarum pondere, trita & ex uino pota. Conueniunt etiam ipsis omnia communia uenenorum remedia è uino dulci in potu sumpta. In pecoribus uerò & iuuentis illa ipsa cum aqua trita, naribus infunde: est enim ipsis præsens remedium. Vnde etiam hominibus similiter in potu exhibeto. Morsus porro cumiuo, & allio, putamine extrinseco non abiecto, contegatur. Eadem etià cum oleo trita assidue ac diligenter locis circumscriptis illinantur. Si uerò ruptæ fuerint bullæ, & ulcera oborta, acida muria proluatur locus, aspergaturq; subinde usti hordei puluere. Verùm non rumpentur, nisi prægnans fuerit mus araneus, qui morsum inflixit. Quod si exulcerentur, mali punici dulcis putamen coctum tritum erit imponendum, & ulcera ex eodem decocto, aut magis myrti decocto proluenda, fouendaq;. Strato uerò inquit, in muris aranei morfu primum scalpello, circumquaq; uulnerandum esse locum, & murem subinde araneum istum cum aceto imponendum, aut sinapi tritum, & aceto exceptum. In potu uerò opem ferunt panax, eruca, capparis cortex, gentianæ radix, & recta uerbenaca, omnia ex uino pota, aut in cataplasmate conformata, & morsibus illita. Prosumt & maluæ folia imposita, & magna antidota potui data.

## Vipera.

## Cap. XLVII.

SI VIPERA momordit, corpus intumet, uehementer arefcit, subalbidumque colorem concipit. Sanies à vulnere profunditur, primum subpinguis, mox cruenta. pustulæ adustis similes erumpunt: & antea depascens vlcus, quod in proxima repens, non summa modò corporis: sed intima quoque corripit. Gingiuæ ijs cruore suffunduntur: inflammatio circa iecur erumpit: tormina, & biliosi vomitus sequuntur. Sopor, tremor, & urinæ difficultas accedit, & frigidus sudor ostenditur. Vbi uerò uipera morsum impressit, sinum caprinum cum uino, studiosè impositum opitulatur. item laurus & abrotonum, & galbanum splenij loco superiectum, & origanum uiride inditum. pulli gallinarum discerpti, & confestim admoti: crui farina uino subacta: radicis cortex usque còtus, vt in puluerem solutus abeat, & scilla tosta: detritum chamæmelum, hordeacæ farinæ cataplasma in aceto mulso præparatum, sed locus antè eo calido foueatur. hæc loco imponuntur. Contra uiperinos ictus rubus cum uino prodest. Aliqui anchusam tenui folio constantem auxiliari produnt. Leporini coaguli in uino terni oboli bibuntur, & porracei succi hemina in mero, & foliorum apiastri succus, & syluestris ruta. hæc in uino potari debent. Vinum frequenter bibendum, allia mandenda, & cepæ, & porri recentes, fassamenta acerrima, & opipara. simplicia hæc sunt. Percussis à vipera præclare auxiliatur medicamentum, quod myrrhæ, piperis, castorij, floris portulacæ seminisque, dimidio acetabulo constat: hæc omnia in Cretico passo teruntur, aut in alio probato. Erasistratus in eo libro, qui περὶ συνάμνων, id est de uiribus, inscribitur, pleraque alia tradidit, quæ ictis à vipera auxilium ferre possunt: inter quæ talia maximè laudantur. Gallinacea cerebella cum uino pota, semen satiuæ brassicæ tritum, & acetabuli mensura cum uino potum. Quinetiam bonum est digitum in liquidam picem intingere, deinde uinum, quo digitus fuerit elutus, bibere. Hæc sunt quæ contra uiperæ ictus auxiliantur.

Viperarum  
morsus indi-  
cia.

V I P E R A R V M historiam exactius, ut puto, latiusq; libro secundo tradidimus, quàm ut operæpretium sit hic eandem repetere, uel plura nobis supersint addenda. Quare tantum reliquum est, ut iam de eorum morsus indicijs, & remedijs differamus. Reperiuntur itaq; in eis (ut Aetius memoriæ prodidit) quos uipera mas momordit, uulnera in loco bina: in his uerò qui à foemina demorsi sunt, quaterna. Primum autem ex eis excernitur sanguis, deinde sanies sanguinolenta, & oleosa. Adest tumor biliosus, feruidus, bullosus, subruber, deinde liuidus, denigratus, &



tus, & proserpens. Siccitas uehemens inest ori, ardor, exolutio, & frigidi horroris insultus, aliquādo et bilis uomitus tormina, capitis grauitas, uertigo, pallor, singultus, febris, spiritus & anhelitus celer, color plumbeus, & frigidus sudor. Mors in horis septem, aut ut longissimè absit, tertia die, in his qui non seruantur, & maxime his, qui à uipera fecmina sunt icti. hæc ille. Quæ omnia Nicandro accepta referri possunt: siquidem is in theriacis ita ad Latinū sensum scribit. Hinc luctū à uipera manantē uiatores diuulgāt: duos enim instar nerui acutos in faucibus dentes in ore suo uirus eructantes, ostentant: uipera uerò fecmina semper plures exerit, per uicioso suo ore insultans. Atqui in carne icti faciliè latos dentes perpendas. Porro è uipera inflicta plaga sanies aliàs pinguedini similis, aliàs cruenta, interdum sine ullo colore conspicitur. Sed quæ ulcus ipsum caro circumdat, germinans graui offert sese tumore: interdū rubens, tumq; palam liuida cernitur: quandoq; etiam aquosum onus concepit. Frequentes præterea bullæ, ceu uacui per ignē tumores, perinde ac corpus igni sit ambustum, in cute supernè ebulliunt. illic subinde putredines circumcirca accurrunt, aliæ quidem seorsum à uulnere, aliæ circa plagam ueneno non dissimilem mortem edentes. Aspera itaque noxa, uehementerq; ignescens totum corpus exedit: hic per guttur, atque collum cocuntes sonitus, agminatim strepūt: quinetiam oculorum uertigine mæret. Illicoq; membri grauians imbecillitas, & lumbis anxietas uenit: at in capite caliginosum omnis consistit. Atqui laborans ille aliàs siti aridum guttur suum exiccat, sæpeq; ex uugibus eum frigus tenet. Hyberna autem uiue exuberans gaudio, omnia membra degrauat. Crebrò etiam biliosos uentris sui tumores expuit, toto corpore pallens, ac humens circa membra sudor uiuis iactu frigidior circumfunditur. Colorem interdū liuidi plumbi gerit, aliàs obscurum, mox floribus similis est æris. hæc Nicander. Præstat igitur (ut Aetius auctor est) priusquam cruenta prodeat urina, allij plurimum deuorare, & uinum meracum copiosum bibere, excisatis subinde uomitibus. Efficacissimum enim eis remedium est allij esus, ac meracior uini potio, inquit Archigenes, adeo ut si quis multum eius sustineat usus, itemq; meri potum, nullo alio auxilio opus habeat. Conuenit itē maxime theriaca ex uiperis sine dilatione pota, & uulneri illico superposita. Quia & ipsa uipera excoriata, capite, & cauda abscissis, interaneis omnibus reiectis, anguillarum modo cocta, & à demorsis deuorata, maximum ictis præsidium offert. Caput autem à uiua amputatum, diligenter per uolsellam prehensum, morsuiq; impositum, ea parte adhuc calente, quæ ceruicem contigit, uenenum id mirificè extrahit. Conducit & dissectam gallinam adhuc internè calentem morsui imponere, idq; alijs pariter dissectis, frequenter, & assidue repetere. Oportet etiam scalpello per ambitum demorsum locum circumcidere, & cucurbitulas subinde admouere. A cucurbitulis foliorum fraxini succus in potu exhibendus est, & expressa à succo folia uulneri illinenda: est enim ualde efficax ad uiperarum morsus fraxinus arbor. Melissophylli item folia, & succus tum ex uino potus, tum uulneri exterius illitus, euidentis auxilium confert, etiam si iam moriatur æger. Auiunt præterea, si quis melanthij drachmas quatuor edat, non moriturū. Similiter etiam melaphroditos herba efficax est, & cancri fluuiales cum lacte triti, & poti, & uulneri adhibiti. Magnificè etiam profunt rane coctæ, & in cibum sumptæ, & iusculum earum subinde bibitum. Præstat et nasturtium plurimum edere, uel tritum ex uino bibere. Facit autem ad id mirificè testudinis sanguis exiccatus, & cum syluestri cumino potus. Utendum etiam omnibus communibus remedijs, supra sæpius relatis: quippe superuacaneum fuerit eadem tam sæpe repetere. Maxime uerò utendum est anchusæ radice, & heliotropio cum uino. dandus & hematites lapis. Auxiliantur & raphani in cibo accepti, & deinde uomitu reiecti, exhibita statim à uomitu Andromachi theriaca. Post scarificationem, & gallinarum impositionem, uulnus ex trifolij bituminosi decocto calido, diu proluendum ac fouendum est: non si pauco id tempore fiat, demorsi peius afficiuntur. Deinde porrum & panem cum sale illini conuenit, aut allium cum aceto, aut ipsius exusti, aut fraxini cinerem, aut alium quēuis cum aceto, aut hastulæ regie, aut sycomori folia cum pane: aut lauri tenellis folijs, coctis & cum oleo tritis integatur locus, aut caprino stercore, priusquam claudatur. Cæterum, ut libro de theriaca ad Pisonem auctor est Galenus, non modò è uiperarum morsibus retribuitur uenenū appposito tantum, ut Aetius inquit, uiperæ capite: sed ipsa quoq; uipera tota contusa, & uulneri imposita. Contra uiperarum morsus mirificè medetur echij epotus succus, herbaq; ipsa uulneri imposita, ut superius libro quarto prodidimus, illius Alcibiij historiam referentes, à quo echium Alcibiadis cognomen accepit. quandoquidem planta hæc (ut ipse Dioscorides testatur) facultatibus adeo præstantibus insignitur, ut epota eius radix ex uino, non percussis modò à serpentibus opituletur: sed eos quoq; qui antea biberint, feriri non patitur. Commendauit etiānum aduersus uiperarum morsus Dioscorides sparsim in suis de medica materia libris, præter ea quæ hoc capite retulit, alia præstantissima simplicia medicamenta, partim exterius applicanda, partim bibenda, uel comedenda, quorum nonnulla hic subiiciam. Vulneri igitur exterius illita conferunt, iuniperi, & fraxini folia, tritici fursures ex ruta decocto incocta, erui farina uino macerata, scilla ex aceto feruescens, personatæ, ebuli, & sambuci radices in uino elixatæ, sarmentitius cinis aceto subactus, aliq; complura, quæ breuitati studentes nunc silentio inuoluimus. Pota uerò profunt casia odorata, costum, myricæ semen, pistacia, cerui genitale exiccatum, tritum & potum, chondrylla, anagallidis succus, ferule medulla, aparine, rubiæ radices, & terrestris tribuli succus: auxiliatur etiam bryonie radix. Admirandos insuper præbet effectus radix illa, quam Goritienses ab auxiliari eius ui Serpentianam uocant, cuius historiam, pariterq; usus rationem superius libro secundo tradidimus. Verum præter hæc præsentaneo remedio sanat nostra quinta essentia, cochlearis mensura pluries eodem die pota: item oleum nostrum de scorpiionibus, de quo etiam sæpius dictum est, ea ratione inunctum, quam superius ipsius conficiendi modum describens retulimus. In uiperarum quoque genere ea nimirum immanis fera recenseri potest, quam AMMODITEN uocant, cuius etsi nusquam, quod extet, meminerit Dioscorides; minimè tamen silentio prætereundum est, quia hæc eiusq; ueneni remedia describantur. Siquidem Ammodita, meo iudicio, in pluribus Italiæ & Illyriæ locis reperitur, præsertim in Goritiensi comitatu, & Iapidie montibus. Est enim fera hæc uiperæ omnino similis, præterquam quod capite sit ampliore, & maxillis latoribus, quodq; ultimo rostro superiori parte eminentiam quandam habeat,

Viperarum  
morsus reme-  
dia.

Simplicia me-  
dicamenta ex  
Dioscoride.

Ammoditæ  
historia, &  
uenefica uis.



Ammodite  
morsus signa  
& curatio.

Sepis feræ cō  
sideratio.

Sepis morsus  
signa, & reme  
dia.

Acontia hi  
storia, mors  
sus notæ, &  
cura.

acute uerrucæ similem. Vnde circumsoranei, qui serpentes eorumq; ueneni remedia profitentur, hanc feram uulgò appellant Aspidum del corno, hoc est, Aspidum cornutum. Neq; sanè ineptum illi nomen indiderunt: naq; non minori cum uelocitate interficit, quàm aspis. Scimus enim quosdam ab his inopinatè demorsos, tribus tantum horis morte occubuisse. Proinde scite libro XIII. cap. XXV. de eo ita scriptum reliquit Aetius. Ammodites magnitudine quidam cubitalis est (maior enim non pingitur, neq; scribitur) colore uerò arenosus, per corpus autem maculis nigris insignitus: caudam habet præduram, supernè discissam. A quibusdam uerò Cenchrias, hoc est miliaris, ob caudæ instar milij duritiem, appellatus est. Latiores autem maxillas, quàm uipera habet, cumq; in multis, alijs ei similis sit, colore magis discerni potest: uipera enim subflaua est. Cæterum ab Ammodite percussos festina ut plurimum mors sequitur. qui uerò tam breui non pereunt, his sanguis è uulnere manat, & uulnus intumescit: sed paulò post sanies effertur, sequiturq; capitis grauitas, & animi deliquium. Qui uerò optimè dispositi sunt, & robusti, in tri-  
duo intereunt: quanquam reperti sunt, qui in septimum usque diem durarint. Celerius uerò mors aduenit his, qui à femina sauciantur. Auxilium porro & ij ferunt, primum quidem à communibus remedijs, utpote ab adfixis cucurbitulis, circunciso prius per ambitum uulneris loco, & superioribus partibus arctissimis uinculis cōstrictis: quin abs-  
scissa, dilatataq; statim scalpello plaga. Proprie autem eis auxiliatur mentha ex aqua mulsa pota, castorium, castia, & artemisie succus cum aqua. Danda etiam in potu theriace, necnon uulncri eadem illinenda. Utendum & empla-  
stris attractorijs, & subinde cataplasmata, quæ ad nomas siue ulcera serpentia conducunt, imponenda. Vipere præterea similis, ut quidam tradunt, ea etiam fera fuerit, quam SEPA nominant, cuius historiam superius libro secundo retulimus. quanquam inibi Dioscorides Sepem lacertæ generi assignauit, unde & eam lacertam Chalcidicam à quibusdam uocari tradidit. Itaq; cum uaria sit apud auctores Sepis historia, facile adducor, ut credam, Sepa reperiri non modò in lacertarum, sed etiam in mortiferarum serpentium, & uiperarum genere. Quod sanè uidetur  
asserere Nicander in theriacis suis. Siquidem cum inquit primo, Præterea ninalis, & asper admodum mons Othrys  
rubentes bestias profert, canaq; uallis, & salebrose rupes, neuorofumq; promontoriū, ubi stibidus ingreditur Sepes,  
colore nunquam uno uisus, &c. haud dubiè ostendit serpentem, immanemq; feram se representare, non autem la-  
certam. Cum uerò secundo ait, Sepem item corpore demisso, exiguis haud dissimilem lacertis, declinabis; nulli dis-  
similium est, quin eam descripserit, quam Chalcidicam lacertam uocant. Nicandro subscribit Dioscorides, quippe qui est  
libro secundo ea ratione Sepa statim post lacertas reddiderit, quòd lacertis corpore, & forma sit similis; attamen li-  
bro quinto, Sepa uiperarum generi adscripsit, ubi de aceti mulsi uiribus differens, inquit. Acetū mulsum contra mor-  
sum eius uiperæ, quæ sepam uocant, haustum meconium, ixiannæ auxilio est. Aetius tamen eius Sepis tantum memi-  
nit, quæ inter mortiferos serpentes, uel uiperæ genera recensetur, his uerbis. Serpens, qui Sepes appellatur, longitu-  
dine quidem duorū cubitorum reperitur: ex crasso autem in tenuem abit: recta uerò ac tardè proserpit. Caput habet  
latum, os acutum: uniuersum autem corpus multis albis notis respersum. Sed aliter de Sepis forma, magnitudine, et  
gressu tradidit Pausanias, ut superius libro secundo suo loco adnotatum reliquimus. Cæterum ab ea percussis (ut  
tradit Aetius) sanguis è uulnere manifestus excernitur, & paulò post sanies graueolens, tumor, & dolor segnis est:  
sed affectæ partes putrefactæ dealbantur, & totum corpus utiligini, quæ alphas appellatur, simili colore inficitur.  
Pili, capilliq; è toto corpore defluunt, atq; intra tres, aut quatuor dies isti pereunt. Porro opem & hi sentiunt ex  
ijsdem rebus, quæ in uiperæ, & cerastæ, & ammodite morsu relatæ sunt. Exhibenda est præterea portulaca pluri-  
ma in cibo, & uinum bibendum myrtites meracius. Conueniet item spongiam calido aceto imbutam, morsui imponere,  
& ex butyro cum melle locum illinire, aut milium cum melle, aut paleas unā cum terra, quæ eis adheret, exu-  
stas imponere. hæc Aetius. Ex quibus facile conijci potest, cum ambæ hæ feræ è uiperarum sint genere, ijs tutò an-  
tidotis earum uenenum superari posse, quibus uiperæ frangitur, & euincitur. Sed quoniam hæc humane uitæ  
tam inimica animalia aliam admodum perniciosam feram mihi in mentem reuocarunt, quæ Græcis ideo ACONTIA  
appellatur, quòd iaculi, uel sagittæ modo in hominem proflinat, cum nihil de ea à Dioscoride memoriæ proditum sit,  
sciuerimq; & hanc in Italia reperiri, non alienum duxi de eius historia ac ueneni curatione ea hoc loco commemo-  
rare, quæ ex probatis auctoribus excerpfi. Hanc itaq; describens Galenus libro de theriaca ad Pisonem, inquit.  
Acontias serpens, ubi se multum extenderit, ceu iaculum quoddam corporibus insiliens, sic perimit. Hæc, ut Ae-  
tius scriptis tradidit, serpens est duorum cubitorum magnitudine, figura autem crassa in tenuem abeunte, colore  
uiridi, præsertim iuxta uentrem, ut milium colore referat, unde & cenchrias, hoc est miliaris, appellatur. Aiunt  
hanc fortiolem fieri, cum milium floret. Porro ubi se ad lædendum parat, extendit se ipsam, ac ueluti iaculum vi-  
bratum corporibus inuolat, atque hoc modo uerberat. Ab huius morsu omnia, quæ de uiperæ dicta sunt, sequuntur  
accidentia, atq; etiam grauiora, adeo ut etiam putrefactiones & carniū defluxus consequantur, ac grauior item  
mors succedat. Cæterum remedia similiter eadem, quæ ad uiperæ morsum bis conducunt. Est qui referat inter re-  
centiores non obscurus auctor, quòd cum pastor quidam misellus, sub cuiusdam arboris umbra æstate media quietem  
somnumq; caperet, cuius socij non procul oues pascebant, ab Acontia, quæ in arborem ascenderat, ita percussus fuit  
in sinistram manumillam, ut illico perierit. At socij audito percussione sonitu, uiso serpente, quem nouerant, super  
defuncti pectus, relicto grege in propinquum rus, pauore territi, aufugerunt. Reperitur hoc seuissimæ serpentis ge-  
nus, ut quidam mihi retulerunt, in quibusdam Calabria, & Sicilia locis, ubi ipsum incolæ à sagitta Sactone nera  
naculo nomine appellant.



## Cæcilia, &amp; Amphibæna.

## Cap. XLVIII.

CONSIMILIA suprâ dictis in vipera eueniunt ijs, qui à cæcilia nomine, & Amphibæna demorsi sunt, eademque ferè auxiliantur. quare hoc venenum priuatam descriptionem sortitum non est, neque visum est dignum, quod alio genere comprehendatur. De ijs autem mentionem hoc loco fecimus, quoniam ferè remedijs ad viperas scriptis, percussi ab eis adiuuari soleant.

NON desunt, qui scripserint, Amphibænam præter naturæ institutum duobus cum capitibus gigni, quæ utraque serpentis extremitatem occupent: fieriq; ob id putent, ut fera in utranque partem repat. Quod tamen fabulosum censemus: nam & hydrae poetæ, septem capitibus constare fabulantur: id quod uilominus falsum est. Veruntamen non negauerim ego id monstruosè, & præter naturæ intentionem euenire non posse in omni serpentium oniparorum genere, quemadmodum & uolatilium. Siquidem pluries compertum est, ex uno tantum ouo duobus uitellis refoeto, nasci pullum modò habentem quatuor alas, modò totidem crura, totidemq; pedes: atq; etiam lacertæ uise sunt aliquando bicipites. Sed hæc non utiq; statuunt, haberi aliquod serpentium genus naturæ biceps. Hoc scitisimè, & apertissimè confirmat Aristoteles libro, & cap. III. de generatione animalium, sic inquit. Monstra rarò admodum fiunt in ijs, quæ singulos pariunt, sed crebrius in ijs, quorum partus est numerosus, & præcipuè in auium genere, potissimumq; in gallinis. Iis enim partus numerosus, non modò quòd sæpe pariant, ut columbæ; uerum etiam quòd multos simul conceptus intra se contineant, & temporibus omnibus cocant. Hinc gemina etiam pariunt plura: coherere enim conceptus, quoniam in propinquo alter alteri est, quomodo interdum fructus arborum complures. Quòd si uitella distinguuntur membrana, gemini pulli discreti sine ulla superuacua parte generantur. Sed si uitella continuantur, nec ulla interiecta membrana determinantur, pulli ex ijs monstrosi prodeunt, corpore, & capite uno, cruribus quaternis, alis totidem. quoniam superiora ex albuntine generantur, & prius: (uitellum enim cibo ijs est) pars autem inferior postea instituitur. quanquam cibus idem, indiscretusq; suppeditatur. Iam serpens etiam biceps uisus est, uidelicet eadem de causa: nam id quoq; genus oua parit, & multa numero. hæc Aristoteles. Quæ sane mihi facile persuadent, ut credam, omnino falsum esse, quòd Amphibæna ex sui generis natura biceps perpetuò nascatur. Verum quandoquidem hoc serpentis genus terrestrium lumbricorum modo utrisq; extremitatibus, capite scilicet & cauda, acuminatis gignitur, adeò ut difficillimè possit caput à cauda discerni, existimauere quidam hanc feram duobus constare capitibus. Proinde Aetius lib. X III. cap. XXVII. scribit, Scytalam (hanc alij Cæciliam interpretantur) & Amphibænam animalia esse inter se similia. Non enim, inquit, ex crassis in caudā tenuem abeunt, sed æqualis crassitudinis in uniuersum existunt, ut neq; cognoscant uidentes ea, iuxta utram partem caput aut cauda sint sita. Quod equidem tum in terrenis & alui tinea, tum in erucis quibusdam, tum etiam in birudinibus conspicitur. Differt autem, ut idem tradit, amphibæna à scytala, quòd illa ex utraq; parte progrediatur, unde à Græcis illi nomen inditum est. Galenus porro libro de theriaca ad Pisonem, Amphibænam bicipitem esse existimat (si tamen liber is adscriptitius non est) ut hæc uerba, quæ in eo leguntur, aperte ostendunt. Amphibæna (est autem animal biceps, quemadmodum sanc & nauigia utrinque proram habentia, cui natura ex superfluo substantiæ bina capita est largita) hoc inquam animal, aiunt, si mulier grauida supergressa fuerit, malè abortum facit. hæc ille. Ceterum, ut ipse Aetius scriptum reliquit, ab utraq; demorsis contingit morsum obscurum esse, ac uix apparere, ueluti sunt muscarum ictus. quapropter etiam si mordeant, non enecant tamen, sed inflammationem excitant, ut apum & æsporum stimulus. Quare transferantur ad hos quoque, quæ de illis sunt relata, uerum facultate intensiore. Ex his etiam Aetij uerbis conijci potest, cum horum animalium ictus admodum tenuis, & obscurus sit, Amphibæne caput inesse terrenis uermibus, uel alui tinea persimile: ac proinde adeò etiam caudæ æmulum, ut alterū ab altera non nisi difficilè discerni possit. Cæciliam autem Hetrusci uulgò appellant Lucignola. Amphibæne corium, auctore Nicandro, oleastri baculo circumuestitum, si manibus frigore torpentibus tractetur, calorem statim adfert, articulorumq; nexus dissoluit.

Amphibæna, & cæciliæ consideratio.

Amphibæna biceps nō est.

Vtriusq; morsus signa, & curatio.

## Dryinus.

## Cap. XLIX.

A DRYINO morsis pustulæ, molestiq; dolores incidunt, præsertim quæ dilutæ saniei emissarium subest: quinetiam erosio, torminaque consequuntur. Ab eo ictis conuenit aristolochia cum vino pota, trifolium herba, radix hastulæ regiæ similiter assumpta, & fructus ex omni glandiferarum arborum genere: & tusæ ilicis radices, & illitæ parti ictæ auxiliantur.

DRYINVS, ut interiacis testatum reliquit Nicander, in quercubus latebras parat, aut alicubi in concauis fagis, in montibus uersatur. Appellant eum alio nomine etiam hydram, sed & alij chelydram, qui relictis bryis, palude, suæq; naturæ idoneo lacu uenatu intercipit in pratis molurides, & ranas. Hic si à myope nufca illa queuis animalia prouocante, petatur, insuetum illum impetum suscipiens, cum concauæ quercus robur celeri saltu subit, strueto sibi in imo cespite cubili. Candet tergo, caput illi æquale, adeoq; hydro simile: grauis autem factor à corpore eius euaporat. Quemadmodum quando incurua, necnon abrafa corij præseginina sub teretibus ferramentis circa humen equorum exuias, & pelles hument. Si quempiam is uel in talem, uel pedis plantam percusserit, à corpore isti hominis

Dryini historia, & eius ictus notæ ex Nicandro.



Ex Galeno.

Dryini descri-  
ptio, & mor-  
tus curatio.

minis difficilis odor sparsus fertur, atq; circa ictum niger in acutum surgit tumor, mentemq; moerentis angor, & tri-  
stitia, quibus detinetur, obscurant. Species nimio dolore conflaccescit, & perit: cutis cum corpore admodum male  
olet, adeo ipsum atrum uenenum semper depascens consumit: quin & caligo lumina eius obfusca, occultansq;, ma-  
le affectum perdit. Alij à dryino icti caprarum instar seu ouium balant, ac omnino difficiles redduntur, impendioq;  
cruciantur. Urina eis decutitur, & pallescit. Ipsi uero dormitantes stertunt, frequentibus singultibus correpti, alijs  
per collum uomitum felli similem, alijs cruentum eructantes, ipsumq; malum acrem sitim generat: postremo laboran-  
tibus membris tremorem effundit. hæc Nicander. Cæterum Dryini nomen huic feræ mortifera inditum est, quod in  
quercuum cauernis, quæ prope radices sunt, stabuletur. Græcis enim quercus δρυς dicitur. Proinde Galenus libro  
de theriaca ad Pisonem, de dryino ita scribit. Dryinus serpens sic nominatus, quod in radicibus quercuum uiuat, tam  
malignus ad perdendum proditur, ut eius, qui supergreditur imprudens, cutis à pedibus excorietur, tota crura ad-  
modum intumescant, & quod magis mirificum est, manus quoque ipsæ curantium eodem modo periclitentur. Si autem  
tem quis aggrediatur eum perimere, olfactu adeo mulctari aiunt, ut quemlibet gratū odoreni prauum esse existimet,  
nec alterius præterea rei queat sentire. hæc Galenus. Dryino, ut Aetius inquit, abundat Hellefontus. Is la-  
tibula in quercuum radicibus habet, atque adeo foetidus est, ut etiam si quis eum non uideat, foetore loci cognoscatur.  
Est autem cubitorum duorum longitudine, obesus, ac asperrimis squammis circa uniuersum corpus munitus. Porro  
qui ab eo percutiuntur, his tumor insurgit nigricans, dolor uehemens, nomæ, delirium, corporis siccitas, singultus  
biliosus uomitus, aut omnino simplex, urina suppressio, tremor, interceptio uocis, stupor, scissura, & mortifica-  
tio percussorum locorum: plurimi etiam intereunt. Porro & hi quoque ex ijs, quæ in uiperæ morsu dicta sunt, opem  
sentiunt: itemq; ex communibus remedijs iuxta consequentium acceffionum proportionem adhibitis.

## Hæmorrhous, &amp; Dipfas.

## Cap. L.

AB HÆMORRHO ictis vehementes cruciatus accidunt, qui angusta, contractaque corpo-  
ra ex continuo dolore reddunt. Ex plaga copiosus sudor effluit, & quacunque parte corporis cicat-  
rix vlla fuerit, ea sanguine manat. Excrementa per aluum cruenta eiciuntur, profluensque sanguis  
in globo coit. A pulmone sanguinem extulsiunt, & in vomitiones effusi sine remedio commoriantur.  
Quos verò dipfas percussit, solutus ac non constrictus tumor premit, sitisque vsque eò perti-  
nax, ut satiari non possit, ac sine vlla intercapedine excruciet: & si potum pleno ore affatim trahant,  
illico in eandem sitim relabuntur: proinde toto habitu similes sunt ijs, qui antea potus nihil haufe-  
rint. quare propter continuam sitim, & præter, & caufon, aut dipfas appellatur. Hemorrhoi, di-  
pfasque morsus velut immedicabiles à plerisque maiorum deplorati relinquebantur. quare si pe-  
culiaribus contra dipfadem remedijs egeamus, communia experiri operæpretium erit. Protinus au-  
tem scarificatione uti, vftionem facere, & si locus patiat, extremorum amputatione opus erit:  
consequenter quàm acerrima cataplasmata admouere, de quibus sæpenumero diximus. Nec me fu-  
git, acres cibos, maximè à falsamentis, viles esse. Meracæ potiones, & lauacra profunt, quæ subin-  
de interiecto breui spatio assumenda sunt, priusquàm morbi genus emerferit. quo semel erumpente  
opem ferre non potest vlla medici opera. In ictu hæmorrhoi eadem profunt. Insuper quæ in com-  
mune opitulatur, ut scarificationes, vftiones, acres cibi, meraci potus, & quæ nunc in dipfada de-  
finiuimus. Quinetiam decocta vitis folia, & cum melle trita.

Hæmorrhoi  
perniciosis  
ictus, & histo-  
ria.

HÆMORRHOS, & Hæmorrhoi, auctore Galeno in libro de theriaca ad Pisonem, suis ipsorum nomina-  
tibus similem hominibus perniciem inferunt. quippe percussi, sanguine per os, & nares, totoq; corpore effuso, inter-  
eunt. Hic (ut in theriacis cecinit Nicander) petrosas rimas assiduò incolit, asperum, supinum, & modicè pendens  
lectum illic sumens, ubi tractum suum habeat, deinde pabulo satur fiat. Longitudo eius pedis uestigio æqualis:  
cæterum quod ad latitudinem attinet, à capite adusque caudam totus & subtilis, & minutus est. Alijs colore igneo,  
alijs rursus candens. Collum satis constrictum est, gracilis cauda necessario in arctum contracta, extenta est angustè,  
& tenuiter. Supra eius frigidus, & niuales oculos, duo cornua fronti sunt infusa: albore luminum suorum, locu-  
stis uel syluestribus apibus par. Insuper horribile, & asperum ei caput horret, obliquè modico corpore suo instar  
cerastæ claudicans. Ex medio etiam dorso paruum nauigium semper appellit, ad terram uentrem suum atterens:  
squamis uero & itinere parū substrepat, perinde ac arundinis copiam transeat. Post ictum statim decolor species acci-  
currit, nigra nimirum, corq; ipsum dolore circumangitur: uenter aqua refertus effluit. Quin & prima nocte sangui-  
s cum ex naribus, tum collo, & auribus salit, recens bilioso ueneno coinquinatus: lotium item rubens accurrit. quæq;  
in corpore sunt uulnera, & plagæ, hæmorrhoi rumpuntur aperiunturq;: cutes enim fuligine contrahuntur. Caveas  
itaq; in primis, ne in te fœmina hæmorrhoi uirus suum iaculetur. Nam si cui morsum illa inflixerit, ei gingiua simul  
ignescunt, penitusq; & unguibus sanguis cum impetu procurrit. Dentibus etiam ex ea cæde graecolentes, seu humen-  
tes molunt. hæc ex Nicandro. Cui subscribit Aetius, sic inquit. Animalia hæc (hæmorrhous, & hæmorrhoida  
intellige) colore quidem sunt arenoso, magnitudine autem tres palmos æquant, & in tenuem caudam angusta figura  
paulatim desinunt. Sunt autem igneo oculorum fulgore, rectaq;, & tardè proreptant. Per corpus uero multis notis  
albis, & nigris uariiegata sunt, & asperioribus squamis obfita: quapropter dum serpunt, sonus auditur. Et fœmina  
quidem uentri incumbens, per terram reptat, & gressum infernè circa caudam firmat: mas uero circa uentrem in-  
gressu



gressu nititur, & collum serpendo extendit. Consequitur horum morsum color icti loci cruentus, coloris tetri, & nigricans: ex quo nihil in initio effluit, præterquam paucū quiddam aquosum. Venter dolore tentatur, adestq; spirandi difficultas. Deinde sanguis ex naribus profluit, & ex ipsius morsus foraminibus: & si qua in corpus obducta iuncta sit cicatrix, ea rumpitur, & sanguinem profundit. atq; hæc quidem in maris Hemorrhoi morsus contingūt. A sceminæ uerò Hemorrhoidis morsu ad hæc & anguli oculorum, dentium gingivæ, & unguium radices sanguine manant, & ut simpliciter dicam, per omne corpus sanguinem efferri contingit. Dentes præterea excidunt, & gingivæ putrescunt. Horum porro curam facere oportet, primum quidem sanguinis eruptioni obluendo ac resistendo ijs medicamentis, quæ apte sanguinem sistere possunt. deinde cataplasmata plagæ imponendo ex folijs uitis costis tritis cum melle, & portulicæ folijs cum polenta. Antea uerò quam cruenta prodeat urina, alij multum deuorent, multumq; uini diluti bibant, & ad uomitum cogantur. deinde confestim theriace exhibeatur, & postea pisces multos, alijs tritis cum oleo tinctos edant. Sumant item in cibo panē, & uinā passam dulcem, & deinde uino diluto largē hausto uomant. Plaga uerò aqua frigida proluatur: uesica autem spongijs calidis foueatur. Sed iam de Dipsade dissectam, quæ sic à Græcis dicta est, quod continuam, & inextinguibilem sitim excitet. Huius mentionem fecit Galenus libro XI. simplicium medicamentorum, ubi eiusmodi feras in Lybia, non in Italia reperiri scribit: quod hæc regio humida sit, illa uerò siccissima. Hoc autem à Marsis, qui Romæ uiperas uenabantur, accepisse ait: quibus tamen non in omnibus fidem adhibendam esse existimat. Quare longē minus nos ijs circumforaneis fidē præstare debemus, qui Marso hosce imitati, diui Pauli generi se adscribunt, seq; inde ortum duxisse prædicant. Nam si Galeni etate hi mendacissimi nebulones uniuerso orbi imponebāt, ueri quidem simillimum est, eos qui bodie per Italiam uagantur, longē magis decipere posse, quam fecerint Marsi illi antiqui. quippe non dubitandum, quin eorum astus à Galeni seculo in hunc usque diem protractus, maximum suscepit incrementum, quod constat mortalium ingenia tam in bonum, quam in malum procliuia, etate magis acui. Meminit etiam Dipsadis Galenus libro de theriaca ad Pisonem. sic scribens. A dipsade communis causo febris malè conficiuntur. nam & multa sitis, & æstu uehementi uexati, interdum & dirupti, diem obeunt. His Galeni uerbis subscribit Aetius lib. XIII. ubi sic inquit. Dipsas, quæ à quibusdam causus appellatur, uiperæ est species, quæ magis in maritimis locis reperitur, quam alibi, magnitudine cubitali, ex crassa in tenuem desinens: notas autem habet per omne corpus fuluas, & nigras: caput uerò angustius. Sequitur autem ab ea demorsos, præter ea quæ de uipera dicta sunt, & sitis intolerabilis plane, adeo ut etiam si nullus potus eis adhibeatur, sitis non sedetur: & tamen neque per urinas, neque per uomitum, neq; per sudores quicquam excernitur. Duobus igitur pereunt modis, aut ob multam sitim exusti, si potum non sumant: aut ob multam potus repletionem distensus rumpitur uenter, uel inferne circa inguina, uel circa inuim uentrem, ut in aqua inter cutem sepius euenit. Ceterum & his, cum à uipera demorsis, auxiliamur: propriè autem in his potiones magis urinam cientes exhibeantur. Alius item per infusum eluatur, & oleo cum decoctis exhibito, ad uomitum cogendi sunt malè affecti. Ad plagæ uerò locum, post exuentionem, circuncisionem circunquaque scalpello factam, cucurbitularum affixionem, & dissectas gallinas adnotas, calx uiua cum oleo imponitur, & emplastra attractoria, & theriaca illinuntur. Porro Dipsadis priuatim meminit Aelianus lib. IX. de historia animalium, sic inquit. Dipsas, cuius uini, & naturam eius, nomen nobis declarat, inferior quidem magnitudine, quam uipera, sed tamen in occidendo quam celerrimè superior. Cuius morsu confixi etsi assiduam potionem hauriant; ad sitim tamen continuo exardescunt, & ad bibendum eatenus inflammantur, quoad celerrimè rumpantur. Eam Sofratus cum albam esse ait, tum duas in cauda lineas nigras habere. Et sicut audio, uario, multipliciq; nomine nuncupatur: quidam præsterem uocant, alij cansonem, alij anombaten, à quibusdam melanurus appellari fertur. Cum in Aphrica, tum magis in Arabia nascitur. hæc Aelianus. Ex quibus uerbis manifestè deprehenditur error Leoniceui uiri alioquin eruditissimi, qui Dipsadem putauit corporis forma nullis notis à uipera diuersam esse. Nec equidem scio, qua ratione, uel auctoritate nixus, in hanc opinionem uenerit, in eaq; perstiterit.

Hæmorrhoi  
morsus notæ,  
& curatio.

Dipsadis hi-  
storia morsus  
signa, & cura.

Leoniceui er-  
ror.

## Natrix.

## Cap. LI.

AB NATRICE demorsis ulcus dilatatur, & liuidum, ac ingens euadit. Sanies ex eo multa, & atra, & malè olens, non secus atque iis quæ serpunt ulceribus, expuitur. Si ergo morsum natrix adigit, prodest origanum tritum, & aqua subactum: lixiuia cum oleo indita, aut aristolochiæ cortex, aut querna radix minutim contrita, & hordei farina cum aqua, & melle colliquata. Bibuntur etiam  
50 binæ aristolochiæ drachmæ in potione poscæ cyathis duobus, deinceps marrubii succus, uel decoctum alterius cum uino. fauus recens datur in aceto.

HYDRVS anguis in aquis plerunque degit, à quibus nomen sibi uendicauit: Sunt & qui Natricem, quod a  
quis innatet, uocent. Hic si relictis aquis, terras inhabitet, longē nocentior euadit, uocaturq; tunc chersydrus. Dis-  
fert tamen is à dryino, qui (ut superius diximus) Nicandro hydrus etiam appellatur. Siquidem ipse de Hydro, cuius  
nunc historiam, morsus discrimina, & remedia prosequimur, differuit sub Chersydri nomine in theriacis, sic carmine  
in profam uerso scribens. Age itaque chersydri, qui aspidi conformis est, figuram æqualem recita. Sed plagam eius  
malefica, & pessima sanè signa sequuntur. Tota cutis circa carnem arida, & abominabilis expassa ab internis par-  
tibus, humentem ictum. satis certò indicat, putredine fathiscens. Quinetiam dolores immensi ignescentes, hominem  
60 tandem interimunt, mox etiam per membra pustule finguntur, aliæ ex alia parte inuicem turbantes egrum. Atq; i  
chersydrus iam antea in uuido, seu parum aquæ habenti lachrym, irreconciliabilem ranis iram adfert. Enimvero ubi sole

Hydri, siue  
natricis histo-  
ria.



Chersydri na-  
tura, morsus,  
& curatio.

aqua exiccata fuerit, adeoq; ariditas in fundo extiterit lacus, tum hic serpens in terra sese continet, & squallidus, & deformis in sole tetrum corpus suum rescillans: in semitis autem, lingua sua afflando sitibundus sulcos exedit. hæc ille. Chersydri quoque meminit Aetius lib. XIII. cap. XXXV. his uerbis. Serpens hic chersydri appellationem inde habet, quod in principio quidem in aquosis degit locis, & hydrus appellatur ab ipsis aquis, hoc est natrix. postea uero siccos incolit locos, & ex compositione locorum, chersydri, id est natricis terrestris, nomen inuenit. In humidis quidem locis, ex humido uictu exsatiatus, non purum uenenum habet: cum autem terrestris sit, nocentius id acquirat. Cæterum forma, paruam terrestrem aspidem refert, præterquam quod ceruicem non ita latam habet: hoc enim insigne solum aspides præ his habent. Qui igitur ab hoc morsu sunt, eis communiter eadem accidunt, quæ in aliorum serpentium morsu, ueluti est tumor, continuus dolor ardens, liuidus locus, & sæculentus, uertigo oculorum, exolutio, uomitus biliosus, ac fætidus. Proprie autem motus totius corporis inordinatus, ut et per uentræ quædam inordinatè ferantur: mors autem intra tres dies. Porro ex communibus remedijs etiam hi opem ferunt, & ex theriacis antidotis. Priuatim uero coni cupressi drachmam unam, & nyrti baccarum itidem unam, terito, & cum melle rosaceo, aut uino mulso in potu exhibeto. Iuxta uero affectum locum calcem uiuam, & similia, cum oleo imposito.

## Cenchrus.

## Cap. LII.

CENCHRI morsum, qui uiperino ictui similis est, putridum ulcus sequitur. carnes antea, ut in aqua inter cutem, prætumidæ defluunt. lethargo corripuntur, & ueterno pressi somnos captant. Erasistratus eos iecinore, intestino ieuno, coloque confictari auctor est. quippe dissectis ipsis, omnes ferè partes corruptæ reperiuntur. Morsus à cenchro auxiliatur lactucæ fructus cum lini semine illitus, & satureia trita, & syluestris ruta, & serpyllum, cum duabus hastulæ regix drachmis, & tribus uini cyathis, aut aristolochiæ radix, item cardamomum, & gentiana.

Cenchri con-  
sideratio.

QUANVIS Aetius appellauit Cenchrum ammoditen, & acontiam cenchriten; non tamen propterea censendum est Cenchrum, de quo hic differit Dioscorides, ammoditen, aut acontiam esse: quod hic nullam cum illis habet cognationem, nec similitudinem. Ea autem de causa Cenchrus dictus est, quod maculis perquam minimis (ut Lucanus est auctor) milij magnitudine, & colore, uniuersum eius corpus respersum appareat. Auicenna cenchrum fæmosum appellat.

## Cerastes.

## Cap. LIII.

A CERASTE percussis locus attollitur, cum duritia pustulosus. è plaga sanies profluit, modò atra, modò pallidior: sed toto concretu uaricosus intumescit: genitale intenditur, mens labat, & oculorum caligo exoritur: denique rigore neruorum distenti commoriuntur. Si cerastes percussus, cita partis amputatio suffragatur. quare sine mora ictam partem amputare, aut scalpro confestim circuncidere, & ijs similia prosequi oportet. Vrentia insuper reliquijs admouenda: siquidem uirus hoc ueneno basilisci simile est.

Cerastæ mor-  
sus exitialis,  
& auxilia.

CERASTÆ, quorundam probatissimorum auctorum testimonio, in Africa duobus in capite cornibus cochlearum instar oriuntur, à quibus cerastæ, hoc est conutis, nomen inuenerunt. Horum morsus lethalis ferè semper fuerit, nisi (ut Dioscorides inquit) demorsum membrum statim à reliquo corpore abscindatur, amputeturq; aut saltem illico omnis caro, quæ demorsum ambit locum, circuncidatur. Immanis hæc fera (ut refert Aetius) cubitalis est longitudinis, longissima duorum est cubitorum, corpore uero arenosa, & iuxta caudam desquamata. Eminentias habet in capite duas, cornuum similitudine: partes uero circa uentrem ex ordine squamis obstitæ sunt. quapropter in serpendo sonum sibilo similem edit: per obliquum autem, non rectè proreptat. Cæterum percussis ab ea, eleuatio ac tumor plagæ capitis clauis similitudine insurgit, & sanies profluit uini colore, aut nigricans, & maxime per ambitum, uelut in cruentatis ac sugillatis aliàs fieri consuevit. Reliqua item, quæ in uiperæ morsu dicta sunt, etiam his succedunt, cum intensione uehementiori. Vt plurimum uero usq; ad nonum diem supersunt. Remedia autem eadem, quæ morsu à uiperæ conferunt. hæc Aetius.

## Aspis.

## Cap. LIIII.

AB ASPIDE ictis uulnus exiguum prorsus, quasi ab adaucta acu citra tumorem conspicitur: sanguis exiguus ille quidem, sed ater distillat: caligo uelox oculos obnubit: labor in totum corpus multiplex, omnino leuis, & non sine uoluptate consequitur. Ideo Nicander perpulchrè cecinit. At uir perit absque labore, uirens, atq; discolor. mediocris stomachi dolor afficit: frons perpetuò reuellitur: genæ contremiscunt, quasi sine sensu in somno uacillent. hos mors tollit, ad diei trientem non dilata. Cæterum ijs, qui ab aspidem feriuntur, quæ de ceraste scripta sunt, auxilia dari debent. Nam uenenum hoc, quemadmodum basilisci, aut sanguis bubulus, celerrimè in arterijs sanguinem cogit.



REPERIO apud eos auctores, qui animalium historias tradunt, tria Aspidum genera constitui, & unumquodque, ubi hominem morfu comprehenderit, celerrime mortem inferre; quippe tanta est carum ueneni uis in hominum necem, ut rarissime seruentur, qui ab eis percussi fuerint. De his scribens Galenus libro de theriaca ad Pisonem, sic inquit. Inter aspidēs nominata pyas collum exporrigens, & spatij metita longitudinem, perinde ac si tunc rationalis fera facta esset, uenenum solenter corporibus inspuat. Harum itaq; ferarum una (siquidem tria sunt Aspidum genera, pyas dicta, chersæa, & chelidonia) reginam ferunt Cleopatram, cum uellet custodes latere, statim, & citra suspicionem mortem sibi consciuisse. Hæc ille, qui subinde pluribus historiam enarrauit tam inuidi animi huiusce moribus de reginæ. Ceterum chelidonium uocatam, id nominis sibi comparasse uolunt, quod hirundinū modo dorso nigricet, & candicet aluo. quemadmodum & pyas altera dicitur, quod in hominem expuat. chersæa uero ita dicta est, quod in mediterraneis semper degat. Harum omnium meminit Aetius libro VIII. cap. XX. sic inquit. Aspidum apud ferarum scriptores tres species reperiuntur. quedam enim ex eis terrestres appellantur: quedam uero chelidonia, quæ circa fluminiū ripas, præsertim Nili, latibula habent: alia uero pyades nominantur. Terrestres quidem igitur maiores sunt, & quandoque usq; ad quinque cubitorum longitudinem reperiuntur. Maxime uero pyades, cinereo sunt colore, uiridiq; & ad auri colorem inclinante. Terrestres uero ut plurimum & ipsæ cinerei sunt coloris, quanquam & subuirdes reperiuntur. Ceterum accessiones, & signa communia sunt in his, quos aspidēs momorderunt. Vulnere enim in demorso loco, ueluti ab acu puncta inueniuntur: bina quidem ex maris morfu, ex scænellæ uero quatuor citra magnum dolorem, à quibus nihil effluit, nisi uolentum animal sit, quod morsum infixit. Consequitur autem stupor, pallor, frontis refrigeratio, asidui hiatus, palpebrarum nictationes, colli inclinatio, capitis grauitas, segnities, & collapsio in somnum profundum, ad finem uero & conuulsio. Mors autem in tribus ad summum horis ex terrestris morfu sequitur: in chelidonia uero ictu præsentissima adest. Porro his, qui à pyade conspuuntur, caligo oculorum succedit, & cordis dolor, faciei tumor, ac auditus corruptio: tardius autem mors consequitur. Auxilium autem ab aspidē morfi ferunt, & præsertim quos pyas momordit, ex acerrimi aceti potu: dandum autem est, quousque aceti qualitatem circa dextram præcordiorum partem perceptent. hepar enim in morfi ab aspidē primum aiunt sensu priuari. Ceterum ad prænotationem, an uicturus sit percussus, centaurium cum uino tritum bibendum præbent: siquidem enim euomet pharmacum, morietur; si non, uiuet. Quo uero ueneni in corpus distributi uis probè euonatur, allia trita cum zytho exhibenda sunt, donec nauseabundus reddatur malè affectus. aut opopanax cum uino diluto detur, & confestim euomet. Numius autem inquit. Origanum uiridem, aut aridam pro egri uiribus cum uino dato. Post uomitum antidotis theriacis utendum, & communibus remedijs prædictis. Vtiliter autem ad plagam imponuntur post cucurbitarum adhibitionem, & scarificationem, centaurium cum myrrha, & modico opio. Rumex autem si cataplasmatibus modo imponatur, nihil ledetur. Præter opinionem uero auxiliatur theriaca tum plagæ imposita, tum pota. Profunt autem & assidue excitationes cum euulsionibus, & plagis, & uniuersi corporis motus, & aqua marina calida pro fomento aspersa. hætenus de Aspidibus Aetius. Efficacissimum porro, & omnium, quantum equidem expertus sum, præstantissimum antidotum contra uenenosum ictum aspidum, quas surdas dicunt, quæ in Italia pluribus in locis reperiuntur, est nostra quinta essentia, ex aqua uitæ & antidoto nostro confecta. Quippe cum tenuium admodum sit partium, ictu oculi in uniuersum corpus diffunditur, uenas, & arterias confestim permeans. Vnde prohibet, ne sanguis & spiritus in uasīs refrigerati cogantur: atque aucto calore innato, ueneni uim accet potētissimè, idq; superat citissimè.

Aspidis perniciosus ictus & genera.

Aspidum historia, ictus notæ, & cura.

## Basiliscus.

## Cap. LV.

ERASISTRATVS in libro, quem de medicaminibus, & uenenis condidit, de uocato basilisco scitè ita refert. Cum basiliscus momorderit, uulnus ad auri colorem efflauescit. Itaq; in plurimis, quæ uirus eiulantur, comites notæ ita se habent. Ad basilisci morsum, ut idem Erasistratus auctor est, auxiliatur castorij drachma in uino pota: item papaueris succus. Ictuum remedia ita se habent.

MULTIPLEX uariæq; est apud ferarum scriptores Basilisci historia, quem Latini Regulum uocant. Sunt enim qui scribant tantæ perniciæ animal esse Basiliscum, ut solo oculorum intuitu, alij sibilo tantum, alij halitu, alij uero morfu, homines statim interimat. Nec desunt qui uulgi opinionem secuti, ex antiqui galli ouo hanc sensissimam feram nasci putant. Ex hac itaque historię uarietate, ac inconstantia facile adducor, ut credam, plerosque historiā basilisci, ut fabularem, descripsisse. Id quod etiam probè Dioscorides sensisse, atq; adeo nostro iudicio adstipulari uidetur. Siquidem is ne cum alijs accusaretur, Erasistratum citauit, auctoremq; historię huius fecit. Basilisci meminit Galenus libro de theriaca ad Pisonem (si tamen liber ille inter legitimos censetur) ubi sic inquit. Basiliscus bellua subflaua, & triplici frontis apice munita, tantummodo conspectus, & quando sibilat auditus, uidentes se, & audientes necat: atq; si quod aliud animal illum etiam mortuum attingit, statim moritur. Hinc aiunt omne aliud reptiliū genus cauere, ne basilisco uicinum habitet. Libro uero X. cap. primo de simplicium medicamentorum facultatibus idem contra Xenocratem scribens, non omnino Basilisci historiam comprobare uidetur, sic inquit. Nam bestiam seu feram regiam, quam uocant βασιλικὸν ὄφιον, ne uidere quidem mihi unquam contigit: & si uera sunt, quæ de illa referuntur, periculosum etiam est uel propè accedere ad hoc animal. Aelianus præterea Basiliscum tanta ueneni acuitate, & inmanitate pollere ait, ut quauis magnitudine dodrantalē non excedat mensuram; serpentes tamen omnes etiam ingentes suo duntaxat halitu extinguat, adeo ut uirga quoque è longinquo contactus, illico tangentem conficiat.

Basilisci uaria historia.



Catablepas.

Plura fabulosa in Basilisci historia.

conficiat. Huius item horrendissimæ feræ historiam tradidit Plinius lib. viii. cap. xxi. ubi ita scriptum reliquit. Apud Hesperios Aethiopas fons est Nigris, ut plerique existimauere, Nili caput, ut argumenta, quæ diximus, persuadent. Iuxta hunc fera appellatur Catoblepas, modica alioquin, cæterisq; membris iners, caput tantum prægrauæ ægrè ferens: id deiectum semper in terram. Alias internecio humani generis, omnibus, qui oculos eius uidere, confestim expirantibus. Eadem & Basilisci serpentis est uis. Cyrenaica hunc generat prouincia, duodecim non amplius digitorum magnitudine, candida in capite macula, ut quodam diademate insigni. Sibilo omnes fugat serpentes: nec flexu multiplici, nec ut reliquæ, corpus impellit, sed celsus & erectus in medio incedēs. Necat frutices non contatu modo, uerum & afflatus: exurit herbas, rumpit saxa. Talis uis malo est. Creditum quondam ex equo occiso hasta, & per eam subeunte ui non equitem modo, sed equum quoque absumptum. Huic tali monstro (sæpe enim enectum concupiuere reges uidere) mustelarum uirus exitio est: adeo naturæ nihil placuit esse sine pari. Inijciunt eas cauernis, facile cognitis sola tabe. Necant illæ simul odore, moriunturq; & naturæ pugnam conficiunt. Hæc de Basilisco Plinius. Quem tamen plura cum alijs fabulosa narraffe putamus. Nam si tantum oculorum intuitu, sibilo, aut halitu hominem interficit, non equidem uideo, quomodo factum sit, ut ij qui ipsum uiderunt, eiusq; faciem adnotarunt, ex quorum postea relatione huius feræ historiam plerique descripserunt, incolumes euaserint: præsertim cum tam paruum sit animal, ut nisi è propinquo loco conspici possit. Atque adeo hinc mihi impossibile uidetur, quin ipse aspicientes non uiderit, cum (ut Plinius refert) non multiplici flexu incedat, ut reliquæ feræ, sed celsus, & erectus: uel quod ex insecto circumstante aere, qui uiderunt non perierint. Cæterum cum Erasistratus his fabulis nullam fortasse fidem adhiberet, certoq; sciret Basiliscum morsu tantum, ut aliæ feræ, homines interimere, eius duntaxat morsus curationem instituit. Verum quandoquidem huiusce ueneni uis adeo uehemens, & inmanis existit, ut expugnari non possit, non est cur plura hic referam, quam ex Erasistrato memoriæ prodidit Dioscorides. Quem dum & auctorem secuti, ut ipse suis de medica materia libris hoc sexto finem imposuit: ita nos nostris in eos commentarijs, quos ad nostram communemq; rei medicæ studiosorum utilitatem conscripsimus, iam extremam manum imponemus. Non obliti immensas gratias agere DEO optimo maximo, cui & omnia accepta referimus, & honorem ac gloriam tribuimus sempiternam.

LIBRI SEXTI ET VLTIMI FINIS.

Venetiis, In Officina Valgrifiana.















